



Y  
J  
30





THEOPHILI

BONETI

MEDICINÆ DOCTORIS

SEPULCHRETUM

SIVE

ANATOMIA PRACTICA

EX

CADAVERIBUS MORBO DENATIS

*Proponens*

HISTORIAS ET OBSERVATIONES

*Omnium Humani Corporis Affectuum, ipsorumq; Causas reconditas revelans.*

*Quo Nomine tam PATHOLOGICÆ Genuinæ, quam NOSOCOMIÆ Orthodoxæ Fundatrix, inq;  
MEDICINÆ VETERIS ac NOVÆ Promptuarium dici meretur.*

*Cum INDICIBUS necessariis.*

EDITIO ALTERA, QUAM NOVIS COMMENTARIIS

*Et OBSERVATIONIBUS innumeris illustravit, ac fortia ad minimum Parte auctiorem fecit*

JOHANNES JACOBUS MANGETUS, MEDICINÆ DOCTOR;

*& Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiatr.*

TOMUS TERTIUS.



LUGDUNI.

Sumptibus CRAMER & PERACHON.

M. DCC.



THOMSON

B. O. M. L. I.

THE NEW YORK

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871



THEOPHILI  
BONETI  
MEDICINÆ DOCTORIS  
ANATOMIA PRACTICA,  
S I L V A  
DE ABDITIS MORBORUM CAUSIS  
Per Cadaverum Dissectionem revelatis.

LIBRI TERTII  
SECTIO XXIX  
DE HERNIIS.

OBSERVATIO I.

*Hernia Rupturam Peritonæi raro sequuntur, frequentissime Expansionem.*



Oc animadversione non indignum videtur, Peritonæum rarissime disruptum: In apertis cadaveribus aliquoties expertus sum, & demonstravi umbilicum cum subsequenter intestinis inflat capitis virilis protuberasse, adeo ut muscoli ventris ad latera impellerentur, & à se invicem separarentur, attamen Peritonæum expansum erat, sed nunquam disruptum. *Barbette Chirurgia Parte 1. cap. 7.*

**P**eritonæum rarissime disruptum] Ab apertione aliqua in Peritonæi membrana, quæ intestina & Omentum in ventre inclusa retinet, facta, si intestina vel Omentum ex abdomine per foramen elabuntur, homin procidentia sequitur, quæ tumorum, Cæle dictorum, varia genera producit: Hæc autem apertio Peritonæi, vel absque ruptura, vel dilatarione proficiscitur, Ob rupturam peritonæi procedentia illa exoritur, intestinelorum vel omenti, quæ tumorem illum, qui verius Hernia vel Ruptura dicitur, gignit, illiusque species diversæ pro diversitate loci ubi ruptum sit, & partis quæ procidit variantes: Si enim in inguinis regione fiat ruptura, & in musculis pro-

cessus peritonæi, qui testes cum seminariis vasibus suspensos retinet & includit, initium scindatur, intestinis tunc per hanc aperturam in inguina sub cutem se insinuantibus, fit Enterocæle: & si illic subsistat, Tumor in inguine prodit: Si vero in saccum deorsum quoque prolabantur, illic tumorem excitant, cumque sepe immensum; si magna intestinelorum portio descenderit, vel illa fistulis dilata, aut excrementis repleta sint, quæ si dura fuerint, tactu etiam deprehenduntur: Si vero flatus in illis contingantur, cum premuntur murmur edunt: & si illic hæreant intestina, nec reponi, quia dilata vel convoluta sint, possunt, cum excrementorum ductus interclusus sit, ut illa minime de-

eiantur, causam præbent, unde fecibus concervatis, sursumque regurgitantibus, ille tandem evomuntur. Quod si vero *Omentum* portio, per ematratam rupturam in loquens feratur, Epiplocele fit, tumore illic plenissimo remanente, nequaquam descendente, cum Omentum ob brevitatem, longitudine sua os pubis vix superaret, tantopere descendere, ut intestina quæ longissima sunt, non possit, nisi forte de illo portio abrupta, quod eadem vi qua peritonæum scinditur, fieri potest, eoque citius, si postquam egressum & retentum, attractum admodum & tensum est, vi hac illigillata, ulterius feratur, & in scrotum tunc pars illius subdeat, quæ tamen amplius reponi minime posset: Vidimus & in Inguine, immensam in quodam tumorem, quem ex omento eo prolapsum processisse, ex contracta adipis diurni cili inæqualiter, uti in Omento adnasci solet, se offerentis, disjungere potuimus, quod disruptum fuisset, copia illius quæ huc præciderat, aliquo pacto innuere videbatur. Vel rariorem fuisse hic, tunc mox offendimus, relaxationem, cum dolorem aliqui nullum sentiret, unde neglecta cura non diu post supervixit: In Inguinis mulierum regione, si peritonæum illic disruptum, ubi

vas quoddam ex utero per illud in Inguinis extrorsum fertur, tunc ut per processum in viis, sic in feminis per hanc viam prolabeoribus quoque intestinis, Enterocoele quædam, prodibit, in qua immensus tumor quandoque in inguinibus se offert, vel Epiplocele, si Omentum præciderat, quod cum longius in mulieribus quam in viis existeret, tumorem quoque eminentiorem in hisce quam illis progignet. Quod si peritonæum in alia abdominis regione ruptum, atque Intestina vel Omentum illic sub eadem provolvatur, si in umbilici regione hoc fiat, Omphalocoele dicitur, Si alibi citius eum, Hernia seu Ruptura generale nomen servat: In quibus Herniis tactus sæpe an intestinum sit, quod præsum mutatur, Vel omentum, quod nullum edicet, & quod illud majorem, hoc minorem tumorem efficiat, discernat.

(Ex Dilatatione, seu Relaxatione sola processus peritonæi, per quæ vasa seminalia ex abdomine in scrotum descendunt, citra rupturam, intestini vel omenti portio etiam prolabi, atque Enterocoele vel Epiplocele fieri potest: Quod sic contingere ostendit, quia citra prægressum dolorem sensum de subito fit, ac præterea ocularis inspectio, *Placerni Prax.* 3. c. 2.)

## OBSERVATIO II.

*Vera Hernia non fit sine peritonæi rupturâ, Imperfecta per solam relaxationem fieri potest.*

§. 1. **T**estis equidem tunica involvitur vaginali, at ea non extendit se ultra testem, sed circa vasorum pyramidalium basin definit, testis unita, adeoque transitis hic loci nullus versus abdomen, Processus adeoque peritonæi hic nullus, ac si vasa spermatica vaginali quadam tunica, libera, tegerentur, quale quid in canibus notamus, sed hic membranulæ dantur plurimæ, coagmentatæ, vasa hæc connectentes: Testiculus tamen ipse à tunica hac totus distat (solo eo loco excepto qui pyramidalis corporis basis dicitur) sic ut spatium aliquod intercedat inter eam & testem. Hernia itaque, si quæ ex abdomine ipso, non fit sine peritonæi veri rupturâ verâ, nec tamen hic materia, quæcunque etiam fuerit, solida humoralive, intra testem & vaginalem tunicam colligitur, cum ex ventre ad hoc spatium nullus datur transitus, sed vero intra hanc & scrotum ipsam: Hæc dum proponimus, neutrquam fluctuantem, &erosamve Herniam (sic liceat loqui) produci posse negamus, à materia spatio inter testem & tunicam vaginalem congregata: hanc enim Observationes Medicorum frequentiores satis probant: Alit hic inter locum, quem materia hæc occupat, & ventrem infimum, nullus datur nexus; poterit enim vitiosa hæc affectio hic loci oriri, nil vitii in ventre ipso existente.

§. 2. In inguine non raro Herniam se exhibere notamus, hanc quacunque etiam à causâ dependeat, solam fere extensionem peritonæi sequi æstimamus, laxius enim hoc utroque inguine notatur, sic ut vel levi tactu sacculum sat notabilem versus femora se extendentem exhibeat. *G. Blasius Observ. Anat.* p. 20.

\* Si Tumor in umbilico appareat Omphalocoele dicitur, Si vero in alia parte ventris inferioris, vel superioris, non duxus tumor fiat, aliquando apparet aliquando latitans, Peritonæi rupta est: Atque si in ventre vitiorum inferioris talis appareat, etiam Relaxatio esse poterit citra ruptionem, citra foramen per quod descendunt vasa spermatica, elongatio in modum cruentum, cum suis contentis epiploce, vel intestinis vel æcrique, &c. si inferioris prononpare, secundum quod magis vel minus est lapsus, diversam sedem constituet, ubi enim ad pubem tantum perveniat Bubonocoele facit, quiescentibus ægris, vix apparet, post saltim autem, vel deambulationem conspicua est: Nec est prætermittendum talem etiam à rupto aliquo epigastri musculo fieri aliquando posse: Verum si supra dicta elongatio ad scrotum usque produeatur, Enter-

rocœle appellabitur, quæ omnes etiam à ruptione contingere possunt: Discernuntur autem secundum causas, ut si à Ruptione sint ea quæ tumorem faciunt, nuda in scroto propius tactui occurrunt; si ab elongatione, cum majore remittenda, & tanquam in secundo vase sentiuntur, quæ ubi in ventrem recipiuntur tumor cessat, hacque nota discernuntur hæc duæ Herniarum species à reliquis quæ in scroto conspicuntur, quæ etiam à talibus causis originem non habent, suntque hæc pneumatocele, hydrocele, sarcocœle & cistocœle: Pneumatocele levitate perspicua, quæ ab hydrocele distinguitur: Sarcocœle tumore & duritie testis dignoscitur: Cistocœle tumorem diversitate & parvitate in epididymo & vasis spermaticis ab aliis Herniis distinguitur. *Rondelii de dignosc. morb. lib. cap. 10. pag. 605.*

## OBSERVATIO III.

*Hernia à rupturâ Peritonæi.*

**A** Nno 1613. Septembris 24. aperti corpus cuiusdam decollati, in quo cum raptura intestinali laboraret, affectum & peritonæum ruptum ostendi, quomodo per eam rupturam intestina vel omentum decidunt. Modum etiam incidendi & ligandi demonstravi: Plures idem in utroque latere habebat varas & artetias emulgentes. *Joh. Rudolphus Salzmannus Observ. Anat.* p. 42.

## OBSERVATIO IV.

*Enterocoele à dilatatione sola processus peritonei citra rupturam dependens.*

**I**N Hernioso hydropico secto post mortem, ejusmodi foramen per quod intestinum in scrotum descendens transmittitur, robusto margine integrum, nec dum scissum vel ruptum ullo modo deprehendimus. Per quod intestini tenuioris portio illa, quæ supra cœcum est, in scroti, aqua pleni, infimam sedem usque ferebatur, totoque illo ductu huius processui peritonæi hujus aquæ causa, quæ tuniceas has erodendo ut conglutinentur facit, firmiter accreverat & adnatum erat, nihilominus sine incommodo excrementa egerente, nec dum de dolore conquirente. *Platerus Practic. lib. 3. cap. 2.*

**H**oc in causa non subitanea vis, quæ dissipare potius solet, sed conatus saltem frequens & validus egerendi sæpe repetitus in natura conspatis, in causa erit, unde & non subito sed sensim nascitur: cum enim per eum intestina deorsum in inguina protusa, ad hujus processui insidum propellantur, illius meatum sæpe impellendo, illique se tandem insinuando, eum sensim dilatant: Quod sic fieri, illiusque processui exordium eoque dilatari, atque etiam citra rupturam admodum dilatari posse, præter illarum exemplum hæc etiam comprobant, quod & alii ductus agustiores & crassiores sic dilatari possint, veluti intestines, per quos calculus aliquoties descendit, *idem ibidem.*

## OBSERVATIO V.

*Vasa Seminalia Peritoneo obvolvuntur ex sectione Anatomica Herniosorum patet.*

**N**otandum quod quando muscoli oblique descendentes tendo modice relaxantur, fit Hernia illa species quæ Bubonocoele vocatur: Quando vero valde dilatatur, tunc sunt Herniarum quæ species, Intestinalis & Omentalis: Valent namque corpora hæc in scrotum descendere. Neque alicui sit mirum si contra opinionem aiusdam Excell. Medicis sententiam, qui cum Fernelq. eredebant vasa seminalia à Peritoneo non esse induta, neque ita de facili tendinem hujus musculi perforari posse, cum jam sæpe, ut vidi, & celeberrimis Medicis ostendi rem aliter se habere, non solum in cadaveribus, sed in vivis, præsertim anno 1596. in quo vidi puerum qui Hernia intestinali afficiebatur, & cum à Chirurgo à Nutria per incisionem curaretur, Testiculo eum suis vasibus avulso manifeste inspexi, atque ostendi vaginam, ut ita dicam, testiculo à peritoneo factam, quæ ita erat dilatata in suo exortu, usque ad finem & fundum, ut duo digiti manus meæ facile ingrederentur, quod credo omnibus facile esse visum. *Hippolitus Bæfius de Facult. Anat. Lect. 1. p. 9.*

## OBSERVATIO VI.

*Mulieres Herniis esse obnoxias ostendit dissectio virginis, cui à relaxato Peritoneo Inguinalis accidit.*

**L**igamenta uteri Rotunda oriuntur à fundi uteri lateribus, his præsertim in locis ubi Tubæ Fallopiæ utero committuntur, & inter duplicaturam Peritonæi versus inguina utrinque ascendunt, & ut vasa spermatica in maribus, ita hæc Ligamenta in mulieribus extra abdominis cavitatem prodeunt: hinc illæ eadem ratione ut viri Herniis sunt obnoxie, quatenus scilicet Peritonæum eo in loco, ubi ligamenta exeunt, præter modum dilatatur: Quem admodum hisce diebus observavimus, dum Fillam Hernia laborantem post mortem dissectaremus, eo namque in loco, ubi rotunda uteri ligamenta abdomen deserunt, Peritonæum adeo relaxatum invenimus, ut integram foveam sive burfam efformaret, perquam intestina in inguen descendendo herniam intestinalem producebant. *Reyniers de Graaf de mulier. organis cap. 10.*

**H**erniosos aliquot à morbo extinctos se vidisse ait *Hildanus cent. 6. observ. 57.* Unam vero tantum herniosam, quæ maximè cum doloribus interit, quod tumorem in inguine celasset: (*idem observ. 70.* notat herniam in muliere, gravibus doloribus uteri, ventris & ventriculi vexata (cui exortus tumor in inguine duorum pugnorum magnitudine, à ruptura peritonæi, à descensu intestini tæcibus turgid) sed medicamentorum efficacia liberata. Lethalem quoque herniam in Funtilli uxore vidi anno 1667. cuilibet passio successit, ita ut à tumore in inguine noctis nullandis magnitudine, quam paucis ante interitum hostis detectam voluit.

\* *Hæc ligamenta in mulieribus extra abdominis cavitatem &c.* Considerata Peritonæi structura in muliere *Reyniers Anatom. Tom. III.*

lieribus, hoc occurrit, etiam membrana illius externa vasa spermatica, atque Testiculos: extra illam cavitatem, non penitus ut in hominibus deducit, membranam tamen largiti ligamenti rotundis, contentum per annulos passam, atque sufficienter ad intestinum productam, ut & Epiploæ & intestinis libertatem concedat ad vulva usque labra procedendi, hincque Herniam completam parandi: *De Blegny cap. 3. §. 6.*

*Fillam Hernia laborantem.* Peritonæum productionibus duabus donatum est: utriusque à lateribus una, ab ejus exteriori membrana rebus subiecta juxta os pubis sunt restes canales: hiores, per tendines muscutorum obliquoarum & transversorum extra ventris cavitatem in scrotum ad testes abeunt, læ

utque se explicantes propriam eorum tunicam conficiunt: per eas vasa spermatica præparantia descendunt, & remaneat deferentia ad testem cervicem non com-miscuitur testem in viris: In mulieribus vero duo processus ab utero ad supernam vulvæ partem abeunt, verum hisce productionibus (quas Vesiculis in feminis dari negat, quod in his teste, penduli non promineant) interior membrana arctissime adhæret, à qua tamen iuxta os pubis se jungunt, hæcque disrupta, & exterior dilata, prout vel intestinum vel omentum illapsum fuerit tam in viris quam

mulieribus Herniam causat: Hæc productio sectione per cutim in inguine facta, si proxime ad abdomen vinculo intercipiatur, illapsum quidem impedit, sed cum simul & vasa in viris ligentur, testis adinatur: Sin vero non proxime incipitur, tunc portio aliqua intestini adhuc illabente, plurimum molestat, et si foris nihil protrahere conicipiatur, vix etiam tâcui deprehendi possit, novaque sectio, novumque vinculum requiritur, ut exempla quorundam nos doceat. *Barbini Th. Anat. lib. 4. cap. 9.*

## OBSERVATIO VII.

*Hernia, ope subligaculi solius curata, natura hiatum materia adiposa effardiente.*

**S**acrificulus in ædibus S. Andreæ Artium sacris, nomine *Joan. Moretus*, Hernia completa laborans me accessit, opem efflagitans, maximo enim se dolore affici dicens, præsertim ubi officij causa esset canendum: Viso loco laborante, à cautione abstinendum dixi, munere alteri concessiohinc plurimis morbo congruis præscriptis, inter cætera subligaculo descensum cohibere jussi, quo & quinquennii vel sexennij spatium usus est; atque ex eo quærens quæ valitudine frueretur, se sanum esse asseruit: Quo de rei veritate constaret, in ædes meas cum deduxi, examinatisque genitalibus, nullum Herniæ vestigium comparuit:

Eo autem semestri post ex Pleuritide defuncto, cadaveris apertionis concessa, inquisivi scdulus quibus repagulis natura descensuris intestinalis obviam ivisset: Fidem testor me circa foramen productionis peritonæi invenisse substantiam adiposam, magnitudinis medioeris globuli spheristerij, tam arctè dicto processui adnexam, ut vix sine dilaceratione adjacentium laterorum divelli potuerit: Quæ sanationis causa fuerat: Multos præterea novi qui à pertinaci subligaculi gestatione, eaque sola citra aliud præsidium sanitatem consequuti sunt; quibus, prius macilentis, post obesis factis, circa intestina colligitur pinguedo, à qua iatumescent, unde nullus in ferotum patet transitus, reliquo postmodum sine recidiva subligaculo: Ex quibus patet temere instituendam non esse castrationem: Res certe admiratione non caret, naturam morbos inéurabiles ereditos, superare, levi auxilio adjuvari. *Parent Operum lib. 8. cap. 35.*

**A** Perinacii subligaculi gestatione] Quorum inveni- lum panem hamulorum castratione luctetur, inquit *Regi- de Graaf. de viderum organo pag. 4. b. 30.* quoniam de

## OBSERVATIO VIII.

*Extraordinaria Herniarum species per Anatomen deprehensa.*

**H**æc sunt simplices Herniæ & compositæ, prout vulgo describuntur, sed nobis plures alias praxis demonstrat, & quæ apud Scriptores non reperiuntur: nam experientia me docuit Peritonæum etiam in parte posteriori versus Dorsum posse disrumpi, & ibi Herniam efficere: Inguina sunt locus Herniis consuetus, verum noli tibi persuadere Peritonæum in aliis locis etiam non posse dilatai aut disrumpi, & ibi Herniam efficere: *Supra umbilicum contingit*, sed rarissime: Infra umbilicum, & ad ejus Latera, & longe supra Inguina, non duntaxat ego, juxta alios Hernias vidi, sed cum illis tanquam cum abscissu agebatur, & Chirurgus non aliam sui erroris rationem in medium producebat, quam quod ibi Herniis consuetus locus non esset. *Barbette Chirurgia parte 1. cap. 7.*

**S**upra umbilicum] Omphalocele, communi fæ- mularum parturientium à matris fœtus innotuit: ut supra umbilicum ita dilatai cutim ut videri interis exemplis: ab usu quotidiano est remotus: Mater grandævâ Hufensio: corpore quadrato & robusto, multis laboribus defatigata supra umbilicæ regionem, mox infra cartilaginem ensiformem tumore exorto, & repleto peritonæo, herniam patiens istius loci plane singularem, quæ quocunque labore incrementum capere non tamen equalis ubique tumor: In medio globulæ eminet, quo omentum vel intestinum particulam recipi ipsa et edidit. *Barbette anat. lib. 4. cap. 9.*

**Supra Umbilicum contingit]** Hippocr. sect. 1. lib. 1. Epidem. non Inguina solum Herniam eodem statui, sed & spatium abdominis: *Abdominis, cit; rariora*

quæ quidem circa pubem sunt, plerumque sunt flatibus repleta: quæ vero parum supra umbilicum in dextra parte, dilatam & corporis jactantiam afferunt, & videntur fieri inducunt: sunt autem hæc aut plaga, aut distensio, aut alterius insulæ. Raptus aut circa pubem sunt plerumque statim innotui esse aut, comparative scilicet aliis. Omnes enim dolores sunt, & partibus subjectis debilitatem afferunt: Gravem tamen fieri aliquando contingit distensionem: Supra Inguina, si distensio eam partem attingat quæ constricta est tendimibus muscularum: Rariora autem supra umbilicum existat, quæ tunc dextra parte, cæteris particulosiores sunt, quia hinc ægi parati ad vulvum.

**Inguina sunt Jæni &c.]** Vide *Clav. Th. Barbette*

exi Neapoli corpulentum quendam genio dedimus, colus duntaxat, ex quo postale enascuntur & suppu-  
rantur: Inferior pars mollior aquam continere vide-  
tur. *Cen. Hist. 95.*

OBSERVATIO IX.

*Eubonocle à descensu Coli in inguen. 1. A Cæci descensu. 2. A descensu Omenti, cum utriusque testicu-  
li Hydrocele. 3. Ab Intestinis inter cutem & musculos cobibitis. 4. Ab Omenti & Intestini prolapsu  
insequuta inflammatio & gangrena. 5.*

§. 1. **O**ccurrit ante aliquot annos mulier 40. annor. quæ jam à sex annis hernia gravi ex  
casu laboraverat: sic ut subligaculo forti propendentia, detinere coacta fuerit.

Aperto in cadavere: Intestinum Colon, rupto peritonæo, dilatatis externis, cavitatem  
ventris magna parte reliquisse observabatur, loco eò ubi ad constituendum Rectum flexuo-  
sum valde sinistro in latere detineatur. *Cer. Blasius observationum medic. 8.*

**I**n testinum colon rupto peritonæo. Eri omnium fre-  
quentissime & facillime descendit ileum; reliqui  
intestinis magis liberum & lubricum, posse quoque  
ptolabi Colon ostendunt *Nic. Massa p. 1. epill. 23. &  
Fabricius Hildanus cent. observ. 71. Marton, ais, à  
mortalis annis Herniosæ post delapsum intestinum, &  
in abdominis superiorem impulsum, gangrenam cum  
ulcere foetidum in inguine supervenit, ex quo bimelsti  
spatio feces alvi emanarunt, aque tamen annos ali-  
quot à curatione supervixit, nulla supervenit fistula:  
Colon autem fuisse affectum, non aliquid intestinor-  
um tenuium, & dilatationi, siue foraminis peritonæi  
inclusum, idque sine ulla reduplicatione intestini cre-  
didi, eo quod intestinorum colon sit crassissimum,  
unde facile fieri potest ut aliqua ipsius pars lateralis  
peritonæo dilatare, aut rupto includatur & putrescat.*

§. 2. Cum Cæcum intestinum properentem dextrum peritonæo contumaciè adhæreat;  
non possum adduci ut credam cum *Galeo* solum hoc intestinum omni vinculo solum esse  
esse, ob idque facile in serotum decidere. Experientia docet solum ileum ubi proximum  
Enterocelen facere. Inveni tamen in puerulis, quibus tum ossi sacro incubat, in serotum  
delapsum, Er nuper in Pharmacopoei cadavere juxta inguen provolutum observavi. *Riolanus  
Anthropogr. lib. 2. cap. 12.*

\* **C**oncedam Intestinum Cæ. Quodam Intesti-  
norum facillime procurbar & Herniam parit;  
distingue ostendit *Cla. de Blegny*, Chirurgus Regius,  
Tractatu de Herniis, Ex notis *ais*, situs partium im-  
ventris colligere est ex intestinalis semper lectionum pri-  
mum prodire in Omphalocelo, Solum Rectum per po-  
ditem eminare: Ileum autem rumpi Annulos transgre-  
di, illam autem coli partem quæ latus dextrum occu-  
pat, illuc quandoque devolvitur, si perquam raro id ac-  
cidere docet *Riolanus* ac solum in infantibus illud

§. 3. In subiecto virili ob causam moneram strangulato 1638. Parisiis: Omentum in inguen dex-  
trum producebatur: Deinde vero musculo cremasteri ita adnatum viscebatur, ut naturalem  
nexam diceret. Epiplocele enim laboraverat: Uterque quoque Testiculus Hydrocele infectus.  
*Bartholinus cent. 2. observat. 85.*

§. 4. Experiri etiam processum peritonæi in Inguinibus ita posse disrumpi, ut intestina  
non in serotum, sed inter cutem & musculos versus femur sese urgeant. *Barbette l. c.*

**I**nter cutem & musculos Cæ. Intestini prolapsi sub  
cutem abdominis, sectione facta repoluit, exom-  
plum affert *Platerus* observationum lib. 3. p. 78. Cui-  
dam tamen impetu facta portibus abdominis in latere  
circa umbilicum perforescat: post convalescentiam  
exiguus tumor, rupto scil. illic peritonæo, remansit;  
quem cum negligenter, tamen sensim peritonæi ex-  
vixæ emergentibus Intestinis, tumor in inguenem

§. 5. Pagano quidam viro rebus cum duobus litiganti, & in terram dejecto, adver-  
sariorum alter pedem in inguinis dextræ regionem adeo impetuose impexit, ut vehemen-  
tem inde cruciatum mox sentiens, vix iterum potuerit assurgere: Inde in lectum collocato,  
statim tumor in eo loco amplius apparuit: Chirurgus & Lithotomus vocati, rupturam in  
peritonæo factam, atque providentiam intestinorum sequutam judicabant, aliquotque dies



in reponendo intestino laborarunt, fomentis, inunctionibus & manuali operatione adhibitis: Quibus cum nihil proficeretur, dolore in dies augetur, & tumor admodum ruber, ad nos adfectus fuit: Cum vero cognovissem illum totos octo dies, ex quo laesus fuerat, nihil per alvum deiecisse, vomitumque eandem excrementorum alvi sequutum, & postmodum omnino intestina procidisse, uti & omenti portionem, tumore in inguine persistente, nec in scrotum descendente, intestina ex lésione inflammata, uti & vicinas partes asseveravi: Et quia tumor mollis, plenus & lividus erat, sanguinem quoque illic collectum ex lésione, eumque ex diutina retentione corruptum esse judicavi. Quibus consideratis, cum nulla alia spes salutis esset, & gangraenae indicia, exeatatis jam nigris in inguine pustulis, exsudantibus ichore apparerent, per sectionem cutis viam patefaciendam, & per rupturam peritonæi tunc conspicuam, intestina reponenda, Agro etiam hoc unice rogante, necessarium fuit existimatum. Itaque Chirurgus, cutem tumori instratam attolens digitis, ne dum secaretur, intestina forte laderet, eam novacula aliquousque discidit, agro nullum inde dolorem sentiente, quod emortuæ carnis è gangraena signum erat, statimque statum feridissimè & corruptus sanguis lividus, cadaverosi & abominandi odoris, per foramen peritonæi scissum, è vulnere erupit, tanta copia ut pelvim pene impletet: Inde sectionem longo vulnere continuans, omentum, quod omnino corruptum erat & procciderat cum intestinis, ab his, amplitudine duarum palmarum abruptit, atque hæc eadem admodum rubentia cruentaque per rupturam intrudere, rursusque erumpentia retinere studuit, quod dolorem agro pariebat, ut omnino interdum deficeret: Postea pannis duplicatis & involutis, applicatisque cum emplastro, ne erumperent intestina cavui, mortem interim prædicens, uti & ego, cum pulsus in eo deficeret, extremaque frigerent, quare tres tantum horas in agone versatus exspiravit.

Abdomine sectione referato, intestina intrinsecus livida aliquousque, uti & peritonæi infetior sedes, carnosaque vicina loca contusa apparuerunt, ex quibus ea inflammata gangrenataque fuisse satis apparuit: *F. Platerus observat. lib. 3. pag. 756.*

**P**er sectionem cutis] Peritonæi nimirum magnam illam sectionem ab antiquis usurpatam & usqueperveniatam: in præsens vero ob Chirurgorum ignorantiam ratam (quod multis exitio est) nimirum dum in Hernia intestinali, intestinum aliquod quasi capitulum detinetur, ita ut etiamvolvulo laborent, & mortifia sint proximi nisi cum subtili dilatactione impet peritonæi secantur. *Franc. Rossetus de Partu Cesareo sect. 3.*

cap. 3. Videant tamen qui sectione Hernias curare instituant, & diligenter inquirant an intestina per processum peritonæi in scrotum delapsa, vel delabantur, viz angustis quasi strangulata gangraenam contraxerint: Tunc enim etsi rectissime secantur, postmodum æger certissime morietur; Chirurgus autem cum necesse videbitur, ejus rei in Gallia exempla observata notavit *Stigelius: Valschlinus obs. 49.*

## OBSERVATIO X.

*Ob Herniam castrati plerique intereunt, vi illata per itonæi processus, nervo sexti paris & vas. spermaticis.*

**E**t si ea curandarum Herniarum via, quæ aureo puncto fit, dolore ac periculo non vacet, tutior tamen est quam illa quæ fit per castrationem: quæ ægros remèdii crudelitate enectos manifesto mortis periculo exponit: Castratores enim dum timent ne curatione absoluta superstes sit relatio, violento tractu peritonæi processum à partibus quibus adhæret divellunt, unaque nervum à sexta conjugatione, qui ad testem pergit, eandem vim spermaticis vas. inferunt, quibus ex rebus dolor excitatur ingens, convulsio, hæmorrhagia, inflammatio, putredo, ac denique mors, ut ego in multis observavi, quos paucis post diebus quam exsecti fuerant, exsecui mortuos: Hæc pericula & damna, etsi nonnulli evadant, illi tamen generandi facultate per omnem delicias vitam privantur. Quare nunquam sectionem Testium subteribam, nisi forte sarcocole aut gangraena ipsos invaserit. *Percus lib. 7. cap. 16.*

## OBSERVATIO XII.

*Enteropilelocelelethalis ob sequentem gangraenam. 1. Ob lési & Epiplois, cum aqua & fluitibus. 2. Ob Epiplois maximam partem devolutum. 3. Ob inflammationem Epiplois & intestinorum.*

**A** Gæcilius olim fui ad Senem quendam herniosum, cui intestina in scrotum prolapsa erant, & qui variis usque gravibus ob id molestabatur symptomatibus: Apud quem Chirurgum reperi illa in suum redigere locum antientem, applicatione forum & unctionum, ex rebus magna ex parte adstringentibus apparatusum: Ego animadvertens eorum usum impediri potius quam promoveri curationem, confestim ex emollientibus & relaxantibus curavi concinnanda remedia, quorum usu intra paucas horas suo loco fuerunt restituta, intestina, & dolores quibus acriter infestabatur sublari: Post aliquod autem

temporis spatium, quia fasciæ usum avertabatur; relapsa cum essent; denique ad illam sum vocatus, ac eadem quæ antea per aliquot dies usurpans remedia, nihil profeci; nec ullò modo intestina potuerunt restitui; & sic præfente bonis senex expiravit.

Ego hærens qua ratione id potuerit accidere, quod usæ convenientium remedium morbus, quemadmodum antea, non ecesserit, petii ex uxore defuncti ut liceret dissecto cadavere ejus contumaciæ investigare causam: Illa non refragante, Ego & Chirurgus opus anatomicum mox aggredimur, & reperimus intestina, una cum epiplo, admodum liventes, in serorum decubuisse, & eo intestina adeo intricata, ut ob id impossibilis omnino fuerit eorum reditio. Et sic *anatomia* in veram ejus contumaciæ pervenimus notitiam. *Ex observationibus Cosma Holzachi.*

§. 2. D. N. herniosus erat; In serorum pars ilei devoluta erat cum Epiplo, præter aquæ copiam: Colon flatibusurgidum. *Vide lib. 2. tit. de palpitu cordis.*

§. 3. Dom. du Lac, annos circiter quinquaginta natus, ab incunabulis Entero epiplocelè vexatus, cum Tumorem ad immensam magnitudinem devenisse observaret, Tetrico Arvernorum, patriæ, Lugdunum medelam quærens conoessit: Convoctati in consilium D. D. à *Claudio, Grassius Ego, Mag. Panthetus & Benoist* Chirurgi, exitum lethalem & calamitatis plenum prædiximus, qui sectioni soli cedere possit, evidenti periculo obnoxii, ob debilitatem partibus inducram, gangrææ & sphacelo expositarum: Objecti æger se ab anno bis vel ter volvoloso affectu affectum fuisse, ob quem in exitum pene deductus esset, malle se remediū aleam subire, quum nihil morte funestius ipsi accidere posset, languoribus finem impositura: Mæculus ægri animus assensum Medicorum & Chirurgorum obtinuit: præparato ergo corpore Colotomen peregi, atque Omenti uncias octodecim exsecui, membranæ tenaciter annexi, immutato quadantenus illius colore: Operatione peracta curam juxta methodum institui: sed Anima ejusmodi domicilii pertæsa, id atrophiam consumptum septima die deseruit: *Observatio.*

Præsentibus dictis D. D. Medicis & M. Chirurgis cadaver aperui: Omenti vero tantum portunculam, ovo columbino magnitudine pæm intestino lico hærentis, repeti; cujus pars gangræa erat affecta, convulsionem & mortis causa:

I Nde colligo in affectibus qui minus spei quam timoris præbent, non temere ad operationes accedendum esse, sed demum habito consilio, & petito à viris Artis peritis, quo præcedente matum deliberatione & prognostico, libera sit erga Deum & homines conscientia. *Josephus Covillardus Operationum Jætro Chirurgicæ, Gallicæ editarum 17.*

\* Omenti tantum portunculam De prociديو Omenti Exicium patiente, sic differit N. de Blegny lib. de Herni; Gallicæ editio, Nec minus utile est, inquit,

§. 4. Hæst. J. H. Hæstler, ab octodecim annis Herniosus, vehementi correptus tussi, intestinis vi deorum pulsus & quasi incuneatis, tandem inflammatione & ingentibus doloribus supervenientibus, bis vomuit nigra, cum præ anxietate non posset contineri lecto, & omnibus invitis sæpe surgeret, à loci mutatione remedium dolorum sibi promittens, tandem sedili locatus, lethali animi deliquio correptus placide expirabat.

Aperto cadavere serorum dextrum omento & aliquibus intestinis plenum inventum, ita erat impacta, ut quamvis corpus adhuc caleret, vix extrahi sine ruptura potuerint: Inflammata erant, tensa erant quasi: inde biduo ante obitum è lecto surgens, erecto non poterat ambulare corpore: ventrem super pronus curvare cogebatur. *Rolskius Epitomes meth. & cur. cap. 6. lib. 3.*

I N Pitavina urbe crebriores observavi Hernias intestinales incarceratas, vomitibus nigris subsequen-  
tibus cum cursu ad lethalem metam tendentes: Apertis defunctos tres, & prolapsum intestini ilei intorti, facumque in carcere incuneatarum rationem summa cum attentione examinavi: Inde audacior factus, rogatus ardentissimo ægri & astantium, ancipitem, dubiæ plenam alicæ sectionem aggressus, benedictionem cœlicam expectans sum: Liberavi intestinum incisa cæce, processibus musculorum & peritonæo; illo reposito, furoris adhibitis, sensum vulnus nulla subsequente hernia: Stultulus de dolore & tumore inguinis dextræ conqueffus, in consilium adhibuerat: Prædicum insignem; Hujus rogatu ægrum invivens, detecto tumore inguinis, ægro moriendum esse prædixi illi sectio adornaretur. Multa internis & externis me-

dicamentis tentata ab aliis, sed meum prognosticum; cum 12. die essetreturus tandem non inane fuisse, animadvertum est: Quam operosa, imo nonnunquam impossibilis herniarum intestinalium ex seroto in abdominis cavitate sine repositiones in vivis, non solum ipsa tellatur experientia, sed & in demoribus atopiæ: Meiorum tamen alias in juvenibus, pro desperatis sæpe habitas hernias, usu clysterum, balnearum emollientium humedantiumque continuato, singlari Divina favente gratia, de subito cum impetu, sponte sua retracta. Non favere videtur rigidiori à Platano lib. 3. obs. p. 708. prolapsu entericæ, qua in enterocèle, in qua immensus & tensus ex prolapsu intestini in seroto prominebat tumor, usus clysterum suspectus redditur: Quamvis enim ex contractu apparet, non ab excrementis sed flatibus intestinum adeo intru-

mulise, cum tensus esset tumor, & compressus rugitum edere, & curatio bene cesserit, nihilominus periculose plenum alicuius iudicio, his absolute prolapsus orationis fidem adhibere: Non semper enim committitur

liber, sed interdum interitum, & cum periculis magni momenti, elypteres semper tui. *Item differtat. Anatom. lib. 1. cap. 13.*

## OBSERVATIO XII.

*Hernia à prolapsu partis mesarai & intestinum in scrotum, cum putredine. 1. 2.*

§. 1. **N**. L. Hernia laborans suavis amicosum agyrtam conducit, qui ad suppurationem illam perducere ausus est, (Existimans, ut credo, esse sarcoceleum) inque ad eam stercore utebatur caprillo destillato circa 14. diem oborta febre, vocor & ego tum propter febrem, tum propter urinæ difficultatem. Adveniens igitur & omnia diligenter perpendens, periculum existimo agyrtæ eura ægro illi allatum: nimirum ob febrem symptomaticeam, itemque dysuriam ex consensu partium ortam, & imprimis quod hernia esset intestinalis, quæ cresceret nonnihil & decresceret: adde decubitus vel ascensum: præterea membranosas illas partes ad suppurationem prorsus esse inhabiles, & rem nonnisi gravissimis intervenientibus symptomatibus in effectum posse deduci: Quia & ut effectus responderet, tamen corruptis illis membris functiones naturales necessario aboleri: Eger contra malle se periclitari quam ceptam curam intermittere, meque rogare ut febris tantum curam habere non gravaret: Pergit itaque adhuc per tres septimanas: tunc redit agyrta iste, ruficus qui erat, & cum phlebotomo incisuras instituit per fundum scroti satis alias, ad materiam exhauriendam, tertio vespere die æger moritur.

Aperiò cadaver, altante ipsius agnato, & mesarai partes cum intestinis prolapsas putrescentes jam & corruptas invenio, itemque in collo vesicæ abscissum quantitatis nucis avellanæ, ut non tantum ratione consensus, sed & abscissus difficultas illa urinæ exorta fuerit. *Phil. Salmuth. centur. 1. observat. 11.*

§. 2. In consultatione referebat nobis 1. Dom. Sala vidisse se mesenterium cum intestinis tenuibus omnibus in scrotum delapsum, abdomenque alterum præ se tulisse, qua mole compresso vesicæ collo, urinæque impedito transitu, necessitatem moriendi ægro esse accitam. *Th. Bartholinus cent. 2. hystor. 95.*

## OBSERVATIO XIII.

*Hernia vicennalis, solo pondere molesta, ex decubitu ilei & Epiplot in scrotum.*

**A** Nno 1678. 18. Januar. dissectum est cadaver Caroli Ludovici, in Nosodochio Genevensi, à Mag. Bailly Chirurgo, me præsentem & Dom. D. de Communis, Nosodochij Medico ac Mag. D. Deniard Chirurgo peritiss. Septuagenarius erat dictus Ludovicus, Vir procerus, vino & veneri, dum juvenis, addictus, qui totam Persiam peragraverat: Obiit autem ex Peripneumonia: Ante 20. annos Hernia laborabat; quam præ pondere & magnitudine subligaculis sustentabat, cæterum immunis omnium affectuum quos hernia comites sibi accersit:

Dissecto scroto, primo se obtulit Omentum eo devolutum, paucula pinguedine obductum, flavescens: hinc intestinum ileum, cum annexo mesenterio, ad ulnæ nostratis longitudinem devolutum, citra ulla lésionis notas: Peritonzi productio adeo expansa & dilata, ut nequaquam detractis intestinis & omento, quinque digitos conjunctos admitteret, manus integram, aliàs excepturum: Omentum autem peritonzo & intestina arcte invicem cohzrebant, ut hinc conspicuum sit operationem sine delaceratione impossibilem futuram fuisse: Testes exigui, compressi, flavescens, nucis moschatæ magnitudinem vix æquantes: Stentorea voce erat præditus: Diversorium, cui pro insigni appendebat effigies viri sylvestris, in suburbio San Gervasiano, ejus fuerat: Coma autem & barba hirta; effigiei prototypus videbatur.

## OBSERVATIO XIV.

*Enterocèle nativa. 1. Incurabilis ob substratum scroto adipem, & Ileum vaginali tunica affixum. 2. Ob prolapsum ilei interi, cum dilatazione externe tunice vaginæ, interna rupione. 3. 4. 5.*

§. 1. **I** Ob le Charron vulvulo affectus evasit, exactissime aliquot annis alio morbo interi: Aperiò cadaver, observatum est mediam quandam partem intestinorum & mesenterii rupto peritonzo in scrotum amplissimum, & omni fide majus prolapsam, ut etiam inde retrahi nequirit: Et ista prolapsio erat illi naturalis, intestinaque tanquam in loco nativo &angebantur in scroto & nutriebantur: *Luc. Thevart Annot. 2. in conf. 24. lib. 2. conf. Ballonii.*

§. 2. Cui scroti naturaliter nullus intervenit adeps, refulit tamen mihi Christi. *Riedinger*

per se illum observasse in Dom. Martino Schatio, qui cum intestinali Hernia laborasset, nullus Chirurgorum unquam ea, quæ in scrotum prolapsa videbantur, ita reducere potuit quin semper adhuc præter testem, tumor instar ovi gallinacci majoris remaneret:

Aperto mortui cadavere observarunt in scroti fundo multum pinguedinis excrevisse, & intestinum Ileum vaginali tunica plurimarum fibrarum interventu firmiter acervisse: *Regnerus de Graaf. lib. de virorum organis pag. 29.*

§ 3. Anno 1664. Dom. Christoph. Heidenius in Herniam intestinaleme incarcerationem in scroto, cum stercoris vomitibus, obstructionibus alvinis, torminibus ventris, singultibus &c. incidit. Elapso sextiduo in consilium vocor, examinatis ante à Dn. N. adhibitis clysteribus emollientibus & humectantibus, infusibus, inunctionibus & aliis remediis, testor nihil omisissum fuisse quod ad restitutionem in integrum requireretur: Sed quam operosæ, imo impossibiles herniarum istarum in abdominis cavitate per hæc media; ut & manualement operationem, sint repositiones, tot lugubria hæcenus facta testantur exempla & in demortuis *anatomia*. Quæ causa etiam est quod dicta præsidia suos sæpe deserant auctores, ut ægros postmodum prognostico cogantur relinquere: Proximam curationis attingit metam qui dislocationem & prolapsum intestinorum in scroto corrigere novit: Hoc me cum Deo meo & rei veritate gloriari possum me ope Emplastri mei magnetici (propria experientia à me inventi, inque pluribus diversæ ætatis, constitutionis & sexus subjectis; eodem etiam malo plures per vices ad desperationem usque aliorum recurrente, multoties non sine fructu probati, quod satis dilaudare nequeo, Lumbis applicati, tormina juxta sopiendo ventris atrocissima, intorta, dislocata, & incarcerationa in scroto intestina, quamprimum incaleverit, ad proximam abdominis transfert sedem, ipsi etiam ægris, non quidem sine molestia, vim ejus trahicem animadvertentibus,) dicti Domini intestina convoluta, & in scroto incarcerationata, in pristinum reposuisse locum: Nam quamprimum die 2. Januar. 1665. hocce Emplastrum ipsius lumbis circa horam noctis nonam fuit applicatum, vix dimidio horulæ elapso spatio tantum exercuit tractum, ut præ cordis angoribus & levibus leipothymiis, nisi adstantes qui tum excubias agerent generosam emplastri virtutem ipsi quasi manibus palpassent, vi abruptere tantum non commoveretur, donec ipse salutarem extractione *inopias* tandem perciperet, eo quod intestina sensim ac sensim in abdominis cavitate serpendo retrogredi sentiret: Dum hæc ita peragerentur, loco vini meri, id quod Divinus Senex ineuleat, internorum confortantium usus internus & externus cordialium non fuit posthabitus: hisce per aliquot horas continuatis, optima recuperandæ valetudinis spes affulsit, dum boni volvoli hujus insequuti fuere exitus, quos *Hippocr.* 2. Epid. l. 6. in comment. *Vallesius* recenset, scil. somnus, lassitudo & diarrhœa, quæ ex fecibus constabat nigris, gangrænam minitantibus: Ad œsophagi tandem & faucium asperitatem, & læsionem ex stercoris & aliorum aerium humorum transitu causatam, profuere lenientia mucilaginosa & putredini resistenta: Sterno dolenti Empl. Oxycroceum levamen attulit, Et sic D. G. præter omalium expectationem tum temporis ex Acherusia quasi palude liberatus est æger: Sed quid sit? Ne de hujus Emplastri virtute ab alijs frivole ac temere impugnata, ullus dubitationis relinquatur locus, ecce Idem Herniosus eum anno 1665. 19. Junij, herniam suam sine subligaculo gestasset, in idem malum, sed aliis comitatum symptomatis incidit: Ille illico, idem etiam Emplastrum adferri è mea domo jussit, Lumbis ut de novo imponeret: hoc quidem iterum suam exercuit vim attractivam, sed irritò conatu Ego elapso jam dumbiduo domum revertens, illico ad ægrum accessitus, deveni, habito ultro citroque mentis discurfu, ad impediti effectus causam, quæ fuit 1. vis emplastri veteris exantlata; 2. doz's ejus malo expugnando inæqualis, 3. nova symptomatum syndrome, qualia præter obstructiones alvinas & urinarias, vomitus stercorum, ventris tormina, fuerunt summa virium diminutio, dyspnœa, nephritis, emphysema ventriculi, cum incipiente tympanitide &c. Ego vero seposita omnium horum affectuum medela, iterum aggressus sum dislocationem & prolapsum intestinorum in scroto? sine his enim reliqua non insequuta essent symptomata: Emplastro meo renovato, & doz'e ejusdem aucta, pristinam institui curam semestrem, quæ licet lente procederet, levibus tamen alijs juxta adhibitis, intestinorum distorsio & dislocatio probe fuit correctæ, subligaculis tamen semper coercenda: Sed tandem anno 1666. 4. Maji dictus D. æger lethalem metam attingit, superveniente ex lapsu prono in terram vasis ejusdem ruptura in scroto eodem affectu defunctus.

Cum corpus ad inspectionem aperiretur, observavi prolapsum intestini Ilei intorti in scroto cum dilatatione externæ tunicæ peritonæi, & internæ ruptæ & dilaceratæ: Intestina inflata cum peritonæo, omento & mesenterio erant inflammata, & tantum non gangrænosa, ob circulationem sanguinis impeditam & spiritus vitalis oppressionem: Vesicula fœlis erat instar ovi anserini in magnitudine: Ad scroti sectionem mensura una & circiter feri eruant effluxi: Constitutio Hepatis & Lientis mediocris: Ren dexter fuit minor sinistro: Ulteriorem cuncti progressum adstantes prohibuerunt: Emplastri compositionem libens commu-

nica rem, nisi retraxisset quorundam objur gandi audacia, fiet tamen si benevolum aliquem offendere. *Fridericum Hofmannus meth. med. lib. 2. cap. 2.*

**O**B circulationem sanguinis impeditam ] Quo- modo hinc generetur Inflammatio ostendit Eradit. *Franciscus Sylvius Pra&. lib. 1. c. 40.* Sanguine in vasis valde differtis, partibusq; quibusdam aliis subsistente, h. e. stagnante, mox incipiunt evanescere partes spirituosae, magisque volaciles, acidae & salinas temperate solutae: unde utraque actiores factae in se mutuo insurgunt, Effervescentiamque, ob partes sanguinis oleosae praesentes, calidam excitant, quin paulatim sanguinem ita corrumpunt, ut in pus veniat &c. Vide esp. dictum.

*Quam operosa imo impossibiles repulsiões ]* Quae difficultatis sit ratio pulchre ostendit Cl. de Blegni tract. de Herniis.

Illud manifestum est aut si magna Intestinorum portio facilius turgat, illis uno impetu non concidi per annulos transire & regressum in locum unde recesserunt, nisi insignem expansionem adepti sint ab interno impulsu partium quae in inguinibus ex Scroto Hernias excitant; hoc est, nisi sibi extremitatum

musculorum, praedictos annulos constituentium ductae & divalae fuerint quotiescunque praedictae partes ad descensum proclives fuerint: unde prognosis evadenda est in ejusmodi affectibus: Cum viceversa, si partes, & faeces praedictae paulatim illuc devolare sint. Sed non parva quantitate, conjecturae locus est eisdem annulos angustia nativa praedictos esse, quapropter admodum difficile fuerit, aut pene impossibile in abdomen repellere, atque solius manus opera, id quod illos transgressum est; pancia, cum strangulationis speciem quae accidet intestini portioni deciduae, sub primo, aut secundo annulo, quo admodum contracti sunt, succedanea protinus habitura p'ultima accidentia, ad eo terrificam, ut vel moriendi necessitas aegre incumbat, vel Chirurgiae, quam Bubonocelen vocant, periculi semper plenam.

*Exempli causa compositionem libens communicarem ]* Quam in sua clavi Schrodetiana publici juris facit pag. 335.

§. 4. Mense Dec. 1676. obiit famulus Chirurgi Nosodochij Genevensis, Enterocoele obnoxi- us: Ea tum temporis prehensus, prae vehementia doloris, aecedente syncope, intra horas 24. extinctus est: Ante apertionem loci affecti, perpendit, *Mag. Bailly*, Chirurgus peritissimus, vix trium digitorum spatium inter umbilicum & pubem intercessisse: Scrotum vero mire tumebat à faecibus in intestino conclusis; facta autem hypogastrij dissectione, reperit Intestinum ileum bis, in formam literae S conduplicatum; adeo in via coarctatura ut neque hinc impellendo, neque inde trahendo, in sedem naturalem compelli potuerit, etiam abla- tis in intestino contentis.

§. 5. Anno 1674. Apparitor Genevensis, nomine *Dominicæ*, septuaginta quatuor natus annos, ab Enterocoele extinctus est, post trium septimanarum languorem: In quo etiam- num Ileum intestinum eodem modo conduplicatum deprehensum, atque tam arctè incu- neatum ut nulla vi, etiam remotis impedimentis, in abdomen compelli potuerit.

## OBSERVATIO XV.

*Epiplocele lethalis ob corruptionem Omenti, Testium & vicinarum partium. 1. A maxima Omenti parte in scroto. 2. Epiplocele ab Omenti in Testis seminaliumque vasorum tunicam descensu. 3.*

§. 1. **A**Nno 1585. robustissimus quidam Faber lignarius Genevensis, quum elevasset pondus ingens, Omentum ei prolapsum est in scrotum; & quia reductum non fuit, intumuit, Inde dolor acutissimus, inflammatio, aliaque gravissima symptomata, denique mors sequuta 7. die.

Ego scrotum incidi, & inveni Omentum, imo etiam Testes vicinasque partes plane cor- ruptas & gangrena infectas: *Fabritius Hildanus cent. 1. observat. 72.*

§. 2. Conspicatus sum Omenti se libram extra umbilicum, Et in seroto Omenti libram & amplius *Columbus de Re Anatom. lib. 15.*

**C**um Omentum in Scrotum delabatur, delapsam tus aliorumque symptomatum causa est. *Vide observat. ventriculum aliquando trahit deorsum, & singul- seg.*

§. 3. Ego non semel sane Omentum in eam testis seminaliumq; ipsius vasorum tunicam (cui peritonaeum originem praebet) devolutum, ac miris modis mediocrem omenti alias constitutionem adauctam deprehendi: Nam cum tota omenti pars alioquin intestinalis in- eumbens in medioeriter pingui homine vix librae aut sesquilibrae pondus excederet, Vidi tamen omentum ita p. n. in ea testis tunica auctum, ut quatuor aut quinque librarum pon- dus penderet, & ventriculum ex sua sede ita deorsum distraheret, ut ventriculi deficiente munere, variisque obortis singultibus, id pondus mortis occasionem fuisse inter scan- dum collegerim, eum in morbo quodam laterali, qui alioquin bene expurgatus fuerat, sero- tum ex more ab aegro adstantibusque subligari neglectum fuisse: Quin etiam quo exactius ramicum herniarumque, uti vocamus, rationem perquiri, eo etiam magis omnes illos molles ramices, quos carnosos vulgus appellat, ac merito à variosis affectibus distinguit, ex omenti prolapsu in incrementoque progigni mihi persuadeo. *Vesalius Anat. lib. 5. cap. 4.*

## OBSERVATIO XVI.

*Hernia triplex lethalis, ob putrefactionem intestinorum in seroto incipientem.*

**I**N quodam magni nominis Viro, vitam sedentariam agente, temperie humida prædito, & diu in viduitate vitam transigente, hernia tum aquosa, tum carnea ac intestinalis (de qua ultima tamen semper fuit dubium, cum nullos dolores sentiret vehementes) excreverat in tantam magnitudinem ut ultra 40. libras penderet, & ipse amplius hoc pondus prope modum ferre non posset, propter difficultatem spirandi, cum omnia magnavi deorsum traherentur, semperque lecto affixus decumbere coactus fuit: Tandem cum nulli amplius remedio locus esset relictus, & mors illi brevi immineret, de consilio Medicorum & Chirurgorum, prius tamen prognostico indicato, cum omnibus copia aquæ adesse videretur, sectio fuit adhibita in loco inferiore, ubi undans aqua percipiebatur, Quæ adhibita sine magno dolore, effluxit cum imperuillius ad libram 1. sed foramine obstructo tunc, Medici noluerunt plus excerni: Sequentibus diebus tribus plus illius evacuatum est, & æget non male se habuit: Verum quarto die febris supervenit cum erysipellate, quod aliqui illi fuisse molestum, præsertim in pede altero, qui ob scirrhum œdemato sum insititæ quoque fuit magnitudinis, ac paulatim vires decreverunt paucos post dies placidissime obierit.

Apertum serotum, quod ex sectione aliqui satis detumuerat, & spem aliquam convalescentiæ præbuerat, Reperta intestina putrescentia, quæ proculdubio mortem accelerarunt. *Observatio Ioachimi Camerarii.*

## OBSERVATIO XVII.

*Hernia ex Aquosa, Varicosa & Carnosa conflata.*

**N**obil. Ramfæus accepit in sinistrae natis partem superiorem & extetnam intortum & deorsum leviter tendens vulnus, ex quo statim concidit: Huic accessit vulneri, inter alia symptomata, sinistri testiculi cum tumore & summo dolore inflammatio, quæ tamen post magnam partem sublata, remanente solum levi duritie, rubore & dolore: Vocatus deprehendo Herniam, non Ventosam, ob defectum flatuum; nec simplicem Aquosam, quia serotum nec lucidum, nec aqua turgidum: nec Carnosam simplicem, ob dolorem Sed Herniam ex Aquosa, Carnosa, & Varicosa conflata: Aquosam quidem inculcat tumor instar ovi oblongus, cum testiculi osculatione quoad tactum & visum: Accedit & hoc quod sinistro lateri aquosæ herniæ valde fiat familiares, quod nempe vena spermatica sinistra oriatur ab emulgente: Carnosæ vulnus ad sinistrae natis partem superiorem vergens ansam dare potuit & causam: generatur enim hæc hernia ex sanguine testes & serotum obveniente, ibique in molem carneam motato: cui affluxit vulnus potuit, ut dixi, ansam dare, ut non solum in principio statim Testiculi sinistri inflammatio, sed & dolor sequutus fuerit: Supperias ferri sanguis adustus melancholicus à vitio lienis oriundus, tenuisque sinistri debilitas: Varicosam monstrat dolor, qui exacerbatur in distensione vasorum spermaticorum, unde erectionem penis cruciatus intensissimi comitantur: Omnia incassum remedia, nam sequenti mense moritur.

Aperto corpore, Renum loco portionem pinguem quasi, Lienis vero loco ovi gallinæci quantitate nigrum frustum, sanguinis coagulati facie, inveniebamus: Cavitas (circa vesicam) abdominalis, aqua erat repleta, ut & serotum circa sinistrum testiculum potissimum dextro longe minorem: Vasa testiculorum varicum modo consistebant: Dextri testiculi substantia spongiosa & putrida, tunicaque adnata erat: In dextra seroti parte caro adiposa

*I. D. Horstius observ. Anatom. 6.*

## OBSERVATIO XVIII.

*Herniosi calculosa vesica unam scaoti partem implebat, Intestina tenuia alteram.*

**V**Enciculi quondam Herniosum novit *I. Dom. Sala*, cui omnia signa calculi vesicæ videbantur adesse, nec tamen cathetere aut candela potuit deprehendi: In mortui cadavere calculus eum ipsa vesica unam seroti partem impleverat, intestina omnia tenuia alteram; *Th. Bartholinus cap. 4. observ. 28.*

## OBSERVATIO XIX.

*Hernia à descensu ilei in serotum, subsequente Iliaco affectu, irremediabilis ob excrescentiam circa mestum exaniam.*

**D**om. à Charancon, Senator Camberiacensis, cum quodam die in Vinca aliquid magno cum nisu ageret, repente sibi inum ventrem crepari sensit, atque intestina in

serotum prolabi, quæ cum reponere conaretur, nec posset, in Iliacam passionem incidit, secunda enim die ructibus & vomitibus assiduis vexatus, alvum habuit penitus suppressam; difficultas etiam urinae illum comitabatur. Sub vespere febris, sitis, oris amaror ingens, vigilæ, jastrationes, ventriculi subversiones, dolores, seu potius cruciatus, clamores continuè illum torquebant, adeo ut nihil per os admittere & retinere posset. Ego accessit sub vespere secundæ diei, ex pulsus inæqualitate, inordinatione, parvitate & celeritate etiam ex tot symptomatum vehementia & subitanea virium deiectione, morbum acutissimum & quartum diem non præteritum pronuntiavi. Atque præscriptis quibusdam topicis, ac nihil fecisse viderer, cardiakis, anodynis, ad discessum me paravi: Sed victus precibus remanenti, & protinus *enema emolliens* & anodynum parandum & injiciendum curavi, post tres horas iterandum: quæ ambo ante diluculum tertiæ diei per os reddidit. Tertium post meridiem injectum, sub vespere adhuc sincerum evomuit, & ea nocte feces ipsas fortentes, & iterum bilis copiam cum violentia & cruciatu maximo per vomitum rejecit; sicque viribus & spiritibus exhaustis, corpore prorsus inanito, sub vespere quartæ diei defecit.

Dissecto cadavere, Ileum intestinum, quod in serotum descenderat, livens invenimus, & supra os pubis, in meatus initio (quod notatu dignum) spongiosum, seu potius fungosum carnositatem reperimus, intestinum circa meatum involvenrem, membranisque vicinis adeo adhaerentem, ut vix manibus & ungibus avelli posset. Eam excrecentiam primo statim die enatam, & à sanguine ob dolorem & rupturam in plagam confluxo, & ad locum laesum concurrente, genitum fuisse autumo, quia fungositate viam obstruente, facta fuit impossibilis intestini delapsi reductio. *Abel Reçius ad Fabricium Hildanum cent. 6. observ. 70.*

*Enema emolliens ejiciendum* ] Prolapsio intestini in serotum, vel est in fieri, vel jam facta & inveterata: In fieri illam esse dico quando ab initio intestinum descendens in serotum, & symptomata nondum gravia adfuerint, tunc enim clyster non protinus infundendus est, ne forsitan unâ cum intestino quoque ad serotum descendat malumque adaugeat: Præstat itaque alvum, si constituta fuerit, supposito laxare, mox (sacculum ex radicibus, herbis, floribus & seminibus emollientibus, statufque discutientibus, aqua coctâ applicare: deinde in lecto collocato egro & inclinari capite, in alvum vero elevatis pedibus redire oportet intestinum in locum suum naturale: reposito intestino, proclivis sacculo adstringente, aqua faborum cocta, locus affectus per dies aliquot fovendus est, ut paucis relaxatæ constringatur & vagina aperta obstruat: interim colum abluendum atque expurgandû est, quo flatu qui intestina ad serotum propellant simul educantur, id autem enematis perquam commodè fiet: Si unû ex superioribus intestinis in serotum delapsum fuerit, præter enemata, lenitivo quoque medicamento corpus expurgare convenit, enema enim naturaliter ad superiora intestina pervenire non posse notû est: Per factum, sive inveteratum prolapsum intestini in serotum, intelligo quando intestini jam per dies aliquot in seroto retenti fuerit, ita ut symptomata pessima, durities actus seroti, dolores, vomitus, anxietates, febris & alia ægrum torquent: In his enemata non tantum conveniunt, sed & necessaria sunt, neque verendum ut facile in serotum descendant, intestinum enim, quia foramenti peritonæi & vaginæ inclusum, & proinde compressum est, ad serotum profluat clyster, vix fieri potest: Sed etsi portio illius illuc irret, quid inde mali sequi possit non video, Enema enim intestinum emollit, lubricum reddit, dolorem lenit, & flatu educit, quæ omnia in defectu intestini summe sunt proficua. *Fabricius Hildanus cent. 6. observ. 73. Responsum* clysteres semper malos judicat: Reversa si intestina retulæ rantum, (vel saltem ne plurius) in serotum prolabantur, nec clysteres eo usque perstringant, ex lenientibus saltem, lubricantibus & carminantibus compositi, (cathartici enim eo nomine essent suspecti) Quid vetat eos præscribere ad deoneranda crassiora intestina & alliciedas feces, statimque discutiendos, qui forsitan intrepere, malum augere, effectumque deteriore reddere possint?

*Enema per os reddidit* ] Mirum cum Ileum in seroto repertum fuerit, quomodo Enemata duplicationem compressionisque illam licet permeare & ad ventriculû regurgitare poterint: verum enim vero naturæ plerumque hæc & multa alia, quæ caput hominis excedunt in morbis perficere, hisce oculis vidit: Ince intestinum vulnere coalluisse observat, vide cent. 1. obs. 34. Matrona à multis annis berniola, cui post delapsum intestini in ipsam abdominis dilatationem, gangrena cum ulcere foetido in inguine supervenit, ex quo biestri spatium feces alvi emanarunt, feliciter tamen restituta fuit nulla superflua fistula. *Fabr. Hildanus ibidem obs. 71.*

*Fungosum carnositatem* ] Annotatione digna est fungosa illa sive spongiosa caro, quæ supra os pubis in meatus initio reperta fuit: quæ satis superque indicat berniam hanc non recentem sed inveteratam fuisse: talis enim substantia carnosâ, ex integra & illaesa aliqua parte corporis, præsertim membranosa, qualis est processus peritonæi, sive vagina, tam brevi temporis spatio (quarto enim morbi die interiit) minime procreari potuisse, rationi consentaneum est: Quæ ego de excrecentia carnosâ & fungosa, ex derectis cerebri membranis, & magnis articularum vulneribus prorumpentibus alias scripsi, hic locum non habent: in eorum enim partium vulneribus, non tantum capillares vasa & arteriæ, verum & magna vasa aperta fuisse notum est: At circa berniam D. de Characem ne minimam quidē evnam aut arteriam disruptam fuisse ille colligo, quod de reperto sanguine extravasato, & in vago abdominis collecto mentionem nullam fecerit: Substantia ea carnea, circa meam reperta, observatione digna est, quæ neminem præter *Param lib. 1. cap. 15.* norasse putohujus substantia, sive carnea sive callosa fuerit, intervenit, foramen, per quod intestinum in serotum descendit, in adultis obstruit, & bernias curat, verisimile esse mihi videtur, adeo provida & sagax est natura: At bujusmodi curationes tantummodo sunt in his qui beneficio peritonæi prohibent ne intestinum in serotum descendat diligenter itaque berniosos moneo ne inbiagacula negligant. *Idem ibidem.*

*Ob rupturam* ] Herniæ duæ assignantur causæ, Ruptio & Dilatatio Peritonæi: Priores vix admittit *Hildanus Epist. ad Doringium*: Si autem, disruptum Peritonæum, id est circa illa foramina abdominis (quæ tamen productiones potius dicendæ) fiat necesse est: alioquin nunquam neque omentum, neque intestina in serotum descenderent: At rupto ea in parte peritonæo, frustra fieret in sectione berniarum ligatura atque contractio vaginæ, simul & abscisso testiculi: peritonæum enim cum sit corpus membran-

solum; nonne disruptio l'io parte disrupta ita retrahi ut amplius coniungi & filo ligari minime possint, existimas? Deinde peritonæum dilatari, non autem distendi ipsa ocularis inspectio fidem facit; & aliquoties enim in herniosis post obitum, præcipue in fœcæ (de quo obs. 65. cent. 2.) qui insigni hernia intestinali per multos annos laboraverat, quia fieri potuit diligentia locum affectum perulstravi, nunquam tamen quicquam aliud præter dilatationem peritonæi observare & reperire potui. Consentit *Riolanus Anthropol. lib. 2. 8.* Si persequaris, inquit, peritonæi productionem in scrotum delatentem, videbis ut in viris simplici constat tunica, quæ externæ propago, interna finibus ossium ilium & pubis coercetur, nec ultra pervadit;

& si quando in osthocoele magna intestinorum portio in scrotum delabatur, musculorum abdominis tantum aponeuroses effringantur, raro tunicæ peritonealæ lacertantur. Sepius observavi in magnis herniis scroti, ruptis aponeurosis musculorum, peritonæum supra suam relaxatam apophysim, & instat faxi descensum ac promittens: Idcirco ad curationem herniæ, redactis intestinis, appressum latum cantherium, modo subiecta vasa non ostendat, præstantius esse puro remedium puncto illo anreo inuicili & fallaci. *Rafaelius Epistolarum methodi cogn. & cur. morbor. cap. 26. lib. 3.* Peritonæi, in virili sexu, nascitur productionis internæ rupturam, exterosæ vero relaxationem; in mulieribus vero utriusque relaxationem. *Vide obs. 1. 2. & 3.*

## OBSERVATIO XX.

*Hernia à vase deferente in scrotum delapsa.*

**P**ræterea non semel tantum observavimus vas deferens corrugatum in scrotum descendisse & ibi Herniam effecisse, quæ manuum ope facillime reduci poterat: Imo quæ, si e corpus resupinaveris, sua sponte intro recedit, à qua ramen nihil mali expectandum aut metuendum est. Tali Hernia *Spermatocele* improprieà me vocatur. *Idem ibidem.*

**S**permatocele] Ad Sarcocoelem potest referri quia in eam abit, monente *Hildano* cent. 4. obs. 64. ubi narrat historiam juvenis, qui in *curvæ* veneræ deprehensus, & à feminis ejaculatione prohibitus, ab ejus retrocessu dolor illi in inguine exortus est, hinc testiculorum tumor post evanescentem atque, dexter testiculus tumidus remansit ob eandem ibi herniam carnosam *ibidem*, histor. 5. affect exemplum Presbyteri, cui non solum testiculus dexter, verum etiam vasa spermatica veluti in lapidem induroctant: Malum autem ad ipsam originem usque vasorum spermaticorum pertigisse censet, ex dolore quem è regione vasorum spermaticorum ad remem ulque dextrum perferentisse ait.

In Scrotum descendisse] Imposuit & Hætiocomis magnitudinem unius Testiculi præter parotidis, quam pro Hernia habuerant: Affect exemplum *Fabritius ab Aquapendente* operat. Chirurgic. pag. 1. cap. 73. ejusmodi erroris, Cum adolescens, inquit, unum testem altero majorem in se observaret, ostendens hanc æsthem Operatio, ille dixit se habere Herniam, & brevi mortuum nisi extrahatur testis: Atque eo ligato, dum testem extraximus effusa: accitens pater adolescentis, videns horribile id spectaculum, retinuit operationem ab opere, dicens se velle ut prius ego viderem patientem, qui propterea solutus est, & cum me adiret, dixi ipsum nullo prorsus malo detineri & ita fuit.

## OBSERVATIO XXI.

*Hydrocele ab aqua copia inter Testem & tunicam Elitroidem. 1. Ab aqua Testiculorum replente. 2. Ab aqua inter Elitroidem & Nervæam tunicam. 3. Scroti apertio in Hydrocele inuicili ob corruptum testiculum è ducto. 4.*

§. 1. **S**ætas est puer annorum 12. hydropticus: In scroto magna copia aquarum erat inter testem & tunicam elitroidem; pauca inter scrotum & dictam tunicam. *Vide tit. de veniris tumore.*

**A** viro vasorum Lymphaticorum Hydrocelem otiosi verisimile est, quæ *Glißon* in testibus tauri, equi, arietis & veris observavit: In homine detexit sæculi nostri curiositas, quæ *Chr. Regnerus de Graaf*

§. 2. Quidam ex phthisi obiit: Illi Testiculorum alter in magnam molem excreverat, durus, qui aquam fundebat citrinam, ut in hernia aquosa: membrana, quæ aquam continebat, erat plane cartilaginea & quasi cornea: ipse enim testiculus sua propria ab hac diversa cingebatur. *Rumlerus observ. medic. 52.*

§. 3. Ego in testiculo dextro hydrocelem vidi: Aquosus humor inter nervæam tunicam & elitroidem continebatur: Evidentes erant tres aut quatuor propagines vasis deferentis intra testem vitiarum & sanguine sanioso refertum

**E**go in testiculo dextro hydrocelem vidi] Hydrocele non totum scrotum obducit, non alteram ejus partem: Cum uno saltem latere innumescit, citra externam causam, hinc non est in scroto, sed in membrana erythroide testem continente: Tunc nunquam dexter testis innumescit, sed saltem sinister, ratione renis sinisteris male affecti, qui sinisteris partis femoralis vena non ex cava ut dextra, oritur, sed ab emulgent sinistri renis, hinc illo male affecto, nec officio fungente, pars utrinque pericam non permeat, per femoralem

§. 4. In Generoso quodam viro, quam omnis periculi plena sit scroti & erythrodis membranz in hydrocele per scalpellum apertio, teste non sublato, compertum est: Ab



aliquot annis sinistra parte hydrocele huic molesta fuerat; frustra camplasmatis ac aliis remediis usus erebro, tandem temerarii Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scalpello tumorem permisit: Effluxit cito omnis humor, tumor quoque subsedit: sed cum testis ipse omnino esset corruptus, vicinas partes facile infecit: Subsequuta mox scroti universi, ac etiam penis, cum tumore & ingenti dolore gangrena: delirium cum vehementi febre, propter doloris magnitudinem, supervenit, ac non ita multo post mors successit.

Ren hujus sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroidem descendens, valde ampla & multum patens. *Dodoneus observ. medicin. 40.*

## OBSERVATIO XXII.

*Sarcocoele fit sapius à tumore Testiculo innato quam adnato. 1. Vesicula intra membranam testiculī. 2. Falsa, à particula steatomatīci tumoris ex abdomine in scrotum delapsa. 3. Curatio Sarcocoeles Chirurgica. 4.*

§. I. **M**reatori Samio ablatus ferro Chirurgi ramicosus testis, pendebat semuncias 34. durus ille quidem toto corpore & massæ carnez nervosis hinc inde gyris distentis similis, sed neque ad latus, neque in gremio suo ullum alium testiculum naturalem complexus, Dissecta enim quaquaversum infirmi mole, ut testiculus verus quem intus delitescere quidam suspicabantur, in conspectum veniret, deprehensum clarissimo fuit, totum illud enorme corpus testem fuisse, sed testem à sanguine, ut conjicere licet, admissio, verum ob, vel contusionem, vel frigus, vel piruitam nimiam ad superiores partes non remisso, eoque in carnem degenerem coagulato distentum: *Olaus Borrichius observat. 97. Aëtorum Bartholini annor. 1671. & 1672.*

*Sarcocelen varie definiunt auctores, Celsus lib. 7. cap. 18. Raro inquit, sed aliquando caro quoque inter tumores interstiti, capax dicitur Græci vocant, Galenus lib. de Tumore. p. m. Testiculos induratos, & lib. 14. meth. med. cumdem scirthis non improvidè comparat: Hodie tamen Medicorum plerique, ut clarius rem exprimant, Sarcocelen interpretantur quorū carnosum quiddam in scroto testibus adnascitur: Atque id quidem nonnunquam contingere haud inficiandum, prostranque apud *Hildanum & Lericium* exempla: frequenter tamen sarcocoele non tam adnascitur testibus quā innascitur, b. e. totum testem, ejusque vasa omnia materiz novæ accessu ita infarcti & porrigit, ut aliquando etiam vigecaplo se ipso gravior ampliorque evadat: Hoc ut sæpe alias, ita quoque in dicto mercatore mihi observatum: Proinde non satis providè rei estimatores mihi videntur, qui confirmatam *capax dicitur* vel medicamentis discussisse se, vel discerpisse evulgant, quod nimiam occalluit massa illi, & mille plezibus nervosisque solidis contrahat invictam duritiem: Cœdiderit *Matthiolus*, crediderit *Scaliger* in Anatom. Chirurgi se sarcocelen pulvere ononidis petcaralle, nihil sit verisimilius quā fuisse hydrocelem duriori cortice circumdatam, atque ideo sarcocelen mentionem: Atque ut id etiam, pter jam allata, person-*

dent tam similia passim exempla apud *Forestum, Sennerium* alios, docentia artifices sæpe aqua profundas in testiculorum sinibus latentis deceptos pro carnosos herulis æstimasse, quæ fuerint aquosæ: Tum docet idem radix ononidis, quæ eam inter nobilissima diuretica sit, aquæ haud debet in sinu testium intimo occultatas papillarum eduxit, atque ita coincidentibus sensim in se involvitur durioribus, sarcocelen æstimata fuit fuisse, *Idem ibidem.*

*A sanguine admissio &c.* Causam Tumoris hujus haud esse sanguinem impurum, contra præcipuorum Medicorum & Chirurgorum sententiam, statuo, cum etiam optimus eum producere queat; nec simpliciter abundantem, eum etiam in corporibus macilentis se exhibet, licet in his nec celeriter adeo generetur, nec ad eam magnitudinem deveniat quā in illis: Sed enim veram hujus Hæmæ causam in eo consistere existimo, cum membranz, quæ vasorum capillarum oscula, ne sanguis nutritius nimis subito in partem perfluit claudere solent, vel evasit vel disruptæ, aut dilatatz sunt; quo tunc contingit plus sanguinis in partem tuere quā ad ejus nutritionem requiritur, Nascitur interim sanguinem, qui alias putresceret, in carnem mutat. *Barbette Chirurgia cap. xxx.*

§. 2. Sectioni Sarcocoele in milire interfuit feliciter & dextræ administratz: Aperta cute inguinis dextri, testiculus dexter, qui ad capitis puerilis magnitudinem excreverat, separato *caro dexteri* seroto, extractus & resectus vasīs spermaticis, prorsus exemptus fuit, magno milieis, alias cordatissimi ejulatu: ligatis vasīs, confutum scrotum & cætera ut vulnus decet, curata.

Dissectus hic dextri testiculi tumor glandulosam substantiam ostendit, ea magnitudine actum, ut oneri esset militi satis valido: Infima vero parte vesiculas intra membranam continebat, sanguine plenas, quæ parte de maximo semper dolore, ob distensionem tunicz sensilis conquestus fuerat: Tormentoribus oblitus ad militares functiones postea rediit. *Th. Bartholinus ibidem observ. 28.*

*Glandulosam substantiam* Tumoris causā in sanguinem impurum refertur, ut ab optimo etiam prodici potest: abundantia sola accusari nequit, eam etiam in corporibus macilentis se exhibet: Veram causam *P. Barbette* Chirurgia c. 25. l. i. ait esse membrarum, quæ vasorum capillarum oscula, ne subito nimis nutritius sanguis in partem fluat, claudat, erosionem, rupturam aut dilatationem, nade plus sanguinis in partem sitit quā ad nutritionem requiritur: natura interim sanguinem, qui alias putres-

ceret, in carnem mutat.

*Vesiculas intra membranam* *Monet l. c. Barbette* carnem hanc quoque adnasci tunicarum scroti communium secundum non verò testiculis, quo in caso tolli ea potest, sine horum læsione aut excisione. Hinc moner causam debite cognosci debere antequam ad operationem ipsam accedat Chirurgus, quod parastare adeo quandoque latuisset sine, testiculis imprimis scirrhosis existentibus, ut hæmæ carnosæ specie illudant quandoque;

S. 3. Famulus N. duritie splenis affligi putabatur, & simul ramice carnoso: vultus abscessus totam abdominis regionem sinistram implebat, ejus portio per inguen in scrotum delapsa erat. *Vide tit. de Hypochondr. tumore.*

S. 4. Sanatam vidi Sarcocoelem, ad medicamenta pertinacem, Si oblonga ea esset, incisione facta secundum longitudinem testiculi, hoc postea extractio cum carne adnata, sectio: nec circa vasa instituta: Mihi enim aliquando contigit ut testiculus sanus externa facie appareret: qui interiore omnino erat putridus. *Aquapendens operationum Chirurgic. cap. 76.*

**H**ic extractio cum carne adnata Statim P. Barbette scroti communiam secunde, non vero testiculis: quo l. c. carnem hanc quandoque adnatis tunicarum in casu sine horum lesione aut excisione tolli potest.

## OBSERVATIO XXIII.

*Epiploon aliquando in scrotum procumbit, Aliquando in Umbilicum procidit, unde Omphalocele.*

**A**liquando evenit ut Omentum de sede sua deturbetur, nimirum in scrotum descendit, ut in Epiplocele, vel per Umbilicum ruptum protuberet, ut in omphalocele De quibus Columbus lib. 15. sic scribit, Conspicatus sum Omentum peritonæo, nec non abdominis musculis annexum: Præterea Omenti semilibram extra umbilicum, Et in scroto Omenti libram & amplius. *VVarthon Adenographia cap. 13.*

## OBSERVATIO XXIV.

*Tumor, seu Hernia Umbilicalis, lethalis ob Tecoris lobum alterum, extra Peritonæum prolapsum eidem accretum.*

**B**eaverat Deus Illust. Mariam Henly prole mascula, In hoc infantulo sancta Junone Lucina recens nato, observavit obstetrix quendam Umbilici tumorem, nucis moschatæ magnitudinem æquantem: Uterque Parens Medicum & Chirurgum in consilium adhibent, & me quoque ad octo miliarium distantiam vocari curant: Convenimus omnes intra 30. horarum spatium, jamque tumor ad pugni magnitudinem accreverat: Quo diligenter examinato, candela admota, conspicienda se præbebant intestina versicolora, in eum prolapsa, rupto peritonæo: desuper vero, à dextra tumoris parte, quæ sphacelo correpta erat, nescio quam carneam substantiam, intestina deprimentem deprehendimus: Chirurgus cum altero Medico spem unam in tumoris incisione collocatam esse affirmabant, fore ut intestina in suum locum reponi queant: Ego contra dissuadebam, quod intestina sphacelo correpta viderentur, & infantulum, admodum debilem, moriturum dicebam, & præstare cum intactum relinquere, quam artem apud plebem maleficam desamare: Parentes vero, Filiioli vitæ desideratissimi, iis auscultantes, anceps potius remedium experiendum constituerunt, quam infantulum sine auxilio, etsi dubio, Libitine absorbendum relinquere: Facta ergo incisione, cum Chirurgus immisso in vulnus digito, intestina in suum locum reponere anniteretur, renitente carnea substantia, ipsis incumbente, eademque deprimente frustra laborabar; infantulo mox vitalem auram, quam vix hauserat, immature effundente:

Aperto à morte corpusculo, ne vestigium quidem Omenti conspiciendum erat: Licet præterea exiguus admodum apparebat, Intestina tenuia, rupto peritonæo, in umbilicum prolapsa & sphacelo emortua: Hepar vero, quod continuum esse solet, nec in lobos, ut in quadrupedibus, divisum, in duos lobos profunde sectum erat, quorum alter in proprio loco, dextro scilicet hypochondrio, sub diaphragmate & costis nothis conspiciebatur: alter vero extra peritonæum prolapsus, eidem adeo firmiter acereverat, ut novacula ab eo separari minime potuerit: Cætera sana. *Fridericus Lossus observ. 30. lib. 2.*

## OBSERVATIO XXV.

*Omphalocele ab ortu contracta.*

**P**uella modo nata, tumorem immensum in umbilico propendentem secum in lucem attulit. Quem cum vocatus inspicerem, deprehendi tenuia esse intestina per umbilicum prolapsa, globi magni instar convoluta, tenuia membrana pellucida, qualis amnion fecrum involvens existit, investita, in quam chorda umbilicalis desinebat, & vesica ampla humore plena adhærebat: infans cætera bene habitus erat: Cum autem intestina promendo reponere studeamus, videbantur nonnihil in abdominis cavum ex parte remeare, mox tamen rursus cum murmure egredi: Quæstio erat an vesica aperienda, digitoque immisso, foramen per quod egrediebantur investigandum esset, ut per illud intestina reponerentur Verum quia mox postea intestina inflammata esse conspiciebantur, atque infans stercora evomens, admodum debilis erat nihil tentare voluimus.

Cum exspirasset, atque abdomen aperiretur, intestina quae exciderant, membranae amnio quae ambiebantur, adeo connexa invenimus, ut nulla ratione ab ea avelli potuerint.

**A**N hoc fitu in utroque foetu existente & crescente intestina collocata semper fuerint, vel postea ansequam nasceretur procederent, vel in partu, in dubium vocabitur: Ego proclivis sum antequam in lucem ederetur ex eo colligi, quod cum mater utero gestabat, ob excrescentiarum duriciem, conatibus magnis abdomen premere coacta fuisset, & quod amnios membrana illi fuerit adnata: Potuisse autem fortum, dum utero inclusos calore parvis fovetur, citra incommoda hoc perficere, quae postea cum a matre separarentur, supervenerunt, eumque in medio sustulerunt, ceteris. *Placens Observ. lib. 3. p. 75.*

## \* A D D I T A M E N T A.

### OBSERVATIO I.

*Bubonocoele testalis ob ilei intestini Peritonaei processum adhaesum abscissum in inguine sinistro genitum.*

**M**aij mensis x. anni 1681 aperto cadavere filii Nob. & celeberrimi Domini Frederici Spanhemij, Theologiz Lugduni Batavorum Professoris, Leviri mei, manifestum evasit descensum intestini, quo laborabat omnino incurabilem fuisse, Non enim solum Intestinum Ileum in inguen sinistrum devolvebatur, sicut fieri solet in Entero-bubonocelis, sed & praeterea penetraverat peritonaei productionem ad longitudinem sesquipollicis, altitudinem vero decem linearum mathematicarum; Impossibilis, ergo ideo plane fuit intestini reductio, h. e. illius in abdomen retrusio, ac proinde dictus intestini prolapsus in inguen sinistrum nulla ratione emendari potuit: Denuum praedicta Ilei intestini portio, quae peritonaei processum pervaserat omnino purulenta evaserat, nec non inguinalis sinistri glandulae; ubi loci puris foetidissimi & crassissimi pinta circiter hypogastrium omnino replens, coacervata fuerat.

Ex mea autem sententia, genitus est dictus abscissus ob strictiorem inguinis sinistri, a feuto peritonaei constrictionem, quod in usum fuerat ductum ad continendum sua in sede intestinum. *Observatio Clarissimi & Excell. Domini D. Caroli Drelincurtii Medic. P.P. Lugduni Batav.*

### OBSERVATIO II.

*Ab omento in scrotum prociduo Enterocelen induci posse ostendit Anatom.*

**I**N Latomi cuiusdam, quem ex casu ab alto mortuum Patavii dissecuimus Ramicis vitium id quoque luculentissime ostendit, Huic namque dextri Testis cum seminariis vasibus, quum a ramice semel curaretur, abscissus fuerat, Ex rursus in sinistro latere idem affectus invaserat, quam ex intestinorum & omenti in scrotum descensu contigisse, dissecando comperi; Adeo ut certam mihi conjecturam facere ad pubis usque os, ipsaque scrotum etiam omentum devolvi posse, licet id sursum in latus sinistrum dissecantibus plerumque retractum observetur: magnum enim inter animantia hoc homines sortiuntur, ut inde nonnulli, quasi dicas omenti gestores, vocentur. *Vesalius Anat. lib. 3. c. 4.*

Quousque ferri possit omentum vide scholia ad obs. sect. 3. l. 3. & 5. 4. obs. 4. sect. 34.

### OBSERVATIO III.

*Abscessus in Inguine ab Hernia suppurata cum erosione intestini, postisque ac excrementorum foetidissimorum reiectione.*

**M**ulier quinquagenaria major, variis doloribus diu vexata, ac praecipue rheumatismo, seu Arthritide quadam vaga, a sero aeri omnes corporis partes membraneas nerveas & tendineas perluente, orta, in intestinorum tandem affectum vehementiorem incidit, protuberant scilicet illa in inguine ad ovi columbini magnitudinem sub herniae incompletae forma, cum tanto cruciatu, vomituque tam horrendo, ut inorituram eam cum brevi arbitraret, prognostico suo relinquerem; verum post dies aliquot revocatus, reperto pulsus formicante in vomituque perpetuos, cum tanto interaneorum ardore, ut se damnatorum penis affligi misera delirans crederet, ac prae furi inextinguibili aquam sibi continuo ingurgitari inter ipsos vomitus expeceret, sed quod maxime ad rem nostram facit, vidi herniam prius a me adnotatam in abscissum degenerasse; ex eoque aperto saniem cum excrementis alvinis foetidissimis effluere. In

casu prorsus desperato quidam revera tentata sunt, ut affinis satisficeret, dolorque aliquatenus leniretur, at omnia in cassum adhibita, siquidem postquam per viginti quatuor horas duro agone conflictata fuisset, è vivis excessit. Aperto abdomine vidimus intestinum ileum in sui prope medio perforatum, laburram intestinale magnâ vi per foramen in abscessu cratim eructasse, magna quæ sui parte gangrenâ affectum. Cætera curiosis lustrare prohibuit factor omni alio major.

## OBSERVATIO IV.

*Hernia in qua intestini ilei portio ad inguina delabens intus & extus glandulosi excrecentiis repleta reperta est: Hepar purulensum &c.*

**M**ulier 65. annos nata, robusta, temperamenti admodum laudabilis, ac nullis morbis obnoxia præterquam quod ab aliquot annis herniam in inguine sinistro, colicæ per intervalla non parum crudeles parientem, gestaret, eodem demum symptomate per octo dies afflicta animam inter vomitus afflavit, die scilicet 16. Maii, ann. 1698. horis martinis. Cum autem sub meridiem cadaver aperiremus sequentia adnotavimus. 1<sup>o</sup>. Quoad exteriora, obesse rorior habitum, facilioremque regumentorum corporis communium à musculis abdominalis separationem, quod pinguis satis familiare; Abdomenque præterea totum admodum tensum ac tumidum, sed compactione ac flarum sic facta eruptione momènto subsidens. 2<sup>o</sup>. Quoad interiora. In imi ventris cavitate libras aliquot feri purulenti, imò puris consistentis super mesenterium ac partes pobi subjacentes respersti, reperiebamus. Epar lividiunculæ maculisque ac lineis variegatum; Sed præterea tuberculis albis, duris, rotundis, quasi glandulis, summè foetidis, nucem juglandem maximam partem crassis, ipsius tum interiora, tum exteriora occupantibus, pluresque elevationes in ejusdem parte & cava & gibba parientibus, atque à parenchymate facile separabilibus; totum confutum observabatur: verum in specie duo ejusmodi corpora juxta vesiculam felleam ad dextras, magnitudinis supra descriptæ, è viscere quasi pendula, & sacculo seu capsula, ejusdem illius purulenti humoris qui per totum cavum respergebatur reliquias aliquas continente, stipata visa sunt. Intestina glandulis minorem olivæ fructum crassis, per totam sui longitudinem exterius eminentibus, occupabantur; inter quas præcipue natae fuere tria corpora itidem glandulosa, illis in epate môx descriptis non multum absmilia, vasis vaticosis tota consita, quorum duo eam intestini ilei portionem quæ in inguina elabebatur, quæque duos pedes supra illius intestini in cæcum infertionem erat, exterius cingebant, tertium intus ibidem reperiebatur, communicare sic illa opera cavum intestini ita claudabant, ut materiis descensuris, præterquam liquidissimis, omnis transitus denegaretur: Vnde enata erat affectio Iliaca, ipse quoque tandem perfectus Ileus qui ægram nostram sustulerat; nulla enim intestini strangulatio in peritonæi musculorumque abdominis annulis, satis per longam partis devolutæ trajectionem patulis, adnotabatur; imo per totum illud tempus quo lethaler decubuerat, nullum herniæ vestigium adparuerat. Prædictæ autem glandulæ intus cellulose erant, unde non immerito forsitan eas ab auditis glandulis intestinalibus vesicularibus per plexus dispositis, productas conjectabamus.

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

## SECTIO XXX.

## De Testiculorum Dolor.

## OBSERVATIO I.

*Dolor Testiculi sinistri à latente Hydrocele ortus, & vitio Renis sinistri.*



**N**GLUS inciderat in gravissimum sinistri testis eumensione dolorem, qui nullis cataplasmatibus, fomentis, &c. placari aut leniri potuit: Vnicum videbatur remedium sectio & testis ablatio: Anturpiz illo tempore multi erant celebres & magni nominis Medici: plerique horum curationem tentarunt: Cum autem sese nihil proficere

experirentur, in eandem nobiscum sententiam devenire, in sola sectione unicam & solam spem reponentes: Interim tamen nemine de hydrocele opinionem habente, sed omnino alium circa testem affectum consistere suspicante: Sectus igitur tandem est æger & sinister testis ademptus: In ipsa autem sectione demum cognitum hydrocelen fuisse affectum, copiosa infecantis faciem aqua exiliente: Testis integer & haud quaquam corruptus extitit (nuper enim natus erat dolor) quem cum etiamnum calentem Chirurgus medium divideret, ex ipsius centro semen erupit, quod annotatione dignum: Curatus ac sanatus à vulnere, paulo post de Lumborum dolore ac gravitate conquerebatur, apparebant in lotio arenulæ quædam: de latente aliquo in renibus Calculo suspicio erat: In pube deinde, circa cicatricem dolor cum tumore successit, accedentibus vero & aliis symptomatis, mors tandem subsequuta est.

Sacrificato autem circa pubem ac cicatricem loco, aquosus effluxit humor & quidem copiosus: Ren vero sinister admodum durus erat, ac iusta quantitate major, & substantia interiore haud parenchymatis colorem referens, sed candidior, concreto ac indurato puri, (quod subinde in affectibus varias formas suscipit) similis: *Dodonæi cap. xxxix. obser. Medicin.*

**H**ydrocele alias universum scrotum, modo namque partem occupat: Impletur totum scrotum hydrope, vel etiam cæchæ laborantibus: Quæ vero unam tantum partem affligit, aliam occasionem habet, nec hydropicos comitatur, sed omnino aliter affectus: Non colligitur quoque humor in scroto, sed in membrana erythroides testem continente: Supervenit quandoque ex causa aliqua externa & manifesta, ut à casu aut percussione, crebro etiam ex latente & non manifesta causa: Quæ autem ab externa causa accessit, aut dextrum aut sinistram testem indifferenter affligit, & in tumore sanguis sæpe numero concretus ac corruptus continetur, A latente vero ac non manifesta causa originem ducens, nunquam aliam quam sinistram testem occupasse diligenter nobis inquirentibus observatum: In hac humor influit tenuis & urinae consistentia similis, erythroidem distendens membranam, qui subinde tam copiosus in hanc fertur, ut tumor quandoque ad humani capitis magnitudinem perveniat: Testis autem substantia ab acrimoniis humoris successu temporis, non tamen mox, corrumpitur: Vereris, inter quos apud Ætium Leonidas, Hydrocelen tumorem esse laxum & citra dolorem tradunt, & idem quidem sæpius contingit reperiri, secus tamen in dicto Anglo evenit.

*Ren sinister durus, &c.* ] Hinc apparet & abunde manifestum est quomobrem hydrocele, haud ab externa sed à latente causa procedens, non nisi in sinistra membranam incidat, atque hujus testem affligat: nam hujus partis seminales venæ, non ex cava, veluti dextra oritur, sed ab emulgente sinistri renis procedit ac originem sumit: Rene vero hoc male affecto, nec officio suo probe fungente, urinae pars, quantum emulgens hæc ad se pertaxit, cum ad vesicam per male affectum renem non potest descendere, per seminales in erythroidem delabitur, hydrocelen eo modo ingenerans: Sublato autem Teste non sua membrana, non amplius illic decumbere humor potest: quod si aliquis eo postea descendat, hunc in pube hæzere necesse est, veluti Anglo contigit, cui paulo ante mortem humor qui defluerat hoc loco subliterat, tumoremque cum dolore ex eia verat, *Idem ibidem.*

*Mors successit, &c.* ] Causa tumoris aquosi testiculii sinistri fuit ren sinister male affectus: Symptomatum vero supervenientium & mortis subsequens, testis extinctio: Cum enim teste ablato, scroto illi humori ad solitum locum confluxus solitus denegaretur, in corpore retentus symptomatibus subsequens & mortis causam dedit.

## OBSERVATIO II.

*Testis dolor cum Tumore, ab ulcere in peritonæo hinc puris in illum derivatione.*

**V**idimus aliquando adolescentem, cui *Testis cum vehementi dolore intumuerat*, is nullis auxiliis adjutus tandem occubuit. Inventum est ulcus exiguum circa peritonæum, è quo perennis saniei defluxio in Testes causa tumoris & mortis fuit *Iacotius comm. ad Coacas Hippocr. pag. 826.*

**V***Leti circa peritonæum* ] Unde proclivis saniei in Testiculos descensus: Hi enim communes & proprias tunicas habent, Communes dicuntur quæ utrumque Testiculum involvunt, & duæ nomenclantur, quarum prima sive externa Scrotum & Bursa appellatur: 2. Dartos dicitur, ex panniculo carnoso constans: Proprie singulos Testiculos scroto regunt: atque in utroque duci nomenclantur, quarum prima Erythroides, originem habens à *Peritonæo*, Cujus pars progressusque merito censetur, nam ita ab eo prodit, quemadmodum Scrotum à cute deducitur: Ob eandem eorumque in hydrope ascite Scrotum ab aquis intumescit: Propriam altera Albuginea dicitur.

*Testis cum vehementi dolore intumuerat* ] Hinc impetum quidam Chirurgi Herniæ speciei delusi ad Testiculii extractionem properant, De ea Testiculorum inæqualitate, quoad magnitudinem egregium extrax

exemplum, & in praxi utilissimum apud *H. Fabr. ab Aqua pendente in Operat. Chirurg. part. 1. cap. 73.* Vidi, inquit, plurimos ad me venientes, credentes se male habere quod unum Testem altero majorem in seipso observarent, propter quam imaginationem videbatur illis Testem majorem dolere: ego autem certos reddidi id naturale esse neque ullum malum inde eventurum: Cùm itaque adolescens ejusmodi Testium inæqualitatem in se ipso observaret, ostendens hunc testem operario, ille dixit se habere Herniam & brevi moriturum nisi extrahatur testis: atque ut brevis perstringam, eo ligato, dum Testem extrahere esset, accurrens pater adolescentis, & videns id horribile spectaculum, retinuit operarium ob opere, dicens se velle ut prius ego viderem patientem, qui propterea solutus est, & cum me adiret, dixi ipsam nullo profus malo detineri, & ita fuit.

## OBSERVATIO III.

*Testis dolor ob compressionem factam ab infimis musculis abdominis, ad quas compulsus.*

§. 1. **A** Nao 1562. cum Nobilis quidam magnis itineribus per dispositos equos Augustam contenderet, in via, ut sit, ex duriore succussu, cum illideret in ephippii anteriore: n partem, Testiculorum alterum contorquens, ita pressit, ut finistrum inter infimas abdominis musculorum extremitates in inguen protruderet, quo postea reduci nullo modo pesser, Tumore ibidem & Doloze excitato, affluente aliud humore, graviter aliquot septimanas generosus Vir ita afflictus est: Delatus inde Francofurtum hanc malo Medicum quæsit. Inventus qui sectione, ut in inguinis hernia Bubonocole administratur, sanationem promitteret, verum augescente febre, priusquam Chirurgus manum admooveret, extinctus est.

Cum Cadaver secaretur, inventus est Testiculus sub peritonæum, inter abdominis musculos extremos ita inhzescens, ut quasi connatus istis videretur: neque (ut ego aperti abdominis observavi constitutionem) potuisset integra valetudine sectione inde auferri. *Solenander Sect. 4. Consil. 18.* Vbi consilium pro quodam simili affectu laborante.

§. 2. Multis quidem naturæ ignavia ambo, vel alter saltem testiculus non propellitur deorsum scrotum, ut etiam illos testibus carere alii existunt, cum tamen in inguinibus tantum latitare quandoque soleant, inde & modum eos protrudendi *Parvus lib. 7. Chit. c. 16.* docet: Bis vero testiculi retractionem ex morbo videre mihi licuit, Semel in B. Ar. qui abscessu laborarar renis dextri, quam inflammatio hepatis subsequebatur, hinc varia symptomata, & inter alia tumor dextri testiculi, post aliquot dies ejusdem intra inguen retractio: Deinde in puero, qui ab alio calcibus circa testiculum peritus, in febre & ejusdem testiculi retractionem incidit, & postquam nulla methodica cura instituitur, moritur, Testiculum intra inguen retractedum dum aperio, substantiam ejus fere totam corruptam, & pus ad ponticæ nucis quantitatem in cavitate invenio. *Phil. Salmuth. cent. 1. Observ. 19.*

## OBSERVATIO IV.

*Testis dolor à copia seminis contenti.*

**H**ispanus quidam *Testis dolore intolerabili* diu vexatus, frustra tentatis omnibus, maluit sibi amputari Testem integrum & incorruptum quam diutius in tormentis vitam trahere. Extractum Testem cum adhuc caletem per medium discicarem, in faciem ipsius erupit & profudit semen. *Dodonæus.*

**H**inc colligit *Riclanus* Vas spermaticum deferens non tenero circumjectu lambere & persequere Testiculum, sed intro subire ac penetrare, humoremque seminalem in ipsum demittere.

*Testis dolore intolerabili* Testiculi enim nervos habent numerosos, partim à sexto pari, partim à spina, mediante inferiore abdominis plexu, in quo illi multo implicentur & uniantur, Nervi ab hoc plexu orti sù descendu subinde majores evadunt & numerosiores, furculosque impertinunt partibus involventibus, demumque ad ipsum testem producti, videntur quasi in membranam expandi, tunicamque albugineam constituere, à cojis superiore superficie hinc illinc numerosæ fibrillæ sparguntur in ductum nervosum, eundemque conficere videntur *Warthon adenograph. cap. 28.* Dubitar autem is, an sanguis per arterias delatus, quæ in testem substantiam admittuntur, solus sit materia ex qua semen conficiatur, quod non adeo copiose sanguinem distribuunt ac arteriæ ejusdem magnitudinis in aliis partibus; recto enim ductu feruntur versus canalem nervosum, indeque iterum per

ambages revertuntur propemodum ad testiculi tunicam propriam priusquam se exonerant. Ex pariet quæ ad ipsam tunicam deferuntur, valde anfractuosæ sunt, ita ut videantur soli caloris vitalis incremento destinatæ: Ipse vero censer, cum arteriarum venarumque numerumque quadruplo excedant, ac neque sensus neque motus causa facti videantur, Eos succum nobilissimum, sanguine longè nobiliorum deferre, ad seminis confectioem, Vide rationes quibus sententiam adsternit ibidem cap. 29.

*Profluit semen* Ea addemus quæ circa illam materiam notata digna observare nobis licuit: In cane cojus vas semen deferens ante coitum firmissime (alias enim semen facile effluit) ligaveramus, vidimus parato coitu Vascula seminaria testium, epididymidumque ita semine surgere, ut in magnam molem distenderentur Testiculi, Idem quia ab accurate attendentibus in animalibus salacioribus observari possit, non est quod dubitemus, cum id aliquoties in Glirium testiculis contempserimus. *Regn. de Graaf de Virorum organo pag. 72.*

## OBSERVATIO V.

*Testis dolor ob vesiculas sanguine plenas, intra membranam illius contentas.*

**M**iles sarcocele laborabat: In dissecti testiculi infima parte vesiculæ intra membranam continebantur, sanguine plenz, qua parte de magno dolore conquerebatur. *Vide tit. de Hernia.*

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

## SECTIO XXXI.

## De Gonorrhœa.

## OBSERVATIO I.

*Gonorrhœa diuturna laborantis Glandosum corpus Semine repletum inventum est, cum Testibus eodem refertis.*

**I**N voluntario seminis fluxu laborante, quem Patavii disseccimus, corpus Glandosum cum divideretur, non minus quam Testes ipsos semine oppletum conspeximus: Et si verum fatendum est, inter disseccandum nulla penitus corporis parte tanta seminis vis usquam atque in hoc glandoso corpore invenitur, quantum vis id à testium substantiis, mollitie, æquabilitate differat. *Vesalius de Hum. corp. Fabrica lib. 5. c. ap. 13.*

**I**N involuntario seminis fluxu Gonorrhœa Seminis profluvium Latini dici potest, sed id de eo quod involuntarie & p. n. sinit, noctu potissimum, citra pudeudi rei ignem aut erectionem intelligendum venit: Fit potissimum ob vasorum imbecillitatem, & statum copiam, vel ob compressionem, vel tensionem, vel succussionem membrorum, ut in convulsione & epilepsia: Profluit interdum ob seminis aquosi & fluitantis copiam: Cum enim tenax & viscosum est, à vasis contineri nequit, reiciturque: Communis est hic affectus & viris & mulieribus: Qui eo laborant, de colores sunt & imbecilles, sensum corpus contabescit, circa lumbos dolores sentiunt, curantur difficulter nisi causa cognoscatur. *Rondeletius pract. lib. 157.*

**Seminis fluxus** Semen benignioris alimenti excrementum est, quod ad speciei conservationem servatur, cui natura difficilioris exundi viam instituit, ne ex ejus fluxu immodico corpus cito contabesceret: Seminis rejectio alia est secundum naturam, alia præter naturam: Illa secundum naturam dicitur esse quæ differtur pene fit, & post coitionem in coitu facili: Præter naturam effluit semen, aut cum mentis erectione aut sine erectione: Posterioris tantum habenda ratio est, ut morborum & symptomatum quorum illa significatio est, causas deprehendere possimus: Ut autem ad id sine negotio pervenimus, primum scire oportet, an quod per penem ejectum est, album, vel viciatum, vel spurculum fuerit: subinde oportet ejus à quo sitis ætatem, corporis, faciei colorem contemplari, à quibus tandem ad profluvium ejus causam deducitur: Quod igitur ad ætatem pertinet, non omnis talem profluvium ferit: Pueritia enim ideo seminis excrementum impotens est, quod illius materia in corporis nutritionem & incrementum vertitur. Ultima vero senectus ob alimentis defectum: Ideo juvenibus, vel ætate consistentibus, vel iis qui venetem nunquam experti sunt, accidere potest ut semen sponte effluat: ob illius exuperantiam vel vasorum relaxationem & imbecillitatem, in iis qui immodice Venetem exercentur. A corporis habitu etiam quidam indicia petuntur, quando enim in corpore quadrato sit, & succi plenus, ob seminis abundantiam extitisse credendum est: Contra quæ quandoque in macilento & extenua-

to, colorem quem pallidum habente corpore, seminis emissio, sit, consumptionis, & hujus corporis emaciationis causa esse merito videtur: Et ut certius de hac re pronuntiare liceat, Dejectionis seminis modus, tempus & quantitas diligenter perpendenda sunt: Ad modum refertur, dissentio pene, vel sensum seminis evanescens facta, quæ indicio esse potest vim expultricem ab aliquo illarum partium ulcere irritatam, vel ob colloquiis lascivi stimulatam, vel ob vasorum plenitudinem commotam ad ejus rejectionem fuisse: Tempus vero profluvium seminis est cum noctu vel interdum fit: Noctu autem inter dormiendum per insomnia libidinis, aut in ætate vel veneret cogitatione, semen assatim procedit: Effluens autem hujus causa est seminis vel exuperantia, vel statum copia, aut acrimonia naturam prostrata: Quod autem unaquæque istarum causarum per se id effecerit, suis propriis signis deprehendemus: tum enim hujus effluviū causam in solam seminis redundantiam non incepte iudicemus, cum qui illud patitur, in ætate florens vitam otiosam egisse videbitur, cui ciborum & alimentorum multum nutrimentum adjuverit usum, vel ipsum veneris usum, vel aliquantisper intermiseric exercitium: à quo tamen nihil periculi imminet: At si ille potius ex vitæ intemperantia eruditates multas collegisse, vel vigilis intemptivis, & ex fructuum crudorum, & oleum, & similibus status generantium immoderato usu collegisse videatur, ut si abstemius sit, jam non dubitandum quin propter statum copiam seminis profluvium hanc patitur: Qui si medicamentis semen ex inguēbus frequenter assumptione, eam sistere putamus, multo tamen vehementius provocaverimus, minus mirandum erit, cum omnium talium medicamentorum genus summe frigida sit participes, ratione ejus intemperiam, quæ illud profluvium excitabat, auxerimus: Si vero nihil eorum quæ dicta sunt, adfuert, quin potius in sece erupit illud seminis profluvium quod longo usu acrimonia eduliorum, (cujusmodi sunt omnia piperata, sinapi & legumina) vesici sit consuevit, non aliunde sine quam ex seminis acrimonia & sanguine hujus affectus scaturiginem emanasse credendum est, licet rarissime ab illa causa contingat: Aliam autem præter causas enumeratas, seminis

feminis immoderate & intempestive effluentis recentiores Prædici constituerunt, speciemque quandam resolutionis partium spermaticarum fecerunt; quod quomodo rationi consentaneum est non video: Nam cum beneficio masculinum non retineatur semen, necne fiat hæc usus deputati aliqui nervi, resolutioni propriè vocanda non est. Sed quemadmodum ventriculi relaxatione vomitus provocatur, sic etiam ex vasibus spermaticis ob imbecillitatem virtutis retentis, aut propter expultricis iritationem, semen p. n. proci dere aliquando posse non negandum est: Decidit autem semen à Parastatis, & Vesiculis illis appensis, sensimque in penem colligitur, unde postea astrum profillire necesse est, nisi ob sectionem parvorum illorum musculorum penis exire astrictus, vel ob penis curvaturam in meatu retineatur, donec cum urina excludatur: Tale seminis effusum in quodam Nobili observare nobis aliquando licuit, qui illud patiebatur ob musculorum alterum penem incisionem: Nam cum antea laborasset ingentis magnitudinis in vesica calculi, qui sua magnitudine vulnus ad pedicem usque extenderat, unde factum est ut ex tanta muscularum laceratione, mensis etiam mori ab offe accideret, una cum urina, cavo penem consistente per traxit seminis sedit effluisse, unus autem parvorum penis muscularum eandem eiam lesionem subiret altero sano remanente, ex quo sequuta est mentula controrsio inde seminis retentio in penem cuius rescindendi nulla ratio alla erat, quam compressa digiti perinas regionem. Malum quidem est seminis profusio, mulieribus perinde atque viris commune: Causa est quod aliquando extra uterum, aliquando intra profunditur: Si extra, nullus periculi meus terror, nisi supra modum fiat, indeque sequatur corporis consumptio: Verum cum è vasibus spermaticis per cornua in sinus uteri descendit, in eoque retinetur, multorum gravissimorum morborum & symptomatum fit causa: Horrores enim, furores, manias, melancholias, convulsiones uterique præfocationes parit, eo quod in utero corrumpatur, & labem malignam contrahat: Quod si in copiosum fluitentumque spiritum resolvatur, inflammationem, quam vocant, uteri excitat: Efflavit autem istius causæ eadem sunt quæ in viris, scilicet exasperantia seminis, acrimonia, exulceratio & partium spermaticarum imbecillitas, & alia supra enumerata: Retineri autem potissimum solet semen in viduis, virginibus, & vesalibus: Quare de illis affectibus dum conquiretur mulier aliqua, ut in proprii morbi notionem deveniamus, de omnibus quæ antea dicta sunt diligenter est inquirendum, nec prætermittenda vitæ ratio confecta, ætas, vitæ conditio, ut vidua an nupta sit: Quod autem è vasibus spermaticis semen profusum, & in utero reteurum ista symptoma procreant, ostendunt istorum curationes, quiescent enim statim, & prius desinunt, ubi reserato inferiore ore uteri semen omnino effluerit.

Invasit hoc sæculo ex lue venerea aliud quoddam vitium, seminis profusioni, & Gonorrhææ finitum; in quo humor qui redditur puris similitudinem refert, quod cum à diversis causis procreetur, diligenter inquirendæ sunt, ut de affectu rectius statuamus. Proinde video dum ad illud puri simile cum urina effundatur, & exiliat aut non, an etiam cum sæculo doloris: Si enim cum sensu doloris, & penis erectione suo datam inflammationem in parastatis esse iudicamus, quæ ea potissimum in parte excitatur his qui rem veneream cum muliere infecta habuerint: postquam enim usum venereum confecerint, ejaculato jam in uterum semine, partes spermaticæ in eo opere calefactæ, & propter seminis profusionem inapare, halitum quandam retrum & fædum ex utero elatum in se recipiunt, quo tempore in malignum virus facit, quod deinde contagione alii quovis contrahunt, eundemque putredinem contrahit, & inflammationem excitat, sed in parastatis po-

tius, eo quod locus ille humidior sit & magis fistulosus: Fit autem inflammatio interdum in eadem parte, sed aliis de causa, quum in ipso venere opere multum seminis è vesiculis, post longam succussionem attritum collegerint, nec foras ejaculare poterunt: Quare semen adhuc fervens, & nonnulli acrimonia retentis, inflammationem accendit, quæ ex continua puris effusione internoscitur, pendendique perpetuo madore & erectione, interdum etiam ex hæmorrhoidum inflatione. Solent enim hæc omnia inflammationem illarum partium comitari, propter consensum qui peni est cum recto intestino: Interdum autem ob inflammationem ulcus, vel scissuræ ex eadem causa circa easdem partes proveniunt: Sed hæc ex propriis affectuum signis difficile fuerit internoscere: In inflammatione etiam major urinae ardor, major enim puris tenacitas: In ulcere vero major puris quantitas, minor ardor, sensus vero non minor: At in scissuris solus est ardor urinae abique ulla puris emissionem. Idem cap. 15, Tract. de dignoscendis morbis.

Corpus glandulosum cum divideretur] Quod corpus Glandulosum possit esse sedes Gonorrhææ probabitur, & quidem hæc ratione, Si corpus hoc ita afficiatur, ut in eo continuo materia sui generis non solum generetur, sed & continuo excreetur, vocabitur iste fluxus Gonorrhææ, nam inter hæc & seminis fluxum non solent distinguere Medici aut Chirurgi nisi quod dicant unum altero magis vicerium esse: Talem humorum effluxum posse contingere probatur à pyralismo, gra vedine, &c. nam quemadmodum in illis continuo salivæ vel pituitosæ materiæ copia illarum glandularum vicio excreatur, ita & harum glandularum vicio major tam huius quam aliorum humorum colluvies excreti posse nihil contrarium suadet, Quod mirum Vobis neutquam videri debet, quando quidem sæpenumero in praxi contingere videmus, quod ægri medicamento aliquo assumpto, vel etiam sponte, nunc per has, nunc per alias vias pravorum humorum totius corporis colluviem deponant, quod etiam in hoc corpore glanduloso locum habere potest, præsertim si venere aut aliqua malignitate debilitatum existat, nam ita se habent humores in corpore nostro ut latrones in carcere, qui cum erumpere student, non fortiora, sed debiliora prima aggrediuntur loca, sic etiam pravi humores ad evadendum non robustas, sed debilitatas corporis partes primo afficiunt: Hanc nostram opinionem confirmant adhuc magis exempla eorum, quos per dignitatem equitationem, vel succussionem ab equo, in Gonorrhæam virulentæ per similes incidisse scribunt: sed talis Gonorrhæa non tam cito vires prosternt, nec erit tam periculosa quam illa quæ à Testibus prodit, sicut hoc memorabile exemplum probari potest ex Bartholins, qui lib. 1. Anat. ultimum cap. 13. refert de quodam Patavi sibi viso, qui ultra annos xxx. eo fluxu laboravit, cum nullo sanitatis detrimento. Nec solum hæc ratio, verum etiam experientia probatur corpus Glandulosum affici potest, experientia namque testatur plures scilicet in cada veribus eorum qui Gonorrhæa usque ad mortem infestabatur, illud primario affectum observasse, nisi videre est in exemplo à Vesalio adducto, Testatur idem Bartholins & alii Glandulosum corpus quandoque sedem Gonorrhææ existere, Regnerus de Graaf de virorum organis pag. 119.

Non minus quam Testes ipsos, &c.] Testes quoque sedem Gonorrhææ esse adeo clarum est, ut si qui in hoc morbo curando operam impendant, nulla probatione indigeant: Ne tamen his desuisse videamur, qui in hoc morbo curando minus sunt exercitati, unum & quæ alterum argumentum in medium proferemus: Frequenter accidit ex repentina aut intempestiva Gonorrhææ suppressione, à potenter adstringentibus facta, ipsos Testiculos in ingentem magnitudinem, ut aliquando vidimus,



vidimus, excelsere, quod contingere neuriquam posset nisi ex parte (sodes Gonorrhæe forentidem) probatur ex eo quod seminis, quæ Prostatibus destituerentur, aliquando, licet rarius quamvis, Gonorrhæa laborent,

quæ in illis proculdubio à Testibus, cum careant aliis organis seminali conficiendo idoneis) provenit. *Idem pag. 125.*

## OBSERVATIO II.

*Gonorrhæa affectu cadaver vasa semen deferentia in penem maxime dilatata exhibuit.*

**V**alis semen in penem deferentis insertio conspectum quodammodo fugit. Et coitus, aut alias excretionis seminis tantum tempore aperitur: Quod Patavii quidam dissectus facile edocuit, qui ante suspendium involuntario seminis fluxu laborans, hos meatus omnes apertos, laxosque habuit: eos potissimum qui ex testibus in Deferentis semen vasis revolutiones gyroscæ pertingunt, & quibus dextrum & sinistrum deferentia semen vasa in vesicæ cervicem terminantur. *Vesalius de humani Corp. fabrica lib. 5, cap. 13.*

**V**ale semen in penem deferentis Semen tam in Testibus quam in Epididymidibus confectum ulceris excurrit per vasa semen deferentia, quæ à testibus sensim ascendunt in cavitatem abdominis, & iurant per idem foramen per quod vasa præparantia exierant: Ubi versus posteriora vesicæ reflexa, veluti in quibusdā capsulis dilatantur, & postea rursus coarctantur, atque angusto exitu in principio vesiculæ seminariarum terminantur, quorum finem haud difficiliter subire quæ per ostia in urethra exire semen potest: Hoc distincte cognoscere in misso tubulo in vas semen deferens, quod si liquore vel statu per syringam distendatur, citius vesiculæ seminariæ distendentur quam quicquam per foramen in urethram erumpat. Hinc patet lapsus eorum qui dicunt vasa semen deferentia nullam cum vasis seminariis communicationem habere, se per duo peculiaria foramina sese exonerare in urethram, distincta ab illis per quæ materia seminalis ex vesiculis erumpit. Exeunt itaque cum vesiculis seminariis uno co-

deinque foramine vasorum deferentium extremitates in utroque latere sitæ, ut nullam inter se murum commercium obtineant partes dextræ cum sinistris, mediante quo simul communicare queat, nam quod à testiculo vesiculæque dextra prodit semen, diverso in loco exit ab eo quod à sinistris affluit.

*Quibus dextrum & sinistrum deferentia vasa, &c.]* Diximus diverso in loco erumpere in urethram semen, quod à dextris quam quod à sinistris affluit, quod contingere existimamus ut hominis generatio eo exactius peregeretur: nam alii quodam interstitio à se invicem divixæ essent partes dextræ à sinistris, læsa una ex vesiculæ (quemadmodum ex accurata partis inspectione semper in lithotomia fieri necesse est) plerique ab ea steriles existerent, quamobrem sapientissimus Conditor, voluit illas partes à se invicem separare, ut una parte læsa altera suo munere fungeretur, quemadmodum in oculis, &c. contingere observamus. *Regis, de Graaf sub de Virorum organis pag. 39.*

## OBSERVATIO III.

*Gonorrhæa excitata ab ulceribus orificii vesicæ vicinarumque partium.*

**M**ergarot cum febre exigua laboraret, ut fere decumbendi necessitas non esset, & fluere Gonorrhæa, ut propterea sectio venæ differretur, tertio post die exacerbatus est dolor, & continua febris tenuit, &c. Nono mors.

Qui sectioni cadaveris interfuit Chirurgus, retulit reperta esse ulcera in ostiis vesicæ & vicinis partibus, Et tamen de his non querebatur. *Ballonius Epid. lib. 2. pag. 16.*

## APPENDIX L.

*Semini emissio citior ob ulcus Recti intestini.*

**D**e his non querebatur? Artificiali socrus H. ab Heers Obscrv. Med. x. quendam de Impotentia Venerea conquerentem, & celeriori seminis excretionem, ulcere in intestino recto laborare pronuntiavit: Historia autem, quia antiquior, huius affectus continet, & methodum ejusmodi ulcera curandi, huc afferenda est. Illustris, ait, Anglus Spadam venit, Impotentia remedium querens, ad vèculas, aut quæ alias peperissent, facile arripere easque inibat, sed virgineo claustro perfringendo impar, quia ad primum laborum contactum semen emittebat, sed inibelle & proflus aequum & sero simillimum: Uxorem duxerat annos natam xvi, sed quam toto biennio, etiam se facere, non devirginataz: optimi orat habitus, corpore procero, ensarios, genis rubentissimis, equitatione, venatione, &c. nulli secundus: Cum ab invito extorsissem ut alios mecum in consilium adhiberet, dixi quando in corpore tam sano impotentia, aliam causam non invenirem; videri mihi illam intestini recti ulcere laborare, indeque parastatas, atque semini præparando & ejaculando necessaria vasa, puri aura in horas afflata semen generare, quod longæ tensioni eolis & florido coitui non sufficeret: mirantibus illis hanc me asserere causam, dixi me olim in Italia casum illum vidisse, & meminisse idem mihi lectum in M. Donato Histor. mem. r. c. Mox cæcolpsum ex solo melle concinnatum ipsi videntibus imponi ceno, & statimque multo pure crasso oblitum reduci, Intestino deinde per clysteris syringam muram, à qua cum post aliquot injectiones mundato scilicet ulcere, valde dolere se diceret, adficientibus col-

legis, cœnui curato illo ulcere, ipsum sanatum iri: Vocatus Chirurgus dixit se medio primum digito, deinde & indice nullo negotio ulcus & magnum & profundum sentire: cui cum medicamenta adhiberentur manifeste proficiscia, scilicetque successum omnino pollicentia, ipse ad Principis ejusdem nuptias evocatus secessit, neglecta cura: Sequenti anno Leodium ad me venit, sed tum de ulcere dubitatio cessabat, tria enim fistulosa, in utraque nate unum, tertium in perinæo omnium oculis se obiciebant: Dixi sectione opus esse, cui faciendæ filo arsenico imbuto nihil convenientius scirem, esse hic Chirugos illi operi suffecturos: Dixit se nulli Chirurgo corpus suum crediturum nisi Parisiensi, Lutetiam enim totam Chironis familiam migrasse putabat: sequenti anno ex fratre intellexi ipsum Lutetiam nihilo quam eo iverrar, saniozem rediisse, itaque ab uxore in jus vocatum eum ea divortium facere coactum: hoc file ulcus sanctione bydrargiri, & multarum pilarum mercurialium crebra sumptione, ab inepto Chirurgo tractatus contraxerat: Balsamus, quo ulcus in Spa percurabatur, quando à me inventus, & semper cum optimo successu usurpatus, reticendus mihi non videtur: Summo florum thapsi, hyperici, fol. prunell. ana. man. j. hos incoquo olei ex seminibus hypericonis, & vini rubri veteris parti quantitati, ad vini omnimodam exhalationem, h. e. dum liquoris gutta igni injecta sine ullo stridore flammam concipit: eoque solo, si præsens urgeat necessitas, utor: Alioqui eodem flores sæpius immacero, & post xl. dierum insolationem, aut ignis calorem, iterum exprimō, quo sæpius facio, efficacius multo oleum comperio, cui remisco lapidem calaminarem septies vino, demum in hoc oleo, post ignitionem extinctum.

## APPENDIX II.

*Semen emissio ab injectis calidioribus chlysteribus.*

**V**esiculæ seminarie situm obtinent inter vesicam urinariam & intestinum rectum, ubi membranis quam plurimis ad collum vesicæ aliisque partibus circum-jacentibus ita annectuntur, ut quasi in æquilibrio pendere conspiciantur: Mirum itaque non est, ubi aliqui à se observatum testantur, ab enematum calidiorum injectione, aliquando seminale materiam per pudendam effluxisse, quia facile vesiculæ seminarie ut pote intestino vicinæ, à calore vehementiore ita afficiuntur, ut semen ex cavitatē suā in urethram propellant: *Regnerus de Graaf De virorum organis pag. 92.*

## APPENDIX III.

*Gonorrhœa ab abscessu frigido Renum producta.*

**§. 1.** **E**go novi Nobilem quandam qui ab abscessu frigido Renum diu hoc morbo laboravit, multo semper habuit detectus cum semen extinguentibus frigidis vel calidis uteretur: Institui contrariam victus rationem, jussique biberet vinum generosum, vescereturque alimentis optimis exsiccantibus, non flatulentis, & curatus est: Is partes illas imbecilles ex coitu frequentiore. Et ob tumorem renum frigidum humores frigidos colligebat, à quibus status multus generabatur: hi vero dilatabant meatus spermaticos, distendebant, & irritabant semen quod ejaculabatur noctu, postquam ejaculationem tam imbecillis erat, ut sese continere erectus non posset, sed cogeretur in loco decumbere, vel in cathedra extritus elevatis: Talibus qui ob status laborant, danda sunt discutientia, siccantia, parum alentia, & quæ non moistos status generant, convenit optima victus ratio, & medicamenta probam concoctionem promoventia. *Rondeletius Pract. c. 57.*

**§. 2.** **E**ssē canines erectus non possit) Uti sanguis aliam, præpediis, vasa proxima pro expediendo sibi transitu, brevi dilatat: ita aliquando, si vasa debilitate, si vasa quod sanguis in partem aliquam iusto magis quam pro ejus ulsā idem atque alliciat, vasa quibus defuit copia sua atque imperis incrementum adeo diducit atque distendit, ut in proximis partes minus copiose & debite induat: Atque hinc est quod Gonorrhœa simplici, aut siccior injectione nitro laborantium spina adeo debilitetur, ut vix erecti sine dēre, aut sese quoquo modo flectere queant: Non quo spina medulla, aut nervi inde ori, sacrum suum (quis hujusmodi sit) nimis in testes aut urethram impendendo suo se fraudent genio, quippe

non adeo liberales sunt, aut esse possunt, prout quidam vane commenti sunt: paucissima enim, & vix visibiles nervorum fibræ in testes disseminantur: Ratio autem potius in hoc sita est, quod arterie spermaticæ & uterinæ laxæ, succum sanguinis nutritium nimis & plus solita copia in testes & uterum deponunt: Et proinde arterie vertebrales, & regione oppositas, suo se sanguine, & spinalem medullam ab his irrigandam suo quoque alimento defraudant: Quod ex medella quoque magis patet, quicquid enim vasa spermatica consistit & constringit, æqualem patiter sanguinis distributionem, simul & debitum partium totum restituit. *Richardus Leveur Traité de Cordes cap. 2. pag. 114.*

**§. 3.** Notabis materiam purulentam Renum, tam in muliere quam viro, per venas spermaticas expurgari: In muliere per uterum, in viro per renem, dum lentum defillat ab Inguine virus, more gonorrhœæ virulentæ *Riolanus Anthropogr. lib. 2. cap. 24.*

## OBSERVATIO IV.

*Gonorrhœa diutius durans, à vasīs spermaticis ad renes usque vitium transfundit, vesicam & ureteres.*

**G**enerosus vir cum xvij. annis Gonorrhœa laborasset, gravissimis renum & vesicæ doloribus enectus tandem occubuit. Huic repertus est ren uterque major quam secundum naturam, durus: Ureteres ambo intus exulcerati, &c. *Vide historiam Tit. de Hypogastrii doloribus.*

**M**ultum interest inter veteram Gonorrhœam, i. e. seminis profluvium, & alteram improptè dictam, ex concubitu cum lue venerea infectis contritam: hæc est purulenta, corrupti ac fœtidi humoris per pendula effluxus, quem interni meatus ulceratio comitatur: caruncule etiam quædam circum labia quandoque suboriuntur, quæ liberum urinae transitum subinde remanent: Majorem si diutius constitit ulterius ferpit, vesicam, ureteras & tandem ipsos etiam renes inficit.

*Tandem occubuit*) Guenotius Gonorrhœam pro

deplorata habuit, quæ digito in anum immisso rententiam habebat ad sensum, aut si catheter argenteus intrusus sublividus extraheretur: sententia enim tumoris indicium, sive abscessus ulcerari, Sublividus catheter ichoris gangrenosi. Sic *Riolanus Anthropol.* lib. 2. cap. 21: Notabis, ait, in vesiculis seminaris & prostaticis sedem esse gonorrhœæ virulentæ, Et ratione situs earum partium quæ in perineo consistunt, equitatione longa vel succussatione ab equo Gonorrhœam, virulentæ perisimilem, excitari, sed quæ brevi perisnatur.

## OBSERVATIO V.

*Glandosum corpus (Prostrata,) Gonorrhœa virulenta sedes est.*

§. 1. **G**onorrhœæ virulentæ protrahuntur interdum ad decem annos, quale exemplum Patavii videmus in viro Bergomense, cætera sano sed vix ossibus hærente: unde in Gonorrhœa hujuscemodi non excerni semen, sed pus ulceris ex prostratis vero videtur proximum: Certe in omnibus Gonorrhœa laborantibus in Nosodochio dissectis, ulcera reperimus, seu callum, ulceris præteriti signum: Impossibile alioqui foret tanto tempore effluvium seminis vita superstitio perstitisse: Severinus Neapoli in dissectis invenit inflammationem & abscessum in parastatis: *Bartholinus cent. ij. Observ. 36.*

**Q**uamvis morborum cutationi conferat locorum male affectum accurata cognitio, jam olim Galenus demonstravit, cum sex libros de illis conscriberet: Hæc autem eo magis necessaria videtur quominus hæcenus expedita fuit in Gonorrhœa illa virulenta, quæ sæpius illicita vagaque venere contrahitur: Cum enim vulgo ab omnibus profluvium seminis statuant valorem spermaticorum vitio excitatum, rem ipsam, uti est profecto non attingit: Verior propterea, sententia *J. Georg. Varsingius* ulcus id potius prostratum existimabat, non tam semen quam saniem & adfluens humores corruptos eructans: hoc enim & copiam materiam satis ostendit afferebat, quæ sæpe quantam congii partem excesserit, & odorem quoque cum colore non semen referrentur, Imprimis cum distinctissime hæc ratio perquirat, vitiumque Patavii vixisse cætero sit, qui annis 30. continuis ejusmodi profluvio laboravit: Ipsam præterea materiam urinae permixtæ substantiam, à semine diversum quid representare, cum fundum petere soleat, illius autem naturæ in superficie natæ & confusa urina, non tamen divelli: Immo cadaverum sectionem frequenter id comprobasse, quæ ulcera in prostratis talia deprehendit, ut hac de re vix ultia liceat dubitare: Sed & jam olim *Rendelius l. de sign. morb. 9.* affectum vulgo Gallis Urinae Ardorem dictum, Parastatarum inflammationem à semine acris & putrescente in parastatis derivabat: Quin etiam *Palmarius 2. de lue c. 9.* sæpe ad multos annos materiam purulentam Prostratas fundere, nullo validius discrimine, nulloque pensilcere animadvertit, multo tamen sæpius utrumque vidium concurrere subnotans: Ex ulcere etiam cervicis vesicæ, à gonorrhœa curata residuo, tota vix materiam purulentam effluisse, non secus ac in diuturna gonorrhœa à prostratis, & gonorrhœam emittentem observavit idem loc. cit: Ardorem præterea urinae exva-

uatione humoris viscosi in urethra existentis per nimiam venetam, à gonorrhœa omnino distinguendum rectè monebat *H. Denipertius*. Fluxum autem menses annosque durantem, sine corporis debilitate, in muliere non gonorrhœam sed catarrhalem vocandam censibat *Gam. Thomajus* met. cur. c. 57. Nec multum dissentiens *Falsingius* unicum rite curandi scopum sæpius nobis commendabat, extergere & siccare potius quam adstringere: hic ipse plurimum commendo conf. malvæ, decocto althææ cum terebinthina & pulv. thei feliciter utebatur: Quo fine etiam ejusmodi gonorrhœam curatam vidimus exhibitis bolis ex casta cum terebinth. & Mercuriali ex arte parato necnon emulsionibus ex sem. cassiabino aliisque refrigerantibus cum spir. terebinth. injectionibus mundificantibus ex leno lactis cum Mercur. præcipit. albo quadratum continuatis, & denique opiatæ siccant ex thei. riciæ vet. extr. juniper. conf. hyacinth. & croco Martis parata. Nec alia magis præterquam siccandi intentione decoctum rad. stæncis bibidab *G. Harduynus*, de S. Jacobo, M. Parisiensis, Caryophylli et montani genus, cui siccandi fœciles eximia *G. H. Valschius Epist. observ. 67.*

*In omnibus Gonorrhœa laborantibus*) Prostratas esse Gonorrhœæ sedem *Bartholinus* non concecit *Parisius*. Adenogr. cap. 31. Ed frequenter accidit ex repentina atque intempestiva gonorrhœæ suppressione, à potenter adstringentibus facta, ipsos testiculos inruescere: quod vix fieri posset nisi ipsi ex parte sedes gonorrhœæ forent: propterea enim intumescent quod materia intempestive testiculis in seos regurgiet: quare verisimilius est gonorrhœam non unam tantum partem generationi seminis dictam affligere: quod apparet ex testiculorum tumore & carunculis circa velicæ collum crescentibus: Fieri potest ut tractu temporis viscosa humorum colluvies ad partes debilitatas

debilitas consuevit, & per eam doctus evacuerunt unquam enim hæc partes in statu sanitatis generatio- ni seminis ex naturæ instituto inserviant, hæc tamen potest ut gravi hoc morbo diu afflicti & debilitate non amplius semen conficiant, sed crassum quendam succum, qui à colluvie dicta, cum toto corpore uni- que confluente permixtus, excludatur foras: quo casu majus impender periculum toti corpori ex restrictione talis huius quam ex ejusdem continuatione: Neque mirandum si quis cætera sanus ultra 30. annos tali summo labore vitæ: quippe hæc partes hoc modo affectæ genium suum quali exsunt, & feminæ corporis loco sunt: quis miretur si ope fonticulorum aliquot aut ulcerum sanum profundentium, aliquis diu vitam, cætera sanus, protrahat? Hæc inde quo- que luculentius confirmantur, quod feminæ etiam quæ prostratis destituantur gonorrhœa laborate pos- sint: quæ in illis proculdubio à testiculari (cum ca- reant aliis organis seminis confectioni idoneis) neces- sario provenit: Imo vero frequenter in iis quoque gonorrhœa hæc diu durat, tandemque in fluxum al- bum, enervato testicularum robore degenerat: quod idem prope est quod viris accidisse diximus,ambo enim hac via corporis colluviem deponunt.

Vidimus in vira cætera sano sed viri obsessi larente] Phthificos sen Tabis cum plures sint species & differ- rentiæ, ita de præcipue & magis notabiles occur- runt, videlicet *Dorsalis* & *Pulmonalis*: Prius etiam no- stro hoc sæculo nomen suum fere amisit, aut forsitan mutavit in Gonorrhœam, tamen *Hippocr.* mentionem ejus facit, & morbum hunc ex prolesso tractans, du- plicem ejus speciem assignavit, scilicet unam ex immo- dica Venere, & alteram ex Distillatione in spinam dorsii: Quod ad posteriorem hanc spectat, de ea lib. secundo Tit. de Tabæ actum.

Altera species longe frequentior, item duplex ex- istit: ea nimirum vel à magno, vel nimis crebro hu- moris genitalis dispendio, Aut à continuo pūtilagi- nis à partibus genitalibus profluvio exoritur.

1. Quoad prius, observatione sitis vulgaris con- stat immoderatum Venere usum, etiam involuntari- um (si magnus iste vel continuus fuerit) seminis es- fluxum totius corporis languorem & demum conta- bescentiam producere, Hujus ratio non est quod se- men, juxta quorundam opinionem, à cerebro per nervos in corpora spermatica descendat proindeque à magno ejus dispendio imprimis *tyrophares* & sequen- ter partes omnes à spirituam inde sustentationem in- fluitia dependentes, infirmantur & contabescant, At vero cum satis evicimus materiam feminalem è massa sanguinea in partes genitales immediate suppeditari, eandemque proflus cum illa existere, è qua in cere- brum insillata spiritus animales procreantur, neces- sario sequetur quo major ejus portio pro reparando seminis dispendio ad testes corrumpitur, aut cerebrum debito ipsius tributo defraudari, & propterea tandem in toto corpore functionem tum motivam tum nutri- tivam vacillare ac imminui: Quod autem velant scot- tiores majorem circa lumbos debilitatem sentiant, partemque infra hos consistat, scilicet femora & tibie ma- xime contabescant, ratio est, tum quia sp. irritam ani-

malium peni in prima scaturigine videtur, & inde de- ficiente, sili extremi, scilicet spinæ medullæ fines, nec- que ab ea oriundi defectum hunc primo ac potissi- mum lauant: tum insuper quia juxta lumbos sanguis arteriosus præstantiores & maxime insaurativus sui particulas, dorso emittendo destinatas, plus ni- mium testibus elargitur, ac interea sanguis venosus propterea efficitur, quicquid opulenti potest à lumbis suffragari.

Seminis dispendia contabescentiam inducentia, modo sunt voluntaria, cujusmodi noxam patiuntur sales ac veneri dediti: modo sunt involuntaria, cu- jus affectus variz sunt species: Nam in aliquibus tantum propter insomnia aut phantasmata impudica contingit: in aliis vero præter istas occasiones, nixus quilibet dorsii, sive ob ponderis lationem, sive propter urinis aut fecum sili excretionem, etiam humorem genitalem dimitti facit: cujus causa est, & quia se- men aquosum & resur, simulque acre ac irritativum existit, & præterea quod partes sunt debiles, proindeque ipsum nec rite concoquere nec retinere va- lent.

In Tabæ altera Doctali, cujus mentionem supra fecimus, non semen ipsum, verum ichor, sive pūtila- go quedam è partibus genitalibus profunditur, cujus effluxus si quando ingens & continuus fuerit, non raro totius corporis vires labefacit, & materiem nutri- tivam subtrahendo, & prodige ablegando, atrophiam sive contabescentiam inducit: Enim vero juxta vasa spermatica, aut in transitu ab iis, tum in viris tum in feminis, Emundatoria quedam consistunt, quorum munus est humorem à semine efformato superfluum excipere, & quando exuberat per partes genitales foras amandare: Proinde quidem ut in utroque sexu ductus isti (ne exariscant, ac rigidi aut minus sensibi- les fiant) lubricentur ac irrigentur: Prostare in viris, & Glandule circa ureth. cotinua in feminis constituuntur, è quibus semper utrique in actu coitus, & non- nunquam citra ipsum, quando corpora spermatica ni- mia humiditate scærent, latex quidam serosus exudat: At in feminis (quarum corpora humidiora sunt, & in quibus hæc vias natura ad menstruas excretionem fecit) hoc sæpius ac multo uberius contingit quam in viris: Quod si emundatoria isthæc debilitate magis, aut virulentia quadam afficiantur, ita ut latorem illic missum aut corrumpant, aut non satis contineant, non modo iste perpetim amandatus copiose per pudenda effluit, sed & alii totius corporis humores superflui, aut excrementitii, ad partes istas debiles affluentes una profundantur, quinimo & succus nutritivus partibus quibusque vicinis destinatus illic consistit, & conti- nenter abscedit, ita demum ut propter societatem (qui ibidem affluens corrumpitur & continuo aman- datur) dispendia non modo partium vicinarum, sed totius corporis languorem & emarcescentiam succedant: Hæc satis vulgo innotescant in Gonorrhœa, item in fluore muliebri, sive affectus isti per impurum concu- binum, aut Venere immoderationem, sive ob pla- gam, contusionem, nixum majorem, aliamve noxam lumbis insillatam excitantur, *Widus operis posthumi scd. 2. cap. 5.*

§. *Wirsungius* tria cadavera Gonorrhœa extinctorum secuit, in quorum Prostatis vestigia ulcerum & cicatrices manifestas animadvertit.

Gonorrhœæ causam semen esse omnes fere con- sentiunt, nihil autè veritati magis consentaneum videtur initio quidem aliquid seminis, vel ob ejus, aut partium spermaticarum vitium, vel facultatis retentivæ imbecillitatem excerni, successu vero temporis humores viscosos à natura per factam hæc viam e-

pellit: Impossibile enim esse per talem fluxum semen semper evacuati evincit. materiz quantitas, nam i. d. quod excremitur intendit aliquot libras excedere expe- rienda docet: at tantum seminis profluere posse po- imo sane mentis statuet. Materiz qualitas, odorem enim ac colorem seminis non semper refert, sed odo-

rem de se spiritus gravem, colorem ostendit varium, interdum nigricentem. 3. Fluxus ad aliquot etiam annos duratio, Novi Lipsiae aliquem per sexennium eum propeffum: Imo pro certo mihi relatum est Virum quendam Patavii supra 30. annos hoc laborasse affectu: Seminis autem profusum sine virium prostratione, ac vitalis roboris extinctione tandem durare posse incredibile est, cum ex sententia Avicennae & plurimum medicorum, una non seminis emissio plus debilitet quam sanguinis unica 40. Urinae signa, nam materia quae excernitur marulae urinae supernatant: Nonnunquam etiam pus emitti observatum est, quod proculdubio ab ulcere ex affluxu viriosorum humo-

rum provenit, probat Wirsungii experientia: Sic dicta autem Gonorrhoea si diu duraverit, curatu admodum difficilis est: Ad evacuationem materiae peccantis exhibeo has pilulas 2℥. Terch. Cypr. ʒj. Scamm. ʒof. rel. Gialapp. ana gr. v. m. f. Pil. ʒx. Ad fluxum inhibendum 2℥. Croci Martis adstring. Div. ossis sepiæ, succin. corallin. ebos. f. a. ʒ. ʒj. m. f. Pulv. dosis ad ʒj. Summo etiam cum fructu usus sum tinctura Vitrioli usque ad 30. gutt. in convenienti vehiculo: Certissimum remedium sunt Pilul. Riverii quae me nunquam fefellerunt. Vide cent. 2. Obs. 74. *Carolus Raygerus Obs. 201. Ann. 1701. miscell. curios.*

## OBSERVATIO VI.

*Gonorrhoea muliebris Glandoso corpore affecto excisatur.*

**F**luor muliebris, si continuus, & Gonorrhoea, ita inter se conveniunt, ut nisi mentem adhibeat Medicus praeter similitudinem facile in errorem abeat, quamquam à diversis partibus procedant & per destinata loca excernantur, si quidem Fluor isidem quibus menstrua fluunt, ductibus ejicitur, quod vel ideo judicamus, quia menstruum cruorem ita subinde immutari, cernimus, ut qui primo veluti à victima, referente Hippocrate, prodibat, hunc minus floribus, postea pallidus ac sensim albus appareat, Fluoremque muliebrem, Album dictum efficiat: *Gonorrhoeam* vero ex Glandoso corpore provenire, & per lacunas circum, & in meatus urinarii exitu collocatas erumpere, Cadaveris ejusdem mulieris hoc vitio infectae, dissecti palam fecit, Nam utero ejusque vagina innoxia, corpus glandosum sive Prostatas, urethrae circumpositas solum male affectas offendimus.

**D**iceret aliquis, Quomodo illi Medicus Internoscere valebit, si mulier affecta se castam & ab omni virili consortio alienam profiteatur? utraque disjungere poterit si ad prolabilem materiam, atque quaeletas diligenter attendat? materia namque Fluoris alteram in Gonorrhoea manantem longe quantitate superat: Querelas si consideret, Flore sedatas lumbi dolose cruciari, alias vero Gonorrhoea laborantes de oborta circa pudendas partes acerbitate lamentari audierit: Sin nimis his contentus certior esse velit, genitalia inspicat, si quidem meatus urinarii circumfidentes partes (in quibus lacunarum

exitas terminantur) mucosa quadam materia obfusa, ac interdum ulceratas reperiet, reliquis vaginae partibus decenter sese habentibus, cujus contrarium in Fluxu albo fieri solet: Sed haec vulvae inspectio non semper necessaria est, cum Medicus haud sit culpandus si medicamenta secundum ægotantis querimoniae praescribat: Si vero illum eludat, nec optatum praescripto medicamine successum, contumax mulier consequatur, id sibi imputet: *Regn. Graef. de mulierum organo cap. 9.* Nota Vinum Clar. lib. de Vitisum org. p. m. 123. mulieribus Prostatas deoegere.

## OBSERVATIO VI.

*Gonorrhoea muliebris à vomica in uno Teste genita.*

**F**œmina ex assidua Gonorrhoea circa uteri regionem atrocissimos et cruciatos patiebatur: Mortua secta, Vomica in uno Teste inventa fuit *Domin. Panarolus Pentec. I. Observ. 14.*

## APPENDIX.

*De Gonorrhoea & Bubonum venerorum ortu. Et de usu Ligamenti uteri Vermiformi dicto.*

**A**lterum Ligamentorum uteri par inferius teretes instar lumbricorum, subrubens instar musculorum, porosum ac concavum praecipue in fine, à lateribus fundi utrinque prodit, atque in suo principio recipit ductum seminatium exilem, à testibus & tubis, siue ad inguina (in quibus superne glandulis falcitur) descendit per peritonaei productionem duplicatam (haec rupta aut duplicata fit hernia inguinalis) tendit inque musculorum obliquo- rum abdominis (sicut vasa deferentia in viris feruntur) transiens, statim extra abdomen fibris carnosius, ab offeilio prodeuntibus: firmatur, & supra ossa pubis reflexum, Clitoridem ingreditur, in eamque aperitur: Et licet in corporibus mortuis nulla apertio ibi manifeste oculis conspiciatur, certum tamen est in vivis poros satis late aperiri, eodem modo sicut in viris clare patet vasa deferentia, atque etiam invisibiles alioquin feminales meatus, qui semen è vesiculis in urethram transmittunt, apertos esse: Ab offibus pubis tradunt varij Anatomici reliquam hujus partis portionem, ulterius in adiposam internam femoris membranam expandi, eum eaque usque ad genu; vel, secundum nonnullos, usque ad pedem descendere, cujus consensu putat Riolanus mulieres primis ingravidationis mensibus de femorum interiorum doloribus conqueri: Verum deceptos ignoratio hujus partis usus, quippe cum hoc lumbricale vulgo appellatum ligamentum habeat usum nobiliorem quam aliquod ligamentum (quo nomine per abusum perperam fuit insignitum) certissimum est dictam membranam ad genu

genus extensam non procedere à lumbricali ligamento, nec ullam cum eo communionem habere, idque eo magis cum manifestum sit illam ab ossium pubis ligamento cartilagineo ori-  
 ri: Hoc par lumbricale ab Anatomiis passim habetur pro tali ligamento; quod utri fun-  
 dum partibus anterioribus & inferioribus laxè devineit. *Bambinus* laxos in corporos, & infe-  
 riore parte aliqualem cavitatem humore mucido perfusam animadvertens, iudicavit illud  
 duobus usus inservire, ac partim ligamenti munere fungi, partim per suos poros genita-  
 lium partium superfluos humores excernere: Verum nobiliori usui destinatum esse osten-  
 sum nempe fungi munere vasorum deferentium, imo esse ipsa vasa semen à tubis testibus,  
 que ad pudendi anteriora in clitoridem deducuntur sē deferentia: Præter semen, putat  
 Veslingius etiam aliam quancunque saburram, circa uterum collectam; per eandem viam  
 expelli, at isti in hæc vasa nullus patet introitus: At certissimum est solum semen per dictas  
 vias effluere, omnem vero pravorum humorum saburram; quæ ab utero evacuat, expel-  
 li per vias menstruum profuxui destinatas, scil. per uteri, & præcipue cervicis uteri exco-  
 poros, ut & per vasa quædam lactea eo extensa, Item per arterias & venas, tam in uterum  
 quam cervicem ejus desinentes: Eodem modo sicut saburram excrementitiam per arterias  
 gastricas & mesentericas in intestina deponi novimus, idque vel sponte in diarrhœis, vel  
 arte ab exhibitis purgationibus, vel vi naturæ in crisis febrium: Interim tamen hoc no-  
 tandum, si ab impuro coitu semen in testibus virulentiam contraxit, tunc illud per hanc  
 viam defluens, modo gonorrhœam modo in glandulas inguinales (per quas ductus hic  
 transit, depositum bubones facere, neque unquam ullam saburram, quam à solis testibus  
 & tubis, hac via defluere posse: Errat quoque Lanrentius, censens hæc rotunda ligamen-  
 ta aliquando ita dilatari ut Bubonœelen parient, Nec enim possunt usquam aperti ad reci-  
 piendum intestinum vel omentum, atque ita dilatari ut aliquod ex illis excipere queant.  
 Sed sit Bubonœele in mulieribus sicut in viris; cum intestinum vel omentum prolabitur in  
 productionem peritonæi vasa hæc comitantis, & cum illud manū versū interiora repelli ne-  
 quit, sectione peritonæi curatur sicut in viris: *De Diemerbroeck Anatomi lib. 1. cap. 24.*

## APPENDIX altera.

De Gonorrhœa causis &amp; differentiis.

**L**angius lib. 2. epist. 5. Gonorrhœam triplicem facit, primam in renum, hepatis ac vaso-  
 rum seminalium calore, in iis quibus corpus hirsutum ac succi plenum, semen genitale  
 copiosum ac calidum coacervatur, ac non raro per nocturna insomnia, lumbis supino decubi-  
 tu incalescentibus, nocturnas vestes maculant ventremque supinum: Quæ vera est nomine & re  
 Gonorrhœa: 2. speciem produci scribit ex putrilagine phlegmatis vel falsi, vel etiam crudi  
 copia, quæ non raro cum momento genituræ permisceatur, ac præcipue à cerebro per spi-  
 nam dorsi, lumbos, renes, etiam ab hepate per venas & nervos ad genitalia tendentes defe-  
 rat, à quibus per penem, cum ejus exoriatione sensum extillet: Quod profluvium mulie-  
 ribus etiam accidat, sub menstruum pituitosorum denominatione. Tertiã speciem ponit  
 eam quæ veneræ luit esse soles, vitulenta dicta: At quattã speciem omittere videtur, à va-  
 sorum imbecillitate orram: Nec humorum serosorum & vitiosorum cum semine permisto  
 neganda videtur, quod facit *Platerus*. Etenim cum alix corporis partes imbecillæ non solum  
 alimentum suum non bene concoquant, sed etiam, si munus publicum habent, id non bene  
 perficiant, ut in ventriculo & hepate videre est, cur idem etiam in Testibus accidere non pos-  
 sit? Deinde nec hoc negandum videtur, si sanguis in corpore sit impurus, etiam semen impu-  
 rum in corpore inde generari, Sic & videmus morbosas feminas impurum lac in mammis  
 generare: Præterea natura sæpe assuescit humores vitiosos ad aliquam partem, præcipue  
 debilem, mittere, idque etiam in Testibus fieri impossibile non est, imo fieri experientia te-  
 statur: habent etiam humores vitiosi interdum ad peculiarias partes suam inelinationem, quod  
 & hic accidere potest, & præcipue in Gonorrhœa ex lue veneræ, virus istud partibus geni-  
 talibus infestum est *Sennertus Pract. lib. 3. parte. 9. sect. 2. cap. 4.*

## \* ADDITAMENTUM.

*Gonorrhœa pertinaci in qua seu observatio unica de corruptione omnium interiorum viscerum,  
 cum veneni exhibitu suspitione adparuit.*

**N**untiatus nobis fuit obitus Dom. Dncis Candalei, qui plurimis lugubris fuit, mors illius  
 omnibus Parisiensibus stupenda visa est, neque in Medicos culpa conjecta est, quorum  
 curatio omnium adplausum meruit: Didici ex ore Illustr. Comit. de Rebé ipsum inveterata  
 Gonorrhœa laborasse, ac ab obitu omnia interna viscera corrupta deprehensa fuisse: Veneni  
 exhibitu suspitionem quod attinet, in admirationem nequaquam trahor, cum enim viri Prin-  
 cipes moriantur, plerisque suboritur illa opinio, quasi rem acutè tetigissent, Maculæ lividæ in  
 corde animadvertæ, à sanguinis corruptione originem ducere possunt, in corde & locis vici-  
 nis. *Guido Patinus Epist. Gallice emissarum 69.*

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

## SECTIO XXXII.

## De Uteri Procidencia, Descensu.

## OBSERVATIO I.

*Uteri Procidenciam possibilem esse ostendit dissectio cadaveris muliebris, in cujus utero prolapsi vagina cereus globulus deprehensus est.*

**M**AGNA difficultas est An uterus ipse inverti possit? quantum ad nos attinet, existimamus in difficili partu dum placenta ei firmius adhæret, & ab imperitis obstetricibus nimium attrahitur, id aliquando contingere posse, rarissime licet id eveniat: In virginibus (nisi quandoque incredibilia contingerent) impossibile judicarem, propterea quod crassa ac membranosa colli uterini substantia in illis tantum exiguo foramine pervia sit. Ad cujus confirmationem sequentem observationem communicabo: Anno 1671. in Nosocomio Delphensi, dissecimus mulierem procidencia uteri laborantem, in cujus uteri vagina nulla Sarcomata, nullasq; alias excrescentias, sed tantum ingentem cereum globum invenimus, cujus immissi beneficio Vagina (quæ alias ob uteri ligamenta nimium relaxata invertebatur ac foris propendebat) cum utero intrus detinebatur, uteri cervix autem naturalem constitutionem retinebat, adeoq; minime invertebatur.

**N**ulla Sarcomata, etc.] Laxatur aliquando Ligamenta uteri, propter vim patris, nimiam corporis humiditatem &c. ut uteri osculum in sinum sudoris decidat, & inversa vagina extra propendat, ut exemplis probant Platerus obs. lib. 3. Th. Barbolinus c. 2. hist. 91. & c. 5. hist. 9. Dom. de Marchetti anat. c. 7. & alii. Reperiuntur tamen qui ob Sarcomata, aut alias vaginæ excrescentias, aut protuberantias quandoque à se observatas, Uteri prolapsum omnino negant, aut adeo ratum pronuntiant, ut vix aut ne vix quidem eum unquam contingere credant, quorum tamen opinioni calculum nostrum non apponimus, quandoquidem ratio docet humores à toto corpore defluentes Ligamenta uteri humectare ac relaxare posse, Et experientia confirmet in locis humidioribus hunc morbum satis familiarem esse. Meminimus namque nos uno tempore ad quatuor diversas filias, quarum virginitas innoxia habebatur, fuisse vocatos, quæ uteri prolapsu laborabant, quibus partim fomentis adstringentibus, partim annulli cerei in pudenda immisso-

ne non vulgare attulimus auxilium. Si nobis objiciant non Uteri sed Vaginæ prolapsus fuisse quos ita temetulumus, petemus an utero in sua sede permanente, Vagina in tantum prolabi possit ut extra pudendum propendat? Si vero uterus simul è naturali suo loco descendat, descensum hunc Uteri Prolapsum vocamus, qui prout major vel minor est, sicureius aliquando ad mediam vaginam, interdum ad usque vulvæ orificium, nonnunquam denique totus extra vulvam prolabitur, ac variis modis afficitur, ita ut aliquando eum extirpare coacti faciamus, cujus rei memorabilia exempla referunt Agineta, Langius, Mercurialis, Oretus, Fernelius, Patavi, Lavini & alii, Ex quibus constat feminas absque utero (licet ejus ablatio ob multiplicem vasorum penetrantium numerum periculosissima sit) vivere posse: Sed cur quæso ligamentis, membranisque partibus, quibus naturaliter detinetur relaxatis, non tam facile descenderet, quam breviori pœot tempore coitus (in confesso est) obviam veniat Regnerus Graaf de Mulierum organis cap. 10.

\* §. 2. Quædam femina uteri prolapsum patiens, globulum cereum magnitudinis palmarie pilæ in uretrum magna vi introduxit, eumque per decennium gestavit, à morbo prorsus libera.

Quod mihi compertum fuit post ipsius obitum ex dissectione cadaveris cum ex febre continua interisset, inventoque in utero globulo prædicto, soror ipsius asseruit eum ante decennium fuisse in uretrum introductum & continuo gestatum: D. Femari. Observ. xi.

## OBSERVATIO II.

*Uteri Procidencia vera in cadaveris apertione deprehensa.*

**A**Nno 1670. mensè Januæ. curæ meæ commissa mulier 28. annor. robusta valde, in qua corpusteros, insignis magnitudinis, ad pudendum se offerebat. In decumbente circa partem superiorem, ubi pudendo proximum crassitiei illius erat, quam duplici spithama comprehendere non licebat: inferiora versus paulo contractius, longitudinem vero spithamæ habebat: Ast quoties incedebat, elongabatur adeo ut etiam genua ipsa attingeret extremo suo: Durum omnino corpus hoc ac seirrhosum observabatur: Difficile valde & hic

& hic, ut in casu sequenti, certialiquid determinaret, idque eo magis quod haud adeo firmæ mentis mulier hæc deprehenderetur, adeoque nec de causa mali, nec de tempore quò vel inceptit, vel anginem in sumperit, vel ullo alio ad dignotionem curationemve scitu necessario non informare apta. Rei gravitatem considerans, in Nosocomium publicum eam deferri curavi: Hic extirpationi quod multum à multis tribueretur, ( licet summopere eam metum improbaret Clar. *Gerardus Penijne* Nosocomii Medicus ordinarius ) ad eam devenum est; ast minus fructuosa fuit, tertio enim die ab eo quo ligatura prima injecta, obiit egta, fuit hic 27. Jan.

In aperta cadaveris ventre Uterus desiderabatur, utpote qui totus, inversus, extra corpus dependebat, intra sui cavum testiculos, uretinæque ligamenta, (excepta ala dextra quæ adhuc in ventre detinebatur) continens: Prolapsus autem uteri fundus, cum testiculis, partibusque adhaerentibus, non ad extremum hujus tumoris, genubus proximum, ac si fundi uterini superius jam fuerit vicinum genubus, sed detentæ partes dictæ in fundo, ad vaginam: aut potius ad orificium uteri internum prolapsio, vagina ipsa extensa, miræque inersata: Inersata mire substantia hæc uteri, adeo ut etiam vel digitorum trium transversum crassities hic notaretur cultro disciscanda, antequam in cavitatem devenire literet: Ureter uterque ad digiti minoris amplitudinem distentus erat, forsitan quod fasciæ ob viciniam viæ urinaria constituta: Fides si habenda tumori, ex partu laborioso Procidentiâ hæc deduci debet: Totum uterum ad exteriora non fuisse prolapsum, mihi saltem ( præterquam quod in aperto testiculi in summo hærerent tumoris ) argumentum, est quod in imo tumoris hujus apertio notabilis, impervia licet, quæ minime adfuisset, si quidem uterus inversus in totum extra corpus fuisset prolapsus. *Gerardus Blasius Observ. Med. 1. part. 3.*

## OBSERVATIO III.

*Vteri Procidentiâ imperfecta.*

**E**odem mense petitioni mariti superstitis, desiderioque meo satisfactorius, apertui ventrem defunctæ puerperæ. Obierat hæc die præcedente, hora 5. post partum, sana alias anxia, edito fortu optime.

Exhibuit hic se uteri fundus ad interiora illius conversus, sicque ad pudendum usque prolapsus, adeo ut vagina tota corpore hoc uteri inverso repleretur, quod etiam arte adeo à contracto utero detinebatur, ut non nisi robore summo, arque violentia, ope per pudendum immissi instrumenti, sursum detrudi, sic in naturalem locum reduci potuerit. Imprudentiæ obstetricis, an vero nimis arcte cohærentiæ secundinarum cum uteri membrana interna, hoc malum adscribi debeat, non meum determinare, hoc tamen addo, retulisse adstantes mulieret quæ in partu obstetrici auxiliatrices fuerant, quam primum fortis in lucem prodisset exclamasse obstetricem adhuc alium in utero gerere scitum, neque extra pudendum protraxisse corpus aliquod rubrum, ad ejus aspectum consternatæ adfidentes imperitiæ illam accusarant, ab opere destiteret serio admonentes, quod etiam fecit postquam in quantum, vel per uteri contractionem, vel per ignorantiam licuit, extra pudendum dependens intro rsum iterum compulsi: Vasa omnia sanguine hic adeo destituebantur, ut etiam quocunque loco cultro anatomico aperta nil ejus funderent, subsidentibus in totum tunicis: quem etiam sanguinis defectum ex immoderato fluxu, ob secundinæ violentam separationem extractionemque causatam, mortis subitanæ causam judicamus. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO IV.

*Vteri procidentiâ, mola credita, lethali.*

**F**ilia hominis eoqui, prægnans, ante partum mortem optabat & eventuram prædicebat: Pridie ajunt ingenti laborasse diarrhæa, noctu facile peperit, Inter patiendum uterus cum secundina prodiit, qui restitutus est, quamvis ignorarent uterum esse: Mane vocatus, quum omnibus viribus destitueretur & vix pulsus sentiretur. Vterus extra propendebat, turgens admodum, quem cum attingerem, effluebat liquor sanguineus & serosus, ita ut existimarem, quum nihil tale vidissem, esse molam aliquam quæ utero firmiter adhæreret: mecum idem sentiebant obstetrix & Chirurgus: Ego ob rei novitatem nihil tentare volui, curans vocari *Tab. de Argent.* Eram ejus opinionis futurum ut præcideretur, id tamen noluerunt absente illo Chirurgo tentare: Præscripsi cataplasma emolliens & suppurans, ejus præparationem non expetebant, statim enim moriebatur.

Defuncta illa Tumore aperto, animadvertimus nihil aliud esse quam uterum eversum: mirabar non à me agnitus, licet id primo suspicarer: Verum id effecit ignorantia obstetricum: deinde quod dicerent nullam vim fuisse in pariendo & fluxu comprimendo, quum arteriis & venis alligaretur. *Ex observationibus Tab. Saubini.*



**M** *Isphar non à me agnitus*] Uteri procidentiam, ab omnibus Medi. is hæcenus decantatam strenue negat T. Keckringius, falsèque invehitur in *Lauvergentium Vellingium & Ericholinum*, quasi illi inter alios hæc de re admodum male iudicassent; Dicitque laxitatem quandam colli, quæ extra pudendum prominet, hæc facere ludibria; Verum respicitur, quæso, vir Doctissimus, & palinodiam canas, nam quia nunquam vidit uterum prolapsum, satis temere irridet alios istius rei oculos testes. Legat *Carpus* in *Ilago-*

ge *Anatom. historiam mulieris*, cui uterus non tantum foras prolapsus, verum etiam excelsus est. Legat *Haldani* cent. 4. *Obser.* 60. 61. 62. ubi à viro fide digno tria istius prolapsus exempla inveniet. Aliis addam meum testimonium, qui ipsemet vidi uterum ad decem digitorum latitudinem à sinu propendere, quem egomet ipse tractavi manibus, & conveniente instrumento versus interiora in suum locum retruxi, & egiam porro ita persanavi, ut postea illa pars nunquam amplius prociderit. *De Dismembrac. Anatom. lib. cap. 24.*

## OBSERVATIO V.

*Vteri procidentia & ellomia, cui deficientis Callosum corpus substituit natura.*

**M** Ulieri cuidam fere trigentæ, sanæ, menstruali, conceptionis signa paulo post secundas nuptias, cum ex priore matrimonio prolem nullam suscepisset, apparuerunt. Progressu temporis abortus est ad partes imas & pudenda ponderis sensus, dolore & urinz retentione adeo molestus ut Chirurgo patefacere se, infortuniumque suum coacta faceret. Is visio tumore in periconzo, fotu & cataplasmatibus anodynis & emollientibus dolorem sedavit. Sed mox ad pudendi labrum interius vomica, velut ab abscessu rupto apparuit, sanie subrubra, citrina & pallida, multo tempore manans; Interim haud evanescibat ponderis ille sensus, quin potius augebatur in dies, ita ut ab anno 1773. ne se quidem in lecto, in hoc illudve latus convertere posset, nisi admota manu hypogastrio ad oneris levamen; sed & rum quidam veluti globus toto corpore & pondere suo sibi provolvi videbatur, in quodcumque latus decumberet, nec stans nec sedens alvi excrementa reddere valebat, nisi pondere illo sursum manibus ad diaphragma sublato: Ineffusa vis crura promoveri poterat, quasi sibi semper ex interfemineo aliquid penderet quod progressum remoraretur: Ex intervallis Vomica illa recludebatur sanie solita manans, sed rum capitis membrarumque omnium dolor, animi deliquia, fastidia, vomitus, suffocationes miseram urgebant, adeo ut ab empirica muliere persuasa, facile adducta fuerit ut antimonium hauriret, cujus tanta fuit & tam effera vis, ut post multas cum multis torminibus vomitiones & aquosas per alvum dejectiones, visus sit sibi anus procidere: sed admonita à familiari quadam sua, cui se videndam erederat, haud ab ano id procedere, sed à vulva, Chirurgos vocavit qui sibi auxilio afflicte sanitati essemus: Expensa re tota & diligenter animadversa, communi consilio censuimus id quod prociderat extirpandum esse: quod atro colore, fetore & aliis ejusmodi signis putridæ ac corruptæ rei argumenta manifesta præberet: Ergo per duos dies sensim, frustatim & sine dolore corpus extraximus, quod nobis Uteri corpus esse visum est: Cujus rei fidem fecere unus ex testiculis, qui integer extractus est, crassiorque item membrana, reliqua ex mola, quæ suppurata, rupto abscessu, sensum diffuserat. Revulso omni ejusmodi corpore, melius ægra habere cepit, & tamen ante extirpationem novem totos dies urina suppressa fuerat, De hinc omnia sibi, naturæ suæ & statò cursui reddita sunt, totumque trimestre sana & egregie incolumis ægra supervixit, donec suborta repente pleuritide inierit.

Dissecta à me, & sedulo singula exquiriti, nusquam comparuit uterus, sed ejus loco callosum quoddam corpus, quod natura, quæ nunquam in nobis otiaur, jacturam ejus partis quasi reparatura, vel lacunam potius alvi repletuta, substituerat. *Pareus lib. de Hom. gener. lib. xlv.*

## OBSERVATIO VI.

*Vteri Procidentis exsectio lethalis, ob simul scellam Coli intestini partem in illum delapsi.*

**A** Dstiti agyrtæ qui Uterum ad magnitudinem ovi anserini prolapsum cum sectione curaturum se diceret, nec ullis argumentis meis, qui aliam curandi viam proponebam, cederet. Roganti etiam ut saltem in uterum prolapsa intestina, vel quicquid esset, durissimum enim se tactui offerebat, aliudque quam aquam aut statum esse certo certius affirmanti, primum loco suo, supinata muliere, reponeret, nec quicquam ab eo præter mala verba referrem, Fac inquam quod facis, mihi tyrannicam illam audaciam & imperitiam spectare nec libet negliget. Nondam domo pedem extuleram, cum immani clamore & ejulatu introsum vocor: convellēbatur vehementer à sectione patiens, cumque animam non dubie agentem viderem, extremam unctionem afferri jubeo, sed serius, expiravit enim in fine sectionis, in qua adstantibus omnibus, vel fuga sibi consulentibus, alvina enim copiose prodibant excrementa; Utero cum contentis in aquæ adstantem situlam projectis & lotis, Intestinum colon, ad cubiti fere longitudinem sectum, omnibus visendum præbui. *Henricus ab Heer Obser. Med. xxii. p. m. 192.*

## OBSERVATIO VII.

§. I. *Excreſcentia fungoſa uterum prolapſam mētiens.*

Maria N. vidua, temperamento melancholico prædita anno 1666. ætatis circiter 47. viduitatis 8. dum in nundinis rei ſuæ nimum dāt operam, & poſthabito menſium fluxu, quo tum ordinarie corripiebatur, merces ſuas emptoribus, ſe vero frigidiōri aëri exponit, primum quidem in hypogaſtrio leves quōſdam ſentit dolores, quos tamen ab externo frigore oborriſſe ipſa ſuſpicabatur: dolores excepit exiguus in pudendo tumor, qui quōdīe creſcens ægram eō adegit, ut mediatricem in conſilium vocaverit: hæc ubi balneis atque inunctionibus ſuis per aliquot ſeptimanas continuatis, fruſtra tractavit ægram, deſperata tandem cauſa ut ſepoſito pudore Chirurgus conſulatur ſuaſit: Sic igitur die 13. Janu. 1667. Vocatus Chirurgus Starlender, offendit extra pudoris finem propendentem ſubſtantiam quandam ſphaceloſam, maxime ſortentem, & duos pugnos magnitudine ſuperantem: unde affectus raritate atque gravitate perterritus, Medicum ſibi in ſubſidium dari petiit. Adjungitur ei D.D. *Chriſt. Meiſnerus*, Quo cum ubi die XIV. Janu. viſitavit ægram, abraſit de prominenti ſphaceloſa ſubſtantia ultra libram, reliquum vero deſenſivis munivit. Subſequenti die XV. Janu. D.D. *Simonem Schulzeum* & me ad ſe invitavit D. *Meiſnerus*, atque comparentibus nobis caſum in præſentia Chirurgi expoſuit: Et quandoquidem D. *Meiſnerus* illud quod extra pudendum propendebat, nil niſi excreſcentiam fungoſam, Chirurgus vero uterum inverſum atque prolapſum eſſe contenderent, rē pro & contra ventilata, ipſam placuit adire ægram, ipſumque affectum propriis luſtrare oculis: omnes igitur ad ægram nos contulimus, ubi mox ſub hypotaſti ingreſſum moleſtiſſimus nos excepit fortior, ægram vero ipſam deprehendimus nimis debilem, attamen ſectionem omnino exoptantem: detecta tandem parte affecta, in diverſas mox ivimus partes, ambigentes quid ſphaceloſum illud eſſet quod quod extra pudoris finem conſpiciebatur. Nam D. *Meiſnerus* uterum, ob ligamenta imprimis latiora, ita excidere poſſe pernegaus, illud pro fungoſa habuit excreſcentia. Nos vero uterum inverſum propendere arbitrari ſumus: neque nos ligamentorum uterinorum uſus de opinionē noſtra dimovere potuit, cum tantum valeat in eorum conſtitutione naturali; non vero præter naturali, ubi aut rupta, aut ſaltem ob continuum humorum affluxum nimis laxatae reſoluta officium ſuum minime præſtare poſſunt. Prout etiam in aliis procidentiis, & imprimis oculi, contingere ſolet: confirmarunt præterea ſententiā noſtram exempla à *Rouſſeto*, *Bambino* aliisque citata. Et tandem ipſe Chirurgus haud leve pondus addidit, ubi noſtro inſtinctu digitum intra finem immiſit, & undique ad latera colliurerini cavitatem explorans ubique ſibi obſtare ſubſtantiam membranofam retulit, unde uteri fundum inſtar faciei inverſum propendere eollegimus. Quandoquidem autem totum illud quod propendebat ſphacelo correptum erat, ſepoſita illa controverſia in ea omnes conſenſimus ut ſubſtantia illa ſphaceloſa, ſive uterus ſit, ſive non, quanto citius & antequam vires omnino proſternantur, reſcindatur, ne partes adhuc ſinceræ trabantur. Inprimis cum ipſa ægra idem perpetuis efflagitaret precibus: quare factō ad ſectionem debito apparatu, Chirurgus iniecit vinculum parti ſanz, non longe à veſicæ urinariz oriſicio, per quod nullo negotio ſtylum in ipſam veſicam immiſit; vinculo eolligato, dum ægræ poſitus ſectioni adaptatur, iſta manus anxie jaſtare, creberrime expalleſcere & ſudore circa frontem diſfluere cepit: unde leiſpotherymiam inſtare colligentes mutuo conſilio ſectionem diſtulimus, veritine una cum ſphaceloſa excreſcentia ipſam quoque auferamus animam. Relicto igitur vinculo deſenſivis partem affectam munivit Chirurgus, atque ex ordinatione D. *Meiſneri* ægra diverſis uſa eſt corroborantibus: nos ſubſequuta inquieta propter dolores ab injecto vinculo excitatos: Die 16. Janu. ob ægræ imbecillitatem nihil tentamus: die 17. eum viribus magis magiſque decreſcentibus circa ligatam regionem magnos ſe pati dolores conquereretur egra, & præterea prope vineculum macula appareret nigra, ægra quoque per tuſſim purulentam materiam ſatis copioſe rejiceret, ita ut eam phthiſi ex ulcere pulmonum contracta laborare nemo ambigeret, & artis honori & noſtræ famæ conſulentes, ſectionem omnino differendam eſſe uſque dum vitia pulmonum emendantur & vires reſtaurentur decrevimus: vineculum igitur ſolvere juſſimus, atque ut locum affectum debite tractet Chirurgus juſſimus, Remoto vinculo ſanguis undique ſtillabat, & ſimul quoque dolores remittebant: ſubſequentibus autem diebus quotidie plures particulas corruptas abuſtulit Chirurgus, ita ut excreſcentia jam vix unum pugnum æquaret & ſector in dies minueretur: unde & nos ipſi quoque cum abraſa tanta parte, ædum quidem adhuc in medio illius cavitas aliqua appareret, qualem tamen adeſſe debere credidimus, ſi de utero prolapſo tanta quantitas fuiſſet ablata, non jam pro corpore uterino, ſed pro excreſcentia quadam fungoſa ac ſphaceloſa propendentem illam ſubſtantiam cum D. *Meiſnero* habuimus.

Neque etiam aliud ipse docuit eventus, cum enim ægra Phthisi consumpta die 24. Morti obijisset, abdomine resecato, uterus illius omni ex parte sanus in pelvi, cui debito & naturali suo loco hæsit, nec, licet propendens substantia varie traheretur, quicquam movebatur, Sphaeolosa autem illa substantia nil aliud fuit, nisi fungosa excresecientia ex uteri collo majori, & hujus antica parte, prope vesicæ orificijum enata: Verbo, Ipsa uterini colli substantia rugosa, spongiosa & fungosa, à mensium & corruptorum humorum affluxu ampliata & dilatata. *G. Segerus Med. Thorunensis Observ. 121. Miscell. curios. anni 1671.*

**V**terum non tantum ad pudoris usque finem descendere, sed & plane extra rimam ejus prolabi, & sic majore modo, modo minore magnitudine foris propendere, adeo jam commune atque receptum est Practicum dogma, ut vix unum offendas qui de Mulierum morbis differens prolapsus seu proidentia uteri nullam fecerit mentionem: Imo si Hippocr. evolvamur, in scriptis quoque illius affectus istius hæud obscura offendemus vestigia, nam lib. de nat. mul. c. 3. p. 564. & c. 73 p. 581. editionis *Foes.* expressè uteri extra pudenda protinus prolapsi atque velut scrotum penduli, signa, causas atque curationem tradit, Quæ cuncta fidei verbis repetit lib. 2. de morb. mul. & lib. de sterilib. Item lib. de Superf. quomodo uteris crebro exidens reponendus & quasi decocto prius abluendus sit docet. Imo verba illa quæ lib. de loc. in hom. cap. 59. p. 423. de sinu uteri viciato, breviter, quidem atramque nervosæ satis profert, dum inquit, *Uteri quæcumque si fide naturali moti fuerint, morbos afferunt, seu foras procefferint five intra efferint.* De uteri cum prolapsu tum ascensu intelligenda esse cur dubitemus? Sic igitur Hippocr. uterum extra pendenda prolabi posse statuentem, sequuti sunt hæcenus innumeri Medici. Et merito quidem, ipsa namque experientia assensum urget, dum uterum p.n. extra abdomen pensilem apparuisse, diligentia atque inexacta fides observatorum annotavit; Certe *Ramusius* de partu Casareo sect. 4. c. 5. & 6. & *Bambinus* in appendice part. 4. plurima collegerunt exempla: quibus adjungenda quæ leguntur apud *Parum*, *Guinterium* de vet. & nova med. com. 1. dial. 8. *Fernelium*, *Forsium*, *Paracelsum*, *Th. Bartholinum* Hist. anat. cent. 4. hist. 2. *Poterium*, *P. Barbette* Chirur. part. 1. cap. 8. *P. Eshavoe* apud *Rivarium*, *Vesichium* Episcopum. Obs. 77. aliisque. Ceterum licet uterum extra, pudenda revera proidentia posse statum, non tamen nego quod etiam sæpe excresecientia carnea aliæque uteri prolapsum ita mentisatur ut & oculatissimis imponere possit. Talia namque exempla præter *Clar. Th. Bartholinum* hist. anat. cent. 2. hist. 58. referant quoque peritissimi Chirurgi Belgæ: *Hem. Van Roenbysen* oblet. Chirur. p. 1. obs. 2. Et

*Joh. Van Meesken* obs. Chirur. c. 51. Quibus hæud abstulit est præcedens hist. *G. Segerus* ibidem. De uteri Proidentia lege *Platerum* p. 13. c. 2.

In diversas evincitur partes, &c. Molam quinquennem prolapsam uteri mentisatur esse refert *D. Joh. Jennischius* in *Miscell. curiosis* anni 1671. ut minime non sit si ambiguum fuerit & anceps de morbi idea judicium: Uxor quidam, aet. 34. minor, & decem liberorum totidemque fere abortuum, necnon plurimum molarum fecunda: parens, ante annos XII. fetus aliquot exclusit vitales, ob impunam autem & ichotosam, quo & parens ipsa & hinc enata soboles, sanguinem plethoricque excoctata totius corporis articula, tandem absoluta puerperio diem suum obierunt, ut ex novem duos saltem conservare potuerit soboles; postmodum natuta & patienti negotio fatigata, nil nisi molas concipere, & singulis mensibus per sesquiduum, etiam absente longo tempore marito, excernere molita est: Tandem opera *D. U. Joh. Agricola* effectum ut mensibus ordinare essentibus denuo conciperet, Ex difficili autem sequenti x. partu Prolapsu uteri satis periculoso se laborare credidit, & obstetrici confirmavit, ut absque ligamentis, hæc malo aptis, nec stare ne dum incedere valeret per quinque integros annos: Elapso quinquennio natura in deterius ruit, hoviisque mensium obstructionibus, passionibus hysteriis & li. pothymis assiduit; Ipsam invicem semianimum reperiit, morbum causamque indago, originemque mali ex impetu vero provenire iudico, cordalis hysterici apta propino; ob adstrictam alvum clysterem applicandum suadebam, quem cum renetet, fomentationes ex emollientibus & carminativis toti abdomini applicari; interne essentiam castorei & spiritum secundæ (ob molæ præsentis suspicionem) in synopo de artimisia propinari jussi, quibus præstitis, elapso bihotali, acerbissimi dolores & conatas parturientium aborti, brevique post molam, capitis infantis ad instar peperit, absque putredine, fetore & sanguinis vestigio: Hoc facta Prolapsus uteri quinquennis evanuit, &c.

§. 2. Vidi in Nosocomio Patavino 1641. dissectam mulierem, quæ prolapsum uteri à partu difficili ante decem annos passa credebatur: Narravit se in prato cubantem observasse descendere uterum gramenque venari, Ex illo tempore in dies crevit ob affluxum sanguinis, ut distensus nigæque in putredinem degeneraverit: Judicabat Chirurgus operationes nobis demonstrans, *P. Marchetus*, non esse uteri Proidentiam, sed excresecientiam aliquam in vagina uteri, adeoque abscindendam: Alter Nosodochii Chirurgus familiaris pro uteri stetit proidentia, quum excresecientia subitum ortum incrementumque habere non possit: Mulier interterum secari volens, inter ambigua consilia, ad mortem properavit.

In aperto cadavere, satis in trunco obzso, sed artubus emaciatis, uterum suo loco sanum beneque constitutum vidimus, Excresecientiam verò ex uteri vagina dilacerata pendulam cum lablis pudendi, ex lue venerea forsitan, inflammatis. *Th. Bartholinus contr. ij. hist. viij.*

**E**xcresecientia ex uteri vagina. Herniam, vulgo vocatam uterinam, nihil aliud esse censet *P. Bartholæus* quam relaxationem anterioris vulvæ tunice, quæ

rugosa facta est ut penem amplectatur & melius semen deferat ad uterum, Atque ut partus tempore onere suocicilius liberet infantem,

OBSERVATIO . VIII.

*Sarcoma totam uteri vaginam occupans, forasque propendens, Vteri Procidentiam falso exhibens.*

**E**orum sententiam qui uterum foras prodire, & extra corpus ipsum propendete existimant, culro anatomico impugnavi: Coloniz Agrippinz mulier erat quæ hysteriæ passionibus mirum in modum cruciabatur, Procidentiam uteri earum miseriarum causam esse & seire se, & manu tangere opinabantur: propendebat enim extra corpus quippiam, quod illi non aliud quam nterum esse, vel esse posse, existimabant: hæc inierim mulier omnia quæ mens obstruicti & reliquis uteri furoi excitare solet symptomata passa, tandem anno 1665. morto ab his liberata fuit.

Dum Chirurgis hoc cadaver secantibus adsum, causa apparuit tantorum malorum prorsus alia quam opinati fuerant: Non enim prociderat uterus, quod fieri non posse ostendemus, sed interno ejus orificio adnatum erat sarcoma, quod diductum per totam vaginæ longitudinem extra corpus sese ostendebat.

Postea aliam ipse secans puellam, inveni similis sarcomatis rudimentum instar dactyli orificio uteri interno adhærescens, quod si tempore adauctum fuisset, eadem ratione inearitis imposuisset, qui uterum semper immobiliter loco suo consistentem, tanquam vagantem per omnes partes ventris, vel tanquam procidentem accusassent. *Theodorus Kerckringius Observat. Anat. 53. Vide observat. ejusdem xx.*

**E**iusdem est sententiæ P. *Borsetti* Chirurgi lib. 1. cap. 8. Uterus, ajr, non facile laxitate, multo minus distentione laterum ligamentorum prolabitur, ut maxima pars scriptorum sibi imaginantur. Gravi foeminarum parturientium nisu, & incapti secundinz extractione, alii nobiscum fundum uteri in pube plane inversum viderunt, adeo ut pars intima extrema esset. Etiam experti sumus ( præsertim in illis quæ alvi duritie & ventris dolore vexabantur ) membranas pubis se co usque extendere, ut homines Chirurgiæ imperiti eas pro ipso utero sumplerint, & etiamnum sumant; Nam uterum sine vitæ periculo posse excidendi, quemadmodum multi scribere ausi fuerint, periculis anatomico intolerabile censetur.

\* ADDITAMENTA.

OBSERVATIO II.

*Historia Vteri procidentis ex virgine resercti.*

**I**N secundo Ephemeridum Tomo Observat. 226. f. 328. mentio fuit facta virginis, cui testes per hymenem propendentes ablati fuere. Dum vero tunc Uterus valde tumens vi egredi cum lutamīs circa inguina doloribus conaretur, chirurgus ad id accito author fui, ut immisso per myrtifolarum caruncularum circulum specillo antrosum secundum longitudinem incisionem faceret, zonamque virginæam solveret, ut via prorumpenti isti moli pateret. Ille verò me absente, ignarus talis eveniret, cum ullius virginis claustra nunquam aspexisset, speculo matricis violentam tenuit divulsionem, quæ etiam non sine dolore & qualicunque hæmorrhagia fuit secuta, remanente interim suumque in locum se recipiente Utero. Ad quinquennium virgo illa ab omni incommodo libera vixit: quo exacto tempore denuò graviter decumbere cepit, & tenuis circa pudoris sinum dolore miserè afflicta, chirurgus prædicto jam satis sub lato, virum alium ad curationem admittere noluit, seque juratæ cuidam foemine commisit, quæ ductui nostro pareas felicem ipsi opem attulit. Promittebat tandem pugni minoris magnitudine Uterus admodum inflatus; in sinistra regione introitus vaginæ arctè adhærens. Foemina adûctens digito paulatim per aliquot dies separate eundem studuit, cui tunc à latere vaginæ divulso funem iniecit, & prope cervicem ligavit inde quo feri eum fortius constringens paulatim tumorem istum diminuit, post quatuor septimanas corrugatam quasi & demortuam istam massam, quæ sicut instar compressæ apparuit, deciduâ effecit. Formam uteri nondum desloratæ omninò referebat, sed cavitate carebat, quæ suspensum, utrum id corpus, verus uterus esset, me tenuit. Cum verò & loci, unde propendebat, conditio, & præcedens utriusque testiculi amissio, & liber circa tumorem eminentem ambitus, mirumque qui ante prægressus fuit cum collo Uteri malè affecti consensus, siquidem circa laryngem consimile denuò ulcus æque fortens hoc morbi tempore adfuit, in unum conspirarint, tanto confirmatiorem me reddidit naturam sarcinam matricis inutilem, maleque conformatam foras voluisse protrusam, quæ nihil unquam frustra fecisse voluit. Tamdiu stabit hæc ipsa sententia, donec tandem è vivis abierit, quæ tunc dissecta contrarium docere poterit. Longæviores autem alijs utero privatas sæpe observavi feminas; & hæc ipsa post amissum sexus foeminini characterem, ab anno hætenus vegeta & in eolumis vivit, quæ circa culpam suam non amplius virgo, nec mulier, nec deslorata audit, sexum alioquin meliorem semper averfata. *Dominus Joh. Georgius Volkameri in Ephemerid. German.*

De excreſcentia uteri ulcerosa, cum sphacelo, lethali.

**H**onestâ Matrona multorum liberorum mater, Ursula Schadin, pie defuncti Balthasari, Lemcken, Civis & Negotiatoris Thorunensis relicta vidua, cum jam ante aliquot menses (post terminum menstrui fluxus à natura præfinitum, diu exactum) menstrua inordinatè fluere percepisset, eum magno dorſi, coxendicum & adjacentium partium dolore; inde quotidiè debilior facta, meam implorat opem. Cui ego ex lege artis nostræ diversa ad id facientia præscribere corpi remedia, continuatè solum, me decumbente, *Dn. D. Iohanne Blumickio*: verum illa nullum inde levamen sentiens, eorum perçessa, indices pejora symptomata cum atrophia totius corporis experta est. Interim menses pedetentim primò, postea etiam in totum cessarunt fluere: nihilominus eadem semper languidior facta, & lecto affixa permanens, tandem quò febre cum gravissimo horrore partium extremarum per aliquot horas, & calore intensissimo longiore, inordinatè aliquoties correpta, per aliquot septimanas, sine omni cibo, solo potu cerevisiæ secundariæ contenta, vitam prærogavit, vomitibus denique primùm biliosis, mox atrabilariis succedentibus. Sed spatio octo dierum ante mortem, menses cum gravissimis pubis doloribus iterum rediere, post quorum mox remissionem tumor è vulva prominens tubicundus & ulcerosus apparebat, purulenta & fetida saburra ex eo indefinenter fluente. Tum misera illa die 12. Augusti anni 1675. post levissimas convulsiones piam animam Salvatori suo placide reddidit. A morte autem partes inferiores circa pudenda & nates, anticæ & posticæ, à sphacelo nigerrimæ & corruptæ conspiciebantur, unâ cum tumore propendente. *D. Simon Schultzeus in Ephemeridibus Germanic.*

## OBSERVATIO III.

Excreſcentia carnea Venerina.

**R**ustica quinquagenariæ proxima è pago *Engishofen* superioris Turgoviz, cui nomen *Catharina Huberin*, phlegmaticæ, ut appellant vulgò, temperici, ad Venerem segnis, nupserat anteviginti, & si quid excurrere potest annos, marito vegeto, robusto, & cui ad 30 annos præter *Christoph. Balthasar* nihil deesse visum est. Cum hoc nonnisi duos in integro spacio progenuit filios, quorum prior octodecim, posterior novem jam annos natus uterque Hippocratis laudatum nomen meriti. A biennio autem lumborum doloribus, levibus quidem, sed continuatè, divexabatur, cui frequens mingendi desiderium, ceterum individuus esse junxerat comes. Menstrua intermedio hoc tempore sæpius in tempestivo, aliquando immoderato & continuato ad aliquot septimanas fluxu urgebant, interdum etiam nihil profusus fluebant. Symptomatum horum impatiens femina, Veterinariis cujusdam, ut infestioris mortalium fortis, *Andreas Schultzeus*, hoc consilium & opem exploraturus abiit, sed tristi, ut fieri plerumque solet, cum evenit, quippe ab eo, cui calculo renis laboraret, generosa tollens remedia, in continuam ex eorum usu incidit mingendi necessitudinem. minxit autem haud difficulter & absque dolore molestiore. Appetitus interea perstitit, nec ulla unquam febri, aut foetibus toruit. Semel ite nunc labitur, ex quo atrox lassitudinem primùm sentiebat, & tri-mestri, verò præ lumborum & inguinum doloribus, licet non adeo vehementibus, sedere difficulter poterat, nulla licet externis apparente corporis labe.

Die Junii 12. anni hujus 1681 sentire quid cepit in vaginis uteri, quod egerendi maximam conatibus movit. Novitate rei percussa femina, duas statim accessit obſectrices, & licet certo sciret, se gravidam non esse, voluit nihilominus, ut quid temerè, studiose explorare insolitarum ejusmodi rerum impente obſectrices fingunt eosque sanguinis esse sphacelati (vocant *ein Brandknoelle*) arbitrare, manu illam extrahedi statuerunt. Peritor obſectrix manus admovebat præptas, sed dum grumum se obtinere sanguinis eredit, en carneam molem duas spatulas longitudinem propemodum æquantem permaciter protrahit. Agra interim præ acerbissimis, qui sibi in extrahitione pariebantur, doloribus immaniter vociferante, venas imprudens arripens omnes ex utroque florum latere sibi rumpi alto clamore ingeminante. Obſectrices perpetuo Agra ejaculibus attonitæ, sero nitium animadvertunt, corpus illud præternaturalenon ex vagina saltem, sed ex utero ipso ulterius descendere. Sollicitæ itaque de rei eventu Veterinarii, à quo antea sinistro cum successu curata fuit, accersi de novo volunt. Ille vero semel atque iterum vocatus accedere requirit, suam hæc in casibus præsumens. Intolerabiles interim dolores Agram miserrimam eo impulerunt, ut obſectaretur obſectrices, in effusione corporis levamen sibi procurare tentarent. Nec rogari diu consuectæ morem gerunt obſectrices, vulnusque digitilongitudinem, ac duorum digitorum transversorum profunditatem facile

facile ex æquans incantæ infligunt. Verum enim vero, ut similiter ut plurimum solet esse eventus cornu quæ *alij* peraguntur, ita tantum quoque abfuit, ut *Ægra* inde levaretur, ut potius in pejus omnia surerent, dolorque per se jam intensus singulis pene momentis magis magisque exacerbaretur, ac, quod pessimum omnium, extaret, qui consilio adjuvmentum præstare possuisset. Fatis igitur commendata mitioribus jacuit ad 14. Julii ejusdem, quo *Cleopha* Schöbingeræ, Matrona Sangallensis Nobilissima, & ob plurimos quos ipsa perpeffa est, morbos, in variis Mulierum affectibus pereurandis versatissima, ad Miseram invifendum à Turicollis rogabatur, hand longe tum à pago negotiorum causa exiftens. Matrona igitur, pro affectu quo erga miseras & pauperes ejusmodi feminas auxilio destitutas tenebatur benigno, sine mora ad *Ægrâ* proficiscitur, ubi examinatis probe omnibus casus circumstantiis, comperit tandem corpus illud ex sinu pudoris propendens sphacelatum jam magna sui parte, intolerabilem fere expirare ferorem, ac penitus consideratum nile se aliud vidit, quam inversum uterum, carnis excrescentiis pluribus, ut ex figura adjecta patet, involutum, molemque carnis maximam spithamæ unitis eum dimidia longitudinem exæquare cognovit. Observavit itidem, ipsam quoque uteri substantiam à vulnere ipsam ac sphacelo corruptam extare, moleque carneas singulas propriis involutas membranis, ac à se invicem distictæ, uteri substantiæ tenacissime adhærere. Omnibus sic probe perceptis, Prognosin statim funestam facit, omnia tamen ad *Ægræ* salutem se contributuram promittit. Eum in finem Chirurgum, qui maxime vicinus erat, accessit jubet, utpote eum quo de medendi ratione, siquidem manulem heic operationem necessariam esse omnino prævidebat, consilium iniret. Quo facto, in eo conveniunt, uti absque admotione eultri (sin desperato enim casu famæ quoque immerito sepe in dubiis eventibus periclitantis hæbenda ratio) digitis saltem carnea moles ab uteri substantia divellatur, eoque peracto uterus in locum reponatur. Manum itaque Matronæ admovet operi, molesque singulas satis magno eum labore ab utero sine notabili eum dolore, ira avulsit, ut vix duas sanguinis uncias inde perdidit *Ægra*.

Maxima, quæ adfuit, moles, duorum transversorum digitorum latitudinem utero undique adnexa, colorem secundinarum finxit, substantiamque obinuit solidioris lienis bovini gaudentem, ac pondere libram civilem æquantem, venis quoque quamplurimis superficiem permeantibus superbiens. Minores vero moles omnes carnis fuerunt firmioris, ac fibrosioris, coloris autem nigricantis, odoris fetidissimi; & levicula sui parte: utro per venarum, arteriarum, aliorumque vasorum reciprocam communicationem adhæreria. Avulsis hisce corporibus Matrona uterum quoque extremis partibus violacei ac nigri coloris, insensilem quippe & jam sphacelatum, in locum suum reponere laborat, ac dum eum sub osse pubis sursum protrudebat, *Ægra* leviculum per sensit dolorem, sed statim iterum evanescentem. Ab 11. Jani usque ad 14. Ischuria laboravit *Ægra*, bihorio autem post operationem peractam sine difficultate ac impedimento urinas reddidit. Nausea interim perpetuo consistebatur, quæ sane sphacelo membri laborantium atque inde moribundorum consuetudo tantum non perpetua. Peractis hisce omnibus, in id incumbendum erat, ut sphaceli progressus minueretur, vulnusque uteri sanaretur. Prescriptis itaque ex consilio Medici internis sudoriferis blandis, vulnerariis decoctis, ac injectionibus uterinis convenientibus, & dixit ad mentem Dom. Mauriceau in tractatu de Affectibus Muliebribus imperata, Matrona Nobilissima ad negotia pristina revertebatur, *Ægram*que Chirurgi sollicitæ commendabat curæ, quam & ea industria gessit, ut *Ægram* adhuc ad sex integros dies superstitem servaret: quibus absolutis, sphacelo ingravescente animam reddidit. *D. Theodori Zwingeri*.

## OBSERVATIO IV.

*Corpus mylodes post partum masculinum ex utero propendens, cum subitaneo puerpera interitu. Apertura cadaverum utilitas.*

**V**XOR molitoris nostri in mola Kuppeliehina dicta, 30. præproper annorum, fat alioqui bonæ constitutionis, infantisque jam unius mæter, per totum ingravidationis secundæ tempus facie pallida se male habuit. *D. 25. Septemb. Ann. 1683.* dolorifico pulsu fores uteri Lucina pulsavit, adceritur obstetrix audacula, & ex illarum cohorræ, quibus est satis loquentæ, sapientiz parum, ut loqui Salustius amat: elapsis binis hõris, quod quidem illi retulerant, enititur pusionem vegetum, Secundinæ satis auspicato (iterum referente obstetrice) successerunt. Interim continuati dolores puerperam ad horæ dimidium exeruciant, identidem ingeminantem, adhuc adesse, quod excluderet, aut Didymon aut aliud quidpiam. Manus obstetrix commodat, expectatur geminus, corpus enim ad obstetricis tactum infantile caput mætum erat. Secus autem atque expectant res eecidit. Propendet extra pudendum corpus globosum, sed nulla arte, nisi forte adhibita vi separabile; obstetrix hic agere sola verita, Chirurgum; hic autem re explorata, satiscitibus inereca, ægæ viribus, me asserit. Ego, quantumlibet festina-

bundus, (non enim dum molior aut comor, annus est) sati velociam praevertere non potui; pedem enim vix porta extuli dum animam hæc exhalavit. Adsum, Corpus myloides (molam dicere non audeo) illine adhuc propendebat, sanguinolentum, adque tactum duriusculum; sed manu calidior tractatum rediit ad casum molliciem. Jubeo Chirurgum digitis explorare, si forte posset hujus corporis initium quoddam reperisse, quod ab illo frustra tentatum; quousque enim digito penetrarat, corpus illud secutum est. Impero denique ut cætro, quam posset, profunde adactò, illud rescinderet, quod ægre, cultri aciem remorante cartilaginea cervicis, quam corpus illud habebat, duritie effectum. Sacrum post illud, quem referēbat, accuratius examinavimus, fortis totum sanguinolentum, sed per longitudinem cultro apertus, nil quidquam, imo ne aquæ guttam in ventre ostendit, sed cute glabra, quanquam corrugata & albicante, superficie interna investitus erat; Caro inierim spongiosa, sesquipollicem sua crassitie absolvens; nihil hic vasorum, ligamentorum, ossium, squamarum nihil illud etiam me vehementer mirum habuit, quod tam cito puerpera extingueretur.

Quid heic fuit opus factu? Cadaveris apertura poterat omnem, quæ animis nostris infederat, dubitationem dispulisse. Impia verò Pietas, quæ, hoc quidem in passu, erga mortuos sunt affectu, qui sanguinis eos propinquat ate contingunt, salvare hoc & fructuosum opus in fere parturidia numerat. Ut enim suspicer, fuisse non molam, sed uteri forte procidentiam, id tamen asseverare non audeo. Multas ego molas & legi & vidi, nunquam talem. At, quid uteri se habentis, si forte solam cartilagineam excipias? Poruit autem uteri orificium aliqua sua parte cartilagineum esse, veluti tum in pyloro, tum ani, vesicæque sphincteribus plus vico simpliciter observantur anatomici. Obstetrix autem, qualis hæc fuit, sibi relicta parum prudens, ubi deinde paucillum illud sanæ mentis vini effluvia tumularunt, secundinas forte æctius hærentes, vel internæ uteri superficiei alieni adnatas, vi evelleret, uterum potuit simul loco movere, qui per nixus secundas extra pudendi rimam omnino propelli potuit. Jam vero est cuilibet notum, quam possint ægre puerperæ statim post partum externum frigus perferre, ita, ut multoties ingenti horrore seu paroxysmo febrili concutiantur, immo, in temporis insecuturas, de vita periclitentur, quale exemplum haut ita pridem in civitate nostra habuimus, quid futurum, Lector, arbitraris, utero insuper ipso, & quidem inverso, refrigerato? nonne quandoque herniosi, scubi refrigeretur hernia, morte luunt aëris inclementiam? atqui sunt herniæ insuper beneficio cutis externæ, cui involvuntur, aliquantillum à frigore munitæ, secus atque ipsissimus propendens uterus. Scilicet, sunt hæc partes membranosæ, frigoris proinde impatientissimæ, quo tactæ facillime convelluntur, insequente morte. Quod autem supra monui, non licuit audacter pronuciare fuisse uterum, nos enim ulteriorem aut per sectionem, aut per digitos explorationem ferebant adstantes, & naturam variæ quoque ludere in mollis generandis novimus. Exempla varia *Ephemerides nostræ* suppeditant, *comprimis Dec. 1. Ann. 1. observ. 136. Ann. 2. observ. 79. 84. 160. Ann. 3. observ. 129. At. Med. Hæst. vol. 1. observ. 26. Plater. observ. 1. p. 868. 872. Schenck. Salmuth. Bartholinus, Hildanus & alii plures*. Suppeditat hic casus iis quasi porismata, quorum primum est: Intereffe Reipublicæ, ut obstetrices conducantur pizæ, sobriæ, prudentes & peritæ: Alterum: Intereffe eidem, impiam illam Pietatem consanguineorum antiquari, & in casibus præcipue singularibus cadaverum aperturam concedi; quin, pro circumstantiarum ratione imperari.

Vulgus non solet distinguere inter Anatomem & solam cadaverum aperturam, hinc, quia inauduit fore in Academiis supplicio affectorum cadavera anatomiz tradi, defunctotum aut affinitatis estimationi destrictum iri veretur, si aperiri permittentur; sed facile possent hoc timore exui, ni vanis & præconcepitis persuasionibus peritacius inhererent. Quanquam enim nec ipsa anatomie supplicio affectorum in contumeliam defuncti aut propinquo rum vendat, & boni publici causa fiat, ob quam injuria fieri non censetur, ut recte allegat ex ff. Carpovius in praxi, criminali, part. 3. quest. 137. n. 72. l. (ubi disquiri, num supplicio affectorum cadavera sint anatomico cultro subsicienda, & allatis rationibus affirmat) toto tamen cælo differat cadaverum aperturam ab eorum anatomie, siquidem in hæc omnes corporis partes ad pernoscendum hominis naturalem statum examinantur & explicancur, in illa tantum in causam morbi, huncque insequens interitus, adeoque statum hujus præternaturalem, inquiritur, ut aliis cum eodem aut analogo morbo constitutantibus opera Medici tanto sit presentior, Tantum itaque abest, ut

ab ejusmodi apertura cuiquam impietatis nota asseratur, ut potius impingat vehementer in Christianam charitatem, quisquis heic Medici secularitatem, sufflaminare sustinet. Quanquam debemus laboriosissimo Boneto, qui in aperturis cadaverum operam collocavit nullo auro compensandam, cujus est testis illustre Sepulchretum à laudato auctore evulgatum. Siquid heic impli lateret, cur Magnatum cadavera aperiantur? non eo fine, ut vel inde tantilla ægris utilitas accrescat, nisi forte per accidens, sed tantum in condituræ seu balsamationis gratiam? Quid multa? Si modò homines resflecterent, Medicum non animi gratia, sed ut ægris profici sectiones his desiderare, non adeo sese opponerent: quid enim in hæc apertura, ex terro fœtore, vel miserie etiam contracto delictarium? quid non potius molestiæ? Hanc autem, uti non in omnibus morbis sine discrimine requiro (quid enim interest aperire quem ex fœbre maligna interitus condant) sed tantum in casibus valde dubiis, rationem & experientiam Medicam illudentibus, aut ubi quid commissi erroris ab adstantibus suspicamus, velut in hoc nostro casu facti,

hic dico; quantumcumque etiam propinqui relati-  
 onem, amicitia superiorum esse cogendos, ut vel  
 ingratulis Medicos cum Chirurgis ad sectionem ad-  
 mittant. Plura in hanc aperturam notabilia habent  
*Ephemer. no. 16. Ann. 1670. 15. D. Rofini Lenuii, in  
 Ephemer. Germanic.*

## OBSERVATIO V.

*Vteri & vesicae urinariae Procidencia.*

Quod verum est, meum est, dixit olim Seneca in Epistolis. Vtinam idem adhuc sentirent  
 quas sapienter scriptores omnes, veritatemque pluris facerent, ceterum quid ac im-  
 murabile, quam fallacia praejudicia, aut fucatae novitatis illecebras, & intempestivum contra-  
 dicendi studium; Quicquid vero delinquant alii, titubante mente, nobis hercle quidquam  
 affectare praeter amabilem vernam religionem est. Neque enim curiositate nostra & quotidianis  
 exercitationibus alio collimamus, quam ad cognoscendam veritatem colendumque Deum,  
 deinde etiam ad curandam mortalium valetudinem. Hic errores tamen non tantum vitare ipsi  
 adhibita summa diligentia, sed etiam ut evitent cetera efficere pro virili parte tenemur. Intet  
 muliebres morbos omni reo cognita & perspecta fuit uteri procidencia, grave; sane mole-  
 stumque malum; quippe generationi plurimum officiens, ac interdum etiam funestum: docuit  
 quae universa antiquitas uterum mulieribus aliquando profundi. Hodie autem post Theodorum  
*Kerceringium*, praeclaris monumentis apud eruditos celeberrimum, in Belgio famigeratum chirurgi  
 duo *Ronhusius* & *Meckranus* editis observationibus negant matricem procidere posse, quod  
 prisci uno omnes ore affirmaverant, arguuntque erroris ac imperitiae praeclara & vel assen-  
 sapio majora nomina. In hoc ansipiti statu, cum alterutrius partium causa eadendum sit, ju-  
 dicem appellare nullum convenit nisi experientiam. Equidem in rebus ad rationem solam  
 pertinentibus humanae auctoritati tantum fidei nunquam adhibemus, quantum conscientiae  
 dictamini: semper enim pro falso ambiguoque iuste reputamus quicquid elaro & dis-  
 tincto mentis nostrae conceptui repugnat, etiam gravissimi auctores secenti id verum ac  
 indubitatum esse pronuntiarunt. Nimirum sapientum ratio sui juris est, & ad quam homi-  
 nes aspirare debent, ceterae veritati, hoc est, Deo, prius auscultat quam hominibus. Ac  
 aliter plane sentiendum est de rebus contingentibus in iudicio cui praesidet experientia. Hic  
 votorum pluralitas, & testium idem affirmantium multitudo, plurimum momenti ac vim  
 veritatis habet, nisi manifeste demonstrati queat testimonium esse fraudulentum. Quamobrem  
 cum in his casibus magni aestimanda sit bona fides, & scriptorum idem sentientium frequen-  
 tia atque auctoritas, acerbè ferimus Chirurgorum istorum petulantiam, in tot praecellentes  
 Medicos temere ac perversè insultantium, quorum ipsi neque famam nec eruditionem asse-  
 quantur, imò continere nos diutius non possumus, quin contra ipsos pro veritate & antiqui-  
 tatis honore testimonium publice dicamus. Accidit anno Christi 1682, mense Martio, ut in  
 xenodochio Schaphusiano vidua decumberet, ex diuturna & gravi uteri procidencia labo-  
 rans. Primum quidem ante plures annos, cum uxor adhuc marito frueretur, leve malum  
 fuisse, nihilque aliud quam vaginae lavamentum; postea vero conceptione & partu iteratis  
 paularim ira degeneravit, ut vagina omnis inversa prominere ac inter femora nutaret.  
 Procidenciam zgra sibi identidem ipsa reposuit, & pila circa uterum firmavit, donec no-  
 vissime difficulter parturienti uterus edicto fori in vaginam pendulam prolaberetur. Pen-  
 silis massa earum spithamam aequavit longitudine, crassiciem utraque manus facile complecti  
 non potuit, tantumque doloris & molestiae zgrotae creavit procidencia, potissimum obam-  
 bulaturae ac rem familiarem curaturae, ut subinde mortem praepararet. Inferne per periculum  
 uteri orificium menstrus statis temporum intervallis promanarunt. Matricem autem extra  
 pudenda delapsam manibus nostris aliquoties palpavimus, quae tamen inversa haut erat, ut  
 oculis conspici posset, sed latens intra vaginam pendulam tractari potuit & comprehendi  
 manibus. Illa sursum aliquando compulsa nativam sedem cum saltu repetiit; alii vaginam in  
 pristinum restituere locum non licuit. Tandem cum nihil remedii superesset, & alia atque alia  
 mala imminerent, hanc amputare visum est. Eventu autem spem non implente zgra mortem  
 oecubuit. Docuit post anatome uterum revera procidisse, vaginamque totam fuisse eversam.  
 Adhuc, quod magis mirum & plane novum videtur, cum utero vesicam urinariam similiter  
 mutata sede proebuguisse annotavimus, cum pluribus aliquando forsitan denarrabilem inclytus *Ves-  
 perus*, qui horum omnium nos voluit esse testes oculatos. Nec tamen rupta fuerunt uteri &  
 vesicae vincula, sed tantum laxata. Resipiscant ergo *Kerceringius*, *Ronhusius* & *Meckranus*, siqui-  
 dem adhuc in vivis sunt, sententiamque suam erroneam & perniciosam moniti retractent.  
 Ceteri denum quotquot hae lecturi sunt, & quorum ista novisse interest, vel nostro exemplo  
 discant scrupulose ponderata omnia, ac ubique magnam adhibere diligentiam cautionem-  
 que, ne cum delinquant ipsi tum sedueant insuriose alios, aut sedueantur. *D. Ioh. Conradus Peyer.*



## APPENDIX.

*Mulieres Hydropica Vteri procidentia saepe obnoxia.*

**A**lterum quod memorandum supra restabat, est, quod mulieres hydropicæ pleræque simul conquerantur de procidentia uteri. Inprimis dux vetulæ summam inde patiebantur molestiam, ad mortem usque. Eo ipso dubiū se offert ex recentiorum observatis, v.g. Barbetri in Praxi, &c. qui scribunt vulgò dictas uteri procidentias videri, non esse veras ut plurimum, sed aut stupulentum vel aliud quid fœreomari simile. Pro affirmativa verò, ut pauca hæc subjungam, verè nempe uterum procidere posse uti certissimum aliàs est, ita notavi, post partum ipsum quandoque uteri se explicuisse globum & propendisse, quod nuperime in præfecti ejusdam uxore accidit, cui fomentis calidis iterum reponebatur. Deinde in hydropicæ altera memorata vidi propendens uteri corpus, quantum ob vastissimam tumētis corporis molem licebat. Mirro observationes aliorum. Cum ergo à sero illo copioso intra abdomen præter naturam collecto necessario laxantur ligamenta uteri, videtur probabile esse, & laxari ab humore, & protudi à copia & pondere eundem posse, sicque veram tunc dari posse in hydropicis procidentiam. Illud vero mirum est, quod in vicino pago æditui conjux, quotiescunquē concepit (contra morem aliàs affectus) procidentiam aliqualem uteri primis ingravidationis septimanis experitur, hinc sensim is iterum contahitur, & extra illum statum nil tale patitur. *D. Thomas Bartholini.*

### OBSERVATIO VI.

*De Procidencia uteri falsâ.*

**M**agno Socrati, Philosopho summo, imò & Antonio Iuliano, Oratori Romano, ordinatum fuit, quoties de amoribus sermo habendus, facie rectè publico se exponere, eo quod quæ proponerent omnis repræbensionis expertia neutiquam esse, satis constaret.

Quam ergo poenam non incurrit ille, qui naturæ artem, amoris omnis pudorisque fontem, peratrare tentat, eum imptimis in finem, ut sententiæ Antiquorum quæ utrum mulierem non tantum extra corpus prolabi, sed & in torum auferri posse docet, falsitas declaratur, præstare multis forsitan videbitur ab incepto desistere, quam Clarissimorum Virorum turbe adeo insigni præcidentis extirpationive utrinque possibilitatem probanti, siue oppo-

At verò non est quod me deterreat hæc similiaque, quin contra animosus, anatomico experientiz cultus armatus, quæ in destructionem figmenti dicti adferri poterunt, proponere agat: tediatur.

*Amicus Socrates, amicus Plato,*

*Sed mensis amica veritas.*

¶ Ere studioforum erit, Authorum variorum, qui vel per negligentiam vel per occupationes  
varias, uterum non solum extra corpus procidere, sed & à Chirurgo auferri sine damno pos-  
se, docuerunt, sententias diversas, antequam quæ nobis obvenire exhibeamus, proponere.

*Actius a Midena lib.16.de re medicâ cap.78.Uterum ad magnitudinem ovi struthiocameli extra corpus proeideat posse,tradit.*

Majoris extensionis aliis habetur, quorum etiam variis causam proeidentiz, addere placeat, vociferationem nempe, fœcum alvinarum excretionem molestant, cāsum, percussionem ad femora, coitum indecentem, partum graviorem; videri possunt quæ hæc de re habet *Felix Platerus de part. procid. cap. 2.*

*Aristoteles lib. 7. cap. 2.* Uterinæ procidentix causam venereum appetitum excedentem dicit, eamque curari minime posse nisi gravidatione.

Hier Fabr. ab Aquapend. operat. Chirurg. part. 1. cap. 86. quid agendum sit docere studet, quoties ob ligamentorum, vel laxitatem, vel separationem uterus extra corpus prolapsus.

*Felix Platerus cap. 2. de part. precid.* Mulierem cui uterus prolapsus concipere, imo etiam foetum ipsum circumgestare posse, scribit.

*Papifcus Fortun. Plémpius Anatom. Cabrolii c. 34.* Uterum ad capitis magnitudinem procidere  
poffe fcribit, eumque incuria quadam putrefactum extirpari fine incommodo, fic ut etiam co-  
ablaro concipere queat mulier.

Paulus Aegineta de arte med. lib. 3. cap. 72. Vivam pronunciat mulierem, cui uterus abscef-

*Du Laurent. lib. 7. de part. gener. cap. 11. Agneta sententiam amplectitur, omnia bona promittens mulieri cui uterus ablatus.*

*Nec utero solo, sed & renibus sine damno carere posse hominem Theoph. Paracelsus Paramir. lib. 4. de orig. morb. matric. scribit.*

*Iacobus Berengarius in Mag. anat. Langius Epist. 39. Tom. 2. Mercurial. lib. 4. gener. 21. & Ludov. Duretus in Haller. cap. 57. de morb. partit. Uterum muliebrem extirpasse se memorat sine ullo periculo, sine ullo vitæ periculo.*

Regius Medicus Fernelius vidisse se refert parturientem quandam, cui uterus cum foetu incluso sine ullo vitæ dispendio ablatus, ipse licet *anat. cap. 7.* uterum siuiter satis nexum referat non solum vesicæ urinariæ & intestino recto fibrillarum subtilium ope, sed & ossibus illius beneficio ligamentorum validorum.

*Plinius & Sordani* uterum muliebrem auferri sine periculo posse exemplo porcorum probare nituntur, quibus, ut delicatorem escam præbeant, uterus auferri solet.

*Paræus Consiliarius regius lib. 23. cap. 41.* mentionem facit mulieris 30. annorum cui ablatus uterus.

*Paræo assensum præbet Franciscus Rousset de partu Casaræ, sect. 4. cap. 5. & 6.* Uterque in sententia suæ probationem adferunt quod in dissectis cadaveribus pelvim quo loco uterus detinetur induratum observaverint.

Fabulis magis annumerari merentur quæ de uteri extirpatione agentes *Avensoar. lib. 2. cap. 2. Anton. Beniven. de abdit. morbor. caus. cap. 11. Wierius, Zant. Lufianus, Fel. Platerus, & plures alij,* adferre voluerant, mulieres nempe quibus uterus corruptus abscissus, non solum superstites permansisse, sed & liberos procreasse.

*Hildanus* è contra ex ore Medici *Henrici Stapedii,* in responsione ad casum de uteri Ruptura à *Dom. Michaele Dorningio* Medico propositum, exemplum adducit mulieris ab extirpatione uteri inordinatè subito exstinctæ.

*Thomas Bartholinus cent. 2. hist. 91.* historiam proponit à *Clar. Matthio* Medico communicatam, qua in nobili quadam, ab obitetrice secundinas auferre laborante, uterus, & cum eo vitam ipsam ablatam narrat. *Nobilissima,* inquit *Matrona Chilonis Holstætarum* 5. ante filiorum mater, foetum vivum, quem 40. hebdomadibus commode satis gestaverat, semihoræ labore, sine ulla molestia feliciter 1642. exclusit remanentibus tamen more hujus puerperæ secundinis, quas cum obitetrix, ut solita fuerat, solvere & extrahere conatur, unâ cum secundinis uterum, quamquam inscia, extraxit. Inter operandum puerperæ sciscitanti quomodo negotium succederet, respondit: secundinam se quidem habere, sed subsequi carnis partem tibi incognitam. Adstantes feminæ, molam esse credentes, sibi quæ sepe id evenisset, obitetricem ad extrahendam carnem extimularunt, quæ omnia, etiam validiore manu, irritò conatu, & renitente carne, jussu exequitur. Advocatus *Dom. Matthius* sine voce, nutu, & pulsu puerperam invenit, mortuamque vere pronunciat; occupatâ deinde obitetricis sede, immissaque sub lecti stragulis manu, ipsum uterum integrum, marsupii instar propendentem, & ab utroque latere perforatam obitetricis digito, deprehendit, adstantibusque monstravit, vere tunc mortuam ferro credentibus.

*Idem cent. 1. hist. 97.* carnosæ excrescentiæ, in utero ex casu abortu, libras quatuor eum media pendentes, mulieri lethalis, meminit.

Locum naturæ utero & amplum, & rursum concessit, inter vesicam urinariam, & intestinum rectum, quæ hic duplicis pulvinaris vices subeunt. Mediis hic est quo in æquilibrio servetur corpus.

Componitur quoad structuram ex tunicis, venis, arterijs, nervis, & ligamentis.

Tunicæ hic duæ, interna una, altera externa.

Hæc originem sumit à peritonæo, illa carnosa est magis quam ulla membranarum infimi ventris. Fibrarum triplici constat ordine, quarum ope attractio, retentio, & expulsio perficiuntur, crassities harum tunicarum inerefeit deerefeitque pro diversitate ætatis, temporis, menstruationis & gravidationis.

Venæ duplicis conditionis sunt, utroque latere una, superiores quædam, quædam inferiores. Superiores à spermaticis procedunt antequam Testes accedunt, uterinumque fundum & collum pererrant. Eadem ratio arteriarum. Inferiores venæ, similiter ac arteriæ ab Hypogastricis deveniunt.

Nervi non solum à sexto pari nervorum cerebri deveniunt, sed ex spinali medulla quæ osse sacro detinetur.

Ligamentorum, quorum ope & vicinis partibus neitur uterus, & in suo situ conservatur, duo sunt paria, horum duo superiora sunt, duo inferiora.

Superiora continuations atque appendices sunt peritonæi, cornibus seu *Tubi Fallopiani* connexa. Inferiora teretia sunt, validaque nervosa, intrus excavata, hæc ex latere fundi uterini descendunt, ubi circa inguina tendines musculorum obliquo-

rum abdominis attingunt, eos perforant, mox varias in partes divisa; una earum, quæ brevissima, circa Clitoridem os pubis accedit, altera longissima, membranam adiposam, cum qua non solum femoris magnam partem adhaeret, & si fides habenda *Riolano, fecit. v. an. cap. 32.* ad extremam pedis excurrit.

Ligamenti huius impurare debent varia, eadem magno numero mulieribus obvenerunt. Tumores nempe inguinales, stupor pedum, dolor femorum, plantarumque pedum, articulo- rum circa pedem extremum, collique vesicæ urinarie corpus, imò resolutio universalis par- tium corporis totius superiorum æquæ ac inferiorum.

Proposita quibus haud sufficiunt adeant scripta anatomica quæ exhibuerunt *Johannes Ro- lanus, Johannes Veslingius, & Thomas Bartholinus*, quam ardē vata spermatica, ligamenta mem- branæque utero uniantur, imò uterus ipse peritonæo, vesicis feminariis, testiculis recto, tuni- cæ ossis in nominati interiorē superficiem investienti, præter varias partes alias, sensiles, in- sensilesque, quantum satis erit declarabunt. Ut adeo cum *Riolano* partem uterum necessariam pronunciare teneamus, similiter ac Testiculos, paramen minime divisibilem.

Partium enarratarum structuram, connexionemque legitime perpendens, quis non videat, quem facillimum sit gravidas, imò sæpius etiam non gravidas, vitio quodam superveniente, graviæque plurima molestare symptomata, hinc dolores intolerabiles, febres gravissimæ, aliaque, imò mors sæpius ipsa, quæ, uti abortivorum exclusio indebita mulierem affligere solent.

Uterius quod si procedamus, quæ non malorum caterva sese offert quoties in mulieri- bus etiam non gravidis menstruum excretio supprimitur? fluor albus hic occurrit, pal- pitatio cordis, febres erraticæ, deliria gravia, nausea continua, pica, chlorosis, & centum alia, quorum causa uterus, ut adeo haud inconvenienter uterus *Hippocrati lib. de locis in homi- ne 99.* omnium malorum, quæ euniquæ mulieribus obvenire solent, causa dicatur.

Rebus sic se habentibus tanto inter utrum partemque alias existente consensu, tanta con- nexione, quis Chirurgorum extirpationi ejus admo-veret manum, quis, qui symptomatum ipsius dispositioni pravæ supervenientium ullam rationem haberet?

At non sine ratione hic aliquis naturam ejus, quod veteres, imò & recentiorum plurimi, uterum prolapsum appellarunt, quod restituisse, imò sæpius abstrahere sine ullo damno refe- runt, inquiret. Vix enim scriptorum ullus occurrit qui non de affectibus mulierum agens Procidentia uterini mentionem faciat, causas ejus exponat, imò & curationem proponat.

Sunt etiam qui procidentia hujus differentias exhibentes; ad genera ipsa corpus hoc, quod uterus habetur, prolabi posse tradunt.

Quod si scriptores hi illud laboris sumerent, ut ligamentorum uteri aliformium structuram examina- rent, firmum id adeo, firmiterque vicinis connexum reperiret, ut impossibile sit sepa- rationem hic ullam dari, nisi quæ cultri acie peragitur, sic ut nullo pondere extrorsum mo- veri queat.

Casus nonnullos rationes, qui vel nobis ipsis occurrerunt, vel Medicis Chirurgisve aliis, primo hic proponere necessarium utileve ducimus, antequam ad rem ipsam deveniamus, quidquid de uterina procidentia, de qua tam multa scripserunt varii, statuendum sit, decla- ramus.

Primo loco consideratione nostrâ omniumque qui in hac re informari desiderant, dignum est quod in gratiam artis Chirurgicæ cultorum his verbis *Cent. 2. hist. 58.* proponit *Thomas Bartholinus*. Vidi, inquit *Vir Celeberrimus in Nosocomio Patavino* 1641. Dissectam mulierem, quæ prolapsam uteri à partu difficili antè 10. annos pass. credebatur. Narravit se in præto- cubantem observasse descendere uterum, græmenque venari. Ex illo tempore indies crevit ob affluxum sanguinis, ut distensus nigerque in patredinem degeneraverit. Judicabar Chi- rurgicæ operationes nobis demonstrant P. Marchettus, non esse uteri procidentiam, sed excrescentiam aliquam in vaginâ uteri, adeoque abscondendam. Alter *Nosodochii* Chirur- gus familiaris pro uteri stetit procidentia, cum excrescentia subitum ortum, incrementumque habere non possit. Mulier inrerim secari volens, inter ambigua consilia ad mortem properavit. In aperto cadavere, satis trunco obæso, sed artubus emaciatis, uterum suo loco sanum beneque constitutum vidimus, excrescentiam verò ex uteri vaginâ dilaceratâ pendu- lam, cum labiis pudendi, ex huc veneret forsan inflammatis.

Accedit casus priori ferè similis, quem & nobis & publico communicare placuit Medico hujus loci experientissimo *Dr. Francisco van der Schagen*, quæ quæ omni tempore sibi per- suaferat, nunquam scilicet uterum verum profunde adeo extra corpus prolabi posse, uti qui- dem veterum recentiorumque crediderunt plurimi, nec ullo tempore extirpatum cum fuisse sicut in vivis non solum permanferit mulier, verum etiam prolifera; quin potius ablatum fuisse aliquod parvis genitalibus, extra uterum, adhærens, vera esse observasse se testaba- tur. Verba quibus casum hunc proponere placuit hæc erant.

Ante annos aliquot cadaver aperiui mulieris alicujus consistentis ætatis, hydropē int̄ ventris extinctā, quod jam à longo tempore uteri procidentia laborasset, omittēte haud potul quin in veram ejus constitutionem inquirerem, dissecto proinde abdomine, intestinis ad latera inclinatīs, uterum non solum quoad externa legitime se habentem reperi, sed & loco debito collocatū; at quod pudendi labiī cōtinēbatur pro utero prolapso semper habitum, nil nisi vaginæ seu colli uterini partem ex extēnsam notavi, quale quidā dum laxantur vasa, facile contigere possit quāvis concedat, nūp̄is hinc de p̄s. noo. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Plerumque jam extirpatum uterum oculis Lectoris cunctis exponere, quō signentis circa ejus proidentiam, abscessionemque à variis propugnīs, fidem alterius dare desinat.

Annos 60, die 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diebus aliquot elapsis, quid de enervatā, periclitāque, quæ dubios nos valde fecerat, controversiisque variis aniam dederat, statuendum, constitui; sanā enim observabamus mulierem, mēstruā ex debito fluere, imō graviditatis signa quædam occurrere; plura hinc facientia seiro qui desiderat observationem secundam Parisiæ primæ Dr. Robenhaysen consulere poterit.

Historiæ enervatis nostram jungere ordinis ratio exigit, exhibebit ea non solum in vivo muliere procidentiam imaginariam, Chirurgicā manu ablatam, sed & in cadavere dissecto, quid ejus nomine venisset iis, qui ante mortem inspexerant, corpūs extra pudenda propendens hinc de p̄s. noo. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Re inspecta, arduum multis videbatur, & non nisi cum viræ interitu perfici posse, uterum ita prolapsū extirpare haud enim induci poterant, uteri hoc minime corpus esse credere, ejus cum corde, hepate, cerebro maximus consensus, quo etiam mulierem destitui posse impossibile.

Urgebant alii extirpationem, ex eo quod & veterum & recentiorum scripta, actaque eam possibilem habent, sapiusque sine ullo sanitatis dispendio peractam testarentur.

Probabilius nobis videbatur, cui etiam sententiæ non unus accedebat, corpus dictum, insigniter adeo tumidum, feridum, pondereque summo molestum, extra pudenda muliebria ad pedum genua dependens, ipsius uteri corpus haud esse, sed solam ejus tunicam internam, dum in statu sano reliquis unitur, variis modis rugosam, extra pudenda, plisic variis solutis, ipsaque à subjecta tunica mediā separatā, prolapsam. Tunice hujus procidentie occasionem primam dedisse suspicabamur humorum impriorum, acrimivē fluxum diuturnum, undē vasorum sanguineorum tunicam eam accedentium corrosio, eamque insequens sanguinis extravasatio; atque loco præternaturali collectio, imō ob humorum copiam expressione, laxitate vaginalis hujus tunice ad exteriora protusio.

Mulier pondus dictum circumgestare coacta, factorem summum diutius perferre nequens, extirpationem urgebat quam maximē. Arduum sane omnibus habebatur eam instituire, nec tamen occasionem oblatam, quæ fronte capillata, posthæc calva, negligere sicut, sic enim constare posse credebamus, quid veritatis falsitatisve insit decantatæ antiquorum, recentiorumque variorum sententiæ, quæ uterum muliebrem extra corpus procidere, imō sine ullo viræ graviditatisque insecuturæ dispendio aufertur posse docetur.

Consultatione debitā institutā, opus magnum, non sine mortis prognosi, aggredi constitutum. Operationis hæc fuit methodus. Primò ligaturā arcu fasciæ firmioris ope sustentā colū corporis dicti coarctabatur, mox intra ligaturam & corpus prolapsū, cultri scutioris operā, instituebatur abscessio. Fasciæ ad colli constrictionem adhibita portio notabilis relin-

quebantur, ad id, ut, siquidem è vivis discederet ægrotans, & nobis cadaverem dissectandi occasio concederetur, ejus ductu in partis amputatæ radicem deduceretur. Extirpatione peractâ sanguinis fluxus nullus observabatur, ad quem tamen stypticum aliquod loco vulnerato applicabatur, licet in totum eum attingere haud concederetur, propterea, quod illico, abscissione peractâ inrorsum ducebat pars ea cui fascia injecta.

Indiem usque quartum omnia bene se habebant, æsticæ sextum, septimumque dies valde imminuebantur, febris contra & animi deliquia augebantur, sic quidem in brevi Deo animam, nobis corpus exhibere cogeretur.

Ad anatomen ejus admissi, ventris imi integumentis dissecatis, uteri examen instituire primarium duximus, hic enim quid de uteri prolapsu, prolapsique extirpatione, statuendum, clarè constare posset credebamus.

Quoad externa nihil in eo observare nobis licuit quod constitutioni morbozæ annumerari queat, nihil hic deficiebat, non solum in utero ipso, sed & vicinis partibus generationi dicatis; Coloris erat albicans, pyri complanati Figuram habens.

Hic sic perspectis, osiumque pubis divisione, eo loco ubi cartilago interposita ea iungit, peractâ, uteri totum corpus, cum partibus annexis, qua fieri potuit dexteritate, à partibus vicinis quibus connectebatur, separavimus separatique convenienter tabulæ imposuimus.

Hic quoties fascia extra pudendum pendula, corporis abscissi radici adhuc alligata movebatur nullo modo movebatur uterus; cogebamur adeoque vaginam uterinam secundum longitudinem corporis dissecare, quo, quinam parti alligata esset fascia dicta, quidque fuisset illud quod extirpatum, constaret. Apertione facta fasciæ ductum secuti deveniebamus ad mali principium, portionem nempe tunicæ internæ rugosæ, vaginam præter alias constituentis; post oblationem portionis reliquæ quæ laxitatis nimis culpa extra pudendum proeiderat, in utero relicte, cui stricte admodum fascia erat juncta. Terminus hic orificio uteri interno vicinus valde.

Quis ergo non videt, veteres hæc omnia necessario latuisse, quod in rei veritatem, qua docebat curiositate; haud inquisiverint; Procidencias uterinas quas observasse se, imò extirpasse referunt, sic tamen ut sana permanferit ægra, satique fecunda; quomodo veras, fuisse probabant; Sane multa ætære nostro fingimus, quorum falsitatem dissectiones cadaverum evidentissimè patefaciunt. Utin variis casibus alijs, ita in hoc proposito verum id observare licuit. Vanam esse procidenciam uteri perfectam, adeoque impossibile omninò mulieri uterum totum auferre, integra manente vira, salvaque conceptione.

Observatio hæc, præter alia à nobis hoc capite propolita planè satis edocere Chirurgum juniorem poterit, quænam agenda quoties, ex affluxu imprimis humorum, vaginæ dicta tunica interior, laxior, iusto reddita, hinc extensa procidenciam nostræ similem, spūtam omninò producere notatur; nihil est quod hic extirpationem impediatur, modò vires ægrotantis eam permiserint, insistere hic licet nro vestigijs Medicorum Chirurgorumque eorum, veterum æque ac modernorum, qui procidenciam uteri auferti posse sine damno volum, modò quæ illi toti utero applicaverint, nos tunicæ ejus rugosæ tribuamus, abstulerunt fateor antiquiores uterum prolapsum, aut non nisi imaginarium, nil enim nisi tunicam dictam extirparunt, quod facillimum, imò nullius periculi opus; quam etiam operationem aggredi teneatur Chirurgus, siquidem inflammationes, gangrenæ, excoriationesque graviores, accesserint, imò ægrotanti difficillimum, partem prolapsam protuberantem in vā vaginam dētere. Pessaria equidē in tali casu usurpant, imò usurpant posse, probè scio, aut cum cera liquefacta denudetur facillè lignum, quod ea incrustantur, non potest fieri quin vasa sanguinea uterina, ob corporis morum agitato ligno, aperiantur, unde sanguinis fluxio continua (quæ menstruatō immo dica vocari consuevit) cum virium destructione, corporisque extrahescencia.

Ad idem itaque Chirurgicæ artis cultor, quænam nteri procidencia in Chirurgia occurrat percepisti; quomodo per extirpationem auferti queat sine periculo, quidque antiquorum dogmata in hoc negotio fidei mereantur, vel saltem qua methodo errores eorum regere liceat, procidencia talis quoties offertur

alacri animo extirpationem aggredere, facilis æque est curationis ac vitia corporis varia alia, sola hic ut percepisti tunica vaginæ rugosa extorsum ptoisula tollitur, minimè uterus ipse. Non ita pridem similis conditionis Uterum prolapsum ægrotanti valde molestum minoris licet extensionis, auferte mihi licuit, bono cum successu. Quod si occasione data prolapsum ejusmodi uterum tollere concedatur, intrepido id perficere animo allabores quæso, sic enim ægrotanti salus antiquitati errorum correctio, recentioribus veritatis indagatio adferetur.

Historia huic æntequum finem imponamus, utile quam maxime videtur, qua methodo extirpatio dicta perfici queat, imò debeat, paucis declarare; Infinitamenta ad operationem hanc necessaria exigno numero comprehendi possunt, sunt ea cullællus falcatus acutus, fascia, medicamentum stypticum, ligamenta circa extrema divisa, ex linteo molli antiquo parata, similis illis quibus lythotomus uti solet.

Ægrotanti mensis incumbendū ligamentum hoc primo omnium applicetur, factis circa ventris anteriora nodo, hinc fascia injiciatur collo corporis prolapsi fiat contractio arctissima loco inter collum contractum & partem reliquam prolapsam intermedio, auferatur. Extirpatione dicto modo peracta, loco vulnerato, ad quem facile manum Chirurgi ducet fascia eidem adhuc neta, pulvis seq. stypticus cum albumine ovorum applicetur, splenisque debitis impositis deligatio conveniens institatur, ad quam ligamenti ptimo loco ventri ægrotantis applicati extremities conveniunt. Medicamentum stypticum, quod delicatula valde sit vagina seq. modo consuevit.

℞. Farin. Consol. maj. ʒij. Cortic. querc. sub-  
pulv. ʒij. Nuc. Gallar. ʒij. Cupress. Balauſt. Sang.  
Dragon. Boll. Armen. ver. Lapid. Hæmarit. an. ʒij. A-  
lum. ust. F. Pulvis.

Die seq. injectio potest fieri ex infraſcripto, his  
quovis die ad tollendum dolorem.

℞. Fol. Malv. Verbaſci. Alchimill. an. M. j. Caudæ  
eguln. Plantag. an. M. 6. Flor. Roſar. Rubr. ʒij. Sem.  
Līm. ʒij. ʒ. Maltich. Oliban. an. ʒij. Coq. in aqua  
pura, F. Colat. ad ʒ. xx. in ea diſſolve Mell. Roſ. ʒ. i ʒ.  
F. Injectio.

Die uno alterove his medicamentis coſumpto,  
ad majorem manifiſtationem ſeq. Injectio uſurpari  
poſt.

℞. Rad. Conſol. major. ʒij. Fol. Ruth. Scordil.  
Hyſop. Antemil. Flor. Roſar. Rubr. an. M. ʒ. Summ.  
Abſinth. ʒij. Coq. ſ. a. in vino Gallico, Colat. adde  
Liquor. Egypt. ʒʒ. Mell. Roſæ. ʒ. i ʒ. Ung. de Apio  
ʒ. i ʒ. M. F. Injectio.

Ad aliquot dies Injectio hæc uſurpari poſt quod  
ſi pus, albicans coloris, minori copia, quam antea  
ſe exhibuerit, ſeq. Injectio ad exſiccationem majorem  
conſolidationemque priori miſceri poſt.

℞. Tut. Pterap. Lap. Calamin. pterp. an. ʒʒ. Sieſ.  
Alb. Rhaf. ʒj. Balſ. Sulph. ʒj. M.

Et brevi tempore ſine omni dubio curatio abſo-  
luta. *ſubſ. à Alackeren in Obſervationibus Anatomice  
Medicæ.*

## OBSERVATIO VII.

*De vera uteri procidentia.*

Quamquam plurimi ſcriptores, ac inter eos recentiores multi (quales ſunt *Theodor. Ker-  
kringius, Roobuſius & Mekeanus*, alique) negent totam vulvam procidere, ipſe tamen  
cum ſæpius memoratis fratre meo, ac Clariff. *Solingio* Medicis, poſt debitam inſiſtentionem  
comperi, *Martina* cuidam *Mottyn* non vaginam tantum, ſed & ipſum præcidiffe uterum, qui  
durus admodum, ac duorum pugnorum inſtar conjunctorum reperiebatur. Internum etiam  
matricis os quàm facillimè ſenſire poteramus, quod extrinſecus tanquam os Cyprini (Car-  
pam vulgò dicimus) nobis apparebat. *Addit idem, in ejuſdem Obſervationis ſcholio.* Retulit  
mihi nuper Nobiliſſ. Dom. *Egidius Eutich. Saxonia Ducis Archiater*, ſe ann. 1683. die Octobris  
16. hic Hagæ ad Marronam 1. D. V. 19. annos habentem occiſimè fuiſſe vocatum, quæ ex  
Carpenti, ſeu Eſedi ſactu præcipiti abortum difficilem, & violentem non ſine uteri prolapſu  
paſſa erat. Quem ipſe, Obſetrixque, nec non Marronæ Marer, alique conſpexerint :  
ſuaſi itaque ut appropriatis adſtringentibus in vino coctis ſoveretur, oleoſiſque intruderetur  
uterus, atque ipſa elarò tranquillè cubaret podice, brodiaque analeptica per epicraſim  
fumeret. Atque ita quidem intra unius menſis intervallum priſtinæ reſtituta eſt ſanitati, quo-  
tannis ſine ullo parturiens incommodo. Quòd ſi illa quidem ætate fuiſſet provecta, res hæc  
non tam felicem, opinor, habuiſſet exitum. *Cornelius Stalpartius van der wil in Obſervationi-  
bus Chirurgicis rarioribus.*

Ipſe cum Chirurgo Medicoque *Cornelio Solingio* hic Hagæ ann. 1673. 14. Aprilis ad M. J.  
Uxorem vocatus fui, quæ pridie robuſtum ediderat partum, cujuſque è corpore ignorantia  
obſetricis ſecundarum loco uterus eductus erat, quem inſtar inverſæ manicæ, interioribus  
partibus exterioribus redditus, inter femora propendentem invenimus, infantis minoris ca-  
put æquantem magnitudine : Diſtam quoque puerperam poſt dimidiam à partu horam de-  
ceſſiſſe intelleximus : Altera autem paulò poſt accedens obſetrix ſecundas cum funiculo  
umbilicali ab inverſo utero, cui etiamnum aſſigebantur, ſeparavit. Nos autem inverſum hoc  
corpus bene perſpectum, factò in fundo foramine, in ſuum reduximus locum, atque tum illi-  
co per dictum foramen ipſa ſenſimus inteſtina. *Idem ibid.*

## OBSERVATIO VIII.

*Uteri procidentia falſa.*

Cum ann. 1667, ad nauæ ejusdam uxorem Hagam inter ac Delphos habitantem fuiſ-  
ſem vocatus, ipſi à partu etiamnum recenti magnum in ipſius uteri vagina tumorem  
eſſe comperì, non ſine ejusdem exitu, extra enim corpus propendebat ovo Struthio cameli  
ſimilis, ac purpuſcentis lividique erat coloris. Chirurgum itaque arceſſi, prædixique haud  
dubiè mox gangrænam inſecuturam, atque illico Chirurgus *Nicol. winiercamp Riſvico* veniens  
adſuit, qui, me præſente, dictum tumorem varijs in locis incidit, ac ſentiente quidem muliere.  
Nos verò tumorem illum (atque ira quidem fueram ſuſpicatus) coagulato ſanguine repe-  
rimus reſertum. Quare ralla ipſi cataplaſmata, ſomentaque præparavimus, qualia hujusmodi  
requirit malum. Arque ira quidem illa, poſt factam ſeparationem, earniſque accretionem in-  
tra menſis ſpatium convaluit, plureſque dein liberos peperit. *Idem ibidem.*

Idem nobis viſum ann. 1686. Neocomi Helvetio-  
rum in Lanſi uxore, ſcil. illa poſt partus laborioſi  
dolores tumorem, inſantis ad minimum æquantem  
è labietum vulvæ interioribus partibus propenden-

tem geſtabat, quem, uſi opera experientiſſimi Chi-  
rurgi *D. Jem. Augusti Parry*, ſcarificationibus factis,  
cataplaſmatibus ſorbiculisque applicitis, & tandem  
ſanguine è tumore necio in maſſam concreto, ſeti-

diffimulque per corruptionem reddito, ferro edo- nenti, ut omnes credebantur, peticulo sub-  
do, facile curare licuit, atque agram, immi- here.

## APPENDIX.

*De utero morbo consumpto.*

**F**œmina annorum circiter 33. patiebatur levem dysuriam, ejus vexationes annum cir-  
citer tacite tulit. Dein malo ingravescente, etularum horribilo illa terrebar presentes, ac  
proximarum domuum vicinos; dum etiam foetibus à partibus afflictis exhalantis inhumani-  
tas arceret, præter necessarios, omnes. Simul quæstæ est defemoris, nec non tibi ejusdem  
lateris dolore atroci, alio, & ossium medullam lacerante, liquante, & qui remedium in-  
finitorum vim sefellit adeo, ut solo opio in tripla dosi tertia quavis nocte sumto mitesceret  
ad tempus. Post tyrannicas circiter anni unius toruras rogatus fui in opccias ferendas rei  
conclamaræ; judicavi post aliquod laborantis examen, populante & pollente ulcere uto-  
rum exedi: & in spurcam sanienti fluere, obstetricem adhibui, & instruxi, quæ manu explora-  
ret num ulcus jam corpus uteri perforasset, post patientem indagationem retulit ea omnino  
perviam esse ulcere uteri cavitatem in vicina & externa spacia: difficile utique mihi non fuit  
absolutè desperatam prognosim instituere, cum has partium spermaricarum ruinas refareito  
impossibile evideretur sit, tamen in solatium, non salutem miseræ intentus præscripti injectio-  
nes in uterum detergentes quarum beneficio & fetor & dolor urinz plurimum remisere,  
dum simul ureterur jusculis diureticis & prisana ejusdem functionis, jusculis incoquebantur  
radices petroselinæ, feniculi, apii, asparagi, ononidis, folia cerefolii, fragariz, nasturtii aqua-  
tici, acetosæ, mutatis sæpius alternatim istis pro gustus caprizantis commoditate; prisana  
hujus erat confectionis.

℞. Sem. hyper. contus. ℥ij. alkekeng. contus. ℥ij. ciner. plant. genist. stipit. fabar. an. ℥ij.  
fiat decoct. in aq. com. lb. iv. ad consumptionem part. 3. coletur, clarificetur & aromatizetur  
cinnam. pro sitis usu. Ut importunis sollicitationibus non insensilis audirem addidi emul-  
sionem quoque diureticam.

℞. Amygdal. dulc. excortic. 3vi. sem. mil. sol. 3i. sem. 4. frigid. maj. 3ß. contund. affun-  
dendo sensim aq. parietar. 3iv. in expresso solve syrup. fragor. 3vi. f. E nullo sæpius ad libi-  
tum expetentis iteranda. Ut femoris & tibiæ dolori castigando prospiceretur, consului bal-  
neum aquæ dulcis cum qua coqueretur hordeum mundatum, herbæ hyosciami, solani, mal-  
væ, altheæ, sempervivum minus, flores verbasci, melilori, chamomillæ, insuper vaporem ad-  
hibui cum radicibus altheæ, mandragoræ, & seminib. papaver. albi, hyosciam. cum sol. sem-  
pervivi utriusque lacte omnibus coctis: præterea alio vapore pro solatio nauseantis, scil. re-  
medis omnia mox memorata cum aceti urentis lb. ij. sacch. saturni 3ß. opij. Thebaici 3j. cam-  
phor. 3ij. in exhalationem calore rarefaciente attenuabatur, quod partes dolore cruciante  
miseræ amice ferrent, nonnihil his corrigentibus curabatur, sed moles tumoris ordematof-  
sensim latius se explicabat: interim nascitur tussis violenta & frequens, cum spuris sanguin-  
tingente constanter rubescentibus, quæ pulmonum ulcus recens, exeatum evideretur loque-  
bantur: præscripti pulverem sequentem ut aliquo solatio sui nimium delicate amantè reficerè.

℞. Pulver. antheæ. Poterij 3ij. sacch. saturn. 3i. pulv. Abbat. Hælij 3ß. sacch. rosar.  
3ß. f. pulvis bis quotidie ex cochleari sumendus, simul prisanam coqui simul jussi vulnera-  
riam, sic & pulmonis & uteri statui annuenrum.

℞. Rad. consol. maj. 3ß. fol. veron. scord. flor. rosar. rubr. an. Mß. antimon. crudi no-  
dulo ligati 3ij. bulliant cum aq. comm. lb. v. ad remanentiam lb. iv. pro potu ordinario; sed  
omnia ut facile erat prævidere in cassum efflere, exsiccante famelica tæbe tot malorum le-  
thalium obruentium prole funestissima, febrisque hæticæ insatiabiliter populantis pedesque,  
fatis, imperantibus paruit. Secus corpus operatus experti & amici Chirurgi; sereno utri-  
que secto sursumque in faciem jacente, apparuit pulmo ambobus suis lobis universim tribus  
ulceribus peresus: cordis conus diaphragmati tætuæ substantiæ intimo coctu firmiter in-  
susacereverat: arteriam magnam polypus decem transversorum digitorum longitudine no-  
tabilis imprægnarat: sed quod monstrum hætenus invisum, nulla deprehendere licuit curio-  
se spectantibus uteri vestigia, præter ramenta quædam fræida, eaque parva in terricam ma-  
teriam euntia: eadem fors vesicam ad collum usque perdidit, cæteris partibus pepercit  
iniquitas dictis malis satur: & ne in minimis curiositati meæ deesset, volui incisione patere  
tibiæ femoriquæ afflicti partes internas; illico ultra lib. ij. feri simplici stillatim effluxit, & ner-  
vus quæstus externus quarti cæralis propago circè poplitem partitus magnitudine digiti me-  
dioeris apparuit stupentibus, humore larivante confectum turgidus: sine tamen ulla, quod mi-  
rèrè, convulsione aut paralyti prævia; hinc in dubium meo vocari potest de utriusque af-  
fectus causa, sententia vulgaris, nec enim ubique seroso latice mersus nervus, in latitudinem

notabiliter explicatus contractione ob extremorum approximationem brevior evasit, nec is ipse humor omnes internæ substantiæ poros infarcens spirituum animalium commercium hoc pacto præpedians sensum sibi suffragatus est. Huic eladi anam dedisse cum rationabili probabilitatis conjectura dixerim binam causam, una est partus ardens, prima irascens Numinis in sexum muliebrem poena ob ejus ambitiosam insaniam, quo rustica obstetrix placentiam ab utero barbarè avulsit, laceravit, ut locus spurcus humoribus copiosis, sordibus, & tandem putrentibus fæde seateus proprio scelere elaboraretur alium, omnemque substantiam inhumaniter devoraret. Secunda causa est mariti ad veneris effrenis officia generosissimi penis insolite longitudinis, ex configuratione illius allidentis immodesta & frequentissima, utri orificium exoriri, altiusque sensum lacerari, tandem humore spurco perenniter irrorante rodi, & putredine accersita fæcilis actionis ejusdem socia, vorari potuit. *Ex communicatione Clariss. Dom. Nozet Archiatri Friburgensis.*

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

### SECTIO XXXVII.

#### De Hystericis affectibus, Suffocatione, &c.

##### OBSERVATIO I.

*Vteri ascensum, qui suffocationem Hystericam distam pariat, impossibilem esse Anasome ostendit.*

§. 1. **U**M Uterus quatuor ligamentis alijs partibus firmiter alligetur, petet aliquis, Quomodo uterus in hystericis affectionibus ad hypochondria & fauces, uti apud plurimos in confesso est, ascendere possit? Respondemus illud impossibile esse, licet Hippocr. id affirmet, Uterum aridum, siccum, suoque genio defraudatum ad hepar, gratiofi humoris fontem excurrere, ut humectetur. Cui suffragatur Fernelius, qui sæpe tactu deprehendit illum instar globi cujusdam in ventriculum efferti eumque graviter opprimere, & manu depressum in propriam sedem propelli; nam Uterus in cadaveribus, ubi omnia ligamenta magis laxa sunt, duabus manibus apprehensus, licet magna vi sursum trahatur, ne quidem vix supra os factum efferti potest, nam præter quatuor ligamenta illa, quibus partibus inferioribus annectitur, etiam vesicæ, recto intestino, & mediante vagina, pudendi partibus externis adnascitur: Necessarium itaque foret, ut si uterus ad umbilicum tantum ascenderet, pudendum cum podice, non sine summis cruciatibus, mirum in modum retraheretur, de quibus nunquam hystérica passione, etiam gravissima affectas, conquerentes audivimus. *Regn. de Graaf de mulier. organis cap. 10.*

**G**lobi ad fauces ascendentes, de quibus quotidie conqueruntur mulierculæ, & quos Fernelius in ventriculum efferti manu deprehendit, nihil aliud quam flatus quidam aucteri sunt, his enim cruciatibus dimittitur non tantum, sed quandoque in totum cessat passio xylinus: quod pluribus probare liceret, nisi caritativitati nostræ firmiter injicere satius esset. Idem. Non omnis tamen ascensus uteri negandus, præsertim fundi, qui ab omni connexionē liber est: manifestus enim est in quibusdam gravidis cum fortis famelicus

est, qui obviam alimento ire videtur: quod non semel sed pluries; non in una graviditate sed multis, manifestissime observare licuit in Uxore mea, cui si passus tempus protraheretur, uterus ultra regionem umbilici efferebatur, protinus ab assumpto alimento residens: Id vero maxime illi contingit cum vires gestavit, eosque robustos, quibus ubera singulis momentis pene porrigenda erant, adeo ut una nutrix sæpe satis non fuerit: Sed in gravidis intumescere uterum certum est, adeo ut supeditotes illi partes attingere facilius sit.

§. 2. In apertis cadaveribus earum quæ hystérica passione extinctæ fuerunt (difficil enim experiundi gratias varias) uterum nec intumuisse, nec ullo modo è loco suo dimotum fuisse (quamvis in vita, atque etiam instante jam morte, de ejus ascensu usque ad diaphragma & fauces magnæ ac continuæ fuissent querelæ) multo ties vidi, imo in dicta affectione raro vidium aliquid in utero, sed plerumque in alterutro vel utroque teste juveni. *De Diemerbrœck Anat. lib. 1. cap. 24.*

**U**terum sponte non ascendere, nec errabundo motu per ventrem inferiorem moveri clarissimis rationibus demonstrari potest: 1. Illud impediunt ligamenta; non modo vasa, quæ sunt vasa de-



ferentia, sed imprimitis lateralia, aliis vesperitilionum  
 similia, quæ adeo firma sunt ut huiusmodi subitam ex-  
 tensionem nullo modo ferant. 2. Uterus adeo parvus  
 (quippe non excedit ovi gallinæ parvi magnitudi-  
 nem) ut se eo usque extendere nequeat, licet vel vio-  
 lenta manu viâ ad diaphragma protraheretur, vel in-  
 tenuissimam membranam per summam extensionem  
 attenuaretur: 3. In apertis cadaveribus, &c. (*Vide re-  
 centum*) Globus autem qui in ventre inferiore sentitur  
 usque ad ventriculum ascendere, ille non est uterus  
 neque putans (quod credit *Riolanus*) sunt testes & tubæ  
 uteri à putrescente semine turgescentes & orgasmō  
 usque impetu huc illuc violenter agitate (hæ enim  
 partes neque tantam laxitatem, neque tantam magni-  
 tudinem habent ut supra umbilicum ascendere, &  
 magnitudinis ovi gallinæ aut anserini ibi sentiri  
 possint) sed sunt intestina, quæ à maligno & acro vapo-  
 re ex utero vel testibus elevato (sicut interdum in epile-  
 psia acris malignus vapor è pollice pedis usque ad  
 caput ascendit) feruntur ac vellicantur; quæ molestia  
 cerebro communicata, ut ejus mali causam depellat &  
 excludat copiosos spiritus animales in eorum fibras e-  
 mittit, & quibus inde intumescuntibus contrahuntur  
 intestina (quemadmodum ab eisdem vaporis ulceris

ascendentis acrimonia vellicantur, & sic contrahunt  
 diaphragma, musculi faucium alique partes) tunc  
 si forte aliqui flatūs sint in intestinis, plenumque sunt  
 contrahuntur circa illos flatūs, eosque arte cogendo  
 & comprehendendo globum istum effingunt: Etiam  
 arcta ligantur, quæ à mulieribus in tali casu per laceram  
 fasciam ventris transversam injiciunt, eo nomine non  
 potest quod globi istius (quem ille uterum esse arbi-  
 trantur) ascensum cohibeat, sed quia per illam maligni  
 acris vaporis, ex utero vel testibus suscitati (suscitantur  
 autem per aliquam fermentationem seu effectum  
 centiam) copiosus ascensus vestis superioris impedi-  
 tur, qui vapor tunc infra ligaturam aliquam in dore-  
 tus, circumstantiam partium calore dissipatur. *De  
 Diemerbroeck Anat. lib. 1. cap. 24.*

Dubitari potest an uterus sponte, aut vi ad hepatis  
 aburgat? Si sponte, non potest motu proprio se ferri  
 si superne vi quapiam rapiatur, necesse est. partibus  
 superioribus accesse convulsionem, non utero, qui tum  
 à superioribus partibus attrahitur ratione nervorum ita-  
 que vererum ipsius convulsionem patitur: Nam  
 tunc convulsiones adfunt in hysterici affectibus: *Ris-  
 lanus Anaph. lib. 2. cap. 33.*

## HISTORIA VENTRIS.

*Hysterici affectus convulsus in muliere cui mensurus suppressa.*

**O**rficium uteri externum nonnunquam ob exulcerationem post partum penitus coale-  
 scit: quod semel in Nobili Matrona observavimus, in qua ne vestigium quidem foraminis  
 vel rimæ apparuit, quæ cum toto año, ipsa malum celante, à mensuris non fuisset purgata, variis  
 hystericiis convulsivis affectibus conficta tandem interijt. *Cassius Bauhinus Theatri Anat. 1. i. r. 39.*

**V**ariis hystericiis convulsivis affectibus. Inter quos  
 eminet suffocationis & strangulationis sensus;  
 quem quidam medicorum proprium esse mulierum  
 existimant, imprimis quando cernit ipsam pendere  
 ab ascensu uteri ad fauces usque affurgentis: sed affe-  
 ctus omnino similis observatus in maribus fuit; cui  
 accedit quod solationis modus absurditatis convincit  
 eam opinionem, nam duobus tribusve floribus per os  
 tenuipentibus tollitur sepe numero iste strangulatio-  
 nis metus, unde facile patet à flatibus habuisse ipsam  
 ortum, qui si sint austri, constringi videntur fauces,  
 præsertim si fides flatūs habitus acres sint & viscosi,  
 æsophagi patietibus adherentes, ipsosque continuè  
 irritantes. *Vide febels ad Observat. P.*

**O**bservatio III. *In muliere à Suffocatione uterina extincta repertus Sanguis in cordis ventriculis coagulatus.*

**F**iliam suffocatione uterina extinctam aperuimus, in ejus cadavere nihil prorsus inveni-  
 mus cui mors imputari posset, præter sanguinem in cordis ventriculis præter naturæ or-  
 dinem coagulatum. *Règn. de Graaf Tract. de Succo Pancreatico cap. 9. ex Elsnæ.*

**I**deo succo Pancreatico, variis modis viriato, præ-  
 fertim tamen austero, Suffocationem uterinam ad-  
 scribit Vir Clariss. & atque ad Illustrationem sententiæ  
 dictam Observationem adducit, ac sanguinis coagula-  
 tionem nimiam, non altiusde quam à succo quodam  
 acidior deduci posse multis phenomenis probat:  
 Cuiusmodi non absurdum videri viros aliquando  
 suffocatione hysterice consimili laborare posse;

præsertim cum ejus causis proxima non accedat im-  
 mediate ab utero, sed à tenui intestino, in quo ob vi-  
 tiolam concurrentium humorum intervescentiam,  
 exaltantur halitus atque flatus austri, qui quoties  
 per æsophagum affurgunt, & ad aperam aëritiam  
 perveniunt, partes illas ita constringunt, ut in stran-  
 gulationis periculo se versari possint ægri.

**O**bservatio IV.

*Hysterici affectus immanes à Semine venento. 1. Ob Testes & vasa spermatica semine, per moram gyp-  
 seam duritiem adepto, repleto. 2. Ob Testes atheromate & steatomate distentos. 3. Ob humorem eru-  
 ginosum, cracem in Testibus, cum alterutro incremento. 4. Ob Testiculum dextrum pure, pilis,  
 &c. repletum cum tumore magno. 5. Ob cracem & fatidum humorem in Testiculis inclusum. 6. Ob  
 Testiculum sinistrum tumidum, nigricantem gangrena proximam. 7. Ob vesiculas atro humore plenas  
 juxta Testes. 8. Ob Testes serosa humore surgentes, & Tubum uteri dilatatum. 9. Ob semen in Tubis  
 uteri corruptum. 10. A semine corrupto in Testibus Ptero & vasis spermaticis. 11.*

**P**uella quædam ante plures annos corrupta à veneris usu forte diu abstinerat: Va-  
 ria affectionis hysterice symptomata sensim successerunt: Tandem immanes in  
 hypo-

hypogastrio dolores, Tumores duri, vagi, aucti referentes, imprimis dextrorsum, nullis pa-  
eandi modis pullantur: Die 3. Octobris accersitus, tabidam inveni decumbentem, tumi-  
dum ostendebat crus dextrum, vestigia comprimentis digiti circa malleolum retinens, sinistro  
quod prius intumuerat, extremo emaciato: Inflatum etiam erat abdomen, oblitteratis priori-  
bus exuberantibus, Sceleron dixisses: Die 7. Octobris anni 1660. circa horam 4. matutinam,  
annos 49. nata obiit.

Aperto cadavere, Hepatis convexum, Intestina crassa, livida & gangrenosa apparuerunt,  
indurato stercore plena: Vasa spermatica præparata semine albugineo, viscido, subcæruleo  
plena erant: Testes, uteri tubæ, vasa deferentia, vesicæ seminales, omnes inquam illæ partes se-  
mine inflatæ mirum in modum turgebant, ita ut in quibusdam incoctum, in aliis omnino ex-  
coctum, crassum, album & naturale, in aliis sicut ita induratum esset ut steatoma referret: Plus  
sanè femi-libra binis Chirurgis & mihi apparuit, pravi nullius odoris: Uterus parvus erat ad-  
modum, compactus, pyri instar superne & inferne complanati, cujus orificium corruptela  
lividum erat, forte ob intestinorum inferiorum viciniam gangæna labefactorum: Pulmo,  
sinister imprimis, etiam vitiatum costis adhzrebatur.

**C**atharina Soror, honesta virgo, forte quadra-  
ge naria, ab anno 1660. floribus albis laborans,  
magno cum hypogastrii & lumborum cruciatu, tan-  
dem exacerbo utero, & suppressi seminis violentia,  
hiennio post quasi tabida exspiravit: Inde facile  
conjectura assequi liceat, plurimas mulieres, maxi-  
me corruptas, & viduas juveniores, ventris usu in-

terdictas, à cumulo, vel peculiariter infesto semi-  
ne languere, tandem interire: Nec enim in illis non-  
nisi coaccervari & labefactari potest, infinitum malo-  
rum prava & venenosa qualitate contra æta author, nisi  
excernatur, hinc illæ quærelæ, *Joh. Nic. Bymingeri Ob-  
servat. æt. centur. 11.*

§. 2. Vir Illustris, in vicinia degens, Mulierem ex Illustri familia ortam uxorem ducit, so-  
mosam, pudicam, proceram, ingenio & corpore præstantem; Hujus fastidium obrepit, ac  
pedissequæ ignobilis, pumilæ, deformis, suspectæ castitatis amoribus irretitur: Injuriam mœsta  
& tacita Uxor concoquit, omni officiorum & cultus genere conjugis benevolentiam revoca-  
re annititur: Interquæ à non excolto naturæ fundo ceterbis affectibus hystericis ac multiplici-  
bus vexatur, quibus melancholicum succedit delirium, erroris mariti ream se professæ, inno-  
cens; ab eo criminis veniam deprecatur, domesticos promiscue quosvis admittit, sustinuisse  
falso enuntians: hinc diutino merore confecta & inedia, à longo decubitu, interveniente  
morte mentis errore & corporis languore exsolvitur.

Aperto cadavere, sola generationis organa in vitio deprehensa sunt, nam Testes, Vasaque  
omnia tum præparata, tum asservantia, tum deferentia, semine turgere sunt deprehensa, sed  
indurato ac in gypseam duritiem coniecto.

§. 3. Nonnunquam in virginibus hystericis, & puerperis post obitum dissectis, Testes  
atheromate & steatomate magnitudine pugni distentos deprehendit *Joh. Riolaus Anthropol.*  
*lib. 5. cap. 1.*

§. 4. Testiculi muliebres nonnunquam in morbofo statu à naturali constitutione rece-  
dunt, tum in magnitudine tum in contentis: Annis 1656. 1658. & 1663. tria sæculi cadave-  
ra muliebria, in quibus unus testis excedebat magnitudinem pilæ palmaris, humorem-  
que viscidum continebat, altero teste se bene habente: In variis aliis, quæ in vira Suffoca-  
tionibus uterinis frequenter laboraverant, plerumque inveni aliquem quidem, sed tamen  
prædicto longe minorem magnitudinis excessum, in eorumque modo uno, modo utroque,  
liquorem quandam auriginosum vel croceum aut flavescens, seminis in eo corrupti indi-  
cium. *Diemerbroeck Anat. lib. 1. cap. 23.*

§. 5. Testes muliebres humore aqueo, instar crassiusculi lactis feri similis in sanis pleni, in  
ægris vero veluti vesiculæ humore aquoso, alias limido, alias croceo, luteo, tingente & gra-  
veolenti, referunt, unde uteri strangulatus causatur. *Beubinus Atom. l. 3. c. 35.*

§. 6. Lugduni anno 1578. quum subito mortua esset mulier quædam sola, & suspicio esset  
de vi aliqua illata, Ego, imperare Magistratu, corpore externe & interne prius diligenter in-  
specto, nullam causam subitanæ mortis invenire potui, præter tumorem magnum testiculi  
dextri, ob copiam pilorum & materiei similis sevo, cum pure, unde matricis præfocationem  
violentissimam & lethalem excitatam fuisse verisimile est. *Ex Observat. Joh. Beubini.*

§. 7. Habent mulierum testes intus, præter vasa, sinus quidam tenui aqueoque hu-  
more plenos, qui prius non laxo teste, sed vi compresso, ac inflatæ vesicæ modo cre-  
pante, in miram altitudinem inter disseandam, non secus quam ex featurigine quadam  
exillire solet, ut vero is humor velut crassiusculum lactis secum in sanis mulieribus albus  
est, ita quoque illum mire luteum croceumque, & paulo crassiores deprehendi in duabus  
Nob. puellis quæ ante mortem uteri strangulatu vexabantur, quibusque alterius testis  
sinuum unus duntaxat, instar majusculæ pilæ protuberabat croceo humore illo infarctus,

& conterminas sedes non secus tingens quam in hominibus colon intestinum, quæ sub Jo-  
eore fertur, à bilis vesicula luteum fieri cernimus: Vtque hujus humoris liquorisve rarus  
occurrit color, ita quoque gravissime olebat, venenosamque quid & tetrum præ se ferebat  
odorem, illorum cerebri symptomatum indubie author quæ in uteri strangulatione in dies  
eborantur.

Vna virgo annos nata nondum xiv. ex Pulmonum, ut videbatur, inflammatione & frequenti  
in eo morbo uteri strangulatione periit, qui non ita pridem molestus esse corporat: Altera  
annos jam attingens duodeviginti, postquam uno aut altero anno insigniter palluerat, il-  
læque symptomatibus subinde oppressa fuerat, quibus puellas modo fere teneri constat quæ  
perdite amantes menstruas purgationes diu suppressas habent, aut quibus albus ille & cru-  
dus humor longo intervallo profluit, suffocatione ita interit, ut cum porrecti venæi pa-  
rentibus incederet suspicio, ex mihi Medicisque aliquot ad expectatam sectionem obigerit,  
in qua præter ingentem pulmonum albedinem molliciemque, ac totius corporis exanguem  
habitum, nihil vitiosum vel circa uterum ipsum deprehendi, præter luteum illud miris mo-  
dis olens alterius testis tuberculum. *Vesalius l. 5. c. 15. Anatom.*

**EX pulmonum, ut videbatur inflammatione.] Hæ-**  
**gemus Tractatu de Passione hysterica**, uterum  
ab omni culpa vindicat, atque pathemata quæ vulgo  
dicuntur hysterica à sanguine in pulmones impetu-  
sus invente oriri credit; Supponitque sanguinem, ut  
pote tenuiorem & fluidulentum, cum effervescencia  
quodam in vasa pneumonica & cordis nimis consen-  
tione intrare, & in illis impetuosè ebullire, adeoque  
pulmones infectis & plurimum aggravate, ut nec illi  
motum ineant, neque sanguis à cordis sinibus lacuna-  
ri possit; hinc à sanguine in præcordiis stagnante,  
magnam oppressionem, respirationem difficilem &  
sepe nullam, cum spirituum vitalium deliquio inferri  
solet: dein septum transversum ut pulmonibus ma-  
gis magisque distentis locum cedat, & respirationem  
aliquo saltem modo perficiat, cum diastole immant &  
diutius continuata deorsum ferri, adeoque intestina  
deprimendo, abdomen & hypochondria distendere, &  
motum velut globi ascendentis simulare, postea vero  
functione vitali ad hanc motum laborante, faculta-  
tem animale in suppetas ejus insurgere, quæ propter  
urgente motum in variis partibus necessitate, spiri-  
tus animales in principia nervorum impetuosè pro-  
pulsos convulsiones diversimodas hinc inde vagas  
edere: Hanc opinionem à magno jovamine in hoc  
affectu per sanguinis missionem, nec non ab insigni  
lesione propter excretionis cujusque sanguinis re-  
tentionem, tum à juvenibus tum à necessitate in  
hac passione confirmare satagit: Assensum tamen huic  
opinionem per omnia non dat *Cl. Willis pathol. cerebri*  
*cap. x. c.* Quod in quibusdam hystericeis, quæ seilicet  
temperamenti frigidiore sunt, sepe etiam pica & ma-  
ledicta afficiuntur, vix credibile sit sanguinem ita in  
pulmonibus immodicè ebullire, sine quibusvis effervescen-  
tiæ suæ notis aliibi conspicuis, Novi, ait, puel-

las ob chlorosin quasi exangues, quæ semper citius  
utpote effusius, à quovis exercitio in corde stagnare  
& in de difficulter admodum in pulmones exantantur,  
quæ tamen passionibus dictis hystericeis etiam graviter  
obnoxie: Certe haud probabile est quod harum san-  
guis immodicè effervescens in vasa pneumonica im-  
petuosè intrat, eorumque poros & meatus confissimè  
infarciat, cum interea tales anhelosæ fiant, ob sangui-  
nis à pulmonibus absentiam aut admissionem diffici-  
lem. Quo pacto evenit ut violentus iste sanguis  
in pulmones incurfus, qui circa paroxysmum fieri  
supponitur, haud inflammationem in illis patiat? qui-  
ppe sanguis partem cuiuspiam, rapidè & nimis consensum  
impactus, facile extravasatur, & præterea egre dis-  
cutiendam excitare solet. Observare licet quod Pul-  
mones haud semper ante alias partes afficiuntur; sepe  
enim symptomata spasmodica aliibi incipiunt & non  
tato pectoris regionem omnino intactam dimittunt:  
quippe in aliquibus vertigo & oculorum consusio-  
nes paroxysmum inchoant, quibus stertus, aut risus,  
aut aruum motus convulsivi; sine thoracis angustia  
aut cordis oppressionem succedunt: in aliis, antequam  
respiratio quovis modo laborat, insimul ventris in-  
mescencia cum vomitu aut rugitu paroxysmum or-  
dinantur & non raro finiunt: utcumque respirationis  
difficultas symptomata ista sepe longa intervallo se-  
quitur, eamque fasciarum in hypochondriis acta  
confissio præcavere solet: Porto videtur quod iste  
velut globi cuiusdam ab hypogastrio ascensus à septi  
depressionem nequaquam procedat: quoniam scilicet in  
paroxysmo hysterico hæc pars haud semper vitæ in-  
fecta deprimatur, ut sepe numero ad superiora con-  
tracta pulmones sursum propellit, adeoque spiritu  
fere præcluso suffocationis periculum fere minatur.

§. 8. Vidua Dn. de Sejelori (de qua lib. 2. tit. de Respiratione laesa) affectibus hystericeis val-  
de obnoxia, subito in terram cecidit exanimis: Aperto cadavere, Inventus est testienus  
sinister exiguè ovi magnitudinem æquans, colore nigrescente, eoque aperto substantia illius  
spongiosa nigra & veluti gangrena affecta visa est &c. *Riverius cent. 1. Observat. 60.*

§. 9. M. Gerart Virginis annor. 25. misere mortuæ & labefactata hepatis hæmatosi aper-  
tum est cadaver, in quo nullam aliam causam mortis quam hæmatoseos corruptelam depre-  
hendere potuimus: quippe inde sanguis ad putredinem dispositus procreatus cum esset, à  
maligna aëris constitutione, & hyemis præcedente, & veris præsentis, febris putrida pro-  
creata inquinaverat uterum & pulmonem corruerat, unde suffocationes uterine abortu,  
anxietate & leipothymia per intervalla miseram afflixerant; concurrente subinde delirio ex  
spirituum vitalium iniquatione à vaporibus, qui tum ab utero proveniebant, tum ex pulmo-  
ne corrupto: Nam juxta uteri testes vesiculæ quædam deprehensæ fuere tetro atro humore  
repleta: Hepar flaccidum erat, & in thoracis cavitate multus humor aquosus crassus sangui-  
nificientibus: Cum itaque hostis pereantis, febris putrida adesset, eique nullum auxilium  
boni

boni nutrimenti opponeretur, tandem necessarie vivificus in corde calor resistere non potuit febris perennitati, & suffocationum uterinarum pravitati: Dum egrotaret, non deglubebat nisi summa difficultate: Post mortem ex oesophago terribissimus corruptus chylos exibat, & multa spumans pituita asperam arteriam implebat, ex pulmonibus exundans. *Neurnia histor. 16.*

§. 10. In hysterice virginibus deprehendi Testes pugno grandiores, seroso semine turgent: quinetiam Tubam uteri amplificatam & valde dilataram. *Riolanus Antwerpog. 2. c. 32.*

Cum uterus sit in suo situ firmiter alligatus, non est verosimile in praefocationibus hysterice ad umbilicum ascendere, crederem potius motum illum obstantis & convoluti corporis, quod hysterice mulieres sentiant circa umbilicalem regionem, proficisci non ab utero ad eas partes elato, sed a testibus & tuba uteri: Quum enim Testes sint penduli, & corpus Tube fistulosum, laxum & vagum, simul volutari possunt per hypogastrium, & tracta ad umbilicum usque allargere dum semine puri turgent: cujus organo & impetu huc & illuc violenter agitantur: itam uterius vi magna superne tractatus, vix supra os sacrum effertur potest: quippe praeter quatuor ligamenta quibus firmiter additur, etiam recto intestino & pudendis partibus adhaesit & coheret: quas quidem partes, nempe pudendum & podicem dolosissime trahi & convelli oportet, si ad umbilicum usque uterus ascenderet: Quod si obijcias Testes & fistulosam Tubam corpus minorae esse quam ut possint tamotum illum rotandum efficere, live corpus illud magnum conglobatum, quale tamen deprehenditur aequare? Oppono exemplum hystericae virginum superius aliam: Quare *Galenus* sententiae subscitbo uterum non per se moveri, sed duntaxat ejus appendices plenitudine distentas huc & illuc circumferri. *Nihil Sennerium praef. 4. par. 1. §. 2. 4. 15. & p. 12. f. 1. c. 4.*

Deprehendi Testes, &c. ] Quandoque & minorem suffocationis hystericae esse uterum ipsum ostendit

*Hieron. Gabucinus*, Mulier, aet., quaedam strangulanti matricis erat obnoxia, saepe in comitiales convulsiones incidebat ac syncopas, hoc malum cum saepius tulisset, nec ullo remedio liberarent, excreto tandem è valva nigro quodam humore & crasso miraculo evasit.

Serose semine turgent ] Imo & à solo sero acri induci posse praefocationem uteri probat *Justitia à Ph. Salmuth* cent. ij. observ. 47. allata, de virgine multis annis praefocatione uteri laborante, cui ex admoitione emplastri de galbano & cetonci, cum ol. cheiridis subactis, primum pustula mox vesicae excitantur, tandem excoctatio omnimoda loci quem scutum tetigerat, unde tanta copia feri biliosi & aeris vacuata ut aliquot lineae plane vacuarentur, à quo tempore immunitis à morbo vivit.

Serose semine ] Quomodo semen cohibitu dolores distensionemque abdominis inferat, explicat *Riolanus Encyber. Anat. lib. 2. cap. 37.* Quamvis (inquid) scriptum fuerit ab *Hippocr.* & à *Fernelio* confirmatum, uterum instar globi revolvitur per capacitatem abdominis, sunt potius cornua uteri, receptacula seminis spirituosius ferentis vel putrescenti, quae tumefacta oberrant donec suum semen in capacitatem abdominis effuderint: quod quidem dispersum dolores acerbissimos inferit, distenditque abdomen donec vis illa spirituum evanescent: inde illa distensio abdominis, & praefocatio diaphragmatis.

§. 11. In Tubis uteri semen muliebze nonnunquam corrumpitur, unde symptomata gravissima eveniunt: *P. Barbette Anat. Praef. lib. iv.*

§. 12. D. *Mannagetta* cum cadaver foeminiuum Hysterica passione (ut ferebatur) extinctum discerneret, reperit illius mesenterium infinitis fere glandulis scitosis, variae magnitudinis & figurae repletum, tantae duritiei ut omnem ferme eultri aciem illuderent: Uterus vero, una cum Testibus & vasibus Deferentibus, materia seminali corrupta quae caseo recentiter conglobata haud ab similibus erat, turgidus repertus fuit. *Ex Miscellaneis curiosis anni 1674.*

## OBSERVATIO V.

Affectus hysterici crediti, Vero insensibilis à Mesenterii membranis ab invicem divulsis.

Cum foeminae Illustris paulo ante obitum affectibus (quos dicunt) hysterice gravissime laborantis cadaver aperirem *Uterum* quidem *prorsus insensibilem* reperi, verum juxta mesenterii plexus nervos, uti videbatur, in molem atollit & elevat solitos, viscereis istius membranas ab invicem divulsas & solutas: ut circumquaque tumidae & laxae, quasi in bullulas five vesiculas inflatae apparent. *Villis Pulv. cerebri, cap. 6. Vide integre hysteriam descriptam supra lib. cit. de convulsione.*

Paffio hysterica pessima adeo saepe existit, ut semel annuam instar plurimum aliorum affectionum causas gerat: si quando enim agitando insulari moris, aut oculitoris delictis in corpore foemineo occurrat, ita ut ejus causa lateat, & indicatio therapeutica sit prope incerta, itum uteri qui plenius, insensibilis est: tamen inflammationem accusamus, & symptomate quovis illustrato aliquid hystericium subesse pronuntiamus, proindeque ad hunc scopum, qui saepe signorum tantum subterfugium est, intentiones Medicae ac remedia omnes diriguntur: Variozum autem symptomatum hystericorum causas medicis plerisque solummodo in uteri ascendum & vapores ab eodem elevatos attulere: Prior opinio, licet antiquum obtineat, minus

verisimilis videtur, quippe in virginibus & viduis uteri corpus adeo exigua constet mole, & partibus circumquaque victis ita strictim alligatur, ut nec ipse loco moveri nec ascendere, nec motus ejus, si quis foret persentiri poterit: Quoad aetiologyam illam vulgatam à vaporibus desumptam, eam uti prolium vanam rejicimus: Credimus autem pathemata ejusmodi capillime à materia spasmodica, intra plexum mesentericos aggregata & per vices explosa oriri: atque omnino à spirituum animalium explosionibus oriri: Discreminis ratio: quia tum morbi hujus species ab invicem, tum ab aliis spasmodicis differt, à variis causis morbisque origine & extensione potissimum desumitur, tum origo hujus, sicut plurimum aliusmodi spasmodorum uter-

ro produs infante, sepe numero in capite consistit quandoque tamen hic affectus ab urei culpa, & nonnunquam ab altum partium vicio dependet. Quoad morbi extensionem, à quacunque origine procedit, ut plurimum nervos interiores, nempe ad viscera & praecordia spectantes, eorumque appendices praecipue afficit, spiritusq; in illis seantes potissimum exercet; interdum vero licet rarius, etiam spiritus qui nervis exterioribus, item qui cerebro & cerebello praesident, eodem affectu involvuntur. Primo dicemus de morbi hujus origine; hanc autem sapissime *ex* *varia* *causa* consistere, & symptomatum quae in vivis accidunt computatio, & *Disjunctum* *observations* *anatomicae* aperte indicant quippe observare licet hunc affectum à subito terrore, ingenti tristitia aut indignatione aliave passione violenta, in qua spiritus cerebri incolae potissimum afficiuntur; crebro exortum ducere: Porro nonnullis mala videtur ratio, & varia accidentia, quibus humores vitiosi intra caput uberius congeriuntur; hoc malum primo intraleunt; quia & paroxysmorum ritus idem manifeste evincit, in quantum scilicet capitis plenitudo, vertigo, oculorum coruscatio, aurium tinnitus, in malis paroxysmum hysterici ostenduntur, eumque non raro concludunt, Praeterea mulieres quaedam ab alio morbo defunctae, postquam interim hysterici dno agerentur valde obnoxiae; apertis, in quibus, *inter* *factis* *recte* *habuit*, in accipie nervorum principia levo auti manila ac prolixo immota deprehendit: His alique rationes perpendentes, non dubitamus asserere passiones vulgo dictas hystericas, creberrime orti; eo quod spiritus animales nervorum principia intra *caput* occupant, ibi quassam afficiuntur: Illi namque aut in coarctatione acti, aut humoribus vitiosi perfuni copulam heterogeneam & explosivam sibi inter adiscunt, quam una secum in carnales nervos longe deducunt: cumque eadem spiritus per tota; eorum series sive cedens, copula ista ad plenitudinem saturantur, aut sponte sua, aut occasionaliter commoti, explosiones faciunt, adeoque motus convulsivos cient. Quod vero talis copula spiritibus adherens, una cum istis in nervos interiores potissimum derivatur, ratio est; quoniam in hoc verius praecordia & viscera committit, spiritus animales propter animi affectus plurimum perturbantur, quare motus quavis aliunde illas facilius adhiereat & anomalias promptius concipiunt: Spiritus enim animales ob hanc praecipue occasione in diathesi spasmodicam contrahunt, quatenus nimirum illi ab impressione violenta, extra orbitas suas de solitione influentia & actus modum pervertuntur; hinc ordinationes suas non modo postea repellant, quia & particulas heterogeneas in amplexus suos suscipiunt, cumque illi facilius combinantur, quapropter in quantum spiritus animales nervos *pari* *ex* *causa* *inter* *capitis* *permanentes*, appetitus cum concupiscibilis & insensibilis perturbationibus quibusvis continuo implicatur, nihil minus est illi praeter ceteris dispositionem convulsivam acquirere: Supposito igitur (quod revera supponi debet) spiritus animales intra origines nervorum copulam heterogeneam & explosivam contrahit, eamque nervos interiores, una secum vexat, & per totos eorum ductus explicat, non difficile erit paroxysmum hysterici omnium ejus symptomatum rationes assignare: Impudens enim morbo ingruente exenunero vertigo, oculorum toratio & cerebri velut insana quaedam quiversiones praevix excitantur, quia tota spirituum cohors in explosiones patitur, levis enim copae verus cerebri colligues primo eliduntur: Deinde statim in imo ventre aut hypochondriis perterrita succedunt, in quantum spiritus intra plexus hic aut illic confusos protinus afficiuntur, in quibus ostendimus, si quis spiritus animales in tota quadam leide expulsi fuerint, qui extremis parti us relinquitur affectionem

istam primo latere: Quare morbi hujus secula in capite & visceribus plerumque habentur, convulsiones modo in imo ventre ac modo in hypochondriis primo sentiuntur, ratio est, quia materies morbosica, interdum nervi intercostalis ductu in plexus ultimos, mesentericos provehitur; quandoque tamen eandem non ultra parvis vagi fines delapsa, multo citius, nempe circa plexus lienares aut stomachicos subsistit.

Cum itaque spiritus animales intra nervos parvis vagi & intercostalis ab eorum origine usque ad fines ultimos copula heterogenea & explosiva imbuntur, illi tandem vel mera plenitudine, vel ab irritatione alibi facta in expulsionem cientur; in qua affectione si quis spiritus verius cerebri medicum illam exiliant, vertiginem, capitis inflationem, aliaque accidentia praevia inducunt, at tamen spiritus nervi candilis extremitatem iterum seiplexus mesentericos & lienares, per quos plexus explodi incipiunt, qui statim elisione sua in mas hypogastri patres attolli & sursum constati cogunt, adeoque *motu* *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* inducunt. Deinde cum plexus mesenterici supetiores eodem affectu sensum implicentur; idcirco, in quantum tota mesence, si compages, visceraque eadem annexa elevarunt & visus superiora impetibile coarctantur; *in* *omni* *inter* *capitis* *violenta*, velut cum exillione quadam succedit: Porro ventriculus non statim situr, murato elevatur, quia febris ejus omnibus intra plexum affectis, sepe tanquam vesica inflata distenditur, hinc non raro vomitus, aut saltem *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* inducunt. Quamprimum vero spiritus hujus quaedam explosis ad thoracis regionem pervenerint, in plexum modo distolte immixti convulsam deprimentur, adeoque viscerum ascensum accutunt, inflationem & summa intumescantiam cum ingenti lacta inferit, ita, ut in affectu illico si compages velut solvi debent, secus ille in Teipthymium incidere periclitantur. Interim septo teipthymo, ejusque distolte continuam, sanguis fere immotus in praecordiis subsistit, adeoque flagratione sua intra tam opprobriosa, ac non raro functionis vitalis veli quodam: Porro *Septo* *teipthymo* modo visus superiora contrahit, adeoque illud pulmones sursum impellit, quod tamen *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* & diutius quam per *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* cumque, hae ratione sanguis in *caput* *quasi* *interi* *affertus* procellatur, nec denique à cordis *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, ibidem ac in toto praeterea corpore *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, unde cordis oppellit & sepe *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, mo interdum *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, modo cum *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* insequantur: Postquam hae in una usqueque regione peraguntur, denum affectu ad *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, quasi tuis ignari ductu, pertingit, quae spiritus isidem explosi modo verius cerebri medullam resiliunt *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, & non raro symptomata Epilepsiae quasi amala produciunt: modo spiritus illi explosi in nervorum aliorum principia *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* patere explosiones cient, quia propter hystericam circa finem paroxysmi sepe *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* aut *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus*, aut *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* possunt, quia *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* ac *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* partes, quinimo interdum brachia aliquae *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* afficiuntur; cumque adeo denum spiritus omnes, qui copulam heterogeneam contraxerant, explosantur, paroxysmus finitur, verum exinde statim aliter paroxysmi materies coarcti incipit.

Quandoque accidet dispositio nem spasmodicam nobis longe lateque protensam esse, praeterquam enim quod sepe nervi tantum parvis vagi & intercostalis eodem plectuntur, neque cerebrum nec membra exteriora, quicunque afficiantur, quinimo interdum nec ipsi nervi ipsantes per totos eorum processus causa morbosica occupantur, aut diathesi convulsiva prout mo. nonnunquam sepe non ultra plexus lienares aut stomachicos pergit, & nec paroxysmus à ventriculo aut hypochondrii haurit. In inflammatione insipiens, non *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* sed *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* vicio orti credidit: Enajmodi. Ne *in* *caput* *quasi* *interi* *affertus* ad thoracem traducta

hædemque septum & pulmones spasmò involvens, *refrigerantem* & *cordis motum* sistit aut quodammodo pervenit: sobrius vero paroxysmus iste modo cum, modo sine capitis perturbatione insigni penetrat: Hec quidem vario modo contingunt: juxta quod materiem morbosam, sive copulam explosivam à capite descendente, vel à pulveris pyris æthereo, modo in hac, modo in illa parte plus aut minus congeri accidit: de qua tamen materia, quo rita eadem in capite producta nervorum origines primo afficit, adeoque passionis dicte hysterica causam præcætericam constituit, jam proxime inquirendum restat.

Quod itaque spectat ad materiam morbosam, sive copulam explosivam, quæ spiritibus intra *hypothalamum* fœtens, accrescens, cumque illis in processu nervos derivata non raro affectui qui vulgo perhibetur uterini, causa existit: dicemus hanc, sicut in aliis convulsionum speciebus, esse particulam heterogeneam & sanguine suffusam, quæ tamen ob dam potissimum *supra cerebri* spiritibus in nervorum principia influxum affigit: solent nempe aut spirituum ipsorum culpa, aut ipsius materie præpotentia: utriusque generis instantia passim occurrunt: Interdum accidit spiritus animales intra cerebrum, inque commensu ab ipso ad præcordia ducentes, confusos, à subita passione, puta timoris, iræ, tristitiæ, plurimum perturbati ac in *anæsthesiam* cogi: proindeque illos extra oves propulsum, particulam heterogeneam quæ sententia obvia sublimet adflictere cumque ipsa combinari, ut propterea mox diarrheia explosivam acquirant, eamque aliquandiu postea retineant: Insuper secundo, ista materies morbifica interdum magis effusa & potentior facta, invitis æconomia animalis præfidiis, è massa sanguinea in cerebrum ejusque appendicem suffunditur, quæ spiritibus adhærens, eos statim in explosiones disponit: hoc passim tenetur in malis febrium crilibus, nec non in affectibus quibusvis malignis, etiam conturbatis, aliisque chronicis perperam judicatis: Has causas plurimum fovet siccitas aut mala aut debilis cerebri & nervosi generia constitutio, sive eadem hæreditaria, sive ob mala viduas rationem à quæstiva fuerint: quæ in corporibus ita dispositis, & spiritus animales à levi quavis occasione in confusionem agunt, æque cerebri & systematis nervosi meatus, materie heterogeneæ & explosivæ incursum facilius patescunt: Reverti propter hanc rationem formæ præ vitæ, illarumque alias præ aliis affectibus convulsivi vis obnoxie sunt.

Quæquam autem hujusmodi mulierum passionem, dicet *hysterica*, sæpissime à capitis vitio, sive à causa morbifica intra *hypothalamum* oriunda procedant, attamen aliquando tales affectus propter causam alibi insipientem, sc. modo in utero modo in aliis visceribus nascuntur, æque hujus pathologie spasmodicæ duo sunt præcipue capita, scilicet.

1<sup>o</sup>. Interdum accidit tumorem aut ulcus, aut humorum acrimæ congestiones, in partibus membranosis circa uterum aut alia viscera confusis extrinseci, atque partes ita affectas, ob solutionem contrarii in spasmos dolorificos cerebro irritari: denique in quantum spiritus animales circumcinctæ dispositi, insinuantur in crebras *anæsthesias* adiguntur, illi demum particulas heterogeneas, aut à parte affecta aut aliunde dimissas sublimet asciscunt, ad impetum explosivos disponuntur, cumque imprimis motus convulsivi tantum in loci affecti vicinia contingant, nempe ut moles in hypogastrio ascendens, aut ventris intumescens solummodo percipiatur, postea corporum nervorum ducta & consensu, spasmus ibidem incipit sensum alia ventris imi viscera, dein ad præcordia, ultimoque in ipsam caput propagant, atque affectu ita paulatim ad spiritus cerebri incolas delato, illi insuper in propria officina copulam heterogeneam nasci, tam in viscera retorquent, adeoque causam morbosam reciproca facta ab utraque candens nervoli extremi-

ritate inchoatur. Vidi olim virginem in qua tumor exigens subter os pubis cum dolore atrocissimo exoritur, convulsionibus immanes in ventre infimo primo, ac postea ad præcordia & caput ascendentes, ac demum in membra exteriora protensas elebam: semel aut bis in die, postquam in parte affecta cruciatus insignes urgeret, abdomen & mox hypochondria attolli solebant, dein respirationis difficultas, & *anæsthesia* succedebat, atque statim affectus exterior transiit, membrorum & artuum contractiones, convulsionemque horrendæ sequitur: Nonnunquam etiam à sociis puteris, ob roxam utero illarum symptomata spasmodica induci: Refert *Harvius* ab injectione uterina acris convulsionem mirandas excitatas fuisse: ita interdum, licet rarissimè, accidit spiritibus circa nervorum extremitates & prope uterum degentibus, materiem morbosam, sive copulam explosivam immediate à loco ibidem affecto & abique cerebri culpa affigi.

2<sup>o</sup>. Restat adhuc alter casus, sive afficiendi modus, quo dispositio spasmodica partium longe à cerebro distarum vitio producit: licet interim labe, quæ illius affectionis causa existit, non raro ipsi cerebro mediantè communicetur: iunguntur, si quando sanctus nervosus alicubi in motu suo, sive circulatione impeditur: inde in partes nervosas retaguant, easque aggravans sæpe diarrheia spasmodicâ infert: ita cum evacuatio quædam solens, quæ liquoris nervoli superfluitates exterui solet ant, cohibetur, aut à fontanellis subito oclusis, aut nleeribus vetustis sine cathartæ exsiccatis, plures in affectiones convulsivas incidunt: Quinimo aliquatenus hic locum obinet, quod vulgo in virginibus & viduis pro causa passionum hystericarum assignari solet, nempe humoris seminalis, quem *Wieland* & *Boerhaave* insipendi oportuit, in tempestiva cohibitu, saltem si quædam istæ à conglaciis vitæ statu juvenem decipiunt, ideo accidit quoniam humoris nervoli retagiones, quæ cerebro & nervoso generi sæpe labem assignant, hac ratione præcaventur: Porro saccos nervosus versus principium suum regurgitat, quia transiens ejus alicubi à tumore aut scirrholo aut cancroso præcluditur: Nuper in hac urbe illiusmodi affectus insignis instantia contigit, scilicet puella quædam 12 annos nata herniam contraxerat, hæc præscripto maris fasciam male adaptatam cum fibula diutiuscula, glandulas inguinales valde comprimente, non sine magno dolore & cruciatu per bihas septimanas gestabat: intra hoc spatium (cum prius integre valeret) de vertigine & gravi capitis torpore queri cepit: ac paulo post affectiones convulsivas & quasi hystericas cerebro ingruentes passæ erat, simulque scrophulæ ingentes pone aures ac in cervicæ ejusdem lateris lababancur, quibus antebac in tota vitæ haur quæquam obnoxia fuerat: in hoc casu minime est quod dubitem quin à glandulis istis, quæ sunt liquoris nervoli emanantia, nimis compressis, humoris istius superfluitates, inde per vasa lymphatica smandari solent, in caput retagantur mala ita pepercunt: quippe symptomatum prædictorum à subliga calidius inguinalis gestatione ortus, ita subito & manifestè successit, ut in hac occasione vel mater ejus morbi occasionem retulcrit: Insuper etiam in aliis observavi humoris nervoli alicubi in decursu suo obstructi, terecmentum versus caput retagantia, non modo symptomata spasmodica, sed deinde affectus stramulos inulabiles.

Hæc de affectionibus dicte Hystericæ rationes formali, diversimodæ origine, nec non de symptomatum ejus causis genuinis: quibus liquido consistere videtur passionem istam non semper ab utero, quin longè crebrius à cerebri aliarumque generis nervoli partium vitio pendere: At vero contra hæc multa obijciuntur quæ juxta veterum opinionem culpam omnem in uterum rejiciunt: Nimirum ita fieri videtur, quoniam hujus morbi insulsi fere tantum feminas

invasit: quin & mollietates circa uterum male habentes, puerperae aut quibus catamenia sistuntur, ei potissimum sunt obnoxiae: Porro ex iuvenibus hoc arguere licet, quia semel plastrum super abdomen gestata, item arcta ventris & hypochondriorum restrictio, quibus sc. uteri ascensus inhibetur, paroxysmum ingruentem non raro arcent: Hoc etiam indicat quod inaveolentia matribus admota paroxysmum inducunt, atque feruida eundem abigunt: contra accidere perhibetur si eadem ventri aut pudendo imponantur.

Ut has objectiones diluamus, dicimus imprimis symptomata, quae videntur hysterica, haud tantum mulieres incescere; nam virum quendam novimus ejusmodi paroxysmis, cum molis in imo ventre ascensum obnoxium fuisse. Quod autem feminis multo crebrius quam viri affectibus istis convulsivis tentatur, duae rationes proferri possunt, scil. primo quod aliarum constitutionis animalis sit longe debilior, nempe cerebrum & nervos molliores & minus firmæ texturæ obtrinent, ut nil fortiter fuisse, nec in iusis cuivis resistere queant: quin & in illis spiritus animales magis in fugam & distractionem proclives, copulam heterogeneam & expulsiivam facilius admittunt: hinc feminæ à subito terrore, aut ingenti ruiticia maximas spirituum inordinationes subeunt, quod viri à rale occasione vix omnino perturbantur: 2. Feminae diathesin spasmodicam promptius suscipiant, quia materię morbosæ copiam uberiores concipiunt: quippe cum vitæ sedentariæ plerumque degant, sanguis ob ventilationis defectum impurius evadit: insuper in hoc sexu iste particulis heterogeneis & fermentativis originaliter scaret: quapropter cum catameniorum fluxu si quis expurgari expediat, quo tamē haud semper quod extraneum & incongruum est in massa sanguinea in totum eliminatur, quin superflus sit quod pro dusa occasione in cerebro & appendicem ejus suffusam, affectionum convulsivam causa exiit: Porro cum fluxu menstruali cohibito diathesis spasmodica accersitur, haud igitur putandum est tales affectus ab utero suscitari, verum quod massa sanguinea, particulis heterogeneis plus solito imbuta, eas una cum succo nervoso capiti ingerat: quinimo potissimum ob banc rationem etiam puerperæ passionibus quasi hystericiis obnoxie reperiuntur: præterquam enim quod læsis uteri membranis, spasmus illic ob sensum molestem inceptus sorsum perrepat, ac denuo cerebro communiatur, sepiissime accidit sanguinem à lochiis retentis in seculo febrili incendio effervescere, ac deinde crises in seculo miserrata maligna cerebro ingerere, unde affectus convulsivi & non raro soporosi excitantur.

Quod vero arguitur morbum hunc videri hysteri- eum, quia remedia circa abdomen applicata non raro levamen conferunt, facile erit refutare causam morbosam, in mesenterio sepius quam in utero constitam, interdum hac ratione aut tolli aut ab influentia sua cohiberi: Præterea ejusmodi circa hypogastrium applicationes nihilominus prodesse, licet affectus origo ab ipso capite derivetur, nam supra ostendimus quod cum materies heterogenea & explosiva ab hypogastrio descendens spiritibus intra totos nervorum interiorum processum dispositis diathesin spasmodicam incutit, motus convulsivi propterea excitantur & nervorum extremitatibus incipiunt, & inde sorsum versus illorum iusula perreperant, adeo ut imprimis viscera imi ventris, dein præcordia, ac ultimo cerebrum ipsum afficiantur: Si vero spiritus extimi, seu in mesenterio plebibus degentes ab explosionibus iusculis cohibentur, exteri omnes in reliquo ductu nervoso intra ordines suos permanent: hoc autem emplastra super umbilicum gestata non raro efficiunt, namque odore suo spiritus ab exhalatione reprimunt, ac in ordines cognos, quin etiam illis copulam accrescentem non raro exci-

tiant abiguntque, quare cum expulsiivis illis incedunt, inhibentur, paroxysmus convulsivus omnino prævertitur: Quod adhuc amplius constat in quantum ista passio in imo ventre inceptus, indeque instat globus ascendens statim supprimitur, ac statim partem constitutionis valida impeditur ne superius perreperat: per numero passio convulsiva, præcordia & cerebrum affectis abrumitur: quapropter vulgo in more est mulieres laborantes scissis, aut brachiis circa epigastrium complicatis arcte constringere, adeoque symptomatum ventris superioris progressum sistere: cum enim spiritus animales velut fontis ignis spasmus successively inveniunt, ubiqueque fontes absconditur aut intercipiunt, affectio illarum prioris inhibetur.

Quod spectat ad varios odoratorum effectus, semper quod suavis paroxysmum accersunt, feruida vero eundem abigunt, dicendum esse videtur priore spiritus animales demulcendo resolvere, ac à solis influentia pensis nimis relaxare, adeoque ipsos ad explodendum paratos in tales ordinationes provocare, quinimo velut flammula adnotata aliquatenus accen serere: Contra autem graveolentia spiritus reprimunt, ac exorbitibus & exorbitantibus retro cogunt, inque ordines compellant: quia velut sulphur auto fulminanti admixtum, viatrem explosivam ita admittit. Idem ib.

*Uterum prorsus infensum* Affectionis hystericae amule, excretionem per alvum ita eam cuiusdam pituitosæ sedatis, mentionem facit *Riverius* cent. 1. oblect. 69. ut hinc patet utero salvo affectus quosdam invadere, quorum tamen culpa in istam àstrictatur: Ut ait *Mercatorius* Monspelienfis per multos dies confidat esse dolore circa regionem Hepatis graviter infestantem, cum levi hypothyris & faucium, constrictione quadam, atque vomitibus pituitosis: per intervalla recurtebat dolor, & interdum ad alias abdominis partes extorgebatur: Tunc interdum animi defectio eam corripiebat, ut brevi moritura videretur: Cui affectio hysterica putaretur, remedia congrua usupantur, à quibus aliquando levatur, sed omnia symptomata postmodum recurrebant: Tandē balnei, foris & clysteribus usup per alvum excrevit materiam quandam pituitosam compactam & latam, scissis instat, palmi magnitudinis, postea vasa per aliquot sedes materiam mucosam, ac postmodum omnino sanata.

*In molem amulsi* Illud symptoma in paroxysmis ejusmodi valde frequens, nempe quod velut globus ab imo ventre effertur ac circa umbilicum impetuose exilire percipitur, ut perinde uteri ascensus perhibetur. Dico nihil aliud esse quam influentia horum plethura spasmus: Sepe quidem in feminis, ac interdum etiam in viris, novi, cum affectio convulsiva invaderet, primo molem in hypogastrio affurgere visam, dein circa medium abdomen intumescant ita immensam successisse, ut viri fortis manibus, ut vir validissime succedens, haud comprihi aut inhiberi potuerit: proculdubio adnoscendi hujus affectus causa est, quod intra partem intercostalis nervos spiritus animales instat, quosque a iusculis sive motus convulsivos instat, primo (qui plethuraque affollet) circa nervi extremitates, nempe in plethura abdominis infimo, effervescere ac velut explodi incipiuntque illorum affectio cum sorsum per partem ad plethura mesenterii maximum deferatur, adeo ut spiritus ejus incole pari inordinatione compellantur, nihil mirum est si illa medi abdominis intumescant, ac velut materiz cuiusdam microsulphureæ explosio cietur: Enimvero haud probabile est symptoma illud ab utero ascendente ac sede sua dimoto excitari posse, quia præterquam quod hæc pars in loco suo fixa & ligamentis firmiter stabilita est, etiam moles ejus in virginibus ita parva est, vix unce juglande major, ut licet in ventrem clars, ejusmodi intumescantiam minime producat: Nec magis verisimile est ejusmodi affectum

# De Hystericis affectibus, Suffocatione, &c. 55

affectum à masculis abdominis spasmò corruptis fieri  
isti enim uter convulsile ac partes subjectas sursum  
aut deorsum, aut ad latus contrahant, verum se emi-  
nus effert, ac umbilici regionem cum imperia in al-  
torem attollere nullo modo possunt: Ut supponamus  
vero spiritibus animales in plexu mellestetii maxime  
effectos, & ad explodendum aptos fieri, (quales reve-

ta sunt obicunque motus convulsivos incitant) isti uti-  
dem densius conglobati, effervescentia sua ac rarefa-  
ctione insigni plexum istum cum convulsione ejus  
inmaniter inibant ac intollant, simulque viscera in-  
posita cum vibratione quadam sursum propellant.  
*Idem Anat. Cerebri cap. 18.*

## OBSERVATIO VI.

*Affectus hysterici judicati, orti à sero acri, nervorum initia in Occipite  
efficiente, utero incolumi.*

**M**ulieres quasdam ab aliis morbis defunctas, passionibus interim hysterici dum ægrotarent  
valde obnoxias aperui, in quibus utero satis recte habente, in Occipite nervorum prin-  
cipia sero acri madida, ac prorsus immerisa deprehendi: *Idem ibidem cap. 10. Vide Astiologiam in  
Scholiis precedentibus.*

## OBSERVATIO VII.

*Passio Hysterica credita, orta à Pancreatii vitio.*

**N**Ob: femina Convulsionibus & Passione Hysterica laborabat, cujus solum Pancreas  
male affectum & ulceratum inveniebatur: *Higlmorus in. Disquisit. Anatom.*

**R**egn. de Graaf. Exercit. de Succo Pancreatico  
§. 89. & 199, ab hoc nimis austero deducit stran-  
gulationis sententiam ac merum, feminis fidei ateri al-  
tius nomine passim notum: Cujus causa proxima  
non accedit immediate ab utero, sed à tenui intesti-  
no, in quo excitati, ob viscosam effrvescentiam con-  
currentium humorum, halitus & flatus austeri, quociens

per oesophagum assurgunt, eandem ita tegunt, ut in  
strangulationis periculo se versari putent æger: Con-  
vulsionem autem causam adscribit *Franc. Sylvius* praefat.  
lib. 7. cap. 41. §. 14. & 15. irritationi capitis spinalis  
medullæ, aut nervi particularis, à spiritu acido &  
acii factæ, halitus forma ex tenui intestino ut pluri-  
mum assurgentis.

## OBSERVATIO VIII.

*Suffocationis uterine causa in Pancreatē non semper querenda.*

**N**Otandum quod *Franc. de le Boë Sylvius* hysterice suffocationis causam commentus est  
Succi Pancreatii peculiare vitium, uterum & partes spermaticas à symptomatum in-  
ductione excusans; Verum etsi multoties symptomata quædam cum hysterici aliquibus sym-  
ptomatibus, quasi similitudinem aliquam habentia vicio, quodam Succo Pancreatii induci  
posse negare nolim (quamvis attentè observatione satis ab his distingui queant) eaque ego  
ipsemet subinde in viris non minus quam in feminis animadvertèrim, tamèn super hac re  
semper accusare, nimis durum atque iniquum videtur, cum à me aliisque infirmis *cadaverum  
mulierum* scilicet multoties docuerit pancreas ab hysterici affectibus prorsus insons existisse,  
optimeque valuisse, atque interea in Testibus, modo valde tumidis (interdum æstertum,  
raro utrumque, ad semipvi magnitudinem intumuisse demonstravimus) modo male colora-  
tis, virulentoque liquore repletis tantorum symptomatum causam latuisse, cum etiam in tali  
suffocatione uterina graviter laborantibus milles observatum sit, per seminis sive coiti, sive  
obstetricis digiti fridione provocari excretionem, mox omnia symptomata cessasse, eorum-  
que reditum per huiusmodi usum fuisse perventum: quæ tamen delecta subito adhi-  
ta remedia nullum qualemcunque succi Pancreatii vitium tam facile, cito & bene tollere pos-  
sent: *De Diemerbroeck Anat. lib. 1. cap. 24.*

## OBSERVATIO IX.

*Affectus hysterici admittendi à causâ occulta excitati, quod nihil  
visu in utero sit deprehensum.*

**V**irgo annos nata 22. in orio magis quam laboribus educata; Ductis Albani Tiranni idem  
perveniens in voluntarium exilium mense Aprilis 1667. patita excesserat: Interceca ex  
calamitate patris ægitudine animo concepit, quamobrem per æstatem non ita commo-  
de degebat, quin crudelitibus ventriculi & viscerum obstructionibus subinde laboraret, mentes  
inordinatas fluebant, ex utero aliquoties suffocabatur, sub finem tamen ætatis, correctâ uteri  
expurgatione melius se habebat: Paulo post Sororum 22. Septemb. ex Buderitia Lemgo-  
vium comitabatur: Professionis molestias utinque ferebat, præterquam quod aberrans in  
itinere serotino, præ metu tenebrarum, alismo deficeret: Vitiis ejusdem tenus vacatis  
menstrua



menstrua fiebat, sed modica, inde corporis lassitudo, dolor & gravitas capitis, hypochondriorum inflatio detinebat: Dejecto appetitu, cibopareissimo, coque minimi alimenti, in prandio tantum, à cœna abstinens utebatur: Circa xli. Octobr. febris quotidie intermittens sub vesperam invadebat, qua durante, singulis noctibus animi deliquium, uterinæ suffocationi simile patiebatur, in quo extrema refrigerescere, respiratio crebescere, prosus considerare, nonnunquam ad tempus etiam plane intermittere, sine ullo spiritu, voce, motu, sensu, moribundæ instat: Interea pulsus celer, creber, inordinatus, inæqualis & minor quidem solito, nunquam tamen deficiens, multo minus ~~depressus~~ durabat paroxysmus isto alias dimidiam, alias integram, alias sesquihoram: quo finito semper ad mentem redibat: Passa fuerat hæc deliquia ter quaterque antequam febris nasceretur: Quæ solebat id mali à frigore quodam, ex inferiøre abdominis parte surgente, inde thoracem & cor feriente exoriri, videri enim cor congelascere: Interebescbat post dies paucos hæc leipothymia, ut nonnunquam maneat, etiam postquam surrexerat, fere tamen vesperi, vel ante vel post febrilem accessionem, etiam ex levissima defatigatione obreperet: Animadverti tamen affectum hunc non solum ex lassitudine, verum etiam ex vehementioribus animi perturbationibus, tristitia, excandescencia, attentionibus, cogitationibus, &c. recruduisse: Tornos plerumque insulsum syneope ista ad tempus aliquod observabar, mane videlicet ex cubili descendendo, crepusculo vespertino, & circa noctem mediam: Afficiebatur interim albo Fluore, servato tamen utrunque menstrui ordine & tempore, præterquam quod deterius fieret, colore & quantitate mutata: Utriusque tenuis, vix spicæ, sedimento fere destituta: Febrili adhibita sunt quæ cum moderato calore & partium tensitate tergent, aperiunt & robur conferunt, ex quorum usu mitior reddebarur: Circa kalendas Decembris, evolutariam periodo menstrua, frequentioribus jam factis lipopsichis, ut intra xxiv. horas etiam quinto repeterent, Quum jam non aliunde quam ex utero illas renasci judicarem, tardiorém solito matris excretionem in neomeniis provocandam duxi, sperans inde commodi aliquid accessurum: Displcebat adhuc rem etiam in malleolis venæ sectio, propter hybernium tempus, exiguas & profundas venas, sanguinem paucum, erudum, corpus febrium noctes infomnes ex cœnæ abstinencia, quam febris vespertina & ~~anxia~~ imperabat: Purgaram quoque ante & subinde, sed elementius: Exhibui itaque Dauci pollinem ex aqua arte misce: fastidienti obtuli ex assa foetida, dauco & castoreo pingui æqualiter mistis ʒi. pilulæ formæ: Cum autem nondum obediret uterus, offerebam adventante vesperæ rursum ex istis catapotis duplum: Quibus devoratis in somnolentiam novam incidit, in quam cum se vergere præsentiret: Quid nunc tandem fiet? aiebat, & paulo post soporatz instat jacebat: quo sopore discusso, obrepebat cum frigore consuetæ & vespertina oscitatio, assilientis febris prænuntia: Totum diem foco inhærebat, carens vaporario, & frigus premebat, caltraque nocte cum febre delirabat: durabat autem delirium istud biduum fere continuum, & jam finito febrili paroxysmo, nam interdiu nunquam febricitabat calore notabili: At cum catapotio uno subsidio uterus responderet, palatide theriacæ opt. ʒi. cum cinnam. ana ex aq. artemisiæ & szecharo propinabam, qua potinacula eadem die menses comparabant ferruginei, crassi, putidi & copiosiores solito pertotum fere quadriduum stuebant: Nihil tamen profuit istis excretio, imo symptoma acerbius & frequentius videbatur: quod cum ultra quinos ad summum imperus uno die ex more non fiebat, jam deinceps nulla nec temporis nec consuetudinis ratione habita creberrime redibat, ut nonnunquam quater duarum horarum spatio repeteret, imo unicus paroxysmus septenas horas & quandoque duas expleret, neque is ejusdem formæ cum præteritis, sed respiratio strangulationi simillima fiebat, una cum sonitu & stridore magno, convulsioneque artuum tam violenta, ut præ contusione fulcrum cum toto sublevari merent & creperarent, cum colli capitisque inordinato motu, imo extensione velut tetano universi corporis, voce inarticulata, coacta, stridula, abrupta, displosa, clamosa, stentorea, ut præ violentia simul paroxysmi plerumque toto corpore sudaret: Finitis uterinis hæc etiam exacerbationibus, fere dispicebat, absurda loquebatur, caput hac illic assidue agitans, & cantillanti voce idem perpetuo occinens, neque ab hoc docesyismo desisteat nisi ad mentem redisset, neque id nisi probe & præter solitum obdormisset: Dum deliraret, imminentem symptoma is insulsum annuntiabat his formis. Scamnum hoc aufer, nimia hic est angustia, trabs nimis imminet, ego aduror, deliquere anime, est mihi volandum paulisper, & simul cum hac voce, plerumque impero quo jam, corpus erigere, tanquam jam volatura conabatur, verum in mediis costatibus ægra desiciens menti eripitur: Durabat hæc amentia tres quatuorve dies continuè sine ullâ restitutione mentis: Dum delirabat omnium, etiam minutissimorum quæ multo antea essent recordabatur, sed quæ mutilatis verbis & obscuris efferebat: Tantæ rerum difficultati cum quid opponerem anxius delibero (neque enim ex frictionibus, ligaturis, fomentis, vacuationibus, odoratis & foetidis fuscque deque admotis &c. utilitas ulla accedebat) ad cata pota illa non purgantia revertor, additoque mithridatio tali proportioni miscetur ad

castorei pinguis simplum, aſc & danei ſingulorum ſexcuplum, mithridatii duplum accederet: huius medicamenti quotidie 5j. in pilulas formatam exhibebam, cui cumini cochlear parvum ex cereviſia ſaccharata ſorbere jubebatur: apprehendi antidotum expectationi tuncque proſperum, quare & iſtante vespere offerre audebam: cuius uſus Dei beneficio, ita nobis ſuccedebat, ut affectus, cuius frequentiffimi uno die inſultus, idemque periculaeſſe ſolebant, vix tandem bis, idque multo mitius inſeſtarent, imo ita quotidie decreſcerent ut infra nonum diem proſus extinguerentur: Totum itaque biduum & mente & corpore valcbat, viſta febris, jugularoque hyſterico malo, cibos apperere coepit &c. Die Decembris xxi. falſo ſuſpicata eſt hominem in hypocausto adeſſe, cuius vocem audiſſe imaginabatur: hinc ſurtim, vacillanti graduſ ſponte in ſubucula è lecto per graduſ 8. in atrium uſque deſcendebat, etiam progreſſura ulterius niſi à ſore ad eam redeunte deprehenſa fuiſſet; quem adventantem ſentientiſ, magna cum eeleritate ſcalam aſcendens ruſus ſe in lectulum proripiebat: Subitum hoc illius robur ſatis mirari nequico, quæ vel pridie de grabatulo vix ulaiſ exportari ſe inoffenſe ſuſtinuiſſet: Ex hoc deſcenſu fatigato corpore, variaque imaginatione animo turbato, illico in priſtinum affectum prolabitur, per biduum delirans, 23. die iterum ad ſe redit: circa 26. Decembris reſuebant, qui ut commodius manarant, pharmaco promovimus, nihilo tamen ſublevantur ſymptoma: Alternis diebus fieri mentis compos fiebat, idque interdum tantum uſque ad vespem: Per hos dies deſicientibus catapotiiſ, pulviſcullum ex una 22. duabus dauci partibus, eduloſa cereviſia inſperſum exhibebam, à quo mitius ſolito habebat per iv. dies continuos, licet ſemper vespertina acceſſione deſiperet. Tertia Januarii 1668. ob ægritudinem animi ex fratris diſceſſu, adeo ruſum morbus ſæviebat; ut intra bidui ſpatium plus minus 32. paroxyſmos prioribus ferociores pateretur: reverſi vero fratris præſentia malum denuo cicurabatur; quod poſtridie ex ejuſdem diſceſſu iterum ferociſſe coepit: Ante quadri-duum aliquando mane talis illam paroxyſmus invadebat qualem ante Calendas Dec. habere ſolebat, cum denſiſſima reſpiratione & ſpiritus interceptione, ſuffocationiſ ſpecie: 7. Januar. dolor quidam punctorius utrinque ab oſſe ſterno, inter geminas mamillas, aſſigebat, neque tuſſicando neque ſuſpirando invaleſcens, imo ſine tuſſicula, hærens nihilominus loco, ad ſingula ſero momenta ſponte ſua ita pungebat ut ſubinde vocem attollere cogereretur, ſed ſequenti nocte mitigatus & fere ſublatus: 8. Recrudelſcebat eructatus ille & vehementer lancinabat, fomentorum uſum non admittebat, quod illorum pondus pectori moleſtum eſſet: Potus & ci-bus omniſ oleoſum quid ſapere ægræ videbatur: Purgabam eo die catapotiiſ, mediocriſ ex-erectio ſequebatur, nihil tamen remittebat dolor. 9. Cataplaſma pectori nihil conducebat, imo profundius inde dolebat: Paroxyſmi uno die interdum plus minus xvi. 20. Utebatur tragema-te ex diatrium piper. & caſtor. ana 3ſſ. ſacchar. duplo: Venz ſectio. cucurbitularum uſus per-parum conſerebant: 15. Suſpiriſ increbeſcentibus, extorta vix tandem cauſa, amorem erga juvenem, invita admodum ſatebatur: Ex hoc animi affectu apparebant cibi, ſomaſ ſanaſ-que cogitationes labefaſtatas: hinc illi 21. Decemb. ex cubili deſcendendi impetum, ſuſpi-cione de dilecto illo proveniſſe; Ex eo tempore eaque cauſa morbus illi cum exacerbatio-bus magis ſevire viſus, eumque delirio majori & diuturniori quam antea: 18. Mihi & uxori ſuſpiriorum cauſas petviciuſ ſeiſcitantiſ; etiam alioſ amores proſcriebatur, adeoque ſe amatoriſ imaginationibus ab eo ipſo momento aſſidue perturbatam fuiſſe: 20. Hieram cum agarico melliram hauit & commode purgabatur: eodem die meſes apparebant nigrican-tes, putridi, qui poſtridie medicamento promoti laudabiliter fluxerunt: 22. Paroxyſmi uerſini à purgatione & rareſcebat & mitigabantur: edulia adhuc oleoſum ſapebant, ſed vespertino inſultu ruſus de mente excidebat: 23. A prandio oſcinbat ſæpius, frigebat crucibus & lumbis: novæ febris quotidianæ annotatio, priore, jam diutius meſe diſcuſſa: A meridie ad men-tem revertebatur: 27. Poſt meridiem oborta vertigine querebatur & ſe & omnia circumrotari: Excipiebat hanc ſtatim quiddam convuſſioni ſimile, oculorum depravatus moris apertis pal-pebris, & decerpente brachiorum, manuum erutimque denant duodena violentæ extenſio-nes, diſtinctæ inter ſe mora perquam exigua, occupata mente & ſenſibus, capite immoto: Hiſ ſiſtiſ illico ſolitus paroxyſmus, ſtrangulationi ſimilis, cum tremula totius corporis con-cuſſione, ſubſequebatur: 31. A prandio, leviſſimo vomitorio exhibito multam viſcidamque piritam reiſiebat: 6. Februar. inter multos paroxyſmos unus quinque horas conſiſtabat, à quo deſipiebat uſque adeo ut ne me quidem dignoſceret, in quo nunquam tamen erraret: 8. vespertiſ ſolitus paroxyſmus octo horas implebat: Ante biduum dolere ſe ſub na-ribus coſtiſ ſupra lienem, idque ab anteriore parte in dorſum uſque, querebatur, ſed rariuſ, exaſperati tamen motu thoraciſ vehementiori: Dolor pectoriſ punctorius, proſus evanuerat, qui per quatuor ſeptimanas duraverat: dolebat & circa dextram umbilici partem proſunde. 10. Unus paroxyſmus, res ſtupenda, per xij. horarum fere ſpatium totam perſeverabat: 17. Ceracum impoſitum parotidi, quæ in glanduliſ colli ſub aure dextra,

dextra, strumiz non absimilis, ante quinque hebdomadas enasci coeperat, jam ad tactum dolebat: 23. toto die optime valseit, mentis compos sine ullo paroxysmo: 27. jam in sextum diem sine paroxysmo ullo persistebat mentis compos, usque in meridiem hujus diei, quo tempore in reparatum lectulum deportata, ex levissima hac defatigatione in paroxysmum veterem recidebat, ex paroxysmo vero in dementia, sensit autem ante mediam noctem paroxysmos tres: Notandum quod prae metu sevilissimi illius paroxysmi plerumque vix ante quartum aut quintum diem lecto dimoveretur: A Calendis Martii totos dies 17. continuos animo & intellectu pollebat, repetentibus tamen interim aliquando primis illis deliquis levioribus, nisi quod bis, dum lectus reficiebatur, ex transportatione defatigata, ratione excideret. 13. Menstruum, quod redire debuerat, intermisit: 31. Tantae vehementiae paroxysmus novus erat, caputque de latere in latus sepiissime agitabat, ut sanguinem ori exprimeret, qui ex capite manasse videbatur: Ad 20. diem Aprilis usque eadem morbi conditio: Maii 4. paroxysmus cum iactatione capitis totiusque corporis, comitante stridore vocis acutissimo inexpectatus adveniebat: sanguinem ex basilica ad 3ij. detraxi: 16. Venam malleoli secui, fluxit sanguis modice, forte ad 3ij. 25. sumpta cathol. 3i. deiecit sexies: Junio mense graviora illa symptomata mitescere, adeoque minui coeperunt: Tandem sub finem mensis hujus nulli redierunt paroxysmi, ne tunc quidem cum lecto moveretur: Sed toto hoc mense catarrhus ad os fluens (quo jam à Januario fatigabatur) infestabat magis, ut quod afflueret cava manu abiciendum excipere cogereetur: Julii 14. febris rursus intermittere quotidie reperere, & quidem duplici, affligi coepit, hac febris plurimum emaciata imo exhausta est: Augusti 5. catarrhus desinere coepit; febris intermittens in continuam conversa vires prorsus labefactabat: Post Idus Tenesmus ad frequentissimas sedes, sed irritas, cum summo dolore sollicitabat: A calendis hujus mensis, fere non potuit, prae nimia macie consumpto corpuseulo, in clunes amplius surrigi ut alvum aut vesicam exoneraret: Hoc mense Tumores illi duri & scirrhusi per se diminui coeperunt, ut mortui fere prorsus evanuisse viderentur. 18. Paulo post tertiam matutinam sana mente, constanti fide in J. C. ex hujus vitae miseriis emigrabat anno 1568.

Corporis habitus, & quidem subpinguis, quo naturae beneficio praedita erat, usque ad solitum hybornum satis sibi constabat quamvis semel tantum quotidie cibaretur: Imo ab eo tempore incrementum adipemque contraxit majorem multo quam dum inculpatæ valetudinis esset: Nam à xxi. Decembris, meliori appetentia quam ante praestabat, pluresque quam cum sana esset, cibos sumebat, durabat id per menses fere duos: Ab idibus Febru. laudabilis illa corporis constitutio flaccescere coepit, fastidio nempe ciborum oborto & febre quotidiana altera, quæ priori tamen mitior esset, per ingluviem suscitata: Interim nec ab hectica febris symptomata immunis fuit, quæ per menses plus minus sex ante obitum apparere coeperat, etiam ut ab aliis febribus putridis liberata esset. 4. Calendas Janu. ad multas hebdomadas, sepiissime unico die, tres, & quidem specio diversissimas inter se syncopas pariebatur: nam non raro & illatum leipothymia recurrebat, quæ ante Kalendas Dec. singulis noctibus etiam dormientem opprimere solebat, idque potissimum quoties ad mentem reditura esset.

Dissolto corpuseulo, Pulmonis lobos undique thoracis membranæ firmiter annexos, ut sine labore aut dilaceratione divelli nequirent, eosque duris quibusdam tuberculis scirrhusi omni ex parte repleti deprehendi: Tenuia intestina rubicunda, velut erysipelate quædam affecta: Bili folliculum felle quodam viriscenti tumidum: Omentum fere corruptum & consumptum: Cætera viscera belle habebant: hecur colore substantiaque bona, communem tamen humani hepatis magnitudinem excedebat: Uterus quoque intestinum rectum, aut lien nihil præ se vitæ ferebant.

Nulli alteri corporis parti, præterquam Utero attribui debere immundissimos hos quibus pia & pudicissima Virgo toto sæpote excruciat fuit: paroxysmos apud Medicos in conspectu est: alius certe atque Aëlis præter seculi, vocis, motus & spiritus interceptiones, etiam hysterici artus contractionem aliquando scilicet cessantem quod facilius credam facit ipsæ graviditatis, quæ de frigida ex imo ventre surgente, & cor ipsum quodammodo congelante, accessibus initio queri solebat: Sed quid in causa sit, fortassis controversia non omnino caret: Statusque autem est præbuit mori veterum sententia causa duplex, videlicet vel mensis vel seminis corrupti culpa. Seminij maior vis tribuitur quæ mensis, ut tri. corpori noxa afficeret: At si seminis corrupti est tanta symptomatum dignitas adscribitur, unde tanta ejus copia ut sedecim,

ne dicam viginti paroxysmos intra xxiv. horas suscipere preferam, cum id ipsum etiam sanis exiguum existat, neque tum sæpe ut cætera excrementa expelli possent, præcipue in virgine quæquæ concubitu expectat: adde quod tam longo morbo afflicta in sextum usque mensem, phlogis hysterice exacerbationes fieri faceret, cum sobrie ut unico pasto, cōque valde modico, ad menses aliquot, etiam ante decubitu acquiesceret, ut post ipsa precedente morbum existeret in Clivia, propter exilium, patrie calamitatem, parentum pericula mercedi & valetudinis semen abundare nequiverit: De seminis corruptione nulla est suspensio ob habitum corporis pinguisculum; qualis illi à sacra fuit, adeoque in ovis moliter adque moribus, modeste & pacifice: At Galenus minuat corrupti spermatis particulam tantorum effectuum causam esse posse, à phalan g

languē & scorpionis idcirco, rabidissime canis salivā affertit. Quod si ita habet, unde tam crebra totiesque renata hujus genitalis succi putredo? unde tam assidua ejusdem expulsiō, quæ per sex menses, vix triduum sine retnis quæcumque insulcibus ægram nunquam destituit? Sane tanta est febtilis paroxysmi æqualitas quanta putrefacti humoris uniformitas, quo discusso etiam accessio dissolvitur: Similem hysterici paroxysmi rationem esse statuimus, ut donec humor venenatus subsistat tam diu affectus quoque severtat: sed si cum singulis insulcibus sinientibus ipsorum etiam mareria abluatur aut ejiciatur, unde tam subito nova colligerit? Quamdiu phalangij, aut scorpionis & canis rabidi virus in corpore hæret atque agit, tamdiu quoque affectus ejusdem sine ulla intermissione perdurat continuo, neque novos facit paroxysmos; In febre quia concoctio & nutritio corporis assidue recte menta quædam seponit, sit ut pro partis morbozæ qualitate, ejusdem nutrimentum atque excrementum vitietur; vitiatumque præ imbecillitate neque concoqui recte neque expelli commode queat, sed inherens putrescat, & pro putredinis sue natura hæc aut illa symptomata producat. At in feminis consideratione, rursus testes ex continuo feminis accessu, pro suo modo sefealant, non tamen quicquid post sol alimoniam superfluum est id statim omnē se propellunt, sed tanquam in meliorem usum utile excrementum proptius conceptaculis reponunt & conservant, dum vel copia molestim turgat vel procreandæ speciei necessitas ut illud excutatur sollicitet. Quamobrem, quæ ratione horum fecundissimum symptomatum causas in corrupti feminis venenosam substantiam rejicere debeam, assequi non commode possum: nisi lentam quandam & continuam tantis temporis gonorrhæam factam esse imaginemur; Neque enim alibi quam extra vasa sua semen putrescere verisimile est; Vasis autem excidere posse, nisi cavitatem matricis excipiat statim, anatomici veteres negant: At si ita frequenter vel minima particula feminis in uterum illabatur, illa lapsa putrescat, sane putrefactam tandem necessariò semel utero excuti debet verisimile quoque est ut item, non tantum utero sed & toti corpori adeo infestam & venenatam; Si excussa fuerit, alienam sane qualitatem facile sensibus proder, neque enim calore ur in febre dissipari posset: neque uterus tantum venenum perpetuo fovete valet: sed in hac ægra nulla vel paucissima humiditas, nec illa quidem ingrata qualitate prædita genitalibus (post finitos paroxysmos) emanasse animadversum potuit, teste Sotore assidue affidente.

*H. Sotore misecell. lib. 2. Ep. 104. v.*

*Nihil alteri corporis partem præterquam Ptero, &c.]* Quem tamen in dissectione vix expertem pronunciat: Si cum annexis partibus, vasis spermaticis, testibus, tuba, &c. salvis fuit, cur causam in semine corrupto querit, in sanguinem potius menstruum, qui corruptus & putridus semper exclusus est, rejiciendam? Si cæterarum caput, forte visum in eo deprehensum fuisset: catarrhus pertinax, suborta parocis & alia labis immane non fuisset ostendit: Aitrologium ergo repetere ex Scholij in præcedentem historiam, à qua symptomatum omnium fere spasmodicorum facilius emetur.

*Quem tamen attingit quam ex Ptero, &c.]* Quæ ratione varis corporis partes cum utero comparantur investigantur, breviter prius ei exponendum quam habent uteris connexionem cum reliquis corporis partibus: Situm is adeptus est in humiliore abdominis regione, ubi osium sacri, illius coxædici pubis que concutit ea cavitatem, quam pelvim appellant efformatur: Colli anteriore fiant cum vesica collo connectitur, posteriore à hæret recto intestino, superne reliqua intestina ipsi incumbunt, Ac fundo uteri, juxta cornua ejusdem, duo emergunt ligamenta quæ

bas cum ossibus illam hinc inde connectunt: his ligamentis Tubæ cum testibus sunt ætende: Lactea hæc ligamenta, si fibræ ipsorum carne ætenduntur considerentur, inter musculos numerabuntur: Ab ejusdem fundi lateribus duo alia ligamenta ceteris fibræ carneis, quales sunt fibræ musculorum, compacta protruduntur, quæ non secus ac vasa spermatica vitrorum per processus peritonæi, & tendines musculorum abdominis oblique descendunt, extra abdomen erumpunt, horumque portio vasis clitoridis excutitur, in tenuissimam membranam versa statim obliteratur, reliquum in membranam femoris intercedere absumitur: Ceteris hæc ligamenta sunt secundum longitudinem excavata, ductu quem in uteri cavitatem apertum deprehendi: Sunt etiam Tubis uterinis ductus conspicui concessi: Cum utrorumque ligamentorum structuram considerarem, mihi visum fuit eorum usum negligentius assignari, & parum congrue ligamentorum nomine vocari, cum proculdubio aliis nobilioribusque dicata sint quam ligandi munerebus.

Præterea cum uteris per vasa nullo modo corpori communis cum reliquis partibus connexionem habeat, ea sunt breviter perstringenda: Ac 1. quidem Uterus venarum & arteriarum ramos accipit superne à spermaticis & hæmorrhoidalibus, interne ab hypogastricis habet funiculos, qui collum & imam fundi ipsius partem percrepant & cum vasis superioribus junguntur, ut ex his in illa, & vicissim facilis sit humoribus transitus, cum nolum occurrat vulvularum impedimentum: Venæ uteri, aut potius tubuli membranacei habent oscula exilissima, quæ mensurorum tempore in cavitatem uteri aperientur: Quo attinet ad genus nervosum, nervi qui fundum uteri percrepant, à pari intercostali emergunt, qui vero disseminantur in medium & inferiorem partem, si ramulis ab osse facto erumpentibus sum debent originem.

Jam singulas, insigniores saltem, expendamus symptomatum rationes uterum inter & reliquis corporis partes, & primo quidem quod attinet ad *Painam*, Si uterus quacumque intemperie laboraverit, eam interitino recto, vesicæ, ac reliquis partibus, quas supra ipsi contiguas aut annexas esse recensui facillime communicabit: Eisdem etiam partes afficiantur si aut uteri ipsa substantia, aut in ipso p. n. collectus præter humoris putredinis, ubi cum illa colluvies fervore quem putredo inducit, fuerit attenuata, facile per insensibiles membrane exterioris uteri meatas exudabit, in vicina reper corpora, eaque labefactabit, temperiem imitando, rodendo, putrefaciendo, aut alio quovis modo: quare si sanies ab utero in rectum intestinum effusa fuerit, tenesmus efficitur, si in vesicam illabatur, stranguriam excitabit: & sic in aliis partibus, prout sunt huic aut illi numeri dicantur hæc aut illa stractura aut substantia donata, varia inducet symptomata, quæ facile possunt intelligi ex partium structura, natura &c.

Ratione *Sium*, si vel à conceptu fetu, vel à statu, vel ab humoribus in cavitatem illapsis, aut in substantia imbibitis uteris in molem ingentem excreverit, quia finis sedibus est fontem alligari, & sepius validis undique conclusis partes circumpositas necessario comprimit ac distrahit: compressio in gravidis alium durior efficit, etenim feces per intestina compressa ægre descendunt, & mora diuturniore exsiccata vix possunt ejici: Eadem ab utero compressio, dum vesicæ collum occludit, urinam supprimit: Ab illo abdominis tumore, si nimis creverit incendantur abdominis muscoli, & ipsum diaphragma trusus sursum intestinis, in thoracem pellunt, unde occurrit difficultas respirandi: Idem uteri tumor, qui ac ramos iliacos comprimit, difficillimè efficit sanguinis per venas

ad superiora refluxum, quapropter sanguis per ipsam crurum substantiam diffuso, aut in ipsorum venis refluxante, tibiz & femora sunt tumidiora, cum sensu ponderis & tensionis, & venae tibiarum varicose.

Sympathiz per *Comnexionem* aut continuitatem cum utero inducitur hęc sunt exempla. Si ob tumorem uteri, aut ejusdem distorsioem, convulsionemve rotundorum ligamentorum aliquod intendatur, tensio sentitur in inguine & interna femoris parte, ad illas enim partes destinantur ligamenta rotunda: ob eisdem uteri affectus parum possunt tensionis sensum exercere lata ligamenta in offibus illius.

Utr Sympathia quam *vasorum communis* inducit explicetur, distinctio facienda io eam quę sit per vasa spiritus deferentia h. e. per nervos; & in eam quę sit per vasa alios quoscumque humores continerentia, suntque arteriz, venę, cavitates ligamentorum rotundorum, ac tubarum canalis lymphatici, interstitia vasorum n. ac fibrarum, quę fibrę a fermento in suis, in ægidiis a causis variis morbificis relaxantur: Hi omnes canales, qui humores continent, ad Sympathiam partium cum utero conferunt, quatenus ab hoc in alios humores traducunt: quapropter ut elatis dignoscantur quę ab ejusmodi humoribus in eis partibus compatiuntur excitantur Symptomata, de illis pauca attingam: Ac 1. quidem advertendum est ut erum, ob intemperiem aut aliam affectionem, possit proprium alimentum corrumpere, aut de sanguine eacochymo prætelabente, quod in ipso vitiosum est excipere, sensimque ad majorem pravitatem deducere: quodcumque illud sit quod corruptum est, postquam putrescendo fuerit eliquatum, attenuatumque, sanguini permiscetur, ac si in ipsa hæreat totam massam inficit, si in aliqua parte deponatur, illam labefactat; circa hæc nihil habet uterus quod non sit commune reliquis corporis partibus; præterquam quod laxat tubulorum supra memoratorum osculis, aliquando crudit in propriam cavitatem, tum quod ipse corrumpit, tum colliviam quam a sanguine exceperit, tumque omnia fœdas ille morbus *Fluxus albus* appellatur.

Quę propria est uteri vis, a qua humoribus insignis, eaque plurima vitia accedunt, quamque censeo imprimis considerandam, ea est quę ipsi accedit a *Fermento* (de quo vide . . . . .) Fermentum ejusmodi, si vel deprivatur, vel nimis evahatur, vel deprimatur, si postquam solum flatis periodicis excitatur: fervorem, menstruz purgationes non procedunt ex præscripta natura lege, sanguis modo crassior evadit, depresso scilicet fermento; endemque exaltato acrior & fervidior: modo vasie deprivatur pro variis fermenti vitis, conferente ad varia illa vitia sanguinis augenda vel temperanda, viscerum dispositione bona vel mala.

Ex illis *Uterini Fermenti* & sanguinis vitis tot & tam variis ordinatur morbi, tam horrenda Symptomata, ut non immerito dixerit *Democritus* uterum *mulieribus sexcentarum annuorum causam existere*; Et aph. 57. 5. *Si menstrua purgationes abundaverint, morbi sunt*, necesse est enim immodica sanguinis prolusione totum corpus perfrigerari, omnes functiones, calore cum spiritibus absumpto, debilius perfici, unde fœdus oritur color in vultu, malus totius corporis habitus, hydrops, alizque affectiones, quę infer nimia sanguinis evacuatio, ex qua cumque corporis parte fiat.

Menstruorum defectus non minor affert incommoda quam excessus, is quidem citra ullam noxam caret ille mulieres quę nullam in utero parturient periodicam fervorem; ac quibus sanguini ab ejusmodi fervore rursuscenti debitus non patet exitus, ex

plurimis gravissimisque morbis ac Symptomatibus affliguntur: Etenim qui in uteri rubulis æstuebat sanguis, fermentativis particulis turgidus per venas refluxit ad cor, toti massę permiscetur, eamque fermentat, expandit, attenuatque, unde sit ut sanguis agitaris, dum vasa distendit & exitum querit, ipsa rumpat, vel in partes debiliores iterat & in ipsis inflammationes pariat: Partes porro superiores magis periclitantur quam inferiores, quia inter illas multæ sunt molliores, teneriores, laxiores, quarum vasa etiam tenera parum circumflectuntur, cum vasa partium inferiorum sint ipsa firmiora, & carnibus solidioribus munita, sique distendenti sanguini magis resistunt.

Quando sanguis est in mediocri quantitate, & partes robustæ, nihil periculi subitanei a menstruum suppessione metuendum est, sed sensum in vasis eacochymia incutere, fermento uteri vitiane sanguinis massam; quare temporis progressu coctionis non rite perficiuntur, inducitur chlorosis, cachexia, aut alij affectus: Hęc autem potius quam alia pars io consensum trahitur, vel proprio visio, vel speciali sanguinis aut alterius humoris mala dispositione, vel utroque, vel ob aliquam sympathiz causam ex supra allatis. Atque hæc quidam accidunt quibus menstrua sistuntur citra insignem malignitatem; Et si in membranis uteri rubulis, aut in ipsa uteri substantia vel sanguis, vel alius humor retinetur, & majorem labem contrahit, seu mora diuturniore, seu fermenti uterini pravitare, seu mala ipsius uteri dispositione, is si aliquando suscepta fermentatione attenuatur, sua loca deserit, sive per venas, sive per alias vias effumat, horrenda magis excitat Symptomata: Cum io venas corruptus humor inficit, & sanguini permiscetur, aliquando in illo excitat fermentationem præter naturalem; aliquando, ut solent multa fœcimenta aliorum vim extingueret, ejusdem sanguinis in ventriculis cordis fermentationem impedit, unde oritur pulsus debilitas, adeo ut crescente malo quandoque syncopæ succedat: Aliquando eor, ejusque auriculæ, cum ejusdem humoris acrimonia vellicantur, assidue se contrahunt, aut egre se expandunt, ad vitandum molestem humoris appulsus; quam cordis ejusque auricularum, motionem pulsus indicat paritare & tensione: Urgente magis acrimonia, cordis tanta inducitur contractio, ut asphyxia & syncopæ possit excipari: Quę ejusdem humoris portio per arterias defertur in alias corporis partes, in iis, pro cuiuslibet natura, & sua, vitas excitat tragœdias; in cerebro, si acrimonia, fermentandi vi polleat vertigines ac motus convulsivos: si sanguinis fervorem cohibeat, & spirituum motum, sensus motusque diminutionem ac privationem inducit: Pari modo reliquorum viscerum functiones ledit, quamque suo modo: Hęc & alia efficietas producit corruptum semen, quæ de causa mulieres salaces, & consueti viti consortio abstinere, magis quam reliquę sunt passionibus hysterici obnoxie: Si corruptus quispium illorum humorum, per transpirationem aut (quod facilius est) per patentes tubarum ductus ab utero in abdominalis cavitatem eruperit, circumflusos humores fermentatos, distensiones parit, quę si majores fuerint compressio diaphragmate difficilem efficiunt respirationem: Si idem humor pravas, aut excitatas ab cohalitis, ventriculi cavitatem subierit, inflationes excitat & nutus: Si diffusos per intestina nervos sua acrimonia sollicitaverit, in ipsis motus convulsivos inducit, & Testes varie convoluta aliquando ascendentes ad thoracem globi speciem exhibent. Unde his qui nesciunt uteri structuram, & cum vitiis partibus conexione, datur occasio opinandi ipsum forsam moveri: Si humor idem ligamenta, quę masculos esse dixi, pupugerit, & in ipsis spasmos

excitaverit, utri sunt contritiones, tubamque hinc & illuc iactationes: Si per ligamentorum rotundorum cavitates fluxerit, dolor sentitur in inguine & interna femoris parte. Respiratio difficilis, strangulatio ab utero dicta, irritatione ab humore per vias expositas delato facta in musculis, respiratio dicatur, aut in larynge possunt excitari.

Hæc tamen Symptomata, ut etiam convulsio præter immediatam musculorum irritationem factam ab humore aut habita ab utero per vasa surgente, aliam etiam habent causam in vasorum communitate, scilicet *Nervorum*. Sive enim humorum colluvies uteri clausa non excedat, sive per tubarum ductus abdominalis tantum cavitatem subeat, tamen ob foecitatem nemotarum uteri, aut reliquarum abdominis partium nervis vehementius affectis, spiritus determinantur ad influendum non solum in eos nervos, in quos ob illarum partium affectionem debent lege nature influere, ad humorem aut habitum molestem repellendum, sed etiam innervos socios quosque eorundem autem in omnes corporis universi nervos capiuntur, si ipsorum spirituum validior facta fuerit in cerebro commotio, aut fibrarum cerebri distractio: Ita observamus in majore tendinis punctura spiritus in musculos omnes impetu ruere & universum corpus intendere.

Ad eum qui in passione hysterica sit per nervos consensum plerumque mulieres disponuntur per suaves odores, fecitque veto liberantur: Cujus effectus ex parte causa patet adventibus rerum jucundarum apulsi partes relaxati ac effeminati: eisdem si à rebus molestis imperantur contractions firmari: vix se continent quum leviter visis, eundem si pupuris, senties subito factum robustiorem. Ita enim debent corporis partes esse comparatæ ut res noxias, seu interius pervadant, seu exterius accedant, contractions possint tepellere, & quod utile est ac jucundum se relaxando recipere: Ea de causa patris suavis odoribus relaxata, supervenienti pravo halitui facilius parent, se totæ in contrariam dispositionem transferuntur: quando instat ipsa convulsio, spiritus in omnes musculos effusi, accepta validiore per fortissimum sensationem determinatione, retrahuntur ad nates & musculos observientes sterminationi, qua concitata interdum mali causa excutitur, eandem retractionem eodem modo promovent vellicationes: Præterea (in qua vim potissimum consistere arbitramur) suaves halitus qui tenuissimi sunt ac levisissimi, cum vapor maligno permiscuntur, eum tantum suscitant, aut ejus vim & impetum augent: qui verò è fecit exspirant corporebus, aqua crassiores sunt, & majore feruntur impetu, ut iudicare licet ex molesta quam inferant sensatione, cum permiscuntur pravis vaporibus, validiore fermentatione excitata, eos discutunt ut sollet lenis aura flammam excitare & foveat, quam subito diffusit & extinguat rivos rapidior.

Insignis est mammarum cum utero consensus, quo illæ fororantur cum hic primum patiens servoris impetum ad mensuras purgationes, & in gravidis sensum lactis replentur: Ob eundem in gravidis, si mammae subito extenuentur, abortus periculum significant: si lac copiose profundant fetus indicant imbecillitatem. Postremi hujus phenomeni rationem reddunt, quia cum lac tanta copia ad mammae confluit, ut debet copiose profundum, manifestum est illud à fetu non trahi, quia hic pro imbecillitate non potest trahere: Venum dicunt quæsi qui illud symptoma referunt in defectum tractationis, obferunt imbecillitatem, si fetus optine valerit quomodo traheret? an per suctum? Nuge! si ipsi aliquando per vasa longa, vane implicita, exilia & maxime flaccida fuerint?

nunquid vident ea ante collapsa quæ suctu sequantur humor: ut est impossibile illa effuso, ita etiam esset impossibile posita sanguinis circulatione, qua per arterias cum sanguine deferretur ad uterum succus qua nutritur fetus, postquam fuit in placenta uterina percolatione defecatus, alia igitur querenda hujus effectus causa. Quoad gracilitatem mammarum abortus præsumitur si substantia sit, errant qui dicunt mammae extenuari ob defectum lactis, aut materiam ex qua generatur, quæ eadem sit cum illa quæ deferretur ad Uterum ad nutriendum fetum, qui debito fuit suctus alimento contabescit. Si enim ideo mammae extenuantur, quia deest lactis materia, toties evadent graciliores quoties eadem materia alio avenerit, si quo fieri ut ultimis gestacionis mensibus gravidarum mammae sint graciliores, cum tunc fœtus grandiosus plus alimentum absumat, seque efficiat ut minus sufficiat materia lactea ad mammae implendas, quod falsum cum sit falsa quoque ea hypothesis ex qua deducitur, adde quod ex aphor. 37. §. ea tantum mammae sunt graciliores abortus præfigit quæ subito contingit, nequit autem qui in venis abundat succus lactens subito evanescere, nec proinde subita mammarum extenuatio abortum præfigit ob defectum alimenti pro nutriendo fetu.

Quoad sympathiam uteri & mammarum per vasa mammaria & epigastrica, ea à ratione aliena est: ut autem sententia illius absurda, advertendum est vasa thoracica, postquam ramos mammas sunt largita, ulterius ad musculos abdominis rectos protendi, ipsique occurrere ramulos vasorum epigastricorum, quorum & ramulorum nonnullorum, qui in uterum distribuuntur communis est origo in arteriis & venis iliatis: Illa quæ sibi invicem occurrunt vasa, solum venæ, ut placet quibusdam, per capillarium ramulorum oscula jungantur: Ex his seu antiquam tuetur errorem seu admittit sanguinis circulationem, nunquam deduces quicquam per illa vasa è mamma ad uterum, aut ab utero ad mammae deferri, ut eorum ope sympathia inducatur inter illas partes: In prima enim sententia, sanguis venosus ab hepate, arteriosus à corde in omnes partes diffunditur, hic per arterias, ille per venas à partibus ad hepatis & cor per eandem viam aliquid refluxu humanum capium superat, cum nulla possit ejusmodi reflexus causa assignari, aut reflexuendi modus intelligi sed etsi concedatur ille fluxus & refluxus, ad summum poterit deduci quod refluxus per ramos venarum & arteriarum, qui sunt determinati in musculos rectos abdominis, & in uterum, deferri in ramos iliacos, & quod refluxus sursum per ramos venarum & arteriarum, qui sparguntur in eosdem musculos & mammae, deponi in vasa thoracica, non vero in uterum aut mammae: Data sanguinis circulatio, clarius adhuc perspicitur ab utero ad mammae, & vicissim per vasa memorata nihil posse deferri: quævis enim sanguinis per arterias epigastricas delati venæ thoracice aliquid acciperent, is sanguis nihil conduceret ab utero acceptum, nec ad mammae posset per illas venas deferri, cum potius ipse excipiant refluxum è mammae sanguinem; sed hæc ex mora sanguinis & structura vasorum sunt manifesta. Non equidem posse materiem morbosam ab utero in mammae transferri, & vicissim sed necessario qui transmittitur humor per venas deferretur ad cor, & inde per arterias ad partem compatiendam, quæ genialis est ratio comparandi partium corporis per vasa sanguinea.

Rejctis istis illis causis sympathie mammarum cum utero, quod attinet ad exempla propoſita, vera est assignanda quam sanum esse Societatem officii motionis quæcumque obcundi, cum per sensationes, qua-

rum organa sunt nervi, spiritus animales determinantes ad inducendum in nervos motum subservientes, ut intestas humores expellantur, resincantur &c. Hinc in utero gravidarum nervi ita afficiuntur, ut transmissa ad cerebrum affectione, spiritus determinentur ad influendum in nervos, qui præstunt glandulis & tubulis mammarum; eoque aliluxu spirituum laxantur meatus, quibus succus lacteus & sanguis feceruntur, & tubuli mammarum sensim dilatantur: Eadem de causa instanti purgatione menstrua, & incipiente uteri fervore, mammae tumescunt & duriores evadunt, accepta scilicet ab illo uteri motu determinatione, spiritus ita in mammarum nervos influunt, ut vasa sanguinem deferentia laxentur atque congestantur, quæ ipsam regerunt, unde fit ut mammae nateant, reduntante in ipsis vel toto sanguine, vel ipsius portione, quam glandule mammarum sicillim excipiunt, ut non existeret citius in utero dispositio ad conceptum, quæ in mammis ad lactis generationem aut secretionem. Mamme cum subito extenuantur, abortum imminere significat, quia scilicet à cacochymio sanguine, aut quovis humore putrescente excitatur in nervis uteri molesta sensatio, ex qua sequitur in spiritibus præposita commotio, & influxus in nervos inordinatus, quo fit ut hinc mammatum tubuli, quibus lac affluit, occludantur & reductionis canales aperiantur, indeque uterini muscoli, & ligamenta appellata contrahantur, & fœtum excludant: *Se quis e mammis copiose fluat, fœtum bene valere est impossibile.* aph. . . . Verum id equidem est, ut non ideo lac & mammae copiose fluat, quia fœtus debilis non trahit alimentum, quod ea de causa cogitur ad mammam restare, sed quia alimentum non appellat ad fœtum, is sensum marcescit, non appellat antem quoties à quacunque causa vix factæ sunt angustiores, tuncque qui magis abundat in sanguine succus nutritivus, per patentes meatus in mammarum tubulis deponitur: Potest quidem fœtus imbecillitas esse causa ut alimentum non appellat ad ipsum, sed ea non est perpetua nec sola; Quod maxime suadet sympathiam per societatem nervorum induci modo à me exposto, In fœtis

animalibus nervis qui glandulis mammarum præstunt aliter omnino habent quam in iis quæ vacuum habent uterum; qui nervi æstant eodem utero suas subeant mutationes, ut facile patebit rem exploranti per sectiones corporum:

His quos statim comparandi modis quæcumque sympathie phenomena perspicue explicari possunt, si Oeconomie corporis animalis peritus rem attentius consideraverit. *Franc. Boyle Dissertat. de consensu vascularum corporis partium cum utero.*

*Doler quidam puelleris inter geminas mamillas, &c.* ] An adhesionem loborum pulmonis cum thoracis membranis assignandas? At si tibi causa querenda, cur dolor ad interiora usque non petere? Cur illa respiratio? Forte causa statuerenda fluxio in pulmones; cni & tuberculorum scirrhosorum origo adscribenda, quæ quædam fuit in fœtibus de spumore humor, dolorem intulit; Ea facta, & postquam humor consumptus, desit molestia.

*Tensus, &c.* ] Tensus intestini recti est affectus, cum in ani rugis humor acris retinetur, qui vellicando assiduum egerendi cupiditatem excitat, inane: Sed hoc in casu intestinum rectum sine labe & vicio perhibetur. Ortus ergo illius fuit ab affectu spumoris, tuncque tenuium intestinorum & quibus tenuis exodans sanies, eaque pauca, eo appellens frequens illud desidendi desiderium excitavit: Vel dic, Eodem modo progenitum quo in vesicæ calculo laborantibus, quibus glans extrema pruriginis afficitur, etiam partes intermediae à molestia sunt immunes, quamquam affecto loco viciniores.

*Nec ab hecica febre symptomatice suis immunit.* ] Ad Hemitremum forte, vel Semitremum referenda; adfuit enim intermittens febris, & ipso consensu Smeris, continua lenta, cujus origo, ad *Adriani Spiegelii* mentem, est à phlegmone partium imo ventris conclusarum, intestinorum præsertim & mesenterii, quod plurimis exemplis confirmat, (*Vide lib. 4. de Febris*) Adfuit vero hic tenuium intestinorum inflammatio erysipelatis naturam sapiens.

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

### SECTIO XXXIV.

#### De Salacitate, Venere Languida, Impedita, Fœcunditate Sterilitate in utroque sexu.

#### OBSERVATIO I.

*Salacitas & Invidia in viro à peculiari vasorum seminalium conformatione.* 1. *Salacitas cujusdam Testicularis destituit.* 2. *Salacissimus in utroque Rene binos ureteres habuit, In dextero tres emulgentes, Ambos spermaticas ab emulgentibus producat.* 3. *Seni salaci & secundo unica arteria spermatica, vena spermatica bifida adinsum.* 4. *Salacitas ab insigni Renum magnitudine in viro.* 5. *In muliere.* 6. *Mulier salax spermaticam arteriam dextram bifidam habuit.* 7. *Vir Salacissimus tribus venis semipalibus dextris donatus fuit, unica arteria.* 8. *Alia duplici arteria spermatica dextra.* 9.

**S. I.** **I**N FIMA tium Emulgentium ad consinium cave, unde fuerat explantata, proferebat de se venam *capillatam* (quod alias tantum, & perpetuo quidem in sinistris nra venire solet) cuius apur supra in modum infundibuli dilatatur, partibus inferioribus sese in canalem arctiorem coangulantibus, *quo seminis materia profundi affluens*, ac cu prodigi pomit: Jam vero etiam spermaticas arterias e caudice aortæ vidides emergere, non similiter aliis, sed prægrandem ramum ac singularem recta aliquousque inde progredi; postea infra extitum pollicis laritudine, in alios duos distimi, directos in involveta testium, ad viralem iis spiritum asserendum. In corporis animalium nusquam perinde ludit Divina potentia & sapientia: ut in Renibus & Stomachis eorum emulgentibus. *Salomon Albertus in structura præterum Renis dexteri mirifica.*

**Q**uæ sentis in materia profunda, &c. Non alluſiſſe quæ hinc peti poſſe cauſe videtur: non ſolum obſeruationis in ſub homine feminis proventus, & aviditatis excendi Venereum prope inexhauſtæ, quæque vix ſatiari poſſet, ſuper quæ pando ante ſupplieum queſtus fuerat; Ingeſſit petegnaſ uſlo unquam præter hunc in vita ſeſo mundo diverſum fuiſſe: Sed & præcipuas perperuræ, cui ſolum habilita nanta aſſerit nunquam enim marem procreavit, neque in conjugio, neque in adulterio, neque in ſupris, quibus creberetur ſe poligerat, ob aliſſuos ſtimulos imperſuſque veneris, quos inhibere omnino ipſe nequit. Eſt autem

§. 2. Erat anno 1546. Monspelli Dominus *Memmorantius*, Ex cujus stipatoribus cum unus cuidam Virgini vim faceret, *Memmorantius* ut forte illac irer faciebat; audito matris clamore, reque intellecta hominem ut erat, iplo momento e fenestra suspendi jubet.

¶ Cada ver ejus rheorri anaromigo illarum. Ecce cum ad genitalia ventum, stupratorem illum *Plantis* joco intellatum, h. e. testibus earentem, tam interius quam exterius invenimus cellulas tamen illas in eo, venercos in usus arma prompturas, ut in aliis notavimus. *Berth. Cabrollius obiter. Anat. Hy.*

**P**eritus hominis membra dum tumor, magnusq; nihil scupulus aliquando injectus est de Testium natura & viribus: In his enim semper ultimam temporis manum plerisque certum, mihi non incertum modo sed & infallibilem, cum quod nulla spermaticorum valorum, seu præparata seu defecientia sint, ullarum Testes subeat, tum quod Aristoteli in ea videant esse sententia, cui Testes non nisi pro ponderibus sunt, ut epidymides in æquilibrio teneant, facilioremque viscoſo alias, nec facile fluxat, semper vim, faciat, ut textorum in officinis appensis videremus regimini lapides, quod subgeminat faciliorem vim alteri secutus: Ad defensionem in feminis partem existeret ut ei proficam vim augeant: Neque negas eum in parturibus vasorumque labyrinthis antea quibus, elaborationis feminis principia jaci, demumque in proflatus perferi, pectusque antem hinc inde cellulis ostionis noventique, quarum singule viderentur unum vel alteri ubi confidens, emittant, coarctent: Jam vero in testium substantia semen non perferi argumens est, quod nemo in his cavitatem ullam insignem, huc

. §. 3. In Anatome hominis lue Venerea laborantis, qui infami ligno lignum S. five Guajaco redemerat, hæc ad curationem infelicem arborem elegerat, dum dissecaretur observatio utroque reperiuntur ureteres, geminæque cavitates, mediana membrana discretas. Utereres in vesicam diversis locis inferabatur; alter juxta cervicem, alter in fundam vesicae deferebatur; omnes erant fistulosi, æqualiter magni: Aliud prætere mirabile in partibus urinarijs animadverti? Res dexter tres recipiebat emulgentes venas, rem sinister unicam habebat, quæ geminam adiposam producebat, ambæ spermaticæ ab emulgentibus emanabant. Hic homo totus erat in Venerem putris, & ob trigamiam; quin tres viventes habebat, quosdam ex his, quæ præcedunt, deinde præcedunt, deinde præcedunt.

— § 4. Habeo ex amicis D. *Wm. F. Peckham*, Anatomicum Baravum, fecisse anno 1558: eadem venis suspensi, qui venas quidem pernavigans circa initium habebat bifidas: *arteriam autem spermaticam* non nisi unam, ex medio trunco ortam, decussu majorem vulgaribus du-



bus, recta in parastatas definentem: hic cum ageret annum sexagesimum septimum tam erat secundus ut uxorem relinqueret gravi iam cum xij. liberis. *G. Hofmannus comment. in Galen. lib. xiv. de usu part. cap. x. n. 1013.*

§. 5. Duos ob rem veneream quasi infames secare licuit, quorum uni *Renes erant maximi*, ut ternos imo quaternos alios humanos aequare affirmare possem: unde etiam unum exemptum quidam, alias non eruditus, superveniens ventriculum putabat, & ob id ab astantibus suavi rifu excipiebatur. *Phil. Salmuth caus. 1. Observ. 35.*

**Renes maximi**] Hoc facere videtur Sennerti paradoxo, qui Prae lib. 3. p. 7. sect. 1. cap. 1. Renibus alium adhuc praeter seri confectioem usum assignat, sanguinis nimirum ad semen generandum, praeparationem, probatque 1. ex peculiari assignato illis parenchymate, 2. ex venae emulgentis magnitudine, quae sanguinis amplius quam ad eorum nutritionem necesse sit, vehat, 3. ex Arteriae quoque amplitudine, 4. quod in gonorrhoea medicamenta lumbis adnota se-

men imminuant. 5. quod inter calidiorum Renum signa, propensio ad libidinem recensetur. 6. Ex sapore & odore Renum, qui alius est in castratis animalibus, alius in non castratis, alius in adultis, alius in novellis. Tandem ex praeparatione valorum origines Accedit his argumentum ab eorum magnitudine desumptum, Quibus magni Renes concessi, in illis propensio ad veneream adfuit, Quibus parvis defuit libido, *Vide adducta ex Timaeo.*

§. 6. Renes ad aliquot librarum pondus excretos vidi in femina quadam Patavina, formosissima quidem, sed ob veneris flagitia, ut solent perustulata, quae (quod rarum alias Italis) à marito suo adulterae deprehensa, fuisse ad nucham interficiebatur, Anno 1650. die 27 Ianuarii. *I. Sculterus Trichiasis, admir. p. 87.*

§. 7. Anno 1662. Lipsiae mulier ob nimiam lasciviam & adulterium decollata, cultro anatomico exposita fuit, Gai in dextro latere arteria spermatica bifida reperiebatur. *Vide infra.*

**Arteria spermatica bifida**] Discant hinc nostri homines ne porro vim generatricem adscribant soli hepati, nam *Galen.* ipso iudice Semen plenum est vitale spiritui, Id autem à corde est: Et *Aristot.* 2. de Gener. Semen. sic ex animali quidem prodit: crassum, albumque à calore cordis multum possidens calorem: Fecunditatis senis illius referebat causam *Pavrus* ad arterie magnitudinem, Rectissime, nam & in vulgus foeminarum Belgeiarum nota est observatio, eos qui largos habent humores gignere fetus grandes, ut *Ferrus* scribit 28. Obs. 70. Cur? quia idem calidissimum

habent Cor. *Idem ibidem.* J. quoque *Van Harne* salacitatis causam in cordis calore querendam vult à quo pectus, etiam in mulieribus, pilis hispidum tedditur nonnunquam, teste *Panarello* p. 5. obs. 37. praesertim si in corpore adfuerint humores salis & mordaces, ut egregie censet *Lemnius* de oec. nat. mir. l. 2. 36. & 37. Ratio ergo salacitatis desumpta à numero venarum seminalium insufficiens videtur, si quidem ut ordinarie solet, unica tantum hic adfuerit arteria spermatica: *G. Hofmannus in Galen. lib. de usu Part. n. 1013.*

§. 8. Duos ob rem veneream quasi infames secare licuit quorum priores erant venae seminales dextrae ex trunculo venae cavae, una sub altera exortientes: quae omnes postmodum circa testiculum, una cum altera seminali iungebantur. *Phil. Salmuth cent. 1. Observ. 23.*

**Res venae seminales**] Nugari nobis videntur omnes Anatomei (inquit *Regn. de Graef* de virorum org. pag. 40.) qui dicunt aliquando unam arteriam aliquando utramque deesse, quia si vas sanguinem referens addit, necessario adferens adesse debet & contra, Ex quibus liquet necessario semper arteriam & venam adesse debere.

§. 9. Anno Christi 1673. circa Christi natalitiam, Lugduni suspensus fuit vir salacissimus & robustissimus, ob eam monerem, in quo deprehensa duplex arteria spermatica dextro latere.

**Trius venae**] Si venarum officium est referre sanguinem superfluum, & plures fuerint quam arteriae afferentes, videtur praedictis Venereis potius ineptius, nedum salacissimus esse debuisse, quia plus exportaret venae, ob numerum maiorem, quam inferrent arteriae, ut paucior materia superperer materia generationi seminis.

## OBSERVATIO II.

**Pennis exstincta in Viri cui Renes admodum parvi & flaccidi** 1. Ob vasorum semen generantium vel defectum defectum suumve praesertim. 2. A venere absinentia tota vita Testes & vasa spermatica contabuerunt. 3.

§. 1. Illustris Steno Bielke per totam vitam à Veneris usu, & omni foeminarum consortio abstinuit: Huius Renes flaccidi, & quod notabile, adeo parvi ut magnitudinem nucis juglandis vix aequarent. *Salibazan Timaeus lib. 3. Observ. 2. Vide Scholia ad observat. §. 5.*

§. 2. Veneris libido in quibusdam nulla est à mala conformatione vasorum horum, ab ortu quibusdam inorta, quae qualis sit in vivis difficile est discernere, nisi ex eo quod perfectius alioquin membris genitalibus, & nulla progressa causa, ad Venerem tamen minime

apta sunt: Et in mortuis sectio, quandoque vasorum semen deferentium, aut generantium abscentiam aut ductum perversum, si in utroque præsertim hoc latere inveniat, sicut ipse deprehendi, vel aliud quid in causâ fuisse patefacit. *Platerus Prax. lib. 1. cap. 17.*

**V**asorum defectum ] Si venæ extinguitur, conceptio quoque fieri non posse videtur: Observevit tamen *L. Rudolph. Salzmannus* Observ. Anat. Arteriam spermaticarum defectum in muliere, quæ

& conceperit & fetum ediderit. Quod merito in dubium revocat *Regn. de Graaf*, quia si venæ effluentes adsint, arteriæ affluentes, adesse debent.

§. 3. Nos in cadavere Monachi, cuius testes in a dolescentia moderatam magnitudinem à natura erant adepti, processu temporis ob votum castitatis, inviolabiliter per multos annos observatum, fere penitus contabuerunt, vasque spermatica unâ cum semine ejus redundante adeo aruere, ut exsiccatorum nervorum, seu ligamentorum duriorum imaginem potius præ se ferrent. *Vidas Vidius, junior de curatione membratim lib. 11. cap. 2.*

## OBSERVATIO III.

*Femina sterilis cui arteria spermatica deerat.*

**N**on nugantur (quod alias accuratissimo Anatomico *R. de Graaf* videtur) omnes Anatomici, qui dicunt aliquando unam, aliquando utramque arteriam spermaticam deesse, Nam non necesse est ut vas aliquod sanguinem afferens adesse debeat, si vas recipiens adsit & vice versa: possunt enim adesse aliz tum venæ tum arteriæ, quæ vices horum absentium supplere possint, & afferre cum sanguinem quem venæ revehant & contra: Ne hæc gratis dixisse videar, aliquot jam recensbo observationes mihi notatas. Canis masculus à me dissectus, nullas habebat arterias spermaticas, venâ tamen in utroque latere optime erat constituta. In Lupo mareidem notavi, hæc tamen differentia, quod in hoc exiguus ramus, ex arteriæ magnæ ramo iliaco sinistro ejusdem lateris venæ spermaticæ insereretur. In cane tamen & hoc notabile erat, quod salacissimus & fecundissimus existeret, quod ipsum contrariatur asserto *Riolani*, dum lib. 2. Anthropogr. cap. 25. asserit steriles esse quibus desunt arteriæ spermaticæ, licet genitalia alias optime habeant constituta. In alia cane femina, ne vestigium quidem arteriarum spermaticarum deprehendi, licet hæc novem catellis gravida existeret: Idem in Lepore iridem prægnante notavi.

Ne tamen à bruto corpore me argumentari credas, accipe quod in humano corpore observavi anno 1664. *Iena* in theatro Anatomico dissecebatur femina, ob parturitionem commissa capitis supplicium passa, quæ Lucinam experta erat. In hujus cadavere arteria spermatica utriusque lateris deficiebat; ramulus tamen exiguus ab arteria hypogastrica ad testes ferebatur: Hæc quæ de arteriis assero, de venis etiam probat *Kerckringius* in spicilegio Obs. observ. 32. *Alardus Hemmannus Cumenus in miscell. curiosis anni 1673. Observ. 113.*

## OBSERVATIO IV.

*Sterilitas muliebri ob multiplex uteri vitium. 1. Ob uterum immensè tumens & scirrhusus 2. Ob ejus parvitatem & duritiem cartilagineam. 3. Ob uterum compressum à duritie insigni Omenti. 4. Ob carnositatem exiguam intra canalem vera cervicis. 5. Ob uteri defectum, vasorum spermaticorum & Testium. 6. Ob obstructum uteri collum à carnea excrescentia. 7. Ob obstructions, tumores, &c. Tubarum uteri. 8. Ob callum in utero enatum. 9. Ob carneum tuberculum in collo interiore. 10. Ob Uterum spongiosum & mollem, ejus cervicem osseam. 11. Ob scirrhum circa orificium fundi uteri. 12. 13. Ob steatoma uteri fundo parte externa adnatum, Et cavitatem pinguedine densa obitam. 14. Ob tumorem uteri materiam sebo similem continentem. 15. Ob concretionem carnosam in fundo. 16. Ob uterum exiguum, utriculum illi adnatum. 17.*

§. 1. **H**elena Lobin nunquam concepit, & hydrope uterino interiit; Uterus, qui circa fundum liber esse solet, peritonæo arcte coalescerat. Vesiculæ majores toto ambitu erant adnatæ. In membrana deserviente, non procul à collo, erat glandulosa quædam substantia, dura, magna. *Vide sit. de ventris tumore.*

§. 2. Illustr. *Baronissa de Condée* ætatis ann. 65. Sterilis fuit, Uterus immensè tumens reperrus & plane scirrhusus, Prostata ovi magnitudine, refertæ putæ. *Ex Observ. Clar. D.D. Alex. Deodati Med. Genev. & Decani.*

§. 3. Vidi in Nobiliss. muliere Barone *Darvault*, quæ anno ætatis 55. decessit, exiguam matricem durissimam, ac ferme cartilagineam. Tres liberos tantum susceperat. *Ioh. Riolanus Anthropogr. lib. 2. cap. 32.*

§. 4. Multæ sunt sterilitatis causæ in muliere, de quibus fere omnes Medici tum antiqui

tum recentiores scripsere: Vnam tamen observavi à nullis editam in lucem, videlicet duriciem maximam Omenti, à quo uterustactus distendi non poterat, & sic generatam proieci-  
bat. In reliquis verò ista mulier bene colorata fuerat & optima fruens valetudine, hoc tamen  
habebat ut omentum undique satis crassum, durum ac fere lapidosum uterum premeret, ut  
tangendo ipsius abdomen observavi, ex quo sterilitas orta fuerat. *Domin. Panarolus Pentecoste  
iij. Observ. x.*

**A**B omento etiam os uteri comprimitur, con-  
ceptionis impeditur causam deducit *Hippoc. a-  
phor. 46. sect. 6.* Quotiesque veto Omentum naturaliter  
se extendat. *Vide Bartholinum Anat. lib. 1. cap. de O-  
mento, & Blasii notas in Veslingium.*

Omentum non omnibus obductum intestinis ad pu-  
bis usque os (ut in canibus propemodum semper) in  
homine repositur: nam ipsius quæ intestinis obvolvi  
debebat, portio tamen ultra umbilicum descendere con-  
spicitur, sed maxima sui parte sinistrorum litem verius  
tetrahi & convolvi. Quod quum in hominibus la-  
tueo suffocatis primam observarem, ex concussu mo-  
tueo corporis hoc evenisse arbitror: sed postea id-  
ipsum in aqua suffocatis, &c. capite truncatis, item la-  
tuali morbo, aut phrenitide ejusve generis affectu alio  
quopiam mortui. Et in iis etiam quibus viventibus  
thorax abdomineque aperiebatur, animadverti: atque  
ut semel dicam, in sano, quod ad omentum attinet ho-  
mine, ad pubis usque os id descendere raro comperit:  
Quin etiam quum idem observasset in dissectionibus  
obundis vix diligens *Joh. Dryander Med. Prof. quid  
de Hippocr. aphorismo sentirem, in quo ille mulieres  
p. n. obedi concipere negat, quia os uteri illis Omen-  
to comprimitur, licetis à me percontatus est, ac piz-*

ter cætera quæ de tamicum distendentis symptomati-  
busque mecum egit, sub omentum ad scrotum devol-  
vi, & inibi tamicum haud posse fieri arbitrabatur: ve-  
rum retractus ille omenti sinistrorum sursumque, fun-  
di in os omento comprimi, & ad scrotum devolvi  
posse non impedit. Nam si distensum humillimum O-  
menti partem sursum revolvam leviter deorsum tra-  
xeris, citra aliquam omnino divisionem, in omnibus  
hominibus facile ad pubis usque os intestinis ipsum  
obtendi posseprehendes, ejusque finem inter poste-  
riorem velicæ sedem, & uteri anteriorem levi occa-  
sione colligi, ibidemque uteri cervicem (si omentum  
præpingue sit) utcumque comprimere doceberis, dum-  
modo in muliere inter velicam & uterum, ut in sua se-  
deponetur, extenderis: quanquam ejusmodi com-  
pressum vix tantum esse aurum & ingesta visus  
seminis in uteri fundi orificium inhiberet, nisi penis  
brevitas hic simul obesser, ac proci ab uteri fundi o-  
rificio semen redderet, cujus dein ad fundum ingres-  
sum coincidens compressaque cervicis uteri ante fun-  
di orificium sedes remotaretur quæ simul obeso com-  
primeretur omento, ac parum scilicet à pene disten-  
ta semen sibi adherens retineat. *Veslingii Tab. 4. h. lib. 5.  
cap. 4.*

§. 5. Vidi in Nobiliff. Muliere, quæ anno ætatis 55. decessit, exiguum matricem, durissi-  
mam, ac ferme cartilagineam; tres liberos tantum susceperat; intra canalem veræ cervicis,  
carnositatem exiguum inveni, inferne positam, tanquam pessulum ostio obdurum. *Riolani  
Anthrop. lib. 2. cap. 35.*

§. 6. Fœmina erat cujus vulva ab aliarum fœminarum vulvis nihil peculiare & diversum  
habebat, Et matricis colli portio prominerebat, vel matricis collo simile, matricis autem nulla  
aderat in abdomine, neque testes: Et quoties cum viro coibat (coibat autem sæpe) mirandum  
in modum conquerebatur, *Columbus Anat. lib. xvi.*

§. 7. Anno 1662. Lipsiæ subjectam fœmininam cultro Anatomico explorabatur, quod ob  
nimiam lasciviam & adulterium commissum decollabatur, Illius desiderium neque à marito  
neque ab aliis sariari, vel ab ullo ingravidi potuerat: In dextro latere arteria spermatica bi-  
fida reperiebatur, Extra collum uteri propendebat excrescentia carnea, circa intesticus colli  
orificium adnata, longitudine digitum minorem, et assidue veto lumbicam ferme æquans, quæ  
uteri collum exacte claudebat, & loco obstaculi erat ut nullum semen uterum ingredi potue-  
rit. *Cass. Theoph. Bierlingius Med. Magdeburgensis in miscellan. curiosis anni 1671. Observ. 208.*

§. 8. Frequentes sunt in Tubis, haud secus atque in utero, obstructions, tumores, ph-  
tyænz amplæ, proculdubio additæ sterilitatis contumacisquæ causæ: *Veslingius Anat. cap. 7.*  
Novem circiter aquæ purisquæ libras in unaquaque invenit *Tulpius Observ. 43. lib. 4.* Interd-  
m ita cavitas p. n. dilatata fuit ut molam contineret, quod *Marquartus in Empir. practica refert.*  
*Blasius ibidem.*

§. 9. Mulieris Claræ, nomine & genere, mortuæ corpore inciso, Vulva à medio infra, ver-  
sus imam ejus partem junctis oris occuluisse reperta est. Quod sterilitatis causam fuisse co-  
gnovimus. *Benivenius de Abd. cap. 63.*

§. 10. Sterilitatis Catharinæ Sandræ, uxoris sororis Rondeletii, causam fuisse suspicati su-  
mus earneum tuberculum pisî magnitudine quod in uteri collo interiore deprehensum est:  
Id enim fuisse potuit obstaculum semini in fundum penetraturo. *Joubertus in vita Rondeletii.*

§. 11. Cur non stupeant homines, si quemadmodum à nobis inter anatomicos annotatum  
est, Uterum in fœminis instar spongiæ raræ & mollis, aliquando & pure osseam cervicem vi-  
deant? *Gemma lib. 1. cap. 6.*

§. 12. Sexagenariam matronam quæ binis nuptiis sterilis fuerat dissecui: perquisita diligen-  
ter sterilitatis causa, invenimus scirrhum circa orificium fundi uteri, qui instar annuli fundum  
matricis circumdabat, adeoque uterum claudebat ut styli acies vix immitti posset, unde nil  
mirum quod in coitu sperma à matricis ingressu perpetuo asceteretur. *Gul. Fabr. Hild. cen. 1. obs. 65.*

§. 13. Ho-

§. 13. Hæc quidam matrona in primo puerperio inflammatione uteri laboraverat, curata tandem sterilis manebat: Cum autem postea morbo acuto extincta esset, corpus ejus dissectum, atque in cervice ante orificium fundi uteri scirrhum magnitudine ovi asserini inveni, ipsi adeo adhaerentem ut unum videretur corpus, nec ullo modo ab eo divelli posset. *Ibid. observ. 66.*

**P**ropter hunc scirrhum semen viri ad uterum pervenire non potuit: Nemini igitur mirum videri debet quod Medici aliquando in sterilibus frustra sibi multa negotia facessant. Hujusmodi enim causæ Me-

dicos latent; aut si non latent, et tamen non nisi ab ipso Deo, qui vulvam claudere & aperire potest, (1. Sam. 15. Gen. 26. 3.) auferri possunt.

§. 14. In cadavere muliebri à Cl. *Veslingio Patavii* anno 1644. aperto, repertus uteri fundo, in parte exteriori, tumor adnatus magnitudine nucis juglandis, cujus interior facies albicans & pinguis steatoma referebat: Aperta uteri cavitas simili pinguedine densa omnino repleta viscebatur, parteribus ejus annexa: Hinc annorum induciis nunquam concepit. *Th. Bartholinus cent. 2. hist. ar. 60. 1. Rhodius cent. 3. obs. 46.*

§. 15. Mulierem, quæ nunquam conceperat, quamvis innumeris medicamentis esset usa, J. *Veslingius* à morte sectam anno 1642. Vidit tumore uteri laborasse, membrana propria materiam sebo similem continente, quem ideo inter sterilitatis causas merito referendum censebat, memorarum etiam 1. *Huchero lib. 2. de sterilitate p. 211. Veslingius Epist. observ. 72.*

§. 16. Vidimus in Nob. marronz *Ant. le Fevre* corpore, concretioneam similem parenchymati Hepatis, cavoque uteri adnatam, à partu postremi liberorum, & æqualem f. b. *Ægyptiacæ*, sterilitatisque reliqua ejus vita causam. *C. Piso de morbis à sero Sect. 2. p. 2. cap. 7.*

**C**um uterus præstantissimo uteri natus, generationi scil. hominis, parum prudenter, ne dicam inique, male vulgo audit, tanquam sentina sanguinis in toto extremis, quod officium uni pudoris sui à natura est demandatum: iam experimento plurimum Anatomicorum & nostro, *In puella quæ tempore menses fluere stragulata cadaver, solus suus pudoris fuit sanguine persusus. &c.* Et certe parum probabile per angustiam admodum uteri cavitatem, continendæ fabre *Ægyptiacæ* impari, à facite & dormiente muliere tantam vim sanguinis abique evidenter corruptæ, aut nimis hæmædious p. n. sive uteri sive uti-

cil ejus interni, conceptui alias præjudicose, periculo præterfluere, si modo tum aperitur orificium: aut periculo concretionis carnosæ & informis cujusdam substantiæ, quæ uteri cavum implendo obstruendoque innumera mala afferret, qualem vidimus in matrona supradicta, Et qualem sine puellæ reddat sæpe sub finem menstruæ purgationis, progenitam quippe ex sanguinis menstrui portione aliqua, quæ moram traxit in extremis suis pudoris cavitatibus, alioqui in colore, crassitie, & soliditate carni Epatis protius æquiliæque, vel sensus visus judicio similem. *Ibidem.*

§. 17. Fœmina nupta virgo sexennium integrum ventrem tumidum gessit instar prægnantis absque impedimento in ullis functionibus: Non menstruabar autem licet commode marito convixerit, corpore beæ habita & musculosa. Obiit præcœara. Utriculus quidam præternaturalis ventris capacitatem explebat, exortum ab uteri fundo extimo sumens. Uterus ipse exiguus erat & arctus qualis puellæ 10. aut 12. annorum. *Vide obs. 55. §. 1. Sect. 2. 1.*

## OBSERVATIO V.

*Sterilitas in juvene ob malam conformationem vasorum spermaticorum & testiculorum retractionem.*

1. In viro ob deficientes arterias spermaticas. 2. Ob vasa spermatica utrinque ex emulgentibus oriunda. 3. Ob lapidem meatum, qui à prostaticis in urethram tendit, occludentem. 4. In viro cui hepar sedem lenis, & vicissim obstinebat, citra vitium partium generationis. 5.

§. 1. **A**nno 1640. dissectus est adolescens Epilepticus, cujus membra generationi infervantia etant conformata p. n. nam vasa semen deferentia vix conspiciabantur, præparantia in uno latere deerant, Testiculi intus fuere retracti. *S. Scholzius in miscell. curios. anni 1671. obs. 62.*

§. 2. Interdum utraque arteria spermatica deficit, quod sterilitatem affert in bene compositis corporibus, quæ partes genitales optime conformatas habent, fortiter arrigunt, semen excernunt, sed infecundum quia virali spiritu destitutum. *Riolanus Antropog. lib. 2. cap. 23.*

§. 3. Mortuum secimus qui ab utraque parte vasa spermatica ex emulgentibus venis & artetis orientia habebat: Hujus semen cum admodum aquosum & frigidum esset, ob serosi humoris copiam, generationi erat summe ineptum. *Dom. Panarolus Pentec. 2. obs. 35.*

§. 4. Retulit mihi Celeberrimus DD. *Theodorus de Meyerne* &c. in ultima cadaveris humani dissectione quam suis manibus fecerat Lutetia, insolitam sibi & inauditam oblaram fuisse sterilitatis causam, Calculum videlicet, exactissime meatum illum claudentem, qui à Prostaticis in urethram dehiscit; per quem à venis varicosis semen vibrante ejaculatione expellitur: quem quidem calculum, non nisi vi, cum partis aliqua laceratione extrahere potuerit, *Frid. Læsius lib. 1. observ. 33.*

§. 5. Vir Nobilis 40. annos natus, supremæ unius ex duabus Britanniae curiis Consiliarius, die 18. Aprilis anni 1648. febre purpurata obiit: Aperto cadavere inventum est Hepar in sinistro hypochondrio positum, amplum, & una sui parte ad sinistram usque hypochondrium protensum, sub cuius sinem lien parte dextra hypochondrii latirabat, parvus admodum & rotundus, totus decolor, & in superficie rugosus, parvi casei mollis figuram referens, ex quo, sicut nec ex hepatis carne dissectis, sed nec ex reliquis partibus corporis incisus, ne guttula quidem sanguinis manavit, (forsan erat intra tubulos venosos & arteriosos concretus (*Rigilensis*) Sed quod magis animadvertendum, cordis basis sub sinistra mamma reperta, muerone sub dextra locato, quod laborans febre, pluribus annis ante obitum correptus, palpante regionem cordis Chirurgus, prophetice quasi visus est animadvertisse, quærenti prædicto Chirurgus palpitationem, de qua conquerébatur, sub sinistra mamma, quem ut ad dextram se converteret mammam monuit, dicens se non ut cæteros alios esse compositum, Sed & notandum maxime, illum nupsisse elegant, & bene partibus omnibus compositæ uxori, cum qua per 12. circiter annos pacifice vixit sine liberis: quamvis in genitalibus ejus partibus nihil deficiens fuerit repertum, nec in structura tota reliqui corporis: Si accuratior fuisset investigatio partium nutritiarum, haud dubie invenissent officiorum ventriculi mutatum situm, pylorum in sinistro latere, ob meatus cholidochi insertionem ad duodenum, quod debuit esse locatum sinistrorsum, ut vena Porta, & Væz origines & væz spermaticæ origo in dextro latere ab emulgente. *Observatio D. Bedæu Medici Nannetensis apud Arvernorum.*

## OBSERVATIO VI.

*Excretio seminis læsa in viro, ob lapidem Glandoso corpori innatum. 1. Concubitus impeditus ob coalescentiam cervicis uteri. 2. Ob magnum lapidem in collo vesicæ. Pter vaginam concreto humore referatam. 3. Ob duas fistulas in collo matricis. 4. Ob Nattam ab uteri labio pendulam feliciter sectam. 5. In femina ob nimium coitum mortua ligamenta Pter teretia semine repleta observata. 6.*

§. 1. **N**Os in *Friderico Trivolo Mantuz*, in Glanduloso corpore illo quod vesicæ collo adnascitur, & in quod Deferentia vasa, postquam coiere inseruntur, seminis elaborationi præter alios interviniente, observavimus lapidem infixum: Non poterat semen hic vir, nisi paucum admodum aquosumque valde in coitu excernere, Dissectusque pro lapidis vesicæ extractione occubuit. *Marc. Donatus histor. mirabil. lib. 4. cap. 30.*

§. 2. Uteri Sinus, seu cervicis, virio Venus deficit, si via seu ieritibus ad ipsum per vaginam non satis apertus sit: Quod ab ortu vel post exulcerationes, coalescente ex parte hac sede, fieri potest, sed raram est; Uti & illud ut officium sinus uteri penitus coalescat: Quod tamen Mulieri cuidam, ex partus difficultate hac parte læsa, accidisse vidimus, ut cum curam illius pudore impedita, naturæ committeret, luxuriante carne, os illud cervicis uteri adeo oecaluisse, ut ne menstruis quidem pateret effluxus, Et cicatrie spissa, sicuti postea sectione post mortem illius, quam viva ferre nolebat, deprehendi, profunde admodum & penitus oblitteratum fuisse. *Platerus Prax. lib. 1. cap. 17.*

§. 3. Nub. femina gravitatem circa pubem sentiebat, nec mariti congressum admittere poterat. In collo vesicæ magnus & durus aderat lapis: Uterus alba, compacta materia erat impletus, nec non major pars vaginæ. *Vide tit. de Hypogastrii dolore.*

§. 4. Uxor N. à venere multis annis abhorruit, & ob dolorem abstinuit: Mortuz apertæ collo matricis, comperi fistulas duas, non callosas, ad anum vergentes. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 5. Femina à labro uteri dextro caro mollis, flaccida, uberis instar, forma oblongæ cucurbituræ ad genu usque pendeat, Nattam seu Napram dices, Apostema carnosum vocant Latino Barbari: Tumor hic septem annorum spatium inerevit, colore naturali similis, dolore nullo, at pediculo tenui uteri labio alligatus, usque ad fastigium in latitudinem mediocrem erat extensus: Sed cum hac de causa concipere non posset, quum inter inguina tumor hic penderet, auxilium, cum esset in ætate 28. annorum, petiit: E quatuor advocatis Chirurgis unus post providentiam rotius sectionem consuluit; Alius in tumore intestina accervari ratus, resolventibus rumorem tractandum dixit; Alter nihil agendum credidit, metuens ne sectione instituta hæmorrhagia lethalis succederet; Ultimus mecum impossibile esse prædixit carneam molem, licet pediculo tenui adhæresceret, cauteriis absumere.

Mulier intrepide ad sectionem se parat: Expurgatur iterum corpus, Inciditur Tumor circa autem, à quo maxima humoris copia vacuata: Caro præcisæ erat alba, spongiosa, cum qua tophacea substantia erat commixta: pependit libras civiles 12. ablato Veneris impedimento concepit, peperit: *Zacutus Praxis Admir. lib. 3. observat. 78.*

§. 6. *Spigelius* in femina à nimio coitu mortua, hæc ligamenta, (teretia seu vermiformia) qua parte vicina sunt utero, semine repleta observavit. *De Diemerbræck Anat. l. 1. cap. 33.*

**A**natomiæ fere unanimiter statuerunt totum scem à testibus per commemoratos ductus, ad rectum procerantiam extensos, exonerari in uteri capacitatem: Verum præter hos utero annexos ductus, *Veslingius* uniusque adhuc aliam viam satis conspicuam invenit, ostenditque etiam à testibus & rubis ductam quandam protendi in uteriligamentum teres seu vermiforme, quod à lateribus fundi uteri utrinque versus inferiora descendit, ac peritonæo cum testibus musculorum obliquo perforato supra pubis ossa clitoridi jungitur, addo; in eamque aperitur: Quod ipsum etiam nos in nostris sectionibus tali modo invenimus: Hoc appellatum ligamentum fatum porosum, sicut vasa deferentia in viris (post tamen

sunt multo laxiores & nonnunquam satis conspiciunt) cunctaque finem evidenter concavum, & semine testibus deficiente in repentino facto sublaris mulieribus madidius repetitum (quod ipsum etiam nos vidimus) tradit idem *Veslingius*: Quæ omnia certo indicio sunt semen non tantum per supra commemoratos ductus deferri in uteri cavitatem, verum etiam aliqua sui parte per has vias defluere ad clitoridem; hæcque dicta ligamenta vermiformia non esse proprie uteriligamenta, sed vera vasa deferentia; Illud etiam ex eo etiam innoscitur quod partes seminales contagio venereo inquinatæ, per hæc vasa deferentia vitulentum semen in glandulas inguinum deponant, in hisque Embones venereos exciunt. *Idem.*

### \* ADDITAMENTA.

#### OBSERVATIO I.

*Conceptio impedita ob internum uteri collum humore crasso obstructum.*

**N**unquam expectanda est conceptio quando internum uteri collum non hiat, sed aut obstructum est ab humore valde glutinoso & crasso, qualem memini me aliquando in cadaverum sectione observasse: aut coaleuit post sui excoarationem ex partu difficili, aut exulcerationem ex humore ætri eo penetrante. *Fr. Sylvius de le Bœ Prax. Med. lib. 3.*

cap. 5.

#### OBSERVATIO II.

*Sterilitas ob uterum contractum & parvum.*

**M**ulier cui carnea excrecentia ab inguinibus lb. xxv. pendeat. Uterus intra rectum intestinum & vesicam contractus locabatur, ut altera vesica ab imperitis & parum in Anatome exercitatis crederetur: Solet autem huiusmodi uterus in nonnullis non raro conspici præcipue sterilibus, & quæ nunquam pepererunt. Sed iis quoque mammillæ parvæ & contractæ sunt, ut ex illis uteri parvitas & exiguitas etiam arguatur. *Arnatus Lusit. cent. 5. curat. 88.*

#### OBSERVATIO III.

*Seminis ejaculatio impedita, ab intumescensione Glandularum.*

**D**om. de la Saulx Seriba Parisiensis Juratus, etsi ex prima conjugæ plurimos liberos suscepisset sexagenarius tamen uxorem denno duxit, quod ætas provecta de pristino robore no quicquam detraxisset; Sed institutum infelix excepti eventus, etsi enim libidinis æstro continuo impelleretur, ac sæpe rigida esset erectio, solus tamen semper imperfectus remansit, quod ejaculatio seminis nulla succederet, quare frustra irritos trahens labores, officio satisfactorius, fracta est naturalis corporis Oeconomia moribusque funestus successit sub finem anni 1681. 18. mense à posteriori conjugio.

Dom. *Frax. M. Juratus Chirurgus Parisiensis*, ex mandato superiorum eadaveris dissectionem instituit; Deprehendit ille Glandulam, Verumontrænam dictam, adeo intumescens & indurata, ut molem exiguae nucis avellanæ adæquaret, ideoque semini transitum omnino præcluderet: quæ induratio jam pidem inducta videbatur, nulla manifesta adparente causa. Hoc vero præterea admiratione dignum, quod materia spermatica cohibita in vasis, ibi in lapideam naturam obdurerit, adeo ut vasa ejaculantia lapidibus durissimis scaterent, plerisque fere rotundis, magnitudine & forma ad pisicæ quadragesimæ tempore in usum venient accedentibus. *Nic. de Bligny Zodiaci Med. Gall. Febr. Obs. 4.*

## ANATOMIÆ PRACTICÆ


## LIBRI TERTII

## SECTIO XXXV:

## De Menstruo Fluxu, Suppresso, Imminuto, Inordinato.

## OBSERVATIO

*Menstrua per collum potius quam per corpus Uteri ferri ostendit Anatome.*

§. 1. UOD mulieres purgentur suis menstruis per collum potius quam per uteri corpus, probat *Columbus* 6. sub finem: Quia, inquit, multo plura & majora vasa sunt in eo quam in ulla uteri parte alia: Præterea exemplo ejusdem mulieris *Sabella* tantum nomine & non re, quæ laqueo suspensa jugulataque est quo tempore menstrua patiebatur, ejus cadaver secavit, diligenterque observavit dicta menstrua expurgati per collum tantum, & non per cavitatem aut corpus uteri: Ibi enim copiam sanguinis vidit, & vasa superius dicta pectinatum, seu digitatim insita plena sanguine fluente aut fluere parato; nec non collum ac finem pudoris madida cruore, & minime uteri cavitatem animadvertit.

§. 2. Similiter duarum mulierum cadavera secimus quibus menses fluebant suspensionis tempore: in quibus prædictas collj uteri venas amplissimas vidimus, sanguinem menstruum effundentes copiosum in colli & finem pudoris, & nullum in corporis uteri cavum. *Severinus Pinus lib. 2. de Notis virginis. cap. 1.*

**H**ic officio collj aliquando cancri aut scirrhj interveniunt, incurabiles, eoque magis si menstrua deficiant, quia sanguis qui expurgari solebat, ibi diutius cunctatus, remoratus & calescit: Rarius in fundo, & cavitatē ipsius uteri maligna ita ulcera & tumores nascuntur. *Idem.*

§. 3. In puellæ, quo tempore menses fluerent, strangulatæ cadavere, *solum finem pudoris* observatus sanguine persusus tinctusque sanguine menstruo, uterus autem prorsus flocos & arctos connivens. *C. Piso de morbis ab illuvie serosa sect. 2. p. 2. cap. 7.*

**P**er collum potius quam per uteri corpus &c. J Non assentitur *Reverius de Graaf* lib. de mulierum organis cap. 9. Rationibusque & experimentis contrarium probat. Videmus, ait, fetus nutrimentum quod toto gestationis tempore à matris sanguine delumini, per nullas alias vias quam per uterum transire: Item illum qui enixus jam factus Lochiorum nomine exliminatur, eadem vias foras emittere, uti id in *Puerperarum* dysfunctionibus quandoque nobis observare licuit: Nec dubitamus quin idem quoque notabunt & qui, nullis hypogastricis vas, vel pizpatribus ad oscula in uteri fundo hiantia diligenter attendent: Quoniam igitur menstruum fluxus, qui ejusdem placentæ naturæ exstiter, per alias vias erumpere nesciunt: Hujus opinionis probatio à sanguinis vas facile deficiunt, quoniam longe plura ac majora ad uterum, quam reliqua ejus loci partes excurrunt. Idem quoque confirmare videtur Lumborum dolor, qui insinuat menstruum fluxum, plerumque à valorem hypogastricorum distensione mulieres perferre solent: Arguerandem evincit oculis ipsæ ostendit, quæ *Hughes* in menstruat issectione uteri membranam à promittentibus ovarum officis asseram esse: Ad tripulatur à *Cesr* lib. 2. de Nat. mulier cap. 2. qui testatur mulieres se vidisse uteri procidentia laborantes, quibus ex uteri osculo sanguis evidentiissime promanabat: Si enim inestruum fluxus naturaliter per uteri vaginam, & non per uterum erumperet, vanus esset abortitionis merus, cum ille in gravidis sanguineis sponte excideret: Inquidem natura faceret id quod ejus minister per venæ sectionem aliquando præstare teneret, ne à redundant sanguine fetus suffocari periclitaretur: Quæres, Si per uterum in gravidis menstrua expurgentur quare non semper abortiant hoc profluvio infestari solite? Respondemus id fieri posse si menstrua moderata sint, & per illam uteri partem evacuetur quæ omnino à placenta libera est: non enim illa omnibus ita partibus, sed tantum alterutri ejus lateri adhærescit: Si vero fluxus immoderatus exstiter, aut per placentæ locum erumpat, placenta intonem, aut coactaque dissolvatur ut fetus superfluis manere nequeat, Idem quoque contingit in modica menstrui purgatione, cum scilicet illa ob uteri osculum primum validissime contraham expurgari non possit, Placentam iteri distensione relaxari, aut parvis quibusdam qualitatibus à stagnante menstruo provenientibus festam perimer: Non tamen hic vaginam sic excludendam volumus, ac si nunquam per illam prodirent menstrua, videmus enim illa per vomitum, alvum, urinam, per oculos, nares, aures, gingivas, mammas, umbilicum, minimum manus digitum, ac alias insuetas corporis partes interdum promanare: Quicquid similiter illa citra naturæ ordinem, per vaginam ntero proximam, tot insuper vas locupleratam

# De Menstruo Fluxu, Suppresso, Imminuto, &c. 71

promovere possent, Quinimo censemus naturam frequentius sese per hanc quam per alias corporis partes exorere: unde contingere nonnunquam potest ut innoxie fluxum menstruum experiantur gravidae.

*Sicns solus pudoris sanguine cinctus* ] Uteri collum *hemorrhoidibus* æque ac intestinum rectum obnoxium est; Hæc fluentes sequentibus signis à mensibus discerni possunt, menses cum fluunt, vasorum ramulos in collo uteri nullos notare possumus, ipsi ex utero pro-

venire, & nullum dolorem nisi in hypogastrio exci-  
tant: Vasa per quæ exterior hæc sit, arteriæ sunt hy-  
pogastricæ & spermaticæ: *Hæmorrhoides* vero rami  
sunt vearum pudendæ, visu tactuque cognosci possunt;  
& dolor nonnisi in pudenda movetur: Eodem modo  
uri aliter tractari debent: Dolorem sedat hoc Ung.  $\mathcal{R}$ .  
mucilag. sem. cydonior. alb. aa.  $\mathfrak{z}$ .ss. croci, ol. terebin-  
thinæ, gallinæ aa.  $\mathfrak{z}$ j. vitell. nvor. n. l. misc. *Barbæ*  
*Anas*, *Præf. cap. ult. part. 3. lib. 4.*

## OBSERVATIO II.

*Anatome Virginis nunquam menstrualis, cujus uterus natura clausus reperitus, sanguis in vasis omnino purus.*

**T**ripere velis penetrare possis: Tantus quoque recentiorum in veritate huius rei per-  
vestiganda labor, ut merito in admirationem rapiaris ipsissimam huius mali causam nondum  
esse detectam: *Galenus* lib. 3. de causis symptomatum cap. 4. septem recenset, quæ huius  
affectus causæ esse solent 1. τὰς μήτρας οὐ καθαρεύουσαν 2. σπυγνὸς τὴν φλέβαν 3. ἢ οὐκ εἶναι  
ἐκ τῶν περικαρμίων ἀγγείων 4. ὅταν κατακρίνῃ τὸ αἷμα παρὰ τὴν γυναικὴν γένειαν 5. ἐμπροσθεν . & 7. ad  
universum pertineat corpus, si hoc ita sit comparatum, ut vel purgatione non egeat, vel  
adit τὴν αἷματιν ὡς ἄλλα: *Idem* idem: Alij naturam menstruum & horum fluxus accuratius  
considerantes, inque hunc studiosius indagantes, repererunt necessum esse ut ad sanguinis  
fluxum menstruatim concitandum aliqua fiat in corpore sanguinis fermentatio: Etenim cum  
secundum ipsum *Galenum* in sanguinis menstrui vacuatione, ille vacuetur sanguis qui in respec-  
tu ad laudabiliorem remanentem, crudior, & temporis tractu vitiositatem acquirere po-  
tuit, hæc vacuatio per nudam sanguinis impulsam, vel solam ejus copiam, vasorumque spon-  
taneam aperturem fieri difficulter concipi potest, nisi præviâ aliquam sanguinis in corpore  
effervescentiam statueris, quam satis probant symptomata virginibus & mulierculis eo  
tempore infesta: Undenam autem hæc fiat fermentatio, an à corde instigante, an ab utero  
irritante, horumque fermentis; an ab ipso sanguine huiusque partibus secum mutuo effe-  
vescentibus, haud facile est concludere: Uteri fermentum hæcenus nullum fuit in contro-  
versiam vocatum, eo quod locus huic asserendo in utero non detur idoneus: Quicquid sit  
uterum omni plane materia fermentescibili destituere huc usque nolui: adde imprimis cum  
haud ita pridem in dissectione puerperæ vitæ defunctæ, uteri substantiam præsentibus pluri-  
bus *φλυκτρίσι* spongiosam totam & porosam repererim, adeo ut his pressis liquor manifeste  
exstillaret: Sanguinem per venam cavam in dextrum cordis ventriculum, & abhinc in fini-  
strum per pulmones redeuntem, in hæc de novo spiritualescere, novasque sibi acquirere vi-  
res certum est: qui ætus sive cordis calori inrenso, sive fermento in eodem latitanti, parti-  
culasque sanguinis fermentaceas noviter in actum educenti adscribatur, non multum litiga-  
bo: Sanguinem ipsum præcipuam huius fermentationis causam esse, *natura ipsius* est con-  
sentaneum & *rationi*: Illi quidem, quoniam sanguis ex partibus fermentaceis conflatu est,  
quæ cum iustam fermentationem subeunt, calorem nostrum æqualem & naturalem conser-  
vant: Cum vero partibus heterogeneis objectis fortius effervescent, calorem adaugent;  
pulsusque celerem & etiam inæqualem efficiunt: *Huius* autem, quia sanguis majori, quam  
natura diutius susserre posset, collectus copia, isque sibi non per omnia similis proprio in-  
stinctu (cui forte fermentum uteri, si illud statuere volueris adjumentum affert) fermentare  
sanguinemque crudiotem, & temporis tractu etiam mixti dissolvendo naturæ noxam alla-  
turum, expellere hoc modo potest: quæ omnia ex continua sanguinis effervescentia, quæ  
ad corporis salutem fieri consuevit, facile confirmantur: Cum itaque modo dicta ad san-  
guinis menstrui fluxum naturaliter concitandum præcipue conferant, si idem secus habenti-  
bus, concludi menstrua plerumque suppressi, hancque frequentissimam esse causam, Eto-  
nim & obstructio veterum ab humoribus viscidis vasa occupantibus, difficilis est conceptu:  
Uteri clausura venarumque angustia rariora esse solent: sola sanguinis dyscrasia frequens est:  
quæ autem nisi per defectum fermentationis, vel male, vel non sientis haud facile explicari  
potest: quævis enim non negetur sanguinem viscidiotem & crassiotem evadere, tamen hu-  
jus rei ipsius causa est legitima fermentatio deficiens, cujus ope alias homogenea congregari  
& heterogenea disgregari consueverunt.

Veritati hæc consentanea esse sequens docet observatio Anatomica, ab Amico commu-  
nicata: Obijt haud ita pridem in valetudinario virgo quædam rustica annorum 22. rubicun-  
da, carnosa, robusta, cui menses fluxerunt: Correpta fuit hæc *syncho putrida*, & die morbi  
quarta ex hac vita discessit:

Post obitum cultro anatomico injecto, omnia viscera sana fuerè reperta, sanguis vero in  
vasis putridus, & uteris natura clausus: Firmo indicio labem hanc contractam; non



tam vitio viscerum quam vitio sanguinis, qui debita fermentatione carens, subsistit, hacque magis magisque deficiente, tandem putredinem sibi acquisivit summam: Uterus natura clausus hic multum accusari nequit, eo quod sanguis nullus in utero cavitare fuerit repertus, inque defunctis, vel iis quæ menstruum fluxum passæ non sunt, uterum subsidere nihil sit novi. Hæc sunt quæ hac vice communicanda habui: Basileæ 28. Maji 1678. *Ex communicatione Excell. Clar. Dom. D. Harderi Medic. Doct. & Philosophiæ Professoris.*

*Circa causas mensuræ fluxum &c.]* Has tradidit Excell. D. De Diemerbrack Anat. lib. I. cap. 24. Arterias & venas habet uterus plurimas, illas tamen numerosiores quam has, nam valde paucæ sunt venæ respectu arteriarum, et quæ per exteriora uteri maxime disperse: Arteriarum superiores cum venis inferioribus, & inferiores cum superioribus, per varias anastomoses coeque vulgo traduntur: Verum ego illas anastomoses hæcenus animadvertere non potui, sed hoc solummodo notavi, venulas ex utero substantiæ emergentes inter sese misceri, & in se mutuo aperiri, verum vultas cum arteriis per anastomoses conjungi: sicque etiam arterias hic illis anastomosis inter se coeque: Subeunt enim arteriarum finibus seu osculis suis uteri cavitatem, in quam sanguinem effundunt, qui in ea quaquaversum distribuitur per anastomosos canales & tubulos (hos nonnulli acetabula & coryledones esse putant) quibus in conceptione Hepar uterinum adheret, in quod tunc temporis hiant, eique sanguinem pro nutritione fortis præparandum infundunt, atque ipsi etiam fungosæ uteri substantiæ, inter utramque membranam sitæ, sanguinem alimentarem copiosius conferunt, à quo uterus tunc in maiorem magnitudinem excrevit, atque sic dum crescit fortis, simul hæcrescit ejus domicilium uterus: Hunc in finem eo tempore vasa admodum magna & turgida conspiciuntur, à copiâ sanguinis quam tunc deferunt & continent: Extra imprægnationem vero qui singulis mensibus redunt sanguis, statim periodis cum fermentatione, seu effervescencia quadam copiosius per arterias ad uterum propellitur, cumque in ejus substantia interiore admodum paucæ sint venæ, per quas tante copię circulatio commode fieri possit, & officia modo dictorum tubulorum sint laxa ac mollia, hinc fit quod redundans sanguis qui ob copiam satis cito circulari nequit, per delibescencia & aperta tubulorum officia, nec non per fines vasorum in collo uteri definentium, ut supervacuas & Nature suæ copiam mollescas, fortis effluit: In quibus vero dicti tubuli firmius oclusi sunt (ut cum in gravidis angustantur ab adherente placenta uterina, in quam nonnulli minimis osculis hiant; aut cum post secundinam violentius cum hepate uterino avulsam obducunt cicatrice, aut alia quacunque de causa obstruuntur) in illis menstrua solummodo profluunt per fines vasorum in uteri collo seu vagina definentium, vel plane subsistunt, imprimis si etiam fermentifica illa qualitas

ad tantam perfectionem nondum pervenit, ut talem effervescenciam in sanguine suscitare possit.

*Uteri fermentum hæcenus &c.]* Quid sit, & quodnam loco generetur illud uterinum fermentum, quod statim mensuris periodis istam effervescenciam inducit in mulieribus vacuis, at non, aut rarissime in gravidis, hæcenus parum inquisitum est: Nos, licet propter rei obscuritatem, hæc in parte judicium nostrum adhuc pro tempore suspendamus, tamen quibuslibet considerandum relinquimus, annon fermentacea materia in liene, hepate, pancreate, glandulis, aliisque partibus genita, & cum sanguine per arterias, aut per vasa lymphatica ad uterum delata, atque ibi aliqua sui parte deposita, & paulatim coarctata, tempore enim in dissectis vacuarum uteris viscosum, seu mucosum quendam humorem invenimus) à specificâ quadam uteri propriæ peculiaris quædam qualitate nanciscatur (sicut eadem in ventriculo aliam peculiaris qualitatem adipiscitur, qua chylus ex alimentis educitur) quæ (humore illo, cui ut subjecto inhæret, in sanis à calore loci mensis spatium ad istam volatilitatem perducto, ut sponte sua effervescat) talem specificam fermentationem sanguini introducat, qua totum mulieris corpus, imprimis partes utero circumstantes (in aliis magis, in aliis minus) conturbantur, & sanguis superfluous inturgescencia sua vasorum officia dilatans, fortis protrudatur: eaque qualitate, aut dicti humoris fermentacæ volatilitate iusta deficiente (ut fit in gravidis, in refrigeratis, in longo morbo detentis &c. item in brutis) illa menstrua evacuatio non procedat. *Diemerbrack ibidem.*

*Virgo rufica, carnosa, robusta.]* Menstruorum suppressionis causa in dicta virgine referenda videtur ad sextam vel septimam supra in textu allatas ex *Galenæ*, quæ ad universum corpus attinent, quod hoc ita comparatum sit ut fluxu illo non indigeat: sic in virginitate, calido temperamento præditis, valido exercitio sanguinem exhaustibus, pauci aut nulli erumpunt menses; vel ad sanguinis densitatem: Porro si clausuræ uteri suppressio adscribenda foret, vel in cavitare comparasset, qui vacuus deprehensus; vel in ejus substantia & inter membranas cohibitus delinisset; ubi putredinem concepisset, phlegmonem induxisset: Inferius subduntur exempla affecti in propria substantia uteri, quia sanguini denegatus exitus per adiacenas vias.

## OBSERVATIO III.

*Menstruorum fluxum non à sola sanguinis in Vtero congestione, sed à toto pendere ostendit*

*Anatome.*

**D**E ratione ac modo quo menstrua excitari solent Medici inter se non conveniunt: Alii quæcumque cum *Aristotele* 2. & 4. de generat. anim. periodicæ hujus excretionis causam referunt ad Lunæ motum: Alij ad solam plethoræ: credentes tota mensis periodo circa uterum collectum sanguinem vasa tamdiu distendere, donec nimia distensione irritata fœcundam suam in uteri capacitatem sese contrahendo deponant: Sed illa speculationibus innixa, potius quam propagandæ veritati consentanea videntur: Ad primum quod spectat, cunctis mensis temporibus hanc vel illam menstruo expurgari videmus, citius aut tardius pro temperamentorum varietate: Non est itaque hujus periodi causa in sempiternos & immutabiles

Lunæ.

Lunæ cursus referenda: Alteram vero opinionem, menstrui purgationis motum à solo exuberante sanguine, qui in uteri vasa perlabitur, eaque copia & calore distendit ac aperit, derivantem, non ratio solum, sed & frequens cadaverum *Dissectio* prorsus refellendam esse demonstrat: si quidem nulla probabilitate nititur quod sanguis (qui perenni circulationis lege continuo per omnes corporis partes moveretur) tanto temporis spatio in uteri vasis stagnaret; Quibus addendum uteri vasa haudquaquam tantam sanguinis copiam continere posse, quanta una periodo evacuari solet: Præterea in mulieribus instante menstruum fluxu subitanea morte extinctis ac *dissectis*, uteri vasa mirum in modum distenta inveniri deberent, at illud nunquam inveniri possumus, nec ab aliis inventum legimus, & licet aliquantulum magis quandoque turgent, illud profecto parum facere possit ad quantitatem singulis mensibus expurgari solitam.

Quibus recte consideratis arbitramur menstruum confluxum statim circuitibus per uterum ex-  
cernendam à fermentatione potius quam Lunæ motu aut sola sanguinis copia excitari: quandoquidem quotidiana experientia constat multis menstrua fluere quæ jejuniâ sese macerant, magnas hæmorrhagias, aut diarrhoeæ morbum passæ sunt: Neque existimamus fermentationem illam in uteri vasis tantum, sed in tota massa sanguinea contingere, quoniam videmus in mulieribus, quarum menstrua fluunt, non uterum solum affici, sed caput doloribus, pedes lassitudine, ventriculum ac reliqua corporis membra his vel illis molestiis infestari: necnon sanguinem illum per nates, pulmones, ac alias jam dictas corporis partes, subinde manare: quæ neuiquam evenirent nisi integræ sanguinis massa fermentationis motu exagitaretur: Ratio vero cur per insuetas illis Naturæ vias quandoque menses expurgentur, potissima nobis videtur obstructio, quatenus scilicet sanguis menstruali fermentatione agitur, per uteri vasa, præter polypos in illis quandoque à nobis observatos, aut aliam materiam pituitosam, cicatricem, pravam conformationem, &c. erumpere non potens, per debiliora corporis loca protumit, & eodem plane modo quo vinum vase firmiter inclusum, dum fervecitur, per debiliores dolii partes qua data porta ruit: Si peccat aliquis, A qua causâ fermentatio illa procedat? Et cur semel tantum in mense menstruum sanguis excernatur, cum reliqua excrementa singulis expurgentur diebus? Respondemus illa ad definitos naturæ motus, & certas illius leges, nobis incognitas referenda: si enim quotidie expurgarentur menstrua, nunquam, aut admodum raro mulieres conciperent, neque hominum quispiam in amplexum feminæ rueret si genitalia perpetuo cruore madarent. *R. de Graaf de organu mul. cap. 9.*

\* *Quidam referunt ad Lunæ motum* Docet experientia quam fœde decipiuntur ij qui asserunt illas periodos minime Lunæ motu ac influxu regi, & variis illis ascripsiis, pro varietate ætatis mulierum fluxum concitari; cum cujusvisque ætatis mulieres, quacunque Lunæ phase vacuentur, cumque aliis mulieribus vacationis periodi sint xxx. dierum, aliis xx. aliis inter hos terminos mediæ, paucissimæ longiore aut breviori spatio continentur, quæ omnia à communi sententia sunt p̄teritas alienæ *Fr. Bayle Diss. de causis Fluxus mensur.*

*Alii ad fluxum plethoræ &c.* Galenum circa causas menstrui fluxus Medici fere omnes sequuntur, mulieres, inquit illi, ad concipiendum & ad nutriendum in utero fœtum, ad certos incrementi terminos destinare dubitant: ita à summo conditore comparari ut majorem sanguinis copiam gignant quam esset necessarium ad proprii corporis sustentationem; Sic enim factum est ut superfluous sanguis graviditatis tempore in fœtus alimentum citra ullam matris incommodum impendatur: Inde etiam orta est necessitas menstrui purgationis in his mulieribus quæ nec

nutriunt, nec in utero gerunt; ne sanguis quem in aliena comoda cumulant, copia vires optime in ipsarum perniciem cedat. Quis autem non videt *Galenum* in hac questione id exponere quod est periplocum, quod vero obscurum est sine expressione relinquere: Dicent ejus defensores dicte vacationis causas clare ab eo fuisse expostas, & ea serie qua alia ab aliis dependant, etenim si proxima quæritur vacationis causa, assignat *Galenus* plenitudinem, ultetius hanc ait cumulari ob viam desidem; desidium denique refert in mulierum naturam qua fuerat à Conditore donata, ut scilicet gravidæ, quæ continent in utero fœtum sine incommodo possent superfluo sanguine nutrire quem in orio cumulant &c. Verum si singula accuratius expendamus, statim patebit quam inani fundamento nitantur, *Galenicis* asserunt mulieres esse ad desidium natas, contrarium sane suadent historie Amazonum & mulierum Spartaniarum, idem rusticæ & quæ casta sequuntur, menstruo tamen circuli obnoxie, concipientes, parientes; unde manifestum ad eam vacationem nullatenus opus esse ea plenitudine quæ per orium & desidium cumuletur: Adde quod plurimæ stæti habent vacationis periodos, quibus sanguinis copia infra mediocritatem consistit, Et aliquando plenitudo ipsa imponit consuetam vacationem, quæ non ante concipitur quam fuerit per v. s. sanguinis multitudo immixtura: At demum ejusmodi vacationem promoveri à plenitudine, ac causa non patet cur per uterum potius quam per aliam quamvis partem evacuetur, Eam profecto nunquam ex postis principis deducunt, qui potius contrarium omnino ex his infert; Etenim si sanguis ideo profunditur quia multitudine excedit, & vasa distendendo eorum oscula aperit, manifesta consequentia deducitur ea vasa quæ sunt debiliora citius à distendendo plenitudine, aperti osculis exitum sanguini esse daturæ, & ea de causa ante patebunt vasa sanguinea ovarium, pulmonem, & aliarum partium (quod aliquando contingit) quam uteri; Sanguis enim depanitur ab arteriis uteri in *tubuli membranas*, quorum oscula plurima in cavitatem uteri vergunt; qui *tubuli* præterquam quod densa uteri substantia firmantur, ipsi sunt adeo validi ut sit ante metuentis ruptio majuscularum venarum quam ipsorum dilatatio, nisi ab aliqua causâ averfator mollescit, qua fiat ut vel à sanguine exitum quærente facile dilatentur, vel etiam sponte laxentur, unde patet plenitudinem non sufficere ad vacationem per uterum perficiendam; præterea, qui cumulanda plenitudinis necessitatem asserunt in mulieribus, quod dicent de vaccis, equibus, ovibus, &c. quæ non secus ac mulieres concipiunt, & suos fœtus in utero nutriunt? an uberiores quam opus sit pro corporis sustentatione sanguinem gignunt? Si negent, quomodo in utero fœtum nutriunt? si affirmant, quoniam ab utero quæso, in non gravidis ille excessus? nec enim ulla patiuntur sanguinis vacationes menstruas, aut alio quocumque circulo, dicent forte in pilos absumi, At eque &c.

cum sunt gravidae suos non minus retineant & nutriant pilos quam reliquo tempore. *Idem ibid.*

*Sed illa Speculationibus innixa &c.* Quapropter explosis furibilibus sententis, alio est mentis acies converrenda, & quia non ita facile est in ipsis uteri anfractibus intueri, ea accuratius inspicienda sunt quae simile quid cum utero patiuntur, & minus abstrusa habent suorum phaenomenon causas, ut ab his si minus certissima via sterneretur ad ea quaerimus, ea saltem patetut qua proxime ad ipsa accedamus:

Observevamus itaque quae geruntur in Terra, quae summam habent cum utero mulieris similitudinem, est enim Terra quidam uterus tum injectorum tum insistorum seminum, & vicissim necesse censendus ager ferendis animalibus à natura destinatus; Ut hic, ita illa commissa sibi semina fovet blando calore, quo spiram vim genitalem germinis excitat, ipsique succum quo perfunditur, ad incrementum supponit; Non tamen quævis terra est fecunda, nec quæ fecunda est quovis tempore potest vim suam exerere; debet enim injecti vis germinis externo, sed blando calore suscitari, & idoneus humor accendere quo seminis alba substantia diluatur, & in succum lacteum, germini nutrienda idoneam commutetur: Ea de causa necesse est prius terram incalescere, eosque ejus meatus relaxari, ut is humor em excipere, attenuare, percolando varie alterare, & in semen siliu veluti deducere possit: Ad illos omnes effectus necesse est multa concurrere, quibus per seipsum non solum terra, sed etiam uteri interior ad fecunditatem virtus innotescet, & aperietur via ad invenienda causas admittendorum circa subjectam materiam phaenomenon.

Ac primo quidem qui requiritur moderatus calor, is excitatur nunc concepto in terræ penetralibus fervore, nunc extrinsecus accedit à Sole &c. aut potius necesse est alterius vicibus nunc ab illa nunc ab hac causa terram incalescere, ut qui per calorem in plantarum nutrimentum excoquantur in terræ meatibus succi, modo uberius in radices, ut sit hyeme, modo ut sit vere & aestate, in caulem largius impendantur; Non sufficit tamen solus calor ad terræ fecunditatem, *Fermento* opus est, à quo blandus fervor interius excitatur, & auxiliante calore externo, nunc intensiore, nunc remissiore, pro varia plantarum procreandatum indole, secundum particulas insensibiles exagitantur, rarefacit, laxaturque: Id præstant *Sales* varii, quos ea de causa vegetabiles appellant Chymici, inter quos *Nitrum* eximias obinet vires; is enim ob summam mobilitatem, & ad penetrandum aptitudinem, terram facillime permeat, ejus particulas exagitat, separat, attenuat, meatus poros excavat, hinc terra evadit spongiosa, friabilis & humori facile pervia: Denique necessarius est humor, seu irrigatio, seu deciditibus convenienti tempore pluvii affusus, qui factos à fermento, seu nitro aliove sale, ductus facile subit: aut potius, ut in siltationibus observamus, necessarius à vi quacunque rapinat in exilissimas ipsorum cavitates, in illuc dom excurrit subligitur ac idoneas acquirit qualitates ad plantarum nutritionem eodem fermento, quod terram præparavit, nutrimenti ejus modi coctionem promovente; hinc stercore quæ multo furnitro, aliivæ salibus vegetabilibus referta, sparguntur in agris, quibus mox semina committenda; hinc *Pergula* 1. Georg. jubet aqua nitrata perfundere injicienda in terram semina.

Ut in terra fecunda, ita in omnium animalium utero, ad conceptum idoneis, observantur illa eadem quæ fecunditatem efficiunt aut comitantur, aut consequuntur, fervor, & quæ consequitur substantiæ rarefactio aut relaxatio, humorum præparatio ac deductio &c.

Oviparæ animantes statim temporibus uteri fervore pariuntur, qui manifestus fit ex eo quod ejus generis formæ fere cæcis tantum temporibus ovipariant & mares admittant, stimulo veneris luctant, quem facit uteri fervor: dum pudenda rapidiore sanguinis, & spirituum motu titillant: Quod æstinet ad Viviparæ, vacis, equabus, canibus, &c. fervor ille recurrit statim temporibus; at quo tempore vehementius ille animantes ad venetem incitantur, magis æstuat uter, pudenda fiunt tumidiora, &c. equæ largius profundunt serosum quid, Hippomanes dictum, tum furore quodam aguntur, caudam jactant frequentius metunt, hoc & illæ vagantur, ut vix quiescant omnia æstuantis in utero sanguinis signa.

*Fervor* ille uteri in mulieribus & similibus mensibus fere circuium recurrit, sique cum insigni sanguinis profusione, quam mulieres patiuntur ab anno 14. aut 12. ad 30. fere, vix citius aut tardius: Fluxum illum sanguinis cum quodam uteri fervore contingere præter allata superius, probatur, quod imminente illa menstrua purgatione ællus circa uterum at spinam percipitur, sique quædam in vicinis partibus tensio, quæ interdum ad coxas extenditur, & scilicet inferi lastrudinis: Aliquando si nimis æstuet uterus, nec facilis pateat effluxui via, tum sanguinis massa exagitata in univerto corpore tensionem quandam efficit, & modo in his, modo in illis partibus phlogosis quædam excitatur: præterea tunc uterus laxatur, non solum aperto orificio interiori, & *tubularum* ipsius osculis reteratis, sed etiam substantia ratiore facta; hinc uterus tunc major est quam reliquo tempore, hinc vas reteratis facilis patet exitus attenuato per eundem fervorem sanguine.

Præterea fervoris illius necessitas evincitur ex uteri fecunditate. & modo quo fit conceptus; hoc enim fervore dom dilatur uterus, aperiturque vix inconspicue quibus semen masculinum intus excipitur: Nec enim hæret in interi cavitate, sed in ipsius substantiam imbibitur, ab feminei seminis permissione turgescit & radices agit, quibus delatum per apertos fervore meatus succum nutrimentum accipit; Deinde ut in terra solent plantarum semina, caulem profert carneum, placenta scilicet uterinam, ex qua fructus instar erumpit ovum cui ex germine liquamini innatante adnascitur alla planta, mox migratura in animal, tandem in hominem si ex humano semine fuerit excitata: Ex his patet quam male *Arist.* & hoc sæculo *Harvæus*, in uteri cavitate injectum nuper semen quæsierunt.

Jam vero inquirendum est quæ sit causa *feroris uteri*? quare statim periodis recurrit? quare in mulieribus & similibus sanguinis profluvium concitetur, cum equæ, canes, & animantes fetosum quid, idque paucum, ab illo uteri fervore producant? & quomodo cum primaria illius fervoris causa consentiant tam admiranda symptomata? Ac 1. quid sit *Fermentatio* sciendum. *Fermentatio est motus insensibilis particularum corporis fermentescens, qui motu illa particula varie exagitantur:* Causa proxima illius motus est ignis in moleculari confertiores collectus; quæcumque vero causa efficit ut ignis ita colligatur, ea valgo censetur fermentationis effectrix, & *Fermentum* appellatur: Ignis autem illa collectio bifariam potissimum contingit 1. per obfessionem contrarii, ut loquuntur, sic hyeme constipatis terræ spiraculis ab ambiente frigore, terræ interiora tepescunt ob reteratos halitus calidos. 2. Ignis colligitur enim halitus vel liquor cuiusvis corpori affusus ita in ejus poros penetrat, ut particule liquoris, nec quos subeunt meatus impleant, nec aliud quicquam ad residuum capacitatem implendam in societatem admit-

tant, patet tenuissimas & facile divisibiles ignis particulas quæ præter adfunt, ut è vicinis corporibus in liberiores spacia statim conflant, ubique in grandiores moleculas colligantur, & dum innatantia in ipsis corpuscula exagitant, penetrati corporis partes concutunt, ab invicem separant, totumque corpus aliquando dissolvant: Ad effectus ejusmodi præstandos insignem vim obtinent Sales omnis generis, & stillariti è salibus liquotes, ut constat innumeris Chymicorum experimentis. Docet etiam experientia ea omnia alimenta quæ sale quocunque abundent, animalium sanguinem ad facilius effervesendum in corde disponere acerbiorēque ac calidiorem efficere: multi etiam alii succi eadem virtute pollent, nullusque est qui non possit in aliquo corpore fermentationem excitare: Interim quod maxime ad rem nostram facit, advertendum est in fermentationibus corporum effervescentiam particulas agitari, attenuari, corpora ipsa rarefcere, emolliiri, eliquari, incalescere, aliquando fumum emittere & in flammam facessere, quæ omnia confertiorē ignem testantur: *non subditur*

Cum itaque ex dictis pateat fermentationes excipari collectione ignis intra exilissimas corporum particulas, & illam ignis collectionem per sales facillime promoveri, præsertim in sanguine, inquirendum an & quomodo his mediis fervor in utero statim periodicis exciteretur: Quæ investigatio ut facilius & certius ex præmissis instituat, insulam propositæ terram inter & uterum analogiz.

Si terra in aperto aëre Solis calori & modico rori exponatur, cavendo ne obstruatur imbre copiosiore, sensim nitrum concipit, seu in ejus gremio generetur, seu extrinsecus adveniat, ejusque nitri tanta copia impletur temporis progressu, ut inde turgere, intumescat, frabillis evadat, imo in tota ejus superficie aliquando nitrum efflorescat, cujus proventus major fit, & breviori tempore, si statim initio terra paucio nitro aut sale communi confertatur: At si aqua largius illi terree affundatur, universum nitrum abluergitur, & terra ad pulvisum statum reddit, sitque caput mortuum.

Jam ad Uterum, quem quod attinet ad circumdantem, simile quid cum terra habere diximus, orationem convertamus: Uterus habet plexum fibrarum, quibus constat, ita comparatum, ut postquam ad debitum pervenit incrementum, Salis cuiuspiam, seu fermenti particulas è sanguine sensim decerpant, aut ex eodem sanguine materiam idoneam fecerant, quæ in fibrarum interstitiis heret, ibique in sales quosdam, aut corpuscula fermentativa, tanquam in proplasmatis efformatur: Quibus salibus, & particulis fermentativis ubi turgere incipit uterus, statim ignem uberior colligit, fervorem concipit, dilatur, rarefcit, rubulorum oscula in ipsis cavitatem hiantia aperiuntur, sanguis ipse fermenti vim excipiens attenuatur, & per reteratos ductus in uteri cavitatem effluit, indeque foras effunditur: Quia vero primo fermenti imperi non patet sanguini satis facilis exitus, cum rarefcit, vasa in utero & circa uterum dilatantur, æstusque ad spinam sentitur: ubi vero sanguis libere fluit, collectum fermentum abstergit, & ad similem exaltationem & etiam novam efficit in utero fermentationem, & ecce causam circuituum: An possunt magis congruere inter se quæ in terra à nitro, & in utero à suo fermento excitantur phenomena? eorum enim idem est principium, idem progressus, idem exitus.

Sed unde habes salē quendam, seu quasvis par-

ticular fermentativas in utero colligi? Eas in utero colligi, seu congectione, seu generatione, seu utroque modo, manifesto demonstratur illo nteri fervore quo illius substantia molliuit, rarefcit &c. quæ nulli alteri parti contingunt: Quod autem illa fermentatione sit salē cuiuspiam adscribenda, potest conjici ex ipsa salium lixiviorum & vegetabilium natura, in quibus fermentandi vis eminet, maxime circa sanguinem: quomobrem mulieres, quantum sanguis plus bilis, ac proinde plus caliditatis continet, facilius & brevioribus periodicis, ceteris paribus, purgantur: Adde quod plantæ abundantes sale volatili menstruas purgationes accelerant, & easdem promouent si fuerint suppetellæ, seu à sanguinis transitu, seu à ductuum obstructione: & enim plantæ uberem fermenti materiam utero suppeditant, & sanguinem ad fermentationem disponunt: quæ de causa à Galeno commendantur chamædrys, chamæp. centaureum, sicut aromata omnia, & Hippocr. aph. 28. aromatum suffusio, quo præcipue continentur sales volatiles calore exciti: adde iterum quod animalibus quamplurimis solear sal exhiberi, ut ejus usus ad venetum incitentur, & ad faciliorem conceptionem disponantur inducto nteri fervore, Nec contemnendum est argumentum quod Ægyptiæ mulieres fecundiores sunt, & breviori tempore gerant utero, quia aquam Nili potant, quæ nitro abundat, aliisque salibus vegetabilibus, quorum ope Nilus totam Ægyptum quam irrigat adeo fertilem efficit: Ex his nihil est quod miremur effectus qui à sanguine menstruo produci perhibentur, quos reliquis sanguis ineptus est producere, sanguis enim menstrualis salibus fermentativis turgidus in quæcumque corpora sese insinuat facile fermentationem excitat majorem minorem pro materie subjæctæ dispositione, & salium quos continet copia & indole, unde fit ut aliquando plantæ arefcant, si solo sanguinis menstrualis halitu peribentur &c. maxime si fluxu à corpore cacochymo:

Quod in utero, ob specialem fibrarum ipsius contextum, sales quibus ejus excitatur fervor, colligantur, licet inferte in ipso utero sales eosdem posse formari: ideo enim colliguntur, quia in uteri rimis aut plicis ac cavitatibus rite efformatis retinentur: Ergo propter loci figuram, si idonea ibi hæreat materia, salium recensitorum figuram & vim acquirunt.

Supereft explicandum quare ab uteri fervore pleuraque animantes tantum fetosum quid & parvum, mulieres vero sanguinem profundunt: hujusce varietatis causa petenda est ex speciali uteri structura, etenim in mulieribus sanguis à capillaribus uteris arteriis in *tubis membranaceis* deponitur, è quibus in venas remeant suo ordinario circuitu: *Tubi illi exilissima* habent oscula, in cavitatem uteri hiantia, quibus quando à memorato fervore relaxantur, sanguis profunditur, è quibus etiam partim post conceptionem emergunt placentæ uterinae radices, & vasa quibus succus nutritus defertur ad fœtum: Illi tubuli adeo facile dilatantur vi fervoris excitati, seu à seminum utriusque sensus commissorum turgentia post conceptionem, ut in gravidis eorum cavitates parvi digiti magnitudinem æquet: Inde fit ut mulierum gravidarum uteris, non modo majorem latitudinem acquirat ad fœtum continendum, sed etiam crassior evadat: Secus omnino contingit in uteris eorum animantium in quibus nulli sunt hujusmodi Tubuli: etenim graviditatis tempore uterus mutata in latitudinem crassitie membranam æmulatur, quod proculdubio dedit Galeno occasionem errandi: & extra graviditatem, cum solitum fervorem concipit, ob ductuum exilitatem fetosum quid ac tenue tantum profundit, non sanguinem ut in mulieribus, & in similibus, ob memoratam uteristructuram quæ in his utilisque est si-

millis quoad hos tubulos, & alia nonnulla. In singulis animantium speciebus uteri propriam fortiti sunt figuram, & speciem librarum plexum & contextum, ut ex sectionibus patet quæ varietates efficiunt ut in variis animalibus uterine placenta, & ipsi fetus adeo discrepent.

Ex illata citius vacuum vacuationis mulierum causa, facile deducitur eorundem in variis mulieribus inæqualitas, cum enim vacuatio menstrua fermenti memorati virtute concitetur, quo citius sufficiens illius quantitas fuerit collecta, & satis exaltata eo citius vacuationem menstruum concitabit: ut autem citius vel tardius fermentum illud in utero succrescat & vigorem acquirat, efficiunt videtur ratio, temperamenti, regio &c. quæ quoniam in variis mulieribus sunt admodum varia; varius est necessarius vacuationis circuitus: Si quando hic mensem Lunarem æquat, id fit ex accidente, non ex aliqua quam Lunæ influxus inducat necessitate, quamvis vulgus aliter opinetur.

Ue, quæ dixi fiant magis perspicua, operæ peritum erit explicare insigniora quæ ex eodem fonte oriuntur symptomata, seu *menstrua purgationes suppressæ* sint, seu citè, seu *perperam procedant*, & demonstratio quam habeant cum ea, quam assignavi, menstruum purgationum causa connexionem: Postquam fermentum uteri coepit vim suam exercere, si à quacunque causa conflueret vacuationis viæ occludantur, sanguis fermento imbutus & turgescens, per capillares uteri, venas in majores remeare reliquo sanguini commiscetur, & quam suscepti effervescentiam ipsi communicat; quæ effervescentia dum tota sanguinis massa tarescit, vasa distendit, & quia in utero incipit fermentatio & expansio sanguinis, sensus quidem excitantur, non modo calor & tensionis in partibus utero vicinis, sed etiam resistentis ad superiora sanguinis: Si validior ea fuerit rarefactio & expansio, sanguis, cui jam continendo impar est vasorum capacitas, in partes debiliores struit, in quibus nunc inflammationes efficit, nunc testatæ vasorum oculis effunditur, aliquando per vomitum, aliquando cum rursus pulmone ejcitur, aliquando è uribus effluit, alias ex aliis partibus ejcitur, Eorum omnium ratio est in promptu, etenim brevi cessaturum est sanguis per illas partes effluviæ, cum scilicet fermentum in sanguinis massam illapsum magnam partem fuerit dissipatum, & sanguis ipse vacuatione refrigeratus, Et quamvis illud non sit omnino expertus uix, & periculi non contemnendi, salutare censendum est, quia eo vitantur majora pericula inflammationum, aut alia prohibentur incommoda varia, pro variis sanguinis vitis & multiplici partium infirmitate.

Mulieris prævidæ, & nutrices sine uoxa purgatione menstrua privantur, illæ quidem, quia cum in conceptu uteros sese expandit ad vitile semen excipiendum, iterumque se contrahit, ac singularem partium suarum convenienter disponit, ut è suscepto semine proferat placenta uterinam &c. totus fibrarum ipsius contextus ita immutatur, ut fiat omnino ineptus ad fermenti coagulationem, aut generationem, nec redit ad statum pristinum uterum quandiam mulieres utero gerunt, aut nutritione integra lactis donantur: Quibus ob pravam uteri constitutionem per conceptum uteri placentæ, timæ, aut alveoli excipiendo fermentum destinati non omnino obliterantur, statim periodicis leviem sentiunt in utero fervorem & agitationem, quam si fuerit major sequitur sanguinis profusio cum præstulo abortus.

Reliquæ mulieres ut plurimum à menstruum suppressione innumera eaque gravis symptomata patiuntur, Fœtus virginum color insignis & satis

frequens affectio est, quæ illam suppressionem sequitur aut comitatur: constat inquam, quia sepius utraque hæc affectio causam habet communem, sanguinis crassitiam aut visciditatem, quibus facile obstructions excitantur, & sanguis redditur minus aptus nec fermenti uterini vim excipiat: crassities sanguinis mulieribus melancholicis est magis familiaris, ob uberiores succi acidi copiam, qui in sanguine est insitit coaguli, eumque dum nimis cogit ac densat, ad fermentationem seu in corde, seu in utero minus aptum efficit, fermentationem generationem impedit, & si quæ genita sunt opprimit: Ita affectus medicamenta ex chalybè præparata maxime conferunt, quia scilicet metallum illud introsumptum succi acidi actioni obijciat, ejus vim obcurdit, ut solet extra corpus aque regie ælimoniam insingere, & dum solet ab eodem succo exagratum, quem concipit fervorem chylo & reliquis humoribus communicat, sicque sanguinem magis attenuat, illumque reddit idoneum ut per exilissimos viscum doctus libere fluat, & ob tenuitatem facile deponat in locis destinatis quos continet, seu utiles seu inutiles succos.

Sanguinis visciditas, quam potissimum punita dulcis & pituita crassa efficit, non minus quam induta à succo acido crassities, fermentationem generationem impedit, & si quæ sunt per sanguinem diffusa, suo sinu viucta veluti detineri, prohibetque ne suas vires exerant. Visciditas præterea efficit ut sanguis in exilissimis uteri & viscerum ductibus hæreat eosque occludat: Mulieres quibus ab hoc sanguinis vitio suppressæ sunt menstrua, juvantur is medicamentis quæ abundant sale volatili; Sal enim ejusmodi egregia pollet virtute fermentandi & detergendi, & consequenter attenuandi ac solvendi obstructions à pituita viscida inductas.

Mulieribus quibus ex solo uteri vitio suppressæ sunt menstrua, aut quia à prima conformatione angustiores habent uteri ductus, aut quia nullos habent, aut quia à morbo vitium aliquod contraxerunt, Ex illece ad fermentum congerendum dispositio maneat integra, statim periodicis vim ejus sentiunt, in utero, & circa uterum, & aliquando toto corpore distensiones patiuntur, & modo levius modo gravior afficiuntur, quæ omnia facile est ex dictis deducere.

Quibus à prima origine ea obigit uteri conformatio, ut nullatenus in eo fermentum possit coacervari, ex utero periodicum uteri fervorem, nec menstruas vacuationes patiuntur, nec suppressionis eandem incommoda affliguntur, nec partum, nec concipiunt, & si reliqua bene habent, optima valetudine fruuntur, illis mulieribus sunt longe robustiores ac diutius vitam protrahunt, quod quoniam in quibusdam virginibus licet observare: Illa omnia hoc modo mihi videntur contingere, Robustiores sunt ejusmodi mulieres & virilis temperiei, quæ quæ solet materia fermentativa in aliarum uteris colligi, & à sanguine separari, in istarum sanguine retinetur, & ipsum facit fervidiorum & acriorum, aptumque ut melius in corde ferveat, ac majorem proferat spirituum copiam, ut in viris, ex quibus omnibus corpori robur accedit ad functiones quasque facillius & felicius obeundas: Eadem mulieres sunt steriles, quia in illis uteri substantia, cum memorato fervore nunquam tarescat, ductus suos non potest aperire ad vitile semen intritus excipiendum; denique non affliguntur gravissimis, quæ menstruas vacuationis suppressionem plenius sequuntur, symptomatis, quia deest ille fervor à quo solet procreari.

Menstruas purgationes sunt aliquando copiosiores magno sanitatis detrimento, cum aliquando cachexiam



reretur aliquis quo pacto fieri potuerit ut bina ista orificia minus fuerint manifestata? Sed mirari desinet ubi consideraverit sub alis, sive Nymphis latere hoc vesicae orificium, ac nisi attentius attendenti patere; accedente illo ex falsis tabulis praedictio, propter quod nequidem inquiri solet à plerisque in rem ipsam, quippe quam supponunt esse talem qualem videat pictam.

§. 2. Mulier post puerperium menstrua amplius non habuit: Mortua cervix uteri spississima est reperta, ac velut cartilaginosa, quae transversus digiti spissitudine coaluerat. *Vide tit. de ventris dolore.*

§. 3. Mulieri ex partus difficultate os cervicis uteri adeo coaluit, ut nec menstruis pateret effluxus. *Vide tit. de Partu non nat.*

## OBSERVATIO V.

*In juvenula ex suppressione primorum menstruum mortua, vena ab utero ad mammas tendens, & vena ad uterum tendentes sanguine distenta & nigra reperta, uterique quasi gangranosus &c. cum ejus collo distorto.*

**I**uvenula 14. annos nata, pulchra, cum primum erumpere deberent menstrua, subito incidit in morbum gravissimum, cum summo corporis ardore, tremore, inquietudine, aphonia, oris contorsione, rubore totius & suppressione profluvii: Nihil autem proficientibus medicamentis eo devenit morbus ut tertia die, nulla s.m. instituta, obierit:

Secundo eadavere superiorum constitutio bona reperta est, nisi quod vena sanguinem ex utero ad mamillas deferens, tota illius copia denigrata esset, felle omni ex vesicula in intestina depulso: Venae omnes circa uterum distentae & nigerrimae: Uterus etiam nigrior, ut gangraena corruptum dixeris; Collum contortum crassissimum habebat. *Ioh. Valsl. Rumlerus observ. 55.*

## S C H O L I A.

\* *Juvenula xiv. annos nata*) Mutationes omnes naturales in corpore nostro adscribit Sylvius de le Boë Prax. libr. 3. cap. 3. §. 57. humoribus secundum naturam in ipso existentibus, ac paulatim dominium in ceteros successively obtinentibus, donec iterum aliis cedant: Quod si quis secundum illud dominium humorum successivum hominis Aetates distinguendus putaret, non incommode tres numeraret primam quae Puertitiam & Adolescentiam complectens Pituita fluori aërosae sive lymphaticae subjiciatur, 2. quae Juventutem & virilitatem continens Bili pareat, 3. quae Senectutem utramque impleas Pituita viscidior, mucosae ac melancholicae obsequatur: Observatum enim à medicis nominatos humores successively dominium exereere in corpore; Postquam nimirum pituita fluidior ad corporis incrementum necessaria functa est munere, auctumque est ad commodam staturam corpus, Bilis ei succedit ad robur ipsi conferendum, tum ratione sui & individui, tum ratione alterius & speciei: Eo tempore cum calor in corpore observetur major, isque Bili praesertim debeat; merito censendum Bilem tunc ceteris dominari humoribus, donec eadem paulatim deficiente aut inertiore facta, senectute adventante, ipsi succedat pituita tenax & melancholica; vere namque Pituita tenax est ipsa melancholia: Bilis dicta cum abundet sale volatili oleoso, vim habet blande incidendi tenacem pituitam: vim autem istam suam ubi exserit supra ceteros humores, sanguinem quoque reddit rariorem, aucto universi corporis calore; quia non tantum in maribus feminis productionem molitur; & mentum pudendaque lanugine & pilis vestit, sed in feminis similia praestat, mammarum extuberationem promovet, uteri vasa impedita expedit, sanguinique menstruo viam sternit &c. Quod si Bilis ob constitutionem naturalem, vel dictam pravam minus sit acris, non mirum si sola menstrui fluxui promovendo haud sufficiat quia diutius quam expediebat idem fluxus cessare desideretur.

*Cum corporis ardore, tremore &c.* Fieri tamen potest ut non prodeuntibus mensibus per uterum nihil tamen detrimenti mulieres patiantur, si sanguis redundans per alias vias, os nares &c. molliatur: unde licet via ista non sit naturalis, non coaccervatur tamen nec corrumpitur sanguis, nec proinde memorata symptomata sequuntur.

**T** Remere, inquietudine, aphonia &c.] Endopos  
 2. Successerunt autem hæc acciden-  
 tia interrupto, ob nimiam copiam, sanguinis soli-  
 ro in vasis circuitu; quem optime expressest Hip-  
 pocrates. 4. de vict. acut. vult. 43. Fieri aliquem re-  
 pentis sine voce venarum interceptiones faciunt, si bene  
 valenti hoc accidat sine occasione aut alia forti causa:  
 Venam igitur secare oportet in brachio dextro inter-  
 nam, & detrudere sanguinem secundum habitum &  
 etatem, iuxta ratione plus aut minus: Constringunt  
 autem plurimis ipsis hæc, rubores faciei, oculorum

immobilitates, manuum dejectiones, dentium strida-  
 res, pulsationes, maxillarum adductio, extremi-  
 rum refrigeratio, spirituum per venas interceptiones  
 &c.

Vena sanguinem ad mamillas deferens] Frustra  
 hæc, postquam arteriis sanguinem defecit, referri  
 autem pervenas Harveyi invento cognitum: Imò  
 in viris quoque Venas istas semper conspeximus, qui-  
 bus tamen nec mammae sunt nec uterus. Valerius  
 in Nativ.

## OBSERVATIO VI.

*Menses suppressi aut diminuti ob Polypos, uteri aut cordis vasa  
 opplentes.*

§. 1. **I**N uteri vasis sæpe reperiuntur Polypi, & quidam tanti ut vasa adimpleant, nec non  
 quandoque in callosam quasi substantiam degenerent. Regn. Graaf de mulierum or-  
 ganis cap. 8. Rario cur per insuetas naturæ vias quandoque menses expurgentur, potissima  
 nobis videtur obstructio, quatenus scilicet sanguis menstruali fermentatione agitatus per ute-  
 ri vasa propter Polypos, in illis quandoque a nobis observatos, erumpere non potest. Idem  
 ibidem.

§. 2. In virginis, cui cum perpetuo defuissent menstrua purgationes, corde Polypi reper-  
 ti sunt; Quid simile in puella observavi, in qua sub venaerulo ad pancreas, & in toto ab-  
 domine aderant glandularum racemi, nucis instar, & in corde globuli, velut avellanæ fru-  
 ctus gypsea quasi materia excitari, In hujus etiam corde Polypi stagnabant. Marc. Adalpinus  
 Tractatu de Polypo.

§. 3. Sanguinis vitium menstruorum suppressioni, uti & hæmorrhoidum sæpe occasio-  
 nem præbet: si tale sit quod illum minus fluxilem reddat, uti sit si crassior quam illius  
 natura requirebat: vel ciborum ingestorum crassiorem succum gignentium causa, vel  
 quia sero minus dilutus, vehiculo hoc suo destitutus, crassescit: quæ & causa quod & cæ-  
 checticis & hydropicis, sero è venis exudante, menstrua suppressa sint: selectaque vena  
 crassus sanguis potius quam serofus detrahatur: Sed & coralli alicujus rubri, vel etiam  
 albi instar, si illum congelari contingit, qualem alii quoque se vidisse prodiderunt, &  
 nos aliquando è venis extraximus, illud longe magis efficiet: Platerus Præceps lib. 4.  
 cap. 14.

**S**anguinis vitium menstruorum suppressioni &c.]  
 Sanguinis à quovis mense parcius effluentis cau-  
 sam vix unquam in ipso sanguine querendam, ut  
 plurimum inveniendam in uteri vasis & cavernosa  
 substantia, censet Sylvius de le Boë Prax. lib. 3. cap. 3.  
 §. 112. nam si sanguis, aut esset glutinosus, paula-  
 tim cessaret ipsius effluxus, prodacta in ejus vasis ob-  
 structione, quod tamen rarissime observatur factum,  
 nisi ab aliis in dicta commissis erratis: Existimo igitur,  
 si non semper, ut plurimum saltem in cavernosa  
 uteri substantia, & sui generis vasis querendam  
 inveniendamque parcius fluentium menstruorum  
 causam, & quidem si recte conjecto, in substantia  
 uteri stupidiore, atque circa menstruorum tempus  
 minus cavernas suas expandente, & imprimis obpi-  
 titum copiosiores, ac sæpe viscosam in ipsa hæ-  
 rente: Pituita enim partibus quibuscumque adhærens

facit eisdem in mota suo qualicumque torpidiores;  
 sicut in sensu hebetiores, quod idem accidit in ute-  
 ro, qui fluxu menstruum instante singulari sensu  
 concitatur, atque ad cavernosam corporis sui sub-  
 stantiam explicandam excitatur: quod si à nimia  
 pituita undecunque tandem in ipso resistente obtu-  
 sior reddatur ad notatum illum stimulum perficien-  
 dum uterus, non mirum si præterea minus succedat  
 peculiaris partium ipsius motus in cavernularum suarum  
 expansione manifestus: Sed non mirum si non  
 tantum minus explicentur aperianturque ductus in  
 utero cavernosi, sed si insuper concidant, claudan-  
 turque iterum solito ciculis: Unde utroque nomine  
 parcius evenit menstruum effluxus, ratione via-  
 rum minus patentium, & ratione viarum citius  
 clausarum.

## OBSERVATIO VII.

*Mensium suppressio ob vitium hepatis, mesenterii, uteri multiplex. 1. Ob uterum mola carnea repletum.  
 2. Ob insignem lapidem in utero. 3. Ob vitium uteri, mesenterii. 4. Ob utriculum aqua plenum  
 G 4 superior*



*superiori Vteri parti adnatum. 5. Ob vasa spermatica, densa, obstruēta. 6. Ob Testes tumidos, vitiosos. 7. Ob hydropem cornuum uteri. 8. Ob vitium sinistri ligamenti uteri. 9. Ob uterum exulceratum. 10.*

§. 1. **A**ug. Imperatrix mensium suppressionem diu passa fuit: Hepar habuit male constitutum: E mesenterio putrescente pendebat fasculus utero incumbens, uterus valde magnus, plenus humore crassissimo; Circa latera & corpus adhaerebant quinque corpora satis magna: In capacitate innatabat quidam substantia alba. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 2. Anno 1642. in theatro uterus mole carnea oppletus veram perpetuam suppressionis mensium causam detexit. *Rhodius cent. 3. observ. 47.*

§. 3. Marrona semper conquesta de dyspnoea, abdominis mole, suppressis uteri purgamentis, ante decennium sit aseitica &c. In utero lapidem quatuor librarum, multis eminentis lapideis, coloris fusci deprehendit dissector. *Th. Bartholinus cent. 4. hist. 64.*

§. 4. Femina ab hydropo liberata est superfluite infimi ventris exigua duritie, hinc mensium suppressio &c. Spatium quod inter intestina & mesenterium interjacet, muso viscido repletum scatebat &c. Uterus parvus erat ac flaccidus, crassamque sanguinem menstruum in venis resistentem continebat &c. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 5. Femina per sexennium ventrem tumidum gessit instar praegnantis, non menstruabat autem &c. Utriculus quidam ventris capacitatem explebat, ex utero ab uteri fundo extimulatus, qui apertus effudit aquam copiosam, &c. Uterus ipse exiguus erat & arctus, quasi puellae 10. annor. *Vide tit. de tumor ventris.*

§. 6. Anno 1637. J. Vellingius in cadavere foeminino deprehendit vasa spermatica, testes versus admodum densa & dura, pituita plena, Ideoque huic mulieri in valetudinario D. Franc. donatae menses ultra bimestre tempus fuere suppressi. *I. Rhodius in Mantissa, observ. 35.*

§. 7. Virgini ob errores in dicta menses suppressi, unde intumuit venter adeo ut male audiret: Testes ab utraque parte non solum tumidos & magnitudinis excedentis, sed & lividos, quasi fungosos, plenos vesiculis aquosis, utero ejusque vasis plane illis. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 8. Catharinae N. adversa valetudine ob suppressa menstrua usque, intumuit abdomen: Praeter jecur pallidum, lienem parvum &c. utrumque uteri cornu novem tum puris tum aquae continebat libras. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 9. Rustica lagenti abdominis tumore cortipitur, menses prius decursu subsisterant: Vterus erat exilis, ejus ligamentum sinistrum superius sero tumidum totam occupabat abdominis cavitatem. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 10. Mortalis multo tempore circa pubem & inguina doluit, nullis interim ex utero prodeuntibus excrementis: Vterus defunctae omnino exulceratus fuit. *Vide tit. de ventris tumore.*

## OBSERVATIO VIII.

*Menstruorum suppressio ob mesenterium steatomatis repletum &c.*

**V**irgo per multos annos laboraverat mensium suppressione & febre hecticā, quae illam extinxit: Reperimus in mesenterio steatomata varia à lymphā crassa oriunda: Et in sinistro latere magnum veluti saccum; repletum materia turbida, pituitosa, majori ex parte eruenta. *P. Barbette Prax. lib. 4. cap. 11.*

## OBSERVATIO IX.

*Menstrua inordinata ob Tumorem vulvae tunicis adnatum 1. Ob vitium hepatis, uteri scirrhusi, vena umbilicalis plenitudinem. 2.*

§. 1. **C**arcinomatis specimen memini me aliquando propalam ostendisse Medicis ac Obstetricibus, in Vulva cujusdam mulieris à cancro uterino crudeliter in modum ossificae, quae in vivis dum foret conquerebatur assidue, non modo de inordinatis menstruis, vago pruritu ac oberrante ardore, sed potissimum de crebris animi deliquiis, quae tam frequenter ipsam invadere, ut tandem miserrime ab illis obrueretur.

Facta Medicis cadaveris copia, in vulva vidimus delituisse tumorem, ut lividum & atrum sic cruore ac sanie undiquaque perfusum: adhaerebat autem membranis suis filamentis tam arte tunicis vulvae, ut non posuisset inde eximi sine scalpelli auxilio. *N. Tulpius observat. lib. 3. cap. 34.*

**Carcinomatæ specimen**]. Partes glandulis refectæ facile degenerant in fungos, proximum carcinomatæ subjectum: Quod si fungus aliquis vulvam occuper, instat illam continenter & effundit menstrua ipsius non minus copiose ac si instaret verus parvus, à quo tamen fixus hic tumor minime quum expellatur, necesse est tandem confugere ad scalpellum, & ejus ope radicles evellere quod nequit extirpare

intus ejusmodi partus: Sed aris est talem sectionem vel audere vel rite perficere in tam obscuris tenebris: In quibus tamen equidem illam bis vidi non minus secute institutam, & fungum ejus loci à Bernardæ Ocularis sine ullius partis offensa, ac si sub dio & in loco maxime obvio scalpellum summa direxisset. *Idem, Vide histor. ibid. cap. 33. & 34.*

§. 2. Virgo 35. annorum menses habuit inordinatos, aliquando penitus non fluentes, aliquando nimis copiosos: Mortuam fecit, atque 1. occurreit vena umbilicalis, quæ in omnibus adultis ligamenti vicem obtrinet sanguinis copia turgida, atque extensa in quibusdam locis, ubi hæc vena contorquebatur, instat varicæ tumerosa: Hepar erat album, tuberosum, durum, inæquale & exangue: Uteri corpus scirrhusum callosumque. *Vide sit. de Febris lib. 4.*

**Uteri corpus scirrhusum**]. Calus Felicæ apud Bartholinum Epist. 26. cent. 1. notat Menstruorum retentionem non ab authoribus illatis tantum de causis exoriri, sed ab apoplematibus etiam nec non scirrhusum

rhosis uteri tumoribus, qui ad tantam quandoque duriiciem deveniunt, ut ossis naturam, colorem, ceterisque acquirant qualitates.



## ANATOMIÆ PRACTICÆ

### LIBRI TERTII.

#### SECTIO XXXVI.

#### De Fluore Muliebri, & Excretis p. n. ab Utero, Mola.

#### OBSERVATIO I.

**Fluor Vterinus ob uterum exulceratum, Glandulas Lumbares & utero vicinas humore purulento plenas, Testiculos vitiatos.** 1. Ob Glandulas totius induratas, fluxum humorem crassum continentes, Hydattides in Tubarum extremitate. 2. Ab utero purulento. 3. Ab utero ulcerato, cum insigni & effica dilatatione. 4. In Utero fluori obnoxiiatur humor limpidissimus repertus. 5. Fluor diuini perseverans gaudet etiam tandem aut uteri corruptionem inducit. 6. 7. 8.

§. 1. **LIZABETHÆ** ANGLÆ quinquagesimum jam agentis ætatis annum menstrua octennio ante fluere cessarunt, nunc inde ab anno redeuntia, sed inordinatæ: Per tres menses eodem Fluore corripitur albo, copioso, summaque cum virium debilitate: sensum aucto, adeo ut stanti ambulantiq; semper invitz quid destillet: Acrimonia humoris abditæ naturæ loci multum erodebantur, urinæque juxta supprimebatur: Inde grumi sanguinis prodierunt, ingenti cum dolore, præsertim in *hypochondriis*: Abus per dies quinque continuos *adstricta* erat: Adhibita autem incassum fuerunt à Medicis excell. pharmaca, Tandem supervenientibus intolerabilibus circa *pubem* & anum *cruciatibus*, & vomitu materiæ biliosæ, mortua est.

Dissecto post mortem cadavere sequentia notavimus, 1. Omentum tenue, sine pinguedine, 2. Venter magnum ac valde capacem, biliosi humoris plenum, interne rubentem, & multis quoque glandulis conspicuum. 3. Intestina tenuia in inguine sinistro contracta penitus, & crassa tum flatibus tum duris excrementis distenta, præterea variis in locis veluti occlusa. 4. Pancreas cinerei coloris, durum tactu. 5. Lienem coloris nigricantis & 6. Hepar pallidum, ad flavedinem biliosam vergens, nec sanguineo rubore tinctum: 7. Hujus vesiculæ copiosa bilis inerat: 8. Glandulæ in regione lumborum plures, conglobatæ, atque aliz prope uterum, valde duræ erant, humorem crassum, sebaceum, flavescen-tem & puri analogum ex se fundentes quo & vasa lymphatica distenta turgabant: 9. Venarum sanguis tenuissimus fuit, sero multo dilutus, 10. Cordi Polypus erat, 11. Pulmones sani, 12. Ren sinister duplici cavitate, pelvim efformante, præditus. 13. Vesica urinaria lotio adhuc turgebat: 14. Uterus arcte undique partibus vicinis adhæsit, fundo ejus cum recto

recto intestino, vesicaque urinaria unito. 15. Circa Testiculos, utroque in latere, hydatides sæ magnæ conspiciebantur, lymphæ turgentes insipida: Ipsi Testiculi purulenti & ulcerati fuerunt, nec Tubarum processus rite apparuit: Liquor in arteriam spermaticam injectus, omnia uteri & vaginæ vasa implevit, indeque levi compressione, cum ex utero, tum è vagina manavit. Uterus magnus erat, intrinsecus rubens, exulceratus, excoriatus, pure fardus, inque sinistram magis latus inclinans: Illeus extra uteri portio, in vicinam quoque vaginam serpsit, Nam ista, quasi gangræna tacta, prorsus nigricare visa est. Vasa uteri omnia cruore turgabant. Ex litteris à Clar. Joh. de Muraltio, Tigur. Medico & Chirurgo die 27. Augusti 1677. ad Nobil. Dñs Conradum Peyer, Medicum Schafhus.

**Ventriculum glandulis confusum** ] De his vide Clar. Will. Pharmac. Ration. sect. prima cap. 2. Iniretlinis Glandulas quoque dixerit dictus accuratissimus, D. D. I. Conradus Peyer, Medicus Schafhusianus, cujus Libellum Schafhus anno 1677. editum consule.

**Circa Testiculos hydatides lymphæ surgentes &c.** ] Vidit Excell. I. Jac. Wepferus in bruiis lymphaticis vasa ab uteri cornibus tenuibus exordis in ductus insignes crescentia, liquorem itum in venas majores hypogastricas, per ligamentum uteri membranofum diffusas aliquor in locis facile deposuisse, quem frustra digitis versus cornua repellere conabatur, abortis nodulis ob valvulas liquoris regressum remanentes.

**Fluore corrumpitur albi** ] Notat Clar. Ralsinius in Dissert. Anatom. mulieris munditæ utris se novisse, quibus perpetua humoris albi ex utero stria manaret: quoque arteriæ ad naves pertingentes sanguis in impudicitas eo delegatas foras non oblegaret: Hinc coryzam arte vel natura excitatam salutariter ad curationem succurrere censet.

**Quinquagesimum ætatis ætatis annum** ] Evenit incipitque hic Fluor frequentius circa tempus instantium primum menstruorum, atque ad ætatem satis decrepitam in multis perseverare solet adeo ut nulla ætas nisi prima, immunis observetur ab ipso; nullus feminarum status eisdem ab ipso liberet; postquam & virgines, & uxores, & viduas & juvenculas, & consuetas & senescentes, & fertiles & steriles ipsam patiuntur satis sæpe molestum. Sympius Prax. lib. 3. cap. 4. §. 7.

**Fluore corrumpitur albi, copiose &c.** ] Si quis humorem, qui tunc effluit consideraverit, observabit eum plerumque quidem pituitosum, satique crassum ac viscidum erillere, rarius, serosum aqueumve ac rennem, Idem subtile copiosius, subinde parcius effluit, subinde acris & mordax, subinde blandus ac minime aut sæpius plus vel minus graveolens; rarissime omnis fortis expers, ut plurimum albicans, vel flavescens; rarius virescens aut nigricans, rarissime saniosus vel putulatus. Idem §. 8.

**Summa cum virium debilitate** ] Idem aliquando absque ullo incommodo, saltem valde notabili, feminas vixit longo tempore; quandiu scilicet & paucus exiit & omnis fortis acrimonieque expers; sæpius ramen istam plurimam producit mala, universalem languorem, viriumque omnium dejectionem, spontaneam lassitudinem, dolores varios, cachexiam, stultitiam, quando & copiosus & acris fœdulusque modis variis exiit. Idem §. 9.

**Albici nature &c.** ] Causam primariam semper in utero querendam arbitror; secundariam, & ipsum augerem in sanguine, alitve viriosis humoribus sanguinis confusis, & una cum ipso ad uterum tendentibus. Primariam inquam, in utero, quoniam citra aliam noxam notabilem in reliquo corpore observabilem, consistere potest aliquandiu; quod minime fieret si in sanguinis vitio qualicunque penderet; Comptum non datur à quo deduci queat: cum enim tri-

plex humor liquorve ad uterum deferatur, sanguis, spiritus animalis & semen, consistat neque à spiritibus, neque à semine posse deduci, unde paret ipsum necessario petendum à sanguine (tangquam causa fecundaria) continue ad uterum pergerent. Postquam igitur utere tanquam cause primariæ, adhibendus est quæritur, Quæ sit visum ætatis? & Quæ materia ex qua generatur hic per uterum ac p.n. effluens humor? Item, An ex universo sanguine, modo singulari corrupto, an vero ex aliqua ejus parte, à reliqui sanguinis secreta & corrupta proficiatur? Censo item ipsum omnino adscribendum massa sanguinis universæ, modo peculiariter corruptæ, non item alicui parti à reliquis secretæ ac elabenti; quævis namque non negem in quibuscumque floreem esse viscosiorem, ideoque magis pituitosum, in aliis fluidiorem ac tenuiorem, id tamen accidit quæ sanguis universus exiit in talibus pituitosior, vel serosior, vel ita corruptior idem, ut abeat nunc in substantiam viscosiorem, nunc in fluidiorem: adeo ut illa viscositas major vel minor debeat aliquando ipsi sanguini corrumpeudo, aliquando vitio in utero existerenti sanguinemque corrupturo. Hoc facile deducitur est qui observavit accurate laborantium constitutionem, tum ante quam fluore corripentur, tum post: Si namque corporis universi constitutio fuerit laudabilis, nullum dubium est sanguinem similiter existere laudabilem, ac prout constitutionem Fluoris variam ipsi sanguini tunc non adscribendam, sed causæ ipsum corrumpeudi, ac efficiendi dicte. Sin corporis universi constitutio existat vitiosa prius quam Fluor, feminam infestaverit, sive illa sequatur menses suppressos, segnisve aut parcius procedentes, sive illa præcedat diu tempus mensium fluxuorum, quis dubitabit tunc ipsi sanguini adscribere fluoris varietatem, imprimis quando illa coarctat cum cachexiæ urgentis varietate: Cum prout sanguis vitiosus non sit causa primaria & adeoque fluoris albi; aliquando tamen hujus vel illius fluoris, aut viscosioris aut serosioris, verum illius causa efficiens, sanguinemque in fluorem album corrumpeudo in utero ipso querenda veniat, jure queritur Quomodo affectus sit uterus? aut, Quodnam p.n. existere possit in utero à quo illa pendat corruptio sanguinis in fluorem album? Adhuc observandum, fluorem album nunquam, vel rarissime, citra initia esse Artem, talem tamen ut plurimum scilicet tandem, 2. Sanguinem tum naturaliter mutari in Humorem album, quando convertitur in Lac; tum p.n. quando corrumpitur in Pus: Utramque autem mutationem hanc docuimus alias debet Acidæ, vel in mammarum glandulis preparari, & ibidem sanguini allibenti admixto, vel in sanguine existenti, atque propter sanguinis extra vasa sua effusam moram & quietem, spiritumque volatiliem in aërem tunc abundantem jacturam, se magis magisque manifestant, viscosque suas excrecenti ceterasque sanguinis partes, sicut dictum, in pus album sensim converteant: Quomodo vero sanguis mutatur f.n. in feminarum utero gerentium mammis, & quidem postremis mensibus in Lac. Idemque sanguis extra vasa sua effusus collectusque,

lectulæque, quin idem ad partes ulceratas delatans, p.n. corrumpitur in pus; ita idem mutari potest cum revera mutetur, in uteri vasis cavernosis, & quidem nunc p.n. in Humorem album quidem, multum tamen cum a pure, cum præsertim à Lacte differentem, adque singularem, Fluoris albi nomine notum, quoniam sæpius soler idem sponte effluere, Differt hæc fluor plurimum à Lacte, quin perfectionem novam obtinet sanguis, quando in Lac mutatur, à qua perfectione sua desiscit sanguis, quoties in album abit Fluorem. Differt item multum à Pure, quia hæc ex sanguine puro tunc confectum magis albescit ac æquale existit quam fluor mulieres ad pituitæ colorem, consistitiam & naturam magis accedens. Idem §. 10. ad 35.

*Acrimonia humoris abisti natura loci multum erodentem.* Quæmadmodum vero pus diutius in abscessu tenentem paulatim acris evadit, ita fluor muli albus sensim acrimosum, & quandoque tantum quæ partes, per quas fluit exulcerare saltem excoriare potest, acquirere solet. Hæc autem acrimonia ulceroſa, h. e. partes efficit in ulcus rodens sola evincit se in Aciditate consistere, postquam, sicut non semel plurimis alias vicinis exemplis, experimentisque manifestissimis, salis lixivi acrimonia, cum nigredine morticina corrumpit partes à se affectas, & Acida exedit eorumque partes in quas vim suam exerce noxiam, moraque in substantiam albicantem: Cum proinde hætenus duplex tantum innoverit nobis, & aliis *Acrimonia*, quæ in corpore humano possit habere locum, & *corruptio sanguinis* ad uterum acceden is, & in Fluorem album mutari non tantum nequeat deduci à lixivii salis acrimonia, sed commodissime possit ab acrimonia acidam, merito tunc corruptionem adscribimus quæritur: Huic nostræ opinioni præter dicta favere cause antecedentes ac forinsecus advenientes, quarum 1. potissima frequentissimaque est Animi moror gravis & diu protrahens, Acidi noxii & inprimis Austeri productio assiduus: 2. Terrores inopinati & grandis, Acidi & Austeri causa certissima & potentissima, 3. Aeris, vel aquæ, forinsecus ad uterum quovis modo penetrantis frigus, comitissive frigoris causæ, unde Acidum ubivis ageri in nobis, tum alia plura, tum inprimis Gravedo evincunt abunde. 4. Fluorem si non producit, fovet saltem augetque manifeste Acidorum abusus, hinc feminis Belgicis frequens ille Fluor: Causis prædictis sannumerari quoque potest Fluxus menstruus, tam segnis accedens, quam parcius prodians, aut plane suppressus; subsistens namque in cavernosis uteri vasis sanguis plus minus corrumpitur, noxamque suam utero communicat, & ita quidem ut in eodem hærens, atque sedem figens, sanguinem postmodum accedentem similiter corrumpat, & in Humorem albicantem ac pituitæ similem convertat h. e. Fluorem album producat: Notamus autem uteri substantiam proximè accedere ad naturam Glandularum, ideoque maxime susceptibile esse Acidis, quod p.n. in corpore muliebri quavis de causa redundans, & quaquaversum delatum, sistitur facilius & abundantius, & astutius in utero, ibidemque modo suo vitabit & corrumpet necessario sanguinem ad ipsum delatum, sicut evincit frequens experientia. Sicut vero à causis non utne, vel fortuitis, Acidum in corpore nostro vel producitur, vel augentibus, vel foventibus, afficiatur primario Glandulæ, & inprimis pancreatice, ita ab istis afficiuntur secundario tum frequentius uteris, tum etiam aliquando mammae: Quamvis proinde potemus à causis notatis deducendam Fluoris albi generationem, non putamus tamen immediate ac primario male affici ab ipsis uterum ( nisi forsitan à frigore, ejusve causa immediata ad uterum penetrante) sed secundario tantum ac

mediate, atque postquam prius male ab ipsis affectæ Glandulæ pancreatice: Notandum porro ad Fluoris albi generationem affici etiam aliquando præterimmediate à frigore externo, tum in puberibus fluxum menstruum sustinere, aut saltem minuire, tum non dum puberibus, nec proinde Fluxum dictum adhuc passis utrum ipsam ita viciant, ut facilius copiosiusque, quam decet, secedat sistaturque in ipso puri sanguinis Acidior, quæ ibidem fermenti prævariam indens, sanguinem ad uteri nutritionem cunctane allabantem paulatim pestes corrumpat, & in humorem pituitæ similem mutet, qui nutriendo utero inutris effluat plerumque, distansque Fluorem producat, Quoties igitur à causa exteriori simul afficitur immediate uterus, ita ut inde ad Fluorem album producendum simul disponatur, toties tum facilius tum citius, tum gravius laborant feminæ isto Flure Quoties contra nullo concorrente immediate uteri affectu, secundariis duratur & post affectu demum & tantum Pancreatis, aliarumque partium glandulas viciatur tandem ipse uterus, ita ut hinc Fluor consequatur albus, toties idem tum segnis, tum levis solet afficere mulieres: Hujus diversitatis ratio est manifestæ, postquam ubi causæ plures concurrunt, eundem effectum producentes, ibi effectus necessario & facilius & citius & potentius obtinetur: Ubi contra causæ illæ pauciores existunt, ibi necessario expectandus effectus idem tum difficilior, tum segnis, tum imbecillius sequentibus: Sive igitur tantum mediate aut immediate afficitur uterus ad Fl. album producendum, sive afficitur idem tum mediate tum immediate, affici tamen debet ipse ad notari Fluoris productionem, ita ut idcirco corrumpatur in ipso sanguis in humorem pituitæ similem, qui pro viti uterini varietate variet non parum, tam coloris, quam odoris & acrimoniæ corpe quoque ratione, quamvis non negem posse illam Humorem variare quoque ratione sanguinis varii, aliorumque affectuum corpori obvenientium: Quæmadmodum enim Fermentum illud uterinum, & quidem Acidum, prout magis vel minus existit austerum, vel acte, vel alio modo varie otiosum, ita diversimode corrumpit sanguinem ad uterum accedentem: Sic etiam sanguis ob alios affectus in corpore existentes aut precedentes variis modis affectus in humorem diversum corrumpitur ab eodem fermento: adeo ut diversitas humoris in Fluore albo effluente pendat nunc à diversitate fermenti corruptoris, nunc à diversitate sanguinis corruptendi, nunc ab utroque: Quæ omnia diligenter observanda, quia plurimum faciunt ad curationem. Idem §. 35. ad 53.

*Abistita in casum pharmace*) Legitima cautio ex causarum distinctione petenda, alias omnis labor inutilis: Causæ autem querendæ, aut idem §. 57. vel in Fermento uteri vitioso diverso, & magis vel minus austero vel acri alterve affecto, subinde, in sanguine ad uterum accedente, ac propter affectus alios precedentes cumtelve multum sepe diverso ac multitudine male affecto, vide curationem. l. c.

*Glandulæ in regione lumborum &c.*) uteri substantiam proximè accedere ad naturam Glandularum adnotat Idem, vide supra Scholia 4.

*Cordi polypus erat &c. uteri intrinsecus rubens &c.*) Hinc verisimile duplici de causa contigisse Fluorem, vel ob affectus alios precedentes, vitiumque massæ sanguineæ, quod cordi innatus esset polypus, venarum sanguis tenuissimus fuerit, sero multo dilutus &c., ob Fermentum vitiosum uteri, qui magnus, intrinsecus, rubens &c. unde affectus magnus & tandem letalis. *Uterus arte vicinis partibus adhesi*) Quia exulceratus, ideoque qua parte ulcus fuit, cum paribus adjacentibus coit.

§. 2. In Angla muliere quæ Leucorrhæa per plures annos decubuit, & tandem corrosivis matricis ulceribus misere obiit, una cum Clar. Sylvio 14. Maii 1668. Lugduni Batavorum; Glandulas totius corporis omnes Lymphaticas, seu Conglobatas, duriores flavaeque extitisse. Ex humorem crassum, sebaceum, luteum, puri analogum continuasse: Vasa vero lymphatica valde repleta & distenta fuisseprehendimus. Insuper ad testes, in Tubarum extremitate, hydatides utrinque magnæ aderant. 1. de Muralto Exercit. de Lympha & Saliva, in Annexu §. II.

**G**landulis totius corporis &c. Clar. Franc. de le Boë Sylvius Glandulas in conglobatas & conglomeratas distinguit: Conglobatas illa sunt, quæ ex una quasi continua substantia, & æqualem substantiam habent, constituuntur, quales in mesenterio & lumbis plurimæ occurrunt, ut & aliis in locis v.g. inguinibus, collo &c. Conglomeratas vocat illas quæ ex pluribus glandulis minoribus simul junctis constanter, quales sunt quæ non tantum Pancreas, sed etiam salivales glandulas & Thymum constituunt: Differunt quoad substantiam hæc glandulæ, quoniam sæpiissime in Conglobatarum medio cavitas reperitur, non autem in Conglomeratis, quod à Senone notatum in observationibus. Anar. Differunt præterea vasibus peculiaribus, nam Conglobatæ vasibus donatæ sunt lymphaticis, quæ omnia versus & ad communem ductum, Thoracicum dictum, propellunt liquorem in se præparatum vel aliunde acceptum: Conglomeratæ autem in peculiaribus cavitatibus suum liquorem immediate deponunt, & Salivales quidem in oris cavitatem, Pancreaticæ vero in tenue intestinum, 3<sup>o</sup>. differunt succi varietate, Con-

glomeratæ enim succum non sibi similem continent, Pancreaticas enim aliquando acidus est, aliquando pene insipidus, nonnunquam austerus, sæpius salus, sæpiissime acido salus, notante Reg. de Graaf. Traët. de succo Pancreatico; Saliva autem ut plurimum insipida est: In Glandulis vero Conglobatis eundem sibi quæ similem humorem secreti externique probatur, non solum per glandularum illarum substantiam ubique consistentem, sed etiam per vias in quas idem exoneratur, desinentes scilicet in Ductum chylerum thoracicum, dum ex glandulis conglomeratis effunditur liquor in peculiares civitates.

**Humorem crassum &c.** Humor vasorum lymphaticorum non semper tenuis est & fluidus, sed interdum crassitieri & densitieri, notante P. Barbet in Praxi cap. 4. lib. 4. qui in hydropicæ cadavere vidit abdominis lympham primo tenuem & fluidam, deinde gelatinam, tertio concretam, tandem duram & stercoraticam: Accionem autem & corrosionis participem, fuisse ostendunt matricis ulcera corrosiva fluxorem comitantia.

§. 3. Mulier 40. ann. ex partu laborioso Fluore albo se laborare conquerebatur: dolorificus valde hic fluxus, nec uniformis hic semper, cum tenuis modo, modo viscidus magis exiret materia, diversi coloris odorifera: Injections hic adstringentes variæ à Chirurgis variis adhibite, æst sine ullo successu: postquam enim per 14. septimanas misere sic vitam egit, obiit tandem, exhibuitque corpus dissectanti uterum omnimodo purulentum, non uno loco materiam, etiam ex fundo ipso, abdominis cavo communicantem: Dissectio hæc instituta 22. Febr. 1675. G. Blasius P. 50. observ. med. 3.

**\* Fluore albo** Ejus hæc est generatio ex Fr. Bayle Dissect. Phyc. 6 §. 13. Mollis uterum (inquirit) uterum statim periculis, quæ menstruo fere spatium comprehendunt, fervorem concipit, quo de se ipsius substantia rarefit luxaturque, biantia in ipsis cavitatem vasorum nescio aperitur, sanguis in ipsis accensitur, & per parentis meatus effunditur: In eucymis ejusmodi sanguinis effluviu non modo statim periculis contingit, sed etiam putus & innoxius sanguis, sine ullis symptomatis, saltem molestis, effunditur: quibus vero singulis pravis humoribus est inquinatus, multa pituita viscidus, bile uberior acrior, melancholia crassus, multi ex hujusmodi profusio morbi accidunt, quorum frequentissimus, & variis modis molestus est Fluor albus appellatus, cujus generis est hujusmodi: Cum sanguis ad uterum, ejus meatibus aperitis constitit, in majora laterum fibrarum interstitia se facile insinuat, ibique hæret, donec ejus cum sanguine fervoris ipsius causis, fibræ ad preitium iterum redeunt, & se coherentes, quem continerant sanguinem expriment, quod facile fit & sine molestia si sanguis parvus sit & laudabilis, quia quamvis uberius uteri fibras irrigaverit, nullam illis intolitur notam: At si pituitosus sanguis ejusmodi interstitia semel occupavit, non ita facile ex ipsis extrahitur, saltem si forti fibrarum pressione expellatur, pituitosum quod relinquit, quod præ visciditate tenaciter adhæret neci fibris, ejusque ductum lateribus: Sic iterum fit pituitosus, & ductus, per quos sanguis profunditur, ac proinde illi ductus sunt apertissimi succum pituitosum sanguini permixtum, præcipue si uberius abundet, excipere, & in uteri cavitatem traducere, ut mirum amplius non sit quare cohibito sanguinis fluxu,

fluxus pituitosus perseveret, quare tenuior succus, crassiore relicto, percoleatur: Nec mirum est etiam quare veniente menstrui periodo, aliquot diebus ante fluxum sanguinis, uberius expurgetur humor pituitosus: & tandem sequatur sanguineus: Scilicet vasa magis lociter relaxata, quia pituitoso succo sunt imbuta, pituitosum succum tantum admittunt, sanguinem vero tunc rariorem recipiant quousque suus magis diluatus: Quod dictum de humore pituitoso, de bilioso & melancholico dictum puta, quod attinet ad memoratam translocationem & evacuationem, quamvis quoad reliqua, quilibet humor sua infert symptomata, graviora, leviora, pro variis gradibus partiaris: Affectio hac perseverat est donec imbibitus humor ab utero fuerit elatus: nonquam vero poterit uterus ab imbibito humore expurgari, aut equam quod ipsius in massa sanguinis abundavit fuerit evacuarum, frustra enim ante quacunque à parte effecta humorum, quo infecta est, ejicies, quamdiu de massa sanguinis novus continuus affluit.

**Depressi colerus & dorifque** Coloris odorifque mutati in excrementis ab utero Syrius de le Boë Causas disquirat prax. lib. 3. cap. 3. §. 394. Certum est autem, corrupti sanguinem ut foret, quis vero quævis corruptio fortiori non est conjuncta, quæritur: Qualis corruptio fortiori illi inducere, quæritur: Acidum certe illi affluere, coagulat & corrumpit, ac sine calore: Salsum quoque livum ipsius consistentiam dissolvit, sed sine calore: At si quis consideraverit 1. Odorem omnem pendere ab oleosis & pingulibus, ideoque fortorem quoque ab iis petendum. 2. mutationes primarias nostro sanguini contingentes Acido & Salio livio consequentibus & simul effervescentibus debere, à quibus

fecerit nullus sanguini conciliatur. 3. In rebus artificialibus manifestum fecerem produci quodvis oleosum salso lixivo dissolutis, & junctis affunditur liquor acidus e. g. solutioni sulphuris per lixivium facta si affundatur acetum spiritus vitrioli &c. Si quis, *inquit*, haec omnia consideraverit suspicabitur forte ad fecerem sanguini conciliandum opus esse ut partes ejus oleosae intimius junctae sint partibus salinis, atque accedente parte acida effervescentia inde sequatur cum fecore conjuncta, nisi omnia ista artificialia colore tamen manifestentur album, dum sanguis ille frigus prodiit septemnumero acri: Observandum tamen Fluorem uteri, Album dictum (quem ostendi octum habere à sanguine ad uterum delato, ubique corrupto) plas minus fetidum aeternumque sepius existere, unde in hoc casu faveret magis argumentum ab experimento dicto sumptum: Quoties autem sanguis menstruus fortens nigricat, nec albet, non videtur illud argumentum aliquid probare, nisi forsitan dici queat corruptum quidem sanguinis partem aliquam, quae albescat & reliquo sanguini magis copioso affluenti admixta colorem ipsius non plane mutet, fecerem tamen suum ipsi communicet: Obijcies, erit saltem sanguis menstruus talis ob admixtam sanguinis partem albicantem pallidior, non item atrior ut patet experientia. 2. Consequentiam valere nisi alia forsitan concurret causa quae sanguinem illum reddat nigricantem, sitque potentior sanguine corrupto & albicante: Ex dictis ergo liquet ab Acido expectandum colorem in sanguine nigricantem: Quod si ad fecerem sanguini conciliandum desideretur similiter Acidum visiosum in ipso excitans effervescentiam, cum talis non fit sanguis univertus, sed iste tantum qui tunc per Uterum effluit, opus est ut in utero, aut saltem circa uterum, ejusque vas repetatur illud Acidum corruptens, ac quidem

§. 4. Dec. 2. 1675, aperui cadaver mulieris 30 ann. Fluxu hac laboraverat albo jam per 7. menses, qui ultimis temporibus gravis admodum & dolorificus, materiz foetidissimae: Uterum parce admodum exercebat, nec unquam sine dolore: Dissectus venter vesicam urinariam offerebat mirum in modum distentam, urinae insigni quantitate repletam, capitis humani magnitudini fere accedebat, ad umbilicalem regionem se extendens, Osium pubis margini firmiter undique adnata, Incumbebat hac Uteri non solum vaginae, sed & fundo, imo pondere suo partem utramque graviter adeo comprimebat, ut non rotunda, aut saltem leviter protuberans, sed complanata, imo potius sinuosa observata fuerit: Fundus ipse substantiae licet debitz, vix à statu naturali recedentis, parte antica atque postica digiti transversi, laterali utraque duplicis digiti crassitiem habebat: hinc ampla valde quamvis ipsi incumbens vesica, extensio ejus tanta ut utriusque manus digitis vix tegi valeret: vagina ab extremo pudendi usque ad orificium internum ulcere sordido affecta notabatur, searebat hac materia purulenta, summe foetida, cujus etiam aliqua portio ipso in ventris cavo, loco eo ubi vagina dicta intestino recto cohaerebat, reperiebatur, eo quod consumpta substantiae uteri particula materiz illi concessus fuerit exitus, omnibus locis gravis & quae hujus vaginae exulceratio; levior quae vicina magis orificio externo, gravis quae interna: Nec tamen ab ulcere quamvis libera magis pars antica vaginae dictae, alienae constitutionis omnino experta reperiebatur, duritiem enim insignem hic reperiebamus, imo & crassitiem, utraque tanta ut substantia vix minimi digiti crassitiem habens naturaliter constituta, duorum pollicum crassitiem superaret, cartilagineae fere constitutionis: Atque huic substantiae hujus, cum crassitie, conjunctae duritiei excedenti, urinae suppressionem, aut saltem parciorem excretionem, hinc vesicae urinae extensionem summam, unice abscribendam dicebamus, angustato sc. ab uteri substantia dicta meatu urinatio eidem continuo. In latere dextro *Tuba uterina*, circa extremitatem eam quae ab utero est remotior & amplior, inflammata valde, roto reliquo corpore purulenta omnino, omni cavitate destituta, purulentus iidem *Testiculus*: In sinistro utraque pars à statu legitimo notabiliter haud recedebat: In utroque loco testibus vicino, cornubus uteri adhuc rebat vesica, quarum dextra ovi gallinaeae magnitudinem habebat: liquore gelatinoso, pellucido, subflavo, repleta; sinistra vix jinglandis, aquosa magis: *Res* uterque sero mire extendebatur, forsitan quod urinae excretio aliquandiu parcior fuerit: *Præterea* ampli itidem, *vesica fellea* insignis quoque magnitudinis, bile turgida, *Hepar* bonae notae, *Pancreas* quoque: *Lienis* mira structura, numerum sive species sive figuram: *Iste* duos exhibebat Lienis intime con-

cum fecore sanguinem per uterum proditurum: Quod si Acidum illud corruptens sit in utero, corruptetur ab ipso sanguis ad uterum delatus, & ob sinuosum ejus substantiam segnius ad cor inde refluens, qui ibidem collectus admiscebitur sanguini menstruum tempore copiosius albacenti & elabenti, atque ipsi fecerem suum cancellabit: Eidem autem nihil obstat admisceri etiam partem Acidi humoris, à quo non tam albescat quam nigricabit sanguis ob copiam suam majorem Acidum magis resistent: Adde quod videatur in corruptione sanguis ab Acido nigredinem primum, alborem postea consequi: Hoc probare videtur uteris Capito per allos partibus quibus, si glandulas excludas, subjectus, Cancrum autem ab Acido habere ortum probant & lancinantes in ipso graves, & cura quodq; facilis & felix per salia volatilia. Cæteraque Acidam temperantia: Iuxta ergo rationem & Experientiam assero Sanguini menstruo fecerem conciliari ab Acido humore in uteri substantia haerente, atque sanguinem ad ipsius nutritionem accedentem paulatim ex parte ita corruptente, ut quamvis non abeat semper in pus, abeat tamen in humorem albicantem & pituitae foetidae haud dissimilem, qui mensum alborum nomine continue fere effluit, & imprimis cessante menstruo fluxu sanguineo sentiat molestus, atque dicto sanguini menstruo junctus *fecerem* ipsi conciliat: Notandum autem tum Alba menstrua, tum *fecerem* fluxum menstruum observari semper in mulieribus tristicioribus, in quibus Acidum noxium continue exuperat; unde confirmari videtur sententia Acidum illud noxium tendere quoque ad uterum, ibidem haerere & sanguinem albicantem ac morantem imprimis corrumpere, atque tum mensibus albis, tum menstruo fluxui *fecerem* causam praebere.

xos, sic ut nonnisi singulari adhibita circumspectione separari potuerint: *Hac* locis variis in eisdem substantiam, adeoque quasi in lobos quosdam parte ea quæ ventris anteriora respiciebat, divisam: Imo in Liene hoc, duplici ex corpore dicto modo composito, appendicula singularis etiam observabatur, quam lobum ejus vere nominare licebat; Circa Renem finitimum nucis moschatæ magnitudinem habens globosa occurrebat substantia, vas mire irrita, dissecta hæc Lienis substantiæ similis observabatur. *Cordis* ventriculum dextrum insignis admodum occupabat *Polypus*, tenax valde, albus, fibrosus, extendebat se ad plurimum digitorum longitudinem in arteriæ pulmonalis interiora: *Mediastino* circa pericardium utroque latere, vesiculæ variz flatu turgidæ adstant: In inguine sinistro *Glandula* quæ aderant, naturali in statu inveniebantur, quæ in dextro duplicis juglandis similitudinem referebant externam faciem spectantibus, licet valde essent inæquales: dissectæ plurimis ex particulis, facile digitis resolubilibus, singulari tunica investitis compositæ videbantur: Cor, Renes paresvè aliæ variz maculas habebant, in tunicis se manifestantes, subnigras, linea albicante circumscriptas.

**V**lcus dictum uteri, hinc F. Uter purulentus vesiculæ circa vasa pampini formis, glandularum in inguine intumescentia, quæque alia huc facientia adduximus, quam causam habere sine trem non est determinare, eo quod nonnisi viribus diuturni sive afflictionis omnino destructi, adeo ut etiam vix verbum proficere valeat, in Nosocomium delata fuerit defuncta nostra, Lymphæ singulari vitio, simili omnino illi quale vis veneret, præcipuam, si non unicam causam variis rationibus morti habemus, plurimum hic tribuimus multa ex dictis suadent: Hanc autem correpta fuerit defuncta dicere non possumus, hoc hic monuisse satis sit, vel sanguinem suis à causis corruptum, (etiam non raro à malignis, quas inter seminum pal-

mam ducit) Lymphæ dispositioni præterea, ac speciatim magis coagulationi singulari, hinc circa glandulas, aliæque loca, ubi ductuum ejus morui destinationum copia collectioni, aliisque inde productis vitis occasi nem præbuisse, licet nec ipse partibus aliis hamoni busque pepercerit, sic ut non solum vitia alia in muliere hac observata, verum & uteri ulcus ipsam et sanguinis Lymphæ constitutione præternat, originem ducunt, vel ex Impuro congestis, semineque pravi in utero detenti corrosiva vi ulcus uteri primo, hinc ex hoc sanguinis lymphæ vitia, quæque ibi produci posse diximus, dependere, *Gerardus Blasius Part. 5. Observation. medic. 5.*

§. 5. Sæpius vidimus in dissectis cadaveribus puellarum seu virginum, & aliarum mulierum profluvio uteri albo, dum viverent, laborantium, quæ ob alium aliquem morbum gravem extinctæ fuerant, In utero enim earum humorem limpidissimum invenimus, qui è cavitate ejusdem guttatim stillabat per verum collum in sinum pudoris, in quo candorem tantum acquirere, ut cremam aut calcem dissolutam in aqua dixisses, & ejusdem mixtionis crassitiem quoque; in aliis majorem: An verò id fiat, i. e. ista albedo & insipissatio humoris antea tenuis & limpidissimi, acquiritur coctione aliqua, vel aëris externi appulsu, frigidi potius ut videtur, aliis judicandum proponimus. *Severinus Pinus de Notis virginittatis lib. 1. problem. 3.*

**I**sta albedo & insipissatio humoris &c. Lymphatica vasa plurima ab utero oriuntur, quæ externam ejus substantiam percipiendo, sensim coeunt, & rivulorum ad instar augescunt, donec ad magnum chyli lymphæque receptaculum, ubi terminantur pervenerint: *Regn. de Graaf de mul. organis c. 9.* Humorem autem in illis concentum primo limpidissimum esse, post erasationem adipisci ostendit *P. Barbette* in Praxi cap. de hydrope,

*In quo candorem tantum acquirere &c.* Cum apud *Hippocr.* de morb. mul. *albus* legitur dubitari potest an intelligat fontem muliebrem: nam & absolute *albus* legitur & *catarrhus albus*: existimamus autem per hæc vere florem uterinum intelligi, præsertim pituitosum, sed nomine *albus* aliud audiendum: *Hippocr.* enim primum ita scribit, Si mulieri à partu cum febre Alba retineatur, pessimum: Et §. Epidem. Mulier, *ait*, in Larissa prægnans erat, 10. mensis sanguis malus florit, 14. excidit puer mortuus; tertio die noctu secundo excreta est & *albus*, i. e. purgantia alba: *Aristot.* vero c. 7. de hist. an. *albus* proprie in poculis considerat, quæ loco menstruum ipsi eveniunt, cum sanguis incoctus & crassus est: Fieri autem potest ut in acumbulis, aut cornibus, aut vasis uteri peculiaris vitio accumuletur sanies quedam & quoddam viscidum, quod menses inficit, licet sanguis qui affluit ad uterum, menstruum purgationem facturæ, floridus sit & lue-

dabilis: Etenim sensum ad partes uteri affluit, & hinc moratur donec mensurus periodus adveniat, & ista quam fecit mota inficitur menstruum & exalbescit: Imo *Duræus* annotavit evenire posse & sine febre & cum febre, sine ulcere ullo uteri, ut circum hujus venas, præsertim fundum, purulentum quid & album acervetur: Et forte ista sunt *albus* quæ à partu consequuntur, diuturnitate temporis sanguine alborem acquirerent: *Galenus* enim 10. 4. de usu part. *ait*, Si sanguis tantum in venis & arteriis moratur traheret quantamen in vasis spermatica, feminis more albetur ut non amplius mirum sit si in corpore ipsius uteri ex albescat humor, & præsertim sanguis, *Galienus cens. b. 2. lib. 2. p. 76.*

\* *Humorem invenimus qui &c.* *Sylvius* l. c. §. 14. triplicidum tantum humorem liquoremvè ad uterum deferri statuit, sanguinem spiritus animales, & semen: Sanguini autem varia admisceri; *Diemerbroeck* Anat. lib. 2. 8. in mulieribus gravidis vel suis neci placentam & aminum chylum deferri censet; ac in non nullis non gravidis (sed sæpe viriosis, intemperatam, vel aliis pravis humoribus admistum) ad uterum similiter fluere, circa uterum corrupti ac putrescere, & foras effluere, cum majore vel minore fetore, prout ejus corruptio ibi major vel minor fuerit; indeque frequentissimam *fluoris uterini* causam deducit.

§. 6. Nob. mulierem affectus plures p. n. male habent; inter quos alii vestitiores sunt, Muliebri Profluvium & Dolores vagi. Alii recentiores, ut Febris quæ horis vespertinis vehementior sit, & jam plus 40. diebus torquet: Muliebri profluvium evidentissimum est, loci enim muliebres perpetuo sunt humidiores, adest fastidium ciborum; &c.

Ex assidua autem defillatione Uteri excitata fuerunt Ulcera, quæ in Gangrænam redacta, Nobilem mulierem ad mortem deduxerunt.

**P**rofluvium muliebri ex Galeno 3. de sympt. causis c. 4. & 6. de loc. c. 9. non aliud est quam defillatio uteri diuturna, per quam universum corpus expurgatur: Cujus generatio est à materia excrementitia, quæ in venis uteri existens, facultatem uteri ita irritat, ut per uterum assidue egrediantur: De causa autem proxima hoc vitium producente, dissidium est inter Seriores; nam alii affectionem referunt in varios humores & ichores, partium principum vitio procreatos, ad uterum transfusos, qui dum illius expultricem irritant, utero nequaquam affecto, tanquam rheumatismo per uterum excrevantur. Alii vero probare nituntur Utero affecto etiam procreari, cum morbi diuturnitate uteri calor redditus sit imbecillior, ideoque plurimam partem alimenti in excrementum commutatur, ut aliquando etiam ex excrementotum acrimonia, abrasiones & ulcera laboriantur: Sed hoc dissidium sic dicendum est, Profluvium id ut plenum accidere transmissis humoribus ad uterum à partibus principibus: Non negandum tamen quin & utero affecto id symptoma possit procreari, quem-

§. 7. Nobilis juvenis temperaturæ biliosæ & sanguineæ, post editum partum, cum in temperanti victus ratione uteretur, non solum in toto puerperio expurgata, sed etiam plures menses post multa aquosa excrementa interdum ovorum albuminis conditionem referentia, semper sanguine perfusa sunt reddita: Totius etiam corporis marcor & febris accessit, quæ horis vespertinis magis amplificatur, quò tempore vehementi alterius coxæ dolore tentatur, qui usque ad extremum calcem exporrigitur.

Quamvis omni conatu actum sit ut febris elideretur, inhibereturque ne in heclicam transiret, neutrum potuit præcaveri, imo accessit etiam uteri gangræna, & sic vitam cum morte commutavit.

**H**æc non alia causa est quam facultatis expultricis læsio, & excrementorum serosorum copia, à qua irritatur; cum ex immoderata & diuturna sanguinis profusione, jecur acque ventriculus propriam temperiem amittunt, ut non sit mirum si plurima materia frigida, tenuis, serosa in dies cumuletur, & quamvis interdum acris percipiatur, id ex aliqua abrasione cervicis provenire existimandum, vel humoris serosi putredine, ex qua causa etiam salus fieri solet: Acco-

§. 8. Domina de Bologni laborabat p. n. yvarum qui erat tetri odoris, fere omnino suppresso: Vitium erat in pulmonibus & hepate, sed uterus corruptus quasi gangræna affectus, plenus tabo & sanie. Vide lib. 4. tit. 4. de Febribus.

\* 9. In euratione Fluoris muliebris animus indubio vacillat, si fluor perseverat magna incommoda sequuntur; Si suppressitur, majora, maxima si à toto corpore est, Eo suppresso vidimus uterum gangræna affectum. Ballonius conf. 35. l. 3.

**Maxima si à corpore** Fluor muliebris curatu est difficilis si inveteratus dum habitum contraxit; Si in utero labes contracta est & in temperamento laborat, & in solutione continui, & cum ulcera vel ulcra adhaere; Deinde morbi & uteri & in utero sunt difficiles & per se, & quia aliæ partes in eum se exonerant: accedit quod ex Hippocrate, uterus sit plenus atra & humiditate; Idem uterinorum malorum & suffocationum originem repetit: ex eo quod uterus ad aliorum organum habet, extrahendas saniem, deorsum inclinat pene sursum, & atque iniqua.

§. 10. Observari in duabus monialibus; & duabus feminis in matrimonio viventibus uterum post diuturnum Fluorem album ulcere cancroso corruptum fuisse, apparente in hypogastrio tumore duro, inæquali, & continue ichorem fetidissimum suberuentum cum maximo dolore stillantem; omnes tabidæ moriebantur Vespertus Traill. de cic. aqu. pag. 104.

admodum temporis diuturnitate in proposito casu factum est: Quare hujus symptomatis causam proximam (præter humores varios & ichores ob pugnantem ventriculi & jecoris intemperaciones genitos) arbitrandum est ex intemperie frigidiore & humidiori uteri; morbi longitudine cumulari; plurima parte alimenti in excrementum cedente, quod putrescens & abrasione uteri efficiens, & expultricem irritans, hujus symptomatis est causa: Dolores autem vagi plurima ex parte ex vapore ortum ducant, qui ex ventriculi & uteri imbecillitate procreantur, cum non admodum permaneat: Febris vero Lenta, quæ horis vespertinis exacerascit, absque siti & aliis symptomatibus, à materia pituitosa dominante, cum bilis & biliosis humoris subdominio, venas interstitii & uteri obstruente exoritur Lelius à Fente Consultatione 119.

**Febris Lenta** Hipp. de morb. malis morbo uteri per corruptionem esse Baxxer, L. c. mitem esse calorem: Ejusmodi febris invadit cum partes principales laborant, atque Medicis incantis imponit.

dit quod morbi prolixitate utero imbecillo reddito, plurima pars ipsius alimenti in excrementum serosum edit, Marcoris vero generatio in morborum diuturnitate & nutritionis inopia posita est: Febris vero & dolor, putredinem causam habet, reliqua eandem materiam à calore febrili agitatam, atque in vaporem tempore paroxysmi agitatam, qui ad partem affectam debilem propellatur. Idem Consultat. cxxvj.

i. e. ad blandum & genuinum fontem, seu hepat sit, seu alio pat. gratiosi rois, incitatur: Cum alieno humore & putri sive alieno, sive indigeno maderet, id malum & ut signum & causa: ut signum quia cum sit fastidiosi odoris corruptionis est index: & ut causa, quia perpetuo partem afficit; &c. Totum corpus raro fere simile est, quod notandum in hoc morbo: qui fluor sit per exonerationem partium male affectarum, robore nature tandem in colliquativum fanebre terminatur, nam aut cita mors, aut præ tabe & tabo vita misera consequitur. Idem.



*Caruncula ab utero excreta ob illum cancerum nunc. 1. Partes factus molliores. excreta pro sanie uteri habita. 2. Globuli Lymphae gelatinae, ab utero iure referto ejecta. 3. Effluxus saniei ob membranas uteri putrefactas. 4. Factus involucri cum utero putrefacta excreta. 5.*

§. 1. **A**lias, cum essem junior, vidi carnem excretam à muliere septuagenaria. Et cum esset aliqua inter Paternum & me altercatio, post obitum mulieris aperto cadavere, inventa est uteri portio ad magnitudinem ovi separata ab utero reliquo, simul cum sanguine grumoso. *Saxonia Paushei lib. iv. cap. xix.*

**C**ognoscuntur uteri ulcera ex dolore punctorio, cum excretionibus aut ichoris, aut puris, vel orniisque, quandoque cum sanguine, aliquando sine hoc, cum fetore; & si oleus sit inflammatorius, dolor est iogens cum febre continua; Sicut cancerosum, praeter dolorem & febrem, adsumt vigilie perpetuae, tor-

pus evadit cachecticum, affectus est diuturnus, excruciantur simul cum ichore & sanguine, aliquando etiam catocae portiones, id quod ego jam bis observavi, semel anno elapso in Nobiliss. matrona, cujus canunculas & excretas plures viderunt, iterum in muliere supra dicta. *Idem ibidem.*

§. 2. Cath. de Fiefs, cum secundas contraxisset nuptias, eodem tempore in morbum incidit & gravida facta, sine suspitione: Infinitis remediis usa est, etsi obstetricis quaedam gravidam pronuntiarent, quod pleraque symptomata adessent, quæ 9. mense omnia desierunt, dein dolores partus irriti supervenere, & statim post omnia signa fetus emortui observare sicut, quorum tamen ratio non habita, Quare cum Luteria domum redisset, adhuc foetum mortuum utero gestavit, idque xv. mensium spatio à die interitus ipsius suppuratione facta, praeter 9. menses quibus in utero materno vixerat, Sic partes putrefactæ per inferiora ejiciebantur, quæ à Medico quodam pro sanie ex ulcere uteri manante habebantur, ut ossa quæ remanserant lienis esse censebatur scirrhum.

Tandem extincta aperta fuit, & copiosa adhuc sanies in abdomine reposita absque utero, & fetus ossa aliqua jam putrida, aliqua vero integra erant, & inter hæc unum ex ossibus clavicularum, jam lividum, peritonæum & abdominis musculos perforarat, ut sola eitis integra remaneret, quod in sinistro latere pro scirrhus lienis imponebatur. *Franciscus Rousseus de Paris casu scilicet 4. cap. 12.*

§. 3. In Nobiliss. matronæ utero post mortem aperto, Globuli connexi splendida lymphæ gelatina pleni inventi, quorum particula etiam ante excrevit quam fatis cederet. *Th. Bartholinus Tract. de Bibliotheca incendio. §. 6. & Tract. de vasis Lymphaticis.*

**P**er inferiora plurimorum diuturno spatio ejusmodi globulos deiecit mercator nostras D. Savournia, anno 1664. laetati tandem restitutus, quorum origo extra intestinorum capacitatem quærenda non fuit, lymphæ quoque ortum debentes: Hic vero iustitiam loquitur, ob concitamentum opus omnibus medicis seriem affectum qui à lymphæ vicio, vel deficientis, vel abundantis vel corruptæ dependeat, vel alio modo peccantis, vel intra vasa sua, vel vesiculis coactis, vel alieno loco effusæ persisteant: ut iam prodeat qui

vices Excell. & Viri suppleat iacturam resarciat.

*Globuli splendida lymphæ gelatina pleni inventi* Valorem soccom à sanguine diversam, & vel Lactum vel lymphaticum vehementem ordo ad utrum perveniat difficile est indagare & demonstrare, præterquam in gravidis brutis post partum, iusto tempore apertis: Tendent hoc illuc lactei ductus, vel (ut alii volunt) lymphatici, etiam ad utrum eoque chylum deducant. *Rossignolus par. 2. de organis General. cap. 16.*

§. 4. In Muliere quadam uteri membranas putredine penitus absumptas fuisse, sectio post mortem patefecit: diuque ante obitum hoc factum fuisse, effluxus præcedens saniei fortetis & putris comprobavit. *Platerus Prax. lib. 3. cap. 2.*

§. 5. Uxor N. foetum mortuum quinque menses retinuit: Quo partus promoveretur, mulier ventrem variis modis compressit, unde fluor materis putris, foetidæ: Univerfus uterus, volucria, muscoli epigastrici, &c. desiderabantur. *Vide iii. de Partu difficili.*

## OBSERVATIO III.

*Mola ex membrana grumum sanguinis continente constans ab utero ejecta. 1. Mola tota solida. 2. Mola parenchyma Lienis interius referens.*

§. 1. **M**olam ex sanguine temporibus superioribus vidi, compactam seu conerctam ex grumis, inclusam membrana, quæ dissecta, & grumum dividi sine ulla resistantia: Sanguis siquidem condensatus quasi infarctus fuit membranz, ut in apex abine videmus: Adhærebat hæc moles alii, non carneæ sed membranz per totum, ambæ pendebant plures libras: Aderat & tercia mola plane carneæ, referens substantiam renis magna fatis, cum quibus gemelli sexu diversi prodierunt non vivaces. *Hachstetterus decade viii. casu viii.*

§. 2. Mulier

§. 2. Mulier quater jam pepererat & post suppressa menstrua quintum jam factum putabat in utero habere: Cum vero in nono mense ad pariendum se accingit, pro expectato foetu globulum seu sphaeram excernit albam, mucore respersam, caput humanum magnitudine sperantem.

Culter sphaera dissecta solida tota intus apparuit, cepae instar membranulis crassis & albis fabrefacta, quibus scditis nullus ichor, humor serosave substantia emanavit: Haec mulier cum frigidi esset temperamenti attenuante victu est preservata. *Zacutus Praxis admir. lib. 2. Observ. 155. Vide Obs. 153. ibid. de mola carnea vivente mirabili.*

§. 3. Molam observavi bulbum omnino referentem in parte exteriori, Dissecta vero per medium, carnem quandam spongiosam, sicut parenchyma Lienis habebat, exterius vero membrana forti & carnosa cincta erat. *Dom. Panagelus Pentec. 4. observat. 46.*



# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

### SECTIO XXXVII.

#### De Graviditate falsa, Conceptione Tubaria, Gemellorum origine, Hermaphroditis, Virginitatis notis.

##### OBSERVATIO I.

*Mola ingens graviditatem mentiens. 1. Vterus ulceratus carnem spongiosam & putridam continens. 2. Mola dua extra matricem. 3. Membrana substantia rotunda, bullis referta utero inclusa. 4. Mola pulmonaria. 5. Mola dua in utero concepta. 6.*

§. 1. **M**ATRONA Mildunensis, Debora Barel nomine, duorum fere annorum spatium gravissime utero laboraverat: ab initio Gravidam se esse putabat, omnia enim signa prægationis propemodum aderant: Elapsis tamen mensibus aliquot falsæ hujus prægationis pejus se habere coepit, mammae flaccescebant, venter vero de die in diem accrescebat, appetitus item prostratus erat, dolores quoque totius ventris continui, imprimis vero lateris dextri, atque è regione renis sinistri tam vehementes tamque maximi aderant, ut sæpissime maritum & adstantes imploraverit quo Chirurgum accerferent qui aperto abdomine horrendas illas & crudelissimas bestias expelleret: plane enim sibi persuasum habebat se gestare bestias. Tandem cum in hac miseria ultra duos annos languesceret, aucta febricula, nausea ac vigillis, nullis item usæ remediis, è vita discessit.

1. Aspectu defunctæ abdomine plurimum aquæ carnis loturæ similis effluxit. 2. Uterus in magnitudinem ingentem extensus perironco à linea alba usque ad costas spurias & renem dextrum adeo renaciter adhærebat ut vix avelli posset: hinc dolor ille maximus quem in dextro latere passa erat. 3. Ren sinister plane putrefactus conspiciebatur. 4. Hepar undique abscessibus putridis scarebat, hinc aqua quæ in vacuo ventris continebatur, sanguinolenta facta fuerat. 5. Utero aperto aquæ foetidissimæ puri permixtæ ultra libras sex effluerat. 6. Mola quoque in conspectum sese dabat, magnitudinem capitis longe excedens, inæqualis, nonnullis quoque in locis dura, atque hinc inde putrida ac foetida, illa autem non solum vasis cotyledonibus, verum etiam tota illa parte, quæ dorsum respicit, tam tenaciter adhærescebat, ut sine dilaceratione uteri avelli atque separari non potuerit. 7. Ambo quoque testiculi præter naturam adeo exereverant ut magnitudinem pugni excederent, erantque inæquales, duri, & ad instar fere Ulvæ. *G. Fabricius Hildanus cent. 2. Observ. 55.*

**P**etus se habere capis. Appetitus praestitutus erat &c.] Gravidis plerisque a modum familiaris tum nausea, tum vomitus, unde impregnationis signum petitur: Urget quoque quorundam vel omnium ciborum potuumque fastidium: Causa molestiarum harum cum peti debeat ex mutatione molieris corporis contentis ob gravidationem contingere, videndum qualis illa esse possit mutatio: feminis igitur ac actu venereo semen utrumque admittitur costringiturque in utero: adeo ut totus uterus solito arctius sese contrahat, atque sanguinem in vas suis & cavernulis harentem sursum versus massam reliquam repellat: hic sanguis aliquantulum in utero alteratur, & ab insole patina mutatus totam massam plus minus immutat & alterat, unde humores omnes ex ipso producti, bilis, saliva, succus pancreaticus lymphæ, & si qui sunt alii, similiter immutantur & alterantur: Prout autem tota humorum omnium dispositio est diversa, & diversa est sanguinis in utero prius alterati constitutio, ita nova quæ hinc cæteris humoribus accidit & accipit alteratio, erit quoque diversa: quare etiam tanta in feminis variis observata ut symptomatum differentia: At Bilis præsertim, una cum succo pancreatico noxam suam exerit, nascentque ac vomitus, ut & fastidii & malacæ causa existit: qualibus enim mulieribus bilis per se fluidior, mobilior, & actior existit, illud non tantum nausea, sed vomitus quoque solet esse molestus: quibus autem succus pancreaticus est austerior illi nausea quidem excitabitur, non facile vomitus: Ex quibus observationibus censeo Bilem præ aliis humoribus omnibus maximam ex gravidatione pati mutationem alterationemque; cujus rei hæc reddi potest ratio, quod Bilis omnium humorum sit maxime mutabilis; sal enim volatile Bilis facillime moverit, mutatur & alteratur, & ita quidem ut alii & humores simul moveat & agitet: Succus autem pancreaticus, quia est naturaliter acidus, non est in corpore nostro tam mobilis & mutabilis, sed pitalit in tenui intestino repetere facile se immiscet, vixque suam quandam modo fractam concentrat & si Bili occurrat, illi penitus jungitur, ac cum ipsa coagulatur: quod imprimis evenit quando idem succus vergit ad austeritatem, qualem animadvertimus in omnibus, vel natura, vel ob causas externas tristibus & melancholicis. In hilaribus autem solet succus idem blandior esse, minusque tam acidus tum austerus, unde in talibus præter nauseam vomitus sæpius existit molestus: Videntur enim sanguis circa uterum retentus, & novam in eodem alterationem passus, ex parte saltem fieri magis tenuis & spirituosus; qui proinde toti massæ redditus, ac continuo bili & succo pancreatico junctus, humorem utrumque præstat similiter tenuiorem & spirituosorem,

adeoque magis mobilem, atque ad halitus subiles producendos, magis aptum: dum autem halitus tales in tenui intestino excitantur, & ad ventriculum attolluntur ipsūque vellicant, non mirum si plerumque nausea, sæpe vomitus quoque sequatur, & imprimis ventriculo vacuo, & aliquando cibis pleno: Etenim sicut vacuus ventriculus facilius admittit tum halitus tum humores à tenui intestino assurgentes, ita irritatur idem facillime ab iisdem: solent namque à cibo & potu in ventriculo tum temperati humores halitusque acres, vel alias tenues, ac quovis modo ventriculum mordicantes, tum ventriculus ipse iisdem illini & muni contra prædictam humorum halituumve acrimoniam: Contrarium evenit in aliis feminis gravidis, ut nempe vacuo ventriculo habeant mesius, post assumpta vero alimenta petus, quod fieri autumo quatenus ab alimentis aliqua sui parte, fluidiore scilicet ac spirituosiore, ad intestinum tenue descenditibus ob vitiosam effervescentiam irritatur Bilis propter graviditatem violata, & prius à succo pancreatico, forsan ne nauseam vomitumve pariat impedita, nunc vero à parte alimentorum maxime spirituosæ & volatili rursus expedita, accedere forsan succi pancreatici austerioris contemperatone ab iisdem alimentorum partibus maxime spirituosæ: Atque hæc mihi probabilis videtur Nauseæ vomitusve gravidarum causa quam similiter arbitror esse plerumque panolorumve ciborum potuumve Fastidii causam: Bilis enim corrupta mox Famem solet minuire, succus autem Pancreaticus Sitim pervertere: Si proinde ob graviditatem uterque hic humor plus minusve afficiatur vitieturque, mirum non est si prout Bilis sola est affecta, vel succus pancreaticus simul est inquinatus, nunc quorundam, nunc omnium ciborum, nunc potuum quoque quorundam vel omnium fastidium excutitur: pendet autem fastidii utriusque maxima diversitas ex humoris utriusque corruptione maxime diversa: Melaciam autem, seu absurdum desiderium ab eadem puto deducendum causam, sed accedente potente persuasione gratissimum firum alimentum: Sicut autem bilis succusve pancreaticus non parum sæpe vitiantur ex gravidatione, ita ex sanguinea massa in dies magis inquinata, etiam à prædictis & notatis humoribus ad ipsam pergentibus, spiritus animales pigriantur non satis puri ac defœcati, quare nec sensus externi internive, nec animalis motus semper rite absolvitur in gravidis, quæ morosiores quoque fieri solent: atque pertinacius quævis capientes aut aversantes: Dum proinde mens quoque videtur quodammodo læsi in gravidis non panis, non mirum si appetitus cuiusvis pluri satis indulgeant pleræque, ac non tam ipsi resistant quam eundem fovant & augeant. *Sylvius de le Boi Pract. lib. 3. cap. 6.*

§. 2. Puella xij. annorum ex scala in subterraneam cellam delapsa, nihil mali experta fuit præter dolorem colli, mox post sedatum: emerit tamen in dorso dolor post aliquot hebdomadas, quem sensim in hypogastrio dolor insequitur: Adhibita in consilium obstetrix, inspecto corpore puellæ, Gravidam pronuntiat: Morbo interim correpta, nihil proficientibus remediis, auctaque in dies ægitudine incognita, octava hebdomada ad meliorem vitam transit.

Mortuissimum parentum rogatu cadaver apertum, ut mortis tumoriſque causa innotesceret statim dissecto abdomine uterus prodiit, ovi gallinæcei magnitudine, ulceribus plenus, sed sine pure aut fœtore: In ipsa autem uteri cavitate nihil inventum præter frustulum carnis spongiolæ, & putridæ, libras quatuor cum media pendens, Hepar, Lien, reliquæque viscera nullum vitium visa contraxisse. *Bartholinus cent. 1. observat. 97.*

§. 3. Quædam civis Viennensis habuit molam extra matricem: Erat illa albiſſima & mundissima, circa vasa ſeminaria: Vivebat cum viro annos 16. quam Medicus (ut mulier petebat ante

ante mortem) dissecuit, quo aliis mulieribus simili morbo laborantibus consuleretur: Invenit autem duas molas extra matricem, Unam in quantitate frusti carnis supra matricem & ipsi fortissime adhaerentem: alteram in latere sinistro circa vasa seminaria, in quantitate capitis: Nupit bona puella seni, & quum venerea esset, caste & honeste vixit, quum interim viri nec debitum prestare non posset: caveant igitur puellæ venereæ à senibus & nubant similibus.

*Iohannes Marguardus Practica. Theor. & Empirica cap. 5. de mola.*

§. 4. Comptum est Gravidationem aliquando degenerasse in membraneam substantiam globosamque, totam aquosis bullis rotundis, tumidis pellucidis & innumeris plenam, aliquando enim sanie fetida & diluta: quam sanie figuram jam comperimus in uxore Bibliopole cuiusdam. *Mercatus de mulier. affectibus lib. 3. cap. 8.*

§. 5. Vidi molam ab humore phlegmatico, grosso, ad similitudinem pulsæ factæ per superfluam milli decoctionem in aqua, quæ tantum excrevit, ut post mortem patientis facta anatomia esset majoris quantitaris & ponderis quam residuum corporis ipsius, *Iob. Arclanus comm. ad cap. de mola, lib. 9. ad Almanforem.*

§. 6. Mulier fere quinquagenaria, quæ nunquam viro nupserat, ex congressu cum adolescentulo concipit in utero, unde sequuta est inappetentia, macies & pallor totius corporis, quorumdam eduliorum desiderium, cum aliis graviditatis signis: post xl. à conceptione diem percepit palpitantem quandam versus hypochondrium dextrum, ab eoque tempore melius se habuit & appetitus restitutus est: Venter in dies augebatur, mammae intumescabant 4<sup>o</sup>. mense: in mamma sinistra, rufum, postea album, in dextra læ apparuit: quarto mense fluxus menstruum apparuit copiosus, triduo perseverans, inde ventris tumor imminutus est, postea tamen sensim denuo augebatur, menstruz purgationes singulis mensibus prodibant quemadmodum ante graviditatem: morus in ventre sentiebatur illi consimilis quem fetus in utero conclusus solet exercere: Nono mense dolores parturientium passa est, ita ut vocata obstetricæ omnes adstantes partum expectarent: Illi tamen dolores post xxiv. horas quieverunt & nihil exclusum est: Ab eo tempore menstruum fluxus adhuc ordinatus fuit usque ad xlij. mensem, in quo iterum parturientium dolores passa est sine effectu: postea vero nunquam menstrua prodierunt, ventris tumor permanens cum motu interpolato instar fetus inclusi: Jamque elapsi sunt lx. menses à principio graviditatis, neque tumor ventris est admodum insignis, vixque enim æmulatur semestrem graviditatem: Duo tumores sensibilibet distincti, ut quoddam intestitium apparent medium: illi tumores ad hypochondria vergunt decumbente muliere, ac eadem erecta veram graviditatem referunt, medium ventrem occupantes, compressi recedebant & iterum accedebant, sæpe motu proprio instar fetus in utero inclusi: Mammarum tumor jam dudum evanuit, & illæ admodum molles & flaccidæ evaserunt, à quibus exprimuntur lactis viridis guttulæ perexiguæ: roto graviditatis tempore mœrore & jejuniis secescit, domi inclusa remanens, quod graviditas illa sine conjugæ contracta fuisset: denique anno 1636. mortua est.

Aperto cadavere Molæ dææ distinctæ inventæ fuerunt, Gaigani degebat, vocabatur Claudia Demarcz: *Observatio D. Pollet. D.M. Matisconensis.*

**E**X congressu cum adolescentulo] Fieri molam non à sanguine solo sed etiam à semine virili, operante aliquantulum vi formatrice, indicio sunt membra quibus integritur, ligamenta, venæ quibus utero alligatur, superfœtatio huic juncta, incrementum, motus quidam tremulus, ita ut omnia habeat imperfecti conceptus signa, neque unquam absque coito concipi quicquam observavit: Male *Mercurialis* molam ex solo sanguine menstruo absque semine generati posse putavit: concitescere quidem potest sanguis in utero, quod permittimus, nam putrescit, grumescit, & prava concitat symptomata, sed tamen in molam non facit, nec utero adhærescit, nec potest sanguis ille in carnem verti, cum careat fœculisque naturalibus, concoctis & alteratis: Recte *ait Saxonia*. Si mola sumatur pio qualibet hyperætrofi, fieri potest ex sanguine, sicut in ulceribus sæpe luxuriat caro: sunt quoque interdum abscessus glandulosi & carnei, qui augentur, nutrantur, venas habent & arterias, quales in utero fieri non est impossibile: Vetus hæc non sunt ad modum conceptus, sed sunt tumores p. n. & sanguis è vasīs in capacitatem partus non effluit, sed sit per modum cuiusdam nutritionis, quod in utero quidem contingere potest, sed non est mola: Errat pariter qui contra *Hippoc.* *Ariften.* & *Galenū* authorita-

tem statuunt, molam fieri posse absque viri completu, ex semine fœmineo cum sanguine menstruo, quia, inquit, mulierum semen quodammodo potissimum est, sicut ova gallinarum subventanea absque galli congressu sunt: Contra *Hippocrates* causam facit copiosos menses cum modico & morbofo semine permixtos, quod, ut advertit *Altimatus*, de fœmineo semine non debet intelligi, cum semper fœmineum semen modicum sit, frigilolus, humidus & imbecillius virili, & solum nihil possit, nisi virile accesserit, unde è vasīs spermaticis elapsam rejicitur ab utero, aut reatentum putrescit pravaque inducit symptomata, sicut ex ovīs subventaneis nil potest formari, Et revera credo semen fœminæ esse merum commentum. Mola autem modicentum quoddam habet conformationis, sicut supra diximus. Idem sentit *Arifoteles* & *Galenus* 14. de usu Part. plane negat ullam unquam vilam mulierem absque viro molam aut aliquid simile concepisse, nisi sæpius in fornicis mulier semen effundat in uteri capacitatem, quod etiam *Galenus* dixerit, non est tamen verum: nec unquam fit in virginibus, aut aliis coitu abstinencibus, sed sæpe cum viro facta conjugitur, unde in tempore partus computando errores contingunt, partusque sequitur difficultas, alias superfluis menstrualis frequentissima foret molæ generatio.

tio: Quam bene cum metreticulis ageretur, quae se virgines simulant, si hanc excusationem violat pudicitiae habere possent; Contrariam opinionem tueretur *Senecius*: *Primrosius de morbis mul. lib. 4. cap. 5.* qui Senectum refellit.

*Sequitur est inappetentia, &c.]* A vero conceptu, uteri hydropo, aliove tumore per initia mola non facile discernitur, nam communia habet cum illis symptomata, saepe etiam cum illis coniungitur: In principio enim menses supprimuntur, adfuit cibi fastidia, nausea, coloris in facie mutatio, uteris & mammae intumescunt, lumbi gravantur, unde à fœtu vix discerni potest: Verum ita distinguitur, quia in progressu mulier longe peius habet; cessant enim langescunt fœtus symptomata, sed in mola ingravescunt, vires magis languent, mulier ad incessant gravior evadit, artus gracilescent, dolor ventrem, dorsum & inguina saepe compangit, respiratio est difficilis, quorum nihil adeest in vero & legitimo fœtu, praeterit si sana est mulier, quae omnia falsa sunt, nam scio gravidas peius à fœtu quam alias à mola vexatas.

2°. Quia fœtus post tertium vel quartum mensem moveri incipit, mola autem per se non movetur, sed duntaxat cum in alterutrum latus revolvit se mulier, tanquam pondus inertis, aut lapidis instar convolvitur, cum sensu gravitatis ac interdum dolore: Aut si quodam palpitante motu movetur, non tamen voluntarius est hic motus, nec in omnem situm, ut solet fœtus, atque mulier, quae antea uterum gestavit, facile horum motuum diversitatem internoscere potest: Sed difficillius cognoscitur si cum mola fœtus coniungitur, nisi conjectura quadam, ut ex gravioribus symptomatibus, majore graviditate & ventris mole, quae tamen

non sunt necessaria: In mola corpus in dies magis magisque debilitatur, contra in vero fœtu, nisi mater aliunde exoret: Major & certior est mola suspicio cum parvum tempus effluxit, interdum enim mola per plures annos perseverat, atque etiam commoritur.

*In mamma sinistra rufum, &c.]* 3°. In mola mammae sine lacte tument, nec verum est lac, ob caloris in mammis defectum, ex uteri sympathia, sed aquosum quidam humor: Verum hoc signum non est admodum certum, plurimas enim vidi gravidas, in quibus aquosus tantum erat humor in mammis, ilque paucissimus ante partum: Tam ex sententia *Hippocr.* si menses deficiant, mulieri lac in mammis generari potest, etiam si nec gravis sit nec peperit, Re bene pensitata, signa haec sunt tantum conjecturalia, ferme omnia falsa aut incerta: *Primrosius ibidem.* In dicta muliere quae annum quinquagenum attigerat, ut vera conceptio, ratione exatis, & quia cum adolescentulo rem habuit, cujus semen languidum & cridum, ita nec verum lac expectari debuit.

*Ventris tumor &c.]* 4°. Praesente mola ventet in omnem dimensionem intumescit, ex fœtu vero potius versus umbilicum, coarctatis utrinque lateribus: Ab hydropo autem distingui vix potest: discernitur autem per ventris duritiem, & quod tumor ad digitotum compressionem & palpationem non cedit, nec tympani sonum reddit, nec manu fluctuato illa percipitur, quamvis temporis progressu hydrops succedere possit, Demum in hydropo ventre intumescente totum corpus minuitur, quod non accidit in mola, nam sunt interdum probe coloratae: Addunt etiam quidam in mola supprimi menses, quod etiam non est necessarium & in hydropo contingit *Primrosius ibidem.*

## OBSERVATIO II.

*Graviditatis opinio ob uterum magnum, humore repletum, cum sero multo in abdomine.* 1. Ob Hydropem uterinum. 2. 3. Ob plures calculos in utero. 4. Ob dysentem, durum, massam carneam continentem. 5. Ob uterum extensum. 6. Ob excrescentiam in uteri fundo. 7. Ob sciatoma illi innatum. 8. Ob insignem molem unius Testiculi. 9.

§. I. **A**ugusta Imperatrix omnia signa veræ gestationis habuit, In cavitate abdominis erant tum ichorosi humoris, tum phlegmatis libræ 24. Uterus erat valde magnus, plenus humore crassissimo, albo. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 2. *Fœminam* recens cœnax obstetrices alterum adhuc gestare fœtum credunt, quia inferior abdominis pars adhuc tumida erat. Uterus aqua cruenta repletus apparuit. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 3. Vidimus uxorem seriosum pannorum textoris, quae cum utero se gerere existimaret, intumescere quotidie ventre, progressu statuto tempore partus, malo corporis habitu, febriculaque lenta correpta extincta est.

Cum ægritudinis tempore disparis sententia inter Medicos prolata esset, quod nullus ipsorum animadverterat, Dissecto ventre uterum aqua plenum invenire. *Mari. Donatus Histor. mirab. l. 4. c. 15.*

**U**terum aqua plenum] Hydrops uteri est ejusdem tumore p. n. ex collectione feri, purulæ, aut flatus, intra illius cavitatem aut propriam substantiam & membranas, propter debilitatem calorem naturalem & malam proprii alimenti coctionem: Una causa est uteri ipsius intemperies & debilitas, ex partu laborioso, abortu frequenti, aut frigore externo contracta: alia vero est eadem quæ & Hydropem universalem producit: aqua autem ex abdominis capacitate cœcam & innatam sibi viam parat in uterum: Huc accedendum vasorum Lymphaticorum vitium, quæ *Christi.*

*Wepferus*, Exercit. de Apoplexia p. 383. vidit in brutis ab uteri cornibus, renibus & cœcitis in ductus insignes excrescentia, liquorem suum in venas majores hypogastricas, per ligamentum uteri membranosum diffusas, aliquot in locis facile deposuisse, quem frustra digitis versus cornua repellere conabatur, obortis nodulis ob valvulas liquoris regressum remotantes: Plurimum etiam facit ad Hydropem uteri accedendum mensum retentio diuturna: Signa sunt Tumor imi ventris laxus, & secundum uteri formam extensus, in ambulando gravitas & spirandi difficultas, menses inordinati, pauci, pravi

partum eorum defectus, utriusculi gracilitas & humilitas, mammae molles & lactis carentia, dolores ventris & lumborum, rigor, ac saepe febris.

*Cum utero se gerere, &c.* Distinguitur ab impregnatione, quod uteri hydrops aequaliter juxta uteri amplitudinem extendatur: si ultra decimum extendatur mensis, quotidie & posterioribus mensibus ingrauescit: In impregnatione contra symptomata, quae primis mensibus assurgunt, posterioribus remittunt, mammae, quae solidae sunt, molles fiunt: In hydropse uteri sanguis aliquis effluit: Distinguitur & Mola ponderere: Ab uteri inflatione, pondere & sonitu: Ab hydropse ventris, quod oritur a partibus superioribus & pergit ad inferiores: In hydropse uteri contra: Cum in cavitate haeret, os uteri clausum est: Cum in cysti,

conniver. Si totum corpus bene se habeat, & praesens partus laboriosus, ab uteri citio fit: Difficilior est dignotio si cum graviditate complicitur, quod accidit anno 1645. in uxore Nobil. & Clar. D. Gravi, Consulis Genevensis: Dissentientibus Medicis, quorum alii pro hydropse uterino stabant, alii pro impregnatione: Nutriti pro juncto utroque: Vixit tamen sententia, quae hydropse uteri laborare iudicata est: hinc valentissima exhibita & admota medicamenta ad aquas deturbandas: Nono mense exacto diffidum compositionem est, assatum enim; reterato uteri ostio, aquarum congeries ex uteri capacitate exclusa est, subsequente partu pelli, optime constituti: Cum de nomine imponendo esset disceptatio, Mosis illi convenire dixi, quia aquis esset eteptus.

§. 4. In Comitissa à Gleichen viduæ demortuæ utero plures calculi reperti sunt, Illaque pergnans credita *Mebius Fundam; Med. Physiol. cap. 10.*

§. 5. Mulier se utero gestare opinabatur, exactis decem mensibus nil producit, tumot perseverat, alii eam hydropicam indicant, alii adesse molam, annos xvi. has molestias tulit: mortuæ uterum apparuit undique distensus, durus, crassitie quinque digitorum, pendens libras ix. cum dimidio: In capacitate massa carnea concreverat. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 6. Fœmina à partu retinuit ventris tumorem ita magnum ut putaretur alium adhuc foetum gestare. Vetus in tanta molem extensus erat, ut totum inferiorem ventrem solus occuparet. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 7. Hydropica credebatur gravis, ejus utero exterius adnata cernebarut excrescentia candida. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 8. Virgo abdomen gemino tumore distinctum gerebat, hinc accusata impudicitiae. In mesenterio duo aderant steatomata. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 9. Vidi in fœmina testem in dextro latere ad magnitudinem ovi gallinae, serositate plenum, Et dum viveret mulier se esse gravidam aiebat: In altera muliere Testes cum ligamentis & tubis ita implicatos, ut velut sine distinctione una massa carnea videretur *Dominicus de Marchettis Anatom. cap. 7.*

## OBSERVATIO III.

*Graviditate ementita steatomata mesenterio innata. 1. Ejus insignis tumor. 2. Vesicula crebra peritonaeo incumbens. 3. Materia viscosa in abdomine. 4. Aqua purulenta. 5. Ingens copia serosi sanguinis. 6. Ren maximus unicus. 7. Hepar ingentis molis. 8. Magnitudo ingentis fœcoris & Lienis. 9. Insignis ventriculi tumor. 10. Ejus hydrops. 11. Vesicula ingentis viscera toti ventris obsidentia. 12. Hepatis Empyema abdominis tumorem efficiens, cum Lienis Intestinorumque statulento tumore, motum factus experimente. 13. Vide plura tit. de ventris Tumore (sezione. xx).*

§. 1. Abdomen cujusdam Virginis distentum gemino erat tumore: Obstetrices gemellos ab ipsa gestari crediderunt: Sed calumniam hanc dissipavit Anatome, nam in mesenterio duo duntaxat inventa steatomata, &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

**M**esenterio innati tumoris quoddam genus graviditatis speciem præ se ferens, idiotis rusticum, innoxium tamen testet *Cl. Palschius* in Epilogo. Observat. 4. &c. molietem, ait, Parisiis vidi *p. Marquardus Skegius* ingenti totius abdominis tumore conceptam, cum aliquo lumborum dolore, quam Medici quidam gravidam existimantes, ad partum accingi jubebant, parum proficientes: Hanc postea accitus *Dom. Hæuerens* bono animo esse jubebat, relique famulari operam dæ, neque de onere illo die deponendo quicquam nris cogitare: Nec enim praegnationem hanc esse, sed motum Gallica lingua *Champignon* dictum, Minum in modum intamuisse mesenterii glandulas, & easque parum quendam insen-

sibilem accessisse: Tres jam eodem affectu laborantes fœminas sibi observatas: Tumor hic rotius abdominalis capaciterem eam in magnitudinem elevabat, ut geminos ntero sentire videretur: Tractanti enim ventrem non aquae fed carnis, præ tensione, duræ consistentiam præ se ferebat: Appetitus ciborum aderat, & alvi vesicaeque beneficio libere fruebatur, de nulli alia conquesta nisi de tumoris molestia quadam & indecentia: Habitu corporis ceteroquin erat macilentio, nigro & melancholico: Sarcoma mesenterii, ni fallor, vocat *P. Pignani* 1. de Tum. c. 13. Idque fungosum potius quam scirrhodes: Fungorum autem substantia est generatio, unde adagium de subito & recens emergentibus *Champignon d'entre nous.*

§. 2. Filia N. dissecta ob aquam intercutem, ostendit in mesenterio suo insignem tumorem ponderantem libras xx. latus refertum pluribus vesiculis, &c. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 3. Fœmina ventre tumore cepit, ut Gravidam se crederet: Abdomen à cute ad peritonæum, nulla musculorum carnea substantia interposita, vesiculis crebris, aqua limpida refoertis scatebat. *Tit. de ventris tumore.*

§. 4. Vidua N. Gravidam se credidit: Ex abdomine materiz viscosæ, crassæ, quinque pottæ effluxit.

effluxere, & una cum hac frustum materiz glutinosæ, magnitudine & figura uvam racemiferam referens. *Ibidem.*

§. 5. Mulier Gravidam se esse dicebat, At compuncto ventre mortuz prodiit aqua purulenta. *Ibidem.*

§. 6. Uxor N. prægnans judicabatur ob ventris tumorem: Intestina tenuia admodum protuberabant: Vterus sanus sine conceptu: Ingens copia sanguinis serosi abdominis & thoracis cavum replebat. *Ibidem.*

§. 7. Anno 1623. in cadavere muliebri *Franc. Plac. Zonius* unum duntaxat Renem invenit in medio ventre situm, tantæ molis ut initio foeminam prægnantem putaret *Rhodus Mantissa Anat. observ. 32.*

§. 8. Mulier ob suppressionem mensium gravida frustra habita: Hepar habuit xl. librar. pondere. *Tit. de ventris tumore.*

§. 9. Pagana credebatur fixum mortuum in utero post partum remansisse: quia erat in latere sinistro durities, caput infantis referens: mortuz tantæ magnitudinis Epar inveni, ut lobus finitrum prætergrederetur latus. Splen quoque immensæ magnitudinis: *Vide tit. de Hypochondr. tumore.*

§. 10. Foemina pro gravida habita est ob tumidum abdomen: Lien inter hepar & ventriculum la itabat: Hic insigni tumore distensus. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 11. Mulier in utero se habere crecidit intumescente scilicet ventre: E ventriculi capacitare eductæ aquæ libræ xc. membrana ejus interior multis hydatibus scatebat partim disruptis. *Vide tit. de ventris.*

§. 12. Mulier novem menses gestare uterum putabatur, Nonnulla ex his aderant quæ imprægnati mulieribus aesse solent, instante partus tempore, præ dolore ob abdominis tumorem satis concepit: Veriti parentes ne uia extingueretur foetus, ut adempta matre superesset, recens emortuz cadaver pene spoliatus secatur.

Totum corpus internum, Epiploum, Mesenterium, Hepar, Lien, Pulmões, Cor quoque ipsum & Peritonium erant obdura vesiculis aqua purissima plenis & limpidissima, nihilque graveolens habebat. Et quod magis mirandum, unicuique vesiculæ triplex erat tunica & incolumis, integraque à corpore, sive esset superficies sive interior substantia, decidi detrahique poterat: *Hippocr. aph. 55. lib. 7.* hydatidas observavit in corpore ipsius Hepatis, sed nunquam quid tale in toto corpore deprehensum est. *Ballonius par. ad. 186.*

§. 13. Lysbet Gillis sibiimer falso ingravidationem imaginata erat, nam per sex menses maritata fuerat: Obiit Decemb. 16. an. 1640. Et post idie cadaver apertum est, in quo viscerum naturalium *nauseæ egylar* malignamque constitutionem deprehendimus: Hepar totum in empyema conversum erat, foris membrana integra existente, hinc mortis causa, nam in pus album crassum, fixitulum totum parenchyma mutatum erat, venæ tantum integre restabant, adeoque inde Hepar tumebat ut variis in locis novacula conscissum, & obtuso etiam instrumento leniter pressum pus in altantes studiosos profunderet: Hepar ut triplo naturalem magnitudinem superabat, lienemque in similem molem excrescere coegerat, sed is durus erat, non tamen scirrhusus, & in uno ac altero loco, ad vasorum ingressum parvum purulentum apostema habebat: Quippe cum Lien sit primum emundatorium Hepatis, omnes ejus impuritates prolicet & in se attrahit instar spongiæ, unde in omnibus hydropicis vitis lienis se ostendunt priusquam Hepatis appareant: Scribente ideo *Hippocr. Omnem hydropem generari præexistente prius vitis in Liene*, quod intelligendum de symptomate tumoris aquosi, Nam quomodo Lien in spongiosam suam substantiam aquam attrahere potest ex Hepate, tamdiu adhuc nondum Hepatis vis obruitur: sed cessante ea tractione, cum aqua restagnat in hepate, plane hæmatosis obruitur & extinguatur, unde tunc in scirrhum aut tumorem aquosum adducitur: cum adhuc robore aliquo peller expellit in musculos & partes externas, unde generatur anasarca, aut diffat ex hepate in abdominis cavitatem, & generatur Ascitis, sive illud fiat disruptis vesiculis aquosis, sive per poros membranz sensim emanat aquosa materia, sive per diaporesin vasorum transfundet, nimirum cum causa hydropis est frigus positivum: Sed cum est in causa frigus privativum, h. e. cum retortidus æstus exurit parenchyma hepatis, tunc rimis finditur, sicuti sub canicula contingit in terra, sed tunc aqua est citrina, sitis major & sitis implacabilis.

Uterus in hac muliere, quæ erat ann. 22. nec unquam pepererat, erat magnitudinis exilis ut in virginibus. Unum autem eximium animadvertum fuit, nimirum *Plurima minima plica, quæ uterum verum sive internum corrugant & confringunt, quemadmodum conspiciuntur apperebant.* Misera hæc sibiimer falsa ingravidationem imaginata erat: Quæ autem tumor in ventre ingravidationem mentiebatur, à mole Hepatis & Lienis, & flatulento tumore intestinorum productus erat: Et cum motum à flatibus in ventre sentiret, fixum viventem se commovere opinabatur: Viscera vitalia, sicuti in hydropicis fieri consuevit, erant flaccida, nam etiam

etiam bona copia aquæ abdomini innatabat, à labefactato tono & temperamento Hepatis, & ab eadem causa enata diarrhœca eam attriverat: In auricula dextra cordis, & in cavitato ejus ventriculi, residēbat crassa, viscida, conglomerata pumita, ovi gallinæ magnitudine, quæ digitis protracta in longum extendebatur, tenaciter coherens. *Oestho Henricum observat. 24.*

## OBSERVATIO IV.

*In muliere qua Gemellos pepererat, Testiculis, & extra eos ova reperta sunt.*

**D**Ecimoquarto Maii examinare nobis concessum eadaver mulieris 27. annorum, quæ non semel gemellos pepererat, jam xi. liberorum mater: Hæc ante 27. septimanas conqueri cepit, octo mensum gravida, de lassitudine totius corporis difficilique incesu, non sine molestia doloreve summo circa locum eum qui est articulationis femoris cum osse Ischio: Octavo à partu die dolor hic insigniter exacerbatus, sætu in partu bene excluso: Tumor jam circa vaginæ uterinæ latus dextrum manifestius occurrebat, cum duritie notabili: Applicata ab obstetricibus, aculis, Chirurgisvè variis varia, etiam talia quorum pendendis applicatorum opera, non solum suppurationi promota, sed & accessus apertio: Purulenta hinc copiose effluxit materia, sæpius saris ferida, quam etiam in urina semper reperire licebat, Dolorifica valde hæc puris per pudendum excretio: Paucos post dies usu eorum quæ mundificandi consolidandive virtute pollent locus hic apertus clausus est, brevi effluxo tempore circa natum partes inferiores, pudendo vicinas, viam novam materia sibi elegit, ubi etiam ulcus amplum, scetidissimo pure sordidum produxit, incurabile omnino, Extrabefacta enim xii. maii obiit.

In dissecto corpore vix aliquid occurrebat consideratione dignum, uterus enim hic optime se habebat, nec ullum prioris apertionis vestigium exhibebat, nisi quod loco eo qui pudendo vicinus, asperitas major in dextro quam sinistro latere, majorque durities. Consideratione dignum in hæc muliere, non tantum extra testiculum sinistrum ovum aliquod hæsisse, membranis singularibus involutum, verum etiam ex ipso testiculo ovorum par non unum à nobis separatum, quæ arte sibi coherabant: Hinc an Gemellorum generatio deduci queat cogitent alii. *G. Blasius observ. part. 5.*

**E**X ipso Testiculo ovorum par, &c. 1 Ova in omulium animalium genere reperiri confidenter asserimus, etiam quadrupedibus ac homine ipso evidentissime conspiciuntur. In cuniculis, leporebus, canibus, porcis vaccis, &c. à nobis dissectis ea vesicularum ad instar, ut in avibus ovorum germinasolent, sese dissecantium oculis exhibent, quæ intesticalorum superficie existentia, communem tunicam hinc inde sublevant, atque ita per eam aliquando transparent ac si brevi exitum minantur. Ova hæc intesticulis generantur ac

perficiuntur, eodem plane modo quo vitelli in avium ovaris solent: quatenus scilicet per arterias præparantes sanguis ad testes affluens, in membranosa illorum substantia materiam his generandis ac nutriendis idoneam relinquithæc ubi naturalem magnitudinem acquisiverunt, tunicis variis involvantur, inter quas immediate à matris congressu glandulosa quedam materia excrefcit, ex qua globulorum dictorum substantia componitur, &c. *Regnerus de Graaf de mulierum organis cap. 11. & 12.*

## APPENDIX

*De Hominis Conceptione ex Ovario, Et Gemellorum generatione.*

**I**usseras Ill. Dom. ut per compendium traderem Tibi rationem qua Conceptio Hominis ad mentem Recentiorum observatur, *Ioh. Hornii, Theod. Kerkringii, Regn. Graafii, Ioh. Suammerdam & Clar. Ruifchii*: Accipis igitur modum quem quidem nos, partim ex lectione istorum scriptorum, partim propriis quoque observationibus animo concepinus. In Coitu nimirum prolifico Semen virile irrigat non tantum uteri fundum, sed & pars ipsius spiritiuosa, sive aura seminalis per vas Deferens, sive Ductum brevem, ad Ovarium usque penetrat, adeoque ovum cæteris maturius, aurt magis dispositum ac porosum virtute sua, (ut loquuntur) fecundat: Intumescit inde per modum velut inflammationis ovum, rubescit & distenditur Tuba, suamque Proboseidem ad Ovarium digitis quasi arctius amplectendo contotquet: quemadmodum illam Tubarum rubescētiā, distensionem ac contorsionem, in recens gravida Amstelodami dictus modo Dom. Ruifchius anno 1673. publice ostendit: Labentibus hinc tribus aut quatuor diebus, Ovum illud adeo crescit ut Ovarium suum ad exelusionem stimulet: & quamvis in non gravidis ex ovario in tubas nullum foramen manifesto compareat, in recens gravida tamen idem Ruifchius observavit aperturam, quæ pisum majus admittebat: Quis imò vidit illum Ovarii locum, quo ovum elum federat, post exelusionem densa spongiositate, villisque rubicundis obfessum, perinde ut in uteris recentium puerperarum confici etiam assoles. Atque hæc per abscissum quasi facta exclusio, sive translatio ovi ex ovario in tubam, & hinc in uterum, proculdubio genuina ratio est nausæ ac vomitus qui sub saltim conceptionis, & primis post fecundum coitum diebus accidere so-



melis consuevit: Porro vero ubi ovum à proboscide tubæ exceptum est, facilius omnino & innocuus delapsus in uteri cavitatem ut plurimum datur: quod si forte tamen in medio tubæ ovum hæreat, *Conceptio Tubalis* Sive *Tubaria*, (de qua alias scripsi) vide Observ. Præc. non sine matris miseræ exitio contingit. Cæterum ovo non hærenti, sed rite in uterum delato quæ evenient ulterius, & qui illud incrementa sua capiat ibi, hic accensere nihil attinet: neque enim à veterum doctrina hac parte multum recedit Neotericorum cura, nisi quod exadins multa explicent, hi ipsi, quemadmodum quod ad ossium formationem attinet, apud *Theod. Kéreringium* in osteogenia sua per singulos menses videre licet.

Verum enim vero experitur hæc de *Conceptione Hominis* opinio idem cum aliis novis inventionibus farum, formanturque à multis contra ipsam variz objectiones, Et 1<sup>o</sup>. Cum nihil à seipso moveri constet, quidnam illud sit quod ovum ex ovario in uterum propellit, 2<sup>o</sup>. Ovum semel fecundatum non moveri à seipso, excludi ab ovario stimulat, sicut idem in gallinis accidit, dum ova grandescunt. 3. *Obij.* metus est ne ovum per tubæ angustias penetrans rumpatur: At Tubæ, etiam in non gravidis, tam sunt pervix semper ut statum & aquam per canaliculum admittant: In gravidis vero quantum distendantur (immane vero quantum in conceptione Tubali) supra fuit relatum: Deinde, etiam si fortassis ovum aliquod interdum frangi contingat, nihil inde damni, nisi quod conceptionis hæc vice spes pereat, alia vice adimplenda. 4. *Obij.* Quare, cum bina sint ovaria non semper Gemelli nascantur? Ad hoc reponi potest rem ita se habere in Scotia & forte aliis nonnullis regionibus, ubi foeminae uno partu ut plurimum binos, quandoque etiam plures foetus edunt: Sub nostro autem climatè quod Gemelli rarius nascantur, nisi ex celo atque astris causam deducere placuerit, varia tamen impedimenta hujus rei, alia ex *vicio conformationis, obstructionis, compressionis, aut intemperies dextra sinistrae Tubæ intervenientia* afferri possunt, attestante hoc scilicet *cadaverum foeminarum*, dum partes illæ generationi dicatae in alterutro latere non raro male affectæ conspiciuntur. 4. *Obij.* Quare ab uno coitu, sicut in gallinis fieri creditur, haud singula utriusque ovarii ovula simul fecundentur, ita enim ad subsequuturas sane generationes ajunt, iterato coitu nullatenus opus foret: *Responderi potest* quo minus hoc fiat, diversa partium obstat constructio: Ovi ductus enim gallinarum rectus est & laxior: in homine vero angustus, & adeo tortuosus, ut astra seminalis non nisi ovum proxime adjacens ordinario attingere possit, hæc vero juxta per universum penetrare ovarium: Quod si vero ad plura ovula quandoque autamillam penetrare contingat, plures etiam concipiuntur foetus.

#### De Ovario Humano atque Tubis.

Pauci præterire dies, cum ad *Te Vollenadi* mitterem de Hominis ex Ovario conceptione observationem, Nunc autem ad illustrandam illam nova mihi emersit occasio, dum mulier xxx. annorum, & sex jam tum liberorum mater homiçidii convicta, die 14. Janv. 1676. *Berolini* gladio peteussa ad anatomen *Curiosis* destinata fuit: Cætera præteritis, ad partes autem genitales quod attinet, in Ovarium & Tubas accuratius porro inquirere mearum tunc esse partium arbitratum sum: *Tubas uteri* vererum plurimi aut plane ignorarunt aut aliud ipsi nomine forte tribuerunt, sicut *Fesalius* sub titulo vasorum deferentium pinxisse videtur, lib. V. *Anat. c. 15*. Alii pro cœcis habere ductibus, ut *Spigelius* l. 8. cap. 22. & *Higlmorus* lib. 1. *Anat. c. 4*. contra nos cum *Feslingio* c. 7. atque aliis Noeticis, & *Tubas esse insignia, admodumque conspicua vasa, & in uteri fundo manifeste patere sine hesitatione asserimus*. Afferro fides accedit ex inflatione per canaliculum facta, si is in Proboscidem intrudatur, exire enim ore insufflatus aer per extremum angustum in ipsam uteri cavitatem: Quod si aquam, lac, aut similem coloratum liquorem ore contentum, per canaliculum impellas pariter is transiit, & adeo quidem manifeste ut dubitationi locus relinquatur nullus: *Hæc autem sit organi descriptio*. Extremum ejus est latum, quod magis rubet & laciniatum est, *Proboscis* non absurde appellatum: Medium ejus capreolis crispum est & sensim angustatum: Extremum angustum, utri fundum in similitudinem penetrans, atque in latere infero *Valvula* oblonga clausura: Innotescit hinc *Valvulam* in utero parere, sed retroorsum nequam: admittit eaque tantisper stylum, sed non altius quam ipsa extendi retro possit: accipiendum equidem hoc erit de liquoribus, quos frustra aliquis per valvulam sursum pellere (nisi violentia interveniente) tentaret: & quamvis extremitas satis angusta in cadavere appareat, in vivente tamen magis parere prorsus vero simile est. De *Proboscide* notandum, læceram illam & quasi attritam à *Fallopio* primum in observ. *Anat. p. 472*. deinde ab aliis quoque & à nobis talem semper observatam, neque de laciniata illius figura amplius dubitandum: Scrupulum tamen inlicere posset, quod *laciniæ* solcant esse rupruque indicium, quod si proboscidi lacinæ illæ non sint naturales, oportet ipsam testibus antea adhæsisse: ab istis autem per incuriam, dum intestina extrahuntur, communiter abrumpi solere: Nihil tamen hic determinatum eo, quin potius hoc ad indagandum propono dubium, num per circumspectam magis dissectionem connexio tubarum cum ovario forte repëriri possit: In figuris *tot. Caff. Placentini* l. 8. tir. 18. Tubæ sua proboscide testes attingunt: Concordat & *Thomas Bartholinus* in *Anat. novissima* p. 152.

*Ovaria* porto sive Testes, obvelat membrana satis valida: Eam cum in dextro per longum scinderem, effluebat humor ex albo citrinescens: sinistrum servabam integrum, sed utrumque in ferventem aquam per medium horæ quadrantem simul conjiciebam: Tunc extracta induissem animadverti, conspiciuis per superficiem ovorum eminentiis, quæ tamca Ova per dissolutionem magis in conspectum se dabant, suis singulis cellulis albicantia, atque facile exemptilia, Speciatim in sinistro, quo divisæ pluseula quidem viscebantur ova, hiæ quidem per medium scissæ, in una vero ipsius cella, quæ exteris major, nucleum eærasi æquabat, haud ovum, sed materia spongiz obscure rubenti prorsus similis hærebat, imo qualis illa videatur fuisse quam *Ruischius* Amstelodami vidit in recens Gravidæ ovario, nominando ipsam, *densam spongiositatem*, villisque rubiundis obsessum locum, in quo ovum antea sedem habuit, perinde ut uterus recentium Puerperarum: Profecto, si quid coniectura assequi licet, ex hac cella devolutum fuit ovum pro conceptione Gemellorum quos postremo partu foemina ista ediderat: Quod si itaque apparatu tam operoso, & novis subinde per attenuatam Ovarii membranam foraminibus (quale quidem foramen à solerti natura in muliere recens gravida factum, & pisum majus æquans *Ruischius* die 15. Aprilis 1673. se vidisse testatur) ad singulas conceptiones opus est, tolerari nullo modo poterit opinio *Kerkringij*, qui Anthropog. e. 1. tam à conjugatis quam virginibus, talia ova sæpissime, & ferme insensibiliter externi asserit: Et quamvis sibi ex relatione quorundam hoc constare addat, manet tamen incertum, cum aliz hæc de re interrogatæ contrarium affirmant, quicquam scilicet tale nec instante purgatione menstrua, nec stimulante libidine, nec ullo alio tempore sibi, etiam observantibus accidere.

Porto vero ad ductum illum brevem quod attinet, qui titulo *vasis deferentis* communiter ab Ovario ad uterum, aut potius ab utero ad ovarium tendit, non penetrare is mihi hoc in cadavere in civitatem visus est: Cum tamen alij hunc ductum pervium invenerint, fides ipsorum nihil ibo derogatum, *Veslingius* sane syntag. Anat. e. 7. nominat ductum Testium, & pingit ibidem titulo vasis deferentis: Vasa autem præsumuntur esse non prorsus solida, sed quovis modo pervia. Quinimo præter hunc ductum ad fundum uteri porrectum, alterum adhuc ab eo exilientem, sæpiusque delitescentem, & ad uteri cervicem protensum statuit: Unde me arbitro, ductus prior *uterinus*, alter *cervicalis* dici non absurde possit: Vterque autem eo fine, quo non tantum in cavitate uteri, sed etiam in cervice, adeoque locis pluribus, pro excipienda aura feminali canales adessent, fabricatus à natura videretur. Denuo autem in mentem hic venit Epistola, quam de *Conceptione Tubaria* anno 1669. (vide observat.) cum hæc de ovario humano nova opinio adhuc ignota esset conscripsimus, Icon ipsi inserta, non duplicem uterum (quemadmodum *Ben. Vassalini* Chirurgus Parisiensis, Programmatissæ impressi author, crediderat, sed fortum extra uterum in medio Tubæ conceptum ostendit: Jam vero hic fortis non poterat primum in uteri cavitate ampla concipi, & deinde per angustum tubæ extremum, præsertim renitente valvula sæpius descripta, sursum in medium Tubæ trudi: contra autem vero magis consonum videtur principium propagationis suæ desuper accepisse hunc fortum, & illud quidem (sive semen matris, sive ovum animatum fuerit) in media via, dum descendebat hæsisse, atque ob impedimentum aliquod ibi substituisse: Singulari certe argumento, non fieri in utero conceptionem, nisi ex testibus aut ovario aliquid descendat: Descensus autem ille non est momentaneus, & qui in ipso coitu necessario contingat, sed potest ad aliquod forte tempus differri, donec nimirum natura foramen per ovarii membranam, quasi quadam specie apostematis paraverit: Unde si primis à coitu diebus vacuos Damatum cervarumque uteros invenit *Harvejus*, mirum adeo potest esse nemini: quinimo perfecta rei veritate ipsemet *Harvejus*, si hæc attigisset tempora, suos de *Generatione animalium* libros, hæc fortassis parte, tantisper fuisset immutaturus *Joh. Sigismundus Elsholius* in *Miscell. curiosis annorum 6. & 7. observ. 197.*

#### De Gemellorum origine

Quantopere hætenus Gemellorum origo philosophantium animos torserit, in propatulo est: Qui in cellulas uteri causam retulere quondam, suam in rebus anatomis prodiderunt ignorantiam: Seminis copia, aut in partes divisio, non explebat etiam mentes acutius cementes: multo minus uteri paulo major, quam foeminis communiter esse consuevit, amplitudo: Ita Problema hoc inter incerta ad nostrum usque ævum jaeuit: Meministi vero, mi *VVolgnadi* in observatione nostra de *Ovario atque Tubis* ad Te missa, pingi cellam Ovarii unamgrandiusculam, materia rubenti spongiz simili obductam, ex qua suspicabar tunc devolutum fuisse ovum pro conceptione gemellorum, quos postremo partu foemina illa ediderat: Profecto hæc in opinione ego roboror in dies, & naturæ ibi magnum mysterium videre mihi videor: Illius enim cellæ præ cæteris omnibus capacitas insigni quid arguit, nisi in ipsa hæsisse, aut ovum simplex reliquis majus, aut Ova duo exteris æqua

lia? De priori, si unicum peperisset fortum mater, nemo dubitaret: iam vero, ubi de Gemellis hos ultimo partu editis constat, posterius verum esse conjicio, nimirum istam cellam haud complexam esse ovum simplex, sed bina ova, membrana tantum tenui intersepta: Cellæ enim suis singulæ septis carneis sat crassis ab invicem distinguuntur, atque ova ut plurimum simplicia complectuntur: quotiescûque vero in cella una geminatum ovum hæret, istamque cellam aura seminalis in celsa venerca attingit, tunc ex ovo illo gemello in utero devoluta, non nisi Gemelli me judice nasci poterunt: Arque hanc esse veram, atque unicam Gemellorum originem, huc usque incognitam arbitror: Ad Tergeminos quod attinet, cellam unam interdum trina (fortassis etiam pro pluribus plura) ova continere probabile est; neque absurdè adeo hinc inferetur in *Feminis Scoticis* esse ovaria ea fecunditate disposita, ut cellæ pleræque pluseulis farciantur ovulis, cum gemellorum atque trigeminorum partus ibi sit adeo frequentes. Idem ibidem Observ. 98.

*Conceptio Tubaria, h. e. Humani fetus extra uteri cavitatem in Tubis conceptio.*

Proxime elapso mense Nov. accipiebamus ab amico literas, Lutetiz Paris. commorante, quibus is refert in aperto cadavere femine Parisinæ inventum fuisse duplicem uterum, addendo etiam programma Gallicum typis impressum, atque iconem æri incisam eum Lemma- re hoc *Demonstration d'une double matrice*. Argumentum autem programmatæ Gallicani omisissim superfluis, Latine sic sonat.

Benedictus Vassallius, Chirurgus Parisiensis, aperuit die 6. Jan. 1664. cadaver mulieris 32. annos natæ, temperamento sanguineo, & habitu corporis satis musculo præditi: Repertæ fuerunt duæ matricēs singulari connexionē à natura tam bene dispositæ, ut vera jam undecies concepisset, septem nimirum filios & quatuor filias, iusto omnes tempore, & debite compositionis. Atqui habebant fraterculum embryonem, conceptum in Adjutorio sive adminiculo genuini uteri, & quidem in loco ad distensionem tam inepto, ut fortis grandescens decem septimanas funestis symptomatibus marrem exagitarit: Tandem trium aut quatuor mensium factus fetus, carcere effracto tumulum sibi paravit in ipsa matre, excitando ingens sanguinis profluvium in universam abdominis cavitatem, id quod tribus ultimis diebus vehementissimi motus convulsi, & denique mors subsequuta fuit.

**D**e matricibus) Vix credam gemino instructam fuisse utero Parisiensem illam gravidam, nisi vocabulum uteri latissime accipere velimus pro quacunque capsula fori includente: Quotusvisque enim appropinquat embryi domunculam arterias considerat, dextram uteri genuini Tubam dilatatam, non autem accurate loquendo Uterum secundum esse constituitur. Nimirum fundus uteri est locus in cuius rotunda cavitate humani foetus ordinatâ lege concipiuntur: At vero extra hanc aliquando contingit & generari historiz aliquæ conveniunt: De modo tamen mens hæret quo conceptio in istâ Tubariz contingat: concedendum tamen semen virile non tantum in fundum pervenire, sed in ipsas inde penetrare Tubas valere: 2. Tubas immane quantum dilatari posse veluti infelix Catharina Boncavalla testis apud Tulpinum l. 4. obs. 44. 3. Masculum semen in Tubas receptum semini feminino commisceri, ut conjundim deinde in fundi cavitate pro fecundatione & fetus conformatione resurgat: Denique in Tubis, haud secus atque utero, obstructions esse frequentes, ut loquitur Vellingius Syntagm. Anat. c. 7. Suppositis his, sequitur miseriam hanc Parisinam sub amplexibus veneris suscepisse semen maris, quod per uteri fundum in dextram usque tubam penetrans, & muliebri copularum, dum telahi in cavitate niebant, interveniente notabili quadam obstructione impeditum subfuit: Virtus interim plastica nunquam otiosa, ex miscella fecundi seminis fabricari fortum incepit, non refragante proterus loci

commoditate, si quidem authore Riolano, Tubæ uteri sunt ejusdem naturæ & substantiæ cum utero, quia mediocriter carnosæ: Porro crescente foetu magis magisque dilatari tuba incipit, imo & membranz ipsius spissari, adeo ut sua crassitie gentium uterum emularetur.

*Tandem factu carcere effracto, &c.*) Tubarias ejusmodi conceptiones embryoni semper, maris ut plurimum lethales esse arbitramur: Per angustam enim tubæ ductum remeare in uteri cavum haud valet fortis grandis, unde aut suffocatur in matrice illa falsa, si ea sit spissior, aut si tenuior, vi petruit & in cavum abdominis probabitur. Eam rupturam insignis hæmorrhagia necessario comitatur, imo lethalis, nisi abdomine artificiose diviso sanguis effusus evaqueretur, & embryo ante partus cæsarei methodo eximatur: Hujus quidem operationis, quæ exciso foetu in tuba concepto, patens servata sit, etiam si exemplum non dux extat, fieri tamen eam posse non magis est negandum quam partum cæsarium hæcenus cognitum: Arque nec illud negandum, tum in tubis varioz morborum muliebrium causas latere hæcenus incognitas, tum in ligamentis uteri reteribus, quippe quæ anna simplicia sed esse conæva, & è duplici membrana haud secus atque uterum ipsum componi, imo per eandem feminalem materiam, nec non alia in utero conservata excrementa ad inguina expelli, ex l. 1. *Vossingii* Syntagm. Anat. c. 7. & aliis abunde constat, Job. Sigism. Elsholtz *Siue in misc. cur. ann. 4. Et 5. pag. 77.*

#### Conceptio in Ovario, seu Testiculo.

**P**ost id quod modo Nobili Matrone de S. Mere accidit, de fetus in mulierum sessiculis formatione, ac providè de Ovariorum existentia vix quinquam dubitare debere crediderim, Vir Clarissimè: Matrone illa, cujus eximias novissi dotes, cum jam octies felicissimè peperisset, & à quinque annis gravida non fuisset, ac ideo ejusmodi periculo defunctam se putaret, in illud iterum incidisse ante tres circiter menses;

menſes, exiſtimavit, quia menſtruis, quæ æam nunquam deſecerant, per menſem integrum, & amplius, eſſi alijs male non haberet, deſiſſinta fuerat, ſed cum paulo poſt aliquid ſanguinis ex utero, per duos poſtremos vite ipſius menſes) juxta ſerè, abſque ulla tamen incommodo, ſtillarèt; ſe prægnaſcem non amplius credebat. Cum 22. hujus menſis die, poſtquam mane ſana ſurrexiſſet, & per horam præter præter unam ſcripſiſſet, in deliquium, quo pulſus omnino ſupprimebatur, inciſit, loquebatur tamen, & cognoscebat.

Dominus de S. Mere deliquium illud vapori cuiſpiam mulieribus familiari adſcribens, eo non multum commotus eſt, donec attrito brachio nullum invenit pulſum. Tum privatio illa pallorì leſali juncta eum adeo terrefecit, ut emiſſo nuncio me feſtinanter accerſeretur.

Ad agram circa octavam horam vespertinam acceſſi. Eam frigidam & ſine pulſu invenì; facies decolor, ſudoreque pingui & frigido operta erat, ratione tamen & loquela etiamnum libere utebatur. De vehementi dolore colico ab inguine dextro ad renes continuato querchatur. Urgebat adeo dolor, ut cum partem dolentem tangere voluiſſem, ea me, ne ſe attritarem, præ ſyncope metu, rogaret.

Momento poſt imminentis partus omnia ſenſu præſtudia. Chirurgum ſuum vocat, atque inter ejus brachia peperiſſe exclamans, moritur, nullo ſanguinis effluvio, aut alio mali ipſius ſtatus indicio extrinſecus apparente.

Leſum adeo inopinatum omnes attonitos reddidit, & Dominum de S. Mere ad Cadaveris apertionem, ut ejus cauſa reſteteretur, petendum impulit. Dominus la Cheſe Chirurgus, ad id officiì me aſſiſtente præſtandum electus eſt. Domini de Montanſon, Veſena Petrocoriorum, Advocatus, de la Perte Eques Comitis de Taleran, du Fair Pharmacopæus, cum duobus famulis teſtes fuere.

Apertis abdominis tegumentis, inteſtina omnia parte epigaſtrica, in ſanguine fluctuantia viſa ſunt ſanguinis illius ultra libras duas cochleari, ne ſitus partium mutaretur, extrahi curaviſſa cum prodigioſum ejusdem coagulati quantitatem in dextro latere reſtitantem advertens, cum manu auferre ipſe tentavi, quali verò ſtupore percuffus fuerim, cum inter priores grumos, ſutum pollicem craſſitie æqualem, at tertiâ parte breviorẽ, diſtincte formatum, in quo ſexuſ masculinus facile agnoſcebatur, at nudum, & ſine integumentis invenì, judicet Vir Clariſſimus. Fœtum hunc quadra impoſitum omnibus aſſtantibus oſtendi, atque locum unde exiverat reperiendi avidus, vicinas partes diſigentiffimè examina-vi. Duobus digitis ab eo loco diſtare cornu uteri dextrum vidi. At auctus eſt ſtupor ubi teſticulum ſecundum longitudinem per medium dilaceratum, quæ parte Tubam non attingit, adverti, ejusque capacitatem ſanguinis grumis oppletam notavi. Ibi infantem formatum fuiſſe nullus dubitavi, ſimulque cum, nimium in eo loco incrementum adeptum, oportuno tempore de labi non poiuiſſe, ac tandem carcere effraſto erupuiſſe, cognovi.

In mea ſententiâ confirmatus fui, dum teſticulum hunc cum ſiniſtro comparans, cum quadruplo craſſiorem invenì, ovum enim gallinaceum craſſitie æquabat, ſiniſter verò minorem caſtaneam vix reſerebat. Ille foris & intus totus rubebat, præter ſanguinis grumos quos continebat, at ſiniſter pallidus, & granulis ſebo luteo ſimilibus plenus erat.

Tubam dextram examina-vi, nec fœtum eam unquam ſubiſſe notare poiui, quin ea ſiniſtra omnino ſimilis erat.

Vterum tandem accuratiſſime inſtravi, is nullatenus laceratus, & in ſtatu merè naturali mihi viſus eſt. Notavi tantum eum craſſiorem & molliorem quam in ſeminis non prægnantibus inveniri ſolet, fuiſſe. Talis omnino erat qualis ab Harveo primo graviditatis menſe, deſcribitur. Specillum per Vaginam in capacitatem introduci, Vterumque diſſindi curavi, nec vel minimum conceptionis indicium animadverti. Membra interna interioriſ vafa ſanguine plena & veluti Varicoſa mihi equidem apparuerunt, atque hinc dubio procul parvus ille, de quo locutus ſum, fluxus procedebat.

Quamquam mortis hujus Matrona cauſam alioſum in quaſiſum ire neceſſe non eſſet, cæteras tamen tum abdominis tum thoracis partes conſiderare voluimus, eaſque optime & naturaliter conſtitutas reperi-mus.

Quid è ſupradictis concludi poſſit, ſe jam judicare ſino, cum nemo, ſe melius, Vir Clariſſ. conſequenti de ex hoc Phanomeno neceſſariò ſequentes, deducere valeat.

De quibusdam ſutibus tum in tubâ, tum in infimi ventriſ capacitatem reperiis integro utero, integriſque tubis manentibus, verba faciunt Autores. At neminem hæcenus conceptionem in teſticulis, aut ovario fieri demonſtrare poſuiſſe puto, unde Ovorum exiſtentiam ulterioſibus probationibus indigere multi huc uſque crediderunt. Verum ex Hiſtoria ſupra allata id maniſeſſe probare mihi videar. Ex Episto-la à D. de St. Maurice ad D. de la Cloſure apud Petrocorios Medicinam Facientem 26. April. 1682. Scripta ut in Ephemeridibus Gallicis continentur.

## APPENDIX

Superſtationis extraordinariæ hiſtoria; ſutui in utero corrupto & clam latenti ſupervenienti.

**A**ntonja Sarron, Uxor Petri à Lavadour in pago Bens, Sub parochia Chatrezenſi, annos nata circiter xxvij. gravi affectu detenta erat, ut vix deambulare, vix reſpirare Boneti Anatomia Tom. III.

haerere, omnibus tentatis D. à Lorieux Medium in auxilium vocat qui mo sibi adjuvit, quocumque ipsam visitavi anno 1613. mense Julio: Interrogata de ægritudinis initio, & dolorum natura, respondit à biennio factum se exclusisse non tantum die vitale: Puerperiorum vero tempore contigisse ut domo incendio confligante præcipitem se è lecto in vicum coniecerit, hinc præ metu & mentis consternatione aucta sit debilitas, ac nocte sequenti ventris solitum tumidior & renitentior redditus ac tumor in dies auctior factus sit, Ex relatione autem conjugis, insignis anhelitus fœtor adfuit, atrocesque & implacabiles imi ventris dolores lumborum & iliorum: Hinc prædictus medicus Lorieux, nec non ex concavis oculis, labiorum morticino colore ac vultus, coniecit superstitem esse in utero fœtum à præcedente partu: Nec enim raram esse superfœtationem, Aut saltem relictam esse molam, quorum exclusioni incubens, id præstitit, ut exclusa materia summe fœtida & livida, mulier multo melius se habere cœperit, munia solita obire, sanitatis integræ sesura neminem præterea in subsidium revocæ: Prædicto vero Medico à Lorieux extra regionem advocato, tandem dicta mulier, sub initium anni 1614 iterum concepit: Cujus conceptionis causa uterus clausus, ac solita humorum exclusione statim tempore destitutus, atque impatiens rei omnino heterogeneæ, in propriam perniciem cohibuit, viam istiusmodi materię molita est, natura excitato ulcere paulo infra umbilicem, latere sinistro, è quo sanies tanto fœtore abominabilis prodibat ut nullus esset ferendo, idque toto trimestri antequam auxilium malo quæreret: Ulceris autem apertionem prægressus est tensivus & pungitivus dolor diu molestus, à materia exitum affectante & partes successively per contagium afficiente & inficiente: Accersitus tandem, comite dicto D. à Lorieux, in urbem reduce, exploratum volui ulcus quod superficialium videbatur, stylo introitum tantum inter cutem & musculos inveniente à latere in latus, in quo insignis durities à me animadverta, quæ tamen ad suppurationem vergere videretur: Sed cum inde stabile indicium adstruere non liceret, in subsidium quoque maricis speculum advocare licuit, ut ejus operæ quid elicere possemus: Id enim animo firmiter impressum hærebat, malum præfens à priore, quod anno præterito curandum habueramus, non discrepare: speculi ergo beneficio, ostium uteri internum adeo distans erat, ut in conspectum non veniret, nullo fortasse se prodeunte malo præter ulcus nominatum: Graviditatem autem, quæ revera inerat, suspicari, nihil ulterius tentare visum est; ne sanæ æque ac ægræ male consuleremus: Ideoque præscripto regimine convenienti, usque quæ modum fervarent ulcers, illi vale diximus, partus tempus præstolantes, qui non procul absuit, marem enim paucis post diebus enixa est, sacro fonte ablutum, sed quinta post nativitatem hora denatum: Hæc quamquam irreprehensibilis, declinare tamen ealumniam non licuit: Ulceri tandem, quod in dies pejorem induebat conditionem (ac fœtore & dolore augefcenibus) aliud in vicinia accessit, duorum digitorum distantia sed in eadem altitudine, & minus exactis quæ diebus circiter xv. durum; quid eminebat, quod adstantes agnoscere non potuerunt. Ego autem à marito accersitus tum ut quid rei esset innotesceret, tum auxilii gratia, Explorata autem re, sola manus, citra aliud auxilium, ossa ischii fœtus eduxi, quæ prima se obtulerunt, reliqua autem extrahere annixus, & resistentiam nasctus, nihil ulterius tentare volui, sed eadem die re communicata D. D. ab Aurieu, nec non Domino De Benoist Sub-Prætori in Præfectura, N. aliisque: nullus non operavit illi operationi interesse, quæ post die xxij. Junij à me peracta est circa 3. ant. horam vespertinam, atque illis præsentibus fœtus ossa eduxi, inter quæ sacræ exitum affectare videbatur per foramen majoris ulceris, quod cum admittere non posset, quia reliqua ossa coherencia alteri foramini se offerebant, sola cute à priore distincta, eam incidi, hinc demum spinæ ossa omnia colligata duxi, humerorum & capitis: quæ posteriora ob insignem magnitudinem, omnium judicio naturalem multo excedentia, ab invicem abscesserunt, integumentis omnino exuta & cerebro destituta; paucilla tantum cute, in occipite & cervice, pilis vestita superstite, qui densi & duorum digitorum transversorum longitudinem æquabant: Cætera ossa, præter unum brachii, adhuc integri, quippe quæ cutis adhuc regebat, ac simul partem thoracis parte dextra (in qua cernere adhuc erat reliquas aliquas diaphragmatis & pulmonum) disjuncta erant & separata, ab ulceris fundo à me extracta, una cum lumbico vivo, pedalis ferme longitudinis. Veritus autem ne tum ratione doloris, tum debilitatis, sinistri quid contingeret, ab operatione destitit, apoplexiam prius quæ e recerat.

Rem autem ad examen revocantes, 1.º magnitudo & crassities ossium, inter quæ ossa femorum, quibus etiamnum deerant epiphyses, quatuor digitorum longitudinem æquabant. Ex brachium integrum adhuc asservatum, quod nunc sextam partem coæquavit. 2.º tempus à quo ulcus effundere cœpit sanem, luescenter causam demonstrant, atque maxime imperitis clare ostendunt fœtum hanc non fuisse gemellum postremi quinto mense editi, quod quidam, sed imperite & malevolè asserere non erubuerunt. Demum quæ causa tam atrocem dolorum, quæ tumoris illius, quæ durities, quæ fœtoris: certe alia non statuenda quam cadaver

illud in utero matris relictum. An verisimile est tantillo post partum tempore potuisse corrupti & crumpere, etiam absque auxilio, ut ne vestigium carnis superstes fuerit, viscerum, cerebri, nervorum, tendinum & cutis, quam solam nominavimus. Adversarij nobis forte objicerent, impossibilem esse novam conceptionem præ sente sceletro in utero, at ignorus illis *Albucasis*, Medicus Arabs insignis, qui simile quid adnotavit, de muliere, quæ quanquam utero gestaret foetum mortuum, concepit tamen mortui, per putredinem in tabum resoluti, particulis versus umbilicum tendentibus, & quo, facto abscessu, attrahentium medicamentorum ope aperto, ossa integra prodire: Hæc à Guidone discere potuissent: Prædicta autem mulier obiit anno 1653, mense Septembris. In præcedentium fidem subscripsi *Ioh. Minganlius Chirurgus Aquapertensis*.

## OBSERVATIO VI.

*Hermaphroditorum aliquot anatome.*

§. 1. Superioribus annis fœminam mihi videre contigit, quæ præter vulvam, membro quoque virili prædita erat, quod tamen non erat admodum crassum, quamobrem in ejus anatome generationis vasa admodum accurate pervestigavi: Vasa seminaria testèscue considerans, nunquid ulla inter hæc communio & consensus adesset, Tandem hoc competeri vasa quidem præparantia ab aliarum fœminarum præparantibus vasibus non differre, sed deferentia, nam bipartita erant, & ex binis quaterna natura genuerat; ex quibus duo, quæ etiam majora erant, ad matricis concavum destinabantur, reliqua duo ad penis radicem, qui glandularum parastatarum experts erat: Hoc tam admirabile visu & speculatu erat quam quod maxime, quo pacto natura prudens sagaxque locum satis tutum selegerat, per quod vasa hæc ad penem deferri possent, & quemadmodum meatum, qui in ipso est pene, perforarent: qui meatus in aliis tum semini tum lotio communis exiit, hic vero urinæ nihil quicquam opis afferebat, nam instar aliarum mulierum urina exibat: uterus autem, necnon uteri cervix à cæterarum fœminarum matrice colloque nihil distabat, sed in testibus discrimen erat, nam testes in hac crassiores erant quam in reliquis mulieribus, sed quoad situm ipsorum nullum discrimen prehendi. Peni scrotum contiguum non erat, imo vero scroto prorsus carebat, & duobus musculis præditus erat hujus fœminæ penis, non quatuor ut in maribus perfectis: Præterea penis hujus hermaphroditi tenui pelle integebatur, nullum aderat præputium, sed duo spongiosa corpora, per quæ duæ arteriæ ferebantur, ab illis ortæ quæ ad vesicam tendebant: *Columbiæ de re Anatom. lib. xv.*

§. 2. Anno 1615. In oppido Steinio, milliari ultra urbem Sancti Dionysii, Hermaphroditam puellulam multis præsentibus dissectui: penis parvus prominebat absque scroto & testiculis: sed ab orificio duplici externo, usque ad fundum uteri, duplex erat matrix, mediano pariete secreta: reliquæ partes genitales simplices erant ac si fuisset unicus uterus. *Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 35.*

§. 3. Ante biennium mihi puellula hermaphroditica inspicienda & post mortem examinanda oblata fuit: Infantem illum cum vivum inspiceremus, dijudicare non potuimus quinquam sexus in eo prævaleret, habebat enim penem pro ætatis ratione longiusculum, simul quoque externam pudendi muliebris imaginem. Post aperturam cadaveris, inventus est uterus cum testiculis, rubis aliisque vesperitionum, tum & sinu pudoris, in cujus superiore parte meatus urinarius quoque aderat, adeo occultus, ut in viva eundem animadvertere non potuerimus. Cæterum penis nullum habebat commercium cum vesica, eoque transversum dissecto, nulla spectabatur urethra, sed tantum duo corpora nervosa, quæ suis crurculis adhærebant ossibus pubis, ut elitoris mulierum. Potuisset hic sine dubio curari si longius habuisset vitæ spatium, è medio sublato pene tanquam supervacuo, postea ulcere debite tractato, ut habet *Agnetta lib. 6. cap. 69. I. Van Horne microtechn. parte 2. §. 25.* Qui plura de talibus desiderat adeat *Cass. Baubini tractatum absolutissimum. Mulieris bene mentulæ vide exemplum apud Bartholini cent. 2. histor. 57.*

## OBSERVATIO VII.

*Pudendi orificij angustia pro Virginitatis nota haberi non debet.*

Nuper cum ex Toupina mboutiorum regione fœmina, annos 25. nata, valde impudica, quæ viros ad coitum invitaret, in hanc urbem Parisiorum adducta fuisset, post ejus obitum pudendi orificium admodum angustum prehendi, & ossa pubis valde depressa: Cunnus glaber erat, pilis spoliatus, quos sibi radicibus evellunt ejusmodi regionis mulieres. *Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 31.*

## OBSERVATIO VIII.

*Hymen, Virginitatis nota membrana, in aliquibus reperta, ab aliis non.*

§. 1. **D**E membrana Hymene quid observaverim dicam. Licet vulgus hominum putet nullam esse virginem quæ Hymen non habeat, Ter duntaxat illum inveni, bis in duabus parvulis puellis, semel in natu majore, quam cum dissecarem intererat Excellent. N. Est hymen membrana quædam sub nymphis ante cervicem uteri, unico foramine prædita superiore parte, ut menses effluere possint, ingressum penis prohibens. *Columbus Anatom. lib. xv.*

§. 2. Dissecta virgo hydropica anno 1673. atque observavi decâratum illud Hymen (quod quidam membranam esse fingunt, aut si quidem membrana est, p. n. quid est) esse quatuor earunculas myrtiformes in virginibus adeo strictas, ut foramen in medio relinquant vix pisum recipiens. In coitu enim si fricentur magno conatu, sanguinem fundunt, unde nota virginitatis. *Ex observat. D. D. Glaseri Anatomies Professoris publici Basileensis.*

**D**E Hymene erat controversia, 1.º quid sit, 2.º an in omnibus reperiat? Circa primum, rejicitur Arabum opinio qui ex veoulis in colli medio hymen confluunt, falsum etiam est. *Fernelius & Ulmus* audiendi non sunt, qui lacera colli adhasere statuum. Illos vero audire debemus, qui aut membranam, aut earunculas, aut utramque simul statuum, ut *Pinnus, Spiegelius, Riolaunus, Vesalius, Fallopius, Aquapendens, Casferius, Veslingius*, & alii plurimi *Spigelius* de Hum. corp. fabrica c. 18. hanc in omnibus quas secut Virginibus se deprehendisse testatur, nec de hisse onam notavit. *Bartholinus* Anat. reformatæ l. cap. 31. Respondet hoc modo, Quod *Columbus & Parvus* oegant semper inveniri, *Laurentius* nunquam se invenisse asserit, imputandum est iocipit cadaverum, aut oegligeor in dis-

sectionibus, Aut si putarunt se virgines secuisse, de hoc tate forte fuerant si virgines illæ quoque digitis nonnuquam & petulencia eam rumpere possunt. At dicent se secuisse abortus puellas binas, trienas &c. Respondemus non credi facile posse in illis deesse, cum authoritates & experientie petitorum Anatomicorum citatorum advertebantur: Deinde si in istiusmodi aliquando deesse deprehensum est, de quo dubitamus, eodem jure quo illi dicunt p. n. adesse hoc membranam, eos dicemus p. n. abesse, &c. *Parvus* observat. ult. pentec. v. in omnibus dari asserit, figuram & descriptionem proponens.

De virginitatis ovis vide plurima apud *Riolaunum* Anthropog. lib. 2. cap. 35. *Severinum, Pinnam* Cap. v. c. 1. &c.

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI TERTII

## SECTIO XXXVIII.

De Abortu, Partu impedito, Foetu mortuo, Puerperiiis.

## OBSERVATIO I.

*Abortus frequens excitatus ob calculum in Rete dextro. 1. Ob vaginam uteri monstrosa conformationis. 2. Abortus gemellorum ob vitiosum alterius fetus constitutionem & matris. 3. Quinto mense factus ob fetum suffocatum à tumore, aspera illius arteria inherente. 4. Ob exiguitatem & tenuitatem vasorum umbilicalium. 5. Ob eorum brevitatem. 6. 7. 8. Ob eorum excidentem longitudinem fetum strangulantem. 9. Ob eadem disrupta. 10. Ob fetum agrum, Tumorem in jecore, &c. 11. Ob Placentam in utero derelictam. 12. Ob spasmodicos afflusus à sero acri à medulla spinali effluente, excitatus, Vtero partibusque vicinis & annexis plane insonte. 13. Ob fetum injuria matri illata notis gerentem. 14.*

§. 1. **N**O B. Matrona multis annis gravissimis Renum doloribus, sinistro præsertim in latere ab initio divexabatur, & quatuordecies uterum gestans, toties octavo vel nono semper mense abortivit, &c.

Eam mortuum cum secarem, renem sinistrum penitus consumptum deprehendi. Dextrum vero humidum in immensum excrevisse, in quo per modum dissecto calculus justæ magnitudinis excreverat, &c. *Vide Tit. de Lumborum dolore.*

§. 2. Mulier, *Bergensis* nunquam ad legitimam posituram, consuetumque egressum infantes edere potuit; Ex utero enim omni labore protrahit, omnes dudum fuere mortui & putredine correpti: Hujus vaginæ propendentis deformitatem obstetrix primum mihi adaperuit; cum

cum quærerem ex illa, cur mulier pariens aliarum mulierum manus ad corpus admittere non vellet? respondit hanc vaginam esse in causa, & quamvis digitus semper intrudi possit, & ad latera vulvæ interna apertæ colloeari, tamen si cuiquam innotesceret forte, miseram illam vulgi veretrix cavillationes; Cum autem vita discessisset, obstetrix rem invisam pluribus monstravit mulierculis. *I. Frid. Tremblerus ad Bartholinum, cent. 2. Epist. 91.*

§. 3. Anno 1605. matrona cacoehymica circa quintum mensem impregnationis parturientium doloribus correpta, post maximos ac diuturnos conatus gemellos eum multa aqua enixa est, foetum se ac masculum. In hoc dissecando sequentia annotavi, 1. abdomen non secus ac hydropicorum, aqua plenum erat. 2. Testes extra abdomen non propendebant sed in ventris capacitate residebant, & quidem eo loci in quo vasa spermatica ad scrotum descendunt, vasa spermatica tam brevia erant, ut extra ventrem propendere non potuerint. 3. Hepar supra modum magnum, inflatum, & aliquomodo lividum. 4. Mesenterium & renes inflammata. 5. Urachus sine cavitate ulla, neque stylo reperiri potuit, nec ipsa vesica apparebat inflata. 6. Vesica rugosa plane & vacua, præterquam quod humor viscidus ei ad latera, non secus ac in intestinis videre licet, adhærebat. 7. Cutis undique maculis, ut in febribus pestilentialibus conspersa. *Fabritius Hild. cent. 2. hist. 59.*

§. 4. Mulierem satis laudatæ sanioris quinto mense abortientem vidi: cumque foetus fere nullam in morte mutationem perensisset, ipsum secui, desiderio impulsus an aliqua noxia causa in ram robusto foetu innotesceret, eum ipsius mater valida huiusmodi abortus nullam assereret causam.

Secundo corpore, in cavitate thoracis sub jugulo dextro lucidam vesicam, aqua plenam; arteriæ asperæ adhaerentem inveni, quæ copiosa humoris inundatione, quam recipiebat à capite, in pueris valde humido, ventilationem cordis prohibuerat ipsum suffocando. *Dom. Panarolus Pentec. observ. 5.*

§. 5. Anno 1644. Nob. matrona quinto mense gravida, post fluxum triduanum uteri cruentum, abortum parituræque foetum rejicit masculum; quoad omnes partes perfectum quidem, quantitate tamen deplumatum rudius vix æquantem, exsiccumque & aridum. Vasa umbilicalia erant instar filorum communium usualium, collo circumvoluta & quasi alligata, non tamen brevia, uti duplici exemplo exponit *Hildanus*: nec disupra, uti alias *Basilius* notavit. In dissectione norabantur partes singulæ discretæ, hepar albicans & exsiccum, cor pallidum, vasa umbilicalia sicca: sub noctem secundina prodiit putrida & foetida. *I. Dan. Horsius observ. Anat. 5.*

§. 6. Fœmina quædam honesta temperamento sanguineo & corpore *Leopæ*, primum filium grandiusculum laboriose enixa est, postea vero septies abortiit, & quod mirum, etiam diversis temporibus, & nunc breviori nunc longiore à conceptu temporis spatio, nimirum nunc mense 1. nunc 2. nunc 3. Imo etiam 4. & 5. abortiit, tamen omnes abortivi ejusdem magnitudinis fuerunt, pollicis articulum fere æquantes, membrorum tamen delineationem exhibentes, & vasa umbilicalia instar fili subtilis albi. Post singulos vero abortus sanguis laudabilis & copiosus effluxit: dum vero gravida esset, vomitionibus enormibus semper infestata fuit. *Sennertus Pract. lib. 4. p. 2. §. 6. cap. 2.*

**P**robabile est causam primariam tot abortuum esse sanguinis materni quo ut altero generationis principio, per venam umbilicalem, post primam ex semine factam conformationem, assilente, perfectionem & augmentum cuius sumit, inopiam & defectum: causam autem cui sanguis ille in formatione suus

defuerit, reddere difficile est, Et ceterum sanguis in corpore non deficit, quod matris constitutio sanguinea, & copiosus sanguis laudabilis post partum effluens doceat; Ego in ipsis vasis umbilicalibus querendam censeo, cum ea plus iusto exilis & tenuis fuerit, secundina contra aliquod incrementum sumpsit. *Idem.*

§. 7. *Torentina Meyer*; ætatis tempore anno 1605. ad quinti mensis finem fere signis omnibus foetus vivi apparentibus, gravida fuit: circa finem vero quinti mensis foetus primo imbecilliter movebatur, ita ut vix præsentiri posuerit: deinde paulatim & intra paucos dies omnino cessabat moveri: mammae quoque, quæ ante lacte turgabant, tunc subsidebant, flaccescebant & exsiccabantur, alique signa aderant ex quibus foetus in utero mortuum esse facillime conjicere licuit: Tandem circa finem octavi mensis, parturientium doloribus correpta, enixa est masculum, quem per tres menses fere mortuum gestaverat. Longitudinem spiramæ cum dimidia non excedebat, Oculi ex suis orbitis seu capsulis propendebant: os item apertum, caput nigrum & flaccidum erat, interim tamen fortior nullus aderat: Hepar Uterinum inregum, sed flaccidum pallidumque conspiciebatur. Chorda, ut vocant, umbilicalis, quæ communiter & in omnibus ulnarum aliquor longitudine esse solet, vix spiramæ erat longitudinis. *Fabritius Hildanus cent. 2. observ. 50. & 51.*

**H**uius abortus causam nullam aliam invenire potuimus quam malam ac ineptam conformationem vasorum umbilicalium: Hinc perspicuum fit crescentem foetum in utero materno paulatim pla-



centum an acerbioribus five coryledonibus abstraxisse & sepe affe: abstracto autem Hepate uterino neces-  
sario moritur foetus. *Idem.*

§. 8. Ob vasa umbilicalia, longiora nimium, collum infantis ambientia strangulari novi  
*Idem ibidem*

Omnis propemodum foetus, quos edidit vxor  
charissima, prolifica, sic in lacem produsse vidi,  
ut vasa umbilicalia duplici convolutione collum  
constringerent, Obstetricum autem sagacitate, salvi  
evasere, quamvis vultu plumbeo, toto corpore lividi  
& fere exanimis prodirent, paulo post vino in os, de  
ore obstetricis iussu resocillari; Hæc vero è diffi-

cilis partus causis una est, cum enim tria; ut sit na-  
turalis, concurrere debeant, matris enixus, Pueri co-  
bur & conatus, obstetricisque manus, si foetus eni-  
tum affectans, ob colli constrictionem retrocedat,  
quanquam enitatur maret, & obstetrici officio funga-  
par, tertie conditionis defectu partum protrahi ne-  
cesse est.

§. 9. Coniux *Tab. Cornu* Paterni ascensis, dum in matrimonio vixit, ad minimum octies Abortum edidit. Causam fuisse brevitatem vasorum umbilicalium, seu chordæ umbilicalis, quæ ultra se sequi spiritum mam longior non erat, certo scio. *Idem.*

*De utero semi spiritum* In adulto foetu longi-  
tudo est ulnæ unius cum dimidia, five spiritum ma-  
rum trium, ob motum facilitatem embryonis, crassities  
est digni, quia ad sustinenda vasa robur requiritur &

iusta capacitas; ista si minor sit, Abortus duplici no-  
mine potest contingere, vel ob fragilitatem comitem,  
vel quia vasa angustiora sufficiens non convehunt  
alimentum

§. 10. Ob vasa Umbilicalia aliquando disrupta, ubi mater brachijs sursum elevatis nimium  
se extendit, Abortum fieri, notavi: *Gaspar Bauhinus Epist. ad Hildanum cent. 2. observ. 50. Vide  
Illius Theatrum Anatom. Tab. 31. Fig. 2.*

§. 11. Maii 1593. foetum abortivum sex mensum aperui, cujus motum mater paulo post  
sextam hebdomadam animadvertit; At quarto gestationis mense non amplius: Longus erat  
pollices septem, Inclusus secundina nondum rupta in quantitate ovi olorini nascitur, sed  
mortuus. Aperta secundina olidus erat, & à plantis pedum cuticula abscesserat. Situ supino,  
in dextri lateris abdomine, è regione umbilici, tumor inæqualis ad phaseoli molem, tactu  
asper, visuique manifestus per cutem spectabatur. Abdomine secto jecur magnum; sed ex-  
terior gibbâque ejus superficies tota colore flava: Inferior & sima haud male colorata: at in-  
fimus ejus lobus tumorem inæqualem, asperum, tophorum particulis, tanquam confractis  
craforum nucleis, absque pure tamen, plenum continens, visu tactuque durus reperi-  
tus est; Exsecto jecore nullus cruor effluebat; quin nec vena umbilicalis quicquam sanguinis conti-  
nebat, totusque foetus gracilis erat & macilentus, Cætera viscera nihil vitii habebant. *H.  
Smetius miscellaneorum lib. x. p. 571.*

§. 12. Mulieri venter in immensam molem excreverat ob uteri ingens incrementum, qui  
ad minimum libras 40. pendebat: Cujus cavitatem internam materia quædam instar pugni  
majoris crassa, putrida & nigricans adimplebat, quam statim à foetu, mola, aut placenta non  
edita, sed in utero putrefacta originem summissee judicabam: Quod ultimum confirmabatur, ex  
eo quod ante xxv. annos, 2. vel 3. ingravidationis mense, vesiculam quandam aqua repletam,  
per muliebria absque placenta excreverat; subsequente, maximo lochiorum fluxu per 6. vel  
7. menses; quo cessante venter sensim magis magisque intumuit: Hanc observationem maxi-  
me utilem esse cognovi, qui ab illo tempore quartam abortionem patientes, per placentarum  
expulsionem felici cum successu, duorum vel trium dierum spatio pristinae sanitati restitui.  
*Observ. Regn. de Graaf.*

*Lochiorum fluxus per 6. vel 7. menses, &c.* Irritata  
scilicet continuo expultrice uteri ad extranei exco-  
lutionem, quæ non desinit quousque illud foras elimi-  
naretur. Eadem est ratio fluoris sanguinis quibusdam  
gravidis supervenientis, qui non alia ope sisti potest

quam foetus eductione, quocunque tempore gravi-  
ditatis advenit: statim enim æ ille exclusus est, fluor  
desinit; quod nisi fiat foetus & mater una pereunt.  
*Vide Obstetricem Gallicam.*

§. 13. Domina Ill. per multos annos affectibus spasmodicis obnoxia, potissimum vero quo-  
tes utero conceperat pathematis convulsivis, quasi hystericeis supra modum tentari solebat  
sub finem tertii mensis *gravidæ*, quo tempore constanter *Abortire* solebar, menstrua erupe-  
runt, quibus per duos aut tres dies, una cum membranarum laceratarum frustulis descen-  
sibus *abortum* expectabar: Tandem uteri fœcinam deposuit, &c. Demum apoplectica in-  
teritit.

Quoniam Uteri principaliter affecti suspicio ferebatur, quantum hoc viscus meruerat pro-  
xime inquirebam: quod in debito situ, & quoad omnia sartum & rectum reperi. Circa ute-  
rum, aut appendicem ejus, nihil extabat cui tanquam causæ morbificæ imputari potuerit: At  
veto præcipuam & originalem morbi causam in capite quærivimus, haud frustra: Nam omnes  
cerebri cavitates & anfractus aqua implens, ejusque totam compagem quasi inundans cer-  
nebatur:

nebatur: juxta nervorum splachnicorum origines aqua se plurimum infundens plam matrem à medullæ oblongatæ caudice, per duos digitos latos separaverat, proculdubio horum nervorum ductu materies morbifica à capite in mesenterii plexus descendens & dolorum & spasmodorum, & hoc consequenti Abortu, Vide lib. I. sect. 13. observat. 7.

§. 14. Cum in oppido Reinheimb. Phil. Rheimichii uxor concivis, conjugem ultimo mense gravidam, non tantum jurgijs prosequeretur, sed & dextræ parti capitis, ipso tum ardente Syrio impingeret, editus paulo post infans, in ea ipsa, qua mater concussa fuerat parte, continui solutionem passus est. Re ad me delata, misertus paupercentis ocyus illuc concessi, atque deprehendi continui solutionem ad ipsum cerebrum penetrare, portionemque ipsius cranii fractam jam putredinem concepsisse. Licet autem externa & interna roborantia fuerint exhibita, putrida etiam portio cranii excreta, multaque fetida purulenta materia extracta, brevi tamen infans demortuus sequentia noranda dedit: Venæ fuerunt turgidæ, ventriculi cerebri aqua repleti, cerebri substantia flaccida. Inter cerebrum & meninges aderat collectio materię purulentæ & fetidæ. Joh. Daniel Horstius observ. Med. ij.

Quæstio an exuberans fuerit causa hujus mali? Respondi quæ sic, cum etiam à nimis partium Concomitatio vixit in foetu. Sic narrat Gemma Cosmogr. lib. I. c. 6. in fœtū eadem calvaria parte, cui in matre acies montabatur, magnum contumitatis divortium apparuit: Facile enim imaginationi for-

mationem mutare, etiam in ultimis gestationis mensibus, teste Sennero l. 4. p. 2. sect. 4. cap. 7. Quomodo vero hoc fiat, à citato loco ostendit. Parentheque nosset de causis similitud. & dissimil. in fœtu, &c. Idem ibidem.

## OBSERVATIO II.

Partus difficultas ob corpus uteri in scirrhum concretum & vitiosum fetus situm. 1. Ob scirrhum & perforationem uteri. 2. Ob Abscessum. 3. Ob Tumorem durum cum ulcere & uteri disruptione. 4. Ob orificium arterie clausum; compressum à recto intestino fecibus oppleto. 5. Ob uteri crassitiem extraordinariam. 6. Ob omecis crassitiem. 7.

§. I. Anno 1611. 24. Maii Uxor D. A. Morge; 30. annos nata, cum quinto utero gestaret & finem noni mensis attigisset, doloribus parturientium correpta fuit circa horam x. matutinam, cum pro more prava esset, dolores tam acerbos & motum foetus tam vehementem sustinuit, ut vix unquam similes visos altantes retulerint: quare vires protinus prostratz fuerunt: circa 3. pomeridianam leiporhymia & horrores maximi supervenerunt, quo tempore infantem in utero oblitte credo: dolores enim atque conatus ad parturiendum ab eo tempore cessarunt, nec foetus percipi potuit: Accersitus circa xi. noctis pulsus vix percipere potui, extremitates frigidæ erant & sudor frigidissimus in toro; brachium dextrum extra vulvam propendebat: adeo mortem proximam prædixi: Ne itaque inventionem meam, quæ hætenus in multis feliciter mihi successit, apud vulgus odiosam redderem, manum adhibere nolui: Adstantium tamen & ægræ precibus commotus, aliquid confectionis à kermes ex aqua cinnam. præparavi: postea, quia genitalia veluti arida erant: (quandoquidem ne guttula sanguinis profunderet) sacculum ex relaxantibus, emollientibus, anodynis applicui, unguento emolliente inuam ventris; coxas, os sacrum & genitalia inuixi, tandem eodem unguento juncta manu situm infantis exspicari cepi, qui etsi monstruosus esset, & brachium dextrum extra collum matricis propenderet, caput tamen, quod pectori incumbere (prius tamen inuncto & clementer introfo brachio) versus collum matricis manu reduxi: verum cum iterum & ipsius collum ob virum & expultricis summam imbecillitatem supra modum elanderetur, adeoque constriingeretur ut manus mea sufficere non posset ab opere desistere coactus fui, brachium mox iterum egressum est. Et circa decimam matutinam sequenti die obiit. Miratus quod scēmina illa, alioquin sana, tam subito extincta fuisset, suasi ut cadaver inuideretur: Aperto itaque ventre, sanguine seroso repletum repeti: ob ingentes enim dolores & violentum motum infantis, venæ nonnullæ in ipso parenchymate Hepatis & circa os sacrum cupit fudisse: unde profusiohem sanguinis & mortem sequutam esse nullum est dubium: Sicut autem foetus talis erat, caput collo matricis proximè adhaerebat, brachium dextrum, quod lividum, extra collum matricis propendebat: Crura versus pectus & caput ita reflectebantur, ut pedes in vertice conjungerentur; manus sinistra hypochoondrio dextro irærat impofira ut brachium crura versus poplitem amplecteretur. Exemplo foetu scirrhum durissimum qui magnitudinem capitis infantis fere adæquabat, inveni. Ille autem utero non simpliciter adhaerebat, sed ipsum corpus uteri in scirrhum concretum atque induratum fuerat. Scirrhum hunc causam fuisse mortis nemo negare poterit, cum uterus ratione hujus scitri hi ita angustus factus fuerit, ut cum muliere adesser partus, sese extendere non posset, & quia foetus maturus & vegetus impotem talem fecerat ut venæ rumperebantur, nec non hæmorrhagia & mors sequeretur. G. Fabricius Hildanus cent. 3. observ. 57. & Epist. ad M. Doringiam.

De doloribus

**D**oloribus Parturientium ] *Revelatus* doloris paritendique difficultatis causam refert in violentam secundinam à matrice avulsionem. Sed cum separatio hæc, si justo tempore fiat, sæpe citra molestem accidit, scilicetque sæpe exeat secundinis adhuc arcte adherentibus, diuque post exclusum, dolore nihilominus graviter urgente, verisimiliter referendus

in violentam dilationem ductus qui ab utero ad pudendum usque progreditur, cervix nominati, qui quamquam amplitudine donatus sit insigni, quia tamen foratum, nisi admodum quoque distenderetur, transmittere nequireret, sit ut & ex hac diffensione, una cum ea quæ in aliis orificiis accidit, dolor paritendique labor augeatur.

§. 2. Honeſta quædam matrona juveneula bis foetum mortuum, opportuno tamen tempore enixa, tertium gravida, tempore partus, instante, doloribusque urgentibus foetum frustra excludere allaborat: Ego prima Julii 1670. vespere ad eam vocatus inveni faris adhuc vegetam: quærens de statu ipsius, ab ostetricibus responsum tale retuli, os uteri apertum esse, reliquaque bene constituta, situm autem infantis malum, manu tantum dextra extra vergente, capite vero & reliquis membris impervestigabilibus: cum ita per totam noctem una cum tribus obstetricibus adessem, nonnullaque corroborantia & foetus expulsionem promoventia præficerem, ægraque sine fastidio libenter assumeret, omnia tamen in eodem statu permanserunt, manu infans usque ad scapulam fere exserta, & jam emortua immobili permanente, puerpera que summe debili, donec natura tandem in totum deficiente, die xxii. Julii paulo ante primam pomeridianam obiit.

Cadavere ipsius statim post mortem aperto, inferius uterum invenimus laceratum & quasi ex ulcere perforatum, scitu masculino perfecto cum secundinis extra uterum inter intestina laritante, manu tantum dextra partim in vagina uteri, partim extra uterum prominente: præterea quoque uterus in fundo dissectus, ad palmæ crassitiem scirrhosa duritie tumidus apparuit. *Observat. Simonis Scholzi in miscell. curiosis anni 1671. Observat. 86.*

§. 3. Anno 1670. mense Augusto uxor militis laborabat 5. aut 6. diebus doloribus partus: infans primis diebus vivus perſentiebatur, tandem nulla signa vitæ edens & matrem jam doloribus fractam à vivis subsequi fecit.

Aperro utero, tantus foetor emanavit, ut etſi in atrio domus res facta fuerit, præ absurdissimo tamen foetore nemo sat longo tempore accedere potuerit: tandem exempto jam mortuo infante, collum uteri abscessu turgidum reperi, sanienque inde emanantem terribi foetore nares percipientem: Hoc autem observatu dignum circa foetum reperi: Infantem bene formatum, & ut judicare licuit, alias sanum fuisse, Et dum instabar hora exitus, ipse summet conatum fuisse viam quærere per quam exiret: eum que eadem ob tumores eidem non paruiſſet, tamen tantos imperus fortitudinis proprie exequiſſe, ut magnam partem cranii in parte dextra ad intra sibi compreſſerit: Ex quo clare elucescit non solum vim expultricem uteri facere ad protrudendum foetum, sed & ipsum infantem allaborare ad sui à carcere liberationem. *loh. lacobus Vencesl. Dobrzensky à Negroponte, in miscell. curiosis anni 1670. Observat. 18.*

§. 4. Anno 1670. Aug. 23. Pragæ Catharina Wolrahin, temperamenti frigidi & hum. ætatis 35. ana. quatuor jam anrea proles robustas feliciter peperit, tandem de dolore uteri subinde querebatur, colore pallida, macies in dies incrementum sumpſit, tussis sicca moleſtabat, eum quinquaginta diebus nonnumquam mensens, naturale pariendi tempus pervenit: quatuor diebus laborioso partu misere torquebatur, foetus dextram manum exporrectam habuit, nec ultra ab obstetricibus adjuvari, nec à conatu matris protrudi potuit, quinta tandem die foetum jam extincto & illa exspiravit.

Aperro leniter abdomine, puer robustus extra uterum, omnis involucri solutus, pedibus in sinistrum hypochondrium extensis Lionem contingens, capite cum manu exporrecta, intra ossa pubis & cervicem uteri hærebat: Chirurgus adstanti ut foetum suaviter eximat diceo, quo exempto manus livida una eum parte capitis, quæ exitum tenebat, ob vehementem facultatis expellentis conatum, in acutum redacta, deprehensa; Uterus in parte sinistra, una eum secundinis à conatu pueri pedibus disruptus: In parte vero dextra, tumor quidam durus in convexum usque ad cervicem uteri instar globi se extendebat: in concavo hujus, ulcus nigrum gangrænosum illum tumorem cauſans, qui foetui vitam præeluxit, repertum est: Sectus per medium tumor, crassitiem quatuor transverſorum digitorum superabat: hæc causa detenti foetus. *Simon Aloysius Tudecis in Miscell. curiosis anni 1671. Observat. 254.*

§. 5. Gravida 5. mense paralyſi totius corporis inferioris à coxis ad extremos pedes tentatur: Ob longam in decubitu moram gangræna nares derepente occupat, qua generosioribus remediis ablata, quum nulla vitæ spes superesset, calore nativo à frædis evaporationibus infecto, prorsus deficiente, ad extrahendum foetum quinque mensem, cujus nuper morum ægra mater ſenſerat, operas suas manusque certatim conſecravit Medici pariter & obstetrices: Hæc igitur manu immiſſa nullum foetum in utero adesse clamant, nisi molam fortassis: At peritior Medicus tumorem statim deprehendit ex intestino recto fræbibus induratis repleto: ad uterum vero progrediens, nulla vi manum intrudere potest.

Mortuæ cadaver apertum, visumque os uteri arctissime clausum, foetusque optimi coloris &

habitus in utero mortuus, nec vicinarum partium fœditate ulla putridus, membranarumque uteri densitate inter tot molestias tutus. *Barbolinus cent. 4. hister. 27.*

§. 6. Lapidieidæ uxor maxima cum difficultate fœtum edidit, qui paulo post extinguitur: Eo excluso tumidus nihilominus remanet venter, unde molæ suspicio; nihil ramen manum intru- dens obstetrix præter angustiam deprehendit, Die sequenti à partu interit.

Recluso ventre insignis uteri crassities, per totum ambitum scirrhus, tres digitos spissitudi- ne æquantis deprehenditur. Mirum fuit quomodo & concipere, & fœtum gestare, multo- que magis quomodo eniti valuerit, ac fœtus intra eas angustias, præ duritie renitentes, com- ponere se ad exitum potuerit. *Observatio M. Benjamin Noël Chirurgi Genevensis.*

§. 7. Mulier aliquando parit difficulter ob Omenti & vicinarum partium nimiam spissitu- dinem & obestitatem: Nam *Hippocrates* scripsit Omenti magnitudinem impedire concep- tum os uteri comprimendo, sic & facile partum molestat: In quibusdam enim Omentum descen- dit inter vesicam & uterum, ibique spissus fit. *Rondeletius præf. cap. 64.*

## OBSERVATIO III.

*Partus impeditus ob ossa Pectinis malam conformationem, quam uteri disruptio sequuta* 1. In Partu difficultate uterus laceratus, impediens scirrhus uteri fœtus exclusionem. 2. 10. Fœtus extra uterum disruptum reperiens. 3. 4. Impeditus ob adnatum uteri orificio sarcoma. 5. Ob uteri orificium caput fœtus constringens; Hydropem abdominis in matre. 6. Ob apophysin non naturalem in materna osium pubis facie aut ischii. 7. 8. Uterus disruptus prope cervicem, in cuius foramen fœtus brachium intra- serat. 9. Partus impeditus ob angustiam oris matricis, huiusque lacerationem. 11. Ob vitiosam osium coccygis & pelvis conformationem. 12.

§. 1. **A** Nno 1594. Haganoæ Alsatiz mulier 40. annor. cum jam septies fœtus alioquin in- regre efformatos, sed mortuos peperisset, ultimo partu, 8. scil. ipsa quoque una cum fœtu, non tamen edito succubuit, postridie nimirum quam fœtus in alvo materna extinctus animadvertitur: Instantibus autem partus doloribus, iisque vehemenissimis (valide quippe puer movebatur) atque sæpius toto triduo recurrentibus, quibus prægnas misere sed frustra exercebatur: dolorum tandem sævitia, potissimum tamen ultima nocte illis exasperatis, vi- riumque resolutione prostrata, interiit: Multa quidem à mulieribus adstantibus tentata fuere, aut sine ullo parturientis iuvamine.

Demortuæ cadaver aperiendo, vix leviter impressa novacula, musculos epigastrii cum peritonæo dividere volumus, quo uteri situm prius cum fœtu contemplaremur: At vix inquam immissa acie, & abdomine parum dissecto, dorsum pueri vulneratur: Nos nil tale suspicantes primo uterum tactum fuisse credidimus: ideoque eaurius sectionem ab- dominis instituendam putamus, qua peracta integer statim fœtus, omnibus numeris absolutus (licet jam inflatus & cicula abscedente ob incipientem putredinem) occurrit, atque immediate peritonæum superne contingens; Inferne intestino recto incumbens, liber in ventris capacitate inferioris, nullo neque velamine aut membrana, neque utero cinctus; situ alioquin ad partum faciliorem accommodato, capite deorsum facie ad postero- riora reclinata, corporis trunco in longitudinem extenso, omnibus reliquis partibus, tam earumque ab utero, quam quæ ad uterum, ut & quæ in utero, (una ruptione excepta) nihil præternaturale ostendentibus: nullibi apparente neque contusione, neque vulnera- tione, ulcere, aut apostemate conspiciendus offertur: Ubi etsi nos ob rei novitatem admi- raremur, non tam fœtus situm & figuram rectam, licet extra uterum in abdominis capaci- tate factam, quam fœtum ipsum integrum & iustæ magnitudinis ac conformationis citra uterum atque extra matricem visus objectum, tamen lætero, rupto, seu potius abrupto utero conspecto, mirari aliqua ex parte desimus: Causas vero hujus ruptionis indagandi haud sine majore admiratione ansam datam animadvertimus: Porro alligatus adhuc fœtus erat vasis umbilicalibus suis secundinis, quæ sursum ad sinistram, lienem versus, ad intestina & lumbos retractæ, & tanquam per convulsionem & abbreviationem vinculo- rum firmiter connexæ istis partibus cernebantur, ut easdem inde abstrahere difficile fue- rit: De uteri vero substantia, quæ quidem tenuior solito apparebat, quantum ejusdem conspici potuit, illud secundinis, ac potissimum placenæ, seu chorio aut uterino jecori, tanquam concretum, rursusque in minorem magnitudinem (ut alias post naturalem partum contingere solet, contractum fuerat, atque adeo secundinas nequaquam amplitudine excedere videbatur, uterum ut properea eundem, quia considerat, ratione potius quam sensibus agnoscere necesse habuerimus): Cæterum juxta cervicem uteri, ad os pectinis, intrinsecus sub vesica, membranæ portio, usitati cultri crassitie non excedens, latitu- dinem

dinem dimidiz palmæ propendebat, quæ uteri abrupti particula fuit: reliquum autem, una cum proprio uteri orificio, ipsisque secundinis omne ad intestina, ut dictum est, sursum raptum, alieno loco detinebatur: unde penitus à corvæ, seu sinu muliebri omnibusque vicinis partibus, quibus adnasci solet, avulsam, atque ex parte dilaceratam fuisse uterum patuit. Ex his illud maxime suspiciendum & querendum videtur, cuius vi uterus abruptus fuerit? Nos tot feruim in partu interemptorum causam deprehendimus *Offis pectinis malam conformationem*, nimis scilicet. Depressi, quod in gibbum superne, inferne autem in arcum excavatum esse oportuisset. *Leonardus Doldius Noribergerensis Medicus.*

**N**on aliam causam, præter dictam ossis depressionem, statuendam esse existimo, cum neque in fetum imbellem & debilem, organis ad tantam vehementiam nondum præditum, (qui solum pondere & motu locali, cum levi calcitratione eximium queri) Nequm parentem recte liceat mulierem eam non conferat plus ad partum quam ut musculos abdominis comprimendo actionem uteri juvet: Opus namque ipsam, quod à scriptis parcurientes præstant, non uteri est, sed musculos abdominis, ut *Gal. 3. facult. nat.* affectis, nulla enim vi alia ad partum excitare mulieres uterum possunt; multo minus in uterum, quia etsi partus proprio est uteri parentis & expellentiæ, tamen in contractione, atque fibrarum contractione non dilatatione operatur, ut hie minus rupturæ metus sit: An vero vi alicui exterræ, maxime jam ob hæmorrhagias & dolores extenuato utero (qui quo vicinior partui est, eo tenuior evadere solet, teste *Gal. lib. de Diffutis*) idem obstetricis manus acceptum ferendum sit, alius affirmandum relinquo: Non minus tamen situs pueri, alioquin optioius, admirationem augere viderur, an scilicet manu obstetricis perfractio jam utero, an vero integro adhuc utero intus ligatus puer fuerit: live ante ruptionem statueretur situs factus sive post, difficultas ruptionis ostenditur: Neque etiam tutum, fuerit affirmare factum, quia inflatus & stris tumidus reperiebatur, post mortem utroque incipientem putredine ob inflationem & magnitudinem auctam, utero dudum attenuato abruptisse, velut à musto ebulliente dolii fundum, eum id fissuram potius intulisset quam abruptionem: Depressio autem dicta à suis pectinis frequentissima est, juxta *Arantii* observationem, & quidem incurabilis partus difficultatis causa esse solet, ob quam infantes justam magnitudinem adepti, sine principum partium conquisitione hanc lucem alpicere nequeunt: Hæc quidem locorum angustia, non concurrentibus causis ruptionis atque aliquid etiam, ad ruptionem contrahitur, ego ut neque infirmare, nec tamen ex his unam aliquam hujus effectus principalem causam producere queo: qui potius hoc (una cum *Gal. de usu part. 7.* dom de naturali partu scribit, mirari nos posse, intelligere autem non posse) inter naturæ

rara miranda repono: Hinc tamen confirmatur aliquid quando necessitas partus cesarei, nisi timiditas mulierculæ, um hoc opus abhorrebat. *Idem ibidem.*

*Uteri substantia tenuior solus apparebat* Causæ uteri variæ, Nam in virginibus tenax est uti stantia, in adultis crassior, & quo sæpius mulier uterum gessit, eo crassior est: mensibus fluentibus crassior uterum, & quamdiu inflat mensium excretio, tumida & crassa apparet: In gravidæ *Galenus*, *Veisalius*, aliique Anatomici putant uterum quo magis extenditur eo magis attenuari, crassitudinem in longitudinem absumi; sed oculatis experientia refragatur, & autoritates *Sylvii*, *Arantii* & aliorum: nam à primo conceptu usque ad partum augetur secundum omnes dimensiones, & uti amplior, sic crassior paulatim redditur & mollior, ita postremis mensibus duos digitos crassa sit uteri substantia: adeo tum uterus à membranæ substantia abit, & rubra sit, fungosa, spongiosa, moreque pumilis foraminibus pervia, in multos quasi cotices divisibilia, quod sit affluxum sanguinis & spirituum pro fetu copiosum: De utraque opinione ita censet *Falcobergius*: Tenuiorum revera fieri uteri substantiam, ut in dissectis gravidis observavit, sed eam videri crassiorem, quod Hepar uterinum illi atque sine connascatum, & hoc potuisse pluribus imponere: *Nic. vero Fontanus* dicit in utero gravidæ se separatæ hepatis uterinum à membranæ, & membranæ admodum crassam invanisse: Recte id quidem, imbibit enim membrana, veluti spongia, affluentem uteri humiditatem, & crassiorem substantiæ conditionem induit: Si tenuior aliquando p. n. reddatur, sive humoris defectu, sive nimia distensione, rumpitur de facili, à fortioribus pellentibus: idem in puertæ observavit *Salmon*: Crassissima vero est uteri substantia circa orificium internum; quod angustum, unde admittenda illa in partu dilatatio & postea contractio. *Bartholinus Anat. reformatæ l. 2. c. 28.* A partu autem uterum ipsum & crassum per octiduum manere, atque inde ad pristinam rursus redire formam, in quinque mulieribus, quas mox post partum supplicio affectas, vel in partu mortuas dissectas, observavit. *F. Platerus.*

§. 2. Marrona quædam Lustriz, ad Marginem Lacus Lemanni, totos sex dies parturiens fuerat: Ego tandem advocatus, ipsam in agone mortis reperio, eaque ipsa nocte obiit.

Corpore aperro utrum laceratum, & caput infantuli in ventris capacitatem dimissum inveni: Hujus autem difficultatis causa fuerat scirrhus, qui magnitudinem capitis infantuli propomodum adæquabat, matrici tamen non usque adeo adhærebat: Hic obstiter quominus ulterius tempore prægnationis sese satis extendere, & parturientis violentum motum fetus sustinere potuisset. *Fabritius Hildanus cent. 1. Observat. 67.*

§. 3. Anno 1697. D. Bines Chirurgus Parisiensis. dissecevit eadaver *Jana du Bois*: Aperto abdomine fetus intestinis incumbens repertus, lacerata enim & rupta matrice eam omnino egressus erat, simul effusa magna sanguinis copia in ventris capacitatem: *Jac. Guillemeau cap. 13. lib. 2. de facile partu.*

§. 4. Testes adduco D. *Pineau*, *Guerin*, *Lanay* Chirurgo Juratos Parisienses, me dissecevisse eadaver pauperculæ mulieris in Nosodochio mortuæ: in cujus ventre repertus infans aquis innatans, utero circa fundum disrupto. *Idem.*

**N**e ferus calcitrans eximieque affectus, enormi fæta uteri distensione (ad quam sæpe convulsiones sequuntur) illum disruptat & laceret, ex-

pedi illico partum promovere: quod nuperissime præstitit dictus *Bines*, imperante D. D. *Bourguet* in Typographi uxore, quæ partus labores ab octava

materna ad nonam vespertinam experta erat, cui cum  
cæcis & debilibus esset pullus, omni motu & sensu pri-  
vatus, metu imminenti convulsionum, immixta in

utero manu, occurrente scetus capite; membranas  
aquis continentes laceravit, siquæ effusus felicem pro-  
movit partum. *Idem.*

§. 5. Expleto gestationis tempore femina Hafniensis, fœtum eniti nullo conatu potuit :  
Extinctus embryo miseræ quoque matri acceleravit interitum.

In aperto cadavere inventus quidem embryo, sed adnata uteri orificio carnea excresecen-  
tia viam occlusit, omnemque egressuro exitum interceptit : hinc suffocatus embryo, dene-  
gato ad vitam meatu frustra laborantem matrem aura maligna infecit. *Th. Bartholinus cent. I.  
hist. 94.*

§. 6. Fuit apud nos Nutrix 24. annor. ætatis, quæ à quodam vitata gemellos concepit ;  
formellam, cujus situs in dextro latere, & masculum cujus sub hypochondrio sinistro : illa  
minor, viva edita est, quanquam in tergum prodiret ; hic major intra matrem est suffocatus :  
cùm enim masculus aquis emissis sequi vellet, ab orificio matricis contracto strangulatus hæ-  
sit : mater paulo post expiravit.

Cùm iussu Magistratus aperiretur, Omentum deerat ; ruptum credo in latera ad intestina  
concessisse ; Viva mater sæpe conquesta est ventrem sibi divulsurum : Statim in conspectum  
prodiit uterus, alicubi ruber, alicubi nigro sanguine infectus, alicubi lividus occupabat to-  
ram capacitatem usque ad foveam pectoris scire ; modico enim intervallo aberat sternum,  
seu malum punicum : Ventriculus compulerat versus diaphragma, ita ut à lateribus uteri  
in summo appareret : Hepar intra dextrum hypochondrium latebat : Utero aperto secun-  
dæ in conspectum veniebant : Hic quærebatur geminæ ne essent, an una tantum ? Vocaba-  
tur una in medio divisa in duo domicilia, interventu amnii : Secundis dissectis infans appa-  
rebat albis sordibus obductus : Caputmersum erat in collum matricis, & ab uteri orificio sic  
tenebatur, ut vi esset revellendum : Dorsum spectabat ventrem, alvus ad spinam matris ver-  
sa erat, nates & pedes complicatis genibus in ventriculum matris tendebant : brachia ad-  
jacebant lateribus & genibus occurrebant : Omnino situs erat naturalis & ad exitum dispo-  
situs, si vires pariendi non defecissent prodisset ita ut occiput anteriora, frons posteriora  
matris respiceret, qui est alter ex naturalibus situs : Vifa deinde sunt membra cætera pro-  
pter hydropem matris : Pulmo lividus, atro sanguine refertus, Cor flaccidum, Hepar & Re-  
nes boni, Lien in sinistro latere adhærebat ventriculo orbicularis circumferentia & nonnihil  
tumidus, palmæ manus instar habens, sanguis intus ex puniceo niger : Judicatum est vicio  
Pulmonis hydropem esse ortum, cùm Hepar rectè se haberet, & ex thoracis capacitate aqua  
ichorosa efflueret : laboraverat autem Asthmate ; In ventriculo nihil cibi erat, sed biliosa  
quædam superfuitas, quæ orificium acrimonia vellicaverat, unde querelæ de rosione cor-  
dis : Intestina inflata nihil fere excrementorum continebant, ob jejunia & ciborum fastidia :  
Mammæ in rugas contractæ papillis nigrescentibus conspiciebantur : Foris à ventris tumo-  
re versus latera & dorsum suffusus, sanguis lividus, niger, puniceus, pedes œdematosi : Pe-  
riisse judicatum est defectu viriam in duplici partu : Vires autem prostratæ fuerant, hydropem,  
asthmate, curis, doloribus dorsi validis : Spina enim intus elevata quasi in arcum erat, hand  
scio an convulsa, an pondere uteri & intestinorum tracta. *A. Libavini in cista med. Hornungi  
Epist. 76.*

§. 7. Ex parte matris nihil præter naturam esse debet, ut est *συντοχή διαστολή*, vel *αγκυρωσις*  
in interna ossium pubis aut ischiæ facie, quæ obsunt foribus, ita ut nonnisi mortui emitti pos-  
sint : Quod à nobis, pluribusque aliis Medicis ac Chirurgis Lutetiæ visum in cadavere ho-  
nestissimæ mulieris, in difficili eam ob causam puerperio functæ, quæ dictam apophysin præ-  
longam præter naturam habebat, ossi pubis sinistro innatam, iatus prope synchondrosæ  
infernum finem : Os pubis tali præditum apophysi alias dedi D. Parco Regis Chirurgo. *Seve-  
rinus Pineus lib. 2. de Not. viginitatis cap. 5.*

§. 8. Nullus aliquando sit Partus ob minus minimè explicata pubis ossa. Tum ob aliquas  
excresecias ossæ in prædictis viis existentes exitumque sætui præcludentes. *Sylvius de le  
Boë Practice lib. 3. cap. viij. §. viij.*

§. 9. Inter parientium moritur femina quædam Lipsiæ : Maritus certior de matre & scæ-  
tu esse cupiens, rogat sectioni ut præesse velim : Secto itaque abdomine, infans extra ute-  
rum supra intestina reperitur : Rem mirati, Uterum inquirimus & ruptum illum ad llium  
dextrum prope cœvicem, ad dimidiæ spithamæ longitudinem offendimus : Fœtus quoque  
brachium dextrum, quod pridie ejus dici exuerat & retraxerat, corruptum erat & fœtens :  
*Phil. Salmuth centur. 1. Observ. 16.*

**H**oc loco monenda mulierculæ ne vel inter-  
pestivis vel sortitionibus, vel nimis urantur pel-

lentibus : Maritus quidam horum nimium usum cum  
lactymis accubabat. *Idem.*

§. 10. Uxor ejusdem militis gravida, pallida & melancholica, cum circa festum Paschae anno 1624. ultra triduum parere non posset, vocatus; omnibusque quae cum ipsa acta fuissent intellectis, ventremque ipsius ubi tetigissem, observavi tumorem durum magnum (quem obstetrix, nec non mulierculae adstantes caput infantis esse putabant) in sinistro latere à regione umbilici tactui renitentem, quo observato, statim de felici partu corpori dubitare: Erat enim hic tumor scirrhosus, melancholicus, ex humore terteno melancholico absque inflammatione praecedente genitus: Tempore gestationis nullum calorem, è contra signitiam haud exiguam ad omnes vitae actiones sensit: Et quia varia tam interna quam externa medicamenta mulierculae adhibuerunt, uterique os cervicis arcte clausum, speculum maricis uteri collo admovendum, ad partum promovendum (quod tamen ob scirrhositatem absque omni fructu fuit intromissum) curavi: hinc quia foetus aliter excludi non potuit, sectione caesarea patientem liberandam duxi, quam tamen sustinere non potuit: hinc symptomatibus crescentibus, altero die circa vespere à vita discessit.

Hujus corpus per me apertum fuit, uterumque in dextra, (sana nimirum parte) disruptum & infantem extra uterum positum: scirrhumque insignis magnitudinis, à fundo uteri incipientem & ad os uteri desinentem inveni: Ob quam causam parere non potuit, Disruptum autem auro puto dolores partus acutos & vehementes peperisse. *Ex observationibus Tobia Knoblochii Archiatri Onolshacenensis.*

§. 11. Anno 1593. Coloniz dissecui aurificis uxorem ex partu mortuum: comperta est matricem erumpente infante lacerata, ejusque caput in laevam ventris capacitatem dimissum, eademque matricem, pars nervosa, circa infantis collum contracta, quae ipsum foetum suffocarat: Mater totos XI. dies parturiens fuerat, obstetricibus, meque tandem ipso pridie ante obitum, frustra adhibitis, quum multo ante mortuus fuisset infans, in utero solo extante laevo brachio quod propendebat: Ab obstetrice praeterea, aliisque matronis, quae in parturientis agone adfuerant, didici angustissimi oris matricem foeminae istius fuisse, unde magnus exans foetus, per viam angustam erumpere nequirit, robustus quantumvis fuerit: *Fabritius Hild. cent. I. Observ. 64.*

**A**ngustissimi oris matricem fuisse? Angustiam illam partim naturalem fuisse, partim quoque ab aetate (agebat enim tum trigesium septimum aut circiter annum, neque unquam antea uterum gestaverat) fuisse arbitror: Exhibita praeterea ipsi fuit à matrona quadam potio validissima ad foetum expellendum, ex qua parturientis dolores & conatus adeo exacerbati sunt, adeoque foetus communis est, ut pereire cum impetu exitum, sed viam nimis strictam inveniens, uterum dilaceraret: Ex quibus perspicuum sit, hoc genus remedii non nisi consilio magno adhi-

bendum: Ante omnia autem inspicendum an membrum genitale satis aptum sit? an etiam foetus talis sit ut naturae medicamento beneficio expelli possit: alioqui si arcta nimis invenitur via, antequam exhibeatur potio, est relaxanda, emollienda, & lubrica facienda: Si vero foetus sitis est vel transversim, vel oblique, vel alio quovis modo praeternaturali, tunc reducendus est manu inuncta oleo lillor. alb. vel amygdal. dulc. antequam exhibeantur potiones illae violentae.

§. 12. In viis causa difficilis partus est, aliquando dum ossa coecygis à prima conformatione non solum firmiorem compagem & articulationem habent, sed &, ac quidem praecipue, si iusto latiora sunt, & extra ita compressa, ut intus gibba potius quam cava sint, & ab osse sacro & coecygis non satis distent, & ita foetui exitum quaerenti viam pracludant, eamque non nisi angustam concedant, ut ita vel occipite vel scapula infans in istis angustis necessario hæreat, quae maxima Partus difficilis causa est, ob quam & foetus & mater interdum periclitantur, imo pereunt: Quod etiam fit ob ossa coxendicis male formata & sita in claudicantibus. *Sennertus lib. de morb. mulierum p. 2. sect. 6. c. 4.*

## OBSERVATIO IV.

*Partus impeditus ob foetum mortuum, putrefactum. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ob foetum extra uterum conceptum. 8.*

**M**ulier Senonensis, (Columba Chatry) quae Ludovico Carita homuncioni, quadrato tamen & bene habito, nupsit ab annis 48. fracta aetate & valetudine hic occubuit aegens annum 68. Haec ante annos 28. quae nunquam antea uterum gestarat, licet jampridem nupsisset (nihil de sanitate prius admodum conquesta) certissima habuit inchoati hominis indicia: nam qui statim periodicis erumpere solebant menses, illi statim substituerunt: Pica primis mensibus laboravit, tempestivum embryonis motum & frequentem persensit, tumore humborum & abdominis paulatim subrescente mammisque turgentibus: Tandem autem decurso pene vix gestationis circulo labores puerperii graves & alvi tormina experiri incipio

# De Abortu, Partu Impedito, Foetu mortuo, III

cepit, urina ad aliquot dies suppressa ( Medicis tunc varia & dubia de illa *nosopie* sentienti-  
bus ) quæ postea currente veluti alveo & magna vi erupit, profuso illo ichore non tam ex ve-  
sicæ meatu, nr credibile est, scaturiente, quam ex loculis: Amnio tunica disrupsa, quæ su-  
dorem foetus & urinam continet, cum una cum istis serosis recrementis ( quas muliercule æ-  
quas vocant ) aliquis coacti sanguinis thrombus emerferit: Inde autem & mammae concidi-  
dere visæ sunt, motus infantis aut ignavus aut nullus, labores mulieris tolerabiliores: qui-  
bus omnibus attonitæ fuerunt obstetrices, quæ antea certissimum puerperium expectassent:  
A Indubio autem istius foetura totum triennium lectulo illa decubuit, ad extremam vitæ cal-  
cem de valetudine conquesta, de tumore, de duritie, de torminibus alvi ( quam obvis quib-  
usque tractandam exhibebat ) de inutili & gravi illo pondere, quod pro vario gestantis mo-  
tu modo in hanc modo in illam partem procumbebat: denique de languente & depravata  
appetentia, quam subinde aetariis & absorpto omphacio sollicitabat, alioqui perpetuo *æteros*  
i. e. sine cibo.

Postquam autem fato esset functa, ejus vir officiosus in uxoris manes accersivit Chirurges,  
ambos valentes arte & artis usu, quibus ( licet de scirrhuso tantum tumore cogitarent ) dis-  
secto mulieris abdomine, & rejecto infra peritonæo tunica, quæ intestina viscera, uterum &  
vesicam contingit, uterus sese offert aspectu quidem rugosus & vesiculosus, ut crista illa pen-  
dula quæ *Gallii* Indicis ex summo capite prolabitur, vel potius ut operimentum illud eura-  
neum quod illorum collum ambit: tactu autem, durus testaceus & crassus instar *in dege-  
neratis*, i. e. eorum quæ testa teguntur: Tum novaculam in portentosam illam molem &  
gypseam injiciunt, qua ad aciem cultelli renitente, scalprum altius *figitur*: Eorum autem  
alter insidit casu in cranium vulnere, & in aliquot costas tandem humerum dextrum impe-  
tit, à quo erumpens ossis caput certissimam fecit fidem ossi illi latitanti: Ex quo scal-  
pellum alio transferunt, & magna vi, sensim tamen & recta, uterum secant, diductisque du-  
rissimis vulneris labris, infantem in orbem implicitum, & ex transverso in utero possum in-  
rospectant in penitissimo sinu & altissimis latebris stabulantem, in suamque velut cystin,  
quam allantoidem tunicam, quæ in utero totum foetum ambit, fuisse puto, callosissimam re-  
conditum: Quo spectaculo inexpectato obstupescit Medicos convocant, quos in re in-  
dita consulant, adhibeantque in testimonium & judicium rei hujus quæ pene fidem omnem  
superet: latera multis ad novum prodigium accurantibus, & opus Chirurgorum intertur-  
bantibus, venit istis in mentem totam istam molem ex illo veluti antro & manibus & uncis  
Chirurgicis, qua valeret vi, abstrahere, ut arborem ex suo caudice, domumque comporta-  
re, ut privatim & apud se accuratius corpusculi anaromen sectarentur, & cum peritis de no-  
vo portento & inaudito consilia conferrant: In præcipiti autem & violenta illa laniena, non  
licito opus festinantibus introspicere quod substratum esset infantulo chorion, quæ uteri a-  
cetabula, quæ umbilici vasa, quis esset allantoidis cum utero & cum foetu nexus, cum ute-  
rus ipse, præcipue ad coxam dextram, ad nares, & ad partem spinæ dorsii cum cute infan-  
tuli omnino coaluisset: situs infantis erat pene sphaericus, facie ad thoracem affixa, sublatis  
ad nares genibus, unde postea ex patulæ, rectæ & resimæ sunt conspectæ: Ossa capitis te-  
nuia quidem, sed firma & instar coræu nitentia, cute capitis multis in locis pilosa: Caput  
in sinistram brachium ita procumbebat, ut à protuberante humero auris & os occipitis im-  
pellerentur, quod inævatum ex parte introcessisse conspiceretur: Cubitus ad summum hu-  
morum reflectebatur, porrecta sola *manu*, quæ in pugnum adeo firmiter erat & contracta, &  
summi digiti ita palmæ inhærebant, ut licet apparent feriatim inter se distincti, re ipsa ta-  
men in unum idemque vere lapideum corpus concrevisset: Dextrum autem brachium ad  
umbilicum manum extendebat, quæ ad carpum inadvertenter excisa fuit & in alvo matris  
relicta, Femur, genu, tibia sinistra dextris incumbabant, quibus tamen ita erant implicita, ut  
talus sinister, pedisque planta in dextrum pedion ( est pars pedis superior ) implantarentur,  
quibus excavatum cederet & pene indissolubili nexu colligaretur: Utrunque crus in ventrem  
& pectus reflectebatur, certissimamque sexus foeminei notulam regebat: Tibia utraque ad  
nares intorquebatur, pedibus ad pedum digitis ita inter se compactis & lapidificatis, ut factò  
ex oculis & tactu judicio, totum istud opus Phidiaz alienius esse ixisset, qui vel ex ebore, vel  
ex marmore maturæ ætatis embryi absolutissimam iconem expressisset, maxime cum in ea  
duritie corpusculi moles cum concidisset, imò cum cute nitida integram suam & symme-  
triam & polysarciam retinisset: Partes autem internæ, viscera nempe omnia, cor & cere-  
brum, habebant naturaliter, eo dempto quod ultra modum induruerant (reins tamen quam  
externæ) Ita ut hodie externum istud corpusculum neque putredinem mineur neque terro-  
dinem: *Iohan. Albofius*.

**D**E hujusce historici fide testantur *Thuanus* lib.  
17. histor. *Parvus* l. 25. de monstris, cap. 18. *Læce*  
*Rauesii Anarom.* Tom. III.

lib. 2. de monstris, cap. 45. *L. Bergesia* obstetric  
in observat. p. 102. *Samoye Prevancheris* cum dicto



*Albosi*, Medicis Senonensibus, in sectione praesentibus qui in causas inquisiverint, quantum Diarrhas vide apud *Schenck* p.m. 587. Si indurationis hujus causas queramus, varias inveniemus sed incertas: Difficile enim dictum quid in utero materno in putredine consueta paullulam hanc violaverit & laxam rigiditatem induxerit; Siqui siccitatem nimiam incusent, ortam à doloribus gestationis assiduis & ichoris effluxi defectu: Alii frigiditate obtrivisse suspicantur, quemadmodum testa in ovis induratur: Calorem plures advocant, quo velut febre hectica colliquata fuerit illa & cunctabatur: Nonnulli has causas con-

jungunt, cum massa crassa, densa, terrenamque partem ubertate affluente: Propius accedunt illi qui iuxta indurationis semina propugnant, infecta, quae vim quandam abditam ab externis causis excutit: Denique à spiritu lapidifico omnia haec alii deducunt, eandem fortis hujus petrificati esse rationem magna veri specie persuadent quae aliorum calculorum, scirrhorum & trophorum in variis corporis partibus genitorum: Vide *De Scirrhismo* Tractatu delectum extra uterum genito, in sectione ultima, *Senonensis* lib. 4. Prae. p. 1. l. 4. c. 7. & alius.

§. 2. Dom. H. *Bisaccionum* Patritius Aetinas, uxorem duxit Ferrariae anno 1571. hanc ille post mensem compressit, tum decimo incipientibus doloribus partus advenientibus, & aqua plurimam fluente, deluse fuerunt obstetrices ac matronae: dolores illico cessarunt ventre adhuc tumido manente, atque ipsa magnam gravitatem sentiente: Nullum remedium tentatum fuit à Medicis Ferrariensibus ut fortum educerent sive vivum sive mortuum, Tandem cum incassum laborassent, & pondus utero incumberet, movereturque ad corporis motum, anno jam praeterito, pararunt unanimi consensu mulierem pari molam, pro qua educenda remedia nihil profecerunt, sic misera annis duobus cum gestavit uterum: Ejus vir duxit ex vovo conjugem ad sacram ædem D. Virginis Lauretanæ, ac in patriam reversus vocat ad consultationem Medicos, quo tempore levi febre & continua tenebatur cum eisdem circa uterum symptomatibus: Hæsitabamus omnes, alius aliam rem dicebat imaginabaturque, ac post discursus multos in eam sententiam venimus Tumorem adesse in utero p. n. vel scirrhosum, vel oedematofum, aut molam. Dum ita ambigimus, ac ab omni genere medicamentorum abstinemus, solo victu accommodato contenti, mulieri fluor alvi supervenit fetidissimus, erant excrementa flava, ac ut plurimum alba & livida & copiosa; singula quaque hora decies fere egerat, En, mitum dictu, nondum visum, nondum imaginatum, cum ipsis excrementis dux effluunt costae parvae: quæ indicabant nobis ob parvitatem esse costas pueri in utero existentis, rursus die sequenti duas alias emisit & expiravit:

Exenterato cadavere, inventus est uterus putrefactus, qua parte rectum intestinum tangit, hocque ipsum totum corruptum: Inventus est foetus sine involucri, sine secundinis, cujus caput non aderat: hoc putamus ex putredine dissolutum: erant integra reliqua costis quatuor exceptis, atque visceribus quæ putredine tabuerant, Quis hunc non admirabitur casum? *Harviius Augustinus* lib. 2. de Hom. partu cap. 23.

§. 3. Catharina de Fiefs cum secundas contraxisset nuptias, eodem tempore in morbum incidit, & gravida est facta: Cum vero se utero gestare non suspicaretur, Luteriæ infinitis remediis, & quidem dicta sudorifica (auxilium adversus morbum querens) usa est, etsi non decissent ex obstetricibus quæ gravidam ipsam pronuntiarent, eo quod symptomata ea quæ utero gerentibus accidere solent, in ipsa observarent, idque à tempore suppressorum menstruum, donec etiam lac in mammis observabatur, & usque ad nonum mensem quo tempore omnia illa symptomata desiere, una cum motu ipsius foetus: dein dolores partus irriti tum supervenire, & itarum post omnia signa foetus emortui observare levebat, aramen horum omnium signorum ratio non habebatur: Quare cum uterum domum redisset, adhuc foetum mortuum utero gestavit, idque mensium quindecim spatio à die ipsius interitus supputatione facta, præter antea hos novem menses quibus in utero materno vixerat: sic partes molliores putrefactæ per inferiora ejiciebantur, quæ non absque ratione aliqua per D. *Pontum* medicum pro sanie ex uteri ulcere manante habebatur, quemadmodum ossa quæ remanserant scirrhum lienis esse censebat.

Tandem extincta §. Nonis Octobr. anni 1570. aperta fuit, Quare copiosa adhuc sanies in abdomen reperta absque utero, & foetus ossa aliqua jam putrida, aliqua vero integra erant: & inter hæc unum ex ossibus claviculae jam lividum, peritonæum & abdominis musculos jam perforarat, ita ut sola cutis integra remaneret, qui in latere sinistro forinsecus conspiciebatur, quod jam pridem pro splenis scirrho habebatur. *Franc. Rousses de Partu Casareo* sect. 4. cap. 2.

§. 4. Vidimus puerum putrefactum & frustulatim rejectum, relictis magnis ossibus in utero per longum tempus, quæ post in utero matris mortuæ sunt reperta, Uxor fuit Chirurgi Monspelienfis, qui post mortem, ut causam alicujus affectus interni cognosceret, passus est illam dissicari. *Rondeletius* lib. 1. Praet. c. 65.

§. 5. Fit etiam ut conatus parienti eo tempore sese manifestent, mulierque paritura videatur, & ad partum ab obstetrice disponatur, aquaque jam, sicuti ante partum fieri solet, effluerit, sed his omnibus rursus cessantibus, atque evanescentibus, nullus partus sequatur, & nisi

# De Abortu, Partu, Impedito, Foetu mortuo. 113

& nisi denno hæc redeant, uti aliquando fit, fetus extinctus nunc in utero, nunc extrahunt hæreat, qui tandem cum involueris putrescens, febris animique defectus, & si nihilominus retineatur, uterum partesque vicinas simul inficiendo, matri exitum parit, sicut in quibusdam acidissimo (Inter quas una quinque, supra decimum menses, fetus mortuum antequam ipsa exspiraret, profluente fæda interita cluvie, & vena umbilicali propendente, utero inclusum gestavit) aliquoties vidimus, tanta corruptione intrinsecus facta, ut & uterus simul cum fætu, & abdominis musculis illius loci ex putredine nigricantibus, summe fætentia, post mortem sectione facta, deprebensa fuerint: priusque vivente matre, interdum timor pelucidus vesicæ instat, circa umbilicum elevatus, subjectæ putredinis character, per quem fetus vertebræ cernebantur, eoque rupto eximebantur, sese obtulerit. *Placius Pract. lib. 1. c. 9. pag. 440.*

§. 6. Matrona Londinensis gravida, ad nonum usque mensem fœtum utero gestavit, quo tempore dolores quasi parturientis accidunt, qui ingentes & diuturni fuerunt; primipara enim erat, quod assistentes muliereulas non tenuit, etsi proxima partus alia signa non accederent, ut dilatatio oris exterioris matricis: Dolores ii duos integros dies, totidemque noctes afflixere: ideo convocati Medici, qui tardantis partus causam existimarent, quod Lucinæ nondum esset expecta labores: Multa ideo præscripta que is facili redderetur, deseruntque tormina eo non succedente. Ab eo tempore fœtum moveri nunquam observavit, ac consultatione inter Medicos & Chirurgo instituta, statutum fœtum exitum affectasse, jamque de fatigatum à motu cessare matremque, quæ nunquam alias pepererat, errasse circa tempus conceptionis: Tertio vel quarto ab hinc die restituta, ac moræ in urbe pettæsa, villam equo volutario pro more patrio, vecta concessit, nulla hinc sequuta noxa; sed mense exacto pristini dolores repetunt, tota die & nocte molesti, postea, ut prius cessantes: Medici & Chirurgi convocati ejusmodi dolores colicos censent, prioresque dolores septimo mense contigisse asserunt, quo tempore, teste *Hippocrate*, exitum affectat fœtus, qui defatigatus, jam quiescat; Addebant verisimile non esse eum mortuum, quod mater vividi esset coloris, vegeta & appetitu polleret; absentibus etiam omnibus signis, ex quibus *Hippocrates*, *Galenus* aliique Medici mortuum esse fœtum colligunt: In statu ergo præcedenti mensem integrum perstitit, undecimum explentem: quo exeunte, leves invadunt dolores, illico succedente cardialgia; ideo lecto se tradidit, exhibitumque vinum, morte subito invadente, antequam auxilium implorare licuisset: In demortuæ latere dextro macula nigra in ventre comparuit, Daleri magnitudine: Cadavere aperto, fœtus putridus inventus, cujus caro in pus conversa ab ossibus abscedebat; Leiptothymia non ante prehendente matrem quam gangræna panniculum carnosum attigerit: *Lodovica Borgesia observat. lib. 2. p. m. 20.*

**M**Ea sententia dolores hi fuisse colici: Fœtus ille maturus erat, qui statim tempore non exclusus in putredinem abiit; neglecta enim medela ejus doloris, causa fuit quod ille in lucem non exierit: Quare si gravidam dolores crebro non invadant, si nihil se

obstetrici offerat; Guteri os constringatur, nedum hiet, si ve pariendi tempus instet si ve non, Colici illi judicandi sunt, qui per clysteres carminantes sedandi sunt. Id si in hac ægra fuisset actum, ea & fœtus superstitis forte fuisset. *Eadem ibidem.*

§. 7. In quatuor puerperis difficillimis adhibitus fui anno 1605. primo Laufannæ 6. Septembris, Sed parturientem in morbi agone inveni, atque in illa ipsa hora, in qua ad ipsam accessi, è vita discessit: Post mortem aperto ventre, fœtus semiputridus, Uterus vero dilaceratus conspectus est. *Fabritius Hildanus Epist. 12.*

**U**terus dilaceratus] Rumpitur de facili uterus si p. n. tenuior reddatur, si ve humoris defectu si ve dilatazione nimia, vel ob putrem fœtum, &c. A fortioribus pellentibus id contigisse observavit

*salernus*. Vide observat. Id autem contingit procul ab officio interno, ubi uteri substantia crassissima, unde admiranda illa in partu explicatio & contractio.

§. 8. Mihi ex Gallia reduci narrarunt D. D. Coler & Raifin anno 1665. se mense Aprili anni 1662. D. de la Fereff, Chirurgum Autelianensem, cum D. D. Baldino Medico Parisiensi, in Nosodochio feminam dissecuisse, quæ diuturnos partus dolores irritosque conatus expecta tandem oblit:

In cuspis ventris inventus sit puellus egregius & optime formatus, extra uterum locatus, nempe in spatio quod uterum & rectum inrestinum interjacet; utero infonte & illæso, nequaquam rupto aut pervio versus intestinum; matri autem puellus exiguo supervixit intervallo. *Monconis Tomo 2. Itiner. Italici p. 450.*

## OBSERVATIO V.

*In mulieris decima à partu hora mortua cadavere vterus, Hepar & Pulmones in visio deprehensa.*

**M**ulier honesta, mollis & rara, annorum 30. febre, destillatione veteri in pulmones laborabat, fetum gestans octimestrem: imperatæ aliquot purgationes, phlebotomia iterata: ratio vitæ ex expressis catinum succis: contra exulceratum guttur pugnatum, In difficultate partus deoſtum veteris galli cum modico cassiæ lignæ, croci & tantillo vini odoriferi, unctio pubis &c. Peperit die 7. levata febris, & omnia imperata quæ instaurant &c. prohibetur somnus in horam unam aut duas propter multas vacuationes &c. Mortua est decima hora à partu.

Apertæ uterus grumis plenus inventus est, totus venter flatibus tumens, Ren dexter purulentus, Hepar quantitate peccans, lobo uno nothis costis hærens, colore totum vitiatum, aridum ac veluti frixum, aliis partibus quasi putredine mucosum, Similiter & Pulmones, in quorum summo ad arteriam vomica puro plena erupit. *Hollerius lib. observat. propr. num. 8.*

## OBSERVATIO VI.

*Partus ad 16. mensem prorogatus, ob vitiosam capitis fetus conformationem, & illi accretum tumorem.*

**D**e stupro conquiritur juvencula; Illa in dies tumidior ad partum retinuum visa est accessisse, nec tamen fetum ullum enitebatur. Hinc molam suspicatus Medicus expellentiæ præscripsit, & tumido ventri cataplasma ex semine lini &c. applicuit, quibus aliquandiu usa, 16. mense feliciter peperit: fetum, sed debilem, nec ultra unum alterumve diem sustentit: Caput infans nuchæ juglandem vix superabat, tumor vero capiti superna parte adnatus erat, univso capite major, qui quotiens manu contrectabatur, totiens infans convulsionibus contorcebatur:

Mortuo infante caput apertum, inventaque in ipso cranio exigua cerebri portio, quam pro cerebello habuit Chirurgus, In tumore vero substantia cerebro valde similis: Hinc diuturnam istam in utero materno moram, ex vitiosa cerebri constitutione derivavit, qua impeditus fœtus & fractus, subsidiariam operam matri parturienti ferre non potuit. *Th. Bartholinus cent. 3. histor. 51.*

## OBSERVATIO VII.

*Partus impeditus ob Fœtum in Vtero incuneatum. 1. Ob Fœtus transversum situm, 2. Ob vitiosum situm, Vteri disruptionem, vasorum umbilicalium convolutionem. 3. Ob Fœtus magnitudinem, situmque transversum. 4.*

**§. 1.** **I**nspectio aliquot honestarum fœminarum, quibus difficilis restitans fœtus vitæ filium abruperat, fenestram aperuit meditandi de captivitate hac exterminanda: Inquiris etiam sepe cum stupore situm fœtus in alvo matris incuneati mortui, meorum præceptorum nullus aggredi arduum opus volebat; commendabatur Deo & naturæ: confisus ego judicii maturitati & manuum dexteritati, neglectum opus aggressus sum. Glorietur *Roussetus* suo pro arbitrato in sectione Cæsareæ, & securam periculi proclamet, Ego semel aggressus infausito eventui ira territus fui, moriebatur enim post quadriduum puerpera, epileptici convulsionibus tentata, vulnere inflicto multa salutaria promittente: ut nunquam hanc operationem in viva suaderem, veritus ne quam fors perimere decrevit, Medici manu sublatam rumor increbescerebat: At extractionem per uncas & forcipes affabre adornatos felici cum successu molitus, nunquam nisi voti compos cum astantium admiratione discessi. *Rosfinckius Dissert. Anat. lib. 1. cap. 13.*

**§. 2.** Sarcocis cujusdam uxor, postquam triduum parturiendo consumpsisset, nullisque medicamentis fœtus jamjam mortuus extrahi potuisset, supervenientibus leiporhythmis morituræ.

Petitu mariti & obstetricis apertum fuit corpus, exemptusque infans jacens, supino quasi corpore per transversum vteri, capite sinistram, pedibus dextrum attingens os Ilion, brachio vero sinistro extra vterum pendulo: Scrutando reliqua viscera, ex vesica felles præter moximum magna, bilis lenta & ex viridi nigricante repleta, extraxi calculum olivæ majoris (quas

# De Abortu, Partu, Impedito, Fœtu mortuo. 115

regias vel Hispanicas appellant) magnitudine, nec colore & figura ibi abfimilem, cæterum æqualem, & drachmam unam civilis ponderis pendente, quem adhuc ob formæ raritatem integrum servo. *Carolus Raygerus in miscellan. curiosis anni 1673. observ. 283.*

§. 3. Matrona Berneſis adhuc juvenis, cum tertio iterum gereret, & iustum gestationis tempus absolviſſet, doloribus parturientium tam acerbis ac vehementibus correpta fuit ut vix unquam ſimiles obſervati fuerint: aqua quin etiam quæ fœtum comitari ſolet, uti quoque ſanguis copioſe profluxere, brachiumque dextrum fœtus primo quoque inſultu erupit: Poſt horam tamen dolores omnes & conatus parturientium ceſſarunt nec deinceps redierunt, Quarto poſt die videns obſtetric rem in anguſto poſitam, ſuaſit ut uxor mea advocaretur: Illa cum ad parturientem perveniſſet, brachium dextrum ex utero propendens reperit, febris quoque, leiſothymiz & vomitus aderant: Exhibita confectione alkermeſ, inuncto ventre oleo liſ. alb. & amygd. d. brachio ex oriſicio matricis remoto, dolores hypochondriorum, qui antea ob tenſionem peritonæi acerbis fuerant, ceſſarunt, verum dolores & conatus parturientium (etſi dolores reliquorum partium continuo vexarent) nunquam leniri poterunt nec medicamentis neque manu Cbirurgi: Variis præſtitis cæteri dolores remiſerunt, ita ut cibum libenter aſſumeret, ſomnum caperet, & ita quidem ut nihil præter excluſionem fœtus deſiſceretur: Cum vero morum aliquem naturæ, qui nobis viam modumque procedendi oſtenderet, ex conſilio aſſtantium, ut in ſeptimum uſque expectaremus, ecce cardialgia, cum rigore quodam & leiſothymia accedente, protinus placideque exſpiravit.

Corpore aperto, cauſa deprehenſa eſt ſitus fœtus præternaturalis; in tranſverſum enim ſitus erat, & ita quidem ut caput ſiniſtro, pedes vero dextro hypochondrio ita inſiſterent, ut in utroque latere prominentia non obſcura obſervari poſſet: ſpina dorſi autem fœtus verſus oriſiciū uteri vergebat: brachium dextrum extra oriſiciū propendebat, ſiniſtrum vero, uti quoque crus dextrum (quod verſus caput reflexum) mediantibus vaſis umbilicalibus (qui truncum corporis bis circumdederunt) tronco corporis ita alligabantur, ut ab initio fœtus ad exitum minus commodè ſeſe parare poſſet, ſed omnia inverſo ordine acciderent: Præterea, ab initio cum fœtus, qui & maturus & robuſtus erat, maximo impetu ſe moveret, & ad exitum præpararet, ſiniſtro pede corpus ipſum uteri verſus dextrum latus dilaceraverat: *Fabritius Hildan. cent. 4. obſervat. 57.*

ETſi diſſicilis partus cauſæ multiplices ſint, omnes tamen ad tria reduci poſſunt, Aut enim alenis anguſtum eſt os uteri, ut in illis quæ nunquam pepererunt, aut ulcere aliquo in partibus illis laborarunt, aut quibus conſtitutio corporis ſicciſſima eſt: At hæc antea uterum bis geſtaverat, & feliciter pepererat, nec conſtitutione corporis admodum erat ſicca; Altera cauſa eſt ſitus fœtus præternaturalis, quod in hac matrona accidit: Tercia eſt expulſionis facultatis laheſcæſtio aut proſtitutio, quæ ſit aut ob vitium cordis abolitionem, aut ex ſolo vitio uteri: at in hac matrona vires vitales ad ſinem ſæpe vitæ integre permaſerunt: Cauſa itaque ex utero ipſo petenda eſt, à fœtu calcitrante diſrupto, unde ejus facultas expulſitæ & protinus & omnino abolita fuit, hinc parturientis dolores & conatus ceſſarunt: Ruptionem autem illam utri in illis quoque obſervavi: Cuſus diſ-

ruptioſis ſubita illa abolitio facultatis expulſitæ & parturientium conatus ceſſantes (ſi vires vitales integre permaſerint) certiffima ſemper mihi fuere indicia, idque quoties accidit, de vita parturientis actum eſt niſi ſectio Cæſarea adminiſtraretur: Diſrupto enim inſtrumento, ſc. utero, ceſſat quoque actio, h. e. facultas expulſitæ & parturientium conatus qui cum neque medicamentis neque manu excitari poſſint, putreſcit tandem fœtus, ſimul & ſecundina, hinc mors: Occurrit & alia cauſa propter quam dolores & conatus parturientium protinus ceſſant, Medicis ut plurimum incognita, nimirum cum ex motu ſuo vehementiſſimo fœtus, vas aliquod internum diſſumpitur, quod vidit in matrona quadam de qua §. inſta: In his autem facultates omnes ob deperditionem ſanguinis protinus proſteſcuntur: *Idem ibidem.*

§. 4. Sartoris uxor annorum circiter 30. quæ quater prius pepererat, quinto gravida facta, exactis decem menſibus, cum jam pariendi tempus inſtaret, atque in ipſo labore fœtus quandam convolutionem, levesque aliquot pariendi conatus ſentiret, tandem ſis omnibus ceſſantibus, fœtum mortuum, uti poſtea apparuit antequam exſpiraret, adhuc quinque menſes retinuit: Quo tempore cum an gravida eſſet, ex eo quod ſupra geſtationis tempus tamdiu ſuperſtes maneret mulier, nec graviora pateteretur accidentia, in quæſtionem venit, & de mola aliave aliquo tumore inrer obſtetrices conſultaretur: tandem conſilio meo habito (licet eam vivam non viderim) de fœtu mortuo pronuntiavi, & ad fœtum mortuum propellendum medicamenta præſcripi, pilulas & peſſarium, quod cum unam ſaltem noctem retinuiſſet, mox chorda umbilicalis propendere cepit, quæ tandem, cum putris eſſet, amiſſa fuit: verum cum nullus ſequeretur abortus, nullusque eſſet omnino fœtum excluſiſſet, deorſumque impulſit, unde fluor uterinus, per quem putris, alba ſectidiſſimaque materia ex utero profluſebat, exortus eſt: Quo octo ſeptimanarum ſpatio perſeſerant, accedente interim febre, corpus adeo contabuit, ut nihil in ea carnoſi fere amplius præter venærem,

transversum admodum tumentem & durum apparet: donec viginti septimanarum spatio, supra decimum mensem, quo uterum gestavit, tempore exacto expiraret.

Rogatus ut corpus aperirem, primo ventris introitu vesicas geminas, lividas, in latere umbilici, ubi tumor durus inæqualis adhuc transversim eminebat; deprehendi, Quibus levi negotio, cum tenuissimæ essent, disruptis, statim vertebra ipsius fœtus, una cum scapulis & costis obvia erant; transversim enim collocatus & supinus dorso inflexo, & in orbem convolutus jacebat & versus exteriora prominebat: qui exemptus diductusque adeo putris erat, ut præter cutem & ossa, quæ tamen levi negotio dissolvebantur, & quod femella erat, nihil alias liceret, vel fœtor immensus fineret cognoscere: hoc saltem manifestum erat transversum illum situm, atque eximiam magnitudinem, quam longitudo illius & capitis ampliando, prolixis admodum capillis constans declarabant, impedimento fuisse quo minus in partu prodire potuerit, sicque retentum 20. septimanarum spatio, computruisse, & simul vicinas partes infecisse, cum universus uterus, una cum involucris & omni portione aliqua, musculusque epigastrici illius loci desiderarentur, totaque illa regio fure, fœtore & nigredine infecta esset, & ad extremam usque cutem, ubi vesicæ apparuerant livescerent, corrupta: Quo in loco si forte sectio, ante extremam illam viscerum corruptionem facta fuisset, fœtum exiit, matre superstitie manente credibile est. *Platerus obs. lib. 2. p. 228. & Pra& lib. 1. cap. 9.*

**S**i forte sectio facta fuisset] De partu Cesareo, ant. *Si Riolanus* mavult, *Cesario*, tractatum amplissimum edidit *Franc. Roussem*. Tres autem sciendum est casus esse quibus extantibus cogitari potest de hac Chirurgia 1. Cum fœtus mortuus est & mater vivit: 2. Cum mater mortua est & fœtus vivit: 3. Cum ambo, & mater & fœtus vivunt: In primo casu non est necesse ægre parturientem manifestos periculo exponere, quia si per Chirurgiam non extrahatur, natura vias invenit alias, per anum, umbilicum, inguen &c. ut testantur historici, Secundus casus frequenter accidit, ita ut (quod deplorandum) damnetur tenebris embryo antequam lucem videat, atque spes animantis cum gravida pereat, ut loquitur Imperator lib. 71. Digestor tit. 8. Cujus culpa? an Magistratus, utpote sine cuius consensu non licet ejusmodi operationes aggredi? quem antequam impetierimus, jam petiit occupatio: an Chirurgorum? qui metuunt ne eos idem maneat factum cum Vesalio: hic enim cum disseccaret choracem cujusdam quam obilisse existimabat (alii referunt pro partu Cesareo exercendo) hysterice veritatem aperuisse, reperit eam adhuc palpitantem: Etenim oportet ut sectio fiat in ipso fere puncto quo mater expirat, aut quamdiu infans adhuc movetur & subsultat: Nec juvat eos gravidæ apertum tenere impossita clavi: hic enim est error vulgi, credentis fœtum respiratione matris vivere: Tertius casus est cum fœtus vivus & viva matre sectione extrahitur: hic vetus est partus Cesareus; sed quam periculose plena sit alex hac operatio quilibet per se videt: Et quamvis sciendum sit ejusmodi sectionis administrandæ sæpe necessitatem incidere, tamen circumstantiæ tot tantæque sunt observandæ, ut interim in incipiti casu nullus audeat manum operi admoveere metuens eatumeliam: Quod enim notari dignum est nullus post *Roussem* inventus est oculatus testis, omnes aurit tantum, uno excepto *Dorinjo*, qui in epist. ad *Heldanum*, testatur se presente utero in inguen dilapsum, dissectum fuisse, extractumque infantem satis veg-

tum, matrem tertio à sectione die ad plures abesse: quod sibi etiam evenisse scribit *Clar. Resnickus* pag. 182. Dissert. Anatom. qui proinde omni contamine dissolvit hanc operationem in viva muliere: Ego vero impendens suaderem sectionem Cesaream, si sciri posset per signa infantem disinctis claustris egressum fuisse in ipsam abdominis capacitatem: Imo suspicor non solum posse intra Tubam uteri fœtum concipi, quod exemplis confirmat *Riolan.* Anthrop. cap. 35. sed potissimum ex eadem rupta (cum alias in uterum regressus non detur) fœtum emipisse, & sectione in inguine institura (quod vidit *Doringius*) emissum fuisse. *Leb. van Horn misroetchn.* §. 30. Posse tamen fœtum mortuum, matre superstitie eximi, luculento exemplo ostendit. *Platerus observat. lib. 1. p. 22.*

**Transversim collocatus &c.**] Ad vitiosum infantis suum huc referendus ille cuius meminist *P. Barbette* Chirurgie Patte 1. cap. 23. Cum illius caput, matre jam parturiente, supra ossa pubis anteriora preloberetur, quod nullus scriptorum observavit: Hac res, ait, animadversione non est indigna. Nam quanto fortiores sunt parturiendi conatus, & quanto magis allabotie, tanto minus partum est productura, nisi infantis caput sursum verius, atque ad matris dorsum, & tandem ad inferiora, vel ad latus ossis pubis obstrictis manu dirigatur: Noxia sunt fœtum pellenda priusquam id obtinuerit.

**Musculusque epigastrici]** Quorum opera ad fœtus exclusionem necessaria est: hinc gravidæ plerumque sunt pigrosi alvi, quia hos musculos, ob uteri distensionem, vix ad compressionem commovent: Medicus quidam, referente *Hoffro* in *Hercule Medico*, ad pellendas secundinas restitutas admovebat emplastrum ex ovi albumine & rubrica, ad constringendos musculos ventris, qui à parturiendi conatu & extensione uteri relaxati, & in opore suo debilitati sunt; his enim sic contractis, & in se redeuntibus, uterum ad eas pellendas aptior redditur.

## OBSERVATIO VIII.

*Ossa pubis & coxendicis in partu distrahantur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.*

§. 1. **Q**uanquam miracula distractio ossium in partu carere non videatur, tamen quia in Anatomie ratio prius audienda non est quam sensus consulendus, inique faciunt qui quod ipsi non viderunt aliorum experientie credere negant: Nec facile his à communi errore abscessissim, nisi Genevæ, cum Illustris Senatus nobis meretricem juvenulam, sexto post

post partum die in lacu Lemano suffocata, quæ adeo facilem partum ediderat ut & heram falleret, ad sectionem offerret, contrarium me sensus docuissent. Difficile est hoc apud nos deprehendere, ubi nefas putatur ex partu mulierem mortuam secare : & quæ supplicii afficiuntur, non prius ad mortem ducuntur quam disjuncta ossa longo temporis intervallo vicissim coherant. *Henningus Arniseus observat. Anat. 6. Idem in Hildani Operibus, Epist. 45.*

Ossa hæc an in partu à se invicem diducantur variè agitata inter Anatomicos ; Quidam diductionem omnino levissimam negant ; alii in omni, etiam facillime eam concedunt : Utrique sententia suas habet rationes : Media incedunt via *Waleus, Bartholæus* &c. qui in partu facili, ubi fœtus parvus, via lubrica, ossa late ab invicem distant, ipsaque cartilago ossibus interjecta mollis adhuc est, diductionem non

omnino necessariam judicant, sola cartilaginis laxatione sufficiente : In difficili autem partu, ubi fœtus grandior, viarum angustia, sicciior cartilago, nunc ossa pubis, nunc ilium & sacrum, nunc utraque magis vel minus divelli censent. Opinioni posteriorum favet observatio *Arnisei*, qui facilem adeo partum fuisse refert ut incisio hera contingeret.

§. 2. Hi qui mulierum & virginum plura cadavera secuerunt, videre potuerunt illas quæ nunquam conceperunt, esse longe angustissimas, easdemque habuisse cartilagine inter hæc ossa sitas, quibus mediis uniuntur, admodum tennes, siccas & fere nullas aliarum respectu : Sed quibus in utero sæpius habere, pluriesque parere contigit ; etiam si longo tempore post ultimum partum obierint, in his interjectas cartilagine crassas reperiri certum esse, in hisdem quoque illa & ossis sacri latera ampla, atque ossa pubis ubique, præsertim inter spinas anticæ ossium pubis latitudine insigni ab invicem dissidere. Quæ vero aliquoties tantum, ut semel aut bis, pepererant, medio quodam modo habere : Quod etiam ex inspectione matricis probatur, Nam ut in his quæ nunquam conceperunt matricis corpus tenue est & parvum, sic in his quæ pluries sunt enixæ, crassius semper remanet ad extremum usque vitæ diem : & in his quæ raro aut semel, medioeris est ; hæcque perpetuo vera sunt, dummodo his partibus nihil præter aut contra naturam acciderit : Hæc autem sententia ulterius confirmatur historia anatomica sequenti An. 1579. Mense Febr. in Regio Chirurgorum Parisiensium Collegio, cadaver muliebre dissectum, Quæsitumque an in partu mulierum ossa pubis & ilium, hæc scilicet ab osse facto, & illa ab invicem distabantur necne ? major pars adstantium negabant, Alii affirmabant, Alii dubii omnino tacebant, Dubium autem istud statim solum fuit, veritasque ex tempore eluxit, Accepto enim altero cadaveris femore seu crure integro, sublevatoque eo, cute minime secta, sed integre servata, cæterisque symphysis superpositis partibus, os pubis ejusdem lateris attollebatur, supraque alterum latitudine saltem mediæ pollicis eminebat : Quod oculis digitisque ab omnibus verissimum judicabatur ; Ut facilius melliusque videretur, crur alterum supini cadaveris supra mensa locati summe extendebatur, nulloque modo ischii flexo articulo, ambabus alteri narium subductis & substractis manibus, sursum os pubis cum minimo conatu attollebatur, & cum eo os innominatum totum ; quod, ut dictum est sæpe, componitur ex tribus, Ischii, Pubis & Illi ossibus, quæ in ea ætate penitus coaluerant per symphysin, quæ eo loci sit sine medio, unde posticas duas synchondroses multo laxiores fuisse solito necessario concludimus : Eo enim quo diximus modo, elato crure, innominatisque ossibus resupinati cadaveris, os pubis lateris ejusdem sua spina latitudine mediæ transversæ digiti à suo eongenere distabat, atque ei superveniebat : contra vero sublatis manibus, & æqualiter postis manibus æqualis opposito apparebat : altero vero crure elato, illud quod prius eminebat, inferius conspiciebatur, unde plures non abs re mirati sunt. *Severinus Pinæ de Notis virginitatis lib. 2. cap. 6. & 8. Vide Babinum Anatom. lib. 1. cap. 49.*

§. 3. A plurimis agitata hæc quæstio, ac nostro seculo à D. D. Laurentio & Pinæo hic dissentientibus : Ego vero experientiz credo, adfuiti quippe ab annis 40. partui plusquam quingentarum mulierum, in quibus manifeste deprehendi erepirationem & diductionem ab invicem dictorum ossium, inserto inter utrumque os pectinis digito, ubi manifestam separationem animadverti : quinimo mulieres omnes, quibus ægrior partus, tunc temporis accusant dolorem eo in loco : Imo infra coccygem imposita manu, prædictam separationem lixivit mihi percipere, Nec non in quibusdam ab inani nixu extinctis facta Cæsonia sectione, reperi ossa prædicta separata & relaxata, necnon ligamenta ea colligantia, mollia facta & dilatata ; eo quippe loco maxima matricis portio incumbit, *Jac. Guillemæan de facili partu l. 2. c. 1.*

§. 4. Vivit adhuc honesta femina, cui primiparæ, sub difficiliore fœtus exitu, ossium pubis commixturæ (ætate satis tum matura) non solum divulsæ sunt, verum etiam uti infelicio ribus nonnunquam in fracturis accidit, utrinque seorsim occalluerunt, invicem separata, ut in scalarum ascensu ac descensu, confusa, sanis validisque pedum alternatione uti nequeat, sed alterum semper (posui prius altero pro fundamento) quasi post se trahat ; digito eandem alternationem circa dictas ossium extremitates eodem tempore aperte sentiente, Aliquoties postmodum, at æque difficulter peperit, angustia forte oblii nimia. *Daniel Ludovici in miscell. curiosis anni 1673. observ. 255.*

§. 5. *Fernelius lib. 6. Pathol. inter causas difficilius Partum recusat ossium Pubis firmiorem compagem: Sed quid opus testibus in re tam manifesta? sola experientia fidem faciet, cui Medicus plus debet tribuere quam rationibus: Scipius, atque plusquam trigelics, in mulieribus mox à partu extinctis, vel paulo ante enixum, vidi presentibus Medicis & Chirurgis, cartilaginem quæ ossa Pubis colligat, minimi digiti latitudine diductam, ita ut hinc pubis ossa apparent si digito intus attraherentur: Quod etiam ante eadaveris dissectionem innotescerebat, uno crure sublato, sic enim ossa Pubis mobilia deprehendes, unumque alteri supereminere: Atque anno 1631. eum publicam Anatomiam instituerem mulieris, quarto die à partu suspendio strangulatæ, presentibus trècentis Auditoribus, demonstravi commissuræ ossium pubis interjectam cartilaginem, digiti latitudine laxatam; quin etiam ossis sacri cum ossibus illum commissuras mobiles admodum scalpello tenuissimo facillime separavi: Ossibus illum ossis sacri, loco cartilaginis, interjecta erant ligamenta crassa, rubicunda, quæ cavitatibus utriusque ossis inculcata erant; ossibus pubis cartilago crassa interposita erat: Potest & controversia etiam ipso sensu componi, Accipe perfectæ mulieris ossa illum, ante inter symphysin, & recto ossi sacro juncta: si per hoc foramen amplissimum, caput infantis recens nati libere tra ducatur, fatebor ossa Pubis non diduci; alioquin sustinebo, non sine maxima ossium pubis dilatatione fetum egredi, quia spatium illud angustius reddit caro intus circumjecta. *Riolanus Anthropogr. lib. 6. cap. penult.**

**I**dem animadvertens in *Perlingium* scribis istam dissectionem ossium illi, sacri & pubis non tantum in difficili, verum etiam in omni, et si facillimo partu fieri: Quæ de re magnopere dubitandum censeo: quippe non semel vidi mulieres parvos, & tamen maturos foetus facillimo negotio, ac sine dolore effatu digno cisternæ peperisse, idque vel in lecto, vel in communi sedili, & sine obstetrice, quod eam vocandi tempus non daretur, in quibus distosum ossium nulla divulsio facta videretur, utpote per quam à vicinatum membranarum distensione non possent non magni dolores induci: Adhuc, verosimile est non nisi per violentiam, & validam à magni foetus transeuntis pressione hanc ossa à se invicem diduci posse, nam cartilaginosa illa connectio nimis firma est quam ut in facili partu à parvo fetu, tam levi negotio distendi queat: *De Dismembrat. Anat. lib. 5. cap. 16.*

*Inter causas difficilius Partum* Mulier ob multas causas parit difficulter: Causæ vero referuntur vel ad Fetum, vel ad Uterum, vel ad Tempus, vel ad Situm mulieris, vel aliqua Accidentia, vel ad Intestinorum & Vesicæ plenitudinem vel ad mulieris in hacilitatem ac spirandi difficultatem: Rursus Foetus major etiam quæ Partus difficultatem facit, & multo magis si duplicatus egrediar, si pedem unum prosterat altero replicato, vel si in brachium exeat: hæc enim difficilissimum partum faciunt: Præterea uteri & mulieris constitutio, vel aliarum vicinarum partium, ut uteri magnus distensio, Oris strictura, Colli uteri longitudo: hæc enim facit, saltem, ut longiori tempore exeat foetus: Item nimia Omenti & vicinarum partium ipsiusmodi & obesitas: Nam *Hippocr.* scripsit Omenti magnitudinem impedire conceptum, os uteri compellendo; sic & facile partum molestat: *In quibusdam enim Omentum asplandis inter vesicam & uterum, ibique pressum sit Stercus induratum* in intestinis retentum idem facit, tum etiam nimis sed minus à se præsens constitutio etiam obest vel conducit partui, si quidem aquilonia difficiliter facit, austrius facilem: Sicca, foetum & mulieris corpus exsiccando, difficilem facit partum: nimis calida, vires resolvendo; frigida, partes contrahendo: Humida omentum apertissima est: Quæ modice calida est, ut veris (quod cum autumno facilliores partus concedat) laudatur: De *Situ* partus vide scholia ad §. 10. *Inter causas* quæ ab ætate juvenili, vel ratione morbi est, partum facit difficilem, quia robore opus est ad fetum

deiciendum: *Morbus pelleris* aut ejus mala confomario, quæ facit ut dilatus spiritum non possint continere, hic maxime nocet, quoniam omnis expulso sit retento spiritu, at asthmatici ex diu retento spiritum suffocant: Pectus depressum non multum aeris recipit, qui est necessarius ut tendatur diaphragma: ipsum enim tensione sua ventriculum & partes vicinas sibi comprimit, & consequentione quadam inferiores ad expellenda excrementa & Fetum cum muscularibus ventris: Hæc sunt causæ quas in partibus contemplari oportet, In aliis quippe *Obesitas* nocet, in aliis *membrorum durities* siccitasque, ut in mulieribus quæ jam senescentes incipiunt parere: tales enim difficile pariunt, quia jam obdunt & quasi in speram artem iugum est collum uteri: Quasdam alie sunt in nostra potestate, alie non: In nobis non est ut quæ pariat autumno, aut vere, aut flante austro pariat: Sed quod nulla sint excrementa in intestinis aut vesica retenta: quod corpus sit crassum, infans minus obesus, uteris sit humidus cum puer descendit, & cauda libera sine compressione aliqua, & alia multa, Medicus prædens, & in rerum cognitione versatus exequi poterit, si mulier sit audiens dicto, qui illis causis causas poterit invenire contrarias: Incipimus à Foetus magnitudine, & à multis causis provenit, à magnitudine parentum, vel à copia seminis & uteri amplitudine: Nam quæ mulier parva est utero, parum seminis recipit, & aliquando non generabit ob parvitatem, & quod facile non dilatatur uteris, cum crescit infans, cogetur abortire: Sed quæ amplo sunt utero, & facile dilatabili, magis infantes procreant, si sanæ sint: Magnam uterum habent ut plurimum quæ magnæ sunt, & quæ jam frequenter pepererunt, vel quibus à partu venter non fuit contractus fasciis: In talibus impeditur foetus augmentum tempore impregnationis, post quantum meriem: Si plethora adit, per epistemon & ex intervallis mittant sanguis partum trahendo, & cibi copiam minuendo, vel dando imbecilliora alimenta quæ satiant & parum nutriunt: Cum appetitus, alium aut prima mensa quæ laxant, fructus, oleum; Regantur hoc modo, Quiescant in lecto, donec certissimum erit infantem in lucem prodire: Duo enim commodæ hinc sequuntur 1. vires conservantur pro tempore emissionis; 2. Ab ære vel frigido vel sicco partes non contrahuntur. *Renæsius Pract. cap. 74.*

§. 6. Quomodo possibile est ut maris & magnus foetus per pelvis angustias, muscularibusque partibus undequaque obstratis & infarctis, in partu transire possit? Dico, si parvus fuerit

fuerit fœtus, eum per dictas angustias sine magna molestia transire posse, docente id experientia quotidiana; nam partus tempore, ab humorum copioso affluxu, adeo leves & laxæ fient partes genitales, ut exigente necessitate, etiam obstetricis vel Chirurgi totam manum facile admittant: Verum si magnus fuerit fœtus, vel partes per se sint angustiores, tunc gravem & laboriosum fieri partum, atque pubis ossa, laxatis ligamentis & cartilaginibus, aliquantum dehiscere, imo cartilagineam quoque connexionem ossis sacri cum illi ossibus adeo laxari, ut manifeste à se mutuo recedant: Hanc dehiscentiam harum partium primi notaverunt, Hippocr. lib. de nat. Pueri, Avicenna lib. 3. fen. 12. tract. 1. cap. 2. Aetius tetrabil. 4. sermone 4. cap. 22. quam acriter quoque defendit Sever. Pinæus operis physiolog. lib. 2. cap. 5. 6. & 7. Contrarium sentientes evincit certissima rerum magistra experientia (hæc docente omnes qualescunque rationes concidunt) qua non semel illud fieri compertum ac clarissime demonstratum est. Nos quoque anno 1654. mense Martio, puerperam sequenti post partum die mortuam, in publico theatro secimus, in qua pubis ossa à se invicem adeo divulsa erant, ut minimus digitus facile interponi posset. De Diemerbræck Anatom. lib. 6.

**H**æc ossium divulsio causa est quod puerperæ, quibus gravis & laboriosus fuit partus, & fœtus magnus, frequenter de dolotibus circa os sacrum & pubem conquærantur: quod etiam femine quæ sæpius pepererunt, dictas cartilagineas habeant crassiores: Item quod virgines seniores, his cartilaginibus

magis tescicatis, viro locatz difficilias pariant quam juniores: quod denique, cum reliquæ corporis cartilagineæ ætatis progressu siccescant & ossæ fiant, hæc tamen in mulieribus nunquam siccantur, ac nunquam ossæ evadant. Idem.

§. 7. Paræus lib. de gener. cap. 13. scribit se olim fuisse in illa opinione, ossa ilium & pubis in partu non posse divelli, sed tandem tamen contrarium ipsi apparuisse in sectione cujusdam mulieris, 15. die post partum suspensæ, cujus ossa ilium ab osse sacro distracta erant, & ossa pubis à se invicem distabant latitudine dimidii digiti.

§. 8. Idem observavimus hic Basileæ ante annos duodecim, cum Nobilis matronæ Gallæ ventrem, quæ ob secundinas retentas interierat, pluribus adstantibus aperiremus. Bauhinius Theatri Anatom. lib. 1. cap. 49.

§. 9. Experientia edoctus assero ossa pubis sæpe ab invicem in partu laxari, emollito eorum cartilagineo connexu, totamque hypogastri regionem ad miraculum usque ampliari: Non quidem ab aqueosæ substantiæ profusione, sed sua sponte, ut fructus maturi excludendis suis seminibus solent hincere. Harvæus de Generat. animal. Exerc. 57.

§. 10. In publicis feminarum, ex difficili partu mortuarum, sectionibus, conjunctis ossis ossum pubis, ut & illi ac sacri dehiscentiam spectatoribus multoties conspiciendum exhibui. Spiegelius lib. 2. de Humanicorpor. fabrica cap. 24.

**I**lli ac sacri dehiscentiam.] Hinc multum refert didicimus experientia quo situ donetur paritura: Nam si se deat, impeditur dilatatio caudæ: eum enim mulier parere vult, necesse est amplius vulvæ foramen, non à parte anteriore, (ut aliqui falso existimant, putantes ossa pubis, quæ cartilagine media conjunguntur, & transversum ligamentum acceperunt, apertiri) sed ad ossis sacri cum cauda articulationem: Nam cum os sacrum in eandem desinat, ita cum eo articulantur sua ipsius ossa inter se, ut reflecti possit cauda in partem exteriorem, & foramen sic reddatur latius

multo; Hæc cauda ita erigitur in exteriorem, ut visu id discerni possit, si quæ parturit mulier emaciata sit: Itaque si natus instantur, cum non possit retrocedere cauda, partus impeditur: Si sit, non satis viribus pollent, quanquam is situs convenientior sit, modo in anteriore se flectans: Quare manibus contra locum, aut mensam, aut aliud innitatur, ita ut sit sufficiens spatium pro obsterice susceptura puerum, & sustineatur à viris fortibus: Sin minus, decumbat, sed dorso tantum innitatur. Randeletus Prae. cap. 64. p. m. 57.

## OBSERVATIO IX.

Os Pteri in prægnantibus artissime clausum repertum. 1. 2. Pteri status à Partu secundo die. 2. 3. 6. De crassitie uteri in Gravidis. 4. Pteri status sexta post partum hebdomada 5. Pteri constitutio in Graviditate & à Partu. 7. Pterus hypogastrio adstrictus post maris partum. 8.

§. 1. **O**S Uteri testibus Hippocr. & Galeno, in prægnantibus tam arte clauditur, ut ne quidem specilli aciem, nec ullius aëris aut aquæ (in balneo) introitum admittat; quod licet nonnulli in dubium vocent, & solummodo de levi aliqua conniventia explicant, tamen à nobis verissime visum est anno 1649, quo apertimus & examinavimus ancillæ veneno interemptæ cadaver; in quo, inter alia, invenimus uterum à longitudinis manus fœtu tumidum, ejusque osculum non modo artissime contractum, sed tam glutinoso ac tenaci humore pituitoso obsecratum, ut nusquam tenuis stylus immitti posset, nisi majore vi per gluten illud adigeretur.



§. 2. Illud etiam vidimus in alia muliere circa 7. mensem grvida, reperiato fato extincta mense Decembri 1665. *De Diemerbrack Anatom. lib. 1. cap. 33.*

**T**am glutinosi humore) *Sanctorius* meth. vit. Exor. lib. 1. cap. 30. ait ostificium uteri non posse claudi, sed ita apertum conservari sicuti erat in muliere antequam utero gereret: at in pœgnantibus solum in parte interna esse obstructum à quodam mucilaginoso infarctu, qui adeo conglobatur, & uteri foramen intus operit; Atque in brutis, capris præ-

sertum, manifestum esse asserit; gravidæ enim si dissecantur, in parte uteri interna juxta ostificium, observari floccum quendam mucilaginosum cooperentem & velantem totum uteri ostificium, sine aliquo ostificii clausura, quod in interna parte semper maneat apertum etiam in mulieribus.

§. 3. Excluso in lucem fœtu redit uterus ad priorem consuetudinem sensum & sensum: Aperto eadavere altero à partu die, uterus conglobatus apparebat ad capitis infantis bimuli magnitudinem, albicans, in tubulis nullo sanguinis apparente vestigio. *Rolfingius parte 2. de Organis generat. cap. 21.*

§. 3. Os uteri ita extensum & lacerum erat ut vix appareret, Uterus magnitudine capitis erat adhuc & crassitie pollicari: Intus sanguinis reliquæ & ora vasorum crasso & nigro sanguine adhuc sudantia: Vincula uteri cum ossibus Ilium, sacro & lumborum, & intestino recto firmissima, parte anteriore nulla, præterquam cum vesica admodum exigua. *Jac. Sylvius in appendice Isagoges anat. de variorum corporum sectione.*

§. 4. Falcoburgius testatur in dissecis se observasse gravidis, crassiozem videti tum temporis uterum, sed falli oculos ab hepate uterino arctissime connexo, quod separatim facum detegit: Sed contrarium docet experientia: Nempe crassities illa in utero, fœtu jam absoluto oculis conspicua, duorum pene digitorum crassitiem æquat, præcipue circa fundi illam partem qua secundina adhæret: adest etiam adstipulante Harvæo, in ea parte qua placenta utero non adnascitur: Constat hæc crassities à sanguine in tubulis uteri stabulante. *Rolfingius cap. 21. de organis generationis parte 2.*

§. 5. Infanticida femina sexta post partum hebdomada capite patratum scelus expiat, juvenula parvæ staturæ, obesa & sana: Peritonæo aperto non comparebat uterus prima fronte, sed vesica lotio tumida conspectum illius adimebat, sub qua delituit uterus, durus satis & contractus, ut mirari satis nequiverim tam brevi post partum tempore contractum: Magnitudine vix pugnū æquabat. Nymphæ contractæ, carunculæ quoque oblitteratæ, nisi ostificio vesicæ appositæ: Vagina dissecta ad uteri ostificium sine rugis solitis: Externa pudendi labra satis hiabant: Uteri ostificium arctissimum durumque: Uterus ipse crassus & fungosus, vix pomo excipiendo capax: In ipsius parietibus crassis foraminula utrinque parebant, seu acrotabula, quibus per fistulam inflatis, elevabantur vasa restibus subjecta, seu alter Tub. inferior ramus ex vasis deferentibus ortus. *Th. Bartholinus histor. 92. cent. 1.*

§. 6. Nuper dissecti Nob. mulierem, quæ 24. horis à partu decessit è vivis, aquarum copiis, quibus abundabat thorax, corde suffocato: Inveni uterum fere ad naturalem magnitudinem contractum, vix enim manus complicatæ amplitudinem æquabat. Dissecti uteri cavitas exigua erat, & adhuc cotyledones, sive tubercula; granis milii simillima apparebant: Parietes uteri duorum digitorum crassitiem æquabant. *Riolanus Anthropol. l. 5. c. 1.*

§. 7. Membranas Uterus obtinet duas, Exteriorem duplicatam validam à peritonæo: Interiorem propriam, fibrosam magisque porosam: Inter has carnosus & fibrosus contextus quidam reperitur, qui in mulieribus gravidis ab affluentium humorum nutritionum ubertate admodum una cum dictis membranis increfcit, ita ut quo magis augetur & increfcit fœtus, eo carnosior, fibrosior & crassior evadat uterus, qui postremis gestationis mensibus pollicis, & nonnunquam circiter duorum digitorum crassitiem adæquat: Hæc crassities non est ex solis humoribus in porositates uteri se insinuantibus, ut multi existimant, sed est vera & satis densa caro, quæ postea muscutorum instar inservit ad fœtus expulsionem: Qualem carnosam uteri substantiam anno 1653. mense Novembri, in theatro Anatomico publice demonstravi, in eadavere puerperæ, duodecim horis post partum mortuæ, Et non ita dudum privatim in muliere in partu una cum fœtu mortua: Hoc tamen carnosum incrementum post partum, humoribus & sanguine maxima copia ab utero effluentibus, denuo emaciatur & exarescit, atque sic ad pristinam formam ac magnitudinem iterum redit & contrahitur. *De Diemerbrack Anatom. lib. 1. cap. 24.*

§. 8. Nuper vidi in muliere 15. diebus à partu strangulata, uterum in dextrum latus inclinatum, & firmiter adstrictum: Ligamentum latum dextræ lateris brevius erat sinistro; marem enixa fuerat: An eo modo constitutus ille, quæ mares potius quam fœminas generant? *Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 33.*

*Secundinarum retentio ob arctam cum Vtero adhesionem. 1. 2. 3. Ob eandem cohesionem cum carne Vtero adnata. 4.*

§. 1. **I**N Nosodochio nostro aperui corpus puerperæ, statim post puerperium de fundæ causam indagans mortis, Inveni secundinam undiquaque ipsi utero tam firmiter adhaerentem, ut vix & non nisi labore separari potuerit, eratque omnino exsanguis, ut & reliquum corpus parum admodum sanguinis habebat, respectu ejus qui alias esse solet. 2. Uteri subititia admodum crassa erat & fere duorum digitorum crassitiem adæquabat, multis tamen fistis conspicuis foraminibus instar spongiæ pervia, inter scilicet duas tunicas proprias: orificium ob recentem partum cum cervicæ maxime hiabat: ossa pubis nullo modo sejuncta, sed arctissime, & ut naturaliter fieri solet, firmissime connivebant: Venæ spermaticæ amplissimæ erant, ita ut infantis cujusdam minimum digitum adæquarent, sanguine repleti, in exortu naturaliter se habebant, dextra tamen paulo infra exortum, aliam adhuc ramum, & cum quidem insignem ab ipso trunco assumebat, eumque mox sibi conjungebat, ut ex duobus vasibus unum fieret. I. R. Salizmannus observ. p. 43.

§. 2. Uxor D. Morel Lanistæ, præpigiis & vorax, eximie fecunditatis, 12. partu filium enititur Junij 13. 1673. hora secunda pomeridiana; Partum magnus sequitur lochiorum effluxus, ea quantitate ut jugularum bovem dixisses, hinc leipthymiz, subsistit secundinæ: Educere tentantem obstetricem conatu adhibito, prohibeo, quod arctius adherere judicaret; perseverant leipthymiz, jeffigatio accedit, Puerperiorum educationem urgent iterum affidentes mulierculæ, & enixa obnixæ postulat; advocantur Chirurghi, qui manum admove ob virium debilitatem recusant, veriri ne in ipsa operatione expiraret, Accedens alter Medicus omnia symptomata in resistentem secundinam rejicit, tetros vapores emittentem: Repugno quod ante tres demum horas satis felix partus præcessisset, nec esset verosimile tantillo spatio eas computruisse; septem horis à partu occubuit.

Referato postridie hypogastrio, adeps ad trium digitorum (pissirudinem) se offert, Uterus bene constitutus, quo incisio ne gutta sanguinis per ejus substantiam diffusa æternetur; In cavitatis parte sinistra cotyledones manifeste erant: Parte dextra secundina utero arctissimo nexu utero adhaerebat, Ita ut judicatum sit ab imperitia obstetricis partum intempessive promotis, mortem contigisse: Aderat porro grumus sanguinis, ovi parvi gallinaeci magnitudine, ad uteri ostium, à quo terra illa acidentia provenisse verissimile est potius, quam à subsistente secundina, quæ illacera & incorrupta apparuit; Mortis autem causam sanguinis profusionem magnam credo, quamvis plethorica esset mulier, hæmorrhagiis obnoxia, quæ quater vel quinque per graviditatem sanguinem sibi mitti curabat.

§. 3. Mulier Nobilis Galla, quæ jam multoties pepererat, cum ante annum in partu, ob secundinam retentam, ab hora quarta matutina, ad 8. vesperti nam, qua demum, nisi prius injectionibus, stercutorijs, suffribus secundinam ejecit, vix evasisset, anno 1588. Martij 25. denovo cum mane sortum excluderet, ob secundinam subsistentem in periculum venit, propendente interitum chorda umbilicali: Frustra autem variis remedijs tentatis, magna que sanguinis grumosi continuo effluente copia, vires adeo collapsæ sunt ut sequenti die circa horam 4. vespertinam exstingueretur.

Sectione facta uterus spissus & amplus (qualem puerperis per octiduum permanere, indeque sensum se recolligere, & ad pristinam parvitatem redire aliquoties observavi) in hac quoque inventus est: Quo in longum ipsiusque cervicæ dissectis, secundinam, tum circa uteri orificium, quod amplum admodum erat, initium adhæsisse, tum per carneam-placentam uteri interiori substantiæ adeo accrevisse, ut ægre manibus avelleretur & tracta laceraretur, visa fuit, cui adhuc amnios tunica, & chorda que umbilicalis adhærebant: Præterquam & corpus quoddam, parenchymate crasso & sublivido constans, hepatis substantiæ coctæ simillimum, propria involutum tunica, illic quoque citra connexum jacuisse observavimus: *Platerus observat. lib. 1. p. 231.*

**E**X quibus, quod nondum perfecte maturo facta mater ad partum edendum ab obstetricis sollicitata fuerit, causam fuisse ut secundina hæretic conjecimus: Cum nisi maturo penitus facta osculis valetiorum tunc sponte, citra laborem secedentibus ab invicem, si fœtus vi majore propellatur, oscula modo dicta citra dilacerationem divelli vix queant: unde postea tanta sanguinis profusio, quæ matrem è medio tollit sequitur: Causamque hanc potius quam secundinæ retentionem, accedente nonnunquam in-

flammatione uteri, ob dolores illos in solutione illa violenta succedentes, quare puerpera tam cito extinguatur existimamus esse: cum illa retenta, ut nec fœtus mortuus tam diu matre supersistere, subsistens; demonstratur exemplis, hoc tam cito minime posse efficere: In quo quam sæpe peccetur ab obstetricibus, ut se expediant citius quam necesse erat, gravidam, postquam aliqua tantum præluia partus senserit, ad laborandum (ut vocant) per conatus impellentibus, in opere nostro Practico exposuimus.

§. 4. Mulieri post 15. annos à connubio parere contigit, Secundæ substituerunt, evulge frustularim: Obstetrix assererebat superesse aliquid; *febris nata*, hinc lingua nigra, dentium intervalla scabritie nigricantia, facies *vixipans*: septimo die mortua: Secta; Inventa caro oblonga adnata utero, membranarum pars quæ computruerat. *Hollerus libello observ. §. 10.*

*Superesse aliquid* Inter signa secundinarum portio- nis resistentis hoc certissimum est, si uteri purgamenta factorem cadaverosum referant; quod duobus exemplis probat *Riverius* observation. 61. centur. 1. Id quoque observavi in uxore Reverendi viri D. *Offerwaldi*, Pastoris Neocomensis, cujus cubiculum vix quicquam prae festose adire audebat: hinc conjectura facta non integre exclusas secundinas, exhibitio pulvere succini cum syr. cortic. citr. conf. hyacinth. & aq. pulg. & lilior. alb. quod reliquum erat feliciter eductum, sanitasque brevi sequuta.

## OBSERVATIO XI.

*Lochiorum retentio ob rupta Vteri ligamenta.*

**C**omitis de Maulevrier uxor cum uterum gereret casu est laesa ad regionem lumborum: ferunt non attigisse partus tempus legitimum: peperit, omnia satis ex voto: Pleuritis, secatur vena sæpius, lochia supprimuntur, *Sotivax*; mors:

Aperto cadavere ligamenta uteri rupta inveniuntur, mirum hoc, Et forte ruptura hæc purgationis non legitime factæ causa fuit:

**A** Non oborta pleuritide in muliere nuper enixa quam quia sæpius sanguis missus fluentibus lochiis: audacius mittendus sanguis? Uxor Domini *Benian* Mercatoris non alia ratione videtur interisse hæc enim statim suppressa sunt. *Ballonius Paradigm. 135.*

## OBSERVATIO XII.

*In muliere à nimio fluxu extincta uterus valde contractus, vaginaque ampla reperiuntur.*

1. Ab Vteri ruptura nimius fluxor. 2.

§. 1. **I**N Nobili muliere immodico lochiorum à partu effluvio extincta, vidi uterum valde contractum, qui vix pugnum excipere potuisset, ipsiusque vaginæ capacitatis major erat quam uteri amplitudo. *Riolanus Anstropogr. lib. 5. cap. 1.*

§. 2. Domina de Mommor annum agens 25. partui proxima, circa 4. aut 5. horam matutina male habere coepit, sacrastramen ædes proximas adivit; tormina ex intervallis urgebant, comite sanguinis fluore continuo: triduo post feliciter peperit, imo sine obstetricis adminiculo, secundinisque paulo post exclusis circa noctem tamen eadem die obiit; asservatum ad aliquod tempus cadaver, de morte dubitantibus consanguineis.

Aperto corpore à *Pinas* Chirurgo, præsentibus D. *Fabro & Ballonio*, Medicis Parisiensibus, uterus ruptus, lacer & fissus parte sinistra inventus est, qua vena & arteria hypogastrica circa medium uteri corpus scandunt, quæ quoque ruptæ, è quibus magna sanguinis copia effusa est. *Guillemeau de Partu felici lib. 2. cap. 13.*

## OBSERVATIO XIII.

*Tormina partum sequuta, ob uterum grumis plenum, status in ventre inferiore, cum lecoris & Renis dextri vitio.*

**M**ulier honesta mollis & rara, annorum 30. febre, destillatione veteri in pulmones laborabat, fortum gestans octimestrem: In difficultate partus, decoctum veteris Galli, cum modico cassiæ lignæ, croci & rasillo vini odoriferi præscriptum: Peperit die 7. contra Tormina decoctum semin. foenugr. bene loti in aqua cal. colatum per manicam Hippocr. cum saccharo & modico cinnam. Syrup. capilli ven. cum succo amygd. Inunctio ex oleis, Sacculi è milio: mortua est 10. hora à partu.

Apertæ uterus grumis plenus inventus, Totus venter flatibus tumens: Ren dexter purulens: Hepar vitiatum & quasi putredine mucosum: Similiter & pulmones. *Hollerus in observat. ad consilia curandi §. 8.*

## \* APPENDIX.

## OBSERVATIO I.

*Partus difficilis lethalis, ob vasa umbilicalia satura constringentia & in utero cibibentia.*

**A**disti ante XIV. dies Nobili cuidam forminx in puerperio, ea qua potui fidelitate, sed sinistro eventu, Etæquæ quamvis infans recto situ officium uteri internum ingressus, artamē clauso

magnum frigus in pectine perceptum, accedente diarrhoea lethali mater & infans simul extinguuntur, ut separationem utriusque moliri intenderim, postea culpa in me translata, ac si encheiristes ad hanc rem necessarias nescivissem, atque sic per negligentiam meam infantem interfecissem; quia effato medici, qui matrem aperuit, infanti ab obstetrice ferri potuisset auxilium quo minus extingueretur, cujus hæc est Relatio;

Ad requisitionem Nob. Dom. seculi conjugem ejus in puerperio extinctam cum infante, observando situ quidem naturali factum utero in orificium internum ingressum, dum caput versus vulvam, pedes autem versus uteri fundum reclinati erant: E contrario vasa umbilicalia circa talum sinistri pedis, quasi tendicula erant obvoluta, quæ tamen ab obstetrice, signata fuisset artis revolvî potuissent servare fœtu vivo & incolumi: Quæritur utrum obstetrix omnes situs vitiosos fœtus prævidere & avertere possit? *Et in specie*, Utrum scire possit quod vasa umbilicalia talo fœtus involuta sint?

*Responsum Facultatis Medicæ Lipsiensis.*

Respondemus prævia deliberatione facta, quod 1°. Obstetrix omnes situs vitiosos fœtus non semper scire, multo minus possit avertere, etiam si liberatè veller, provocando ad experientiam quotidianam: Hinc 2°. etiam videre non potuisti an vasa umbilicalia talo infantis sint obvoluta: quoniam in abscondita nemo visu penetrare potest, nec medicus scivisset hæc nisi mediante sectione hæc observasset: Proinde non conspiciamus quomodo hæc revolutio vasorum fieri potuisset.

*Utrum obstetrix omnes situs &c.* 3. Obstetrix omnes situs vitiosos fœtus non potest prævidere, multo minus corrigere; Facile quidem in libris præcipitur, muta muta situm fœtus, sed in tanta loci angustia vix tam & feliciter effectus datur, Quomodo enim corriget illud quod non videt? dicis, Tactu explorat, Respondeo, fallax indicium probet in locis angustis sicut quoniam Obstetrices tactu solo judicantes, os humeri, cubiti pro capite fœtus habuerunt? deinde quomodo juvabit obstetrix Agrippas, quid si fœtus duplicatus in nates exitet quomodo hunc fœtum vitiosum emendabit? *Ammannus medic. crit. casu 87.*

## OBSERVATIO II.

*Partus impeditus ob fœtus insignem magnitudinem, Pleri expansionem extraordinariam, ob peritonæi divulsionem Hernia uterina ansam præbentem.*

**V**XOR Pistoris Bagnusienfis, quadrimestris gravida ex casu graviter læsa ad umbilicum, quia impigrit venter in stipitem ligneum quadratum; Non diu post animadversus tumor Nattam referens, paulatim increscens, partus tempore pugni magnitudinem adeptus, sed succedentibus lociis decrescens, quare minus ægræ terrificus fuit, à partu plane subsidens: Accedente autem altera graviditate, exacto biennio primis diebus emerit idem tumor, sed ad tantum incrementum deveniens ut tempore partus magnitudinem capitis infantis attingeret, sed iterum excussus est tumor, quod à partu nulla sui vestigia reliquerit. Initio à postrema, rursus se prodit tumor, in tantum adauctus ut instante partu in pedalem altitudinem assurgeret, circumferentia bipedalis esset universam hypogastricam regionem occupans ac umbilicalis partem: Porro accedente partus tempore, dolores illius comites adfuerunt, qui quaquam & cerebri vehementes, illuc tantum usque producti sunt temporis, quo aquæ effluvium incepit: Illico ab earum exitu ingens erupit sanguinis copia, quæ utur insignis orificium tamen uteri interius referere non valuit quo concederetur tum fœtus capiti fœtus exiturientis, etsi multum jam progressi ob indebitam magnitudinem: Ea propter in auxilium invocatus fui, sed cum eo in statu constituta esset qui omne respueret, in dubia præterea adessent fœtus mortui indicia, omnisque mihi præscinderetur spes alterutrum, matrem scilicet aut fœtum conservandi, assidentibus edixi inique me acturum si manum crudelem operi admovendo matris interitum promoverem: Hoc in casu satius fore D. Thomæ auscultare, qui gravidam morientem, statim ac anima egressa est, disseccandam jubet, id quod paulo post à me peractum.

Incisis partibus imi ventri continentibus, latere sinistro, inbique dissecto utero, illico prodit ater humor fœtidus & purulentus, pinæ unius mensura; Postmodum detecto fœtu, observavi ipsum in cavitate uteri complicatum, adeo tamen ut ipse solitarius Tumorem pro Natta habitum, formaret natis partem maxime eminentem effingentibus: Admiratione vero omnino digna fuit magnitudo ad quam pervenerat occasionem præbente partium continentium expansione: Illo enim utero exempto, & dimenso, altitudinem xvvi. pollicum obrinnit, cum crassitie convenienti; etsi ab aliquot diebus mortuum esse

colligatam ex epidermidis absentia & secundinæ corruptione, quæ uteri partem contiguam infecerat. *D. Saufseil. Zed med. Gall. anno 3. p. 52.*

**C**um nemini dubium sit quin membranose partes ex accedenti præter naturæ limites expandi queant, nullus tamen admirationi locus adest in ista muliere uterum insolitam hanc dilatationem passum esse, nulla subsequuta fibrarum sensibili divisione: Sed sicuti partes continentes, ex naturæ lege subditas in officio & situ continent, adeo ut nullam evagari sinant, quamdiu nulla accesserit vis externa, ita certum est ab utero, simili in casu non potuisse tumorem induci peculiari modo circumscriptum, quo tempore læsio contigit, nisi quæpiam partium continentium propriarum aut saltem peritonæum, quoad propriam structuram divisum fuisset, eoque pacto utero concessisset sparium ad quod ultra præstitutos limites deferretur, hoc est penetraret locum istius dilacerationis: Supposita hæc circumstantia facile est ceteras illustrare: quandoquidem secundum naturam contigit personæ divisionem (initio verisimiliter exi-

quam) augmentum suscepisse priore graviditate, majus secunda, insigne tandem tertia; cum in unaquaque graviditate circumferentia divisionis ab utero semper occupata fuerit, qui extensionem amplius incrementum fieri admittere non ponit, qui idem dem ulterius dilatare circumlocum membranæ quæ tunc cingebatur: Idem statuere licet tertium factum tanto majus incrementum capessere debuisse quanto major peritonæi hiatus evasis, si quidem utero nullum amplius occurtebat ad expansionem majorem impedimentum: Atque hæc proculdubio deducenda causa inextinctis fortis, ob ruptionem inevitabilem fibrarum secundinæ componentium, ac proinde illarum quæ fixæ erant in parte uteri contiguæ, his adde hæmorrhagiam uterinam supervenientem, & symptomata varia partium impedienda, nulli remedio locum concedentia, mortis causam immediatam. *Idem.*

## OBSERVATIO III.

*Abortus excitatus & Remibus calculosis & purulentis.*

**F**œmina grvida quam anno præcedenti doloribus nephriticis pertinacissimis diu vexatam nec dum plane liberatam cura proluxa tractabam anno 1655. 15. Jan. embryonem à XII. septimanis conceptum masculum abortu rejecit, qui minimi digiti magnitudine, oculos nigricantes habebat prominentes, caput magnum, oblongum, venter videbatur sanguine repletus, cetera membra exanguia omnia: Crastino die de *terminibus ventris & doloribus* conquerebatur in latere dextro: 18. Jan. suffocationes matricis sensit, ut dubitaret num secundina embryonis secesserit nec ne. His omnibus paucis diebus post supervenit periculossima *diarrhæa* interdum *liposymia* conjuncta, quæ etiam postmodum semper per intervalla rediens, administratis licet convenientibus multis ac variis, nunquam plane fere ad mortem usque debellari potuit: præterquam quod etiam ab aliis insuper symptomatis ut frequentissimis accidenibus & *suffocationibus uterinis*, *doloribus atrocissimis nephriticis* laterisque dextri, *cardialgiis*, *nausea ac vomitu*, *horroribus ac insultibus febrilibus*, capitis gravædine atque dolore ut & tandem delirio, mortem proxime præcedente, alternatim stipata fuerit: In primis autem à puerperio statim prædicti Abortus, quo & reliqua sevirè ceperunt, universali totius corporis *atrophia* adeo consumebatur, ut hac indies magis magisque ingravescente, viribusque labalcentibus, ad 25. Aprilis usque qua moriebatur, ad extremum marasimum fuerit redacta.

Hujus corporis post mortem aperti statum interiorem hunc reperi, Omentum erat putridum, Intestina ut & Ventriculus, vacua Hepar, ventriculo incumbens magnum & majus folliculo: Vesica biliaria flava subalbicante bile plena, porus cholidochus digiti latitudine, ad duodenum fere amplius: Uterque re carne absumpta, pure plenus & calculis, dexter magis quam sinister, in illo namque inventi quatuor angulosi cum eminentiis & ramis; Pelvis fistulis diversis respondentibus, in sinistro vero unus crucis, alter amygdalæ figuram referens, far magni: Ureteres, vasa emulgentia atque spermatica pure plenæ; cor flaccidum lobus pulmonum sinister liber, sed undique costis & dorso adnatus, quem cum separare vellem, pus foetidissimus in magna copia prorupit, uterus rugosus, vesica vacua *Manifeste Observat. Plateri pag. 54.*

## OBSERVATIO IV.

*parvus impeditus ob Pterum in latas hypogastrii devolutum, putriloginosum redditum ab inflatione intestinorum.*

**M**ulierem quandam parvi stature, gibbosam naturæ, anhelosam, prima vice imprægnatam an. 1670. 20. Julii, atrocissimis parturiendi conatibus longe prius vexatam, post cænam vocatas adij: brachiolum fortis dextrum jam semiputridum ad axillam usque extra corpus

fuit protrufum, capite prorfus retro orificium matris internum manente, ipfa jam vitibus adeo efforta, febrique continua correpta (ex fanguinis infectione, ut opinabar, ob putrilaginosum foetum, in utero jam dudum mortuum) ut brevi fucebituram, nec foetum hac figura fituque integraliter unquam emixuram, praxdixerim; eo quod ob summam naturalium extreme dolentium anguftiam ac inflammationem, nec infans retrudi, nec in tanta virium debilitate, laboriofa operatione, instrumentis fruftillatim eximi poterat; Praefcriptis ergo cardiaceis & hystericis variis, cum pediluvio ex iisdem & emollientibus purato, injuncta infuper obftetrici & aliis cautela fumma, poft horam difceffi: Duabus poft abitum meum horis abfque ullo enixu mortua eft, quam fuper afferes collocaam in eodem fitu immotam detineri in craffinum ufque jufsi: Altero fummo mane ipfam diffecare volens huc me contuli; ubi venter hujus demortuae praeterita durante nocte adeo intumuit, ut hesterno ad minimum duplo major, praefumma cutis ex panfione quali rupturum minaretur: Infans vero mafculus, putridus, lividus, ac toto ferme corpore excoriatus; vivente matre omnibus modis exclufo prohibitus, nunc inter hujus femora fuit repertas.

Inmani hoc ventre vix dum diffectio, inflata impetuoiffime eruperunt Inteftina, cum tanto ferrenti flatuum turbine, qui totum cubiculum fubito implens, praefuo intolerabili fetore nobis ibidem perfiftendi vix concedebat moram: Hanc vero intumefcentiam inreraneorum flatulentam, magis ac magis inaufcendentem, cui venter extreme dilatatus amplius cedere non potuerat, uterum tandem adeo compreffiffe (quem quidem in infimam hypogaftrii angulum fuppreffum nonnifi longiori inveftigari indagine) ut onus fuum deponere putrilaginosum, & quidem facili negotio, per vias poft mortem flaccidas, lubricas ac laxas, adjuvante nonnihil fi velis ultimo moriendi conatu, coactus fuerit ftatuere tum abfurdum mihi non videtur: Secundina glomeris inftar convoluta, in rotum mortificata, quam digitis meis agglutinatam ut putridum pomum contrivi, in utero fuit reperta; hujus vero parietes intus squallido obliiti pzdore: Inprimis vero poft obitum diu effluxit per oscopiofus humor, lochiorum inftar ichorofus atque cruentus. *Maniffa obfervat. Plateri pag. 76.*

## OBSERVATIO V.

*Partus impeditus ob putrefactum uterum, factu in abdomine fuo.*

**P**AUPERCUla quzdam uterum ferens, toto difficilis geftationis tempore fempet de doloribus in abdomine querula, jufto appropinquante Partus tempore inter ingentes conatus cum parere nequiret 21. Jan. anno 1676. expiravit.

Qui difsecavit Chirurgus recensuit aperto abdomine, & remotis integumentis parum effluxiffe aqz putridz, mox in confpectum veniffe infantem omni ex parte liberum, in abdomine extra uterum fitum, mortuum quidem, fed extera abfolutum, perfectum, nulla parte contaminatum, fub ipfo autem uterum apparuiffe femiputridum & fphatelo ita abfumptum ut frufta ejus nigricantia foetida exemerit, adftantibusque monfttraverit, admiratus rei novitatem, ftudiofius inquifivi an non quia foetus illz falvus & integer, uterus forte in muliere continuis laboribus & geftationibus victum quzerente fuerit ruptus, ficque infans in abdomen prolapfus, id quod fzpius fieri poffo concedit *Feftingius* in Syntagm. anarom. & exemplis probat *Hildanus*. Sed ille revera uterum putrefactum, una cum obftetrice & aliis affirmavit conftanter, adeo ut fidem denegare non potuerim: Vide *Bartholinum de infolit. Partus viid. Car. Rayer in mifcell. cur. anni 1677. obferv. 60.*

## OBSERVATIO VI.

*Partus difficultas ob factus gemellos in utero mortuos.*

**M**ulier Ferrarienfis, quum ob difficilem partum mortua fuiffet, eam aperuimus ac difsecimus: Geminos enim in matrice completos habebat, mafculum & feminam, & illos quidem mortuos: Inde extracta matrice percepimus falsum effe quod quidam dicunt in matrice pluries locellos effe, quum revera uterus fimilis fit veficz, in qua praeter communem quandam cavitatem nulla altera apparet. *Amatus Lufit. cent. 2. car. 27.*

## OBSERVATIO VII.

*Partus impeditus ob folutionem continui in utero parte exteriori & inferiore.*

**A**PERTA muliere in partu extineta, reperta a *D. Tamponetio Medico Regio*, folutio continui in parte uteri exteriori & inferiore; cujus caufa foetum in exteriori & inferiore

parte uteri, ejus causa factum in cavitate contentum extrahere non potuit, etiam si caput orificium externum jam prætergressum esset. *Nic. de Blegny Zodiaci med. Gall. p. 79.*

## OBSERVATIO VIII.

*Partus impeditus ob scirrhum in regione umbilicali enatum.*

**M**ulier aere annum in partus doloribus oblit, annos xxviii. nata, temperamenti dum viveret melancholici; Aperto cadavere repertus scirrhus in tegione umbilicali, magnitudinem duorum pannum Reginae dictorum exaequans, molestus toto biennio: Tumor is una cum fetu versus superiora septum transversum adeo compulerat, ac tantam viscerum situi naturali immutationem induxerat, ut Lien costis, homoplatæ subditis parte sinistras proximus esset; Jecur autem ex altera parte collocatum, ad æqualem pene altitudinem compulsum esset: vesica fellea adeo contracta, ut nulla pene cavitas inesset; meatus autem choledochi, ob jecoris elevationem extensi videbantur, à quibusdam aliis partibus contracti adeo ut bili commearum denegare coacti fuerint: Cystin enim illi excipiendæ dietam omnino opplebat materia conereta, xxv. aut xxx. lapides tetragonos constituens, pentagonos, laeves, lucidos, ac tandem pene omnis figura & colore referentes globulos gagatinos, quales assuntur cogis lugubribus: *D. Davy Zodiaci med. Gall. pag. 119.*

## OBSERVATIO IX.

*Partus impeditus propter caput infantis inter ossa pubis & ipsum uteri orificium profundius impactum.*

**M**ulier quadragenaria à novem mensibus viro nupierat, atque jam septimo mense grvida erat, eum post elevatum magna eum contentione onus, flexumque violentius corpus, subito abdominis doloribus atrocibus prehenditur, quibus per totam noctem cum continuis dejectionibus, vomitibus, cubandi impotentia, suffocationis metu, pulsu celerrimo & parvo, cum iis laboribus qui parturientibus sunt familiares, torra, obstetricem advocat quæ uteri orificium ita clausum ut nequidem minimi digiti extremum apicem admitteret, tepetit; nosque præterea qui ægræ ventrem tumidum & non minus quàm tympani bellici membranam tensum observavimus. Pro reprimendâ inflammatione venæ sectionem imperavimus & in perpetuis leiporhymis cardiaca multa temperata propinavimus, nec interea applicationes exteriores clysteriorumque appropriatorum injectiones omisimus: Verum frustra omnia, siquidem diei morbi præhensionem mox subsequenti horâ primâ pomeridianâ, inter ejulatus è vivis excessit. Die proximè subsequente Maji 19. Ann. 1698. horis matutinis abdomen aperuimus, quod ultra quam concipi potest tumidum se nobis manifestavit, at emissio multo flatu fetido postquam perforatum fuisset brevi confedit ac flaccidum evasit. In interioribus primo adpectu serum sanguinolentum ad libram unam in ventris eavum effusum se nobis præbuit; sed omnia viscera inculpata, imò intestina ipsa à ventriculo ad podicem usque extus & intrus, præterquam quòd Ileum lambricos multos excremento bilioso innatantes contineret, varicosumque quid in ejusdem intestini extremitatibus, totoque propè colo ac cæco tumefacto, conspiceretur, probè constituta reperiebamus: Uterus ad debitam extensionem pro septimestri complectendo devenerat, eratque circa fundum dimidium digitum, ac circa collum integrum pollicem erassus. Fetus è membranis suis evolutus, aquas in uteri eavum effuderat, hujusque sinistro laceri per placentæ, radices adhuc dum firmiter adligabatur: & interea capite ad inferiora adactò, totum illud eum collo ad humeros usque sub pubis ossibus occultabat, ac tanto induxerat conatu, ut id hinc evellere & extrahere, sine ipsius colli laceratione, vix omnino nobis concessum fuerit. Inductio autem illa, non ad uteri cervicem, sed ad ejusdem anteriora ita declinabat, ut sacrum ibidem sibi aptaret, herniamque quasi efformaret, unde quomagus per aliud impactum eaput pars hac dilatabatur, eò etiam fibras omnes collum uteri circumcingentes ad se trahens: ipsius orificium arctius porro claudebatur, sicque quòd majora ac vehementiora parturientium molimina nostra hæc experiebatur, eo minus expansio orificii partui necessaria, expectanda veniebat. Sed quid demum mortem tantopere acceleravit, ut citatissimo passu adveniret? Illud sanè non alii imputandum credimus causæ quam vi illi quasi laceranti factæ ab embrionis eapite uteri parti anteriori, collo ipsius quam proxima; sic enim non tantum dolor intensus & convulsivus in parte verè sensili excitabatur, qui totam viciniam per nervos mesentericos eorundemque plexus in consensum trahens, turbas enormes ac fatales in imo excitabat ventre illosque ciebat motus qui excrementorum per inferiora & superiora rectorum causa forent propinqua: Sed præterea per sic intrusum caput vasa inguinalia non parum comprimabantur, ac sanguinis ad inferiora circulus præpediebatur, unde ille majori impetu in vasa mesenterica, aliaque, viscera imi ventris ac ipsa intestina in specie allentia, irrumpens, totus facile reduci nequibat, ac effusioni seroso-sanguinolenta, de qua in cadaveris apertione verba fecimus, ansam dedit, & in occidendâ nostrâ symbolam suam, quamvis priori minùs perniciosam, aliquatenus contulit.

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

S I V E

## DE ABDITIS MORBORUM CAUSIS

Per Anatomen Cadaverum revelatis.

## LIBER QVARTVS ET VLTIMVS.

*De Febris, Affectibus Externis Artuum &c.*

## SECTIO I.

## DE FEBRIBVS.

## OBSERVATIO I.

*Febris excitata à sanguine vasa meningum replente & distendente, cum earum tumore phlegmonode.*

1. A tenui meninge leuiter inflammata; Sinu tertio sanguine referto, Superficie ventriculorum cerebri exulcerata. 2. A venis cerebri sanguine distentis. 3. Ab inflammatione meningum, post vulnus capitis, sero & pure inter utramque coactis. 5. A phlegmone intra calvariam excitata. 6. Ab abscessu sub calvaria. 7. Ob cerebrum cancro affectum. 8. Ob puri supra membranas. 9. Ob dura meningis phlegmonem. 10. Ob nlcus in cerebro. 11. Ob abscessum in cerebro. 12.

§. I. **U** V E N I S eum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore conquiescit, tandem Febris aucta, vigilis &c. Calvaria mortui ablata, vasa meningas obducentia sanguine distenta erant: Ipsæ membranæ tumore phlegmone per totum affectæ apparebant. *Vide libro primo, sectio. 1. Observat. 8. & 14.*

**F**ebri aucta } Febris describi potest in hunc modum, quod sit motus inordinatus sanguinis, ejusque nimia effervescencia, cum calore & siti, aliisque præterea symptomata quibus æconomia naturalis varie perturbatur. Pendet autem à præternaturali seu effervescencia nimia sanguinis; Fermentationem nimiam seu præternaturalem dico, quando sanguis, (instar ollæ super ignem ebullientis) ultra modum effervescit, & turgescencia spumosa tatefactus vasa distendit: Pulsus celeritorem excitat, & velut liquor sulphureus incendio concepto calorem adurentem quaquaversus diffundit: Hujusmodi motus, seu fermentatio sanguinis optime illustratur exemplo vinorum effervescentium: Et enim vina, præter lenetam & æquabilem fermentationem, qua primo depurantur, quibusdam temporibus adeo insigniter ebulliunt ut vasis ora excedant, & si strictim occcludantur, in partes distillare faciant: Ad hunc modum velut organismo percussa, ni statim à tartaro, seu fece sua in vas aliud deplentur, effervescere non cessant, donec spiritu plurimum exsoluta, atque sulphate vel sale nimium exaltatis, aut rancida fiant, vel in acernum degenerant: Tali effervescencia ob duas potissimum causas solet excitari, 1<sup>a</sup>. quando aliquid extraneum & non miscibile dolo infunditur (ita guttæ quedam sevi, aut pinguedinis dolo infillatæ hunc motum producant): Vel 2<sup>a</sup>. quando vina fræce, seu Tartaro nimis opulento ditata, (propter partes sulphureas supra modum exaltatas) sponte fervores concipiunt & immaniter ebulliunt:

Et enim in quacunque substantia sulphur luxuriat, ejusque particule à mixtione solutæ invicem consociantur, & una coarctentur, ibidem tales effervescencie immodicæ conciliantur. Consimili (licet non eodem prioris) modo quo vina effervescunt, ebullitio sanguinis inducitur, nimirum vel quid extraneum & nimine congeneri cruori commiscetur, quod cum non assimilatur, perturbationem & effervescenciam inferre solet donec heterogeneum illud aut subigatur aut focias eliminetur, & particule sanguinis confusæ & perturbatæ denuo extricuntur, ac priorem in mixtione repetant positionem & situm: Vel 2<sup>o</sup>. sanguis præter modum effervescit, quia principium quoddam, seu elementum ejus constitutivum (scilicet spiritus aut sulphur) ultra temperiem naturalem evehitur, atque effertatum evadit: quo nimirum hujus aut illius particule non congeneres cæteris, à mixtione solvantur: solutæ plus debito impetum faciunt, sanguinis liquorem exagitant & effervescenciam pariunt, quæ minime sedatur, donec sanguis velut inflammatus, diuturno febris incendio deflagaverit: Utroque modo sive cruori, ob rei non miscibilis confusionem, seu ob spiritus, seu etiam sulphuris evecti effertationem, in vas effervescit, quoniam hinc compages ejus plus laxatur, ideo magis in corde accenditur & particulæ actius prius solutæ à fermento illic confecto plurimum exaltant, & à mixtione exsiliunt, & motu suo calorem inenitum ac velut igneum quaquaversus dispergunt: Sub hoc tamen discrimine, quod effervescencia quæ



ab extranei cum sanguine confusione dependet, sit plerumque brevior aut interpolata, quæ cum heterogeneum quoddam fecerint aut subigitur, sponte sedantur: partemque sanguinis conqualitate, & extra ordinem positæ facile ad finem & crasin naturalem redeunt. Quæ vero à spiritibus aut sulphuris effluviis inordinata ebullitione exoritur, sit continua: minimum hoc tota citius massa ita laxatur, & stricto mixtionis vinculo exsolvitur, ut tanquam liquor oleosus incendio correptus, effervescere seu inflammari non destinat, donec spiritibus, aut sulphuris seu materie combustibilis particule maxima ex parte deflagaverint: Restat adhuc tertius præternaturalis effervescencie mo-

dos, in quo sanguis alterationem subit, quæ minime vino, sapissime autem lacti contingit, minimum autem quando à causa morifica ejus liquoris coagulatio inducitur, ita ut substantia illius fundatur, ac in partes secedat, fiatque crassi & terrestri à tenui secretio: Cujus ratione citius minus idoneæ in vasis circulatione, quin portiones ejus gelatæ in extremis defigunt, aut in corde stagnare aptæ, motum æquilibrium interm-piunt, aut graviter impediunt, cujus restaurandæ gratia effervescendæ solito majores in sanguine concitantur, quales nimirum in phlegmide, peste, variolis & morbis venenatis passim occurrunt. *Widus de Febris cap. 2. a. 1. 1. 1.*

§. 2. Barthol. Feer (de quo lib. 1. tit. de affectibus Soporosis.) Circa principium Novembris 1656. capite doluit: circa xi. febricitare mediocriter videbatur, die xix. lethargicus obijt. Aperto medio ventre, nihil in corde p. n. animadversum quod manifeste febrilem fomitem sanguini inesse proderet: Intra cranium, per duram meningem, tenuis quasi inflammata apparuit: verum illa discissa, vasa tenuis meningis, ad finem tertium tendentia, triplo ampliora, citra inflammationem, ipsæque sinus tertius sanguine plenissimus apparuerunt, quod evenit à sanguinis circulatione impedita, vel prorsus intercepta: Superficies utriusque ventriculi aspera & inæqualis ac flaccida, humore purulento viscido imbuta, à quo inquinamenta putrescentia, massæ sanguineæ intra cerebrum admixta, febris lentæ causa evaserunt.

§. 3. Filius Dom. Perwart Regii in camera computorum Auditoris, cum bimestri Tertiana laborasset, nec ad medicamentum adduci potuisset, cum cœlum incanduisset paulum, datur medicamentum cui indormiendum imprudens Pharmacopæus censuit, medicamentum inane fuit, movit, nihil exclusit: Ab eo tempore vix febris expers: De Dolore capitis, de quo prius non conquerebatur, queritur: dum paroxysmus repetit, repente æquus fit, elatis in cerebrum vaporibus, imo & febre ipsa jam cerebrum occupante (unde calor accerrimi sensus apparebat) ac si febris esset Capitalis, ut sic loquar: per xxiv. horas æquus fuit & hætorus cum prehenderat: virtus erat debilis, nil natura præstitit quamvis irritata, Convulsus interijt.

In cerebro nihil deprehensum, venæ intumuerant parum: vi febris interijt, obsessio cerebro quoque, ut in interea non esset labellario cordis ob respirationem non liberam. *Jac. Thevat Annot. 3. in conf. 58. Ballonii lib. 1.*

**C**onvulsus interijt De causis convulsionis febribus supervenientis, aliisque morbis chronicis, vide Scholia ad observationem 3. sect. 13. l. 1.

*Feb. e cerebro occupante* Anno novissimo 1678. cujus ætas squallida & calida, febres vagæ sunt quæ cerebro omnes bellum indixerunt, symptomata enim aderant aut cataphorica, aut paraphorica, aut cephalalgia, ex pathognomonica: Inter cetera, quæ in quibusdam observavi tæcedinem & *εὐνομήν* π, etsi fauces vitæ nilil proderent, cum deglutendi difficultate: quorum symptomatum causa, me iudice, non alia fuit quam summa plenitudo & turgor vasorum collis, tum majorum tum capillarum, carotidum scil. arteriarum & jugularium venarum, hinc compressio & angustia ac depravatio functionis partium voci & sermoni destinatarum: *Δύσπνοια* & *ἰσχυρὸς*, nam superveniente hæmorrhagia nasum, cum inflata altera & jugularibus, protinus illa accidentia remittebant: Inde audacior factus quotquot curæ meæ demandatos habui omnes ad nnum apertæ venæ jugularis salvos & incolumes reddidi: Ex illorum serie prior exeat Nobilis puella, Filia Excell. & Nobiliss. *Michaelis Tremulæ*, Consulis Genevensis, annos xiv. nata, cui cephalæa ab anno indefinens molesta erat: febre veto (mense Julio) accedente duplici tertiana, paroxysmorum tempore adeo intendebatur dolor, ut sui impotens quid ageret nesciret, perspecta ejus temperie bilioso-sanguinea, quod jam ab anno decimo tertio cæramenia prodidit: nec ad iteratas sanguinis missiones tum è pede tum brachio dolor quicquam concederet, hæmorrhagiæ præterea nasum esset obnoxia, Nobil. Parenti significavi, si penes me potestas esset jugularium alteram resecturam, quo è pro-

ximo fonte sanguis eliceretur: Consensit ille protinus, ad vocatorem perito venifica, scalpellus venæ, ad minimi digiti crassiciem profunde adigitur, hinc rivulose & altatim emulsi sanguis, cujus maxime pars meta purillago erat, ad purulentiam accedens: Ea ipsa die solarium nullum sequutum est, adeo ut auxilium irritum visum fuerit: at postridie tanta fuit levatio, ut se doloris prorsus immunem assereret Nobil. puella, menti restitutus sit nitor, & sanus, qui prius nullus, accesserat, quanquam febris ad illa quot dies cursum suum tennere: Eodem tempore sub cura mea habui juvenem Pharmacopæum ministrum, parcia Lausannensem, apud Dom. Revilliod, Comate vigili, Lethargicæ febris specie imponente, affectum, statim enim vocatus sed delirans, excitatus, Qui & ejusdem venæ sectione cito convalescebat, & à symptomatibus cephalicis liberatus: Hinc accenso Pistorum phlegmide occupatum, ejusdem sectionis ope testium: Et Uxorem Tinctori Serici, vocat *Ladet*, mulierem robustam, proceram, crassam, viraginem, quippe quæ vitilia officia in officina sterneret obijt: Hac mense Septembri ultimo, febre comasosa affecta, cum insigni capitis gravitate, aperta quoque jugulari liberationem accepit: Prodeat adhuc Nobiliss. pnet. xi. annos natus, cui nomen *Oswald* natione Borussia, Nepos Nob. Domini *Neubauer*, Equitum Magistrus, qui una cum febre cephalalgia gravissima afflictus, quanquam morosus & remedia omnia respuens, à demissa illa apertione: affectus specie lethalis periculum evasit: Eandem sectionem destinaveram Theologi candidato, Pedemontano, cui cum febre (saucedo insignis & deglutitionis impedimentum aderat, sed indicta & sanguinis missionem

hæc, hæmorrhagia larga incidit, quæ rancens, feb-  
bris & deglutitionis libertatem attulit: Ab hoc præ-  
sidio prætermisso, viri duo Clar. consuetis ætatis,  
plethorici, eadem tempestate, ut verisimile est, inte-

riere, quibus ab obitu largus cruor & adustus & nari-  
bus emanavit: De hujus venæ sectionis efficacia A-  
dum lib. 1. sect. 1. observ. 1. in scholiis, & sect. 23. Ob-  
servat. 1.

§. 4. Audimus D. Cardinalis Lotareni, qui *febre velot capitali* interit, aperto capite re-  
pertas venas omnes adusto plenas sanguine, & meninges veluti tactas de oculo & sideratas.  
*Ballonius Epidem. & Ephemer. lib. 2. pag. 129.*

Quibus in capite focus est, ut jam doctrinæ gra-  
tia Febris capitalis dicatur, oculi rubent, dolor  
que passibilis percipitur: est velot *inflammatio* venarum  
capitis, ut prælo quidem verbo, sed non inepto  
explicat *Hippoc.* Intro lib. 2. de morbis, Annon at-  
teritionis confert? *Ibidem.* Anno 1575. capitis do-  
lores vigere tantum tamque longi in Medicorum ope-  
ra eluderent, &c. Unde cum tunc febre ægri videren-  
tur, tamen erat nescio quæ oris siccat, oculorum  
rubedo, pulsus in temporibus manifestus: Ac valde  
notandum quod *Gal.* scribit, comm. in aph. 3. lib. 7.  
*Ruber oculorum color sequi possit ab ventriculi inflammatio-  
ne, maxime vero ex his ab inflammatione in cerebro  
inflammationi similem:* atque tunc dolor est quidam  
per se verus, & habet aliquod puerorum *rubor* *enig-  
mæ* referens: Est porro quædam inflammatio pati-  
um cerebri & membranarum, adeo ut oculorum &  
sinaples consequatur cavitas quedam, cum *epi-*  
*significet* fustam & cavitatem in qua semina aservan-  
tur: *Longius enigmæ* vult scribi, ut dicatur *sed tunc  
enigmæ* 1. e. inflammari & exsiccari, quod pallor,  
cavitas & ariditas corporis consequatur, cum informis  
& vigilia & vocatur alio modo, Febrilis capitis  
infantium dolor (propterea enim ad pueros refertur,  
quoniam cur non idem in viris?) Ac propterea *enig-  
mæ* dici poterit: Quid valde notandum est,  
nam si exquisita esset inflammatio, Phrenitis foret;  
Sed varietas humorum, si quidem humor est quidam  
pituitosus cum bilioso, efficit ut non sit phrenitis, sed  
quipiam analogon nec magna febris insequatur: 1.  
*idem ibid. pag. 114.*

*Febre velot capitali*) Dicimus paulum discedentes  
à doctrina *Galeni* febrem aliquam esse *cephalicam*,  
aliam, *Linsensem*, *Pentriensem* aliam, *Hepaticam*; aut  
cum paribus ipsis iusta obstruio, aut impactus  
modicus humor, aut corruptio contracta est: Ut si  
erroris convincendi sine qui & febrium continuarum,  
& incrementum & hæticarum, & materialium  
sedem perpetuè in ventre inferiore constituent: Con-  
tra enim sentiendum, imò, quod notandum est febrium  
ardentium focum *Hippoc.* in capite, videtur consti-  
tere, & *Galenus* Pulmonis venas: *Sic ut lenis febre  
aridum finitus cum caligine, proveniatque in naribus  
grævis, nante ex melanobolia aberrant, par. 73. sect. 2.  
1. lib. 1. Epid.* *Galenus* hunc locum explicat de febre  
ardente cujus focus est in cerebro, propter collectum  
in eo bilem quæ inflammationem excitat: Eaque feb-  
ris distinguitur ab altera, quæ sit non conservata in  
cerebro, materia, sed in venis inferioribus reside, à qua  
statuosa exspiratio suscitatur delirium excitans: nam

cujus febris ardentis materia in cerebro manserit  
habet, ea contrariam habet desipientiam, & sympto-  
mata non ita sunt fugacia: atque materia dum ibi ef-  
fervescit, stantulem namque acquirat, cujus signa in  
varius corporis partibus appareat, prout illa in varis  
cerebri partes interpretis, parque hoc vel illud nervo-  
sum obsterit: At quæ ardens febris materiam habet  
in aliis partibus, non habet desipientiam assiduum:  
prior febris phrenitidis simillima est, ob symptomatum  
cognitionem: sic in phrenitide symptomata ea est  
febris quæ adest: præterea ardens feb. primario ce-  
rebrali affectu contracta, fere statim appareat, phrenitis  
non tam cito, si tempore acquiritur: imò ne in decli-  
natione quidem feb. deliria quiescunt, quod aliter  
contingit in his febribus quarum deliria sunt sympto-  
mata tantum, prout enim manifeste febris ira & de-  
liria: Nisi quis forte objiciat duo adversum ea quæ  
dicuntur, 1. quod nota hæc phrenitidis, & febris ar-  
dentis primario cerebrum impetentis male assignetur,  
nimium phrenitis non subito nasci, contra febrem  
ardentem cephalicam statim adori: contra *Hippoc.*  
in *Epidem.* animadvertit quodam phreniticum pri-  
mo die factum, Sed hoc ex his est quæ raro eveniunt;  
quoniam, ut *Gal.* in com. non ita fuit subita causæ  
generatio ut morbi ipsius: Si quidem primus *Hippoc.*  
scripsit, Non de repente morbi hominibus accidunt,  
sed paulatim collecti consensim apparent. 2. Quod in  
declinatione feb. cum phrenitide conjunctæ deliria  
non quiescant, quod alienum videntur, nam si febris  
symptoma est phrenitidis (quæ est inflammatio in ce-  
rebro & ejus meningibus impacta, ut *Gal.* in *Epid.* ex-  
plicat) & morbo fere sele consequuntur, non potest ea  
febris declinare quin & morbus ipse deserviat: Sed id  
dictum per comparationem, nam quæ deliria sunt feb-  
rium ardentium symptomata, ideoque excitata quod  
venulas in cerebro membranisque suas humores  
tantum præterfluant, non autem impingantur, ut an-  
notavit doct. *Gal.* non necesse est in earum declina-  
tione parapsychosynem illam quiescere. Sed quæ delira-  
tiones in phrenitide sunt, ejus naturæ necessario  
consequentes, & tanquam de essentia existentes, tamen  
si febris symptomata declinet, non quiescunt tamen,  
non quod non remittantur, sed non tanta tranquillitas  
adest quanta in febribus essentialibus, quarum deliria  
symptomata sunt tantum: Quomodo enim iraque  
caput febris cujusdam focus esse potest, ita & partes  
relinquit, ut magni interit scire cujusmodi sit febris, ut  
illius sedes animo lustratur, tandemque parti quæ in  
virio est legitima cura adhibetur. *Idem 1. de virgi-  
nibus & mul. morbis e. 7. p. 10. Vide 1. 2. p. 5.*

§. 5. Miles in tempore dextro vulneratus fuit: septimo die febre incipit, paulo post eum  
apoplecticus mortuus est.

Illi dura meninx inflammata & stupendæ crassitie fuerat; trans illam multum ichoris  
cruenti cum portione puris stagnavit: Tenuis meninx idem inflammata & pure conspersa  
inventa fuit, ac sub illa ichor fluctuabat: Ex *Ephemeridibus Excell. Dom. Johannis Burgoweri  
Pellieri quondam Schapphusiani, in Dissertat. de Apopl. 1. I. Wesseri histor. v. Vide histor. Tit. de Vul-  
nerib. capitis.*

**V**ix vulnus insignius est, maxime si partes nervosas attigerit, cui non protinus febricula jungatur, quæ quando pus generatur, augere: Unde prædentes Chirurghi, nisi largissime sanguinem vulnerati profunderint, tempestive plethoricis venam secant, vitium tenuem & refrigerantem imperant, vitium denegant aliaque, quæ ad febrem ejusque fomitem submovendum pertinent, instituunt: In omnibus enim vulneribus in primis partium nervosarum, labia vicinæque partes intumescent aliquantulum & aliquomodo inflammantur; nam sanguinis, succi nervosi, & lymphæ motus perturbatur & impeditur; canaliculis per quos meant remeantque succis, contusis, compressis acque confusis ab extravasato liquore: flagrant incendium concipiunt, quod incrementa sumit, quando in pus marantur eorumque particule incense sanguini reduci magis admixta calorem p.n. in tota massa sanguinea accendunt, nunc majorem nunc minorem, prout scilicet inflammatio circa vulnus le-

vior aut gravior fuerit, quem merito Febrim nunciamus, non secus ac continuas, quæ plerumque ab insigni & profunda inflammatione partis principis pendunt & foventur: Febricula hæc plerumque periculo caret, nec molestiam aliquam parit, quæ alijus momenti esset si ægi recte tractentur & sanguinis circulario reliquorumque humorum motus reparetur: si vero error committatur, raro impune illam ferunt: Apud militem istum indolens inflammatio reliquæ partium vulneratarum apparuerunt in cavere, sc. dura meninx stupende crassitie & tenuis meningis manifeste inflammata, à quibus febris excitata fuit; fovebatur autem ab ichore subcortico copioso cum pice intra spatium utriusque meningis, & sub tenui quoque fluctuante: postea à venæ sectione & aëris frigidi admissione, particule putridæ profundius adactis & repereussis augebatur: A vini ingurgitatione, Venæ & exandescencia prorsus effusa reddita ægrum ad incitum redegit. *Idem ibidem.*

§. 6. Mulier leviter in capite percutitur, Tertiò die Febris ingens sequitur cum rubore faciei: 5. die mors. Ingens phlegmone intra calvariam inventa; dura meningis tumens, dura, livida, copia puris suffusa. *Vide tit. de Vulneribus.*

§. 7. Miles in occipite vulneratur & moritur: Aderat rima & depressio solius cranii laminæ internæ, quæ cerebrum continuo compressit: hinc ortus abscessus sub calvaria, qui intro duxit Febrim & phrenitidem. *Vide ibidem.*

§. 8. Puer vulnere in osse frontis accepto in febrim incidit, xl. post die: Alienatum & cancro affectum cerebrum in occipite inventum est. *Vide ibid.*

§. 9. Quidam percussus in capite cum maxima contusione: post quinque menses Febris oboritur cum rigore: Copia puris inventa fuit supra membrana, & intra cerebri substantiam. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 10. Studiosus vulneratur in occipite: Die nono Febris oboritur, 40. die mors: Dura mater circa tertium suum sinum, ubi torcular ascendit, prorsus livida erat. *Vide ibidem.*

§. 11. Puer glaciem transmittens in caput recidit, unde paulo post Febris: Ulcus cerebri omni magnitudine deprehensum est, quod dissecto aqua fetida promanavit. *Vide tit. de Vulneribus.*

§. 12. Rusticus aliquot vulnera in capite accepit, nono die Febris sequitur, xvj. mors. Sanies inventa est purulenta in ipsa cerebri substantia: abscessus in dextra occipitis parte, &c. *Vide tit. de vulnerib. l. 4.*

## OBSERVATIO II.

*Febris ab Abscessu in Corde desinente in ulcus. 1. A concretione pituitosa in ventriculo. 2. A polypis in sinibus cordis, &c. 3. Mucosa pituitosa in corde, &c. 4.*

**F**ilia D. N. 14. annos nata correpta est febre cum cardialgia per intervalla recurrentes: Pulsus fere semper erat intermittens, cum dolore in summa scapula sinistra, Decubitus in sinistram latus molestus, Tussis sicca, Dyspnoea, &c. Cor mortuæ albicans visum est, media sui parte fere exesum atque ulceratum: In capsula cordis nullus humor repertus, &c. *Vide tit. de Hæmoptysi.*

§. 1. In corde Comitidis reperta est concretio quædam humoris pituitosi, flavescientis. Febris laboraverat. *Lib. 2. tit. de Pulsu p. n.*

§. 3. Emin. Cardinalis de dolore in Thorace conquestus (*vide lib. 2. tit. de Pectoris dolore*) febrim quoqueprehenditur, 14. ab invasionis die cum è medio tollens. In thorace, sub integumentis communibus, abscessus erat. Pulmonum substantia pure referta, In dextro ventriculo cordis Polypi duo. Semiputris erat Lien.

§. 4. Adolescenti erus dextrum vehementer doluit cum acuta febre. Abscessus ad fuit cum pure albo in apice gibbæ Hepatis partis, Dissectione cruris facta, in mediis musciculis pus album inventum: In corde sanguis veluti mucosa piruita; Alius abscessus purulentus sub ala dextra, *Vide tit. de Doloribus Externis.*

## OBSERVATIO III.

*Febris Pulmonum inflammationis comes. 1. A Pulmone dextro inflammato & tabescente. 2. Semiputris ab inflammatione. 3. Pulmonibus retorridis & purulentis, cum hydropse thoracis dextri &c.*

*Ab Empyemate universali pulmonum. 5. A Pulmonum parte fere tabida, pure in thorace. 6. Ob lapides plures lateribus asperæ arteriæ incumbentes. 7. Ob Pulmonis substantiam pure refertam, & Serum Mediastinum repleam. 8. Ob Pulmones purulentos, corruptos, Intestinorum phlegmonem, & aliarum partium vitium. 9. Ab Apostemate & hydropo Pulmonum. 10. Ab omnibus Pulmonum vasis sanguinis plenit. 11. A pulmonis dextri purulentia. 12.*

**I**llustr. Baronissa de Condree, ætatis ann. 65. sterilijs, post casum ex rhoda in partem capitis levam; defluxum percussit in maxillam dururnam & dolorificam, unde Febris, sudores nocturni, melancholica phantasmatia; Vario successu dimicatum est, tandem Febris invaluit, & mortalitatem exiit.

In aperto cadavere Pulmo repertus est inflammatus & lividus, cum maculis nigris: Venâ triculis amplius, cor flaccidum, hepâ extremo lobo leni adhærens, Uterus immensè tumens & plane scirrhosus, Prostratæ ovi magnitudinis refertæ pure: Cystis fellea referta lapillis & scirrhosa. *Ex schedis Clar. Dom. D. Alexandri Deodati Medici Gener. & Decani.*

§. 2. Uxori N. à partu subfiterunt lochia, hinc febris, dolor lateris sinistri: circa vesperam illa recrudescbat, mane remittebatur. Pars sinistra pulmonis fere magna sui parte tabuetat & tabo infecta erat, sana reliqua substantia. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 3. Joh. le Mire febre ingenti prehensus est cum dolore pungente ac fixo ad nothas costas, &c. Scimputris erat Pulmo ab inflammatione mediæ ejus partis. *Vide lib. 2. tit. de Lateris dolore.*

**S**Empyematis ab inflammatione? Sanguis & quivis humor alius, in parte animalis aliqua copiosior, & supra vires collectus & infarctus, quia bifariam non diffusus, nec à primis natura vincitur, putrescit: Unde tanta tumorum p. n. & utriusque generis abcessuum colluvies, quibus Febres superveniunt, nunc acutæ, nunc leviæ, nunc statim ab initio, nunc solum, aut magis dum pus conficitur: Phlegmonis namque internis, ut phrenitidi, cyanche, peripneumonia, pleuritidi, & quæ diaphragma, ventriculum, hepâ, lienem, intestina, renes, vesicam, uterum exercent febris acuta, ( præsertim cum sunt magnæ ) una

cum ipsis invaditum vero parvæ sunt, aut externæ mitior & simplicior, & diariæ affixis, post apparet, præsertim dum pus generatur: Quin & partium quarundam, tum internarum tum externarum potredo quædam paulatim lenta morte ipsas partes corrumpit. Id quod externæ ante mortem, internæ post mortem; secundo corpore, palam ostendunt, cum antea nemo horum quicquam corruptum vel suspicaretur: Ob id quod harum partium alterationes, & solutiones continui, dum paulatim fiunt, raro sentiantur ab ægris, etiam in parte sint sentiente. *Jac. Sylvius comment. de Febris p. m. 108.*

§. 4. Uxori N. spirandi difficultas accidi; accessit febris, etiam levis admodum. Illi thoracis dextri spatium aquæ magnæ vi erat distentum: Pulmones retorridi & multo purulento tabo prægnantes. *Vide tit. de Dyspnoea lib. 2.*

§. 6. Uxor D. N. nata patre pulmonico, concepit, peperit, à partu subsistunt lochia, Febris, dolor lateris sinistri: Pars sinistra pulmonis magna parte tabuerat: purulenta materia ea thoracis parte continebatur. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 7. Quidam laborabat magna dyspnoea, tandem Febre superveniente obiit. Lapides varij asperæ arteriæ incumbentes immediate eam comprimebant. *Lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§. 8. Vidua D. N. subito asthma præhenditur: die 4. accedit Febris cum tussi & sputo sanguineo &c. Inventum est mediastinum; lenum fero sanguineo: Pulmonis universa substantia materia purulenta erat referta, &c. *Vide lib. 2. Tit. de Pectoris dolore.*

§. 9. Duo sunt quæ inter accidentia symptomataque in febres, quæ hac tempestate grassantur, incidentia numerantur, quibus plurimum ægri torquebantur, Singultus ac Tussis: Nec ita quidem molesta esse ceperunt, vel quod totum febris tempus occuparent, vel quod brevissimo tempore divexarent: Vidimus enim ineunte statim accessione ita suffocationis periculum oboriri & tussis molestias, ac si nulla vitæ spes relinqueretur, deficiente accessione placide ac sedate habebant: Singultus autem in nonnullis ita molestus fuit, qui febre nocturna, mox diuturna, cum destillatione in pulmones laborarent, ut omnia præter Singultum moleste ferrent: In his fuit Dominus de Bures, cui antequam cessaret singultus, totum corpus inrumuit: Detumesciente corpore repetiit singultus, afferens ei aliquid permolestius quam ante: nam & ulcusculum excitavit in partibus ad orificium ventriculi adjacentibus, nam cum quid deglutiebatur sur calidiusculum, aut manifesta qualitate præditum, percipiebatur in imo cesophagi dolor: Illi autem à Singultu, cum abdomen inflatum fuisset, alvus biliosa reddidit, post excretionem biliosorum sequuta sunt purulenta, quod mirum est, Nec credidimus hæc à pulmonibus emanasse, quamvis hos laborare suspicaremur: cum enim à partibus superis tale quid contingit, id simul & semel fieri solet: at hic æger sæpe eam excrevit materiam.

Hic æger Singultuens, tussiens, febrilis, ad tabem vergens, interit; Aperto cadavere inventus est hydrops ascites in abdomine: Inventi sunt pulmones purulenti, corrupti, Intestina livescabant,

bant, quasi desiderata superna parte : unde credibile tum singultus magnam occasionem illius natam, tum syncope qua prehenfus est: Lien plane putris: Denique nulla in toto corpore pars inventa est integritatem suam servans : Dejectiones purulentæ, nobis admirationi fuerunt, à putri mælaræ manabant; Dejectiones antequam diem suum obiret, præcesserunt nigre, pici liquidæ similes. *Ballonius consil. 25 lib. I.*

**S**ingultus, Tussis, Febriens ] Equid causæ fuit tum Singultus illius tum Tussis in accessionis tempora incidentis ? Ac Tussim quidem eo sævire tempore quo paroxysmus repeteret ex eo conjicimus, quod febris à catarrho maxime esset, Et quæ materia subtilis acrisque, quæ rigorem sensationis quæ frigoris afferre solet, quiescebat aliquo loci conclusa, dum ruptis veluti repagulis deservit decurrere in extrema corporis, feriendo superiores membranas, pulmones vel vestientes, vel illis proximas, tristis ille sensus Tussim afferrebat : Præterea in catarrhosis febribus, quid impedit moveri quoque materiam in pulmonibus & capite ipso, quæ dum cieitur, fuscitur, impelliturque, hoc molestiarum afferre solet ? accedebat & nocturni temporis occasio, quæ pientæ salis feroseque impulsionis & molestiæ sese præduntur enim universalium temporum aliqua est observatio in motu humorum, ita & particularium. Sic ascarides moveri æstumno scripsit Hipp. sic in vesperturno tempus earum ascaridum motus incidit ; quod & defluxionum incursionibus verum esse mulierculis compertum est. *De Tussi quædam hæc pertinentia Vide lib. 2.*

**Singultus** ] Singultus majorem difficultatem afferebat, nam xij. aut xvj. fere noctes affligebatur leviusculis remediis superatus, relabatur recurritque cum molestissimo ulcerationis sensu circa orificium ventriculi. Quæri potest an hic æger singultientem fe-

§. 10. Rarissimus affectus est quo obiit Sereniss. Venetorum Dux, *Franc. Contarinius* ; cujus ægrotudinis causa et Venetias vocatus fuit *Joh. Prevotius*, variisque nominibus cum aliis Medicis dissentientibus disceptavit: Die ipso Solstitij æstivi inciderat in acutissimos dolores colicos, quibus erat obnoxius, illique vix altero die liberatus ope remediorum præcalidorum, incidit in Febrem quæ typum duplicis tertianæ servabat, redibatque modo anticipando per aliquot dies, modo per totidem & plures postponendo proportionaliter : Vigilia & sitis molesta fuit usque ad septimam, quo tempore, occasione levis medicamenti oborta est diarrhoea biliosa, quæ ad 40. usque diem perseveravit: Urinæ ab xi. die semper apparere medioeris consistentiæ, ut plurimum tufæ, sopiosæ, modo cum sedimento albo & lævi, modo cum suspensio boni coloris, levi & satis eohærente, aderat quoque levis tussicula qua è faucibus videbatur aliquid pituitæ crassæ reddi, respiratio satis erat libera, difficilis tamen ad latera decubitus: ad oblata semper bene se habuit: Pulsus erant magni & fortiores quàm ætati convenirent. Ad 40. diem febris visa fuit remittere, neque ulla manifesta aderat exacerbatio: Alvi recrementa ceperunt consistentia fieri & fœces bene coloratas præ se ferre: pulsus perseverarunt robusti, retinebant aliquam non naturalem celeritatem, neque unquam recuperavit appetitum : Singulis autem 8. vel 10. diebus revertebatur manifeste febris, quæ duabus aut tribus accessionibus manifeste fiebat post levem alvi evacuationem, vel spontaneam, vel clystere aut levissimo pharmaco procuratam, perseverabat rursicula & difficilis decubitus : Sub æquinoctium indevit tussis & earatrus ipsi alias familiaris ; extera perseveravit in statu proposito usque ad Octobris initium, valde emaciatius: Eo tempore rediit febris bis, alternis scilicet diebus, sed cum spirandi difficultati & anxietate tam insigni in principio accessionis, ut vix duos illos insultus superaret, reddita autem copiosa bile per alvum beneficio clysteris, febris illa manifesto cessavit. Inde traduxit fere mensem integrum quiete, & si tussiculam exciperes, difficilem ad latera decubitus & inappotentiam, quæ nunquam cessarunt, videbatur Sereniss. ad convalescentiam pervenisse: dormiebat enim, comedebat sine nausea, aliquando surgebat è lecto, solus etiam absque innixu parum perambulabat, pulsem servans constantem & robustum, qualem ab initio morbi habuerat : Ecce autem circa Decembr. initium spirandi repentimam difficultatem, cum anxietate & febricula, casus obscura erat accessio alternis diebus, pulsum mira inæqualitate & parvitate: dum labore cogebatur pene rectus, neque poterat ad latera: Sentiebantur ingentia murmur ventris, & ob flatum copiam subinde cibi & potus deglutitio impediatur, spuebat difficulter crassa, cinerea, subflava, corruptum quid redolentia: urinæ erant crassæ cum sedimento co-

*pilo & crasso.* Die 6. Decembr. in principio accessionis, dictorum symptomatum vehementia obijt, cum ex pulsu ante explorato in sequentem diem vivere posse crederetur: Medici Veneti malum semper retulerunt in insignem jecoris tstum & siccitatem pulmonis, quem consumptum & arefactum credebant: ideo mellita, sacchara, aliæque aperientia, detergentia, & mediocriter catarrhum absumentia, necnon ventriculorum, & pulmones roborantia nunquam usurpare voluerunt.

Die 7. apertum fuit cadaver: Intestina omnia, crassa & tenuia, flatibus distenta erant; leucum tumidum & spongiosum instar plenum materia alba, quæ omnem partis rubedinem abstulerat, adeo ut parenchyma varie dissectum, ubique album appareret. Cor prægrande, nulla tamen materia intus aut extra contaminatum. Cavitas pectoris lib. 7. circiter aquosæ materiæ continebatur; dextra pulmonis pars flaccida videbatur, crasso & mucoso humore oppleta: sinistra prorsus resoluta erat in sanie albicantem, quæ tunica pulmonis ut in sacco continebatur. Ea dissecta effluvia in cavitatem thoracis sanies ad 3xvi. circiter: Plane nullum pulmonis vestigium sinistro latere, præter membranam, quæ costis adhærebat, indicium relictum erat. G. Hieronymus Velschius ex I. Prævotii observat.

§. 11. Vocatus fui ad Comitum L. Gonzache quartam diem, qui obiit sexta: Inveni omnia vasa pulmonis plena sanie simili lacti: Dissecui etiam puellam xij. annorum, Et cognovi illam ex simili defluxione obiisse; erat enim puellæ morbus jam diu in capite, ex suppressa purgatione per ulcera, nec adventantibus mensibus correpta Febri, &c. Vide lib. 1. Scd. de catarrho.

§. 12. Piscator in cerevisiaria taberna cum sociis potans, poculo lapideo in capite feritur: Solutio continui nulla, tumor cutis exiguus, quo litu oleorum à Chirurgo brevi discusso; Piscator ad scapham suam, & post ad compositionem rediens, non multo post Febre correptus fatis concessit: Qui perculserat ex dis male insimulatus, capitur, catecti mandatur, supra extincti sarcophagum ex more patriæ decollandus.

Venitur ad apertionem cadaveris. In capite cis & citra calvariam omnia sanissima, nec ullum læsionis vestigium: Aperto thorace Pulmonis lobum dextrum pure refertissimum, quantum erat, deprehendimus: In sinistro quindecim abscessus, unguem pollicis æquantés observamus, Cum ab illis abscessibus, quos à capitis contusione processisse, si quæ fuisset, impossibile erat, enecatam Piscatorem jurejurando affirmaremus; compotorem carnicis manibus eteptum libertati restitimus. H. ab Heers Observat. Spadan. cap. 2.

**O**B capitis vulnera in Jecore abscessus sæpe fieri, experientia compertum est, quos ibi localem habuisse generationem, à cerebro non ducto exordio quidam falso existimant. Id si in Jecore contingat, quidni & in pulmonibus vicinioribus capiti? Quamquam circa hujus læsionem in Piscatore (quod læsionis expers apparuit) Pulmones vitium contrahere

potuerunt. Possibile tamen fuit ut primigeniæ capitis affectionis vestigium nullum se exhibuerit, superflue ea quam per sympathiam conceperant Pulmones, quorum vitia, si substantiam attingerent, pene sunt indelebilia: Vide cit. de Vulneribus, exempla abscessuum in Jecore sequutorum capitis vulnera.

## OBSERVATIO IV.

*Febris ob affectum Oesophagum ad os ventriculi usque.* 1. Ob apostema in Ventriculo. 2. Ob ventriculorum inflammationem, hinc perforatum. 3. Ob ilei intestini inflammationem. 4. Ob abscessum Mesenterii. 5.

§. 1. **A**dolescens dysenteria cum febre correptus est: Aperti oesophagus interior, ad os ventriculi superius, & ad medium thoracem niger, corruptus, Pulmones alterati, &c. Vide lib. 2. tit. de Dysenteria.

§. 2. Uxor N. dolore ingenti circa ventriculi regionem cum Febre afficiebatur. Apostema in orificio ventriculi inferiori & duodeno inventum: In cavo ventriculi multum erat sanguinis; Cyctis fellis maxima & turgens. Vide lib. 3. tit. de ventriculi dolore.

§. 3. Uxor N. febricitabat, vomituriebat, &c. Deprehensus ventriculus ad fundum perforatus, à prægressa inflammatione. Lib. 3. tit. de ventris tumore.

§. 4. D. N. laborare cepit colico dolore vehementi: tertio die supervenit Febris: Intestinum ileon erat convolutum; Ea portio gangræna affecta cum portione mesenterii sibi adjuncta. Vide tit. de ventris dolore lib. 3.

§. 5. Virgo in dolores pro colicis habitos incidit, remediis insuperabiles: succedit febris quotidie cum rigore insigni repetens, & tandem marasmus. Mesenterium pure repertum & turgidum erat. Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.

**I**n dolores pro colicis habitos, &c. Sicut doloribus in his febribus succedit, ita vicissim febris intermittens in dolores hos transmutatur, momentè Ballonio ex Fernelio, paradigmata 81. In colicis aut doloribus

bus cavendum ne decipiamur; nam sæpe in fine febrium contingit à centro materiam regeri in abdomen, ibique dolores excitari colicis similes, cum in illis nulli aut exigui flatus contineantur. Sæpe aut

mor biliosus ferit & distendit, dolorémque excitat, scellus, à quibus dolores colicis non abfimiles est, qui colicum mentiat; interdum continentur ab-

## OBSERVATIO V.

*Febris ab Hepatis inflammatione. 1. Ab ejus vomica 2. Ab ejus tuberculis & abscessibus 3. A lapidibus in vesica fellea. 4. 5. A bile multa in cysti. 6. A Iecoris incendio. 7.*

§. 1. **R**Ever. N. insignis in hypochondrio utroque tumor cum febre vehementi, Hepar tumidum, induratum retorridumque, & pumicis instar hircinum repertum. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§. 2. Cuidam adestat Febris, dyspnoea, &c. Vomica in Hepate cum maxima puris coactione reperta. *Lib. 2. tit. de Lateris dolore.*

§. 3. Saepè lecur animadversum tuberculis & abscessibus instar furuncolorum obsideti, quorum non aliud signum fuit quam febris mediocris, cum siti, &c. *Fernelius path. lib. 6. cap. 4.*

§. 4. Inveni in vesica fellea famulae duos insignes lapides occeruleos: laborarat diu regio morbo, ac ultimo febre correpta occubuit. *Vide lib. 3. tit. de Ictero.*

§. 5. Nob. Ictericus tandem obiit ex febre. In vesica fellis inventus lapis durissimus. *Iidem ibidem.*

§. 6. Sectus à D. D. Sylvio Febricitans & ictericus, in quo folliculus fellis grandis, distensus bile. *Vide lib. 3. tit. de Ictero.*

§. 7. Filiola Dom. N. duos menses febricitaverat. In mortua inventum Hepar incanduisse prae calore, ut esset friabile. *Lib. 3. tit. de Diarrhea.*

## OBSERVATIO VI.

*Febris ob Renes lapidibus obsessos. 1. 2. 3. Ob eorum inflammationem, hinc consumptionem. 4. Ob inflammationem eorum figuram depravantem. 5. Ob sinistri corruptelam, cum scirrho Pancreatis. 6. Ob eorum corruptionem cum lapide in cysti. 7. Ob Vesica urinaria inflammationem. 8. Ob inflammationem ejus colli. 9.*

§. 1. **I**oh. N. ren sinister lapide angulos obtusos habente obstructus erat; febris conclusa plus in recessu quam in fonte habens.

Vidua N. ren sinister lapide obsessus erat exiguo: in magnam molem undique increverat. Febricitavit, tabida facta est. An verum illud à renibus febres marasmodos contingere *Vide lib. 3. tit. de Diabete.*

§. 2. Fili N. aperto cadavere, nephriticus deprehensus est, Febris perseverat. *Lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 3. Nicolæ nephritice Febris accessit cum lumborum dolore, &c. Ren sinister extrinsecus lividus ac humidus, intus aqua & calculis infarctus, &c. *Vide tit. de Lumborum dolore.*

§. 4. Magnus Vir nephriticus, rigoribus & Febre inordinata deprehensus est. Fuerunt inventi renes consumpti, ut portio, quæ reliqua fuit, frangeretur. *Vide lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 5. Cl. Ioh. Sperling diu nephritica supervenit Febris cum lumborum doloribus. Renes appa-  
parucè penitus inflammati, Tumor vero adeo increverat ut eorum figura externa mutata  
esset. *Vide tit. de Lumborum dolore.*

§. 6. Matrona (*Vide tit. de ventriculi dolore*) dolore ventriculi correpta est cum conatibus  
ad vomitum, succedente Febre insigni. Pancreas maximum erat & scirrhosum. Ren sinister  
colligatus omnino erat.

§. 7. Nob. dysuriz renumque doloribus obnoxius, sitiebat, Febricabat, &c. Ren sinister erat  
albus, semiputridus intus, materiam purulentam continens. In vesica fellis lapis durus, &c.  
*Vide lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 8. Quidam post equirationem urinae passus est suppressionem, cui mox Febris successit.  
Vesicæ parrem inferiorem gangræna invaserat. Pus copiose cum urina effluebat, à vesicæ in-  
flammatione. *Lib. 3. tit. de Ischuria.*

§. 9. Vir loria cum viscida materia reddens, cum Febre & Ischuria periit. Inventum est ulcus  
& inflammatio in collo vesicæ. *Vide lib. 3. tit. de urinis p. n.*

## OBSERVATIO VII.

*Febris à collo Matricis cancroso & ulcerato. 1. A secundinarum putredine. 2. A corruptione uteri  
fetus, secundina. 3.*

§. 1. **N**ob. Matrona suppressione mensium bimeltri spatio cum laborasset, tandem exor-  
tus est dolor & inflammatio partium genitalium: Ab adhibitis medicamentis  
acribus

acribus auctus est dolor, aucta & Febris. Aperto mortui corpore totam collum matricis plane cancrum & exulceratum repertum est. *Tit. de Hypogastrii dolore.*

§. 2. Mulieri post xv. annos à connubio parere contigit, laboravit multum à partu: Secundinæ subisterunt, avulæ frustillatim: Obstetrix assererebat superesse aliquid: Febris nata, hinc nigra lingua, Dentium intervalia scabritie nigricantia, facies *rupeas*, septimo die mortua.

Secunda, inventa caro oblonga adnata utero, & membranarum pars quæ computruerat. *Hollæus lib. Observat. peop.*

§. 3. Uxor N. scitum mortuum quinque menses retinuit, accessit interim Febris. Fœtus computruerat cum utero, involucris, &c. *Vide tit. de Partu difficili lib. 3.*

## OBSERVATIO VIII.

*Febris ab abscessu intra musculos abdominis & peritonæum, post conquassatum corpus à pertransiente rheda.*

**Q**uidam à rotis rhedæ circumrotatis super hypochondrio dextro fuit conquassatus, hinc Febris symptomatica, &c. Incisis musculis abdominis effluxit materia purulenta copiosa, ab apostemate intra abdominis musculos & peritonæum genito. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. dolore.*

## OBSERVATIO IX.

*Febris icterum lateri insitum sequuta, à contusione facta in subditis partibus.*

**I**uvenis (de quo tit. de Hypochondr. dolore) icterus in hypochondrii dextri lateris infima sede, unde Febris, &c. mors: Intestina subdita maculis lividis obsita. Septi transversæ sedes dextra, livida. Mesenterii vasa circa originem penitus cruenta & velut contusa.

## OBSERVATIO X.

*In mulieris apoplectica cum Febre morientis cadavere, vix uncia quatuor sanguinis residuum reperta sunt.*

**O**lim invisi Dominam Illustrem, quæ dudum colica & affectibus convulsivis miserrime afflicta & plane attrita, demum in apoplexiam cito lethalem incidit. Huic cum pulsus fortissime vibraret, sanguinem è vena jugulari ad 3iv. detrahendum præscripsi, qui mox à vase pertuso tanto cum impetu exiit, ut crederem illinc totam sanguinis massam, modo lineretur, effluxurum fuisse.

Nam post die cadavere aperto, sanguinis vix alias uncie quatuor in toto corpore residuas inveni, & tamen hæc Febricitans moriebat. *Willis.*

**F**ebricitans moriebat. Non minus usitatum est eum Lethargus affectio principalis fuerit, Febrem succedere, etque tam originem suam quam solutionem debere, quippe febris post veterum incipiens, eo discusso mox sponte cessat. Talem itaque non à sanguine, ob particularum intestinalium dissidia effervescente, sed propter corporum continentiam & vicinorum impulsus, cursum ejus varie alterantes ac inturbantes potius exoriri. Enimvero recta sanguinis temperies, non tantum à partialis ejus rite commixtis & subactis, sed insuper à motu cordis & vasis impresso, sive circulatione organica plurimum dependet: nempe ut liquor ejus pari & æquabili fluxus & refluxus modo ubique diffuset, qui scubi remoram, sive obicem offensus retardatur, in toto præterea alveo motus ejus impetuosus & cum tumultu febrili peragitur: Hoc manifestum liquet in passionibus violentis, doloribus acris, solutione continui, in quibus singulis crori uno loco obstructus, aut coarctatus, in aliis vero vehementius correptus, effervescentiam febrilem concipit: eum nempe ob finem ne circulationis filium, à quo vita necessario dependet, abruptum, quare, ut in proverbio

dicunt, *Nemo sine febre moritur.* Nam utcumque deficiat aut depauperetur sanguis, itque partium omnium morricum vires faciliant, tamen in ægione febris instantis, aut instare visæ, mero nature impulsu fibræ ubique nervæ sese erigunt, ac ultimos conatus exerunt ne sanguinem intestinum propellant & motu rapidissimo circumagant: Patet omnino ratio est febris lethargicæ, quæ tantum organis vitalibus à natura laborante plurimum incitatis, & propterea sanguinem vehementer circumpellentibus exoriri videtur. *Idem ibidem.*

*Ut crederem totam sanguinis massam, &c.* Nob. puer Bernas, Genevæ degens, annos natus 2, anno 1674. exterrere in vehementissimam convulsionem Epilepticam incidit, quæ cum omnibus remediis resisteret, quia timebat & roborat vultus, ex meo, & D. D. Crameri consilio missas è cephalicæ sanguis, qui tanto impetu profusibat, ut totam sanguinis massam, interea dum 15j. sanguinis alteri demeretur, exhaustis licuisset: paulo post admore Inio canthico actuali citra recidivam sanatus est: paroxysmus quatuor horas excessit.

## APPENDIX

*Febris brachii dextri particularis Quotidiana.*

**I**N insula nostra Marixburgensi Majori, quidam nomine Martin Genger, in dextro brachio certe admirandum Febris monstrabat ludibrium: Totum brachium dextrum circum



ca horam septimam matutinam primum frigore maximo corripiebatur, ad tactum etiam perceptibili, reliqua corporis parte naturali calore participant: Circa horam circiter octavam rigor & tremor quasi digitorum & manus conspiciebatur; tandem tribus horis elapsis calor præternaturalis ingens totum brachium quasi exandefactum reliquit: Durabat febris usque ad duodecimam, continuabat jam sexta septimana: Notabile hoc erat, Vomitus sæpius committabatur febrem, aliquando anteibat, Post remissionem febris, præcordiorum dolores & punctiones circa mammillam dextram sentiebat, qui tamen emplastro de santalò cedebant: Curata ista febris æque tali methodo & via sicut alii febricantes, auxiliante Deo, parvulo suo servo communicatis medicamentis; sunt restituti. *Andreas Cnosellius in Miscell. curiosis anni 1673. Obs. 205.*

## OBSERVATIO XI.

*Febris Hæctica Phlegmonarum internarum fere comes est.*

**V**idi inflammationi laxioris Intestini diutina succedere Marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, acrenum: Puerunt autem nonnulli qui affecti erant difficultate intestinorum, Et in summa dicatur, quoties præexsiccatum cordis ipsius corpus febrilem susceperit, solum difficilem. *Hæctor Gibalium comm. ad cap. xii. lib. I. de differ. febrium Gal.*

**F**ebri Hæctica est calor p.n. in substantia cordis, primum & per se inhærens & infusus: Solus calor elementaris supra modum audus febris Hæctice est essentia. Hæctice febris pathognomonicon signum constituit hæc tria, 1. quod sit Continens, 2. quod Exacerbat, 3. quod corpus vehementer Consumatur: Continens nascitur quod cordi continenter; aliquid molestum sit, ideo Cor continenter celeriter pulsam facit. Id autem vel est in materia sanguinea, vel in loco contrahente. In massam venit quod paulatim pravo vitæ genere sit contractum, vel quod reliquæ sunt aliquis ardoris febris nondum evictæ, quæ sensum reliquum corrumperunt, & cor molestant. *In loco extra vasa*, ut cum humor aliquis putrescit in parte ubi colligitur, ut crodium tuberculum in pulmones vel quando ipsa pars putrescit, ut pulmo, vesica, renes, mel intestinum, &c. sed hæc partes præcipue: *Exacerbatio* post cibum causa est, vel quia cibum malam largitur qualitatem (quod potissimum in fine Hæctice accidit, cum ventriculus incipit non bene coquere); vel quia cibum & porus particulas calidas existentes dissolvit, quæ dissolutæ magis sunt cordi molestæ: Partes autem hæc sunt humor acidos & sal. Si enim oleum vitrioli in manu continet & passum aquæ affusum, non poteris præ ardore continere, & videmus eos qui salso cattaribus labantur, si bibant, febrem lucetere, quia materia motu dissolvitur. Si non bibant, imminuit illam, quare & recte *Galenus* calorem vivam pro exemplo adduxit, in qua partes calidæ sunt sal. *Consumptio* denique causa est continens febris, unde humores inepti redduntur ad nutritionem, & ardor assiduus omnia intus depopulat. Huc etiam facit enatatio partium motum sanguinis ad se non admittentium. *Signa causarum*. Si humor in massa sanguinea corru-

ptus sit, fere æqualiter affligit, nisi quod post cibum exacerbetur, & urina exhibeat interdum sedimentum (quod sæpe in sanis nascitur, idem quod ventriculus male sese habet) Interdum vero non præcesserunt cause aut dictæ, æger se febricitare non putat, erit materia extravasata in causa sit, ac proinde cor continenter afficitur, tamen multæ contingunt exacerbationes, non pos non confertim, tunc patet, tunc raro, tunc frequenter ad cor à foco veniens, unde interdum ægri subito exsurgunt.

*Succedere marcorem* Tres gradus Hæctice dantur, *Primi* gradus signa dedimus, communia reliquit: *Secundi* gradus signa sunt pinguedo in urina, & manifesta consumptio: consumptio autem nuntium patium simul à principio sit, non seorsim huius aut illius: *Terti* gradus signa sunt ardor in gutture, prostratus appetitus, freques hypothyria & facies hippocratica, consumptio tunc jam fere perita. *Pinguedo* in urina sit consumpta membrana intermedia pinguedine, & hoc modo circulatio sanguinis prohibetur, & consequenter nutritio, unde partes concidunt. *Valeat Practica cap. 21.*

*Præexsiccatum cordis corpus* Unica quidem est Hæctice species, sed gradibus differens, nam primum humores albes sive secundarii effervescent, post exsiccantur, demum in cauem & solidas partes calor grassatur, atque cum extrema macies est, Vocatur *Marasmus*, sicut *Marasmus* in senio sine febre contingit. Humores autem secundarii sunt Ros, Gluten, Cambium: humorum Innominatum non agnoscit laudatus *Valeat*, Ros illi est quod diluitur quando lavamus carnem, *Gluten* illud quod distillat cum lente assatur carnem, *Cambium* est aliquid mucosum quod cathi adheret.

## OBSERVATIO XII.

*Hæctica morasmode affecti Cor ex toto exsiccum*. 1. *Materia crassa sinistro ventriculo impacta reperi.* 2. *Cor flaccidum, aqua pericardii multa, Pulmones vitiat, cordi accreti.* 3. *Auricula sinistra ulcerata.* 4. *Tumor diurnusculus in pericardio.* 5. *Cor durum, minus. Pericardium laxè ambiens, vasa cordis ampla, Pulmonum vitium.* 6. *In Hæctorum pericardio & ventriculo cerebri ut plurimum aqua exuperat.*

§. I. **D**. *Sagittarii* (Serenissimi Ducis Bavaricæ Maximiliani Consilarii) cor tabidum ex toto apparuit, ita quidem exsiccum & parvum, ut quod *Thonerus* de ejus cerebro ab aliis illusum recenset, ad nigredinem ex usu Tabacci frequenti contraxisse, hoc ego de corde verissime affirmare possum: Sane aliquot septimanas antequam occumberet Vir Clariss. consumptis magna ex parte spiritibus vitalibus & animalibus in utroque oculo visum perdidit: Mortuus tandem est anno hujus sæculi 47. non præcise ex vomitu, ut *Hor-*  
ferus

ferus narrat, sed ex tabe & febris Hætica consumptus interit: febris inquam Hætica quantum magnitudinis gradum adepta. *Franc. Ignatius Thiermair. conf. 5. lib. 1. p. 75.*

**S**cio quidem tres solaminodo gradus febris Hæticæ à Medicis constitui. Primum, cum torida humiditas absorbatur: Secundum cum cariosa & adiposa substantia jam perit: tertium, cum etiam fibrosæ partes colliqueantur & exsiccantur: Addere tamen quartum licet, quando ipsam Animam (sita loqui concessam est) vel certe ipsam mentis At-

cheum, intimisque vitalitatis recessus hæc Tabes afflat: Afflat autem viros in Republica meliores: Gravissimas, inquit *Petrarcha de Senectute restu. Dial. 4.* Febres Medici dicunt quæ ipsi in ossibus & medullis æstuant: Quanto illæ sunt graviores quæ in anima intus latent? *Idem.*

§. 2. Filius N. cum dyspnœa, leipothymia, &c. febricula quoque laboravit: Sinistra cordis auricula solito amplior refferat materiam crassam & compactam, quæ ventilationem caloris impediabat. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnœa.*

§. 3. Juvenem post laceris dolorem, cordis palpitationem corripuit Febris Hætica & hydrops: Cor fuit flaccidum: aqua pericardii exuberans, Pulmones vitati & cordi accreti. *lib. 2. tit. de cordis palpit.*

§. 4. Puerum trimum vexabat tussis, febricula, &c. Reperta est sinistra cordis auricula ulceribus exesa, &c. *Vide tit. de Syncope. lib. 2.*

§. 5. Quidam animi deliquit, &c. obnoxius, accidente Febricula consumptus est. Eo dissecto apparuit in pericardio duriusculus tumor, nucis avellanæ magnitudinis. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 6. Puerum novem annos natum XIX. Martii 1669. secui: laboraverat is Febre Hætica per quinque fere annos. Cor autem nobis mortuus ostendit durum, longe infra suæ ætatis magnitudinem, vas tamen præditum tam amplis, ut viri perfectæ ætatis capacitatem æquarent. Pericardium laxè illi circumdatum, falso liquore repletum. Pulmones indurati costis adhæserunt, omni sui parre purulenta materia expleti. Felliculus fellis tunica virilis magnitudinis, nigricantem quandam substantiam imbiberat.

**I**n lenis illis morbois unus naturæ error, errorque multos, & multas mortis rupis causas inducit: Sed quæ causa cordis valè ita dilataverat? Annon per febrem ita diuturnas circulatio & fluxus sanguinis vehementior?

*Puerum ix. annos natum*] Ad hæticam inducendam, præter tantam efficientem plurimum facit cordis dispositio, si illud naturæ temperamentum celi-

dius adeptum sit quod facilius, si præcesserint alie febres, ulteriusque incalcescit & exsiccatur, ut & Cœterentius adhuc, in quo calor ille extraneus facile imprimitur, illiusque nativum temperamentum destruit, occasionem præbet, Ob quam causam infancibus junioribus febres hæticæ tam sunt consuetæ ut non solum prægressa febre diuturna, sed & diuturnæ in hæticæ laborant.

§. 7. Probabiliter magis quam verè scribit *Vesalius* in Viris minus aqûe, in femellis plus inveniri: Sed exit etiam plures, ut *Banbinum*, *Iul. Casserium*, *Claudinum* & alios, qui eadem tenui conjectura moti radunt in Hæticorum, Phthisicorumque & marasmo laborantium Pericardiis nihil aut minus aqûe reperiri: Ego autem in his semper plus humoris quam in aliis offendit: Rem eam pluribus experimentis veram hucusque cognovi, & mecum alii, *Excell. Chr. Majar. & I. D. Herffius Anatom. Observ. 7.*

Ego ubi hoc loco (pericardio) nonnunquam tres, quatuor, quinque aut sex uncias, aliquando libram illius humoris inveni, tandem eorum cerebra, opera administri inspicere non superfedis profecto in ventriculis hanc aquam quoque multo cumulationem sæpius deprehendi: In his pedes aqua erant tumidi, in abdomine minus, plus aqûe in thoracis cavitate erat, ac in cerebri ventriculis aqua erat sane quam notabilis. Horum quidam ante mortem amiserat memoriam, quidam mente non satis constabat, Quidam, inquit Dn. D. *Vesperum* phthisi obiit, ac remoto cranio plurimum feri sub pallidi in omnibus ventriculis & spatio inter meningas reperit, *C. F. Schneiderus L. 2. de Catarrhis c. 9.*

**Claudinum**] Hic statuit aquam illam pericardii in viventibus omnibus, tum sanis, cum ægris reperiri, sed ita quod parcius in sanis, copiosius in ægris colligitur. Sed loquitur hic Author in universum de omnibus morbis, ita tamen ut Phthisin excipiat & marasmo: nam credit hanc aquam aliis morbis augeri posse, phthisi autem & marasmo non posse: Hæc est ratio, addit, propter quam inest cæteras marasmi causas ego defectum huius aqûe reponit: Ego ubi hoc loco, &c. (vide textum) Idem supponit *Vasius Castellus*, disputat vero tantum quomodo naturalis bonique humor in corpore phthisici conficitur, & excremetis, ita loquitur, augeatur: Dein auctores ipsi ut *Pisemus*, vident interdum ob vim illius aqûe palpitantem cordis fieri,

& mox corpus tabescere ac febrem hæticam consequi: cur ergo ille calor, qui corpus conficit, non hanc aquam quoque consumere potest? De generatione huius aqûe sit *leb. Ant. Van der Linden*, Ego plane ait, scio cum his qui vaporibus illam attribuant, quos Cor expirat: pericardii autem densitas cogit rursus in aquam, non secus ac in ollis ad ignem positis videmus coire guttas in operculis: argumento mihi est vapor concretescens ad digitos tangentes arterias in his quos synochus habet, & quidem tunc cum in vigore est febris & curis sicca. Et paulo post. Qui novit quomodo ab arteriis tam copiosam tæpe vapor ercat, ut tangentes digitos quodammodo humectet: facile noverit quomodo ab arteriis cordis is vapor

vel exprimat vel expellatur, quae praebet materiam aquae huius in pericardio. Item, Ego hoc velim in disquisitionem mitteri, an non possit esse à sudore quem inter moriendum sudant cordis partes exteriores, perinde ac reliquo cum corpore manare videmus: *Hae Lindem.* Eadem ratione humor ventriculorum cerebri in mortuis magis est conspicuus: Eorum multa semper madida est in viventibus, instante jam morte plus vaporis vasis exit, qui his cavitatibus capitur, & tandem in aquam convertitur: Et ut summum loquar, in ventriculis cerebri & in Pericardio paucæ aquæ guttur in homine qui sanus subito interfecus est, ut 4. 5. 6. & aut 7. inveniuntur: Si viva animalia inciduntur, minus aquae reperitur: si corpus jam refrigeravit & jacet exanimæ, aqua illa non nihil augetur: quare peritæ *Vesalius* ait universam ventriculorum superficiem esse lubricam & aequo humore oblitam, utque tam inter dissecandum subinde eodem humore oppletam conspici: Nimirum si aquam spongia auferas, mox aqua iterum affluit, quia cerebrum manibus pressius contrahitur, *Nunc loquamur de aqua Pericardii.* Vivi canes involucri cavitatem & cordis superficiem humectam habent, in hisque nulla distillant aquae observatur quantitas, cum tamen notatu digna (etiam si semper mediocriter) in aliquodini mortuis canibus semper occurrat: In porcis vero viventibus plus aquae quam in canibus spectatur, uti

etiam porci jacentis mortui, illam utriusque copiosam proponunt: Hinc *Lindem.* Certum est minorem copiam in vivis subito aperiis, copiosiore autem hanc humorem in mortuis reperiri, Ultraque autem est & illis illi aquæ quæ in vaporariis ad fenestram guttatim adheret, & jamjam in se coit: membranae intus naturaliter madent, atque plus vaporis adventante morte amittitur, quare illæ in jam mortuis humectiores sunt, ac obi cavitates est, aqua ex illis vaporibus conflata in fundo subsidet, ut in pericardio & in ventriculis cerebri est seclota, ut denique aqua in pericardii magis quam oportet angelcit & varii coloris est, si corpus ægrum est. Itæ in ventriculis cerebri nec copiosior, nunc impurior invenitur, si homo non integra fractus valetudine, *Utriusque aquæ* est duplex generatio, alla naturalis, qua humor ex vaporibus oritur, altera p.n. qua humor ipse instat totis de vasis manat, & is in pericardium, si secessit sanguis; & in hos ventriculos coit, ut in hydrocephalo: Valde plausibile est quod *Hofmannus* ait, cordis æstum exprimere & exudare facere humorem per vasorum tunicas, non aliter quam cum ex ligno viridi incenso extillat aqua: Intellexero autem vasa, non coronaria, sed quibus appendet cor, quia enim scavidissimas & vaporosissimas est sanguis cum primum à corde exit, incredibile non videtur aliquid transudare per arteriarum tunicas. *Schneiderus ibidem.*

## OBSERVATIO XIII.

*Febris Lenta à Pulmonibus aridis, cretacea materia ubique obsitis. 1. A Pulmone sinistro & thorace plane purulentis. 2. Ab humore lutulento intra Pulmones concluso. 3. A pulmonibus intus & extra purulentis, corruptis. 4. Ab iisdem putredine fere absumptis, vasisque cordi adfisis. 5. A pulmone veficis semipleno, aquam flavam continentibus. 6. A pulmonibus putridis, ulceratis, costis adherentibus. 7. A Pulmonibus lateribus per pituitam viscidam annexis. 8. Hellica à pulmone plane putrefacto. 9. A Pulmone dextro admodum tumido, cum materia purulenta in bronchiis. 10. A Pulmone in unicum vomitum converso. 11. Ab ala superiore & inferiore dextri empyemate infecta; Vomica in superiore &c. 12. Ob Pulmones superna parte adherentes, semiputridos &c. 13. Ab ingenti scirrhus in dextro lobo. 14. A thoracis capacitate sanguine putrido plena, pure in pericardio, cordis superficie erosa. 15. A vitio pulmonum, Ex defluxione acris à capite. 16.*

**§. 1.** *Inter febres symptomaticas refertur quæ vulgo Lenta appellatur: quæ hac laborant plus debito incalescunt præsertim à pastu, motu quovis aut exercitio: urina plerumque rubiennnda est, spiritus sunt debiles & viros dejectæ, circa appetitum & somnum se mediocriter habent, Tussi aut sputo copioso carent, verum in dies, (tabidorum instar) & sine causâ manifesta marcescunt.*

Quendam tali morbo defunctum aperui, in quo viscera coctioni diæta satis recte se habuerunt, Pulmones vero erant exfacci & aridi, necnon materia sabulosa instar cretæ per totum obfusa: Non raro in hoc affectu mesenterium glandulis tali materia argillacea repletis obfuderat. *Fernelius.*

Videretur mihi quod huiusmodi affectio immediate fundatur in mala sanguinis diathesi, qua in temperiem nimis salfam & acrem vergit, idcirco antriori & æquali circulationi minus aptus redditur: Etenim sanguis in corde, non secus ac oleum in lampade, si patricalis salisio nientum redundet, non placide & æquabiliter, sed cum crepitu & magna partium evaporatione accenditur: quo quidem citius dispenditur, & flammam non nisi languidam & imbecillam exhibet, utrum vero sanguis salior factus ejusmodi viscerum affectiones primo intulerit, vel an viscerum dyscrasia sanguinem prius infecerit, incertum est? Probabile videtur quod alterutra affectio ab altera dependeat, & mali utriusque causæ reciproce fuerint. *Willis Traité de Febribus Cap. XI.*

*Inter febres symptomaticas refertur quæ vulgo Lenta.] Symptomatica febris omnis in continuam est*

genere, neque ulla unquam visa est intermittens. Huius proxima materia continensque causa non invenit est maioribus, sed in parte aliquapiam, & qua aut putredine quiddam, aut teter putridusque vapor in cor obrepit: Ejus quidem genera multa, unum inflammationes sequitur, quod & ipsum est multiplex: Quam enim aut externa aut distans est inflammatio non nisi Ephemera febris accenditur, quod solus calor partium condonatio in cor in cor evadat: At si partium interiorum, maximeque principum & cordis vicinarum, vel phlegmone vel erysipelas est, sanguis bilisive putrescens, aut illi in cor subit, aut citius potenterque de se vaporem in ipsum emittit, quo per arterias fuso Putrida fit febris: Sic à phreniide, ab angina, peripneumonia, phthisi, pleuritide, hepaticide, splenitide & à oophritide febris fit Phlegmoodes; ab erysipate Typhodes; eo quoque gravior

gravior quo pars affecta nobilior cordis; vicinior fuerit: Nonnunquam inflammatio, quæ febris hujus est origo, per initia quasi in voluta, larer, at febris ejus symptomatice admodum conspicua est, quæ hoc modo à continua primaria differitur. Ultra; acuta est & putredinis notas exhibet, sed symptomatice nullis stans periodicis exacerbat: urinae nullum putredinis indicium habent, nisi ex affecta sede putredo ebrepit forte in venas: Si non statim initio, mox tamen inflammatae sedis indicia se profertur. Raro vel vij. vel xiv. die aliis de rectoris judicio solvitur: In primaria febre continas hæc contraria apparent omnia.

Alterum febris symptomatice genus multo obscurius est, eam febrem continas quam *Lentam* appellavi. Oritur non è visceris partive cuiusdam inflammatione, sed à *latente obstruione & putredine*, quæ visceri contumaciter adherescit impaßa; est, adeo ut & ipsa visceris substantia plerumque labefactetur: Putredinis portio nonnunquam in venas effusa sanguini permiscetur: Hæc notis præse fert symptomatice ejus quæ aut phlegmonodes aut typhodes appellantur: distinguuntur autem quod omnium est putridiorum mitissimæ ger nullo gravi symptomate premittit, sæpe nec se zgrotari perat: Putredinis tamen notæ interdum elocent in urina: Pulsus frequens, celer & inæqualis, non tamen magnus aut vehemens: vires imbecillæ & languidæ collabuntur, ut ne progredi quidem possit ager: Corporis moles etiam alimentum sumunt, sensum liquefcit: Diuturna etiam hæc febris est, quæ reliquarum continuarum terminos prætergreditur, nec xx. nec interduum xl. soluto.

Hujus quom suspicio est, fomes querendus omnesq; corporis partes animo sensuq; iustandæ sunt, dum si-

gnis conspiciuntur sit in qua is parte consistat: Sæpe in ventriculo, aut in jecore, interdum in liene aut in mesenterio, nonnunquam in pulmonibus, cujusmodi humoris feminala putredo conulari hanc excitat: Sedulo igitur observanda sunt hypochondria & hypogastrium, nam in his tumoris cujusdam sensus infit: Sæpe etiam vel in cachexia, vel in sordis virginum coloribus, ferose pituitæ in corpus effusa levis putredo illam protulit. Et hæc quidem *Lenta simplex* appellatur.

Alteræ est *Lente* periculosa, quæ non solum ex impecti humoris, verum etiam ea visceris, cui insidet, corruptione putredineq; emergit, Jecoris, Pulmonis, Cerebri ac Lienis, interdum etiam Renis distantiorumq; partium corruptela, simplexque putredo, rametis nullo putri humore comitatur, quoniam tamen expiratione gravi cor assiduo lacescit, continuam febrem nō aliter quam putridus humor suscitatur, eamq; symptomatice ac omnino Lentam: hanc pleriq; rerum affirmatè dant: Hecticam dixerunt: Iisdem notis se prodit atq; quæ expostit: Inter nos scitur autem quod sensum editur, multoq; tempore protedit: aliis fere morbis succedit, nihil vel minimum vacatione mitescit, nullis cedit remediis, sed lis sæpe exasperatur, vires plurimum offendit ac debilitat, levig; occasione syncopen accersit: sensum ac plerumq; sine sensu hominem extenuat & marcem conficit: Hoc genus est febris quæ Phthisin comitatur: Hectica quippe non est, sed putrida, ex putrescente pulmonum substantia, nec enim est necesse putridam omnem in humore consistat. *Fernelius lib. de Febribus cap. 8.* Vide *Echeiridum medicis prædictum*, ubi cursio hæc febrium traditur, Et *VViliu loco citato*.

§ 2. Filiolæ Dom. de la Vau mirumquid contigit, Febris continua, dolor lateris sinistri, is fugax fuit nec perseveraverit: inde dilata est phlebotomia, bene habere visâ est, Febris recruduit, difficultas spirandi, mors.

Aperto corpore, *Epiploon pure perspersum* erat: à thorace fluxerat: nam torus sinister pulmo, & thoracis pars sinistra pure plena erat: Catarrhosa erat nec expectoraverat quicquam unquam. *Gul. Ballonius Epid. lib. 2. pag. 26.*

*Epiploon pure perspersum* Epiploon venis amplis & evidentibus conspersum est, ad excipendam impuritatē & illuvem Lienis, ut notat Hippocr. libro de locis: *Libi vasa, ut, pinguedine vacua fuerint, & a silete florissante ac auferente in omnium defluxerit, utpote vicinum valde existens, & vasa habens eque*

*vacua*: Et aphor. 57. sect. 7. Ab hepate aquam in illud erumpere dicit, unde Hydrops: Nec vero solius ini venarum eluvium excipit, sed & mediis & sapremi, quod ne cui mirum videatur vide lib. 4. tit. de vultuibus ob, servat. de Hepate abscessu tentato ob vulnus cerebri.

§ 3. Illust. N. diu languidus cum febre Lenta, tussi, pectoris oppressione: Mortui ini ventris viscera integra quidem, sed sicciora: Pulmones autem sine vlcere, humore lutulento unciarum lxxx. ponderis erant. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

§ 4. Puellula cachectica pulmones habuit intus & extra corruptos, fetidos, purulentos, unde febricula Hectica: abdomen etia scarebat sero multo cœruleo, viridi, fetido, *Lib. 3. tit. de Cache.*

§ 5. Puer à casu & hæmoptysi sensim cœpit contabescere: In pulsu febris deprehendebatur Hectica: Pulmones erant fere putredine absumpti: vasque cordi inserta simul deperdit. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*

§ 6. Ill. Cardinalis cum dyspnoea, Febrē lenta extinctus est: Pulmo vesicis erat plenus, aquam flavam continentibus. *Lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§ 7. Dom. de l'Aubespine cum febre Lenta extincta est, &c. Dissecto cadavere inventi pulmones putres, & costis adhærentes, cum ulceribus variis. *Vide lib. 2. tit. de phthisi.*

§ 8. Puellæ, tussi, dyspnoea affectæ, tandem febris lenta & marcor accessit: Vtrique pulmones tenacis & spumose pituitæ glutine costis coacti inventi sunt. *Vide lib. 2. tit. de Tussi.*

§ 9. Dom. de Abbenbrouk (de quo *Tit. de phthisi*) cum longo tempore catarrho acri in pulmonem illapso Tabæ consensu decubuisse, tandem & Hectica febre consumptus, Pulmo illi plane suppuratus & putrefactus, membrana integra existente, reperiuntur est, &c.

§ 10. In omnium corpore aderant indicia Hecticæ non levia putredine intermissa: Excrebatur alba materia tenax, &c. Suffocatus obiit. Dexter pulmo tumidus apparuit, adeo ut rotant illam impleverit cavitatem. Divisis bronchiis, alba materia fere tota referta erant. *Vide lib. 2. Tit. de Tabæ.*

§. 11. N. Hætica febre consumptus obiit: Mortui invenimus pulmonem nihil aliud quam vomicam esse. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 12. Hermann Stas diu asthmaticus, tandem Febre Tabifica confectus fuit: Lateris dextri ala superior & inferior empyemate infectæ erant. In superiore ingens vomica, parenchyma pure oblitum, In sinistro exigua vomica dispersa: Cordis auricula dextra sanguine oppleta nigro: Lien, Hepar flaccidum. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 13. Juvenis ex dyspnoea marasmode extinctus est: Sinister pulmonis lobus succingenti membranz, cum dextro tenaciter adhærebat, ad medias putrefactus, pure refertus, &c. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§. 14. Unum admiratione dignum placet observare, quod Ego cum Illustr. J. Fr. Seraleo anno 1593. in cadavere cujusdam mulieris reperi in lobo dextro pulmonum, Scirrhum ovi gallinacei magnitudine, Et mulier hæc Febricula laboravit per multos menses, nec non Tussicula, ita ut Hætica videretur esse. *Hippol. Boscos de Facult. Anat. lect. 4. p. 40. 23.*

§. 15. Cadaver secimus in quo repertus pulmo consumptus, Thoracis cavitas plena sanguine putrido & concreto: In pericardio pus album copiosum, Toræ cordis superficies ablutpta: Aderat tussis, Febricula, &c. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§. 16. Pulmonis vitium ex renui, acri multaue distillatione à capite in hunc ipsum illapsa, cum Lenta febre notavit *Idocus Lommius* Observat. mod. lib. 2. Tale quid anno 1624. in *Olas Slangeldorpio* observare licuit Patavii, qui à Febre continua in itinere Neapolitano contracta Romæ vix sanatus, extenuato corpore quum superatis Hetruriz montibus Paravium rediisset, intra paucos dies vitam cum morte commutavit: Viri eximii *Guerneri Rolsinij* opera thorace aperto causa mali patuit. *Iob. Rhodius cent. 1. Observat. 4.*

**L** *Ommius* Observat. pag. 47. Non omitendum vitium pulmonis est, quod ex tenui, acri multaue distillatione à capite profectum in hanc ipsam illabatur: scilicet hic multus ardor & febris excitator, quæ febris, quia Lenta est, paucis hominem consumit: Ad hanc & tussis, & spiritus difficilis accedunt,

sed ut nullum tamen vel ulcus pulmonis, vel sputum cruentum addit: *Hæc Lommius* Quoad vitium autem in Pulmonibus à *Clar. Rhodio* deprehensum, an habuerit in cerebro originem non probat, quæ in maligna sanguinea potius delinquit, acri & salina. *V. de lib. 2. tit. de Phthisi.*

## OBSERVATIO XIV.

*Febris Tabifica à vomica in mediastino, sterno, pure in abdomine. 1. A puris copia intra thoracem, post abscessum lateris: 2. Ab aqua cruenta thoracem replente. 3. Ab hydropo thoracis. 4. A pure ex pleura abscessu in diaphragma decumbente. 5. A vomica purulenta in sinistro pulmone & sinistra pleura, &c. 6.*

**I** Maxius ex gravi percussione lateris dextri versus dorsum in tribus primis costis spuris, à qua flarulentus oedematosus tumor procreatus, per gangrenam & cariem 1638. extinctus est: In cadavere aperto pleraque sana, nisi quod in mediastini intercapedine vomica existeret crasso pure repleta: similisque sterno sub pleura incideret, eo loco ubi mediastinum connatum erat, vomica affectum, ita ut inter se sed hæc vomica communi aditu parent: In abdomine magna puris copia innatabat, præcipue ad aqualiculum collecta, quæ expinguedine omenti & intestinis adnata, per Tabificam febrem eliquata fuerat: Quam suspicionem O. Hearnio auxilii residua omenti & intestinorum pinguedo, quæ diffuens similem idzam purulentæ materiz representabat. *Bartholinus cent. 2. Observ. 53.*

**I** *N mediastini intercapedine* Observavit. *Andr. Falckenburgius* membranas mediastini antici, evidenti intervallo naturaliter non distare, nec cavitatem constituere tam late patentem quam est ipsum

sternum: cum acutissime hæc membranz corpebantur, nec ulli vi accedente separabiles fuit, quod in præcedenti casu à vomica inclusæ contigit.

§. 2. Cadaver aperti cujusdam qui lateris apertionem admittere noluerat: In latere materia purulenta nidum habuerat, unde in thoracis cavitatem decedens, ibidemque in copia ingenti aggregata, & Pulmones continue immersos polluens, Febrem Lentam, & quasi Hæticam, à qua æger valde senex interit, excitabat. *Villis Pharmac. rat. p. 2. sect. 1. cap. 9.*

§. 3. Cachectici pulsus, præsertim vesperi, lentam quandam febriculam prodebat: Thorax universus aqua cruenta refertus erat. *Vide lib. 3. tit. de Cachexia.*

§. 4. Multoties deprehendi integris Pulmonibus, vel utramque pectoris cavitatem, vel alteram aqua plenam: Interim pulmones corruptos in aqua natantes vidi unde cum *Hipp.* asserere licet in Pectore hydropem fieri huius rei insignia duo afferam exempla: anno 1666. in schola Bononiensi, Medicinæ Theoricæ Professor *J. Peregrinus* quinquagenarius, corporis constitutione à phthisi proclivis, hydropo correptus fuit, à qua multo ac diuturno piperis usu seipsum liberavit, tandem in hæticam marasmodum incidit & animam dedit.

Aperto cadavere inveni dextram thoracis capacitatem aqua plenissimam ac turgidam, Pulmonem illuzum, &c. In Virgine quadam, præter alia animadversione dignissima & rarissima, deprehendi thoracis partem dextram equa subnigra & putrida plenam continebatque ejus aquæ cantharum & dimidium Pulmonis etiam dextram partem, quæ in ea cavitate collocata erat, cum pleura corruptam & nigram. *Cæter in Observation. Chirurg. & Anatom.*

§. 5. Empyematicus paracente sinu reconvalescit: Huic pus ab apostemate in pleura diaphragma corripit, ac totum ductum ventriculi & intestinorum tunicas exteriores: Hic Febricula, & si tenebatur lib. 2. tit. de Dyspnœa.

§. 6. Illustr. Comites Itali, Alexander & Octavius Blandiadi, alter xii. circiter, alter x. annorum, cum ultra annum Monachii satis commoda usi essent valitudine, alacres & prompti corpore animoque, nisi quod Octavius semestri ante mortem ex febre continua, sed lenta, aliquot dies decubuit, ex ea tamen belle restitutus mense Junio 1588. Octavius puer, qui prior rursus incidit in febrem continuam, lentam tamen & mitem, cum calore & dolore prope nullo, neque aliis malis accidentibus, pro ratione tanti affectus tunc adhuc latentis, stipatam, junctus tantum erat febris difficilis spiritus, sublimior quam pro febris ratione, citra tussim, cum lateris dolore ad tactum, quem ferre non poterat, alias fere nullo: ventris quoque aderat aliqua inflatio cum torminibus, urinz turbida, Cum quotidie in pectus omnia laborarent, decimo die obiit.

Dissecto cadavere, vitium incurabile, & forte à primordiis generationis, illi, ut fratri, congenitum apparuit, cum enim abdominis viscera sana inventa essent, resecato thorace reperta vomica in dextro pulmone; universam simul dextræ partis thoracis pleuram occupans: erat enim sub unica pulmonis dextri, & pleura ejusdem lateris costas integente plurimum ac crassum pus: In cavitate vero thoracis dextri plurima aqua citrina, altero pulmone illuzo existente.

Alter vero frater, Alexander, paucis post diebus eodem prope morbo decumbere cœpit, ex febre miti, continua, nullis comitata symptomatis pravis præterquam vigilis, siti aliquantulum interdum, dolorem nullum quam sub axilla dextra indicabat, sed vinum desiderabat valde, ut & frater, urinz tamen satis accefixæ erant, cum enzoremate nigricante, quæ statim turbabatur: noctu magis incalescebat, sine tamen manifesta episternia, qui calor neque ita mordax fuit, ut in febribus essentialibus, ex materia in venis putrescente, & lentius illum conficiebat, paulatim enim vires condecidebant, ut neque sedere posset, extra lectum sublimis fiebat spiratio, narium pinnae movebantur, dolebat in affectu latere ad levem tactum: In somno conviventibus erat oculis, capite ad pedes capitis devoluti: Tussis erat irrita cum qua nihil extundebatur: dolor sub axilla & appetitus vini augebatur: In 7°. tussis crebrior, cum qua aliquid purulenti exercebat, sed hærebat major pars in larynge & stertorem inducebat: ea nocte lubricum totundum alvo egressit, respiratio tandem, cum nihil effectû dignum educeretur, cœpit valde coangustari, ut esset plane orthopnoicus puer: alvus fusa fœda exercebat liquamina, omnibus denique viribus intermorientibus cessit & ipse fato 10. morbi die.

Aperto cadavere abscessus, seu vomica purulenta reperta in sinistro pulmone & sinistra pleura, eratque pulmo ille intermedio pure costas & pleuræ agglutinator, flaccidæ alias substantiæ & repletus vesicis quibusdam aqua viscida plenis. Reliqua cavitas in eo latere aqua similiter subviridi plena erat: Hepar etiam durum habuit cum felle magno. *Ex Observationibus Hieron. Fabri Medici Bavar.*

**S**ub tunica pulmonis dextri pus, &c. Quia abscessus ille erat in loco libero, laxo & libere, jamque paulatim familiaris illis partibus redditus pus sub tunica exteriora contentum arterias Pulmonis non irritavit ad tussim: neque ob intersectam aquam ex thorace per poros pulmonis, quam crassius etiam transsumi potuit: sed febre tandem accensa, à colore putredinali viribus cordis obstrictis mors sequens. *Idem.*

**Dolorem sub axilla dextra** Cur doluerit sub axilla dextra, cum vitium in sinistro pulmone fuerit, causam arbitror, quod maxima pars & vomica collectio erat retro juxta spinam, ubi affixi sunt pulmones; pectore facile affectus versus dextram axillam communicari dolorque advehi potuit. *Idem.*

**Vinum desiderabat valde** Illud in usu practico observare est, eos quos peripneumonia occupat ingenti vini desiderio, quantumvis necessarii teneti, quod

sæpe animi deliquit eo in morbo accidant, imo eos quibus pulmones natura impulsus calcent, merito præ cæteris delectari.

**Ad pedes capitis devoluti** Εἰς τὴν vocat Hippocr., cum quis modo hominis vivens decumbere non potest, sed tanquam mortuum inanimumque corpus deorsum fertur: signum virum ad extremam debilitatem perductum, cum robur universum exolutum est. Hæc enim jacendi ratio nullam profecto facultatis adjuvum ostendit, sed potius afflictionem extremam: Hinc Hippocr. coac. 11. lib. 3. si pretinus delabatur ager ad pedes, pejor est illi, Petronius, ait Divesius, omni facultatis officio quod lucet in decumbendo, adhuc exiguum manet in supino corpore artubusque extensis ob facultatis infirmitatem, quæ ipsum tamen constrictum dum indecore jaceret omnino antem deserit ac misero valedicir & τὴν εἴρηκα δὴ τὴν εἴρηκα. In propinquo mors est.

*Febris Hæctica vitio Pulmonum inducæ, diaphragmati, & plerarumque partium naturalium. 1. A vario pulmonum vitio, mesenterio scirrroso, Compressione aortæ & cavæ. 2. A Pulmonum & Lienis vitio 4. A Pulmone sinistro purulento, Glandulis Mesenterii, & adstis porte trunci tumidis, Sero in utroque ventre. 5. A Pulmonum inflammatione, mesenterio scirrroso, ventriculi corrosione. 6. Ab Abscessu in Pulmonibus, & juxta Hepar. 7. A Pulmonum vitio, & partibus spirabilibus in angustum coactis ab hepatis & ventriculi mole. 8. A Pulmonum vitio, Lienis, Vesicæ & Intestinarum inflammatione. 9. Ab Abscessu putrido in Pulmone, cum scirrhis, mesenterii tumoribus scirrhis, &c. 10. A Pulmone dextro inflammato, Gangrana in fundo ventriculi, colo 11. A Pulmone sinistro putri, Liene, thorace sero pleno. 12. A multiplici partium thoracicarum vitio. 13.*

§. 1. **I**LI. Domina Sporekia, Nobil. Baronis Sporek conjux, Hæctica laborabat, atque una cum continuis ventriculi doloribus: Primo ad eam ingressus, adeo eam vigiliis, doloribus, imprimis ventriculi immensa siti confectam reperi, ut non tantum non animam trahere videretur, Eapropter nihilominus quam afflictiissimi hujus corporis curam cogitabam: Victus tamen precibus, ratus quoque melius esse, Celsi nostri indicio, anceps quam nullum experiri remedium, primo omnium, præmissis tamen leni clystere, confugi ad *Laudanum*, nostrum perlatum, tanquam ad sacram post Deum anchoram: Dedi & vidi hi oculis felicissimum effectum: namque post hanc placidissimus eam excepit somnus, quo, licet diu non duraret, minime tamen se refocillatam aiebat, adeoque petebat ut usum ejus continuarem: morem gessi, etiam si multa adessent quæ crebriorem opiatorum usum disscaderent, confisus in eo præparandi modo, qui usum Laudani mei tutissimum mihi polliceri poterat: perrexi itaque & exhibui: cum necessitas ita flagitaret, singulis ferme diebus nunquam non felicissimo cum successu: Interdum contra Hæcticam pugnatum liquore cornu cervi, sale essentiali Saturni, uti & antihæctico Poterii, modo in jusculis alterantibus, modo in Julapiis appropriatis: utque vires adhuc majus argumentum sumerent, gelatinam Zvvelferianam parandam curavi, additis quibusdam pretiosis pro virium majori reparatione: Atque his, Deo benedicente, in tantum profecimus ut ad majora progredi nobis licuerit: Aquarum moles magnis Illustrem Dominam patientem molestiis premebat, atque qua antehac movenda non erat, nunc de ea, quantum fieri posset removenda consilium ceptum, & propinatum primo apozema digerens, aperiens, ex iis potissimum herbis confectum quæ sale essentiali surgunt: subjunxi hydragogum lenæ ex magisterio gummi Gotte, Sale Martis subdulci & sale Tartari volatili constans quibus effectum ut pars aquarum versus umbilicum secederet, pars quoque, licet exigua admodum, per alvum eliceretur, non sine tamen insigni Domine Patientis allevatione, quæ ut eo citius desiderato sine potiretur, fortiora sibi expetebat, imo jam se in portu sanitatis navigare firmiter persuasum habebat: Verum longè alia mihi mensebat, quam R. P. Confessionario ejus clare satis exposui, prædixique hunc esse extremum naturæ conatum, quando quidem præter alia eadaverosus odor cubiculum satis amplum impleas moneret, interiora corrupta omnia esse, Illustremque Dominam non procul ab ultima rerum linea consistere: Itaque dum discedendum mihi esset, confortantius præcipue usum commendavi, reservatis reliquis ad reditum usque meum, quo tamen opus haud fuit paulo enim post, cum nihil minus quam mortem cogitaret, subita lipothymia correpta obiit.

Cadavere me absente, quod valde doleo, aperto, oppido apparuit quæ subitæ mortis, quæ tot aliorum symptomatum, quibuscum per tot annorum decursum conficta, causa fuerit: Mitto à Chirurgo observata, & lapidis in ventriculo reperti formam, &c. Cerebrum, quia plenissimum instabat, plenum erat & sanum: Pulmones velut arefacta spongia deformes, inter utramque alam purulenti, undique adnati: Cor valde parvum sed sanum: Ventriculus contractior siccitate, magnitudine ovi anserini, plenus materia cruda, quasi ovi puridi: Interius ventriculo accreverat lapis durus, griseus, quem abrumpere coacti fuimus, crassus pollicem, longus articulum: Diaphragma arefactum, Abdomen plenum aqua, circiter quatuor cantharorum: Hepar magnum, durum, densum & colore præternaturali: Lien parvus valde & contractus, sicut & Renes, omnia informia, Mesentericæ Venæ obstructæ omnes: Intestina flatu plena & aqua, Summa omnes musculi abeflaccidi, uterus & vesica tam parva, ut puerilia, sed inanitate Slesvici 26. Julii 1659. Ioel Langelet Epistol. ad Thomam Bartholinum centur. 3. Episl. 49. & 50.

**L**audanum) *Walen* Meth. med. p. 153: ait Hydro-picos unius grani Opii exhibitione mori: Id quoque à me observatum anno 1659. in virgine 35. annor. quæ hydropce abdominis & pectoris, phthisique summi interit, cum ob pertinaces vigilias

Laudani opiatum optime preparati gr. ij. fuissent exhibitum, placidissimus quidem somnus obrepit, sed postidie mors successit quæ nondum infare videbatur: Et paucos ante menses anno 1672. Vir Reverendus, Asthmate cum pertinacibus vigiliis laborans, ac hydropis

hydropis initio; appoſtitionis repente concidit ab animis pauci deſperarent.  
aſſumpto pridie laudato, eſſi de reſtitutione valen-

§. 2. Puella xi. ann. ab ephamera in hæticam incidit, Meſenterium illi ſcirrhoſum, in Hepare ſteatomata: circa cavam multa materia gypſea: Lien eadem ſcarens, Thorax aqua ſimpida plenus: Pulmones materia purulenta imbuti: Aſpera arteria à ſteatomate compreſſa, &c. *Vide lib. 2. tit. de Phthiſi.*

§. 3. N. Cachecticus, cacochymus, febre continua ac tuſſi moleſta prehenſus, hinc ſequuta hæmoptiſis & purulentorum reſectio, & tandem Hætica maraſmodes: Pulmones erant arte adnati plenæ, Intus purulenti membrana integra, Cor flaccidius, Hepar magnum, pallidum, exanguè, ut Lien, &c. *Vide lib. 2. tit. de Phthiſi.*

§. 4. Puer iſtericus factus cum febricula: Pulmo vitium inſigne contraxerat viſcioſus erat Hepar velut *ωρόμενον*, *Vide lib. 3. tit. de Ictero.*

§. 5. X. Martii 1676. in Puella octo annorum, quæ Febre Hætica interierat, obſervavimus ventrem iſſimum mediumque ſero valde lento repletum: Pericardium quoque ejus notabilem continebat copiam: Pulmo ſiniſter totus purulentus pleuræ ſimiliter agglutinat: Glandulæ meſenterii omnes, ſimiliter ad illæ quæ venæ Portæ truncò circa Hepar adſitæ ſunt, inſiguiſer tumefactæ, materiam continebant pinguem, albiſſimam. Hujus etiam notabantur aliæ conglobatæ glandulæ: Pancreas cum conglomeratiſſimis, integrè ſatis ſe habebat. *Gerardus Blaſius Obſervat. Medic. xii.*

§. 6. Ceſſiſſimæ N. Febricula cum aliis ſymptomatis: Meſenterium erat ſcirrhoſum eum glanduloſis tumoribus: Pulmones inflammati, in Ventriculo, corroſionis & inflammationis notæ. *Lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 7. Nob. cui tumor juxta cartilaginem enſiformem (*Vide tit. de Tumoribus*) incidit in febre Lentam & maraſmo obiit. In ſuperiore parte Hepatis aderat abſceſſus veſicis plenus, qui id corrupit, Alius major in pulmonibus: Tertius ad inteſtinum colon. &c. *Vide tit. de Febris.*

§. 8. Seren. N. arthritico acceſſit deſtillatio in pectus Febricula, &c. Cor. pleura, pulmo, ſeptum vi erant retracta, ac in anguſtum hepatis mole & ventriculi: Pulmones cum tabo, ſed ſine ulcere erant. *Vide lib. 2. tit. de Dyſpnoea.*

§. 9. Monachus Franciſcanus ex Febre Lenta, dyſpnoea poſt menses aliquot, cum delirio ad plures abiit.

In cadavere aperto viſi ſunt nobis pulmones lividi & exſucci: Lien cæruleus & ex illis Inteſtina hinc inde inflammata, ſicut & interior Veſicæ facies: Nihil tamen in urina viventi vitii comparuerat: Cætera ſana videbantur, niſi quod totius corporis habitus fuerat extenuatus. *Bartholinus cent. ij. hiſtor.*

§. 10. Puella 14. annorum in Tabem incidit, Febricula continuo vexata: Reperi meſenterium reſertum tumoribus duris, ſcirrhoſis, circa venam portam tumores ſcirrhoſi: In dextro lobo Pulmonis abſceſſus erat putridus & foetidus cum pure, &c. *Vide lib. 2. tit. de Phthiſi.*

§. 11. Nob. N. diarrhœæ affectus (*Vide lib. 3. tit. de Diarrhœa*) tandem etiam febre lenta, & continua corripitur: In fundo ventriculi aderat gangræna, ut & in ſine coli, ubi latuerat ulcus. In dextro latere inflammati erant Pulmones.

§. 12. Thomas N. laborat tuſſicula & Febricula: Totus thorax plenus ſeroſo humore: Pulmo rotus putrilaginofus, nec non Lien. *Lib. 2. tit. de Tuſſi.*

§. 13. Apertum eſt cadaver Cath. Mathylo Leodiſis, quæ nata erat annos xv. cauſam mortis in nullo viſcere eximiam deprehendimus, nam animi anxietate ex ærumnoſæ vitæ afflictionibus contracta in Tabificam Hæticam miſeriam inciderat: quippe in pravâ diæta eum haberetur, & peſſime tractaretur ab iis apud quos victum laborando conquerebat, nullo commode nutrimento partes ſuſtentatæ, & ad incrementum naturale acquirendum ſultæ fuere: Unde enara Diarrhœa, ex humorum corruptela & intemperie, viſcerum naturalium & viralium omnes vires devaſtaverat, cujus manifeſta ſpectabantur indicia in viſceribus omnibus valde flaccidis, præcipue autem Corde & Pulmone: Vomica etiam in dextro pulmonis lobo aderat: & ſupra pericardium, ubi membranz mediæſtini ei connectuntur: ad cordis apicem glandula nucis juglandis magnitudine ſolida, valdeque denſa exiſtebat: Thymus etiam glandula in jugulo eandem conſtitutionem obtinebat, Sicuti etiam in Meſecolo, & que majores, & in meſenterio, ſed minores, inter quas erant variz atheromatis materiam obtinentes: Plurima aqua pericardio inerat, cordi autem ſanguis paucus: Sed Pancreas à magnitudine & conſiſtentia naturali non variabat, ſicuti nec Lien: Renes flaccidi erant & loridi, præcipue in parte ſima, ſed ureteris utriuſque extra renem in exordio progreſſus valde amplus: tamen calculoſi aut ſabuloſi in renibus aut veſica deprehendebatur: Omentum omni



omni pinguedine exspoliatum erat : Hepar flaccidius & colore fusco ad luridum vergente, ceterum naturaliter comparatum : Uterus minimus erat & durissimus : Testis uterque gracilis & longior naturali figura : Tuba non apparebat, sed vas deferens à teste ad uterum aliquatenus conspicuum erat : Vasa ad fundum & collum uteri protensa tenuia erant, quoniam nondum menstrualis fuerat : Totius corporis habitus gracilis & exsiccatus erat. *Ossio Heurnii Hist. xv.*

**P**roxima aqua pericardio intrat : (M. Curvius & alii, tum viventibus, tum confectis ab obitu dissectis animantibus nullam à natura inditam aquam inauranti pericardii contendunt, Spirituum concretorum in aequam substantiam conversionem à succedente mortis frigore cogente, profectam hanc adstruunt : Vesalius contra asserit nunquam à se dissectum cadaver & pericardium, in quo non is humor

existerit : Rarus plus in dilata quam festinate sectionis cadaverum animadversam aquam : Vide Jalsolii librum de aqua in pericardio.

*Cordi sanguis panem*) Ob pravam dictam praecedentem & morbi diuturnitatem : Car. Piso de morbis à serosa illuvie l. 2. p. 2. cap. 4. notat in cad. a vecoj. dam febre extincti vix sanguinis libram superficem fuisse.

## OBSERVATIO XVI.

*Febris Hectica à Glandulâ Pyloro accumbentibus tumidâ, eumque prementibus. 1. A Glandulâ lumb. baribus magnâ, mesenterij visio, &c. 2. A visio ventriculi materia viscosa referti 3. A corruptione crassorum intestinorum, &c. 4. A syderatione & corruptela ventriculi.*

§. 1. **F**ebre Hectica Lutetiae quidam eum perisset, in corpore nihil observatum, quam quod Glandulae illae duae, quae Pyloro à natura appositae (vel porius circulus qui est in pyloro, duritiem & scirrhum contraxerant) ratione cujus proculdubio alimentis non patebat transire. *Ex Observat. G. Bauhini.*

§. 2. Glandulae Lumbares conspicuae magnitudinis erant in Corpore Hectico, quatum eum Lymphaticis commercium manifeste videbatur. Hectici hujus Mesenterium computruerat, Omento penitus absumpto, Ingentique aquae ad viridem vergentis quantitate in abdomine collecta. *Th. Bartholinus Epist. 70. cent. 2.*

§. 3. D. N. dolebat circa stomachi regionem cum Febre lenta, In ventriculo reperta materia nigra, lutulenta, copiosa. *Lib. 2. 3. tit. de ventriculi dolore.*

§. 4. Petrus N. tensio dolorifica in abdomine eum Febre valde afflixit : Inventa sunt intestina crassa livida & semis corrupta, In abdomine multi tumores foetidissimi. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 5. Quidam ponderis sensus in ventriculo, eum Febre lenta, &c. Gibbus ventriculi vivebat, fundus & pylorus syderati. Torus erat putris & lacerus. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

## OBSERVATIO XVII.

*Febre Lenta extincti Omentum corruptum repertum est, Ren dexter gangraena affectus Hepar grande & durum ac tuberculosum, intestina & mesenterium male affecta, &c.*

**C**adaver D. Miron Regii consiliarii, febre Lenta mortui, & adeo exsucci ut nec carnem nec pinguedinem habuerit, sed loco muscularum fibrarum rubentes, & ossa euto siccata & arida fuerint vestita. Parisiis 18. Junii 1639. apertum fuit, plurimis praesentibus, imprimis Guidone Patino, visu digna haec notabat vir doctissimus, 1. Omentum corruptum, gangrenatum & totum fere consumptum. 2. Ren dexter gangraena corruptus; putridus & nigro colore tinctus, cui impactus calculus in medio, crassus & longus minimi digiti magnitudine, cujus apex ureteres ingrediebatur, quos ramo bifurcato obstruxerat : hic ren adeo corruptus fuit, ut nisi aliunde mors obvenisset, mortis potuerit sola esse causa, ex suppressione urinae brevi sine dubio sequutura : Alter Ren neque putridus erat, neque ulcerosus, sed lividus totus propter sympathiam eum dextro, qui praeter figuram nihil reni habebat simile. 3. Hepar grande sed durum multis in locis, plenum putridis tuberculis deorsis : & parvis abscessibus interius, ex quibus prodit materia alba & crassa smegmatis instar : sed magis putrida inferior pars quae renem tangit, superior costis adnata : color lividus, Sanguis contentus crassus, lividus & putridus ; 4. Lien non valde vitiosus, solo colore livebat, quod forsitan vitium ab hepate illius amplitudine sua protenso contraxit : 5. Intestina decolorata, imprimis jejunum nigriculosum, & nonnihil siccum durumque. 6. Mesenterium consumptum nihil spectatoribus reliquerat praeter glandulas nonnullas virides & pure foetido tectas : Substantia ipsa mesenterii videbatur in pus resoluta, quod tribus ultimis morbi mensibus per ventris fluxum evacuaverat : distincta tamen erant vasa, venae & arteriae, ob copiam sanguinis stagnantis. 7. Pancreas durum, scirrhum & exile. 8. Ventriculo naturalis erat constitutio, & vesica lotio plena. 9. Pulmones duo, plane purulenti, pleni tuberculis

tuberentis nigris & ecetuleis, quibus apertis effluxit pus album & spumosum cum sanguine livido & nigrescente, præter partem inferiorem sinistri, quæ tota rubebat, dura & sicca, cum aquæ rubræ claræ pinta unica in cavitare. 10. Cor exile & aridum, quale illorum esse solet quæ febre lenta moriuntur. *Th. Bartholinus cent. ij. Observ. xix.*

**O**mentum corruptum, &c.) Id in plerisque à tabe, aliisque spectabilis chroocicis interemptis putridum & fere consumptum invenitur, adjuvante *Virid. Pathol. cerebri cap. 9.* atque ipsam totum hoc in opere colligere est: Hydropicis plane computulasse observavit. *Clar. T. Bartholinus Anat. refer. cap. 8.* quod contingit ob membranz teonitatem & valorum multitudinem, eloviem excrementorum excipientium, quæ in ibi putredinem facile concipiunt.

## OBSERVATIO XVIII.

*Febri Hætica Putrida juncta, cujus focus in venis mesaraicis atro sanguine tumentibus, Liene putrida, sanguine nigro oblito, Vesicula fellis atra bile referta, &c.*

**N**Ob. mulier adolefens nupta viro Illustr. provectæ jam ætatis filium illi peperit: Marito nè vivis sublato, viduæ in mammilla sinistra tumor prodiit durus, &c. mox postquam sanata fuit in gravissimos dolores incidit circa ossum nudam, præcipueque articularum regionem, cum capitis intolerabilibus cruciatibus erumpentes. *Medici suspicati à lue venerea* eos procedere, curationem eo dirigebant, atque suffribus ex cinnabari medebantur: Accersitus ego, eam sub strato decumbentem suffimigiisque utentem, summeque ob lectum carbonibus accensis calefactum, calentem sudantemque deprehendi, & de doloribus circa ossa atque calvariam conquerentem, Febreque simul laborantem, quæ suas habebat certo tempore exacerbationes, easque præsertim post cibum sumptum: Cum & Medici & Chirurgi eam vel infectam mihi narrarent, Ego singulis exactè perpensis, ostendi arthritidem esse hunc affectum, neque dolorem illum, circa ossa se offerentem, quæ quattam luis speciem constituit, multis rationibus probavi, Quare à suffitibus illis, quibus jam diu usa fuerat, & qui Febrem Hæticam in ea pepererant, abstinere iussimus, & pro doloribus arthriticis remedia convenientia adhibuimus, verum præter hunc affectum, circa coxas, humeros capurque eum assilgentem, febremque Hæticam eam consumentem, febris Putrida simul accessisset, unde cardialgie, vomitio post cibum sumptum fere continua, ac menses aliquot supervixerit, tamen sensim rot morbis labefactata, tandem è vivis excessit.

Corpus demortuæ à medicis sectione divisum, atque undique diligenter inspectum, hoc pacto constructum deprehensum fuit: Capitis cranium crassum atque integrum sine futuris, Ventriculi in cerebro aqua limpida pleni: Mamma sinistra, qua dum viveret scirrhus laboraret, circa radicem scirrhosa, ut & circa papillæ radicem scirrhus erat candidus, glandulam representans. In costis vena lata nigrescente latebat: Hepar sanum nec vitiatum: Vesicula fellis exterius nigra, intrinsecus ulcerata, & bile atra, quæ picis instar splendebat, repleta: Lien totus putris sanguine nigerrimo oblitus: Venæ mesaraicæ tumentes & sanguine atro turgentes, eoque crasso & veluti concreto, quæ à majoribus venis, coralli instar nigri, invicem cohærens extrahebatur, venæque ex illis ventriculum implicantelæ & varicosæ erant: In rene dextro calculus triangularis, albus, mucro obvolutus inventus fuit, in sinistro tantum arenulæ: In reliquo corpore sanguis, in vena cava paucus, uti & cor, quod parvum erat, exangue eenebatur: Ex quibus præcipue his vitis satis conjicere potuimus in venis causas & putridæ & hæticæ febris, atrophicæ, aliorumque partium naturalium symptomatum fuisse, quæ mortem illi potius quam arthritidis, quippe quæ curati potuisset, pepererunt. *Platerus Observat. lib. 2. p. 504.*

**M**edici suspicati à lue venerea, &c.) In iudicio ferendo non quæ Loc venerea sit infectus, ad Momi incertam observare operæ pretium est, maximeque ad Medici & auctoritatem & iudicium examinem hoc & censura pertinet, ut ne quid præcipitanter pronuntiet, nil statuat de quo jam exploratum diligenterque questum non sit. maxime vero id difficile est, quoniam hinc & illinc molum adest difficultatis: illinc quidem, quoniam parvi oco refert io æstimandis rebus istis præjudicata ois scotentia; unde si in ejus suspitionem alterum conjugum vocaveris, veritatis odio aut tibi coesses inimicitias: aut si non rectè pensitatis rebus quicquam absolute pronuncies, quædis, criminationibus ac jurgiis domum impleas: Aut si securus minimi morbum minuas, opinione-

que minorem dices, dum ad blandiri morbo volumus, ægtorumque levando opinionem tacite existimationis speciosum aliquid præterere, periculum vitæ creemus, aut vitam infelicem reddamus, tandem coacti osotpare illud, quod jam iudicio & veritatis studio anticipandum & anteverendum erat: *Balleronius Histor. lib. 2. Consil. adde his discrimen in quo d conjicis ægtum ex falso præjudicio, cum errorem in therapeuti quoque sequatur, in quod infortunium adducta hæc paritona.*

*De doloribus conquerentem, &c.)* In Hæticis sic cora dolere & immortescat, mortem instare observatum est, quod etiam fit si vermes excernere incipiant. *Vel. fibris in millonim*

## OBSERVATIO XIX.

*Febris Hæctica ab insigni mesenterij abscessu genita 1. A Mesenterio nigro varicibus obfuso, Pancreate obftructo, 2. Ab inflammatione Epiploï mesenterio communicata. 3. A mesenterio steatomatis repleto, 5. A mesenterio calculoso. 6. A callo inter venas mesentericas. 7. A sanguine concreto in vasis mesentericis tumidis. 8. A mesenterij glandulis materia argillacea infarctis. 9. A vitio Pancreatis tumidi, lecori annexi. 10.*

**I**N mesenterio Medici merito sentinam colluviæ humorum collocarunt, ideoque eorum Nutricula vocatur, nam ab eo fonte omnes morbi alvinæ regionis erumpunt, eorumque incontumacia repetenda est: Cum enim cum hepate mediane Porta vena connexiones, constetque ex substantia adiposa & glandulosa, ex ceptioni humorum idonea, si accedat idonea victus ratio, mirum non est si inde graves & lethales exoriantur affectus: Exemplum insignis præbuit uxor Dom. D. Crameri Clarissimi, Collegæ Præstantissimi, quæ circa conjugem febre gravissima afflictum, mæque curæ commissum, dum sollicita occupatur, pede titubans subluxationem malleoli patitur, incessuique inepta decumbere cogitur, interim morbus, cujus seminaria latebant erumpit: Nata erat ætatis xxv. pusillæ staturæ, delicatissima & molliter educata, vivacissimi & sagacissimi ingenii phisicum habitum, angusto pectore & depresso præ se ferens: Tota vita à carne & alimentis probi succi aliena, esui lactis indulgens & casei caprini recentis, quo solo pet ætatem vitam sustentabat: Bimestri ante obitum, qui xx. die mensis Maii, anno 1676. contigit, de nausea conqueritur, accedente alimentorum omnium fastidio, imo medicamentorum etiam gratissimorum, Interim intumuit aqualculus cum inflammationis notis, levissimum contactum non ferens: Febris se sociam lenis adjunxit, facilisque in tenui corpore & exsueco marcotis successio: Causa adscripta est pertinaci viscerum & mesenterij infarctui, nascentique abscessui: Conjecturam firmavit vomitus materiz pituitosæ puri remittæ, suppurato in expuratum abeunte: Ab injectis clysteribus eniendi ventri doloris causa, similis & copiosa, sed foetidissima educebatur colluvies: triduo ante sobitum desinit vomitus, nulla toto morbi decursu adfuit tussis neque dyspnea, quanquam virium pulmonum in suspicionem veniret.

Aperto Defunctæ cadavere 1. Pulmones occurrunt corruptionis notas præ se ferentes, exterius variegati, maculis nigris conspersi, intus corrupti, sterno coherentes, parte dextra liberi, sinistra costis & dorso annexi, 2. discissum Pericardium seri uncias viginti circiter effudit, qui affectus *Hydrocardia* potuit dici, vel cordis aut Pericardii *Hydrops* 3. maximum erat, pallidum, exiguum ctuorem in auriculis & sinibus continens: 4. Diaphragma sine labe fuit: 5. Abdominis muscoli in Jecoris vicinia, & inferius, corrupti, lividi, gangræna næ proximior 6. Nulla neque peritonæi omenti vestigia. 7. Hepar prodigiosè erat magnitudinis, naturalem duplo excedens, universum ventricululum cooperiens, flavedine inrus & extra suffusum, ubique scirrhusosus, & costis nothis adnatum: Cavum abdominis implebat æmura, seu humor feciei vini albi non absimilis, commixto pure multo & pituita viscida, hæc *Hydrops* species constituebatur: Abdomen enim ea feculentia educta concidit & resedit: Atque is fuit humor qui vomitui causam dedit, qualem etiamnum alvo exeluxit: 9, ventriculus admodum expansus erat, flaccidus, rugis omnino carens: 10. Intestina crassa nigra erant & phacelo affecta, 11. Necnon abdominis muscoli, à prægressa scil. inflammatione, quamquam febris mediocritas fuerit, à penuria nempe sanguinis. 12. Mesenterij nulla reliquia, quod universam in purilaginem abjerat. 13. Ingens vermis & vivus purulentæ illi innatabat, qui an ab exeso vel perforato aliquo intestino prodierit dubium fuit, nam foetor summus ulteriores disquisitionem prohibuit. 14. Uterus admodum parvus, apparuit, vix fabæ capax quamquam prolem reliquerit, scirrhusosus: Renes fere inculpatis, etsi color ad cinereum vergetet. 16. Splen integer.

**A** Carne, &c. abhorrens, &c.) Inter notas corruptæ Jecoris substantiæ ingens carnis fastidium ponit Author *Enchiridii Med. Pract.* cum virium imbecillitate, febre lenta & totius corporis extenuatione, ac summo vini optimi & meraci desiderio: Causas externas, vitium alimentorum corruptorum & putidorum, ex quibus pro landabili sanguine generatur putris quædam & maligna sanies, quæ jecur consummat ac tandem corruptit. Vini quoque generosi longus & liberalior usus, à quo aliena fuit Agra: Sed casei diuturna ingestio, quid ætate præteritæ edulium & abstinentia

alimentorum probi succi, satis fuit ad illius perniciem & congectionem prætex saboræ: De nequitis causis vide elegantem Excell. *Leisichii* libellum.

*Mesenterij infarctus*] Obstructiones in mesenterio, vicinisque partibus glandulosi sæpe sequitur inflammatio, quam excipit abscessus: Cum enim natura varios sæpe numero in mesenterium deponat humores, ita ut quibuscumque, circa noxam, malorum annotum decursu, vel singulis mensibus semel æque iterum aut citius, pituitæ acidiæ aut potris, vel bilis utriusque æroginose, porraceæ aut vitreæ, insignis vomitus

vomitum, aut per feces fecit relictur copia, Nihil equidem obitare potest quia diutius coerciti, vel in glandulis ac venis istis perplexis altius impacti, imbibitque, calore accedente extraneo, putredinem concipiunt, & inflammationi febribusque variis nec non abscessibus materiam suppeditant: Quin & eo malignitatis corruptionisque partes istæ vitæ sunt devenisse, ut gangrenam, malum omnium corruptelarum pessimum, conceperint: Cause obstructionis hæc sunt, Venarum mesenterii nimia adstrictio, de qua Galenus lib. de diff. & causis morbum cap. 7. (quam suspicari in corpore strigoso & macilento licuit) Suppressa mensum aut hæmorrhoidum evacuatio: Sanguinis abundantia, aut ejusdem morbum præcedentem, exustio nimia: Jecoris & vicinarum partium robur, copiam humorum instar molesti oneris, in hanc sentinam excutientiam. Humor crassus, lentus, plorimus, crudus, vel à cerebro in ventriculum copiose procumbens, atque in tenues venas cum alimento penetrans, easque obstruens, vel cum spissu Batulento intra tubulos mesenterii contentus: Bilis flava diutius p.n. coercita crassescensque, Humor atrabilialis ab Imbecilli Liene non attractus, Callus inter mesarcales (quod observavit Benivenius) excrecens & anasodiu chylis prohiens, Vel Tophi in eodem & pancreate residentes: Febres diuturnæ, epidemice præ cæteris, & quartanæ magnam vitiosorum humorum saturam secum trahentes: Frigus intensum quo humores concentrati in corpore figuntur, diutius perpeffum: Alimenta quinetiam viscidula crassa, motu vehementiori, aut balneis intempèstive usurpatis, in venas rapta: Saccharata vel melle delibata atque edita, copiosius à microcholitis vultu, aut qualitate minus laudabili prædita, Casum vestitus, exsiccatus aut putredine squalens, &c. His addere licet variorum ciborum ingluviem, totius corporis imputritiam præ præva viscerum configuratione proficiscentem & post crapulam: Laboris & exercitiorum rationem neglectam: Potum vini crassi, dulcis, austri, cerevisiæ non debeat: frigide usum liberaliorem, maxime post balneum ac tempore infus æstuante: medicamento frigidum & narcoticorum usum frequentem: Violentum ab assumpto cibo motum: Somnum diuturnum: Alvi suppressiones validas: & inter cernendum Affectus animi concitatorios.

*Inflammationis causas eadem quas obstructio agnoscit. Quibus addere licet & sanguinè de vena quapiam, semper quidem, sed per ætus vehementesque corporis & animi contentionis excidentem, qui caloris regimine destitutus certoque loco coercitus & concretescens, cum amplius libere eventari nequeat, putredine concepta exardescit. Mast, Martini de morbis mesenteris.*

*Levisimum contactum non ferens*) Ab inflammatione musculus abdominis, cuiusque propagata, quæ mesenterii obidebat, phlegmone insigni tamen haud caret admiratione sensum Mesenterii adeo obtusum atque heretum esse, cum ex ipsius conformatione certum sit plurimis illud constare atque reserptum esse nervis: Ex Fallopiis namq. observat. Anatom. testimonio elucet, quamvis mesenterii pars superior, circa primam lumborum vertebra occasione membranæ ejusdem cum peritonæo substantia, cum primis vero arteriarum gemmarum, quæ ab Aorta supra regionem emulgentium progrediuntur exoriantur: ejusdem tamen a arteriis nervorum quorundam complexu, & illo quidem robustissimo, illico circumdari, ita ut originem progressumque illarum, insigniter oculetur, insensitque propagibus, adusque viscera pene omnia eorumdem ductum concomitetur: Pari ratione in exorta inferioris principii, sub finem rectæ lumborum vertebra, nervorum abunde est: eo quod arteria ista unica, ceu dictæ originis fundamentum, simul ac ab aorta procedit novo alio nervoso complexu manifesta comprehendatur, illique.

Beneri Anatomia Tom. III.

variis anfractibus donec in recto intestino, ad sedem usque & in parte coli obliteratur, associetur. *Idem ibidem.*

*Febris lenta*) Inflammationis in mesenterio quæseque sunt febres languida, occulta & lenta absque tamen siti & gravioribus symptomatibus functiones ægri quotidianas haud quamquam interpellans, anorexia, remissionis ac gravitatis sensus subter ventriculum, circa vehementem, & quæ nonnisi pressu animadvertitur, duriciem: Egestionis chylosæ, haud quamquam tamen ob digestionis vitium in ventriculo concitatur, quas ut plurimum ichor tenuis subsequitur, nullo doloris sensu, modo feotum ac siccum, modo fecibus permixtus desolens: absunt inflammationis hepatis signa, atque prout inflammatio intestinis vel tenuibus aut crassis, supernis vel inferis, aut umbilico vicinior est, molesta: Impensius tamen ac fortius hæc accidentia suam exercere ferociam solent, patribus inflammatione obsessis, Jecur vicinum in consorcium trahentibus, quo quidem in casu febres ardentes magna ex parte procedit: malo deinde ad suppurationem vergente, lenta atque tædiosa nimis subsequitur. *Idem ibidem.*

*Nascentique Abscessus*) Evenit quandoque mesenterii inflammatio in Abscessum vergat, aut ex humoribus acervatis à natura ibi depositis coercitisque, vel tumores aut tophi confertim erugant.

*Mesenterii nulla reliquia, &c.*) Licet autem Mesenterii viscus integrum inflammatione simul obfideat & suppuratione resolvi possit, circa subiecti destructionem, rationi minus sit consonum (malo namque eo vehementer promotio subest merus, ne vel emptione puris, aut vitio his ejusdem exhalationibus, præter antea labefactam chyli elaborationem, jecoris substantia corrumpatur vel erodatur, quæ reparari ullis ingenis cum nequeat, vitari hæmorrhagiam ac nutritionem totius; una cum viscerum omnium facultatibus evetti, universi habitum plane desiccat & metastasem consumi, tandem ex corrupto sanguine, ac facultate hepatis resoluta, substantiam viscosam putridam, saniolem, cruentam vel nigram deici opus est) Quia tamen non raro monstrat quædam in morbis & curacionibus, juxta Averoerem, observare licet, idcirco admirationem hic suspendere non alienum abs re fuerit. *Idem.*

*Mesenterii quæd universum*) Summa autem cum ratione Hippocrates in Coacis prædictionibus triplicem notavit ventris regionem, exindeque totidem tumorum ac apostemarum discrimina tactus ministerio elicit, Consequitur enim teste *Morato* l. de morbis lib. 4. cap. 2. haud fallaces de salute & interitu, & num ad suppurationem perventura sit affectio ista inflammatoria, vel in abscessum migratura, capi possunt: Primam regionem utroque hypochondrio, supra umbilicum in latera deducto designavit: Alteram inferiori subter umbilicum sede, hypogastrii nomine complexus est. Tertiam denique in medio circa umbilicum ventre notavit: Singulis autem in locis tumorum omnium oborti possit generis docet, qui tactus ministerio ubi dispefcuntur, triplici continentur serie, cen *Durus dolens, & mollis indolens*: Ex dictis locorum aut tumorum differentiis suppurationem concipere possum, Durus indolens, & mollis indolens, & hoc ipsum vel citius modo tardius frequentius aut rarius, qui hypochondriis aut umbilico viciniore sunt, idque ob caloris sui æterni remissionem vel intensionem, eo quod tumores universi, quo longius ad inferas recedunt partes, tanto serius maturantur: Quod si nati sub umbilico exoriantur suppurationi raro sint obnoxii: Idcirco non injuria Hippocrati 6. Epid. p. 2. Umbilicum harum suppurationum terminum constituit: Tumorem istorum variis observare licuit differentias, &c. *Idem.*

*Suppuratio in excuratone abunde*) Hinc ulceri

mesenterii oras. Frequenter ulcera sordida, multorum malorum fomites, aut collectio marciae purulentæ ac sordida intra binas mesenterii tunicas, majorem ventris inferioris partem occupantes, heparque sua putredine inficiunt, videntur: Quæ tamen signorum adminiculo à Renum suppuratione diligenter internoscenda sunt, eo quod Renum substantia putredine consumpta, etiam puris copiam inter peritonæi membranas subinde fluctare illaque totam ventris lumborumque regionem distendi, quandoque etiam cum dejectione, tum vomitu foetorem reddi usus docuit, referente *Fernelio* lib. 6. *Pathol.* cap. 12. Abscessum autem nonnulli, vel indurantur materia in eisdem effluente, vel suppurantur: In excludenda autem inde nata coagulis miranda Naturæ molimina adverte licet: Quandoque eorum morbus hic sponte exolvitur, erumpente ad alvum hac saburra, recludente sibi natura cæca ac delitescente spiracula, & absconditas ad hanc excretionem vias: Non raro etiam tumoris rudimenta, semel discussa, posthac quasi factio circuitu revertantur, *Fernelio* in *cons.* 68. autore: *Idem*.

*Cavum abdominis implebat amara &c.* ] Simul ac vero aliquas abscessus erupulo contingit, tunc pro natura inflammationis, & humoris heterogenei, nec non loci affecti conditione, & viscerum vicinorum, quæ peritidis vaporibus aut fœtigantur, aut plane inficiuntur symptomata, ac mirifici Naturæ in ejiciendo copiosus adventantur: Hinc modo puri sincerum & albidum magna copia, nulloque doloris sensu, per venam proximam in recti aut coli intestini cavitatem defluens, profunditur: modo inflammatione ad intestina postrema vergente, fecibus alvi permixtum redditur: (modo eadem superiora afficiunt, per vomitum: *Aut si eadem late diffusa sit per vomitum: & alvum simul, ut in casu præcedenti excernitur*) Aut, quod à oobis semel atque iterum est visum, factis caniculis magna vi per umbilicum fauces copiosa erumpit: aut per vena Naturæ ductu excluditur: Quin & *Dadones* innocuit, inflammatione semel in abscessum desineente, oullisque sordibus alvi polluta, singulis diebus bis terve per inferiores ultra quadringentum, modico salutaris dispendio ejecisse: *Annuum dejectionem materia purulenta, cruenta, fecibus permixta, copiosissima, à mesenterio procedentem vidimus anno 1658. Nicomachi Helovetorum, pro Dysenteria à Theologo medicastro habitam, in vira Nobili quinquagenario, nomine Petiti. Pierre, cui protento sequipede exarabat aqualiculus. A nobis frequenter usu Rhei & decocti traumatici, concurrentibus aliis prædictis, sanatum, quoniam ad marcerem admodum fuisse: biennio tamen exalto, & interperatam & intemperantem sed vix legem, recurrentem lethalem:* Majori tamen ex parte materia, tribus supra umbilicum digitis, loco fundo ventriculi vicino, & juxta hepatis regionem collecta putrescentisque, variis & differentionum & dolorum species excitat: quæ post diversos & chronicos sibi invicem succedentes morbos, inter peritonæum & abdominis musculos copiose profusa, vel in cavitatem ventris, rupto peritonæo, defluit, aut per abscessum exterius erumpit: *Idem*.

*Febri, marceris successu, vomitus, ventris, dolor, &c.* ] Abscessus isti malorum gravissimorum symptomatum, & ipsius denique mortis causa sunt: Observatum namque ex hoc fonte febres erraticas, hæc tamen uniformes, cum vomitu & canfa, necnon hypochoondrii utriusque tumore, *Hælerius* in *observat.* ad consilia curandi fol. 678. Alii cruentas dejectiones, ita ut sanguinem copiosum, nigrissimum, sæpius tamen corruptum, fecundissimum, malorum libraram pondere excreverint, vel materiam mollem nigram ferentemque, encasato sutorio non ab similes (qualem, dum hæc scribit, anno 1677. *munus Oberti, copiose excretam vi-*

*di à Pistere quendam Genevensi cui nomen Rovicte, qui primo sanguisus de præcordiorum anxietate & affus cum intenso capitis dolore, sibi & medicis tenuibus, obstructionum partium imi ventris indicibus, Paulo post ab usu remedium destruxerat* (Carum incursis & Pulmonum infarctum, cum febre continua, ut *Lathargo à Pulmonibus* indulto, de quo lib. 1. sect. 3. *Observe.* 39.) afflicta similitudine videretur, à quo expectorantis & cephalicorum usum resurrexit. Tandem soluta alvo, ejusmodi materiem, promigenti morbi reliquias, puri nigra sula similitudine & glutinosissimam deiecit per plures dies: Erat tamen nativæ caloris & ætatis beneficio, quemvis triplex corporis æconomia ingenti viro laboraret, ut *ajui salvi miraculo proxima cunctis ysaia*) exdoleret in copiosissimas, vigilias perpetuas, ob retros malignosque vapores, cor ac cerebrum indidem ferientes, indores faciei figidus: Virum debilitatem insignem, cum fidi clamoia, lingue ariditate, trilli ventriculi sensatione & ab terminibus fortissimis promanasse: Vide *Marcellum Donatum* *Hist. mil.* l. 4. c. 7. *Benivenium* de abditis cap. 33. *Idem*.

*Abdominis muscoli corrupti, lividi, &c.* ] Per consensum affecti à vitio mesenterii, ut & Jecur. Ex jam relaxis autem operis erit exigui cognoscere quæ via Inflammationes, Tumores & Abscessus istos à vicinarum partium affectibus discernere liceat: *Adulterum* enim in abdomine inflammatio, ac dolores (quodam eorum ductum, figuram ac posum protendantur, plerumque tamen sunt oblongi ac per totum ventrem extendi videntur, cutis externa condecescens, dolor vehementissime urget, adeit denique vomitus, nausea ac sitis intensa, Jecoris autem inflammatio comites habet febre æ acutam, singultum, deliria, hypochoondrii dextri gravitatem, dolorem acutum, hypochoondrii totum retrahentem, sese ad jugulum extendentem, assum siccum, ingens sibi fastidium, lingue colorem primo rubentem, mox nigricantem, sitim inexhaustam, bilis sinceræ, vitellinæ aut æruginosæ vomitum, alvi adstrictionem, tumorem in modum visceris totandum, ac decubitus in latere à affecto mollescit, Prædictos æmulantur & *Diaphragmæ* tumores, de quibus consule *P. Salium Diversum* lib. de affect. part. c. 8. *At Mesenterii* inflammatio dolorem effata dignum non consistat, ac nisi vehementius comprimitur, solo gravitatis seculi molesta est, febris denique, ac symptomatum omnium graviorum exors, affligit: Rupto dein abscessu, puri vel sincerum, aut fecibus permixtum, citra dolorem tamen enormem, excluditur: Id quod in intestinorum, ventriculi, jecoris aut lienis inflammatione (in quibus universis dolor vehementissimus affligit, symptomata gravissime urgent, negram sinita fauces deorsum, ob longiorem viæ tractum prodire consuevit) si hæc quæquam posse vero non est ab similes: Tactus præterea judicio facile licet internoscere utrum melaram ex toto, vel ex parte intumuerit: Sannes denique mesenterii discernitur ab illa quæ ab hepate defluit, eo quod hæc ad rubedinem vergere, sanguinemque corruptum indidem admixtum habere constat. Illam autem ad albedinem, vel citrinum inclinare colorem scilicet arguit.

*Febri leni, marceris successu, &c.* ] De suppurationum internarum moris egregie *Vallesius* comment. lib. 5. *Epid.* p. m. 461. Suppurationes, eis, quam à cute non absunt plurimum, facile deprehendantur vel ipso Chirurgi tactu: Quam veto in alio latente majiori arte opus est ad cognoscendum: Easque in thorace, aut magno alio ventre sunt suppurationes, aut parte cordi vicina, necessario Febres antecedunt, eoque quum pus conficitur crescunt, suntque horridæ. Et quum rumpuntur novos rigores cient, & jam inde faciunt pro dolore pondus, æque adeo fluctuationes

duationes in conversionibus, duransque deinde febricula remissior, sed ex quibus, nisi cito liberentur, tabescent homines: Verum accedunt Suppurationes quibusdam in locis in quibus non potest hæc expectantiam in brachio, aut parte alia longe sita à corde, potest adesse pus in alio latens, juxta ipsam os citra solum non quidam exit multum, neque ex inflammatione magna, sed exiguum & ex corrosione particularum juxta os, aut etiam ossis tunicam factum: Sed & quibusdam in partibus, inter inguina & alas, fieri potest ut pus lateat, cum neque febris maxima antecesserit, neque sensus ponderis, neque fluctuatio subsequuta sit: Febre quidem magna, quod longe etiam sit pars à corde, & non ex magna aliqua inflammatione, in suppurationem assuetam abeunte processerit malum, sed ex fluxione aliqua paricularum putrescente & corrosivente: Fluctuatio, aut pondus, quod non habeat pars ventrem aut vomitum insignem, sed inter musculos & peritonium, aut hoc & ossa interfluit, velut imbibitum par-

tibus pus: Quæ ergo signa in talibus expectanda sunt? certe febricula non potest abesse ubicunque pus notatum dignum collectum sit inter inguina & alas, non sub cute, sed in interioribus moram faciens, nam ubique ita sit, aut teneat arterias aliquas magnas, aut illis proximum est pus, per eas autem necesse est fuligines putridas in cor transmitti. Quo fit ut quibus incantata interna aliqua suppuratio est, lente, ignarique quid patiantur, tabescent cum quibusdam febriculis, quas nequean febres vocare sans sciunt vulgares Medici. Et hoc quidem commune est omnibus internis suppurationibus: magis vero his accidit quæ sunt in venis, in quibus quidem dolor tunc cessat quum pus erupit, & pro eo fit solum pondus. In his vero quæ juxta ossa, aut inter ipsa carnesque proximæ factæ sunt, febris non adeo apparet, sed quanto pus generatio magis procedit, tanto magis dolores ipsi ingravescunt, quia tanto magis procedit peritio, & partium aliarum sententiam corruptio & exesio.

§. 2. Celsus, Princeps (*lib. 1. tit. de melancholia*) Scorbuiticus, octo diebus ante mortem correptus fuit febricula Lenta. Aperto abdomine primo sese obtulit omentum foetidissimum atque putridum: Deinde mesenterium nigris varicibus undique circumseptum, cum Pancreate induratis multis magnisque glandulis impervio: Pulmonum tam secundum substantiam quam vasa insignis erat corruptela, &c.

§. 3. Vir ann. 32. occubuit epilepsia terminata in apoplexiam: anno ante febre Lenta, dein intermittente, laboraverat: Epiploon putre repertum est, à quo mesenterium infectum, inflammatione tentatum. (*Vide lib. 1. tit. de Epilepsia.*)

§. 4. Virgini menses suppressi cum febre Hætica. In mesenterio erant steatomata varia. In sinistro latere velut sacculus plenus materia turbida. (*Vide tit. de mensum suppressione lib. 3.*)

§. 5. Carharina N. hætica obiit: Viscera omnia flaccida, Vomica erat in pulmone: Mesenterii glandulæ solio majores, Hepar tabidum, &c. (*Vide tit. 3. tit. de Diarrhoea.*)

§. 6. Duo fratres contabuerunt: In sectione reperti sunt lapilli parvi in venis mesaraicis: tetius simili morbo mortuus est, sed initio Febre laborabat. *Roeslerus in miscell. cur. ann. 1670.*

§. 7. Filius N. viii. anno incidit in corruptum appetitum, hinc in Febriculam. Repertus est coagulus inter venas mesaraicas. (*lib. 3. tit. de Diarrhoea.*)

§. 8. *Platerus lib. 2.* Observat. pag. 505. ex relatione *Chiffletii* habuit, venas mesaraicas in Hætico sanguine crasso & concreto tumuisse, qui è majoribus venis coralli instar nigri coherens extrahebatur.

§. 9. Non raro in iis quos Febre Lenta conficit Mesenterium glandulis, materia quasi argillacea repletum reperitur. *Willis Traët. de Febris cap. 11.*

§. 10. Anno 1595. puellam annorum xii. aperui, incantata quæ credebatur, adeo miris symptomatibus per octennium correpta fuerat: Huic cor intra pericardium aquæ virulentæ innatabat, cui color viridis ac si marinam vidisset aquam: Causa mortis Pancreas erat, quod mirum in modum intumuerat, Jecoris eavæ parti arctissime adhaerens, ita scirrhum ut lapidem tangere te existimares. Dissectum candido plane intus conspiciebatur colore, haud aliter ac si albam pituitam, admodum induratum tractasses. Exrenuata omnino erat, extincta Febre Hætica. *P. Parvius Observat. 14.*

## OBSERVATIO XX.

*Febre Hætica, Lenta à corruptione Hepatis. 1. Ab ejus putrilagine. 2. Ab ejus ingenti Abcessu. 3. Ab ejus parenchymate in pus converso. 4. A graveolente pure sub ejus lobo minima. 5. Ab ejus duritia & vitio cystis fellea. 6. Ab eo putri & Renum vitio. 7. A Liene post casum indurato.*

§. 1. **F** Amula quædam cum longo tempore non sine febre decubisset, per me tandem utique restituta fuit sanitati, ita ut aliquot mensibus foras prodiret, Verum postea facta recidiva, rursus aliquot mensibus decubuit, neque tunc ulla medicamenta adhibuit, nisi cum jam macie exhausta jaceret, eum Febre Lenta, Siti que continua & fluxu colliquante: Atque cum tunc ad illam accitus essem, tumor circa stomachum apparuit rotundus, ita ut tunc apostema esse videretur, atque instante jam quasi morte, & remediis aptis adhibitis nihil juvantibus, & cum ex tactu pus sentiretur, constabat intus latere abscessum jam maturum, Chirurgus accitus incisionem in moribunda tentare non fuit ausus, nam die uno vel altero sequente obiit.

Facta post mortem incisione, inventus est lobus hepatis supra stomachum ascendisse, totius hepatis membrana illæsa quæ hepar continebat, sed ea incisa tota hepatis substantia corrupta & purulenta, vomica instar undique effluxit in capacitatem ventris cum putore intolerabili. *Forestus lib. 19. Observat. 20.*

Cum hic lobus hepatis supra stomachum ascendisset, & tumorem externum rotundum effecisset, aliquis iudicasse ex rotunditate affectum in ventriculo extrinsece, nullo apparente tumore in hypochondrio dextro tamen hepate toto suppurato, ob magnitudinem abscessus lobus ventriculum comprehendens conscenderat: Ideo hæc consideranda, ne in consimili casu quis fallatur, et si inflammatio hepatis & ventriculi eodem fere modo curentur, propria tamen remedia, sibi quæ familiaria eorum quodque requirit. Notas

quibus ab invicem distinguantur vide apud præcticos. *Idem.* Sunt qui pro nota inflammationis, & potissimum gibbe, addunt quod dolor est in dextra parte, sed illam notam falsam experientia agnovi: nam si hepar inflammetur in utraque parte, gravitas circa menses costas percipitur, sed in clavicula sinistra potius quam in contraria, quod dissectio docet, Hepatis enim extremitas ad sinistram venit, quare si inflammatio sit in extremitate hepatis, dolor in ea parte sentitur. *Remedeus Practic. lib. 2. cap. 37.*

§. 2. Ego Ictericum cum lenta febre, atrophiam &c. conspiciens, & regionem jecoris tractans, ibi causam mali latere dixi: Hepatis substantia fere tota absumpta erat, &c. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolore.*

§. 3. Conquerabatur quidam de Febricula nullis remediis cedente: dolor tandem successit in hypochondrio dextro, tumorque jecoris cum dyspnoea: paulo post morti cessit. In aperto cadavere ingens abscessus in lecore inventus est. *Vide lib. 3. tit. de Hypochondriorum dolore.*

Febricula nullis remediis cedente: Plurimi lentis febribus symptomaticis laborans, quas vulgus febres non putat elidisse, quod nullus rigor comes sit, frigus aut horror, vel angustia, unde sine iudicio cibis ægris porrigitur, nec ullius accessionis & remissionis: latens

tatio habetur. Nam tum lateat putredo, & humet conclusus sit, non sparsus per partes sensiles (à quo rigoris sensus) latens est & obscura impuritas, maxime vero id contingit si febris lenta periodice annexa sit, quod sæpe maximo ægrotum damno contingit.

§. 4. Vidi cui Hepatis parenchyma, illæsa sola superficie, in pus versum fuerat sub languida febre ac frequenti leipothymia. *Hernius aph. 41. 6.*

§. 5. Lictor ictus fuit bipennis in infima jecoris fibra, quam Lenta accedens Febricula confecit. Inveni sub vulnerata fibra plurimum graveolentis puris. *Tit. de vulneribus.*

§. 6. Fœmina per VII. vel VIII. annos vix unquam sine medicamentis deiecit: Tabes cum Hætica eam confecit: Hepar repertum durum, & folliculus fellis in sese collapsus ac fere totus consumptus. *Vide lib. 3. tit. de Alvo adstricta.*

§. 7. Civis N. in eadem hexam incidit cum nausea, vomitu & Febricula continua. Hepar fere totum erat putre: vesica fellis vacua, Intestina croceo colore tincta, Renes sic colorati. Eorum parenchyma lividum. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 8. Latus sinistrum decidui ex loco superiore afflitum fuit Fabri lignarii, hinc febris Hætica: Cujus causa fuit læsus lapsu isto Lien, qui præter modum induruit. *Vide lib. 3. de Hypochondr. tumore.*

## OBSERVATIO XXI.

Febris Lenta symptomatica à Renis dextri putredine. 1. A Rene dextro purulento. 2. Ab utroque in pus converso. 3. A sinistro toto absumpto cum vomica. 4. Ab utroque purulento cum carcinomate juxta vesicam. 5. A vermibus in utroque. 6. Ab ureteribus à calculo obstructis. 7. A Rene putri calculum continente. 8.

§. 1. Vir Nobil. Iacobus Myro, Senator Parisiensis, cum esset raræ texturæ & infirmæ valetudinis, circa initium Februarii 1640 incidit in Febrim continuam, quæ ex prægrandi abscessu rupto in Mesenterio, cum pravis aliquot symptomatis, præsertim vero diarrhoea biliosa & serosa, jugibus vigilis, hæmorrhoidibus, & universi corporis colliquatione, versa est in Lentam symptomaticam, qualem graphice descripsit Scholz nostræ lumen *Fernelius 4. path. cap. 16.* Ex hoc affectu postquam decubisset Nob. Senator, per quinque fere menses, quibus in dies pugnarum est arte medendi, tandem exitum superavit opem qua victa jacebat, fatigæ cessit morre lenissima, sine ulla vi, ullaque torsione, quaque placidiorem nullam potuisset unquam sperare aut optare Augustus ipse, sine ullo cruciatu & tormento, quam *Crævus* nomine indigitar solebat. Transactis ab excessu horis XII. dissectum fuit cadaver.

Inter cætera observatu dignissima quæ consulto annotavi & hoc unum fuit, Ren dexter, ex cujus virio supra annos x. sexvissimis doloribus nephriticis multoties fuerat divexatus: totus patris & in tabum redactus deprehensus: In ejus media substantia & cavitare oblongum & obliquum calculum comperi, angulosum, & ut ita dicam, cornicularem. Jam multum temporis

temperis erat ex quo haud dubie Ren ille non solum putris & saniosus, verum etiam totus gangrenosus affectus & corruptissimus, sui muneris nihil quicquam edebat, & propria secer-  
nendi sanguinis & feri excernendi facultate destitutus erat. Qui enim potuisset obstruc-  
tione ad grandiore calculo, & corrupta ad eum putredinis gradum propria substantia, ut  
ipsius renis nihil aliud quicquam haberet præter figuram & tunicam, quæ pro renis substan-  
tia metum tabum, idque nigerrimum continebat. Et tamen nulla unquam laboravit per to-  
tum morbum urinae suppressione. Quod sane sæpius quoque à xv. annis in hac populosissima  
urbe, calculosorum feracissima, observavi. Ergo non est semper verum uno Rene obstruc-  
to alterum statim cessare ab officio, cum ægrotum plurimi urinam profundant alterius Renis  
beneficio ad ultimum usque vitæ momentum. *Ex Observationibus Excell. Guidonis Patini Doct.  
Med. Parisiensis & Facult. Decani.*

**L**Entam symptomaticam qualem describit Fernelius, *[Sec.]* *Idem verbis*, Traditur tertio Hæticæ diffi-  
cultas ex partibus conjungitur affectione, præsertim ex le-  
coris, Lienis, ventriculi, Pulmonum, Thoracis Renum,  
vel Intestinorum inflammatione haud recte curata,  
maxime vero si purulenta evadat; Quam enim f. brillis  
calor duntius in his persistat conque obducatur, solum  
certe quidem difficile evadit, ac tum cordi cæterisque  
partibus summam siccitatem ingenerat. Cæterum hoc

proprie Hæticæ censeri non potest, sed symptomatica  
febris, eaque plerumque Lenta, id enim genus ex  
putredine nascitur, quam etiamnum diu tedolet, ejus  
quippe indicia in pulsu, in urina, in siti, in aliis que sym-  
ptomatis permanent. Quin & crebris in his excan-  
descencie etiam sine eis hinc, & inæqualitates & cre-  
bri horrores, quam præsertim purulenta est collectio:  
Itaque omnis quæ Hætica appellatur, ex putrida febre  
profecta, putredinis etiamnum particeps est.

§. 2. Nicolæa N. post Febrem Lentam Orthopnoica obiit: Repertus est ren dexter puru-  
lentus. *Lib. 2. de Dyspnæa.*

§. 3. Puella paralentis urinas reddebat cum Febre Lenta: Renes inventi sunt omnino in  
pus conversi. *Lib. 3. tit. de urinis p. n.*

§. 4. D. N. cum ante de Renibus non conquereretur, Febricula obtigit, ischuria, &c. Ren  
sinister totus absumptus, vomiceis plenus repertus. *Lib. 3. tit. de ventris Tumore.*

§. 5. Mercator (de quo tit. de Urina per alienum locum excreta) Cum lumborum dolore, urinae  
ardore Febrem lentam habuit. Dexter latus renis erat expers. Sinister pure ac stœaromare  
infectus. Sordidum carcinoma ambiebat meatum qui à vesica in rectum intestinum illi des-  
cendebat.

§. 6. Juvenis dolore renum oppressus Febre jugi extenuatus est. In utroque Renum cavo  
vermes crassii, albi, vivi inventi. *Lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 7. Magdalena N. post omnimodum lotii impedimentum Febre Lenta prehensa est, Cal-  
culus acuta apice obturabat Ureteris principium, ut omnem transituræ urinae intercluderet  
aditum, Oppositi renis ureter similiter obstruebatur. *Lib. 3. tit. de Ischuria.*

§. 8. Nob. N. incidit in Febram continuam, quæ in Lentam symptomaticam abiit, Ren  
dexter, ex cuius vitio supra x. decem annos laboraverat, totus putris, calculum in se conti-  
nens. *Lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

## OBSERVATIO XXII.

*Lenta febricula ab ulceribus vesicae inducitur. 1. A Calculo in vesica citra signa. 2.*

§. 1. **D**Octor, Franc. de Figueroa, Medicus Hispalensis æt. ann. lxx. urinam coepit emitte-  
re velut fuligine tinctam, parum & sæpe, cum tenfimo, hinc arenæ sabulose ex-  
cretionem: post Lentam febriculam suboritur, quæ incrementum cum lei, linguæ scabritie: Tabæ tan-  
dem brevi consumptus perlit: Vesicæ locus inspectus docta dissectione, Et in illius alveo in-  
venti sunt duo lapides inæquales, & horridi, substantia & colore rubri, sanguine descendi:  
Vesicæ corpus erat, & facies interna aphthis nigris & lividis corrupta, ut & permultis albis in  
circulo corrola. *Vide lib. 3. tit. de Dysuria.*

**I**llud est animadversione dignum quod febris illa  
quæ ab ejusmodi ulceribus fovetur, aut incipit,  
aut desinit in hæticam, licet à putrida incipiat, ut  
febris quæ fovetur ab ulcere pulmonis, quo fit ut  
omnes fere tabidi moriantur: quod cum in hoc ægro-  
to etiam innoteret, post alia auxilia impetavimus  
ut de lacte asinae juvenulae parum sumeret, à tribus  
unciiis incipiendo, ut paulatim ascenderet ad octo: Et  
licet his auxiliis profuturum spes esset (erat enim ade-  
quatam auxilium lapidis à vesica extractio) libenter  
consulvimus auxilium, hoc enim maxime urinae acri-  
monia temperatur & abstergitur ulcus: quoniam est

lac asinae, si quod aliud genus & vesicæ ulceratæ, seu  
ab acri humore lactescit, utilissimum & efficax auxi-  
lium: tamen nihil prohibentibus Tabæ consumptus  
perlit: Eadem symptomatica gentiliens, idem fere mor-  
bi progressus à nobis observatus in quodam Reli-  
giolo: qui etiam cum dolore in sinu mictus, & urina  
primo nigra, postea sanguinolenta, ultimo sabulosa,  
lenta cum febre abortiva ac nimò tertiana continua,  
de genere ardentium, Tabæ consumptus obiit: Est  
enim illud peculiare Tabæ genus quod sequitur pu-  
tridam aut corrolam ulce in vesica. *Caldera Tri-  
bunalis Medici pag. 225.*



§. 3. Quidam Lenta Febre detentus, foliacea sedimenta cum urina emittens. *Difsecta vesica ulcus in ea repertum lib. 3. tit. de Urinis p. 11.*

§. 4. Laborabat vir Nobiliss. D. Gul. Poole, ultra sexagesimum aliquot annos progressus, habens pleno, febre quadam lenta, ut plerumque solent senes, cum aepesia, virium langore, aliisque symptomatibus, qui tandem jugularis mortalitatem exiit.

Aperto post mortem corpore, inventus in vesica urinaria calculus, durissimus, pyriformis, in medio secundum longitudinem pervius: urina ex eo tanquam canali quodam sine omni impedimento profluente, xiv. unciarum pondere constans: In hoc Nob. Viro nulla apparebant calculi in vesica coagulati suspicio: ut miretur quis non sine causa, quomodo fieri pornerit, ut tantæ molis & ponderis lapis ab ægro non discerneretur. *Fridericus Loßius Observat. lib. 3.*

## OBSERVATIO XXIII.

*Febris Hæctica ab uteri corruptione. 1. Ab ejus affectu in gangranam desinente. 2.*

§. 1. **H**Ac nostra memoria à corruptione uteri observatum est primates mulieres interisse, febre latente & blande ægras tractante, quod expectationem spemque Medicorum non sine infamiz nota & ignorantis suspitione decepit. *Ballomius Histor. 1. lib. 2. consil.*

**E**X morbis quidam sunt Febres ipsæ, quidam febres comites habentatque: ex comites febres aliquando nihil habent ægræ, ut dicatur æger febrile necne nil interit, aliquando sunt magni momenti: Alias mites sunt admodum, aut saltem tales apprent, cum in recessu perniciem moliantur, ut partes hæ quæ pat-

tis alicujus principis dissonantia sequuntur, ægri enim sine sensu, & nil tale cogitantibus Medicis morimur: Ex hoc *Hippoc.* 1. de m. m. observat, qui dum loquitur de febre quæ vitium in utero, & perniciem jam perfectam consequitur, ait *ὡς ἐστὶν ὁ σπυγίς*, i. e. febrem esse mitem & mansuetam, ut videtur. *Idem.*

§. 2. Mulier post partum fluore muliebri tentatur, accedit febris horis vespertinis ingravescens; quæ in hecticam abiit, subsequente uteri gangæna. *Vide tit. de Fluore muliebri lib. 3.*

## OBSERVATIO XXIV.

*Febricula assidua in quodam cui corrosa duæ lumborum vertebrae reperta sunt. 1. A Glandulis in toto corpore dispersis.*

§. 1. **Q**uidam in Lumborum dolores incidit, comite Febticula & urinis admodum flammis. Illæsis renibus duæ Lumborum vertebrae corrosæ sunt repertæ, una cum aortæ & venæ cavæ ruptura. *Vide lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*

§. 2. Virgo scrofulis multiplicibus vexata ex Febre hæctica moritur. Reperimus mille ultra glandulas, majores, à faucibus ad os pubis. *Vide tit. de Tumoribus.*

## OBSERVATIO XXV.

*Intermittentium febrium causa deducta ab obstructione partiali ductum Pancreatis lateralem.*

§. 1. **A**liquoties publicæ quibuscumque presentibus, in Nosocomio Academico ægrorum præter alios graves affectus, intermittentibus quoque Febribus, & quidem non raro multifariis diutine laborantium & tandem mortuorum eadavera disseccantes, per syringam huic rei aptam, infudimus salen volatilem liquidum, & tinctura cærulea resectum in ductum Pancreaticum ubi in tenue hinc intestinum, qui sal quoniam nunc in plures, nunc in pauciores glandulas non penetrabat, dum in cæteris tum viciniorum remotiores, & quidem non coloratas, tam posteriores quam citeriores admitteretur, ipsasque colore suo inficeret, obstaculum aliquod hinc inde litasse, propter quod ne per laterales Pancreatis ductus omnes in connexas ipsi glandulas aceret, Liquor infusus impediretur, Spectatorum nemo non videbat, & procul omni dubitatione agnoscebat. *Fr. Sylvius Prælex lib. 1. cap. 30.*

§. 2. Obstructionem à Pancreatis ductibus observavimus in femina febrem Intermittemtem passa: In ejus dissectione per syringam infudimus liquorem volatilem ac cæruleum in ductum Pancreatis maiorem, ex quo in plerosque ductus laterales penetrabat, dum in paucis propter obstructionem sistebatur, unde dicto colore inficiebatur ipsa Pancreatis substantia in uno loco & non in alio. *Regnerus de Graaf Tractatu de Jucco Pancreatico c. 2. Thesi 175.*

§. 3. Recodori egregiam & Nob. Domicellam Annam de Gatinois, uxorem N. xx. ante annos Terciana autumnali laborasse, quæ in continuam & modicam tamen mutata, totam hyemem viguit, sed ingruis severissimis stomachi doloribus, duas tresve horas statim ab assumpto cibo juvenelam graviter exercentibus, Verosimile sane fuit focum Febris causamque

sanque doloris adeo acerbi in Pancreate latuisse. Nam huiusmodi dolores deinceps observavi à Scirrhuso Pancreate, graviter prementè ventriculum, cibo distentum excitati, aut potius recrudescere & exacerbari à compressu ventriculicibo pleni: Ex nominatim in Reverendo Canonico qui quatuor ante mortem annis de his doloribus fuit apud me semper conque-  
stus, id enim constitit satis ex dissectione corporis: *Car. Pisto Scit. 6. de morbu ab illavie serosa*  
pag. 594.

§. 4. Vir quidam Nobilis Campanus sanguineo & melancholico temperamento incidit in Febrem cum quodam dolore ad Dorsum & Lumbos, & totius corporis tremore insolito; qui post paucos dies feliciter desit fluxu hæmorrhoidali, lentò quidem & paucò; sed dolorifico; post aliquot dies utroque symptomate adaucto. Is auxilium Medici recusat, nullam à Medico-  
rum præceptis opem sperans, ineurabili quodam, ut aiebat affectu laborans: Morbum enim magicum esse; Ingravescente affectu & Febre incandescente, accitus D. Guido Patinus Medici-  
nam illi fecit, venæ sectione iterata & purgatione blanda ex cassiæ medulla, foliis fenæ & sy-  
rupò diarrhodon ægri statum perduxit ut in convalescentiæ spem lubens deveniret: Tandem  
quum vino multo, eoque moraciore usus esset in seio Medico, invaluit Febris; prostratz vires;  
fictor corporis nulli ferendus tandem cum anæsthesia & fugaci delirio extinctus est.

In dissecto cadavere apparuerunt omnia viscera nutritia supra modum pallida; à veteri in-  
temperie biliosa, quæ toto vitæ decursu dominatum obtinuerat, sed absque ullo eorum sub-  
stantiæ vitio: Ex utroque Pulmone leviter compresso ferum putre & fetidum defluebat: Sub-  
stantiæ cerebri serum multum instar seri lactis subvirescente innatabat, cuius portio in spinam  
dorsi decidua, Tremorem illum initio morbi concitaverat. Mortis autem causa fuit ingens  
abcessus in toto Pancreate latrans, cum multo pure & fétore intolerabili; pure inquam  
valde putrido & subviridi, cuius acrimonia glandulosum corpus pene universum exederat  
atque discerperat. *Thomas Bartholinus cent. ij. hist. xxxix. & Epist. 23. cent. ij.*

**A**D febrem iocerrantem producendam requi-  
ritur aliquid, quod in sanguine non existens,  
alias Synocha excitetur, sed ipsi admixtum una cum  
ipso ad dextrum cordis ventriculum deferatur, & qui-  
dem 1. A parte corporis tali, quæ per vasa sua, aut im-  
mediate aut mediate communicet cum corde: Funda-  
menti namque, postulatæ loco hic supponimus  
*Circularem sanguinis motum*, abunde probatum. 2. A  
parte tali, perque vasa talia, in qua, vel in quibus pos-  
sit ipse, non causam cæternam, in rebus non natur. fere  
consistens, ita infici & affici, ut subito, secundum  
aliquam saltem sui partem, in motu suo sistatur, atque  
ad tempus aliquod, idque nunc longius nunc brevius,  
impediatur ne hæcens continuo ad cor deveniat. 3.  
Hud idem tale sit oportet, quod aut propter solam sui  
horum stagnationem in focu suo vel vasificat, sponte,  
aut ob quamcumque aliam causam iocerrantem, à quovis  
eius affectu nominatim demonstrandamque ac  
concurrentem, tale vitium acquirit, ex quo (ubi deni-  
que ipsi quocumque modo ac medio restitutus est pa-  
rens ad cor aditus) vel solo vel aliis pariter determi-  
nandis joco, cuncta symptomata, etiam diversissima  
& in multis febrium intermittentiæ speciebus  
observabilia tum commode possint deduci, tum ra-  
tionali certa que curatio confirmari. 4. Impedimen-  
tum tale sit oportet, quod ad tempus humorem prius  
stagnantem cogere possit, postquam vero eodem transi-  
tum quancumque demum de causa concessit, mor ad  
pristinam revertatur naturam novam, & proinde si-  
milis prior humorem rursus eodem in loco simili-  
ter sistat, donec idem, uti prior, per paratam quovis  
modo viam effusus parvum ovum producat,  
idque tamdiu alterationem continetur, donec tandem  
(in prius perierit æger) aut sponte, aut casu, aut arte,  
notatum corrigatur tollaturve impedimentum, atque  
eo ipso intermittens curetur Febris: Si proinde omnes  
corporis humani humores suis in locis parari, aut  
etiam conservari, postea que per vasa sua ad dextrum  
cordis ventriculum deferri solitos excutiamus & ac-  
tente consideremus, observabimus præter sanguinem  
à paribus comitentibus omnibus ac singulis ad cor  
per venas restituentem, observabimus inquam 1. Bilem  
tam immediate quam mediate sanguini. 2. Lympham

immediate sanguini per vasa sua lymphatica. 3. Sac-  
cum Pancreaticum mediate duntaxat eidem defec-  
tenti per ductum proprium, iustitiam fistulam, la-  
teas venas & Ductum thoracicum. 4. Denique Sali-  
vam mediate tantum sanguini per suos ductus admi-  
ceri, atque una cum ipso ad dextrum cordis ventricu-  
lum propelli. Præter quos humores quatuor tum hæ-  
cenus iocerrant nulli ad dextrum cordis ventricu-  
lum delati, merito ab illorum uno vel pluribus febrium  
intermittentiæ, qua intermittentiæ, causam deduc-  
endam iudicamus, postquam ab ipso sanguine male  
affecto Synocham non intermittentiæ futuram fe-  
brem, ob ipsius motum ad cor perpetuum nemo non  
videt. Sanguine ergo relicto, à Bile febres intermit-  
tentes deducendas nemo censet, qui attenta mente con-  
sideraverit; nec in sua vesicula, nec in sui ductibus posse  
illam subito ab ulla causa externa ita infici & affici  
ibidem aut secundum aliquam sui partem in mora suo  
ad tempus sistatur, atque iterum vel sponte sua, vel ubi  
quamcumque aliam demonstrabilem causam internam  
inveniat viam; per quam quocumque modo setatur ad  
cor, ac vel sola vel alii iuncta producat symptomata  
superius notata: Concrevit aliquando bilis, nec diffi-  
teor, in cysti sua in calculus, tum in hepaticis suis  
ductibus in calculosam crustam, ac ut neutrum sit  
subito, ita nunquam observatum alterutrum ab inter-  
na causa, quin externa duntaxat iterum solutum, nec  
tamen ita ut aliquid Febris intermitte, finisse possit  
inde deduci: Iudicatur itidem aliquando fætor, ex  
albicantibus & viscidioribus alvi fecibus, in Ictero,  
bilem ad tenue intestinum quancumque demum de  
causa non deferri: Atramentum non semper, subinde licet,  
observatur Ictero intermittens conjuncta febris, quæ  
proinde ab illa bilis impedingentia deduci nequit. A  
Lymphâ similiter, febres intermittentes, quæ intermit-  
tentes hand videntur deducende, &c. ut ore 3. à Sali-  
va, &c. 4. vero à Sacco Pancreatico, Febres Intermit-  
tentes merito censet deducendas, quoniam & si sin-  
gula ad ipsas producendas Requisita notata hic eun-  
currere animo observaverit attentus: Nam 1. laudatus  
ille succus defertur ab ipso Pancreate, Parte tali, quæ  
per vasa sua & Ductus proprios mediate, supra nota-  
tos, communicat cum dextro cordis ventriculo. 2.  
Defertur

Defertur idem succus per vasa talia, Ductus nempe Laterales, in quorum uno vel pluribus potest ipse ob causam externam ita infici & affici, ut subito, secundum aliquam sui partem, in motu suo sistatur, atque ad tempus aliquod impediatur, ne bastenus continuo ad cor deveniat. Evenit autem illud quoties nunc ab aëre, nunc à vehemencie corporis motu, nunc à vigiliis protrahis, nunc ab animi solitudine, aut ita durante, nunc ab alimentis, condimentis medicamentisve acrioribus, vel quascunque demum causa alia, Pituita in tenui intestino plurimum colligi & accrevit solita, solvitur mox & sanguini admista una cum ipso quascunque ad omnes corporis partes propellitur, quin humoribus singulis, ubi vis preparatis artibus veltalius conjuncta cum idem per ipsoem vasa devolvitur: unde supervulcente subito causa externa, pituita coagulata apta (aëre frigido, ventis algidioribus, potu gelido, animi terrore aut mœrore summo, repentino praesettim, &c.) quemadmodum alibi, ita & in ductibus Pancreatis lateralibus, angustioribus scilicet, concrescit eadem pituita, ductus eisdem obstruit, & ne per illos succus ibidem idcirco stagnans, in Ductum modicum, ampliorum, & sic ulterius pergat, impedit. Illud autem in Pancreatice, quam cæteris forsan corporis partibus omnibus, acidior facilius sepiusque, quoniam cum Succo Pancreatice, cæteros humores omnes aciditate superantis, materia acidior jungitur, transportaturque facilius & copiosius, pituita, quin ab eadem secedit rursus non ita diffucilet, accedente causa ipsam coagulante, à qua promoveretur ille secellus inter Succum in cidioculum quidem, non tamen valde aciem, atque pituitam, sed visciditorem simul confusus tantum, nequidquam intine mistos, Nec tantum obstructionem in Ductibus Pancreatis Lateralibus ex modo enumeratis causis ex parte sibi contraria, sedque mutuo excipientibus fieri posse probabiliter concludimus, verum ipsam non semel actu factam evidentem in cadaverum sectionibus per autopsiam evicimus. Aliquoties tamque publice, &c. (vide *Textum*.)

Obstructionem illud obstructionem fuisse ab humore crasso visciditque laterales ductus infarciens, vel idcirco affluens, quoniam (præterquam quod nullum vel minimum, cui hoc adscriberetur occurreret vel compressionis vel alius angustiae speciei signum cause antecedentes omnes, quoties innotescunt, symptomata febres intermittentes comitari solita, ipsaque adeo easdem curandi ratio maxime rationalis ac certissima cum obstructione plane convenire & amussim quadareprehenduntur. 3. Talis est Succus Pancreatice, qui ob solam sui moram & stagnationem in Ductibus suis Lateralibus sponte sua vitium tale possit acquirere, adeo tunc ex ipso partim solo partim aliis postea determinandis junctis, cuncta symptomata febrium intermittentium etiam diversissima, commode, nec ita difficulter possunt deduci, atque rationali certaque curatione deduci: Est enim Succus Pancreatice sua natura Subacidus, quod evincunt non tantum argumenta plura à me in Disquisitione mea de Febribus 2. 6. 32. & sequ. proposita, sed ipsa experientia ab Ingeniosissimo *Reyn. de Graaf*, tum sepius alibi & hic in casibus, tum etiam semel in homine infelicitate subtrahere oppresso ac extincto instituta: hic succus quoniam Subacidus est idcirco simul talis est, qui ob solam sui moram & stagnationem in Ductibus suis quibuscunque sponte sua vitiosus, & quidem ita ut reddatur primum solido acidior, hinc obstruere suos ductus pituitam, si non in totum solvat & secum educat, perforet saltem ac permeet, atque tandem tum solus, tum aliis humoribus, postea explicandis, junctus, symptomata in febribus intermittentibus omnibus occurrentia omnia, non tantum producere possit, aut revera

producere: Testatur enim experientia quotidiana quavis acidia sponte sua reddi continuo acidiora: Sic acetum quo servatur diutius eo acclit magis: Cuius eventus ego sequentem puro rationem; acrimoniam nempe Acidorum augeri nunc, quoniam evanescant ex parte saltem spiritus volatiles acidiores illam temperantes, unde non mirum si conservatus liquor quavis acidus reddatur sensim acidior: Eandem ob causam, multis licet ignotam, promoveretur aciei confectio in loco igne vulgari calefacto, vel sub ædium scito fumo radiis Solis expositiorum enim ope via pariter spiritibus volatilibus citius & facilius sic ex parte paulatim effluxuris: Quemadmodum autem extra corpus nostrum Acidia quævis accelescunt: spon te magis natiq;que, ita in eodem ipsa, & nominatim Succum Pancreatice stagnantem amplius accescere probant symptomata, tum in melancholicis affectibus dictis perisquendum, quod hic magis urget, in febrium intermittentium initis observabilia, & sicut absque aliis acidia abusu sæpe oborta, ita uni acidia accepta referenda: Accecit vero Succus Pancreatice in Ductibus suis stagnans, quoniam secedit tunc ab ipso, sensim magis magisque spiritus volatilis ei secundum naturam conjunctus, ipsumque blande temperans: hic Succus Pancreatice stagnatione, sicut dictum est, Acidior & acclit factus, in obstruente ductus suos pituitam vim suam exerceat; ipsamque incidere incipit, quæ si teneat ac visciditate tanta prevalet, ut in totum, ab ipso abstergeri, solvi, atque inde removeri nequeat, eandem solum perterebat, sibi que per ipsam viam aperit quam pervadat: Symptomatum omnium in Febre Intermitte observabilium exortum in Succo Pancreatice acidior, aliisque humoribus ipsi junctis deducimus, postquam verbo præmisimus quatuor Requiritum novum hic quoque concurrere: Pituitam nempe viscidam, Ductus Pancreatis laterales obstruentem, talem esse, quæ non tantum in ipsis succum laudatum ad tempus cohere possit, ut ibi stagnet, sed in super postquam eadem, acrimonie sua viam sibi parant, transiit: coactis, mox iterum coeat, concresecat, solutamque ex parte obstructionem reparet ac redintegret, hinc & similes priori succum tandem eodem in loco similiter sistat, donec eadem ut prius, per apertam similiter viam cessus paroxysmum novum producat, idque tamdiu alternatim continueretur, donec quocunque modo tollatur in totum obstructio ac febri, aut ipsius Ager Pituitæ viscidæ naturam esse in perforata licet, sponte coeat iterum & coalescat, evincunt non tantum visciditatem omnia eandem mutationem spontaneam subire solita, verum insuper pleraque febres intermittentes, eradicatione, vel etiam jugulanti dicta medicamenta, sive sint incidentia & diuretica suborificave, sive vomitoria purgantive per alvum illa enim omnia videntur mihi febres intermittere, quasvis curare, quatenus pituitam viscidam in ductibus Pancreatice hærentem incidunt, solvunt, abstergeri atque secum ad intestina deducunt, quin aliquando diversa licet via, & corpore in totum educunt: Quod agnoscat facile quivis medicamenta Febribus intermittens felicitè tollenda specialia, vulgo specifica dicta, serio expendens transiensque.

Postquam pluribus deduximus Febrium intermittentium exortum in Succo Pancreatice in lateralibus suis ductibus obstruente stagnante, proximum jam est ut symptomata omnia, eademque diversissima in febribus istis notabilia, tum ab eodem, tum ab humoribus aliis cum ipso junctis deducamus: Succus ergo Pancreatice, stagnatione notatus, redditus naturalis acidior, atque post perterebatam obstruentem pituitam, in tenui intestini cavitate effusus, mox in confluentem bolemquealemqueque laetorgit, atque cum ipsa effluenscentiam solito acclitioris parit, & quidem pro

pro pituita occurrentis varietate variantem: Quamdiu enim succus ille acidus, pituita adjoritur, opprellam tenet bilem, tamdiu *Frigus* in multis circumstantiis differtur: plura tamen profert: Nam 1°. frequentissime in *Lumborum regione*, ubi confusus est tritum modo memoratorum in tenui intestino humotum, *Frigus* angit vehementer, quando succus predictus est acidior pituita non valde viscida, per quam penetrans intestinorum unicam frigoris sensu afficit: 2. In eadem Lumborum regione paucam vel nullam sentitur *Frigus*, quando valde viscida exiit pituita salivaris, succi pancreatici penetrationem ad intestini tunicam impediens, unde tunc, aut ventris medio, tenni nempe intestini parte ulteriores, aut in extremis duntaxat corporis partibus frigus urget. 3. In *capitis partibus interioribus* frigus maxime molestare videtur, quando idem humore icatet pituitoso, cui se jungens succus acidus, ejusve halitus, ibidem magis quam alibi se manifestat, ægrumque torquet. 4. Ab istidem halitibus lenitioribus, & ob admissam pituitam intestinale magis satientis ad Pulmones tendentibus, excitantur in paroxysmum initia *Ofitationes*, uti ab istidem per corporis habitum dispersis, *Pandulationes*, *Inquietudines*, *Arenæque lassitudines*: 5. Ab istidem halitibus acrioribus, minusque pituita admixta habentibus, sed gradibus acrimoniæ differentibus, produciuntur alias *Horror* alias *Rigor*. 6. Ab istidem halitibus majorem acrimoniæ obinentibus, *Dolores redentes lumbantes, ventrisque adeo terminis gignuntur*: sicut ab admixta multa pituita *Dolores gravantes* magis ac *contundentes*: 7. *Pulsus* mox cum accessu frequentior existit, ob irritationem cordis ab halitibus tum satulentis tum acris coactis: 8. Idem autem ductu frigore paulatim redditur minor, ratione aciditatis auctæ in halitibus assurgentibus, sanguinisque magis coagulati, adeoque ad sui rarefactionem minus apti: Unde non mirum si præterea una cum *Animali motu* universis *Debilit* sit *Pulsus*, qui proinde urgente valde frigore vix, aut ne vix quidem observari potest. Ubi autem omnis Succus Pancreaticus stagnatione acrior factus effusus est in tenue intestinum, aque Bilis aut per se acrior existens, aut ob vitiosam cum dicto succo factam effervescentiam acrior facta vicissim dominium nanciscitur, qui tunc fere plures atolluntur Halitus magis biliosi. 1. *Anxietatem circa præcordia* solent parere, quin nonnunquam *nauseam, vomitum*, aut *subinde alvi fluxum*. 2. Ab istidem halitibus magis biliosis partim ad ventriculum, hinc & fauces assurgentibus, partim ad Cor & Pulmones transeuntibus *Sitis* excitatur. 3. Bile dominium in corde quoque recuperante, Sanguis paulatim magis rarefit, *Pulsusque major* fit & *robustior*, permanente tamen in priore *frequentia*, ob irritationem non minus: 4. bilis acrimonia & sanguinis rarefactione aucta cordi contingentem: Sed impetis 4°. *calor & arder* in corde, hinc & *universa* angitur corpore, ob imperantem successive bilem: Nec mirum proinde si tunc 5°. ardori tali copulerur *Lingua ariditas*: cum halitus è sanguine in pulmones delato per asperam art. effusi eandem exsiccent. Nec mirum si 6°. rarefactio valde sanguine *difficilis* procedat & *augetur Respiratio*. Nec mirum si 7. *capitis præsertim assus*, Dolor, pulsatioque angat ægros, postquam nulla corporis pars non habet arterias, tantum accipit sanguinis: In ejus temporali regione cum sint anfractuose ille notabiles cerebri fissuræ, per quas grandes ferantur arteriæ, ibidem *Pulsatio* quam alibi sentitur molestior. Nec mirum quoque si 8. cum *Pigritia* tam frequenter urgeant, tum non raro *Delirium*: viriosi namque producantur tunc necessario spiritus animales, moveatur illdem turbulente, quin à quiete, tranquillitate saltem naturali impediuntur, quare mens illius egens turbatur, quin sæpe numero Amens fit æger. Postquam vero bilis à

Succo Pancreatico, ob stagnationem suam acrior facta, similiter facta acrioris æstus præternaturalis ac fustor paulatim remittere incipit, jamque ad serenitatem tranquillitatemque pristinam universi corporis humores disponuntur, qui durante paroxysmo turbulento penitus erant confusi, jam sensim ab invicem rursum secerant ac secedere, quin eorum aliqui, una cum potu liberalius fere assumpto, per Sudorem aut Urinam excerni solent.

Jam Febrium earundem secundum accessum & paroxysmum, intervallis nunc brevioribus nunc longioribus redeuntium, diversitatem, in Quotidianas, Tertianas, Quartanas, Quintanas, cæteraque distinctarum rationem consilique, quas puto diversissimas, profertam, explicataque opinioni meæ applicabo. Quamvis autem Typorum humorumve rationem diversam humoribus diversis vulgo adscriptam in totum haud sequar, non tamen puto humores illam diversitatem producant, fiant tamen multum; aut mediate tantum ad illius productionem. Quemadmodum ergo cujusvis Febtis Intermittentis Paroxysmus novus, secundum ea quæ docui, excitatur toties quoties à Succo Pancreatico ob stagnationem suam acrior facta perforatur pituita, ductum ejus lateralem obstruens, transiitque nominatus succus ad tenbe intestinum: hic post qualitercumque viriatam cum bile effervescit, & alia symptomata ibidem: ac in vicinia producta, per hæc venas, ductumque thoracicum; ac venam cavam superiorem, in dextrum cordis ventriculum, & sic porro, ita citius tardiusve penetrat perforaturque à memorato Succo Pancreatico pituita ipsius lateralem ductum obstruens: Hæc autem Pituita obstruens penetratio & perforatio citius vel tardius contingit, tum ratione ipsius pituitæ ductum obstruentis, tum ratione Succi Pancreatici eam perforantis: Quod namque viscidior & copiosior existit illa pituita, eo difficilior, adeoque tardius eadem perforabitur: & contra quod eadem minus existit glutinosa & paucior, eo perforabitur facilius, adeoque citius: Quo rursus existit Succus Pancreaticus per se acidior, simulque copiosior, eo citius acquirit stagnationem suam majorem, atque pituitæ obstruenti facilius citiusque perforandæ sufficientem acrimoniæ: Ex contra quo succus idem magis existit obtusus, vel austrius & paucior, eo difficilior & tardius eadem pituitæ perforandæ sufficientem acquirit acrimoniæ: Quo igitur pituita obstruens paucior erit & minus glutinosa, succus vero Pancreaticus acidior & copiosior, eo citius continget novus Intermittentis Febtis paroxysmus, adeoque *Quotidianus*, h. e. intra horas cunctas 24. recurrent: Quo vero pituita obstruens viscidior erit & copiosior, succusque Pancreaticus obtusior vel austrior & paucior, eo tardius obveniet novus intermit. Febtis paroxysmus, adeoque *Quartanas* vel *Quintanas*, & sic porro. Quoties autem 1°. medio modo se habebit Pituita obstruens, succusque Pancreaticus vel 2°. cum pituita obstruens viscidior aut copiosior concurrit Succus Pancreaticus per se acidior aut copiosior; Vel 3°. cum pituita minus glutinosa paucave, Succus Pancreaticus existit istdem minus acidus pauciusve, toties alternis fere diebus recurrent novi febrium paroxysmi, producenturque *Tertiane*, supra cæteras febtes intermittentes omnes multum in suis symptomatibus differentes, & quidem ob triplicem modo memoratum pituitæ obstruentis, succique pancreatici eam perforantis respectum possibilem: Ex his non ita difficulte Intermittentium febris, & multiplicium, variisque compositarum cause poterunt inveniri: obstructions puto tam variz cum in variis Pancreaticis ductibus lateralibus simul producantur: Difficultas vero superest magis urgens in explicanda causa febris intermittens simplicis, *Quartana* scil. aut

*Tertiana* multiplicatione, hic in duplicem triplicemve mutatione, Quam Ego arbitror accidere quoties ob erratum in *Dixta*, medicamentoive, aut venenis potius, perperam usurparis paratum, pituita nova in corpore ac intestino tenui praesertim solvitur, hinc & una cum sanguine quaquaversum; ergo ad *Pancreas* quoque propellitur; quae in uno pluribusve ipsius ductibus, prius non affectis, quacunque de causa iterum coagulata, obstructionem à priore magis vel minus differentem producens, febrem quoque prodicere priore magis vel minus gravem: Atque hoc ita fieri quotidiana, si non evincit, saltem abunde confirmat experientia &c. De curatione juxta eandem doctrinam, variasque *Intermitt. febrium*, quoad symptomata constantia differentia, vide *ibidem*.

*Thoma Willis* effervescentiam sanguinis quae *Febrim Intermittentem* constituit, unice dependere statuit à *Succi nutritii* assimilatione, ipsius sanguinis vicio praepedita: Dum enim *Succus nutritivus* cum sanguine non assimilatur; licet ejus particulae velut heterogeneum quoddam, & non exatè congener in sanguinis massa persistant, adhuc tamen cum eo sine tumultu aut perturbatione circulantur, donec eis ad effervescentiam etiam massa saturatur: tum propius bubulit illa, & effervescentiam febrilem cuncitat (non minus intensam & violentam, durante scilicet paroxysmo, quam in continuis) quae vel subigitur, vel foras protrahitur quod heterogeneum est: corpus consorcio cum sanguine liberatur, sequitur accessio febrilis intermissio, postea demum à novo hujus succi supplemento

novus inducitur paroxysmus: Quapropter Intermittenti praecognita hoc peculiare est, quod quaedam *anapsis* seu intermissionis habeat tempus: Quam vero *Rigoris & Frigoris* quae in paroxysmo intermittenti excitantur, hanc statuit, puerum *Succi nutritii* in materiam nitrosam & acetosam degenerare fluorem & turgescensiam, quo spiritus & calor *viscissimi* obundantur (unde in toto corpore frigoris sensus percipitur, & corpora nervosa irritata in tremore cidentur) Postea autem cum particulis huius nitrosae aliqua ex parte in superficie corporis praemis, earum gravamine & opprobrio sanguis nonnihil liberatur, spiritus vitales se recolligunt & emicare incipiunt, & sic calor succedit intensissimus, qui usque persistit donec materia ista fermentativa peritas combusta, subacta & subiliata, sudore aut transpiratione insensibili evaporet: Quod vero statim temporum intervallo Accessione plerumque redeunt, ut non sit automatum horologicum exactius: Rationem talem reddit, quod nimirum aequalis succi nutritii portio, sanguini in vasis consuetudine consuetudine ut plurimum suppeditatur. Causam vero Periodicam, Quotidianam, Tertianam, Quartanam constituentium, adscribit diversae sanguinis constitutioni, quae nimirum à debili temperie in diathesi modo acrem, modo acidam aut austeram pervertitur: Pro diversa enim hujus dyscrasia, succus alibilis recens advectus plius aut minus à mutatione deficiat, & in materiam citius aut tardius fermentescere aptam degenerat.

## OBSERVATIO XXVI.

*Febris Tertiana in senes lethali ob visum peritonaei, mesenterii & pancreatis.*

Cum anno C. 1668. Illustr. & Rever. Dr. *Joh. Rozyci* Episcopus Chelmenfis &c. septuagenario major Thorunsi ut Commissarius Regis Polonae degens, 11. Aug. in Febrim Tertianam exquistam incidisset, ab eaque adhuc in isto mense per medicamentum opportune eidem à Nobis exhibitum, fortunante Deo, scilicet purgationem levem, venae sectionem, & pulverem nostrum antifebrilem ab eadem liberatus esset: accidit ut ex pravo victu nempe fructuum horariorum atque vini cerasitis nimio usu, die 2. Sept. recidivam passus sit: quae iterum benedictae summo Archiatro, beneficio pilularum nostrarum antifebrilium feliciter praefugata, hinc sanus usque ad Abbatiam Mogilensem novem miliaribus Thorunio distantem profectus sit, ibidemque usque ad anni 1669. ultimos dies mensis April. satis vegetus, in ista praesertim aetate permansibilis tam ex nimio usu lactis coagulati & cremoris ejusdem, secunda vice in Febrim Tertianam recidit, ad quem ego 2. Mali veniens, post secundum paroxysmum lenes evacuations porrexi: subsequens autem 3. paroxysmo venam dextri brachii medianam incidere jussi, tum ventriculo corroborantibus prospiciens febrem denuo, Deo proprio, abegi: Sed cum ille ex lacticiolis, quibus admodum delectabatur, accederet, tertia vice in fine Iulii, recidivam incurrisset, tertia Iulii viribus potatis vitam cum morte commutavit; ad quem 4. Iulii ejusdem mensis vocatus accedens, eadaver cum permissione domesticorum aperire jussi.

In quo omnia secundam naturam, inventa fuere, praeter peritonaeum & mesenterium atque pancreas, quae singula nonnihil corrupta & saniosa deprehendebantur: Heparetiam durius quam secundum naturam esse consueverat.

Apparet inde quam vera fuerit in hoc casu *Clar. Hylarii* annotatio, comm. in aph. 12. §. 2. Post effusam tam relicta materia, tum dispositio morbosa recidivam facere consueverit, nisi anteverit purgatione vel alteratione: Acidit tamen aliquando circa hanc ut fiat recidiva ob interperantem victum aegri, si plura sumptis quam conficere possit: Recidit etiam in morbum saepe convalescens propter externas injurias, id quod praesens casus confirmat: Hoc refert aphor. citatum. *Sym. Scuturini in miscell. cur. ann. 1674. 75. §. 76. p. 126.*

*Septuagenario major.* 1. Qui debili calore sunt, ut *Senes*, ex quibus febribus tentantur, Et quaedam corpora quae debiliore caloris naturalis febriciantur interius,

exteriori refrigerata, atque adeo non solum secundum caput, manus ac pedes, sed & secundum aetatem arteriam, pulmonem & thoracem, & internum os, & hanc ob causam expirant frigidum, exiguum & rursus, & habent frigidas linguas: si demum contingant calores & frigoris vicissitudines, ut praeter caloris naturalis extinctionem admodum frigeant, denno intense recalescent, hinc fingere sursum, arsurum iterum non semel: Certe cum naturalis calor est exiguus, & is qui praeter naturam magnus, accendit hae vicissitudines, excitata enim flamma ingenti à potescentibus succis, & eorum fuliginibus, ut vel in cadaveribus aliquando nunquam ipsiusmet caloris ignei vi consumptis quibuscumque, & dissipatis, apparente interno frigore: accedere enim igne

igne calefcunt, eam recedit, refrigeratur: Corpus ergo ægroci, in quo frigus internum jam vadit, accedente causa calorifica inflammatur, & recedente refrigerat: accedit vero & recedit per vicissitudines, ut in aliis cum facit exacerbationes: Nam exigua illa febricitula, quæ per remissiones superest in aliis continuis febribus, non potest, cum calor est exiguus, totum corpus calefcere, sed eam solum partem in qua potestens succus hæret: Quis nisi calor naturalis calorem, à quacunque causa erexitur, in corpus deferat, non potest in totum corpus se effundere, nisi omnino sit maximus: Si enim cavadere una in parte ignem admovent, eam solum partem urens, reliquum corpus frigidum esse senties neque certe totum calefcies, nisi totum occupet flamma: sc. non adiant spiritus & arterialis sanguis, qui calorem p. n. concipientes, in totum deferant: *Passifus lib. 3. Epid. sect. 3. Aegro 3.* Vicissitudo illa caloris & frigoris in senibus febriquantibus, ob caloris resurrexiones, qui ad extinctionem præparat, ob sanguinis penuriam contingunt, calorem in totum corpus transmittentis & succi nutritii, ex alimento dato, appulsus negatum, qui ex contraria teliduum cinerum in calorem flammamque reaccendit hoc absumptum refrigerario succedit, donec ex iterato alimento recentis flammæ suscitabulum accedat.

*Vitam cum morte commutavit* In senibus Febres intermittentes, etiam non gravibus stiparum symptomatis, ut plurimum lethales esse experientia fidem facit: E plurimis exemplis nunc hoc sufficit Nobilis matrona, ex illa *Durasterii* familia, Uxor Viri Exc. & Generis *D. Gallia*. Consulis Genevensis, robustissima, quæ octogesimo annu pene ætate gerat, anno 1672, mense Maio Febre Tertianâ prehenditur, quæ intra septem circiter Mea opera liberatur: Nunc tibi tobi confis, dimissis domiticiis & à cubiculo faciesse iussu, virium periculum factu à lecto exiit, atque ad fenestras levissime contexta, flante Borea propetatur: Ab incute suscepto frigidiore ætate, quinta post solutionem die recidit Tertianâ, quanto paroxismo ierhalis.

*Beneficio pilularum ægri febrilius profligata* Posterioribus annis, Summi Dei clemencia, in aurore cortex ille Peruvianus, cujus dextro usu febriam curas sepe omnino interciperit, & sine recidiva: non quartana in solum, quibus destinatus censetur, sed & omnium intermittentium, imo ad *diarrhoeas* non omnino devolventium: Nec juvenum solum, sed & senum, quoniam decrepitorum: Exemplum præbere vicinus meus, vir octogenario major, Urbis Portitor, *Gedon Chausardus*, illius ope, à se ipsi exhiberi quærere intra biennium, Febre Tertianâ defunctus est: Tandem anno postremo Quartana quoque correptus, post alterum paroxysmum adeo illi atrox fuerat vires, ut tertio ferendo omniam iudicio impar esset: facies enim jam *Hippocratis*, cum stertore & mortis imminebat omnibus indicis, Cardiacorum ope refuscitatus, opem meam implorat, seque cetero exitio destinatum afficit: Auxilium pollicetur & salutem, si modo Pulverem illum, ingratum alias, assumete non renuat, annuit, & in primo paroxysmi preludio, illius Zibtheria, remixtum cum vino haurit: Illico, quasi incantamento, paroxysmus, qui præ foribus erat, retrocedit, & paucis post diebus, post sumpto levi purgante, à febre omnino liber evasit. Nunc salvas & in columis, quamquam postmodum leves aliquot paroxysmos tertianæ passus sit, & aut trimense Ophthalmis, cui per me sanæ succedit mense sequenti erysipelas cruris phlegmonodes, à quo plenissime liberatus est, jam, facillime deambulat & officio cum assidue fungitur: Pulvis autem dictus non ex vino solum exhibetur, aut Potions forma, sed ex aquis stillaticis, ubi à calore vini metus est, Et in bolos reformatus cum aliquo syrupo, conserva, &c. in illis qui potiones nequeunt, atque eo modo datum observavi dimidia

doxi certe operari.

*Recidivam passus sit* Recidivæ nihil aliud sunt quam ejusdem morbi, qui paulo ante quævit, reiteration, ex eadem causa intrinseca, modo & ratione quo prior, actiones affligens: Sic constat quod nihil inter ipsum morbum & factum recidivam interfit, sed unicum esse reversionem, idque in essentia propria, cum inter recidivam & morbum primum solum remissio, non autem omnimoda intermissio fiat: Species, seu differentie, sunt varie, prout varie differentie morborum reperiuntur: Ex harum natura aliæ sunt improprie, vel proprie: Improprie Recidivæ sunt duplici modo: 1. Cum quidem ad curacionem morbus videtur remissus, qui tamen ob pertinacem causam visceribus penitus infixam gravior recurrit: Sic opere Medico tritissimum est, sponte vel arte materiam in hydropse evacuare, quæ de causa quamvis demutetur tumor, tamen malum reperit, & id fit ob rationem andram: 2. Cum humor à parte una in alteram transfertur, qui tamen ejusdem idem morbum perit: Proprie Recidiva est, cum humor ad suam fontem revertitur, & ex eadem causa tandem morbi ideam exprimit, legis istam actionibus, ob paroxysmos & symptoma eadem, sive illud decorioribus accidentibus, dum periculatur æger, sive levioribus, quod reliquum morbi à refocillatis viribus focus exagitantur. Alia etiam est perfecta Reversio morbi, si revertitur is qui plane remissus: Alia imperfecta est, quando symptoma & paroxysmi quidem remittunt, morbus tamen non intermittit: *Hippocratis* etiam Reditus morborum, alios *κατὰ λόγον* id est *εὐλογοῦ* vocat, alios *ἀπὸ κατὰ λόγον* id est *ἐπὶ λόγον* solutares appellat, sc. quod ritè fiant post dimissionem & infidas cides, nihilque mali incuriant: *Οὐδὲ κατὰ λόγον* sunt eæ quæ temerarie sunt, & præter rationem regrediantur cum vires periculis. Porro Recidiva alia est Legitima, alia Illegitima, Legitima est quando recidiva cū radice, h. e. priori morbo plane convenit: Illegitima vero si ex eadem causa novus morbus oritur, vel tamen aliquantulum diversus à priori.

Omnes autem Recidivæ fiant à reliquis humoribus, qui concoctione à natura separari nequeant, quas *Hippocr.* τὸ ὕγαντὸν παρανοῦν ἀὲ μὴ κατὰ λόγον appellat: *Epid. 3. & lib. 6. Epid. 1. & 2.* & sunt *χρῶμα λεῖψαν* τὸ τὴν μὲν χρομῆν: hæc *Hipp.* fert. de his quæ infra modum & ex parte vacuantur: Hoc ideo fit quod morborum causæ non sint ejusdem conditionis, sed pars alia tenuior, alia vero crassior sit: Crassi humores difficilior & tardius sunt cocti ac venies, unde fit ut tenuiores facilius & citius sive eopia sive qualitate advesantur, excernantur: quamvis etiam nondum concocti, vel putrefacti sint: Hi aliquā diu in corpore sine febre possunt esse, & demum ex super natura putrescere, aut interperie partis, quæ contahitur aut vi morbi, aut irrita agitione, quæ contingit quādo materia agitur & mutatur: Quid mirum itaque est si putrescentibus reliqui materiæ prioris morbi, idem morbus reviviscat, & cū priore jungatur, cum ex eadem radice proveniat. Sic colligitur propie in illis morbis, qui per crisin solent finiri: & in vigore sensibili judicari à causatione, recidivæ esse timendum: non vero in illis qui vigore ex quo per tempus declinationis paulatim decrevant, quod à caloris nativi virtute ipsorum ex utraque emendatur.

Et si ad utramque morbi solutionem coctione humorum opus est, tamen illa plane est diversa: Equidem ad criticam evacuationem satis est hærere à natura devictos esse, ut sponte, vel artis subsidio ex corpore discedant: hoc si non contigerit quocunque modo morbus multiplicata humoribus terratur, ex ipsis tamen recidiva metuenda est: Humores enim calidi & sicci, qui acutorum & morborum & calidum sunt alimentum, sunt hujusmodi oleis, ut licet ex parte coquantur, tamen ad eam benigne ignem mor-

perveniant, ut sine seditione in corpore possint nostro effluere, quando morbi per vias, absque evacuatione cessant, non solum crudi humores, qui morborum talium cause sunt à natura subiguntur, sed etiam adeo benigni evadunt, ut in posterum naturam non laedant, verum etiam ut nutrimentum in corporis substantiam concedant. Huiusmodi enim morbi cum à succis cruidis & frigidis oriuntur utique natura sibi eos concodione familiares reddit: Ex eo præclare dicit Hippocrates, *Quod in pus vertitur, ad morbi reversionem non facit*, ipsa namque maturatio, & judicationis & excretionis rationem habet.

Ita deprehendimus ex quibus morbis Recidivæ incidere solent, scilicet his quoque acies & calidi humores præcitantur. Hi utcumque sedati fuerint tamen revertuntur, si non est facta copiosa evacuatio. Nam sic sufficienter evacuatio, sive cum Natura molitur, sive ars, quod humores ad expulsionem inepti sunt ob quantitatem vel qualitatem: Sub horum alterutro vitio calor stultus facit, præsertim si viæ fuerint impeditæ: Etiam Recidivæ causa est materię morbosæ violentia, quæ præmaturam judicationem accedat, scilicet cum adhuc omnia cruda sunt, ex quo necessarii morborum Recidivæ subsequuntur: *Hippocr. 2. Epid. sect. 1.* Et sic id ratione materię diversæ, uti dictum, Medicis errore recidivæ sæpe reperit, si is contra præceptum Hippocr. 2. aph. 1. integre iudicata novæ & movere medicamentis, vel aliis irritamentis, cum hoc tempore convalescentem plenius victu reficere debeat: Item Medicus si iusta dozi remedia non adhibet, etiam Recidivæ accelerat: Ea tantum, si infra modum sunt, humores agitant & corpus calefactione, ex quo aquosum (id est serum tanquam bilis fixum) quod bili in-

ferentissimum est absumitur, & bilis relinquitur præcipuum febribus alimentum, ut id sensus docet Hippocr. 4. de morbis p. 507. Etiam morbi Recidivæ contingit, si idem Medicus intemperlem in aliquo viscere relicto negligit, ob quam istius alimentum facile in fontem morbi concedit, vel quando etiam impuris corporibus victum concedit.

Signa Recidivarum diagnostica compendiose recensentur ab Hippocr. lib. Judic. p. 54. *Morborum reversionibus tentantur, quibus circa febrem vehementes viri, aut in valens somni accidunt, aut corporis robur subitur, aut singulorum morborum dolores adsunt, & quibus febres non accedentibus solationis signis, neque diebus judicatoriis quiescent: Quod si deficiente febre, & accedente sudore minam fulvam, albam subsidentiam continenter reddiderunt, his in dies febrium reversiones sperato: Veluti etiam si judicatione facta urina rubra subsidentiam rubram continens reddiderit, his quoque febribus reverte eodem die contingit, & eaque parvi solvantur: Tertio etiam febribus reversionem facit, nisi post reversionem die impari dimiserit, & plerumque si non cula fuerint urina, neque alia signa secundam reversionem processerint, morbus iudicatorio die revertitur: Quibus etiam judicationis tempore exorta ad aures tubercula non suppurantur his salvis morbi reversione præceduntur ratione simili circumvenit contingit. Nullius autem Recidivæ suspicio incidit quando concoditionis signa adsunt. 1. Epid. sect. 2.* Huiusmodi percutit ex urinarum colore in melius mutato, aut levi quadam crassitie, quæ refrigerata parum subsidet, vel etiam quasi nubes elevatur. *Marinus Bogdanus in Theobis Inauguralibus.*

## OBSERVATIO XXVII.

*Febris Tertiana vitio lecoris tumidi, retorridi, nec-non Lienis indurata. 1. Ab Hepatis immuni more. 2. Ab Eodem scirrhoso & glandulis mesenterii tumidis. 3. A bile æruginosa circa ejus cavam collecta. 4. A bile sincera intra ejus membranas collecta. 5. A lecore duro ex angini, ventriculi tunica exteriori erosa. 6. Ab obstructa cysti & meatibus per lecoris substantiam decurrentibus. 7.*

§. 1. **M** Emini Febrem Tertianam, quæ tenuit Ampl. Præsidem ante quinque annos formam habuisse in Hepare, ejus indicium Tumor inflammatorius visceris ei superstes, qui in suppurarum abiit, ut constat ex sero purulento, commixto sanguinis massæ, vena secta conspicuo, & lingua semper albescente, vapore scilicet purulento tincta, quique accessu febribus quartana exacto tandem anno mortem intulit.

Eius in cadavere Hepar insigniter tumefactum & quasi retorridum, sed adhuc aspersum pure fuit repperit: Lien totus ambrus & carnis instar niger. *Car. Piso de morbis à Serosa claudis, sect. 6.*

§. 2. Recordor etiam Nob. adolescentem, *Joh. de Pouly*, Tertiana laborasse gravi admodum & producta, cujus paroxysmi circa meridiem à mediocri Rigore cum inciperent, sudore largo sequenti solvebantur, Febre autem ingravescente, derepente & in continuam mutata, subito me absente suffocatus interit.

Dissecto cadavere Hepar immensi tumore, & jam scirrhoso distentum inventum, & vomica pure prægnans in pulmone, nam biduo ante peripneumonia oppressus fuerat. *Idem ibidem.*

§. 3. Non ita pridem excessit è vivis Rever. N. à Tertiana febre comitata magno admodum tumore Hepatis, eoque duro, nec non abdominis dextri, & eo etiam infra umbilicum porrecto confectus.

In hujus cadavere, præter Hepar scirrhosum & oppido grande, observatæ glandulæ omnes dextri lateris, una cum pancreate, tumore supra admirationem magno & duro distentæ retorridæque, ut vere lapideas diceret: Hic autem, ut accepi, ante Tertianam Lenta febre bybernaque detentus extabuerat. *Idem.*

**G**landula omnes una cum Pancreate) Scilicet Omenci, mesenterii, huiusque glandula major, Pancreas *Affatus* dicta, in quibus *Fermentis* se lenta-

rum febrium, errantium, ac latentium morborum causas ut plurimum se deprehendisse scribit: Revertentes partes hæc errorum diæte ac intemperantiæ deposi-

ficariæ sunt, vasorum melsariorum, lymphaticorum &c. juxta nonnullos, nervorum impuritatibus ex-  
cipiant.

*Ex ferro commixto sanguinis massa, &c. §. 1.* Februm intermittens materiam supponit minime esse simplicem illam cacochymiam famosam, Si quidem, aut bilis, pituita aut melancholia excrementi humores scorum haud quaquam reperiantur ea copia cum qua febrem in toto exsistent, sed potius esse sanguinem, impurum illum quidem sive semi-sanguinem, quanquam crudum, temperatum vel etiam biliolum auratrabilem, qui in portis hepatis &c. lienis eorumque cum radicibus per duplex viscum propagatur, tum ramis & propaginibus per mesereum & epiploon glandulasque varias perreptantibus,

tandemque ventriculo & intestinis implantatis contentus putrescat, utaturve aut simpliciter ebulliat sed sub ea conditione ut quævis alteratio minime sit continuata, sed interpolata, quæcunque ratione interrumptantur: Hæc enim est jam pervagata opinio de loco & de loco putredinis intermittens febrium à Divino primam *Fernelius* meditata, explicataque ab Excell. *Mercato* & *Rudio* aliisque Inuolentissimis rationibus, denique experimentis confirmata. *Idem ibidem.*

*Hepar quasi retortidum §. 1.* Causa Febris Tertianæ est bilis putrefacta; pender autem hæc ex causis superius à nobis enarratis, Potissimum ex Jecore retortido, unde scribit *Galen.* Tertianas semper fieri Jecore laborante. *Præmorsum lib. 2. de Febribus cap. 2.*

§. 4. Affligebat Nob. Scorum, & quidem juvenem Tertianâ duplex, jamque xxij. diem persequabatur, comitante usque & usque diarrhœa biliôsa: Utrique malo obviam ibat Medicus peregrinus venæ sectione decies repetita, Pitana, eonsectione diahyacinthi, aliis: Quibus minime respondentibus expectationi, æger allatum Londino spiritum Tartari, nescio quo popularium suadente, per intervalla ad guttas plures hauriebat, unde viribus quidem sibi audior videbatur febre tamen nequaquam immutata: Succedere tandem fæces alvi nigricantes, quas post aliquot dies mors sequuta.

Aperto cadavere hæc paruerunt, 1. Pulmo exteriùs attis sparsus maculis, interius pure hinc inde restagnans. 2. Pars Hepatis gibba, sanæ simillima, sed coloris obsoleti & in album tendentis: Sima, quæ felleæ vesicæ propior, cœrulea plane: neque lambebat duntaxat superficiem invisus ille color, sed in ipsam jecoris substantiam altè penetraverat: Ut conjicere hinc liceat bilem initio morbi hujus fuisse valde æruginosam, adeoque vicina omnia fœdo colore tinxisse: qua per continuam diarrhœam tandem deficiente, non ideo à morte vacua fuit vesicula fellis, sed alia sane bile, & quidem subflava, eaque dilutissima jam distendebatur, quæ perpetuò in intestina, ut erat texturæ nimis fluidæ excurrrens, non poterat non alvum identidem ad exeretiones frequentes sollicitare: Sed cur æruginosa ante bilis? laboraverat ante annum quartana in qua cum præcipue triumphet succus acidus, credibile aliquid ejus in vesiculam quoque fellis sese insinuasse, & colorem naturæ flavum convertisse sensim in viridiusculum. 3. Lien triplo major naturali, & intus aigra quadam amurca hinc inde squalens. 4. Renes magni sed flaccidi. 5. In dextro cordis ventriculo dimidium cochleare sanguinis, sed lenti & piculosi: In sinistro ne gutta quidem sanguinis reperta, adeo frequentes v. l. omnia exhauserant: Quod si in simili posthæc casu sanguis mittatur parcius, Ex usurperetur liberius, non ea quibus attenuetur bilis, sed quibus nonnihil crassefeat, rectius haud dubie ægro consulatur. *Olaus Borrichius Observ. 91. In actis Th. Bartholini ann. 1671. & 1672.*

*Pars Hepatis sima &c.* Opinio est *Fernelii* Intermittebris Febris materiam, non e venis in corporis habitum propelli, sed hanc penitus immergi, & circum præcordia adhærescere: Eamque non esse venarum succum alendo corpori destinatum, sed humorem supervacaneum, qui à jecoris sanguine prolektus in propria conditur receptacu-

la antequam is Jecur transeandat. Omniumque propriam sedem & originem in prima esse corporis regione, circum præcordia ventriculum, diaphragma, jecoris cavam, lienem, pancreas, Omentum aut Mesenterium, Quod hæc partes sint quasi publica corporis sentina, in quam omnis confluit eumulaturque humorum colluvies.

§. 5. Vir ætate florente, epulans liberaliter, quotidianæ vomitioni biliosæ jamdudum fuerat obnoxius, hac repente suppressa, ventriculi vehemens dolor prehendit, cum nausea & tussi inani: Huic mox cœpit corpus citra febrem ullam vehementi rigore, tanquam invadente exquilita Tertianâ, ex intervallis quotidie supra vias concuti: Exactis diebus circiter xv. putrescente jam bile, Tertianâ febre corripitur, qua multis post diebus soluta, resolutio inlequitur omnium corporis partium quæ sunt sub capite, nec multò post interitus.

Corpore dissecto, tam multorum affectuum causam deprehendimus bilem sinceram, eamque prassinam, circum jecoris cava libræ pondo membranæ coercitam, & cujus jam portio in spinæ nervos obrepserat. *Fernelius Pathol. lib. 4. de febr. cap. 10.*

Non paucos dein non admodum dissimiliter affici notavimus, quorum exemplo intelligi potest rigore, modo sine febre modo eum febre, intendum ex præcordiis suscitari: Intermittebris quoque febris fomitem in istis locis contineri: Id ex his quoque conficitur, quæ sæpe fieri observavimus, Tertianâ diurnam atque quartanam, in atrocem eructationem, colico immaniore definere, qui non-

nunquam & in artuum dolores & in paralyfin facessit: Hic dolor sine febre est, febre tamen confuero accessibus tempore exacuitur & exandescit, pristinumque circumitum retinet: vix nisi vacatione bilis misceatur, quam constat ut doloris, ita & febris causam fuisse; depellitur enim à præcordiis & visceribus in peritonæum intestinorumque membranas, eo argumento, quod & febris & sitis, & inappetentia



mitescant subotto dolere; Itaque ut doloris circa des est circa viscera & praecordia. *Idem.*  
peritonaeum & intestina, ita intermittens febris se-

§. 6. Anno 1580. obiit Sereniss. Princeps, Magnus Dux Etruriae, inexpectato casu, ex febris Tertiana, quam Medici ipsi simplicem ferebantur: Quae causa erat ut varia deinde vulgi & eruditorum iudicia hinc inde audirentur, praesertim cum primo pharmaco assumpto statim melius habere incipiens, ex voto, quod fecerat, 12. supplicium meritis à carcere liberari iusserit: Erant qui *fungorum* ejus repentinam mortem adscriberent, quo cibo ipsum maxime delectatum certum est, eum sanus viveret; Alii medicamenta non rectè exhibita in-  
cu abant, quae sane omnia nive & glacie refrigerata gelidissime assumpserat:

In cadavere ejus Jecur durum & exsangue repertum, ut cui §xxj. sanguinis paucis interpositis diebus extractae erant, subsequente sibi intolerabili: *ventriculi internam tunicam* maxor quidam saniosus arroserat, reliquis visceribus bene constitutis & integris omnino. I. Val-  
ricus Ramlerus observ. 94.

*Simplicem*). Esti Tertiana intermittens omnium putridarum securissima habeatur, observatum tamen nonnullam periculi expertem non esse, & groscumque inopinato perdidisse: *Mercurius* lib. de Febribus pluribus modis lethalem fieri posse censet, 1. si humor quem natura è vasis extra vasa mittit, in membrum aliquod princeps feratur. 2. cum humor, qui è venis ejicitur, tenuis admodum est & summe putridus, qualis est bilis copioso ichore plena: 3. ob humorum pravitatem ex pravis alimentis contractam: Quae ratio hic locum habere potest, ob fungorum etiam praecedentem; 4. ex missione crasso-

rum humorum cum tenuibus: 5. ex aliquo accidente superveniente: Adde his malignam humorum qualitatem, & Errata commissa, velut aphor. 1. sect. 1. quale fuit usus medicamentorum nive & glacie refrigerantium, à quibus humores *diversi* & *diversi* redduntur:

*Ventriculi internam tunicam*) Erosio illius fungorum ejus crebro non immerito adscribenda videtur: Nam inter symptomata supervenire solita, intestinorum exulceratio ac ventris tormina recensentur: Si in intestinis vim exferant, quidni & in ventriculo primo pravum illud edulium excipiente?

§. 7. Bilem ejusque acrimoniam incusandam, ex anarome famuli Helvetici, duplici Tertiana & simplici, Patavii defuncti videor mihi divinare: Vesica enim fellea, quia ubique obstructa observabatur, imprimis obstructis meatibus, qui per substantiam jecoris dispersi bilem ad vesicam deducunt, bilem calidum succum in corpore resistentem, & febris & rigoris causam fuisse vero sit simile: videatur *Spigelius* lib. 1. de Semitertiana cap. 15. qui venas portae pro fomite hic agnoscit. *Th. Bartholinus* cent. 4. Epist. 47.

### OBSERVATIO XXVIII.

*Febris Tertiana naturam referentes à Serositate biliosa in carnibus putrente orta.*

**A**NNO 1648. mense Augusto in Nob. urbe Lusensi, ipsiusque agro, morbi grassantes inter Epidemios sunt reponendi, non ratione essentiae, cum plures afficiantur sub diversa forma, synochi scil. hemitritici, ardentis, tertianae, ephemeræ: sed ratione causae, utpote qui à causa communi ortum duxerunt, aëre scil. valde humido & in activis inaequali, modo calido, modo frigido: Er quia hic affectus magis viguit in planitie quam in montibus, ubi magis ventilatur aër, hinc factum est quod in montibus degentes non ægrotaverunt, ægritudinesque variae extiterunt pro diversa patientum temperatura & varia victus ratione: Sicut enim excedens aëris humiditas corpora afficiens, ea disposuit ad putredinem, cum humiditas sit putredinis subjectum, putredoque hæc sese insinuat in humores in corporibus prædominantes, eosque vel sanguineos, hinc synochi putridæ: vel biliosos, hinc ardentis & tritæphie: vel cum pituitosis putrescens, hinc hemitritici: Nee solum variae fuerunt febres pro diversitate humorum, sed etiam pro diversitate loci in quo putrescunt: Hanc ob causam bile prædominante, modo fuit ardens, dum putruit in venis: modo Tertianæ naturam referens, dum putruit in parte determinata; Vel in carnibus ipsis, circa quas serositas biliosa inventa fuit in copia *diversa* facta fuit cadaverum dissectio. *Ben. Silvaticus* cons. 15. cent. 1.

**V**EL in carnibus ipsis) Quas *Galenus* sedem putredinis in intermittens febribus statuit: Quæ (*inquit 2. de Crisib. c. 61*) ob flavam bilem febribus accenditur, sine aliquo visceris affectu, siquidem manente adhuc intra vasa bile, accendatur, Exquisita bilis, ardens nuncupatur: Si vero per totum corpus deferatur, Tertiana. Sic si ab attrabile sit febris, cum per totum corpus delata fuerit, Quartana efficitur &c. *Idem* asserit 4. aphor. 59. Et professio 2. de

diffic. febr. cap. ultimo, ubi rem ita concludit, Quicunque circuitibus quibusdam accidunt morbi, partium superveniunt dispositionibus, vel mittentium, vel suscipientium, vel gignentium, vel attrahentium excrementa: Quæ vero nullum circuitum habent, in his nulla est pars corporis quæ præcipue sit offensa, sed humores in venis & arteriis omnibus; maximeque maximis & calidissimis consistunt. *Idem.*

## OBSERVATIO XXIX.

*Eorum quæ in paroxysmi Febbris Tertiana initio extincti suere, Cor & Pulmones sanguine aggravata reperta sunt.*

**I**N Tertianæ Febbris principio morbifica causa cor petens, circa Cor & Pulmones, quando immoratur, anhelosos, suspiriosos & ignavos facit, quia principium aggravatur vitale, & sanguis in Pulmones impingitur, in crassatur, non transit; Hoc ego ex dissectione illorum qui in principio accessionalis mortui sunt, expertus loquor. *Harveus de motu cordis c. 16.*

**P**incipium vitale aggravatur) Ideoque Pulsus ingruente frigoris paroxysmo admodum rarus est & depressus, qui plane arguit calorem & spiritus vitales in sanguine à materia quadam cruda & non facile combustibili velut obtui, non secus ac ignis in foco accensus, ac dein lignis viridibus obiectus lente admodum gliscit & parum deflagrat: qui postea diffuso humore crudo in flammam apertam & valde immensam erumpit, sic etiam sanguis materia cruda, quæ in fluore est aliquatenus subacta aut dispersa, plurimum accenditur, & quod in cruore residuum est, cum ipsius particulis fermentescens exurit, & celocem cum sit intensissimam inducit: quare sanguis impetuose effervescent pulsu vehementi & velocissimo urgetur: Secus in corde nimium congestus suffocationis periculum induceret. *Willis lib. de Febr. c. 3.*

*Qui in principio accessionalis mortui sunt) Gale-*

*nus cap. 9. l. 3. de crifibus docet multis de causis contingere, ut in principii accessionalium suffocentur ægri, strangulentur, ægre spirent, imo & moriantur aliquando. Ex Hippoc. de lib. scriptis. In principii febrium, sive delirium accesserit, sive alicujus membri sideratio, periturum hominem sciendum est, si non optimum aliquod signum apparuerit: Id fit propter aliquam separationem & secretionem materiei, quæ non per venas, sed per arterias aut nervos, aut inanes quosdam mixtos irreptis, insolentia quadam symptomata procreat ac progignit, contingit enim sæpe, ut moveatur materia, tum suo ipsius nutu ac sponte, ut ipse animata & excitata suo spiritu & ichore (nullus enim humor sine aut flatu aut ichore cito impellitur) tum naturæ vi pellente, & tum in partem aliquam vis atque impetus iste & impressio redundat. *Ballonius consil. lib. 2. hist. l. p. 6.**

## APPENDIX.

*Febbris Duplex Tertiana, Epileptica dicta, à Symptomate Epileptico in singulis paroxysmis periodice recurrente.*

**F**ebbris Epilepticæ meminit *G. Caldere Tribunalis* mod. p. 225. novæ & à nullo Medicorum observatæ: Puellam, ait, vidi decem annorum motibus convulsivis irritatam, cum moderata febre, sed alysmo implacido, ut nullibi quiesceret, & maxime cardiaca ventriculi læcessita: mox intra breve spatium accidens Epilepticum vidimus incipisse, contortis oculis & membris corporis universi convulsis, cerebri potentis oblectis, & omnino abolita pene sensatione, à quæ valde delassata quievit, sed non à dolore ventriculi: mox illi vomitorium imperavimus, ex borraginis aqua tepida, solo admixto saccharo, illud enim sese nostro iudicio primo obtulit, an bilis æruginosa, aut aliter deterrima os ventriculi pyngeret, ut cerebrum, nervorum consensu coafficeret, & Epilepsiam per consensum ventriculi concitaret: Placidam egit noctem, neque de dolore ullo querebatur, præter morsum ventriculi, urina ad flavam declinabat, crassa, moderate confusa: Et licet de febre putrida satis moderata essent indicia, non ob hoc tantum, sed ob accidentis immanitatem, quod maximam intulit vim naturæ, sanguinem mitti iussimus die sequenti, sed ex talo, non tantum quod valentior esset reulsio, sed quia in hypochondriis pravorum fucorum sentinam & fluxionis originem conieimus (quod attendere certe est maximi momenti, nam hoc solo auxilio phrenitides, lethargos & alia symptomata præcaverunt, quæ ex impio consensu oriuntur, vaporibus illis insuperatis) & cum aqua ceraforum & scorzonæ, parum aquæ tilia admiscere, tum offerre ipsi cibum iussimus, horis aliquot ante accessionem: at tamen paucis exactis horis, irrumpit fraudulenter accessio, dolores ventriculi incipiunt clamosi, Epileptica accidentia revertuntur; ut puella à Demone obfessa videretur, præ doloris sæviriæ nullibi quiescebat, & sic donec hora 10. sequentium dierum inceperunt reliquæ omnes accessiones, intermittenti Tertiana periodo, ut merito illam dixeris duplicem Tertianam, cum vomitu pituitæ & bilis in principio, exurenti ardore, linguæ ficeitate, oris amaritudine.

Hanc in principio febrem diximus Epilepticam: Aliud enim est febris cum Epilepsia, & Epileptica Febris, talis ab accidenti dicta: In hoc quippe differentia ratio constituitur, quod dum accidens cum febre complicatur, ab alio quam à febris principio, aut à foco diverso oriatur, licet illius occasione concitatur: hæc est certe Febris cum Epilepsia, ut quando ab apparatu epileptico, seu à cibo, ventriculo corrupto, febris occasione commovetur, seu ab affectione cerebri primigenia, seu vaporibus redditis acrioribus, veluti in variabilis: sed hoc in eo differt à febre epileptica, quod nec determinato tempore concitetur, nec aliquem ordinem determinatum servet, sed prout fors tulerit, ille commoveretur apparatus: At vero in febre Epileptica, quia certum ordinem servat, determinato & tem-

pore & loco, eandem febris causam, ejusdemque mineram & putredinis focum : ideo istud accidens peculiare & genititium hujus febris videtur, ut merito hæc febris dicatur Epileptica, & non ut sopor, lethargus & phrenitis, ex frigido aut calido humoris apparatu : hoc enim peculiare habet in hoc casu accidens epilepticum, nam præter causam fixam, focum determinatum habet, in loco, quo quadam velut necessitatem cerebro consentit, in venis nempe quæ os ventriculi circumdant; ibi enim ramus nervi insignis à sexto cerebri paris superiori officio implantatur, & in reliquum ventriculi corpus postea distribuitur: nec parum ad hoc facit quod os ventriculi ipsum amplo foramine septo transverso adheret, quo doloris & humoris appulsu, mox cum cerebri substantia & nervorum principio consentit, ut in septi transversæ inflammatione apparet.

Quo supposito, consensum epileptici accidentis in hac febre, non tantum fuisse os ventriculi causam existimamus, sed singularem humoris apparatus, acerrimi nempe & mordacis, cujus appulsu cerebri & membranarum substantia vellicetur; & nedum illa tantum, sed focum pensiam febris in venis quæ os ventriculi coronant; quo certe vidimus in hac duplici tertiana epilepticum accidens per accessiones incrementa advenisse, in declinatione evanescere, & in singulis postea reverti tam statuto ordine, ut ita proprium videretur accessions accidens, quasi tertianæ intermittentis rigor: Nec mirum hanc febrem ita denominari, si ob similem causam, & consimile accidens, nominare placuit Galeno, ob singularem singularem febrem, quia in illa est etiam focus intra venas ventriculi, & acerrimus humor, qui determinato & tempore & loco tale concitat accidens, præfixo nempe accessions tempore; aliter aut ubi est febris cum singultu, ex alio quam à febris principio ac foco; ideo non statuto ordine, sed quando casu incidit irritatio, quæ est illis differentiarum ratio.

Hanc febrem ex talo sanguinis missione reperita curavimus, hirudinibus postea hæmorrhoidalibus venis adaptatis, quæ mitiora vidimus accidentia: postea jam capere receptam (non parum enim occasione accidentis confluit) vena in carpo secta derivari curavimus, frægnatis intus humoribus cordialibus aquis, cum pulvere crystalli præparati interdum 3i. ex confect. hyacinth. quibus febre reddita mitiori, prorsus demisit epileptica in accidens: Ideo syrupo regio & persico repurgata, divino auxilio convaleuit ex atroci & singulari morbo.

## OBSERVATIO XXX.

*Febris Quartana focum ut plurimum habet in Liene atro sanguine turgente & adusto. Cujus parenchyma in substantiam pici similem sepe resolvitur. 1. A Liene majori, putri & corrupto. 2. A Lienis non naturali constitutione, ac Porta, hujusque ramorum à Glandulis vicinis tumidis compressione. 3. Quartanarii cadaveri exhibuit in corde & vasis fusiâ magna pituitosa. 4. Quartana affectus, neglecto remediotorum usu, lethalem musculorum abdominis abscessum incurrit. 5. Quartana à Iecore inflammata, cum vitio Lienis, Pancreatis, ventriculi, intestinorum. 6. Quartana ab Hepato scirrhus, cui successit hydrops &c. 7. Inducta à vitio Iecoris & cystis felleæ. 8.*

§. 1. **L**ienis viscus, est focus frequentissimus plerarumque febrium sive continuatum sive intermittentium, quæ ex inflammatione maxime sanguinis fervidi, tenuis & atrabilaris succenduntur: quæque febres adustionem sanguinis, partim linguæ nigrore, partim urina fulgorem quandam emicantem præ se ferre demonstrant, ut ex dissectione cadaverum eorum, qui ab ejusmodi febrium violentia perierunt, nec non ex excrementis, atque etiam ex solutione ejusmodi febrium deprehendere est: In dissectionis namque cadaveribus, aut Lien totus sanguine atrorem fulgentem præ adustione retinente carbonis instar turgere conspicitur (ut sæpè alias & nuper à me animadversum in Ampl. Præs. Michaelæ Bouvero extincto à quartana continua). Aut vero ejusdem Lienis parenchyma in succum quandam piceum ac fulgentem dissolutum cernitur: cujus particule quandoque per alvum rejici solent. *piceam fuscâ substantia sua & nigrore fulgente referentes*, ut animadverti quoque in mulieribus præsertim melancholicis à natura, post diuturnas febres: C. Piso de morbis à sero sectione l. Theorem. 3. p. m. 40.

**E**x inflammatione sanguinis fervidi ] Cum duplex sit melancholicus humor, alius veluti sanguinis limus, faciviorum crassorum proportionem respondens, temperamento frigidus, qui proprie melancholicus humor dicitur, Alter vero multo tenuior, temperamento calidus, genitus vel ex sanguinis fæce, vel ex flava bile, vel ex pituita falsa multam bilem flavam admixtam habente, qui proprie atra bilis dicitur, Ideoque duplex Quartana statuenda est, una genita ab humore melancholico frigido, vi ignei caloris torrefacta, quæ vera seu legitima, seu exquisita Quartana vocatur, Altera ab humore atrabilario, quæ notha seu illegitima, seu spuria Quartana appellatur; In magno igitur errore versantur qui unam ejus causam agnoscunt, nempe melancholicum humorem frigidum & siccum, adeoque quamlibet Quartanam nominis calidissimis medicamentis curant &c. *Ambros. Enechiridii med. Practici p. n. 364.*

*Picem fuscâ referentes &c. ]* Triplex sunt nigre dejectiones, 1. ex sanguine, quæ à venis excidens in grumos concrevit. 2. ex humore melanch. naturali, seu fæcilla sanguinis quæ circa lienem colligitur & fusa manet nec concrevit: 3. est ex bile atra, nigra splendens, acri; 1. non adeo periculosa nisi forte putrescat,

partefcat, venetique naturam induat, aut caufa unde provenit, fit magna: 2. aliquando fit cum acri commo-  
modo, etfi licet debilitatem arguat, ideo videndum  
criticè an fymptomatice fiat; 3. peffima efi, utpote quæ  
fit ab humore peffimo. *Sennerius lib. 3. Præf. p. 2. f. 2.*

cap. 7.

*Sanguine acriorem fulgentem* ] Sanguinei, & quibus  
facile color floridus facile in Quartanas incidunt: Eo-  
rum acriora notæ duo genera *Belonius* conf. 64. lib. 1.  
ex quibus dæ quartanæ differentie exurgunt, variam  
medendi rationem expofcentes *Tis iſtydyon, ait*, duo  
sunt genera, alii calidi & humidi funt, hepaticique di-  
cuntur, & multum fanguinis generant, pulfus habens  
plenus, elatus, magnos, febribus continuis, fynochis  
putridisque funt obnoxii; & cum perfpiratione ca-  
teant, funt melancholici, non arabilari, fed melancholi-  
ci à face fanguinis & crassitie, & veras legitimasque

quartanas habent, cum fanguis non bene repurgatus;  
aut cum plus modo fuccrefcit in corpore, Et tales  
quartanæ funt longæ quidem fed fecuræ: De iis dicit  
*Hippoc. Præf. ubi melancholici funt*: Alii colorem ha-  
bent rubeum, & hepar præcalidum habent; fed calor  
in humiditate, politus non efi, fed in nefcio quo fqua-  
lore, ficcitate, humiditatis inopia: Et hi tamen rubore  
alias fugacii, alius non fugaci perfundantur fuffundantur-  
turque, tamen hoc non efi indicium abundantis fan-  
guinis fed calidioris Hepatis, fanguinem acriem, funt  
lem ferofamque generantis: Sic funt pauci fanguinis,  
pulſus fatis cæleſti, non claro, non pleno &c. qui in ara-  
biliarum naturam immutatur: Priores *iſtydyon* facile  
ferunt venæ ſectione: Poſteriores non ſiſſima cum  
difficultate, vix enim ſeſe recipiunt recolligi ut, hypo-  
chondriaci morbis laborant & obſtructionibus me-  
ſenterii &c.

§. 2. Ioh. Formageus dum juvenis effer valde famelicus erat & ciborum appetens: vix fa-  
mem ſatiabat: Obſervarunt primarii Medici eos, quibus aut imbecillis eſt Lien, utpote non  
ſatis officioſe expurgans Hepar, aut putris, voraces eſſe, ac velut boulimo quodam generaliter  
diſto occupari: Ac revera hic de quo nunc agimus, *Splenicum erat, corpore & habitu melancholi-  
cum per aduſionem*, ſed tamen moribus & animo ſatis feſtivus & hilaris: Sed literæ illæ interio-  
res, quibus vitioliſſima etiam natura poteſt emendari (exemplo *Socrati*) illum ad iſtam æqui-  
tatem & hilaritatem traducere potuerant: At febre *Quartana longa, qua detentus fuerat*, & dolor  
fixus ad hypochondrium ſiniſtrum, & apertio cadaveris ſatis teſtantur *quale vitium in Liene  
fuerit*: Et cum cibum ingeſſerat conqueſcebat dolor. Præter autem naturale & inſitum ipſi Lieni  
vitium, quod corpusculum iſtud in tantam corruptionem adducere non poterat, ſed juvare  
tantum, cauſa erat *perſpirationis*, quæ noxam magnam intulerat ipſi Lieni: Nam cum forte in  
equum conſcendiſſet, artis equeſtris parum peritus, tanta vi ab equo depreſſus ac decuſſus  
eſt in ſolum, ut mirum fuerit eum repente oppreſſus non fuerit, incederat in latus ſiniſtrum, &  
Pulmo & Lien vitium eſperant: Ad medium menſis Martii dolere cœpit pedem dextrum, re-  
vera arthritidis erat, eaque reſidua ex febre illa quartana de qua diſtum, nam narrabat ſe diu-  
turnitatis radio affectum omnia remedia undique quaſiſſe quibus poſſet cito febre illa de-  
fungi: Conſultum eſt ut hauriret cyathum aceti deſtillati aqua diluti: Revera febris viſa eſt ex-  
tingui: Sed vice illius totum corpus ſcabie eſt infectum, nec non ab eo tempore in magnis tem-  
porum mutationibus articularibus doloribus eſt impeditus: Cum ergo duos integros dies ma-  
gno pedis articulo laboraſſet, & ad anodyna more ſolito conſugiſſet, dum ceſſat dolor iſte,  
paulo poſt doloribus hypochondriorum, & præſertim ſiniſtri conqueritur, in neutrum de-  
cumbere poterat: Erecta cervice ſpirare cogebatur: Murrur erat magnus & flatuum illias, do-  
lores iſtos à ſtibus eſſe putabamus: alii vero ab illius refluxu materiæ, & orgasmo materiæ  
antecedentis, quæ ejuſdem erat naturæ cum ea qua dolores articulares commiſſe: Mors, quæ  
repente ingruit non fuit (ut putabamus) reſcuſus illius materiæ quæ in pede dolores excrave-  
rat, aut ſuppreſſæ materiæ virulentæ & antecedentis commotio, ſed rupta velut vomica inte-  
ſtit, Etenim in hypochondrio ſiniſtro adeo potens erat pulſatio ut quæcunque ei hypochondrio  
ſuper-eſſent ea ſubſultarent, & pulſatio talis percipiebatur qualis in abſceſſibus ad ſuppuratum  
tenderibus: Nunquam memoria noſtra tam alto palpitans pulſanteque hypochondrium con-  
tingeramus; ut mirum non fuerit ſi ei pars hac doluerit ſemper, & ſi ita repente cladiſ interit-  
iſque cauſam intus foverit: Ac initio quidem tanti momenti remeſſe non putabamus: ac  
nos fateri oportet mali eſſentiam ignoraviſſe deceptoſque ſimilitudine tantum: Nec illud eve-  
niſſet, magna artis noſtræ, quæ multis eſt auxilio, calumnia, quod contigit, Nam tribus à venæ  
ſectione horis, de repente arteria vaſiſque aliis, ut credibile eſt, in Licis regione ruptis interit.  
Sed mirum quod contigit, natura conſuebat per vas venoſum in capacitatem reſectare eum fan-  
guinem, qui ſua copia & quantitate moleſtus erat, unde adeo intumuit induruitque ventricu-  
lus, ut faxeus lapideuſque eſſe videretur: Sed credo libera non erat via qua id præſtaretur.

Aperto autem cadavere, putris & ſemilacer inventus lien, & in magnam molem exerevo-  
rat, ſed corruptione propriæ ſubſtantię in partes veluti minimas conciuſus & ſemeroſus vide-  
batur, Lobi pulmonis ſiniſtri adhæſerant coſtis, & in Liene ſanguis concretus erat, qui è propriis  
vaſis effuſus, tandem ruptis tunicis quibus concludebatur, inopinatam mortem intulit. *Ballo-  
nium* conf. 107. lib. 1.

**Q**uartana longa qua detentus fuerat &c. ] Vix  
quis diuturnam febre quartana, & nulla arte me-  
dica curabili decineret, quia vitium ſit in liene & an-

tecedens & conſequens; autem, inſitum eſtatem aut  
in ſubſtantia ipſa aliquid latens & contra naturam,  
quod congreuerem affinemque morbum accerſat, pa-  
riat,

riat, alar, foveat, & in multos dies ac annos etiam deducat. Si enim quosdam congestionem humoris melancholici sustuleris, quae autumnalis aut hyemalis quartanae febris author esse potest, fere fit ut diuturnae quartanae focum habeant in liene; sed tanto diuturniores fiant, quanto vicium est intricatius, ut totius substantiae esse dicatur morbus, & *καταεργα* contingat in parte ipsa. Consequens autem vicium voco, illud quod sequitur ex longa obfusione & occupatione ipsius partis, nam non potest fieri ut morbus aliquis in parte diutius stabiliatur, quin partem ipsam, in qua residet, infirmet officiatque, imo deteriorem faciat quam antequam morbus ipse eam occuparet: Dolor autem qui illum saepe affligebat in sinistro hypochondrio, satis indicabat subesse quippiam contra naturam, si verum illud quod scribit Hipp. Ubi dolor & calor ibi morbus.

*Quale in Liene visum fuerat* [Plerisque visum totae in ea febre diuturnitatis causam non aliunde petendā, quam ex cancrofa dispositione in corpore lienis: oam quas Quartanae solus humor melancholicus accedit, ex non tantum ita diuturnae: Sed cum lienis ipsius temperies est immutata, citra inflammationem aut scirrhum, aut obstruktionem (de Hepatis *καταεργα* docet Galen. cap. 8. l. 5. de loc. aff.) multum quae praerabantur affectus ipsi: At cum non sit in manu Medici situm istam aut partem *διαφραγή*, ut *διαθρον*, aut notam quae elui non potest, & quae laevis Assyrio colore cinis similis est, tollere, non est quae in potestate illius ut morbos inde natos & alios tollat: Ea dispositio quo magis medicamentis irritatur, magis aegreditur medeodo.

*Cum cibum ingererat conquiescebat dolor* [Sic e' edebatur esse ab inanitione, ac palliativa erat ista doloris cessatio: atque eo modomulta sunt & adhibentur quae dolorem leniunt, cum tamen ea non sine legitima doloris sedandis remedia, sed id fit per accidens.

*Totum corpus est infestum* [Notat Rhodius cent. 1. observ. 11. quoddam se novisse Patavii qui scabie fovebantur nisi Quartana quocumque correptatque B. Silvaticum Cancallatum oovisse Quartana correptum quae scabie solvatur.

*Quae articulares dolores committebat &c.* [Revera et multis colligebatur argumentis, contra paradoxon Ferrii, dolores isti articulares non à capite erant sed ab interno corpore: Credibile esse potissimum quod Hippoc. in Epid. scripsit part. 3. sect. 4. lib. 6. Cui intellum in dextra parte dolebat, & articulosum morbo laborat, erat quietior; postquam hic curatus fuit, erat dolentior: Isti comm. duas causas reddit Galen. 1. Quod duobus doloribus una non eundem locum infestantibus, maior obscurat minorem: 2. Quod humorum in artus currentium imperus ad colon intestinum conversus est.

*Natura canabatur per vias ventrum in capacitatem rejellere* [Plerique emutatione viscerum in ventriculum aut sanguinis aut humoris, à subita repentinaque morte sunt vindicati: Atque eum in sensum Galen. cap. 1. lib. 6. de loc. Lien, ait, Hepatis exemplo excrementa ex se rejicit, ita ut & vomitione melancholicum sanguinem aliquando exernat, qui interdum per inferiorem quoque decedit: Et cap. 6. lib. 5. Sunt, *αἰμαί*, qui pu-

tent nequaquam fieri posse ut sanguis vel ab hepate vel à liene effluens per ipsum evacuetur: verum per artis exercitationem utramque opinionem contrarium mihi, visa est per ipsum ventriculum fieri evacuationem ex dictis visceribus: Jovianus verò *αἰμαί* tali excretionem, si modo sint ferendo, item si non sit perennis generatio sed tantum congestio.

*In hypochondrio sinistro pulsatio* [Itaque iste & pulsatio aneurysma subesse declarabat: Nec enim de vera palpitatione hoc potest an dici, quae à spiritu crasso & flutulento fit: Sed pulsus & palpitationis omine audienda vebemens & perceptibilis quaedam motio arteriarum, aut magnae arteriae dorso iocumbentis, eo modo quo in magnis inflammationibus ac praecipue cum ad suppurationem tendunt, contingit: Nec enim omni inflammationi pulsus adest, sed si ea sit longae & suppuratione proxima, ut ait Gal. cap. 1. l. 3. meth.

*Si ei pus hac doluerit semper* [Quodvis apud Hippoc. legitur Hypochondrium hoc vel illo modo contractum esse, in eo febrilis affectionis sedem esse oportet, ait Gal. comm. in hist. 2. sect. 4. lib. 1. Epid. Atque ad perpetuam memoriam hoc est menti infigendum, quod quis etiam dum rectus agit de dolore hypochondriorum, praesentim profundo coqueritur, oportet non remete secutum esse, sed verendum est de re aliqua latente: Declat hic noster *αἰμαί*, & *Απelinus* sect. 3. lib. 3. Epid. hist. 13. cui coeuctus dolor erat ad dextrum hypochondrium, & hic mortis tandem causa fuit, cum levi alia de causa laborasset: nam mirantur aliqui sepe oos levi de causa in morbos incidere, ut haec per se non est causa sufficiens, Etenim, ait Galen. comm. in part. 15. sect. 1. lib. 3. Epid. Sunt quidam quae per seipsa morbum committunt nequeunt, quae si ad corpus morbo opportunum accesserint, totius causam morbi creduntur sufficere.

*In Liene sanguis concretus erat* [Hippoc. aph. 20. lib. 6. ait, Si in ventrem sanguis p. n. effunditur, necesse est suppurari, Graece *καταεργα* i. e. *καταεργα*, corrumpi & in pus verti, Ac primum nosse oportet id quod placet Hippoc. Si unquam sanguis à propria cavitate in aliam quamcumque pervenerit, omnino est impossibile ut sanguis permaneat: Sed an necesse suppurari? Non placet Galen. cum suppurari sit nomen mutationis unius in sanguine factae: itaque generalius refertur ad *καταεργα* i. e. vitium: Nam tribus modis vitatur sanguis, aut enim in pus vertitur, aut livescit, aut grumescit: grumescit autem praesertim si in magnam cavitatem ceciderit: atque non mirum si in agro nostro non suppuratus fuerit sed congestus & in grumos versus, erat enim magna pars ejus in amplam cavitatem delapsa: deinde aneurysmatici capio repentinam mortem attulit: Sic iste magnus & appatus pulsus significabat continet aliquid contra naturam in capacitatem ista & arteriam dilatam valde: Atque huc pertinere potest aph. 13. lib. 4. Quibusdamque ex morbis acutis, aut diuturnis, siue quovis alio modo extenuatis, oigra bilis, siue ut sanguis oiger desoperto exierit, postmodum moriuntur.

§. 3. Michael Tedler ann. 25. anno 1640. cum per 16. circiter menses Quartana laborasset, non obstantem eo quod diversis accommodatis remediis usus esset, ad superandam quam ex victu pravo contraxerat eacochymiam, tandem morbo modelam superante noctu inter 23. & 24. Martii decessit: fuitque hic ejus vitae exitus: aliquot diebus ante mortem à corrupto viscerum tono pedes & crura tumescere coeperunt, Viresque & appetitus paulatim dejiciebantur, manebat tamen idem febris circuitus, cujus paroxysmum etiam nocte, quae ipsi penultima fuerat, passus est, sed & die subsequente ante vesperam, novo coque vehementiori paroxysmo correptus fuit, qui ipsum mane ante tertiam abstulit.

Aperto in defuncto abdomine, haec praecipue p. n. deprehensa fuerunt: Lien praeter solitum, triplo major erat, flaccidus tamen & sanguine nigro ultra quam docet infuscorus: circa

circa autem ejus arterias, earumque ramos, ad ventriculum & ad Portæ venam tendentes, glandulæ erant multæ, quæ comprimendo ductus angustabant, & visceris hujus (ut facile colligere est) obstructionem faciebant, simulque febri huic dum viveret occasionem præbebant, & omnium medicaminum vires eludebant; Sed & hujusmodi aliquot glandulæ erant circa vesicæ felleæ ductum ad intestina tendentem, eumque ita comprimebant, ut vix aliquo conatu instrumentis tenuissimis esset transitus: Et harum glandularum omnium maxima firmiter etiam Portæ trunco ad finem Pancreatis necessebatur: adeo ut mirum non fuerit nutritionem ipsi defecisse, & lsteritiz paulo ante mortem signa se in murato corporis habitu obtulisse, & alvum (de qua tandem etiam querulus fuerat,) lægiorem redditam: In Thoracis dextraparte etiam modica aquæ quantitas colligi exceperat, Pulmo tamen mediocriter habitus & liber: sinister autem Pulmo passim partibus continentibus erat adnatus, non corruptus quidem, sed flaccidior tamen & aquæ spuma impletus: Reliqua à naturali constitutione non multum aliena erant. *O. Henrins observat. 22.*

§. 4. *Helidius* secuit aliquando in Hospitali Bononiensi virum quendam, qui febre Quartana, quæ diu detentus fuerat, tandem mortuus est: Posteaquam autem cadaver istud aperuit, reperit in corde, venis, & quasi omnibus membris, frustra magna, longa, alba, pituitosa: Hoc est præcudubio id quod in venis cruditatem appellare solemus: *Ex observationibus Laurentii Scholtzii.*

**D**E his corporibus pituitosis mentio sæpe facta lib. 1. pluribus in locis: Pituitam autem Quartanæ originem aliquando daret *Alessius Hellerius*, quæ tam crassa est ac contumax quæ ipsa atra bilis: Neque id, ait, repugnat Græcis aut Arabibus, nam pituita consilientia crassa, quantitate paucæ, quarantæ aut etiam rariore circuitus facere potest: Sic *Rhazes* docet Quartanam fieri succensione. Quotidianæ & Tertianæ, adultis scilicet aut incrassatis humoribus.

§. 5. Quartana affectus neglecto remedium usu abscessum musculorum ventris incurrit. *Vide lib. 3. tit. de ventris Tumoribus.*

**N**Eglecto remedium usu Intermitteutes febres per se minime lethales sunt, etsi exquisitæ admodum acutæ existant, cum ipsarum causa procul à corde in ventre inferiore existat, circa excrementorum sentinam, à quo loco melius quoque expurgari potest: Fit tamen quoque si diutius perseverent, aut frequentius infestent, ut visceribus vicinis lesis, Hepatæ, Liene, Ventriculo, Intestinis, novi inde morbi & graviora periculosioraque sequantur symptomata, ut colicus dolor, uterinus, hydrops, similiaque quæ ob errorem ægri, nonnunquam & Medici, possunt accidere. *Platerus Prax. lib. 3. cap. 2.*

§. 6. Juvenem, cui perperam fuerat exsectus testis, febris quartana apprehendit, ac in eas redegit angustias, ut nequiverit unquam in cubiculi quiescere; nedam urgente etiam vel maxima dormiendi necessitate, sive nocte sive die, somnum capere, nisi vel pronus consideret in sedili, vel caput in lecto haberet sublime, interdita ipsi quasi omni decumbendi copia: corpore enim vel minimum, sive rectorum, sive in alterutrum latus inclinato, dici vix potest quam acerbos illico perferret dolores cum in lumbis tum in ventre, quorum cruciatibus, qualibet febris accessione tam miserandum in modum excarnificatus fuit, ut oppressus miseris, non invitus è vita discesserit.

Invenit autem Anarome Iecur inflammatum, Intestina vitellina, ventriculum vero atrabile perfusum, eandemque in turgidis omenti, ac multijugis Lienis venis (quarum congeriem perperam vas breve vocant) adeo copiosam ut coram omnibus digito inde exprimeretur: In varicosis vasorum spermaticorum anfractibus, vesiculisque sub vesica positis, ob exsectum alterutrum testem, plurimum stabulabatur seminis: Sed admirationem movit Pancreas, supra infraque ut turgidum & extuberans, sic intus sordido pure, ac viscida pituita impendio nimis infarctum: cujus pondere depressis occlusisque venæ cavæ, ac arteriæ magnæ tunici, visceri huic suppositis, ut juvenile hoc corpus emarcuit, genio suo defraudatum, sic excitavit contumax ipsius obstructio summas illas præcordiorum angustias, quæ comitabantur quascunque febris accessiones: inalescente præcudubio putrida hujus visceris proluvie, sive ab incendio febrili, sive à pluviorum calore: cujus vapores deinde in ventrem, spinalem medullam cerebrumque delatos, ecquis non videt excitasse dira illa symptomata quibus corpus hoc quotidie fuit exagitarum. *Tulpinus observ. med. lib. 4. cap. 32.*

**D**E vero Pancreatis usu &c. ] Quamvis inter medicos necdum convenit de vero Pancreatis usu, certo tamen certius est inibi locorum inveniri diutinos ac inextricabiles morbos, veluti tabem dorsalem, febres productas, scirrhos, abscessus, theatomata, vomitum, inquietudines, vigilias, alioque perniciosissimos affectus, qui ex hoc fonte, quasi ex Pandoræ pyxide non infrequentè erumpunt, ad pernitiem humani generis, testibus *Fernelio*, lib. 6. c. 7. *Risiano Anthrop.* lib. 6. c. 6. & *Hildano* cent. 1. observ. 71. *Huc refer quæ supra adducta sunt de febrium intermitte. origine ex Pancreate.*

§. 7. Quinquagenarius, aut circiter, è febre Tertiana æstiva Autumno in Quartanam simplicem, hinc in triplicem degeneravit, atque ad Novembrem in hydropem: Desperatus est à Medicis,

Medicis, quia Practici confirmatum hydropem dicunt post secundum mensem: Relata causa ad Hepar refrigeratum, partim usu aqua destillatarum, acetosae & eichorisi, quibus plurimum usus fuerat.

Mortuo Febr. initio inventa sunt syderata intestina, similia aquatilibus colubris: Omentum corruptum: Hepar multis occupatum scirrhis. *Hollerius observ. 20.*

**E** *Tertiana estiva in quartanam &c.* Quartana vel primo incipit, vel aliis febribus succedit, praesertim Emeticis: Cum primo incipit, ab humore fit frigido siccoque: cum aliis febribus succedit, fit ab humore adusto: Et hujus origo potest esse Hepar servidius atque bilem generans: *Hollerius* docet Quartanas fieri vel vitio Hepatis sanguinem adurentis; Vel vitio Lienis melancholicam non expurgantis; vel *visu venarum* crudum humorem generantis.

§. 8. Dom. *Magnus* ait in vulgari Quartanarum feetura, observasse se plerosque toto autumno & hyeme quartanarios decubuisse, ac tandem interiisse, in quorum mortuorum cysti lapide loco, fellis concreverat. His Quartanis *lecur author fuit Ballonius Parad. 135.*

**I** *Ecce author fuit* Bilem generans nimioque calore adurens; quippe à bile assuta vel exsiccata plenamque originem ducunt calculi vesicae fellae: Hinc *stant Huisfeldus & Swanningus in historia Christi Secundi Danorum Regis* inventos plurimos lapillos parvos in ejus cysti felica, quia vinis generosis frequentius circa vitæ fuerit utebatur. *T. Bartholinus.*

## OBSERVATIO XXXI.

*Febris Semitertiana ortum habet plerumque ab inflammatione mesenterii, Omenti, Intestinalium vicinarumque partium 1. 2. 3. 4. Pestilens ab Hepate, Pulmonum, imo Cordis inflammatione hinc consideratione. 5. Extincta mulieris Hepar exsiccatum repertum, cum lapillis in cysti, Pulmone suppurati. 6.*

§. 1. **Q**uidam ex gravi dysenteria in Semitertianam spuriam incidit, quæ postea febris intermittens facta fuit: Aegro 40. die mortuo, & corpore aperro, inventa est interna ventriculi tunica levi erysipelate inflammatorio affecta: Venæ mesaraicæ, & quæ ad ventriculum tendebant, atque omentum, crasso nigroque sanguine refertæ erant, imo Omentum semiputrefactum ab inflammatione Erysipelatoe, quæ in omnibus venæ portæ ramis minoribus inerat. *Adrianus Spigelius lib. 1. de Semitertianâ cap. 15.*

§. 2. Ego plures qui febre quotidie sese exacerbante, præcipue circa vesperam, aut statim post meridiem, in modum duplæ Tertianæ continuæ, vel Semitertianæ, perierunt, secui, & in his putredinem non in vena cava, sed in inflammato alicujus primæ regionis viscere, vel alia aliqua recondita parte, inflammationem paulò minorem quàm ut dolore ab ægro, vel *tactu hypochondriorum à Medico & ægroto cognosceretur, deprehendi: Idem ibidem cap. 16.*

§. 3. In dissectis Semitertiana mortuorum cadaveribus, reperi inflammationes ex sanguine bilioso & pituitoso factas circa jecoris cavam partem, in ventriculo, intestinis tam crassis quam tenuibus, Mesenterio, Omento, Liene, & sæpius in una partium commemoratarum, aut pluribus; aliquando etiam in omnibus, quæ celeris mortis causa erant, superveniente gangræna vel sphacelo: Præterea in plurimis dolores in ventre immanes vel continuos, qui certis horis plerumque exacerbabantur, vel intermittentes eos affligebant, orti fuerunt, ex facto abscessu, sanie ac pure, aut bile saniosa & concocta per secessum vel vomitum redditæ. *Idem cap. 14.*

§. 4. Rarissime Semitertiana laborant, qui firmis sunt visceribus, sed ii qui distillationibus laborant, lecur habent obstruatum, aut Lienem, aut mesenterium, Pulmones male affectos, per longa intervalla colicis doloribus infestantur: Nullius eorum, qui à Semitertiana perierant, cadaver inspexi, in quo Pulmones & lecur non male haberent: vel una cum his Caput, Lien, Renes, mesenterium, Intestina magna ex parte inflammata, & in aliqua parte gangræna correpta erant, præsertim quo loco Ileon colo jungitur. *Idem l. 2. c. 11.* In quodam juvene Belgæ, qui post Dysenteriam in Semitertianam incidit, & die 20. mortuus est, reperi intestina tenuia inflammata; Ileum, quæ parte cælo & cæco adhærebat, sphacelatum. *Idem ibid. c. 16.* Adolescens quidam Gallus Semitertianam correptus 27. die mortuus est: in cujus cadavere dissecto tenuia intestina inflammata fuerunt deprehensa, & Ileus portio magna versus colon sphacelata; jecoris etiam cavæ partis portio inflammata fuit, *Idem ibidem.*

**E**X vulgata sententia, Semitertiana febris ex continua Quotidiana & Tertiana Intermitteente est composita: At cum non solum antiqui & recentiores de febris hujus natura non plane consentiant, verum etiam mixtura illa febris Tertianæ & Quotidianæ, bilisquæ ac pituitæ non semper locum habere videatur, multoque graviora in hac febre adint symptomata,

magisque periculum quam quod solum ex pituitæ ac bilis mixtione provenire possit, Ego meam hic sententiam propono: Equidem non negaverim febres tales ex continuis & intermittentibus complicatas dari posse, libenterque concedo cum *plures simul & eodem tempore in venis mesaraicis & vena cava humores putrescere posse, ac quidem vario modo, ex diversitate* *marciz*

matærie vel tertianas vel quartanas simplices aut duplices, multas aut legitimas, cum continua complicata: febres quæ quæ varias exacerbationes & mutationes in symptomatibus habent, excitari possunt; Modo hoc obstrictum non necessarium esse ut una harum febrium semper sit quotidiana: sunt enim quotidianæ febres sæpe omnino & semper longæ, cum Semitertianæ sæpe sint satis frequentes, imo interdum epidemice & non semper diuturnæ: ideo sufficit ut una sit Intermitteas, altera continua cuiusmodi etiam generis: quomodo illæ de variis differentiis & gradibus controversiæ tolluntur: Verum his omnibus concessis, sum in ea sententia, etiam febres naturæ suæ intermitteas, Tertianas præcipue seu simplices, seu duplices, seu triplices, vel etiam, si cui ita libet, quotidianas, Semitertianas, dici posse. Eas scilicet, in quibus causæ morbosæ pars aliqua & ventriculum, intestina ac vicina loca detrusa, inflammationem atque in se febrem symptomatice excitant, ut ita hæc febres, ratione intermitteas sit horrida, ratione symptomaticæ, continua: ut enim natura in continuis febribus interdum partem materię ad partes aliquas privatas, ut pleuram, pulmonem, fauces deponit, ita non est impossibile eandem etiam in intermitteas partem materię cum sanguine ad intestina & ventriculum ac vicina loca depellere, quæ ibi hærens inflammationem excitet, unde etiam febres hæc tam periculose sunt. Atque ita rem se habere observatio allatæ ex *Spigelio* docet: Persuadet istud & hoc quod febres hæc sunt frequenter contagiose dysenterie contagiose grassantur, ut idem docet *lib. 2. cap. 10.* Materię enim ad intestinalia impetus est in utroque malis: Accedit his & illud quod febres hæc solvantur dolibus colicis, alvi fluxu, dysenteria, quæ omnia humorem ad intestinalia impetum habere indicant; & ut idem *lib. 2. cap. 14.* docet, Aliquando in morbenæam apoplexiam & paralyfin mutantur, quæ proculdubio ex primis viis ortum habet, et quæ talis qualis colicam quandoque sequi solet, quod vel ex eo patet, quod febres hæc ex paralyfi, superveniente dolore colico quandoque solvi solet: Scribitque, Idem, se longo usu edoctum dolores hosce colicos, post duplices tertianas & tales febres sequi, quod ortum habeant tales febres ab abscessu pleurae quæ confluit in pancreas, mensestione vel cavo jecoris, è quibus maresia ad intestinalia de pellatur.

Ex quibus omnibus apparet materię Semitertianæ non semper in vena cava, quod *Spigelius* concedit, sed in venis melsaricis etiam contineri, & proinde ex febre primaria & symptomatica componi: Et primo quidem natura sua febrem intermitteas esse, cui postea continuus calor accedit ex inflammatione ventriculi, intestinum & vicinarum partium, ex sanguine ac humoribus viciosis in ea loca & extremitates vicinorum vasorum melsaricorum eo desinentium confluentibus excitat: Unde ipse *Galenus* lib. de Typis scribit, non semper continuas, sed etiam intermitteas reperiri semitertianas, i. e. ut *Spigelius* explicat, non omnibus morbi totius temporibus: nam primo potest intermitteas esse tertiana sola, huic postea accedit aliquid visceris inflammatio, quæ sedata nihil hominis potest febrem intermitteas remanere: Imo fieri potest ut superius hoc modo febribus mutetur, prout sæpius nova aliquas partis inflammatio accedit.

Atque ex his causis horrores & rigoris, Et cur in febre hac continua toto morbi decursu horrores & rigores toties accedant, febresque hæc *Spigelius* appellatur, reddi potest: Fit hoc primo ordinate, & non sæpius nunc rarius pro febribus intermitteas natura, quæ potest esse tertiana simplex, duplex, triplex, vel etiam quotidiana fortasse inde inordinate, cum inflammatio novam partem occupat, vel dum pæ, secundum *Hippoc.* 2. aph. 47. Sunt enim hæc partes, quæ inflammationem dixerimus, membranosæ, & proinde illis affectis facile

rigor vel horror excitari potest: Neque ex rigore vel horrore semper initium novæ febribus colligere licet, sed sunt rigores & horrores etiam inflammationibus proprii, ut modo ex *Hippoc.* 2. aph. 47. dictum, qui etiam in coacis scribitur Qui subinde exadant, rigoresque, lethale, ac sub finem morbi suppurationem habere deprehenduntur, alvosque perturbant: Ita ibidem, *de co. 2. p. 2. m. 1. accidet*. Et habentur in coacis plures aphorismi, qui docent Rigores non solum in finis febrium accidere, sed alias etiam ex materię commotione: Et experientia id confirmat, refert enim *M. Donatus* hist. mirab. l. 5. cap. 5. cuidam in musculo temporalis vulnerato septima die supervenisse rigorem, eamque ad 45. diem riguisse, & quotidie fere semper sudasse, alternarim rigoribus succedantibus sudoribus: Et ipse ægrum vidi inflammatione autis, quæ tandem ad suppurationem pervenit laborantem, eodem die ter riguisse, idque aliquoties accidisse etiam per intervalla longiora: Et omnino facilius ex hisce quæ diximus, omnium quæ in Semitertiana accidunt causam reddere licet, quam ex difficili illa & non semper probabili febribus intermitteas & continuæ mixtionem, præcipue si hoc præsupponamus, quod à doctissimis Medicis approbatur, nimirum eundem hominem posse pluribus tertianis laborare, si in diversis & pluribus tamis melsaricis causa febribus continetur: hinc enim fieri potest, ut non solum antiquam una febris solvatur, alius paroxysmus invadat, sed & accedens inflammatio calorem præcipue continuat, unde febris est continua: Toties vero rigor & horror invadit quot numero sunt Tertianæ: neque enim duplici vel triplici saltem Tertiana, sed quotot vel quinque Tertianis homo laborare potest, prout febribus materię sedes in tot locis consistit.

Ex his facile etiam patet quanam sint Semitertianæ causæ: Nam si ea ex continua quotidiana tertianæ intermitteas, vel alio modo complicata continua & intermitteas consistet, etiam causæ utriusque febribus adfuit necesse est: Si vero in Tertiana cum inflammatione aliquis partis causæ illæ omnes quæ Tertianam constituere possunt, locum habent: Si nimirum maresia in pluribus venarum melsaricarum ramis colligatur, & putrescat, partique ejus effusa ad intestinalia, vel ventriculum, vel alia loca vicina, ea inflammant: Habet tamen humor hic proculdubio peculiaritatem qualitatem, ob quam ad hæc loca fertur, sicut & in dysenteria humor peculiaritatem qualitatem, quæ intestinalia infesta est, obtinet: Unde & epidemice sæpe ac contagiose sunt semitertianæ, imo nonnullis locis familiares sunt hæmitritæ, sicut *Galenus* Romæ & in Æthiopia; totoque litore, tractuque terræ ubi calidum est calidius cum adventitia humiditate, frequentem esse scribit.

Signa hujus Semitertianæ quod attinet, quam esse Tertianam intermitteas simplicem, vel duplicem, cum inflammatione aliquis visceris diximus, Febribus ipsa quidem intermitteas sunt typum observat, sive sit simplex, sive composita, calor tamen ob inflammationem est continuus, eaque etiam suis signis se prodit, adfuntque vomitus, dolores ventris, alvi fluxus, chylæ stes inest nihil fæcis educunt, sed mera chylæ stes materia sine excrementis, prout erat injecta, statim, vel modico post injectionem tempore, exit, quod signum inflammationis intestinorum in ejusmodi febribus frequentissimum esse solet: *Sænetus lib. 2. de Febribus cap. 21.*

Vel tactu hypochondriorum etc. ] Plerique ex his quibus præcipua cura est de contrahendis hypochondriis, cum nec inæqualitatem, nec tumorem, nec renitentem quid tactu deprehendunt, propterea jubent securos esse ægros: Tametsi autem *Hippoc.* in coacis, in omni morbo hypochondrii qualiterem in æqualitate & substantia, in eoque doloris vacuitatem laudatis, non præterea latere non debet subesse substantiæ totius vitium in viscere



viscere contento in hypochondriis: nam *Gal.* cap. 7. l. 5. de loc. declarat quomodo superficies corporis saepe colore asiginoso infecta deturpatque sit, cum nulla existeret obstructio aut inflammatio aut scirrhus in Hepar, Sed, &c. secundum substantiam temperiei ipsius partis mutatur sit temperamenti quaedam alienatio: Sed sit ita, inquam, aliqua obstructio aut tumore la-

bores Hepar, an propterea tactus fidem faciet? Audiamus *Galenum* c. l. Constat, inquit, Hepar intra musculos locatum esse quod cum tribus contegatur musculis, fieri non potest ut tactus aliquam illius noticiam praestet, nisi vel magna in eo oritur inflammatio, vel incumbens ei musculi valde extenuati sint: At affectus Hepatis cognitionem alia arte veniendam esse tradit. *Balae*,

§. 5. Novi mulierem (eo morbo derentam) cui cum urina fluebant primo furfures quaedam, inde & pelliculae magae, & postremo pns manifestum villis, festucis & tunicis variis intertextum: Profecto ea membranarum defluxio, pro quantitate sui, certum morituris prae-nuntium misit, nam ex hepatis, aut pulmonis, aut cordis sificatione consigerant, ut etiam per anatonem deprehensum est: Plethisque diffecto corpore universa haec viscera, aut major illorum portio, nunc nigra ut earbo quispiam visa est, nunc suppuratis pustulis plena: sit enim facillime ut per consensum tunicarum pituita concretescens jugiter adhaerescat, eademque salior aut virulentior, subiectam oesophagi linguaeque substantiam depascatur. Possem plurimos recensere, ut mulierem *Aethiops* symbolo, & sub insigni Hierosol. &c. *Corn. Gemma de febre pestilenti Hemitritae*.

§. 6. In Illi. Domina à *Calmantio* febris erat assidua, alias interdum, alias noctu exacerbationes habens: una dies levior, altera acerbior, in morem *remittens*, aut *intermittens*: Si forte remissio aliqua erat, minima occasione prehendebat Horror; cum perfrictione quadam, ita ut ad hemitritam accedere videretur: *Anxietas erat summa*, quæ calore acti omnia confundente & es superius ventriculi molestante contigebat: Implacabiles erant dolores renum, utinam fore crudæ conjiciebamus circum ventriculum coactam esse humorum copiam, unde defensionis animi excitato vapore sequerentur: Sed mirum quod apparuit, nam cum habitum corporis haberet tumidiusculum, pituitosum, minime diffabilem, corpus internum aestuabat, omnia quæ excernebantur erant biliosa, tota massa sanguinis erat corrupta, Et quod mirum, pulsus erat vibrans, qualis in ingentibus inflammationibus apparere solet: Cumque esset annosa, mirabantur Medici, quomodo in febris assiduitate ista Pulsus vibratio, elatio, magnitudoque tamdiu persistisset: at animosa erat mulier, nullis aut corporis aut animi laboribus defatigari solita, nulli pene celeritate cedens, irasci celeris, ad omnes actiones expedita: cor compactum habebat, & faculrarem vitalem omnium validissimam (nec enim tamdiu, tam violentæ diræque febris molestias tulisset) itaque pulsus erat validus cum facultas vitalis esset valida, auctus erat usus, instrumentum cedebat, ut mirum non fuerit, si talis pulsus extiterit: Sed quod magis mirum fuit, est quod uno die quinquies aut sexies rigeret, ac si nova accessio foret: Statim ab isto horrore, calor adurens surgebat, manum rangentis feriens, adeoque vola manus & planta pedum incaluerat ut nullus ferè eum calorem ferret, obiit die 27. totius morbi.

Aperto cadavere: sinistra pars Pulmonis erat purulenta, Et cum ira esset præcipitum, in cysti cholodochi novem lapilli, eicceribus rubris duplo majores inventi sunt: Hepar incendio ineanducrat, totus sanguis putri erat & lactem. *Ballonius lib. 1. consil. 77.*

*Sinistra pars Pulmonis erat purulenta*] Non alie-num erit monere *Galeno*, comm. in p. 3. sect. 3. l. 1. Epid. placuisse cum veteribus febres istas *remittentes* inflammationem sequi partium internarum: quod & in hac muliere observatum est, totum enim corpus internum incendio conflagravit. *Ballonius*, l. videm: vide supra quæ de Pulmonibus, aliisque partibus male affectis afferuntur ex *Spigelio*: Et lib. l. Epid. p. 35. Febres quæ toto mense Junio, Julio & Augusto anni 1573. vagantur sunt, ad hemitritam & *remittentes* accessisse, à phlogosi viscerum natas fuisse, ac inflammationis fuisse soboles,

*Defensiones animi, Anxietas &c.*] Ab oblesso ore ventriculi, huic enim vicina partes, hac in febre, maxime patiuntur: Sic apud *Hippoc.* 1. Epidem. Diopithis forosi in febre semitritiana circa accessionem os ventriculi graviter dolebat: alique oris ventriculi dolor aliis similiter contigebat.

*Anxietas ira summa &c.*] Apud *Galenum* duplex est *diarrhoea*; unus *remittens*, alter *assidens*: Ita enim ad part. 4. lib. 2. prout. Bisarum ægri sunt *diarrhoea*, uno modo cum virus à corpore gravatur, nullamque figuram retinent ægritudo modo, cum os ventriculi à pravis mordetur humoribus; Priores perniciosè afficiuntur, posteriores sunt nausabundi: Ad duas illas causas, malignam qualiterque accensibilis: Imo virum

infusmitas non videtur causa, cum saepe post magnas vaccinationes multos videas valde imbecillos, qui quiescant nec subinde subinde moriuntur: Itaque aliqua latens causa, ut venenata qualitas esse videtur, quæ homines jactat faciat, i. quæ in semitritiana febre saepe concurrit, accedente molestia ori ventriculi inflammato.

*Ira præcipitum &c.*] Sic apud *Fernelium* lib. 6. cap. 5. Deceptus senex in iram misse propensus, post decessum sine cysti & sine felle inventus est, in cujus sede calculus ingens concreverat.

*Tota sanguis viri erat: &c. l. 1. u. 1.*] In venæ sectione nonnunquam hac loco feri prodit: Lac autem istud secta vena in pelvi conspicuum à putridis humoribus diligenter est distinguendum, qui saepe sapius lactis speciem referunt & calidi nativi extinctionem notant: Nollem dissentire, accedere tamen non possum *Risla*, qui pag. 188. contra *Paequetum* scribit, *Dum in educto sanguine per phlebectomiam & vasculum excepto, superficies digiti minimi crassitie albicans apparet, non tam à putredine sanguinis nasci, quam ab ista chyli portione profusione cum sanguine qua superflua est*: Enimvero si superficies illa candicans gelatinæ similis in emissio sanguine, plerumque in morbois condensata conspicitur, & vidi corii instar crassam lentamque, saepe in febrilibus acutis hoc anno observatam: Quis in chylo concretio-

non talem animadvertit? Expositus aëri demptus ex lacteis chylos, permanet liquidus: In quibus superficies sanguinis durior est & candicans, subjectus sanguis in pelvi sine fibris plane est puridus, imò vidi in huiusmodi nec gutturali coloris rubri: Nostri contra quibus lacteus fuit sanguis, sani erant: A picuita igitur lenta oritur superficies alba, crassa, quam à chylo credimus diversam. Considerata autem infectione & progressu lactearum thotacitarum, vidi sumas nobis invenisse viam quæ lac cum sanguine aliquando emittitur. *Bartholinus in Dubio de Lactem cap. 3.*

*Alias interdum, alias nollis exacerbationes habere etc.]* Similem paroxysmorum anomaliam vidi in Nob. Matrona, Uxor Nob. & Clar. Dom. Consulis *A. Domini*: Unde verisimilem credidi de Semitertianæ origine *Sagallii* sententiam: Dicta Matrona anno 1674. mense Januarii 60. ætatis anno, de dolore ad nuchas costas sinistro latere conquiritur, qui statim enemata & fomenta sedatur: Postmodum tertium horarum rigor succedit, & postmodum calor deficiente paroxysmo, ob lumborum dolorem, cum urinatum paucitate, consentiente complexionis sanguinea, nubo vultus se protendente, Saphena tunditur: Die sequenti tertio febris insulam comprimit, horrore prægresso; ac circa noctem alius paroxysmus cum rigore & nausea adortur: præsentibus plurimæ cacochymie indicibus, portigitur Senna & laci infusio, cum syr. Emerici *Sala* 3ij, quia in vomitu

tum erat prona, ante nephritidi obnoxia unde infra quater copiose bilem, supra plurimum phlegmatis, cum manifesto levamine excludit: Die sequenti unicus paroxysmus, siquæ levis adventit, cum restitutione libertatis loci, plurima hypochondrii crassa onusta, sed livorem manifestum præ se ferentis: Porro cum Matrona virilis esset animi *adversus* accessitque deinceps urinae fluxerunt, oleum colore & consistencia referebant, sed paucæ erant: Languam ad radicem nigra, quasi à caustico expresso, cum singula & deglutendi difficultate; hinc phlegmones interne opinio enata: Morbi die 10. insida levatio, nec diuturna, ingruente enim catarrho suffocativo extinguatur. Post obitum pars summa anterioris thoracis livida & sidentata fuit, à phlegmone partes summas pulmonis cum œsophago obfidente: Negata cadaveris apertio, assertionem confirmare non potui: Ingruente catarrho ab incanto Phatmascopeo uncia tres vini Emerici dantur, cum quia inefficax, subjunctæ uncia duæ oxymelitis scyllitici inani tamen effectu, ob nocturnum partium dictatum: Et quia præcipites sili catarrhi per venas jugulares feruntur in partes spirituales: Annotatur enim à Clar. *Sigero* quotquot ab iis extincti fuerunt, in corde Polypos exhibuisse, ob concretionem scilicet subitam sanguinis in illis: Unde *Cl. Kerringtonii* opinio est eos non præexistere, sed momentaneam habere generationem.

## OBSERVATIO XXXII.

*Febris Erratica à pecore orta, in cujus sima vomica. 1. Vitis Lienis indurata. 2. vitio mesenterii glanduloso. 3. A mesenterio glanduloso, Pancreate scirrhuso, Pulmonum labe. 4. ab obstructionibus vasorum. 5.*

§. 1. Quidam natus anno 42. rotus cholericus, (*vide histor. lib. 3. sept. 17. observ. 2. §. 6.*) febrem habuit quandam Erraticam, atque tumorem durum tensivumque in hepatis regione: Febris minime erat intensa & periodica, sed hecticæ similis, quæ incerto tempore subinde per totum corpus diffundebat æstus soliro majorem, qui interim prius, interdum tardius remisit.

Aperto cadavere invenimus vomicam simæ partis hepatis, cuius non parum putrefecerat innatam. Reliqua bene constantia erant. *Coiter libello observ. Anatom. & Chirurg.*

**E**rratica Febris neque facile à quovis dignoscitur, neque curatur, omnis enim cognitio certa à quodam firmo & fixo capienda est, cum in his febribus nil certi & ordinati sit, nisi quod inordinatae sint, & subinde moveantur, de una natura in aliam, (quod erraticas & mutabiles facit) ab omnibus ordinatis distinguuntur: Hæc omnino typorum expetites sunt, id est, neque quotidianæ, neque tertianæ; sed præter modos enumeratos, adhuc citra diemum ordinem fiunt, i. e. quæ tertianæ paroxysmum, deinde quotidianæ, vel tertianæ, vel quartanæ, & tunc tardant, nunc accelerantur: Tales vero inordinatae dicuntur & sunt, quoniam multæ particulares differentie sunt, quas difficile est enumerare: Hæc solent autumno fieri, ob diversitatem humorum in corpore coagregatorum: statim tempore & autumni, temporis inordinatione solent fieri, post longas febres & sporas in corporibus debilibus: Non enim pos-

sunt istam diversorum humorum naturam vincere, & derivare, qui multi sunt, & si ad vites referantur, multi simul: Sed si particulatim & seorsim sumantur, pauca est humorum quantitas, quæ est in causa, quod ex eadem materia duæ vel tres accessiones fiant consequenter, vel quod bona fiat expurgatio: Plato illa recemenda vult subinde ab intemperata visceris alienigena generatis: pauca retinet in corpore, & cito putrescere ob caloris imbecillitatem: Ad eam curationem necesse est diligenter inspicere: cuius visceris vitio id fiat, ventriculi, hepatis, vel lienis: Si tumor aliquis in parte intetna, aut gravitas sentiantur: Talis pars in causa est, vel intemperies: Quare indicatione sumpta à parte affecta, intemperata remedia instituit oportet: In hæc febribus libertate ægrum obstructionibus, bonam procurationem & lubricum alvum habere potissimum est. *Rondeletius Pract. p. m. 812.*

§. 2. Ager febre primo quidem Tertiana per annum afflictus fuit, modo simplici, modo duplici: postmodum quartana & erraticæ: Totus Lien durus erat, plumbei coloris, magnus, crassus: In quo materia feci vini rubri similis continebatur. *Vide 1. 3. tit. de Hypoch. tom.*

§. 3. Filioles N. Febre inordinata prehenditur: Glandulæ per totum mesenterium scirrhusæ deprehensæ: Lien & Hepar punctulis tartareis, perduris undique erant repleta. *lib. 3. tit. de Diarrha.*

§. 4. Puella annos 13. nara, nomine *Dentand*, macilentia, sed vivida, morbis crebro tentabat, palpitationis cordis crebro obnoxia: Appetitu omnino carebat, imo ad capeendum cibum; per 6. vel 7. annos adigenda erat: Libera erat respiratio, præterquam in scalarum ascensu, quas nbi superaverat, anhela erat: Ingestus eibus statim in os recurrere,

nec tamen excludebatur: Sub medium Maii mensis, anni 1676. febre Erratica prehenditur, ab initio & in progressu lumbrios aliquot excludens, unde morbi origo crediti: Capitis dolore vehementi afficiebatur, cum vigiliis, qui quamquam remitteret, nunquam ex toro desinebat: Abdomen nunc tumidum erat, nec depressum; Nulla tussis fatigabat; sexto à decubitu die cordis palpitatio vehemens urget, accedunt convulsiones, die 8. mors.

Aperto cadaveris pectore, Pulmonis lobus dexter intrus & foris omnino patris apparuit undique costis & dorso cohzrens, ejus portio cum sternò à dempta, diaphragmati etiamnum adnatus: Lobus sinister à connexione liber erat, sed in corruptelam vergens, variegatus, scirrhis parvis per totum obsessus, cum abscessu purulento in declivi parte: Cor maximum fuit sed flaccidum, in conspectum omnino veniens statim remoto sternò, quia à lobo sinistro pulmonis penitus antea cooperiebatur, illum ad latus sinistrum propellens: Vasa coronaria, id cingentia, nigra erant & sanguine turgida: Jecur sanum sed maximum: Venter mollis, sed flaccidus, exolatus & ultra modum expansus, qualis in iis visitur qui crebra cibi & potus ingurgitatione ejus tonum vitiant: Mesenterium maximis glandulis, & steatomaticis erat refertum, sinistra praesertim parte: Pancreas durum & scirrhosum, ejus ductus Wirsungianus atro sanguine turgebat:

**I**N causas vehementiae capitis doloris inquirere non licuit prohibente ejus apertione: marce: Palpitatio autem cordis obscura fuit causa. An continebatur, quia Pulmones viciati sanguinem ab eo transfusum non excipiebant? Aut potius hic contagionis labe inquinatus, ad cor refluus, illi incongruus, molestiam pariebat? An à hypochondriis, mesenterio scirrhoso, maxime pancreate atro sanguine turgido, quo etiamnum vasa cordis coronaria misce distendebantur, causa rependenda? An cordis insignis illa magnitudo nativa fuit, aut palpitatiois diuturnae effectus fuit? Mirum vero fuit

quod in tanta Pulmonum corruptela, major respiratorum difficultas non fuerit, sed tantum in ascensu, maxime quod undique, ante & retro, ipsi etiamnum diaphragmati cohzrent: Tussim vero perpetuam non fatigasse adhuc magis miramur; An ideo quia Pulmonum parenchyma omnino vitiatum puris stimulum & acutum humorem non per sensit: Febris autem lentæ & putridæ causâ referenda videtur tum in obstructionem ductus Pancreatici & mesenterii, tum in Pulmonum gravem corruptionem.

§. 5. E fuceo mordaciori depradante, & viscosiori vascula infarciens, adeo contabuit corpus ægrotantis quadragenarii, ut Tabem exquisitissimum configuraret, Ex denegata namque debita nutritionum *avayōrē* superficies & extrema non solum contrabuerunt, sed increvit Febris Latens, vaga & incerta, obturationum soboles, quæ heticam ita mentiebatur, ut ipsam adesse Medici alioqui peritissimi pronuntiabant: Cui ut occurrerent *γυαλακτωσώριον* imperant, profiliunt symptomata graviora, quibus magis ingemiscens exspiravit.

Dissecti cadaveris ventriculus & duodenum lactis coagulo infarciebantur. *Bennettus Theatri Tabid. Exercitat. 26.*

**I**N *γυαλακτωσώριον* Lac affuetis, optime constitutis, a videque petentibus exhibere vice carniū, dum sanguis turgidior & calidior scaruerit, substituisse accommodatam arbitror, & quibus acer aut bilis inter fluida exuberare, modo vasculorum confinis adhuc conclusa retinentur; eminus scilicet patrescente prima symptomatum phœnisis dicatorem *φαίειν*: Ejus tamen usum vero phœnisis portus interdixit ob causas inferius necesse duxi: Qui etenim per actioris succi extravasati depradationem emarcuerat, caseosam ejus partem in spissamentum cogant, unde vascula pertinaciter obturantur: Qui à succis portentibus incaluerat, butyrosam in bilem tabumque demutant, citiusque si mellita aut saccharata admiscueris, quibus deinceps aquosa stagnatio spiritalia sufficit, iis pectus

magis insigidatur, unde anacathasis vel remotionem vel repulsum, plerisque denique capitis dolorem intulit. *Haltenus Bennettus*: Et nos infelicem *γυαλακτωσώριον* usum in quatuor vitis eodem anno vidimus, ad prolificationem Podagræ à Medicis quibusdam Parisiensibus præscriptæ. Priori, insultus podagricus, qui mensibus fere erat, constitit, per septem menses, sed nonas lethifer fuit, à suppressione humoris antrididemi committitur, ejusque in partes nobiles *μεινωσέναι*. Secundo lischutia lethalis 17. die inducta: Tercio ad tempus setocia podagræ mitigata, sed paulo post calculus renem succellit, hinc in vesicam de volutus: Quarto venter hydrofici in morem intumuit, menstruumque spatium in saburra deplenda (quæ tota erat lac coagulatum) insumpsum.

#### OBSERVATIO XXXIII.

*Febris acuta ab intestinorum inflammatione, subsequente vicinarum partium putredine &c. l. 2.*

§. 1. **F**ebre acuta correptus Fridericus filius Celsii. Principis Norvegiæ &c. 1657. sexto die Parisiis extinguitur: Aperto defuncti corpore, visa est cerebri partium integritas summa, cor ipsum quale in sanis: Pulmones per febrile incendium à constitutione naturali aliquantum degeneres: Hepar parte sui cava & majore lobo, à calore febrili ex fuceum & subnigricans: Lienis color immutatus, vergens in coeruleum, Omentum exaruerat: Renum parenchyma parte sui intèriore subangustum & subdurum: Mesenterium magna sui parte putrilagine & sanie velut quadam conspersum: Intestina subtumida & subnigricantia, Intestionum Heum duobus in locis exesum & perforatum: In vesicæ cavo glandulosa quædam substantia ad nucis avellanæ magnitudinem non adhærescens, sed mobilis: Denique per totas alvinas regiones prorupta & effusa tam ingens vitiosorum & serosorum humorum saburra ut æquare videretur pondus librarum duarum & trium.

**P**robabile videbatur Medicis Parisiensibus motem coagulabile ex intestinorum inflammatione ob aciem illam & corruptam biliosorum humorum illaviam, qui cum exitu suo prohiberentur propter coarctatam & coagulata intestina, instillarent sibi viam in abdominali spacia patefecerunt, per se & perforata ileo intestino, unde vel modica compressione excidentres totam abdominalis capacitatem abunde replebant. Hinc acerbissimi illi in alvini partibus dolorum motus hinc hypochondriorum obstinata & periclitata distensio, hinc febres, animi defectiones, obortoque tandem fædovomitu, mors brevi consequuta. Observandum mo-

nent iidem medici decubuisse & occubuisse Principem mense Augusto, canicula regnante fervida, iisque temporibus quibus apud Parisienses visæ sunt morbi complures quos cumulatior bilis eaque maligna & effera excitavit, cum plurimorum interitu. Notant præterea quomodo in modum illum incidere tentatum fuisse Bononocle in quam ajunt ab annis tenerioribus fuisse proutum; inde suspicabantur nonnulli hinc repetendam priam labem & originem mali, quamquam intestinum tum perfectissime in proprium locum sit redactum, aperto tamen corpore, inspectisq; singulis particulis desit illa suspicio. *J. B. Bartholinus scrip. N. hyst. IV.*

§. 2. Homo tres septimanas afflictus fuit complicatis morbis, Epatici fluxus, lientericæ diarrhææ cum acutissima Febre: Infra ileon intestina omnia erant livida, gangræna correpta, eor quasi rostum.

## OBSERVATIO XXXIV.

*Febri Ardens ab inflammatione meningum, quam sequuta fideratio cerebri. 1. Ardens ab Abscessu, sub cranio, putredine meningum & particula cerebri. 2. Ardens ab abscessu in cerebri substantia, inflammatione meningum. 3. A sanguine pituitoso & seroso in vasis cerebri. 4. 4.*

§. 1. **Q**uida n sæpius in dies ebrius, post comperationem sævissima cephalalgia corripitur cum omnium sensuum dejectione: Acutissime febriebar, rubebat facies cum rimore, pedes manusque jactabat, nec verbum proferebat: Dixi cerebri sphacelo correptum esse: die 3. obiit: Inveni meningas valde lividas omninoque fideratas &c. (*vide Tit. de cap. dolore lib. 1.*)

§. 2. Agricola cujus caput diu Solis radii verberaverant, in dolorem capitis gravativum illico incidit, *Febrem ardentem*, succedente die v. phrenitide & 9. morte. Dempto etanio visus tumor avellanæ magnitudine, pus foetidissimum coloris viridantis continens: meningas putredine ræte erant & portio cerebri subdita. *Lib. 1. de capitis dolore.*

**F**ebrem ardentem ] Febris Ardens (sæpe Causas) est de genere Continuum, quamvis accessio ad plures dies sine intermissione protenditur, Hæc differtentia & generationem sic explicat Erasistratus, *lib. 1. de Febre. c. 7.*

Febris continua est, cujus accessus ad plures dies sine intermissione protenditur; hæc habet remissiones & exacerbationis tempora, Intermissionis vero nequaquam: Exacerbationis modo est remissior, modo intensior; usque tamen febescit magis, donec ad crisi, aut intermissionem convalescentia morbus in totum solvitur.

Plures autem sunt modi, quibus sanguis effervescentia febrem continuum inducit, quorum præcipui adhæc capita revocari possunt: est ad cum Spiritus. Ex subillis sanguinis portio nimis incallescit, & exardescit quidam afflicta, quæ idcirco reliquis cruoris partes exagitat, & in organum quenda n incitat, adeo ut Sulphur, seu oleosa sanguinis pars prius dissolvatur, & magis in corde accendatur: etiam propterea adeit inter omnes cruoris particulas quædam seu perturbatio, qua nimium confusa & extra ordinem potius denso statim extricatur, æque in priorem situm redigi nequeunt, quæ in toto corpore fervor & incandescencia solito major excitatur: cum vero Spiritus solummodo in culpa sint, eorum zitus & inordinatio intra breve tempus solent sponte sedari: idcirco hæc febris sæpe intra diem terminatur, ræte extra triduum extenditur adeoque febris *Ephemera*, aut *Synochus pleuritica* dærum appellatur.

Secundus Effervescentie modus, sive gradus est, quando pars Spiritus sive oleosa sanguinis nimis excalefacta fervorem concipit: tunc enim & immodice in vasis effervescit, & plurimum in corde accensa deflagratione sua calorem valde intensum in toto corpore producit, Equidem sanguis, quoad temperiem suam, a conditione sulphuris maxime dependet; Quando ob crudatorem sulphur minus dissolvitur, fit cruor aquosus & frigidus, ac in vasis pigre movetur, sin

ulta crasin naturalem pars sanguinis sulphurea, seu oleosa incalescat, statim effera, & cum cæteris improporcionata evadit; ita ut fere tota à cordis fermento velut in flammam acta sanguinis massam immodice effervescent & ebullire cogat. Quemadmodum enim cum vinæ fræe opulencia prædita, & sulphure nimis rancido fervorem concitantur, aut veluti fernam nimis madide repositam, ob ventilationis defectum particulas sulphureas à mixture solutis, sponte incendium concipit pariter cum sanguis non ræte ventilatur, quin ab evacuatione cohibita, propter rei calidæ admixtionem, vel præcipuum ubertorem, aut ob aliam causam, sulphuris particule densius agglomerari incipiunt, statim, totus ejus liquor à sulphure solvitur, & in corde inflammato immodice ebullit, & hujusmodi febris inducitur, quæ *Synochus putrida* vulgo nominatur: quæ tamen appellatio licet à plaribus rejicitur, eo quod sanguis quamdiu in motu est, minime putrescat, quatenus tamen in hac febre, sulphure nimis exaltato, sanguinis mixtio non nihil solvatur, ejusque liquoris massa à crasi naturali immutata versas putredinem tendat, ideo *Febri putrida* vocabulum, prout antiquitus inolevit adhuc bona cum ratione retineri poterit.

Dividi solet *Synochus Putrida* in *Synochicam* & *Essentialem*, Symptomatica dicitur quæ ab alio quodam affectu sive morbo in corpore prius excitato origine ducit; ita ut febris sit tantum symptoma isti alteri morbo superveniens, cujusmodi habetur quæ ab angina, pleuritide, peripneumonia, à vulnere, ulcere, aut abscessu, quopiam in parte principe, aut ejus vicinia dependet, de quibus nos paulo aliter sentimus. Quod scilicet revera nulla febris Putrida sit mere symptomatica, nisi occasionaliter forsan orietur ab alio quodam affectu. Fundatur vero immediate in sulphurea sanguinis parte, nimis effervescentia velut accensæ ætem sine regumatione, seu præcedente sanguinis indispotione, prædictæ affectiones

tato, aut vix o nimio febrem putridam accersant.

Quod vero spectat ad Anginam, Pleuritidem, Pleuripneumoniam ac similia, dico, quod ista sint Febres producta seu affectus ipsam consequentes, minime vero ejusdem cause: *Septissime* enim causa evidens praecessit, quae sanguinis effervescentiam febilem produxerit, ut pote frigoris susceptio, evacuatio cohibita. Dein licet non aperte statim febrem inciteret, tamen sanguinis ebullitio solito major concitatur, prout ex urina, pulsus, inquietudine totius corporis licet consicere: post aliquos dies, modo citius, modo tardius inflammatio in hac vel illa parte producitur, Cujus ratio satis probabilis hujusmodi assignatur: Sanguis propter effluvia retenta quae se insister ferreum habent mole augetur, & in vasis plus solito turgescit, cumque ob ventilationis defectum, circulationis suae spatio angustatur, facile qua data porta arteriis exilit, & circulationis filo interrupto extravasatur in tumorem aggeritur. Et quoniam ab ejusmodi tumore calor & dolor in parte intenduntur, sanguis in motu suo magis perturbatur, adeoque febrem primo accessu plus aggravatur: Praeterea in hujusmodi febribus advertere licet sanguinis, aspritudinem quandam ad coagulandum [de quo vide Scholia ad observat. 3. sect. 4. lib. 2.]

Inquirendum vero hoc, Utrum febris, quae hos affectus comitatur, habenda sit ex earum causa, quae Putridae dicuntur necne? Cui referimus quod Septissime sunt synochii simplices, in quibus tantum subtilis & spirituosior sanguinis portio inflammatur: ideoque si a copiosa sanguinis detractione, aut vasis à sudore depletis cruor extravasatus circulationi reddatur statim effervescentia compescitur, & febris brevi sedatur: Quand, quae tamen, cum praedispositio, velut in plethora, aut insigni cacochymia, accesserit, simul cum hujusmodi affectibus, ab eadem prorsus occasione Febbris Putrida accenditur.

Inter Febres *Symptomaticas* refertur, quae vulgo *Lenta* appellatur, de qua vide supra observat. 5.)

Febres autem quae Symptomaticae dici maxime metetur, ea est quae in Phthisicis à Pulmonis ulcere, aut contrahescentia excitatur, Etenim sanguis dum pulmones in circulatione sua totus pervadit, huic visceri plurimum morborum ideas sepe imprimit; & vice versa ab eodem male affecto easdem recipit: Quicquid impurum in cruoris massa continetur, arteriarum extremitatibus, velut molli efflorescentia ejicitur; quare cum natura debilior facta in superficiem corporis excrementa sua nequit transferre, proprio lustratione eadem in pulmones deponit: Hinc insignis cacochymia, & morbi plerique chronici frequenter in phthisin desinunt: Patet enim pulmonum cito contrahescit, aut sceleris ulceroso forensis semiputrida evasit, sanguis pertaniciens materia purulenta, aut tabida inquinamento inficitur, & proinde continua effervescentia, ob rei non miscibilis confusionem concitatur, quare & febrem Assiduam inducit, & succum alibilem omnino pervertit; par ratio est de Febribus ab ulcere, aut abscessu saepe in aliis partibus concitato; haec enim non fecus ac tabida Pulmonum continuo saepe Phthisin & febrem Healticam inducunt. De Febre *Lenta* ex mente Fernellii vide supra observat. 6.

*Synochus Putrida Essentialis* dividi solet in putridam (qualis supra describitur) in *Causam*, & praeterea in *Quotidianam*, *Tertianam* & *Quartanam*, Synochus putrida modo delineata, ceterarum regula sive norma esse debet, ad cuius typum plenamque Febres quae sunt generis hujus componuntur, reliquis breviter subiiciam.

*Causa, seu Febri ardens*, ea est quae cum majori aestu, sicut fere intolerabili, aliisque symptomatis infirmorem sanguinis phlogosin arguentibus, cursum

sum peragit. Ejus ratio formalis, quae à ceteris differt, minatur, in hoc consistit, quod temperies sanguinis, ea affectus sit calidior: h. e. sulphure concretibili magis abundat: ideo cum effervescit majori copia incenditur, & deagatione sua caloris intensissimi effluvia per totum corpus diffundit, Ejus motus est acutus, & cito ad statum pervenit: Symptomatum magis honestis stipatur, crasis habet densiorem, & eventum peius, calidus acrior plenior.

Quod vero spectat ad periodos istas: sive paroxysmos quibus febris putrida statim tempore interitum exacerbat solet, & (veluti inremittens) diebus modo singulis, modo tertio quovis aut quarto febrem quasi accessionem repetit: Hujus ratio non facile explicabilis videtur, praeterim si quatuor huiusmodi, quorum (prout auctores motus hic effectus vulgo adscribunt), ab hoc censu rejiciamus: super hac re quod mihi venissimum videtur proponam: In Febre Continua duo sunt principia quae sanguinis effervescentiam aut plurimum inducunt, nimirum in errore partis sulphureae exaltatio & accessus, inde consequenter materiae adustio, & de flagratione sanguinis resolutio, ad turgescientiam congestio: A priori febris continuatur, Ab altero ejus flatus & perturbationes criticae dependent: his aliquando tertium quoddam accedit, nimirum succi crudi ab alimentis ingestis reces plenitudo & turgescencia quae statim temporum intervallis (prout in paroxysmis intermittentibus) majorem effervescentiam inducit: Cui autem non semper, nec eodem prorsus modo hoc contingit, ratio haec est, Quando Synochus putrida est valde acuta, & sanguis fere totus cito inflammatur, & summe adurit, quicquid succi nutritii erui si funditur, statim adurit & incendio absumitur: quare parum aut nihil ejus in paroxysmi materiem & massam sanguineam continetur: Sin vero haec febris & minus acuta, & sanguis modice & per partes solummodo desagrat, succi crudi supplementum non prius adustione absumitur, sed mitiori incendio in materiam fermentativam pervertitur: quae cum ad turgescientiam plenitudinem in vasis assurgit, fluorem concipit, & effervescentia sua calorem febilem prius in sanguine gliscientem, velut novi pabuli accessu intendit: Hujus materiae efflorescentia non raro cum levi rigore aut frigore incipit, & aliquando in madorem desinit: plerumque vero transpiratione insensibili exhalat: In singulis paroxysmis, praeter succi nutritii degeneris penum, aliquid & materia sanguinis adusta & concreta evapora: quare morbi crasis diu protrahitur, ut raro intra dies 10, aut XIV. perficitur, quia ut plurimum, in febre hujusmodi paroxysmus & remissionibus intercalata, vix intra dies 10. perfecto morbi solutio contingit; atque aliquando sine manifestis disacris sensum remittit, & dein longa declinatione in mortem aut salutem terminatur: Quod vero hujusmodi remissio & exacerbatio juxta typum febri intermittentis variantur, aut diebus modo singulis, modo alternis, & interdum nonnulli intra quatuordecim vices suas repetant, hujus ratio à doctrina febrium intermittentium petenda, nimirum juxta quod sanguinis dyctasis diversimode se habeat, succi nutritii degeneris supplementum citius aut tardius ad turgescientiam plenitudinem assurgit & proinde effervescentia sua modo crebrior: modo rariore in hac febre paroxysmos efficit.

*Tertius Efflorescentiae gradus*, qui & distinctam Febrem continuam speciem constituit: à fermento quodam maligno & venenoso inducitur, quo cum sanguinis massa imbutur, & spiritus, & pars sulphurea una fervore concipiunt: eorumque exacerescencia non prius sedatur, quam aut materia ista maligna assumpta sit, & focus eliminetur, aut etiam à veneno ejus corruptivo sanguinis coagulatio, & veluti putrefactio quaedam inducatur, quae & circulatio impeditur, & spiritus

viscidis exstinguuntur: ordo solet hæc malignitas; vel à contagio quodam ab extra suscepto, vel à miasmate quodam intus in nobis genito: Intra hosce modos *febris maligna, Variola, morbilli*, etiam *pestis* origines suas deducunt, & contagio suo late in ipsas graffantur.

Sunt itaque tres Effervescentiæ gradus, sive modi, è quibus febris continuatur species determinantur: A subtili sanguinis effervescentiæ portione, seu *Spirituum ebulliens* oritur *Ephemera*, necnon *Synochus* unius aut plurium dierum: A *sulphoreæ*, seu oleosa sanguinis parte nimis excalescens, & accensa, *febris putrida* conflat: dein, 3<sup>o</sup>. è *miasmate venenato*, sanguinem inficiente, ejusque liquorem congelante, *febris maligna* dependet. In singulis horum à succi alibilis recens in sanguinem congesti depravatione, seu potius corruptione, variis paroxysmi, inæqualitates & motus critici oriuntur: Videndum porro quo pacto effervescencia sanguinis in febre continua disjicit ab altera illa, quæ intermittentes constituit.

Dico igitur quod effervescencia sanguinis in *febre intermittente* unice dependet à materiæ cujusdam fermentativæ, & cum cruore non tunc miscibilis commixtionis, ejusque ad turgescentiæ plenitudinem congectione: Propter unius effervescenciæ cum sanguine in vasis & degenerationem in corde, paroxysmus inducitur, ejus distillationem *ampullæ* sequitur, ut paroxysmus interitio, neque Spiritus neque Sulphur impetum faciens: venam integre servato mixtionis vinculo, liquor æqualiter & sine tumultu in vasis circulat: E contra in febre continua Spiritus aut sulphuris, aut si-

mul utriusque inordinationes propria *dispositione*, etiam sine alterius miscela, sanguinis ebullitionem concitant: quæ ad *ampullæ*, præter materiæ excrementitiæ distillationem, sanguinis accensi deglaciatio, ejusque ad debitam crasin reductio requiritur.

Constat quoque sanguinis in febre continua est ejusmodi ac vinosum; cum nimis à fecce opulenta effervescant nimirum & spiritui pollent, & Sulphure exaltato turgescunt, ideoque sua sponte, sine alterius mixtionis fervorem concipiunt vel immaniter ebulliant: In febre *Intermittente* commoveitur sanguis eo rito, ac vina, cum propter aliquod non miscibile tunc consulum, effervescencia concipiunt: Insuper in hac febre cruoris distthesis ejusmodi est ac vinosum, cum in casu & declinatione sua, mucilaginoso, rancida aut etiam acida sunt in quibus nimirum spiritus deprimitur, interitio ut sol: aut Sulphur aut utrumque simul cæteris emineat, & inordinatione sua totum liquorem afficiat: Febris *Intermittens* periculo aut plurimum vacat, quoniam partes sanguinis constitutivæ, licet crasin paululum mutarent, ut cunque mixtionis vinculum servant, & dum sui juris sunt, æqualiter in vasis circulantur; quin & succum nutritium in materiam non omnino præter naturam; sed plenitudine & turgescencia sua magis infestam perverunt: In *Continua* febre, præter intemperiem, sanguinis mixtio & liquoris compages nonnihil solvuntur, ut corruptio ejus facile solvatur: quare hic morbus sæpe in mortem terminatur; Insuper succus alibilis in materiam penitus vitiosam & omnino naturæ infestam depravatur. *W. H. de Febribus cap. viii. §. vi.*

§. 3. Fœminæ graviter caput contusum: accessit Febris acuta: Inventus fuit abscessus in cerebri substantia, Membranz ipsium investientes lividæ. *lib. 4. tit. de vulneribus.*

§. 4. Mulier ex ingenti animi dolore: Febre ardenti cum capitis dolore &c. corripitur: Sanguis ductus majori ex parte pituitosus, erudus & serosus fuit. Dum mortuæ fessa cranium removeretur, effluit aqua loturæ carniū similis: Tenuis membranz & plexus choroidis vasa aquosa & pituitosa sanguine turgabant. *Vide lib. 1. sect. 7. observat. 16.*

**C** Aralus Pifo febres continuas serosum humorem, pro partiali subiecto agnoscere statuit, *sect. 6. lib. de morbis à sero,*

## OBSERVATIO XXXV.

*Febris Acuta à Pericardii inflammatione 1. Ardens à Pericardii & Pulmonum phlegmone suppurata. 2. Acuta ob foetidum humorem sinistram Cordis sinum replentem & totum fere thoracem. 3. Acuta à Mediastini tumore inflammatorio. 4. Pericardium eorum quos Causus extinxit exhaustum reperitum, Cor marcidum. 5. 6. 7. Juvenis ab ardente extincti cordis ventriculi sanguine flavescens, illis affixo, pleni reperti. 8. A Cordis phlogosi & vasorum ejus tumore. 9.*

§. 1. Quidam cum Acuta febre crassitatis ingens, anxietas, dyspnoea, tussis sicca &c. Scdulo palam fecit fuisse pericardii inflammationem &c. *Vide lib. 2. tit. de Lateris dolore.*

§. 2. Agricola plaustrum feno onusti eversionem in se sustinens, de dolore pectoris conqueritur, Ex diebus aliquot elapsis Ardente febre consticti cepit. Pericardium scatebat pure copioso cui velut immersum eor &c. Pulmo ejusdem labis particeps. *Vide lib. 2. Tit. de Pectoris dolore.*

§. 3. Civis M. post melancholiam Acuta febre lethali prehenditur: Tota fere cavitas thoracis tenni, prærubro & foetidissimo humore oppleta erat, nec non sinister cordis sinus eodem humore plenus erat &c. *Vide Tit. de Syncope.*

§. 4. Nobilis Febre Aëura detinebatur, cum spiratione frequenti, tussis, angustia ad sternum, syncope. Inventus in Membranis intersepticibus tumor inflammatorius, qui ex parte communicabatur pericardio. *Lib. 2. tit. de Pectoris dolore.*

§. 5. Parvii puer quidam frequenti siveum cibo scirrhum contraxit Jecoris, nec longe post in Febrim incidens Ardentissimam, die periit critico.

Ejus dissectandi cadaveris facta copia, aperto abdomine, extra in foetida natate aqua, fœcus thoracis, pericardium expertis aquæ, maximo & continuo cordis actu depastæ, corrugarum conspicebatur. *Observatio Lesseni à Lessen.*

§. 6. Juvenis quidam intra triduum Febre Ardentissima, maximisque symptomatibus

corruptus mortuus est: Secto corpore Cor correfactum pyri tosti imaginem representans, absque ulla pericardii aqua inventum fuit. *Dominicus Panarolus Pentec. 1. observat. 31.*

§. 7. Ardente Sirio juvenis in Caustum incurrit, cum lingua nigra, Siti chamosa, viscerum ardore & nimio viscerum caumate pressus, applicitis remediis convaluit: Post duos menses debilis factus iterum incidit in Ignem: curatio non potuit efficere quia macie tabefactus è vita migraret.

In ejus sectione inventum est cordis involucrum rugosum, & cordis ipsa substantia marcescens: Nec mirum, quum omnis fere humor qui in pericardio natura sua continetur, ab affante calore fuerit exhaustus. *Zacutus Pr. Adm. lib. 1. Observat. 142.*

**P**ericardium ex parte aquæ &c. ) Exhausta ab ardore febrili lymphæ: Vasorum lymphæ inter ceteros usus hic est, ut aquam quibusdam partibus certos in fines apportent, imprimis cordi, sive ad sanguinem alioquo crassiotem ocoonili diluendum, sive caliditatem temperandam: hinc in inflammationibus, calida

totius temperie, affantur facile & exsiccantur, unde æstuat ob humiditatis hujus defectum ebulliens sanguis, & ad febres ardenies producendas operam conferat infelicem. Th. Bartholinus cap. 7. de valis lymphaticis.

§. 8. Sanguinem grumofum in sinistro & dextro ventriculo cordis interne affixum semel tantum observavimus, in tot quos secavimus, in quodam juvene Febre ardentissima mortuo, non concretum, nigricantem & stagnantem, ut in aliis, sed maxime rubrum, aliquantum flavescens, in cordis ventriculis maxime adherentem, ut secari non posset citra lacerationem. *Panarolus Pentec. 2. observat. 29.*

**E**xperientia, ut ait Gal. de sanit. tu. fidem inventorum comprobat, sed non nimis coriose expectari aliquid debemus, sed solum ad indagandam veritatem, alioqui, aut oegligentia talpas nos reddit, aut nostræ opinionis amor vitrum luforium oculis nostris imponit, unde confundimur & fallimur: Hoc dixi, nam aliquando secando corpora, dum aspiciunt, aut

in aliquo magno vase sanguinem concretum, sicut in omnibus cadaveribus apparet, statim aut sanguinem grumofum, aut cornua cervorum, aut vermes lethales in corde reperisse æstuo: cum revera nihil horum sit, sed sanguis frigidityte cadaveris concretus cum adipè, qui secundum vasa volubilia & tortuosa ita diversas figuras ostendit.

§. 9. Lectori cuidam Febre Acuta prehenso statim vivere corpori supereilium sinistrum, & antequam viginti duæ elapsæ essent horæ, totum corpus sphacelo fuit tentatum, ipseque exspiravit.

Ego gravem subesse aliquam cordis affectionem suspicatus, curavi ut dissecaretur cadaver: Quo facto cor invenimus duplo majus quam in sanis esse solet, cum venis tumentibus & inflatis ad digitum crassitiem. *Hercules Saxonia Praelector. Practic. Parte 1. cap. 1. §. 5.*

### OBSERVATIO XXXVI.

*Febbris Ardens à Pulmonibus inflammatis, qui nigri & corrupti reperti. 1. A Pulmonum Erysipellate. 2. Acuta à Pulmonum inflammatione in sphacelum desinente. 3. Acuta epidemica à suppurato sinistro pulmone lobo, Es puris collectione infra diaphragma. 4. Acuta ab inflammato pulmone lobo sinistro & latere sinistro vicino. 5. A puris copia in thorace. 6.*

§. 1. **Q**uadragesarius febre ardentissima correptus doluit etiam à latere: detractus medio criter sanguis ad vascula duo: perseverant omnia neque cedit dolor remediis: Sexto die detractus iterum sanguis ad duo vascula puris & corruptus: Sudor 7°. levis, tenuis & tamen in capite & thorace: nihilo melius habet: deliria nocturna, æstus & inquietudo magna, urina turbida: sudavit: 9°. & 11°. nihilo levata febre, 10. levius habere visus, nocte eadem patitur: 11°. urina subdunt, sed divulso & nigro sedimento, sudat ut prius: pulsus perpetuo frequens & magnus cum paucis inæqualitate: Jam tendens manuum sine manifesto membri motu revelli sentiuntur: urina bene colorata & corporata cum sedimento nigro: 13°. floræ colligit, manibus revelluntur digiti, delirium fere perpetuum: 14°. media nocte mortuus est: pulmonibus corruptis nigricantibus inventus est. *Hollerius libello observat. §. XIII.*

**F**ebre ardentissima correptus, doluit etiam à latere: Sanguis eductus puris, urina turbida &c. ) Advertendum est diligenter (quod maximi est in praxi momenti & à paucis animadversum) non omnes perpetuo febres que cum partium inflammationibus coniunguntur esse symptomáticas, sed quasdam etiam esse Essenciales, quibus inflammationes prædictæ succedere solent: Hic eorum plerumque nec sanguis corruptus, nec pravis humoribus refertus, postquam febrem excipit, exaggeratur à natura, & tanquam sibi oculus expellatur ad partes debiliores, aut humori reat-

pleo magis idoneas, unde in his inflammationes producitur, quæ febrem istam non efficiunt, sed illi potius succedunt: Sic nobis frequenter in usu practico videtur ægros, ab initio febri coctionis laborantes per unam aut alteram diem antequam dolor lateris & alia pleuritidis signa appareant: sic multi 30. vel 40. die febris in pleuritiden incidunt: Sic arthritici fere omnes, antequam dolore, tumore, inflammatione articulorum afficiantur, febri coctionis per unam aut alteram diem laborare solent: Sic qui erysipellate tentantur, febre aliquod diu afficiuntur antequam erysipelas appareat: Id ipsum

ipsum ostendit *Urinarum* dispositio, quæ in huiusmodi inflammationibus notas putredinis in venis contentæ manifeste producit, initio enim crudæ apparent, in progressu vero signa concoctionis in dies incrementis ostendunt. Tum *Sanguis* è vena admodum corruptus

apparet interdum, quæ non fierent si febris ejusmodi esset tantum symptomatice, aut ab illis inflammationibus simpliciter dependentes. *Rovius Præf. lib. 17. cap. 1.* Vide *Placitum* è quo hac doctrina desumpta.

§. 2. Intimus Sac. Cæf. Majestatis consiliarius, à parente podagrico ortus, circa annum 35. doloribus arthriticis infestari cepit, à quibus ut liberaretur emplastris quibusdam à Chirurgo oblatis est abusus. Sed incidit in scyllam volens vitare charybdis, nam post unum vel alterum annum correptus Ardente febre, eum erysipelate Pulmonum suffocatus inierit.

Cum autem mors semper fere imputaretur Medici, quasi terminum accidentalem potius essent devinere, ideo hanc ut calumniam fugerent, ad eorporis dissectionem confugunt, in qua Pulmo, post remorum sternum, niger adeoque tumidus sese obrulit, ut naturali suo reddi non poterit hospitio: Epar magnum plurimo nigroque sanguine conspersum, cum cysti fellea omnibile dekiruta examinanda se obtulerunt, Cum autem sufficiens mortis causa in Pulmone inventa fuisset, dubii fuimus an aliz investigandæ forent particulæ: Ultero ergo progressi, in utroque rene duo magni calculi inventi fuerunt ponderis 3vj. nullo signo præcedente, sive arenulas, sive pedum torporem, sive lumborum gravitatem sive urinz indigentiam consideres: Nam copiosiores justo fundebatur urinas, sed aquæ simillimas, Sicutque adeo intolerabilem patiebatur, ut nullo potu ea sedari poterit. *Antonius de pazzis Observat. 32. Miscell. curios. anni. iv.*

§. 3. Gener. Viri D. Thomæ Trenchard, Equitis auri, famulus à pedibus, annos circiter xxv. numerans, proseræ staturæ, temperamento bilioso, cum ex officio multum incalvisset, hausto cerevisia, forsan frigidioris poculo, incidit in tussim, cum pectoris angustia & spirandi summa difficultate, accedente Febri Acuta, cum intensa siti, & malarum rubore, pulmonibus laborantibus & inflammatis familiaribus: Hic ut erat robustus initio hunc affectum parum curans de vocando Medico parum erat sollicitus: Eo vero indies ingravescente, Herus, servi amantissimus, me accersiri curavit, Ad quem ingressus, pulsum inveni tangendo magnum, undosum quodammodo & languidum: consideratisque symptomatis, hominem peripneumonia laborare affirmavi, dato simul *Hippocr.* oraculo, Quod pauci eam evadant: Ego tamen sine eunctatione, cum tertius esset à prima invasione dies, basilicæ dextræ incisionem institui, & detraxi circiter septem sanguinis uncias, cum virum imbecillitas largiorem profusionem non admitteret, et si sanguinis plenitudo adesse videretur: Sequenti die ad materiæ impetum à pectore avertendum, & humores vitiosos evacuos, exhibui mannam, decocto pectorali dilutam, adjecto syr. rosar. sol. cum agarico: Leniter inde purgatus fuit, sed symptomata omnia ingravescebant, ut de salute ejus omnino desperarem, maximo cum sputum non procederet, & febris exacerdesceret: His ut subvenirem, præscripsi Eclegma, 2℥. conserv. viol. & borrag. mucil. sem. psyll. & cydon. cum aq. decoct. malv. violar. & lactucæ extr. ana ʒi. tab. diakh. ʒi. emuls. iv. frig. semin. & papav. alb. ʒij. syr. violar. & juiub. ana. q. s. m. f. Eclegma. Pectus unguento pectorali & resumptivo mixtis inungi curavi, &c. Cum vero in lipothymiam ereberrime pronus esset, & refici necesse haberet usus san, ex imitatione Valleriolæ, succo ex vervecum cordibus expresso, addito tantillo confectiois Alkermes: Sed sicuti exitiale signum est, ubi nunquam ullis auxiliis, ratione recta administratis recreatur natura, ita & in hoc ægro contigit frustra adhibitis prædiis, 7<sup>o</sup>. tandem die, morbi magnitudine superatus, naturæ cessit.

Hujus corpore, Nobil. Heri jussu à me dissecto, omnes in infimo ventre contentæ partes apparebant bene constitutæ: Pulmones vero membranæ costas succingenti in utroque latere per plures fibras erant connexæ, unde difficultas spirandi ex parte proculdubio processit, forsan etiam inflammationi ansam præbuit, Substantia eorum erat nigricans & sphacelo correpta, Et hic fuit morbi exitus, ut verum sit quod Celsus ait, Peripneumoniæ scil. esse vehement. & acutum malum, quod plus periculi quam doloris habeat, paucique ea correpti evadant. *Fridericus Lessius obser. iv. lib. 2.*

Cum virum imbecillitas largiorem, &c. ) Peripneumonici sæpe imbecilli sunt & delinquent animo, ob incendium & obfidionem partis principis, & tamen non oportet esse valde timidos in secunda vena, imo audacter mittendus sanguis: Nobili mulieri a. *Rabonius Epid. lib. 1.* post horrores acuta febris orta est, cum lingua aspera, dolore lateris acuto, dyspnoea, secatur vena, non quiescit, deinde repente sedatus est, evanuit potius: 4<sup>o</sup>. rubent insigniter genæ, deliria, mentis alienationes, frequentes succutiones, jastrationes, nullus lateris dolor, caput dolebat, febris duplo major, lingua torrefacta apparebat, & mucore plena: Peripne-

monia facta est per translationem, alvus liquidis durcitur excrementis, vicesimo interit: Debeatur us illam pluribus venæ sectionibus exercere præsertim cum Peripneumoniz adessent argumenta, nam morbus iste maxime phlebotomiam postulat.

Basilicæ dextræ incisionem, &c. ) Si ut voluit Medici, vena Peripneumonia oritur exciso tenui & bilioso sanguine, à dextro cordis sinu in venam arterialem, unde totum Pulmonis corpus inflammatur, sectio venæ videtur potius celebranda ex invisiore dextra: Tamen Ferr. nelli ex sententia quorundam, in inflammatione Pulmonum, secari vult internam cubiti sinistri: ratio ejus



hæc est, quia Pulmonum venæ ex dextro cordis sinu prædeunt, hæc autem in sinistram parietem venæ cavæ inseritur, qui per alam sinistram in cubitum excurrit. *Ballanius conf. 27. lib. 1.*

*Exhibui mannâ, &c.*) Peripneumoniam & Plenritidiam, quoad curationem, & maxime circa purgationem, eadem est ratio; imo quibusdam Plenritidis legitima non datur citra coactos pulmones: Quantum vero in hac (inquit auctor *Encheiridii med. Pract.*) prodest venæ sectio, tantum nocet purgatio, quantumlibet blanda & leniens: ea enim commotus humoribus fluxionem auget, Aut si jam fluxio constituerat, eam renovat, magno ægri damno: Huc accedit quod in malis thoracis alvi fluor noxius est: ideo toto curationis decursu à catharticis abstinendum, alternis tantum diebus alvus dura clystere emollienda: Adde quod cathartica ex affecta parte nihil evacuant. *Risnerius sent. 1. obs. 98.* Purgationem in peripneumonia interdum ante septimum convenire ait, in pituitosa scilicet & ubi æger multa pituita refertus videtur: quod in quodam simili laborante feliciter

§. 4. Illustr. ejusdem Comiris Filiolus trimus, vigoris supra ætatem solidi 1. Dec. anno 1653. tumorem pone aurem sinistram, ad juncturam maxillæ inferioris radicatum, sed tamen usque in collum protensum, cum dolore ardente monstrabat: qui indolem suam provido Medico mox sequenti die cum Febri Acuta Epidemica, gravi anhelitu & tussi sicca, constanter in mortem usque tenentibus hunc Pusionem, loquebatur: Die 5. hujus virulentæ Epidemiciæ sobole, successit alvi profluvium atro carbonæ nigrius & effusissimum cum dysphoria potius quam allevatione patientis persistente tussi illa sicca & præcordiorum quasi præforata spirandi difficultate, nuncio hujus veneni in spiritu vitali & liquoribus naturalibus jam habituati & tyrannidem suam exerceantis: Cimmericis plusquam ignorantæ tenebris occæcati duorum medentium oculi, hanc catastrophën è summa virulentia non advertentes, catarrhi figmento, quo totus orbis cluditur, afflictis parentibus & adstantibus singulis imposuerunt: Post 4. septimanam per alvi recrementa rejecto vermiculo, totus in eorum expulsionem incubuit Medicus: etiam mercurium vomitivum exhibere paratus: Interea cum indies magis arietaret pro suo mercurio, Tumor oedematofus albus, nitens, circa Puelli hujus medicamentis inundati malleolos, in utroque pede exortus, supra furas, subito perreptat abdomen, & prima vice manum & faciem dextram occupat, ultima, & mortis, sinistram quoque, cum summa palpitatione illius lateris dextri: Die xi. Januarii exhibitus mercurius dulcis ad tria grana in pulvere: Ex hoc deiecit hic æger octo sedes scetidæ mucosæ (vermem veto nullum) liquidas, colore fere gryseo, cum allevatione respirii & tussis illius continuz, remissione etiam palpitatione dextri lateris, adeo ut cum hætenus ne manum quidem ferre posset, hic dextro lateri (quod pluribus septimanis non factum) incumberet, & indormiret satis placide: Die 12. insequente propinatæ quinque guttæ tincturæ martis in cerevisiâ: hora octava insequente ægrum sat bene comedentem & avidè, & solito pauciores urinas vidimus: Die 10. alternata vice usutincturæ Martis seposito, surrogatus est mercurius dulcis, dozi trium granorum, vermium & incipientis hydropis causa: qua tota die nil nisi duas ante mediam noctem dejectiones coctas, naturales compactas habuit, & melius illa nocte quievit: mirabantur nobiscum astantes effectum & notabilem meliorationem, sed tamen perfidam ex hujus medicamenti usus bis repetito, Nam continua tussis & pleuram dextram circumfiliens palpitatio, remissior in tantum observata, ut pluribus, ac nunquam hætenus, horis æger hujus lateri incubuerit, hodie de nullo querulus: Secundo tumor, tempore vespertino, in pedibus & furis prominentior semper, solita mensura circa suram utramque, ad duos transversos digitos monstratus, spem Illustr. parentibus faciebat meliorem, quam tamen minus tutam satis semper prædixi: Die xxv. eadem euphoria perseveranti ægro, post somnum præterita nocte satis commodum, denuo, mane expurgato exhibitæ sunt guttæ 4. vel 5. die de tinctura Martis: satis tota die commodè valuit: Die xv. spes hæc meliorationis, prout prædixeram, concepta frustrari cœpit penitus, etsi domestici lætius sperarent: mihi unico nomine suspectus fieri cœpit, quod eum febris æstu immanius recidivante, præteritam noctem duxerit totam infomnem, mox omnem cibum tam subito respuebat, vix respirium ducens & quasi suffocandus: Die xvi. ubi ex enemate ægri euphoria sperabatur, præcedens nox infomnis & inquieta hujus injectioni successit: manus faciesque sinistra, itemque latus ad oculum intruere: Abdomen mensuram solitam, qua in dies tumor explorabatur vel diminiens, in sex transversorum digitorum incrementum per horas notabile elongavit: pedum itidem tumor albus, oedematofus, nitens, circa suram ad duos transversos digitos adausus, & ad genua extensus eum respi-

præstitit, qui ejus etiammodum magnam quantitatē vomituerat: Alias pernitiosa, ait, censetur: In dextro autem juncu biliosa erat Peripneumonia.

*Eclēma, &c.* Quod tenuitatem & mobilitatē humorum infringere valebat, alias ad crassos & obstruentes humores valent quæ moderate humida, si viscosi, non solum opus humiditate, sed & deterfione ex aridis, sic melicratum ad crassa, oxymel ad viscosa conducit.

*Pellus innungi curari*) Litus ad thoracem an pulmonicis contenti videtur quod non, nec enim anniguit corpus Pulmonis: Primarius Medicus duas ob causas linit thoracem, tum ut per diaphorēsin thoracis evacuetur, hæc autem in pellendis morbis primas tenet: Si enim æger calido est, acti & mordaci sanguine litus iste est bonus: Si cruditas est, valet ad mitigandum, & aliqua ratione coquendum, tum ut pituita, quæ præ colore & siccitate membranis adhærescit, difficultatem spirandi & dolorem infert, facilius eluatur. *Ballanius Epid. lib. 2.*

rio anxio & agonizante: Ideo seposito usu tincturæ Martis, de spiritus salis cerevisiæ usuali commixto, propinatum est ægro, ut urinæ, quæ deficere sensim exepere, liberius succederent: Die xvij. incrementum fumentum tumore & dyspnœa, mane æger sumpsit medullæ seminis ebuli curiose excoctatæ grana vij. cum gr. iij. Mercurii dulcis in pulve è confusis amygdalis facta: in interdium bis de jecore liquamina mucosa recrementis alvi commixta: circa vesperam satis vegetus: Ex quo post mediam noctem præfocationis sibi imminenti quasi præfagio excitus puerulus, hora secunda antelucana cum morbo vitam quasi præfocatus & anxius finivit.

Die sequenti apertum & exenteratum est corpusculum puerili: Antequam Chirurgus novaculam admoveat, invitavi Medicum Corradæ & D. Davissonium, curationis comites, velint dispicere an putatili & toties incusati vermes tantorum facinorum & mortis reatus postulandi fuerint, An potius, quod fieri amat in febrium harum Epidemiarum, maxime castrensiū procrastinata curatione, viscus aliquid naturale, etiam Hepar ipsum eschara vel lethali characterisatum: vel hospite malignitate habituata exsolutum occasionalis causa fuerit illius hydropsis, ad prædictas mensuras, duabus ante mortem hebdomadibus subito tumefaciens, sub cujus tactu præfocatus videbatur hic puerulus: Aperto tamen abdomine, vermis nullus inventus: Sed ecce post hanc exenterationem, quod prognosi Medica nullus nostratium augurari potuit, in sinistra parte obviabat magna diaphragmatis propendentia instar sacci, purulencia ex albo virescente, è totali suppuratione sinistri lobi Pulmonis, salvis corde & pericardio, adeo infarcta ut liquamen illud purulentum, postquam scalpellum à Chirurgo per musculos intercostales in cavum thoracis penitus intruderetur, instar fontanæ profliret, & è cavo thoracis, postmodum aperti, supra mensuram dimidiæ ollæ effunderetur, de parenchymate vero pulmonis ne vestigium quidem compareret reliquum: In abdominis cavo vero aqua inventa nulla. *Andreas Cuselius in methodo med. feb. Epidemias.*

§. 4. Filiola N. Febre prehenditur acuta cum tussi, &c. Latus sinistrum purulentum erat & pars Pulmoni quæ illud contingeret. *Vide lib. 2. tit. de Tussi.*

§. 5. Juvenis inter 6. & 7. costas vulneratur. Sequitur Febbris acuta, anxietas, gravitas in parte, &c. Ingens inventa inter thoracem & Pulmones copia puris. *Vide tit. de Vulner.*

## OBSERVATIO XXXVII.

*Febris Ardens à secore retorrido, in quo sanguis ater & corruptus. 1. A secore extremis partibus inflammato 2. A secore maximo inflammato. 3. Febre Acuta extincti secor disruptum inventum est & combustum. 4. Ardens vulnus Hepatis sequuta. 5. Ab Hepate bile undique suffusa, flavissimo, &c. 6. A portione Hepatis inflammata. 7. Ab immani Ejus tumore, intus duri, retorridi. 8. A bile acerrima è cysti emanante, adusto sanguine in corde, &c. 9. A dextri Hepatis lobi & Splenis inflammatione. 10. A Liene phlogosi laborante.*

§. 1. **P**etrus Venetus (*de quo Tit. de Narium aff. lib. 1.*) ad olfactus privationem usus calidis medicamentis, in febrem continuam incidit, quæ intra nonam cum jugnavit. Repertum illi Jecur valde obstruatum, durum, & quasi lapideum nigri coloris, carbonum instar, sanguinisque in eo contentus perinde erat atque attramentum valde ater & corruptus.

§. 2. Filius D. N. ix. annorum febreeipyrice correptus est: Hepar erat consuetæ magnitudinis, in extremis partibus tostum, nigrum, durum. *Vide lib. 3. tit. de Mixtione difficili.*

§. 3. Filius Dom. N. novem annorum, bonæ complexionis ægrotavit diebus xxxij. febre Ardentissima, quæ spatio paucorum dierum consumpsit puerum. Mortui inveniebatur Hepar immensæ magnitudinis prorsus sanum, nisi quod in extremis partibus esset tostum, nigrum & durum. *Bartholinus cent. 3. hist. 34.*

§. 4. Aurisaber habebat ministrum macilentum & longæ staturæ, qui ineidit in febrem satis acutam: Monitus à sodalibus, accipit vinum malvaticum cum zinzibere & aliis aromatis ad provocandum sudorem: sed cum ex hoc levi sudore parum juvaretur, monitus accepit ab eisdem Theriasam & intravit balneum, ut magis postea provocaret sudorem, quod & secundo fecit, sed res semper cessit in deterius: Vocatus, adhuc refrigerantia & omnia quæ possunt moderare illum æstum, sed frustra, & intra paucos dies exhalavit animam.

Secui corpus, Hepar ex nimia illa caliditate combustum fere inventum, ita ut haberet quatuor rimas in gibbo. *Ex observation. D. lob. Hessi med. Norici.*

§. 5. Duobus Jecur vulneratum fuit, ut post mortem videre licuit, qui quotidie bilem evomebant & inrenissima Febre ardebant, &c. *Vide tit. de vulneribus.*

§. 6. Filia Viduz N. 14. annos nata laboravit febre Assidua cum ventris tumore, in quo per vices dolor quidam punctior: Aperto cadavere inventi sunt muscui abdominis in loco tumoris, putredine affecti: Hepar colore flavissimo adhærebat perironzo undique diaphragmati, & mole sua mediam thoracis partem replebat, ut ipsi cordi omnino esset vicinum. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 7. Seotus febre prehenditur Affidua, &c. Aperto mortui abdomine primo se obtulit Hepatis lobus orificio ventriculi posteriori affixus diaphragmati nothisque costis, ut non nisi frustillatim avelli potuerit. Portio hæc lilius nigricans ex inflammatione quæ præcesserat, reliquum hepatis recte se habebat. *Platerus Observ. p. 471.*

§. 8. III. N. inflammatorio Hepatis affectu, Febreque *Continua* prehensus fuit: Iecur illius immani tumore extuberans repertum, interius ligni instar durum & retorridum. *Vide l. 3. tit. de Diarrhoea.*

§. 9. Anno 1670. Auriga ex Febre continua ardente quasi furibundus, in via Regia demortuus, iussu Sereniss. Electoris Saxoniæ secabatur: In exenterato cadavere inter cætera observavi viscera omnia bene constituta, excepto quod in ventriculo neque cibus neque chymus sese offerret: Erat autem repletus materia viscosa fluidiore, ex viridi nigricante, gelatinæ spissiori, adhuc tamen fluidæ similis, quoad mensuram cantharum Misnicum ferme excedente: E cystide fellea adhuc integra & illæsa, ovo columbino majore, exsudasse vidi tenuiorem bilis portunculam, duorum vel trium digitorum transversorum spatio, circumcirca superas inferasque & adjacentes partes undiquaque croceo colore tingentem, irrigantem, itaque corrodentem ut partes ea illiniras & atactas putredinem acquisivisse manifeste non solum apparuerit, verum & præter hepatis substantiam magnam partem hypochondrii dextri tingendo rodendoque putridam reddiderit, illæsa plane vesicula biliaris: Unde facile colligendum erodentem vim bilis simul genus nervosum tetigisse & ægrotum furiosum reddidisse: Venulæ insuper & arteriæ in cæcæo rugebant sanguine nigricante, Eque corde dissecto sanguis nigerrimus, picis ad instar liquidæ dimanabat. *Melchior Frise in miscell. curiosis anni 1673. Observat. C.*

§. 10. V. Veinmanni filius, cum Patavii diu misere affligeretur, tandem in Febrem incidit vehementissimam, cum urinae suppressione, cui postea stillicidium advenit, cum fecum retentione & maxima hypochondriorum tensione, ita ut summe imbecillis evaderet: vermes quidam subesse suspicabantur, eum *nares semper vellicare*, atque ideo miserum clysteribus perpetuo sollicitabant Ego inflammationem & fecum retentionem solam causam divinabam, quare adhibeo fomento ex absinthio, agrimon. cuscuta & carduo melius habere coepit, expulso etiam sudore, urina reddita & fecibus excretis: cum vero naturæ debilitas nullis medicamentis tolli posset, obiit.

Seoto cadavere, vesicam invenimus maximæ molis, musculis adnata, urina aliisque excrementis plenam una cum ureribus: Renes in puero tantæ magnitudinis quanta vix esse poterant in adulto: Splenis quoque & dextri Hepatis lobj inflammatio aderat, vermes nulli. *I. F. alr. Rumlerus observ. 40.*

**N**ares *semper vellicares*) Inestum id vermium indicium: Vapores enim ischotisque aciores quicumque id facere solent, propter tunicam ventriculo ori & naribus communem: Hunc vero asse-

ctum tensio hypochondriorum satis indicabat, Neque inepta erat inflammationis suspicio, cui plerumque alvus contumacior obstat. *Vesibius.*

§. 11. Observavi Lienem rubentem & acidum in quodam Duce milirum: hic quamvis esset Hepate bene se habente, nihilo tamen minus & firi immoderate angebatur, & ardente Febre cruciabatur, Fuirque hoc visum anno 1563. *Hippol. Bosius de Facultate Anat. Lect. 2. p. 14.*

## OBSERVATIO XXXVIII.

*Febris Ardens, cum lumborum dolore ab inflammatione Renis sinistri in corruptionem abeuntis. l. 2.*

§. 1. **S**ereniss. & Potentissimus quidam Princeps, annos 53. natus, natura plethoricus & copulenter, cum quodam tempore æstuantæ Sole inter venatorum turmas summo mane campos ingressus esset, non prius venari desit quam sol ad occasum inelinans eundem abstinerere cogeret: Ibi vehemens ac violenta corporis, sub pondere gravis, & nedum optime post tot morbos composui, agitatio, occasionem & causam fatalis morbi certo provocabat Ibat enim venatico curru per invla tanto animi æstu, ut cum auriga non satis audacter pro reverentia Majestatis, Regem saxi, sulcis stipitibusque superveheret, Dux ipse, excusso à curru homine, habenas raperet, & animo alacriter indulgens, eursumque nulla lege temporans, nec curru pareeret nec ipse sibi: Altera post mediam noctem hora tristem effectum exercere coepit violata volupras, ac primum quidem nephriticis correptus cruciatibus præter morem doluit: Repertum ea die bis terve balneum, neque calculum neque dolorem loco movit: altera tamen dies benignior visa est, jamque cum venatoribus nova expeditio designabatur, quamvis interim sitis faucium molesta & quædam inappetentia fastidia non des-

deficerent: Quarta morbi die vehementius exaruit renum viscerumque vicinorum dolor, quem excepit ingens ventriculi & præcordiorum, atque totius corporis concussio, cum vehementissimo ad vomitum conatu, & omnium, ut videbatur, vitalium inamiti conficiatione: Apparebat ex illa naturæ violentia omnes quicunque in tanta corporis mole delitescerent humores ad tumultum excitos turbare, & omnia misere, præcipuamque rebellionis sedem jam tunc in stomacho reficere, Febris certe manifestis sese prodidit a gumentis, dolore capitis, æstu, siti, cordis & aliis ejus generis: quare quæcumque contra nephriticos dolores sunt adhibita remedia, ita temperabantur, ut simul calorem expugnarent: Quinta morbi die cum malum cresceret, aperta vena emissus copiose est sanguis; usque adeo floridus ut nunquam hæcenus ab annis plurimis observare licuerit meliorem; nam etsi primo vasculo nonnihil putridioris admixtum innataret, tribus tamen aliis adeo purus exceptus fuit, ut vel inde perquam facile fuerit Medicis concludere febrem illam non ipsa in sanguinis massa exaruisse intra venas, sed extra vasa ab æstuante alieubi pravo quoppiam; aut etiam maligno humore, & præcipue ab illa in tra ventriculum stabulante flamma concepsisse: Firmabatur hæc opinio ab incrementis deteriorum symptomatum: nam quamvis sanguinis illa missio in corpore plethorico opportuna fuerit & laudabilis, post illam tamen non immunita sunt mala, sed adven-ta aliunde, inter quæ primas vendicare visus est gravis; & in omni febre periculosus Singultus: Hic cum in horas cresceret, nihil quod ad eundem compescendum conducibile videbatur, intermissum est, continuo enim biduo aptissima & præstantissima medicamenta propinata sunt, nihilominus febris restincta non est: Singultus autem vehementia augebatur in momenta: Hinc demum Medici cum ex aliis signis, tum præsertim ex illis atrocibus singultuum incrementis, præsentissimum & plane extremum periculum adesse præfagebant, credebantque fieri vix posse ut Rex, quantumquoque viribus polleat, diem unam aut alteram inter singultus illos supervivat: quare in eam partem omnes converterunt curas, ut stomachum ab illa labe, seu æstuante bile, fundo ventriculi innatante, partimque ejus lateribus impacta liberum facerent: evidenter enim inde apparuit ab illa sola assurgere habitum venenatum, qui superius orificium ventriculi suffumigans, acrimonia sua Singultus illos excitaret, totumque corpus concuteret: Quia vero præviis purgationibus nihil fuit effectum, conclusum est communi consilio, vomitorium porrigendum esse: adhibitus in eam crocus metallorum, sed beneficio naturæ factum ut medicamentum aliam aperiret viam, omnis enim ille pravæ bilis apparatus, qui sane magnus fuit, non vomitu, sed faciliore per alvum dejectione copiose, ad admirationem usque, & quandam formidinem deturbatus est, nec sine manifesto emolumento, mox enim post unam aut alteram horam omnis illa Singultuum tempestas ad maliciam composita est, & tandem desit, cunctosque in spem erexit integræ ac perfectæ sanitatis: Sed quamvis tanta adustæ bilis copia intra paucas horaseducta sit, & major deinceps continuatis purgationibus copiosius educeretur, cessantibus tamen singultibus adhuc ardor febrilis ab incendio stomachi prorumpens, cor ipsum vehementer affligere, patientem ad extrema adigere angustias non desit: Demum integro post sacram synaxin triduo, alternis eventibus cum morbo & doloribus luctabarur, victor interdum, & quasi periculum prætergressus morbo superior, interdum usque ad desperationem adstantium morbo succumbens, postquam ex diuturniore lucta insignis tum corporis, tum animi mutatio, vix aliquid bene promitteret: alternabant tamen spes & metus, donec ex multa conficiatione vires collapsæ penitusque resolutæ nihil medicis in naturæ vel artis subsidiis bonæ spei relinquerent: Tandem peracta extrema unctione, circa horam undecimam nocturnam manifesta deficientis viæ signa se prodiderunt, ita ut ante secundam, post mediam noctem horam, istis verbis prolatis, Domine Iesu in manus tuas commendo spirituum meum, expiravit suavissime.

Post meridiem sectione corporis facta, videre licuit manifestam morbi mortisque causam, partim in Rene sinistro, qui quotus fuit, sæde computruerat, nihilque aliud fuit quam metissimus mucus & putrilago, partim in ventriculo, cujus fundo & inferiori orificio innatabat pars non minima bilis adustæ: cætera quoque viscera haud leviter inflammata conspicebantur. Cujus morbi historiam tibi B. L. candide exhibeo, eam eandem oculatus & verissimus quidam testis, propria manu conscripsit: eamque mihi fideliter communicavit: Sed D. Andreas Cnoselius Archiater olim Regius, in Exercit. Epid. febr. contra D. Augustinum Corrade Exere. 4. tragici hujus casus causam in crocum metallorum, quem unus medicus insciis reliquis à balneatore quodam mutatum, temere ad xliij. grana in substantia propinavit, loco citato plane rejicit. De Abfcessu renum vide *Ballenium conf.* 41. lib. I. *Simon Schulzeius in Miscell. cur. anni 4. Observ.* 114.

§. 2. Septuagenarius ardente febre eadem die fuit extinctus: diu ante de laterum dolore conquestus fuerat: sinistri renis substantia carnea plane fuit consumpta, & in eo calculus: Dexter in colore vitatus erat, coloris flavi subfusci. *Vide it. de Hypoch. dolore.*

## OBSERVATIO XXXIX.

*Febris Ardens vitio Pulmonum & Renis dextri. 1. A Pulmone vesicis obfito; Hepatis tumore inflammatorio, &c. 2. A lecoris, Vesicae, Intestinelorum, inflammatione Erysipelatode 3. A viscerum omnium putredine &c. 4.*

§. 1. **N** Ob. N. Vulneratus fuit sclopeto in brachio sinistro, & xxx. die à vulnere moritur: Pulmones deprehensi sunt omnino purulenti ac scirrhosis tumotibus repleti: Ren dexter putris, cum puris copia in vesica. *Vide lib. 4. tit. de Vulneribus.*

§. 2. Adolescens orthopnea inveterata laborans, Febre funesta jugulatus est: Inventum hepatis inflammatorius tumor: Thoracis hydrops in uno latere: Pulmo vesicis, in quibus viscidus humor refertus. *lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

§. 3. Nob. Venerus ardentissima febre correptus fuit ex pituita falsa, cum maxima albedine & lentore linguae, cum siti inextinguibili, vigiliis & extenuatione corporis: Obiit Tabesectus.

Dissecto cadavere, invenimus in rene sinistro abscessum jam suppuratum, Iecur, vesicam, intestina, etysipelate detenta, ex qua inflammatione erysipelacea obiit. *Bened. Silvaticus Epist. ad Beverovicium, in hujus Exercit. de calculo.*

§. 4. Vidi qui in Acuta Febre, utroque contento hypochondrio plurima per alvum deieceret, nigra porracea, cruenta, flava, graveolentia: Ei brevis interdum cataphora, levis surditas: temporarium delirium, à quibus parotides expectabantur: Ad xxvj. dolor sub auribus, unde magis illi sperabantur: Verum prae imbecillitate naturae, recurrente materia, orta gravi dyspnoea, mortuus est. xxxo.

In altero quoque eadem omnia & graviora quoque, singultus, animi deliquium, frequens mutitas, pulsus deficient, Sub xxx<sup>mo</sup>. levi parotidum significatione edita & orta dyspnoea, aliter similiter obiit.

Utroque dissecto omnia viscera marcore confecta & abscessu putrida inventa sunt. *Hellius committ. aphor. 17. sect. 2. Coacerv. Hippocr.*

## OBSERVATIO XL.

*In vesica fellea eorum quos Febris ardens aut diuturna rapuit, saepe lapides deprehensi.*

**A** Renulae febricitantibus non paucis (maxime morbo jam defunctis) copiose cum urina minguntur, nulla vel praesente vel praeterea etiam nephritido, sero à venis omnibus aut certe majoribus (ubi exussio humorum viguit) fabulum hoc rapiente: Quod minus mirum videbitur iis, qui bilem totam intra propriam vesiculam in Lapides, alias numero paucos, alias numerosissimos induratum aliquando viderint, apertis eorum corporibus, quos febris ardens aut etiam diuturna rapuerat. *C. F. Schneiderus l. de catarrhis specialiss. Cap. de Arthride.*

\* **C**um urina minguntur &c.) Urinae suppressio febris *nauralis* proprium etiam est symptoma, quod medentis consilium & provisionem ad se trahit; sit autem malis de causis initio talium februm, praecipua tamen est copia humorum, & pituitae praesertim, vias urinarias occupantis, vel fluxus humorum ad easdem vias, Et medici graviter errarent si ad diuretica sese converterent, derivandum enim potius per alvum; plerisque creatum periculum quibus praepropere diuretica sunt administrata hac sola ratione quod urina non redderetur: *Ballonius Tomo 2. conf. 37. p. 274.*

*Ubi exussio humorum viguit* L. *Isambertus* cap. de Urinis non in solis renibus aut vesica, aut, gignuntur arenulae, sed si bene judico, plurimum intra vasa, venas inquam & arterias, idque per febres aut diuturnas, quae humores accendendo, horum crassiores partes sic adhaerant, ut tandem, in arenulas redigantur: Atque id est quod nostri dicunt humores usque ad incinerationem corrumpi, seu putredine seu actione, quo fit ut nephritidinea quae obnoxii, febrem solusmodi passi, cum urina plurimum arenularum excernant.

*Sero à venis omnibus, &c.* In massa sanguinea, tanquam in oceano & communi fonte Corporis huma-

ni inest materia fabulosa, de qua lapilli gignuntur. Cum enim materia lapidum, inquit *Zacutus*, in corpore nostro sit mucus, seu humor viscosus, lentus & crassus, ut passim *Galenus* edocuit, si ad sit torridus calor, quis dubitat in quovis loco, ubi hae reperiuntur, gigni posse: Sic in podagricis, tophi, gypseique lapilli inveniuntur: Quia & in abscessibus arenas lapillosque generari testatur *Marcellus*, qui à femoris notabili tumore dissecto extractum fuisse lapidem album, ovi gallinaei magnitudine proximum asseverat: quid plura, non ne in venis & arteriis generantur lapides prout notant *Gemma*, *Fernelius*, *p. art. ult.* In vena Portae oriri auctor est *Colembus Anat. l. 15.* in venis hepatis, in parte cava reperiens *air lac*. *Camenerius* in *Epist. math. l. 5.* *Epist. Mathian* *Gradini* confirmat arenas exustione sanguinis in venis gigni. Quoniam, aut, in urinis emittitur interdum materia arenosa subtilis, cum urinae substantia multum permixta, & non est residens, imo saepe adherens superficiem urinae, & de hac non possumus prognosticare supra futuram lapidem, quoniam ejus materia magis pendet ex aditione materiae in determinatis membris ut renibus & vesica; & hae arenulae contingunt in multis cholericis, etiam in pueris, ut contingit in me *lib. Maassen.*

Etiā apparentia in declinatione febrium, & post longas febres, Et distinguantur etiā tales Arenæ ab eis quæ significant super lapidem, quoniam si trahuntur digitis comprimendo, facile dissolvuntur, &c. Hæc est doctrina hujus viri sententia, ex qua causam & differentiam arentularum in venis ortarum, ab eis quæ in renibus & vesica generantur, colligere licet: Nam ut ait *Ludov. Mercatus* 4. de morb. int. c. 10. Arenæ quæ generantur in venis Subtiliores sunt præterque aut nunquam subsident, sed cum urina innascentur sedimento immerse: In renibus vero, aut vesica subsidente subsident, Cujus rei causam uterque Author non expressit, sed ea est, Nam in determinatis locis

mucoſus humor retentus, in angustiori loco per motum ab affante calore diutius torretur, & ab humiditate spoliatus in graviores vertitur arenas, quæ subsident: In vasis vero è contra, ab uno enim loco ad alium cum remeet humor, non ita aduri potest & exficari: quare vasorum arenæ non assumpta ex toto humiditate innascent. *C. F. Schneiderus* l. 3. de catarr. c. 7. Arenulas calculi renum indices, ab iis quæ ab aduſtione humorum sunt, distinguit *Riverius* Pract. l. 14. c. 1. has naturæ salinæ esse dicens, atque in calida urina dissolvi, neque ullo modo apparere: Illas æquæquæ.

## OBSERVATIO XLII.

*Febris acuta ab inflammatione juxta musculos lumbares internos, in abscessum desinente.*

**D**Om. N. famulum habebat, qui ex contusione lumborum in eorundem internam inflammationem vehementem, febrem acutam excitantem incidere: Quo vita defuncto, cum venter aperiretur, ac intestina removerentur, animadverti in internis musculis abscessum à renum regione ad fundum vesicæ exporrectum delitescere, ex quo aperto magna puris copia exiit. *Observatio* Jac. Oethi Praefulis Aischstetensis Medici.

## OBSERVATIO XLIII.

*Gravida acute febriens infantem emittit, cujus ossa vi æstus febrilis friabilia reddita sunt.*

**G**ravida febre acuta & inflammatione circa umbilicum subito, correpta, opiaione citius & *Allyes* liberata fuit: Æstus vero, febrilem in foetum transiisse eventus docuit, nam mortuus ex utero extractus ossa habuit in pulverem rubicundissimum redacta, tanta vis ignis febrilis fuit: *Matthias Jacobus observ.* 116. in *Actis Bartholini* ann. 167.

## OBSERVATIO XLIV.

*Febris Ardens à sanguine intravasa æstnante, citra labem interiorum viscerum.*

**F**ebtis Ardens confecit intra ix. dies puellum quinquennem, optimi habitus & formosissimum, filium Nobil. Domini *Theodori Burlamachii* Genevensis: Aderat, præter signa pathognomica palpitatio cordis, æstus insignis circa hypochondrium sinistrum & ultimis diebus spasmodici motus.

Difsectum est cadaver 1. Aprilis 1677. in quo viscera omnia rite constituta apparere, lœcus tamen naturali majus, Cystis felicæ parva & inanis: Cordis sinister ventriculus continebat corpus concretum liberum, candicans fabæ magnitudine, longiusculum, sebo concreto simile palpitatio cordis causa: Intestina vacua, flatibus distenta, à crebrius exhibitis purgantibus: Pulmones ad aliqualem livorem vergebant: Sedulitas muliercularum satum acceleravit, vel forte promovit, quæ malignitatis suspitione, pipiones singulis momentis cordis regionis admovebant, unde auctus fervor sanguinis, circulatio sanguinis irritata, adeo ut pulmones flabellando cordi impares fuerint; atque ab extraneo calore natus prostratus sit.

## OBSERVATIO XLV.

*Febris Continua, Tertianaria, à seroso humore in vasis cerebri accenso & totius 1. Aperte intra cranium & membranam subsistente. 2. A Plenitudine vasorum tenus meningis, cum apostemate in proxima cerebri parte. 3. Ob partem cerebri cum membranis putrefactam.*

**I**llustr. Virum temperamento cal. & humidum annum supra 63. agentem, circa solstitium hybernum anni 1606. Borrea de repente fervente, de mane hortipilatio cum ingentis situdine invadit, unaque sibi vehementi & oculorum caligine: facies insolito rubore saturato ac livori propiore suffunditur: urinæ copiosæ, tenues & aquæ, instar pellucidæ: hisce symptomatis totum diem urgentibus appetente nocte somnolentia gravisque torpor ac stupor & in motu atonia: taciturnitas denique, oblivio & desipientia quædam obrepunt: Atqui cum non sine stupore otium insolentem animi stuporem ac desipientiam in Heroë mirantium, quid rerum ageret prorsus incius & multum ab illo Hectore mutatus transgessit duas horas, ecce derepente evigilat atque ad se redit, sed attonitus & immemor

eorum quæ sibi evenissent: tum vero primum è pulsu majore ac velociore, nec-non erebro & inæquali, simulque igneo in toto habitu calore Febris emicat eaque acricomirata, sed & quæ plurimam noctis partem inquietam traducere cogeret: Sequenti die assidua quidem & vehemens sternutatio, una cum tussi & raucedine exercuit; indeque febris describit paulatim, sed ea sequenti luce denuo ingravescere cepit: Arque hunc cursum tenuit febris in xv. usque diem, nisi quod à secundo paroxysmo indies lenescens magis magisque tandem prorfas elanguit. Secundus morbi recursus à priore nihil omnino discrepavit, nisi quod nulla sternutatio excretiove subsequuta, sed alterius brachii, in quod caput repandum inclinabat, torpor & tanta imbecillitas ut illud attollere per aliquot menses ei non fuerit integrum. Tertio febris repetitur sub novilunio in Febuario incidente, flante desubito Borea, sed & 4. 5. 6. & 7. imo quoties constitutio aëris muraretur usque ad annum 1608. recurrit inquam febris sed longè levioribus symptomatis: Circa deliquium Lunæ quintæ anni 1608. progressis per unum & alterum diem coryza multaque spuitione, & insigni colli gravitate febris reerudit terrificis, magis quàm unquam comitata symptomatis, 2. scilicet deliqui die Borea faviente, cum ab hac causa serosa colluvie introrsum vi frigoris compulsa, plurima mictione urgente & sopore jam sensim premente sese æger comminisset, ecce subito horrore insolitaque rigescit gravitate & pandiculatione, oscitationeque & sopore opprimitur atque mentis quadam hallucinatione: Ea porro gravitas brevi adeo concrevit, ut sponte conciderit genibus labantibus: reducto autem in lectum Sopor sensim, unaque oblivio ac veluti desipientia obrepunt, quorum ille quidem circa primam noctis vigiliam solutus est, hæc contra evidenter aucte, ita ut quanquam ad interrogata non absurde responderet, tamen garriter & nugaretur præter consuetudinem: Ab eo tempore urentesque per universum corpus paulatim se prodere, sitisque ægere totam noctem una eum sequenti luce, urinis tenuibus alioqui ut ante, & instar aquæ perspicuis, copiose fluentibus: eam diem excepit nox sopore inturbido & inquieto tradita: à quo evigilantem gravitas statim opprimit pariter cum oblivione & desipientia, ut vel lectum commingeret, moxque sopor horrorque, & tanta in motu atonia, ut statuum vel catalepticum in lecto diceret: sub vesperam tamen primum evigilare, nugari, æstare, frirre; reliquam noctem sopor sed turbidus interruptuque tenet, febris ardor inde remissior: Quinto morbi die, ecce paroxysmus hora confecta, sed longè gravissimus reperit, cum ingenti extremorum refrigeratione, oblivione, desipientia, commictione lecti, comate vigili, apbonia, sensu sepulto, motuque abolito, & tanta corporis gravitate ut plumbeum crederetur: neque vero quicquam deglutire, vel ad oblata generosa quæ somnum excuterent sensus alicujus superstitis signum ullum dare, respiratio crebra difficilisque admodum & parva; pulsus è magno & renitente, parvus, ercher & mire inæqualis, vulnus magis quam ante flammans, sed oculi lacrymis prægnantes: à meridie ad nonam largus sudor sese adjunxit, tandem circa x. noctis horam æger sensim somnum excutere, ad se redire, sed inde æstus vehementior, quia tamen lenescere corpus declinante die: Hoc die de mane de natione dolore querela, nam cum corpus illi à natura vastioris molis à sopore illo gravissimum redditum, durante per 15 horas veterano, totum in nates procumberet gangrena successit, cujus eacoëchia adjuncta vehementiæ paroxysmi quarti anticipantis, sive rigori, qui ex Hippocr in continua febre, corpore jam debili lethalis est, oppressus nature cessit.

*Aperto cadavere, Aquæ in capite impuritatem confirmavit reperta aqua plurima in toto capite stagnans, & adhuc in cadavere reses, nec ab ardore febrili resiccata: Febrem autem in sanguine inflammato hæsisse argumentum est, quod sanguinis massæ ardore febris pene exsiccata exhausta que est, ut dissectio docuit, cum in vasis vix libra sanguinis restitisset in demortuo. C. Piso de morbis à sero sect. 2. p. 2. cap. 4.*

**H**æc est morbi historia ex diuturnitate, & gravitate symptomatum, præsertim cephalicorum magni & insignis: de cæsis specie sic statuo, ut illi parapoplexiam, vel apoplexiam levem, sive febrem reapsopiam, eamque Comatosam indigemus, parum à vero aberrare credam, Si attente Hippocr. orationem qua breviter & graphice Apoplexiam levem circumscribit, Qui illi & siderati dicuntur, cum cerebrum multa immunditie vitioforum humorum repletum fuerit, antequam pars capitis primo dolorem ipsis infert, & sufficere non possint aliqui ambobus oculis; aliqui altero, & super ipsos tenet, & desipiunt, & tempora salunt, & febri tenuis habet, & corporis impotentia. Si hanc

*Hippocraticam Apoplexiæ circumscriptionem consideremus, nullas dubitationi locus relinquitur, Febrem hanc omnino esse eandem cum Hipp. levi Apoplexiæque si circumlocutione tui placeat, & latius definire, esse eam Febrem continuam naturæ Tertianarum, sed cum comate pervigili complicatam, Nam immunditiæ multæ cerebri mucosæ excrementis conspurcantur clara fuerunt indicia, 1. Sternutatio assidua plurium dierum. 2. Tussis cum cantu. 3. Oculi sine causa manifesta collacrymantes. 4. Sopor singulis epilepticiis exacerbationum periodicarum conjunctus & adeo contumax, ut nisi x. horis exacte solveteretur. 5. Aqua reperta plurima stagnans in toto capite. Vide plura l. c.*

§. 1. Huic febrili comatosæ similem & germanam omnino vidimus in Nob. matrona 63-

annorum, habitus enfarci: Similis inquam fuit in omnibus, five idam febris, five syndromen symptomatum species: in his tamen duobus discrepans, quod & epistemas tempus ac initium exacerbationum non adeo pertinax, eum horas duntaxat novem desipientiaque premeret, & calor citius emicaret, Et vero non fuit producta, aut recurfus distincta; sed in quinti paroxysmi initio fatalis extitit.

Vasa similiter sanguine exhausta in cadavere reperta, & caput plurima scatens aqua: sed speciatim vesica cholidochos distenta prægnansque pluribus calculis sabæ molem excedentibus, ilque viridantibus. Idem ibidem.

§. 2. Adolescens in sinistro bregmate lapillo pereuntur: Circa diem xx. febris assidua eum corripit: Non parva puris copia inter cranium & membranam reperitur. Vide lib. 4. sit de Pulveribus.

§. 3. Melancholicus juvenis (de quo lib. 1. sit. de Paralyfi.) laborabat Paralyfi & convulsionem eum Febre insigni; paroxysmi erant admodum frequentes, ita ut multoties quateretur. Eo mortuo, in latere dextro admodum turgabant venæ tenuis meningis multo sanguine nigro & concreto. Ea pars nigricabat, & apostema continebat, in proxima cerebri parte.

§. 4. Mulier Tina tentata, crebris lotionibus sanata, in capitis dolorem ac febrem continuam lethalem incidit: Media pars totius cerebri, cum membranis (erat dextra) putrida inventa est, ichore citrino referta. Saxonia Præcl. Præcl. p. 1. cap. 1.

## OBSERVATIO XLV.

Febris Continua secum in Pulmonibus inflammatis habens. 1. Ab inflammatione Pulmonum in abscessum desinente. 2. §. Ab Erysipellate Pulmonis. 3. 4. Ab inflammatione partis sinistra Pulmonis posita, in corruptionem desinente. 5. A Pulmonibus Tumentibus, ex parte duris, aqua fetida plenis. 6. Ab eorum inflammatione circa partes extremas, Sanguine crassiori in eorum substantiam effuso. 7. A dextra parte cum pleura corruptione. 9. A tumentibus Pulmonibus & Abscessu tentatis. 10. Peripneumoniarum quorundam Pulmones sanguine putrido turgidi, indurati. 11. Pulmones cum corde sanguine turgidi. 12. A Pulmonibus syderatis, Aqua virosa in thorace. 13. Continua à Pulmone & Pleura uno latere corruptis. 14. Ab inflammatis Pulmonibus & Iecore. 15. A sinistra parte inflammata. 16. Ab humore in eos influxu, unde tumores reperti. 17. Ob fluxionem à cerebro in pulmones, unde peripneumonia mendosa. 18.

§. 1. Ventrículo nimis incalescente Pulmonis inflammatio perniciofa, decreto Hippocr. de morbis lib. 2. Quasi Oventus Lange tux familiar postremus, Cimbricæ nobilitatis deus Patavii anno 1617. abripitur, qui juvenis sanguineus vehementi in gymnasticis exercitio febrem continuam sibi attraxit, inflammatis Pulmonibus, quos corpori exemptos, ita deprehendimus affectos, antequam ad suos in patriam transportaretur. 10b. Rhodum cent. ij. Observat. 1.

[Inflammatis pulmonibus, &c.] Peripneumonia deficiendi solet Inflammatio pulmonum cum febre acuta, tussis & respiratione difficili: Hæc affectu laborantes in pectore phlogosin insigunt, cum pulmonum locumescencia, & dolore interdum pungitivo sentiunt: anhelum laboriosum & brevem, five, ut Hippocr. ait: sublimem ducunt; Febris cum siti immixta, vigills & tussis molesta urget, cui etiam spiritum sanguineum, aut sanguine interpersum succedit: E quibus signis manifeste liquet morbum hunc oriri, in quantum sanguis febriliter effervescent vasa pneumonica minora non facile trajicit, sed lota ductus eorum lutes primo obstructionem, dein plus aggestus & extravasatus, phlegmonem, cum calore tussis & spæco discolori parit: Porro quatenus sanguis ita coarctatus & flagrans ductus pulmonares hos inflat, & illos comprimit, respirationis difficilis & angustia: & quatenus iste fibras nervas vellicat aut dissolvit, sæpe dolore excitatur. Quod si inquiratur, quomodo phlegmone in pulmonis compage, mere veliculosa & excanti concrescere possit; & qua ratione ab eodem isto loco carne musculari, aut visceris parenchymate excitari solito, differat: Dicendum est, quamvis prædictæ partes quoad structuram varieot, tamen affectus rationem in istis singulis prorsus eandem esse: Nam vasa sanguifera perexilla, tum in pul-

monibus ductus omnes tracheales, tum in muscularibus carneis, tum denique in parenchymatis fibrillis & stimata nervæ, cum plexibus densissimis, velut coeys his, ubique pariter amplexant, vincunt & varie circumligant: Quod autem phlegmonem parit, ipse est sanguis, qui dum v. lde effavescit, simulque in transitu suo impeditur, ubique locis ac præsertim in pulmone, cujus vasa in plexu minutissimos ramificatur, primo obstructionem, & consequenter inflammationem eret. Itaque peripneumoniarum ratio formalis, & causa conjuncta in hisce duobus consistant, videl. quod sanguis febriliter effavescit, simulque quod intra pulmonum ductus angustiores hærens, obstructionem ibi foras metastoriam creat: Nisi bins hæc concurrant, à morbo illo immunitas est: nam in febribus plerisque aliis, ac præsertim in consorte, sanguis unus vehementissime æstuans, & tota præcordia inflammans; quin etiam in pica, malacia & hydropse pectoris, iste lentus admodum, & intra ductus pulmonares plurimum hærens, peripneumoniam haud concitat: Ad hanc producendam opus est ut utrique affectus conveniant & vires jungant Attem cum utriusque diathesis jacta est, modo hæc, modo ista prior, in actu est, & quodammodo alterius causa, aut saltem occasio existit: Nam interdum sanguis in febrem concitus, obstructionem pulmonarem facit: quandoque



item iste in pulmone remotam offendens, à propria obstructione effervescentiam febilem concipit: Attamen ad motu hujus procatarsin constituendam, sanguis una ad effervescentiam, simulque ad vasa pulmonaria obstruenda, aptus esse debet.

Cujusmodi hæc liquoris sanguinei diathesis ad peripneumoniam inclinans fuerit, etsi non facile designatu fuerit, ejus tamen ratio ex phlebotomia in hoc morbo, semper cum successu optimo celebrata, nonnihil elucescit: Enimvero sanguis est quibusque hoc morbo, prout etiam pleuritide laborantibus, detraheus, postquam refrigit in superficie sua, loco cremoris coccinei pelliculam subalbida, aut alias discoloratam, quæ item tenax admodum & viscida est, succrescentem habet, unde conjicere licebit massam sanguineam in compage sua nimis strictam, dum inter circulandum recrementa sua demittit, nimis incipissari & quasi lentescere, proindeque tunc ad effervescentiam, tum intra vias angustiores, & præsertim pulmonates herere nimis proclivem fieri: Quod amplius inquiratur, unde nam hæc sanguinis dispositio, quasi instar vini penduli, sit tenax & viscosa, procedat: hujus generalis hæc est, vid. quod crassiores partes crassiores à subtilioribus non satis commingantur, ita ut omnibus æqualiter mixtis & muris subactis, demum humores utiles in munia quibusque appropriata secedant, atque inutiles per cloacas idoneas continue amendantur: Verum è contra, in quantum sanguinis particule sulphureæ, una cum salinis & terrestribus nimis evedtis combinatæ, cæteras quasque iterant & inviscant, proinde liquor ejus recrementa quæque & impuritates intra se continens, instar glutinis lentescit, & propterea

diathesi peripneumoniam concipit: Eiusvero unicuique obvium est, sanguinem quatenus ita lentescit, ad vasorum ductus angustiores (qui certe in pulmone perquam angusti sunt) obstruatos aptum reddi: Insuper ob eandem rationem, etiam ad effervescentias febiles ineundas inclinari: videl. in quantum iste faculentius quasque & recrementa sua intra proprium sinum pertinaciter retinens, ab iisdem subinde in plenitudine aggestis; in turgescentiam immanem (à qua necesse est pulmonis inflammationem obstructionem incipi vel angere) cogitur. Insuper ad motu hujus procatarsin, non raro pulmonum vitio sitas accedit, atque ad hæc partem adiciendam generalem istam sanguinis dyscrasiam determinat: Nam ut cruce lentescens effervesca, præcordia firmiora & robusta sæpe noxam ab illo intentam evadant, atque labe in pleura, aut circa habitum corporis defixa pleuritidis, aut rheumatismis potius quam peripneumonia excitatur: Attamen pulmones teneti, tussi obnoxii, aut propter hæmoptoen, ac alios pedoris affectus in conformatione prius lesi, à sanguine dum in compage sua nimis stricto & tenax est ebulliente, oppilationem præsumunt facillime concipiunt.

Hæc de peripneumoniam causis conjunctis & præcædendis; ad evidentes quod spectat, hæc referri debent quæcumque sanguinis crassio subito perveniat, at diaphanæ liberiores cohibent: uti impetis sint caloris & frigoris excessus: vini aut aquarum ardentium potus immodicus, vehemens exercitium, aquarum quantum & præcipue glaciatarum potus: Porro nonnumquam maligna æris temperies hunc morbum pluribus accersit, & epidemicum facit. *Will. Pharras. p. 2. f. 1. & 2.*

§. 2. 1601. In Ducatu Urbini, totaque Piceni regione *hyems frigidior*, æstas humidior fuit, autumnus frigidus & humidus; hyems denuo borealis, deinde placidior circa solstitia atque vernalis, etenim Austri Favonii, boreales alternatim viguere, bis terve tantum pluviz: quare Martio & Aprili, tota in regione Pisauri, atque Urbini, grassabantur tumores circa fauces, pleuritides, tussis, difficultates anhelitus, Thoracis dolores, frequenter lethales Peripneumoniarum exercebant, quarum aliz primo insulso fatigabant, plurimæ *ab angina & pleuritide ortum ducebant*, & in septima sæpe, raro XI. interficiebant, neque hominum maiorem partem occupabant, sed senes destillationi obnoxios, immoderationi victus deditos, atque exercitiis violentis: plures ruris incolas quam urbanos, eosque calidos atque crassos: febre prima die cum rigore, deinde continua corripiebantur, cum siti magna & lingua excrementosa humida, modo aspera & rubra, gravitate thoracis premebantur, levi dolore ad claviculam, costas, spinam, humeros vagante; densa & calida respiratione, tussi cum sicca tum humida, cum *sputo viscido, spumoso, crasso raro, subflavo, subruento, subnigro, rarissime purulento*: ægre sputa deieciabantur, aut nihil; floceos aut palcas à parietibus carpentes, 4. & 5. delirii peribant: hanc febrem non admodum magnus calor, nec tactu insigniter mordax concomitabatur: utinæ crassæ & confusæ inter initia apparebant, quæ si statim attenuarentur, moriebantur, Si vero paulatim clarescebant, sanabantur: eorum color est subrufus, pulsus magnus & mollis, aliquando intercurrentes erat, in salvandis validus in morituris languidus, frequentissimus: Efflorescebat malarum rubor & oculorum: facilius supini & in laus decumbebant; alii recta cervice spirare eogebantur.

Quamvis auxilia necessaria adhibita fuerint, maxima ex parte tamen plurima pars ægrorum interibat: Scitis cadaveribus, *reperiuntur pulmonum abscessus*, ex quibus multa materia foetens prodibat. *Lalieu à Fonte consult. iij.*

**T**riplici affectuum genere homines constituti satis constat; Angina, pleuritide, atque possimum peripneumonia cuius maxime noxæ traduntur: Est autem inflammatio pulmonis cum febre acuta: Locis affectus censendi sunt parietes vasorum & paratum magis nervosarum Pulmonis: communicatur autem affectus toti pulmone, præsertim partibus proximis illi quæ inflammata est: Quam quidem affectionem interdum in sanguinem pituitosum atque bilio-

sum referendam cenleo, nullo alio affectu præcedenti, ex dextro cordis sinu in pulmones vehementius excurrentem, qui non modo pulmonis venas & arterias, verum etiam totum ipsum corpus præter modum implet atque distendens, coarctatur ac putrescit, ac pulmonis inflammationem accendit; non eam quidem altam more collectam, sed toto viscere distensam: Quamvis *Galenus* dicat. de c. Puls. c. 11. non accessit à bile pulmonis phlegmonem, cum humor bilio-

biliofus fit fabellis & facile elaboratur. Rpondeo 1. vel bili perniciet pituitam, quemadmodum in hoc tempore: vel colligit humores putatim, vel aliunde contrahit: Sanguis biliofus, cum conuertatur pulmone, Putatim colligitur & peripneumoniam potest contrahere: In id vitii plurimum præcipit angina & pleuritis antecedens, cum tumor heterogeneus ex sanguine, bile, & catarrhali excremento perfusus in pulmone latuit per ora venæ arterioſæ & arteriæ venoſæ, ex parte veto à cerebro prolabitur: Physiis cauſis accedant Aſthologæ, Eclypſis ſcil. præterita, arque Saturnus in mundi themate in ſexto domicilio, in domo Maris reperiatur, ex oppoſito hotoſcopium reſpicient: quæ præſentem ſenſibus in hac tempeſtate morbos acutos minantur, ut ex iis peripneumonis, ſi earum cauſas perpendamus, aliæ ex ſanguine pituitoſo, excremento catarrhali permiſto, arque bile otunde ſint aliæ vero ex bile melancholice portione permixta & ex iis aliæ acutiores & interſicientes 4. die, vel 7. aliæ miores: Præterea aliæ incipientes & eſſentiales, ſed raro plurimæ ex angina, pleuritidis, vel catarrhali excrementi ſuccellione. Inter ſigna à poſteriori deſumpta, enumeratur febris aſſidua & acuta; diſſicultas ſpitandi vehementiſſima; & major quam in pleuritide, ſiquidem, ut ſcribit *Galen.* de loc. aff. 8. tanta inducitur diſſicultas, tanta anguſtia, ut ægrî videantur ſuffocari: Præterea dolor gravativus ut ægrî ſenſum cujuſſam gravitatis thoraci incumbentis potius quam dolore ſentiant; cum pulmones tenui admodum ſenſu præditi ſint; Pulſus molles obſervantur, languidi, inæquales, ut reſert *Galen.* de cauſ. Pulſ. 12. Tuſſis interdu ſicca, in principio præſentem, poſtea temporis progreſſione multa & varia apparet, modo alba & crassa, modo ſlava, aliquando nigrore aliquo perſuſa; adeſt etiam rubedo maxillarum; Inter ſigna quæ ab antecedentibus deſumuntur, præter ætæ præcedentis inæqualitatem; huiusmodi affectus producendi accommodatam, non prætereunda eſt cibi porioniſque immoderatio & labores nimii; Signa cauſarum ita perſequebantur, dum eſt à bile, quod raro accidere intelligo, ægrî calidiſſimum ætatem reſpirant, æque frigidiſſimæ, ſeu ætæ cupiditatem habent; Dum eſt ab aliis humoribus, ſummus ille æſtus non ita apparet, neque cætera ſymptomata ſunt ita gravia & periculosa; Signa lethalis peripneumoniæ deſcribuntur ab *Aetio*, quod die quarta aut ſeptima interſicit: vigilie aut ſomni breves, ſtuporem aut delirium inducentes: Quotum ſignorum omnium facile citatiorem reddere, ſi quis voluerit naturam hujus

morbi & partis memoria retere. Spitandi amque diſſicultas & anguſtiæpremit, ex inflammatione in pulmone bronchia anguſtiis, cogente, quæ ætæ attractionem impedit; Nullus eſt doloris ſenſus, niſi gravitatis, quia pulmo ſenſus eſt expertus: membranz autem interſepientes, à pleniore pulmone depreſſæ, dolorem gravitatem producant, extremis poſitionem partibus quibus alligantur, quia maior ibi extenſio, ut ad os pectorale & linam exporrigatur; Exſpuunt ſemper aliquid, ob laxitatem partis affectæ, à qua ſemper aliquid reſudat, ſentientque calidam reſpirationem qua partem plurimum eſſendo, partem plurimum ætrem frigida reſpirando, allevari queant: Acuta comitatur febris, cum rubore inſigni maxillarum, ex ſuſſigine ſanguinis præteritis ex qua cauſa delirium concitatur, &c.

*Urine crassa & confuſa* ] Propoſitis affectibus præter accidentalem febrem etiam eſſentialem & malignam accedere duo ſunt quæ ſuadent, cum delirium ſuperveniens, cum urine confuſæ. Nam peripneumonia pectoris & aliarum partium conſenſione, ex heterogeneo excremento ut plurimum genita, & in ſene, non debet in ſeptima die interſicere cui potius deberet accedere coma quæ delirium, cum hoc à vaporibus fermentibus & bilioſis conſugete ſoleat, unde *Hippoc.* 7. aph. 12. In peripneumonia phreſis malum: qui affectus non ſolent eſſe ita lethales, cum à materia pituiſa aut plurimum pendeat, & multo ex his evadere debent, unde *Hipp.* in propoſita conſtitutione, dum has peripneumonia proponit, dicit ſere omnes evaſiſſe: Lora etiam confuſa poſſunt eſſe à calore febrili materia morbiſicam agitante à qua vaporis ad caput exhalantes delirium accerſunt: hæc enim confuſio & craſſities non ſemper oſtendit coctionis gradum, cum in principio in ſenſibus pituita ſcæntionis id non facile contingat, ut ob id non ſine ratione colligendum ſit, iſs febrem eſſentialem malignam ſæpe conjungi *Idem*.

*Ab angina & pleuritide ortum ducebant* ] Quandoquidem diſſectis cadaveribus ſoli pulmones affecti apparebant, inquam varia ſymptomata fatigant, tumores circa fauces, lateris & pectoris dolores &c. Inde conſiderari poſſe videtur opinio eorum qui Anginam exquiſitam ſedem in pulmonibus habere ſtatuant vide c. de Suffocatione §. 1.2.

*Frequens Pleuritidis, &c.* ] Inde quoque verſimilis redditur eorum ſententia qui pleuritidem ab inflammatione pulmonis deducunt, Vide lib. 2. cap. de lateris dolore §.

§. 3. Melchior de Freſnoy annos 4. natus febre corripitur continua, ſed quæ exaſperationes haberet: catarrhus erat, tuſſis, ſicca, nec præ tenella ſiſu qua expleri non poterat: tamen inanis ſemper erat tuſſis & tenuis humor eludebat ſpiritum: Vomitiones frequentes, alvus albicanſia eiecit, deinde ſubſtitit: uriaz tenues crude, decolores præ febris vehementia medicamentulo alvus ſollicitara reddit multa bilioſa: tuſſis perſequebatur: dolores ad ſiniſtrum hypochondrium, ſed vagi, æque eodem modo perſequebantur deinde ſiniſtram lateris partem occupabant: alvus ſoluta eſt, variâ excreta, chyloſa, ſiſu qua expleri non poterat: magnum in pulmonibus conſectum incandium conjectum eſt: hinc dolores ad ſternum & lateris ſiniſtrum, ſed qui ad lateris ſiniſtrum non perſequebantur: Medici putabant vomitiones ab imbecillitate ventriculi oriri: Quod in eam ſuſpicionem eos adduxit, eſt frequens deſectio, multa que rerum variarum, putidarum, viridantium: aliquando animus paulum deſiciebat & nos animi deſectiones & frequentes vomitiones in alio obſervavimus, cui inflammatio pulmonis à pleuritide aut fugaci dolore lateris oborta fuerat. Febris non erat admodum vehemens, deſtillatio erat magna, eludebat ſpiritum: ſenſim conſiſcebat: & incauti nobis cum cibum appeteret, biberet avidiſſime, 20. die, item cum de purgando eo cogitarent Medici, ſublatus eſt: debuerat miſſi ſanguis.

Aperto cadavere nihil p. n. in pulmone contentum inventum eſt: una pars pulmonis veluti ſtipula ardente deſagraverat, lobus unius pulmonis, livebat, Hepar quoque veluti deſagraverat *Ballonius conſil. lib. 1. conf. 27.*

**D**efectum animi, frequentes vomitiones, &c. ] Quæstio hoc loco moveri potest, An inflammatio Pulmonis, sive ea sit phlegmonodis sive erysipelae, habear hæc sibi conjuncte, Defectum animi, Vomitiones, Tussim siccam, Alvi fluorem, ac si per le primoque alvus inferior laboraret, Fugacem generum ruborem, Situm inextinguibilem, Febrem non ita magnam omni tempore, sed ex intervallis ferocientem & prodentem sese? Hoc fortasse pauci ante nos animadvertunt, & sic alium morbum pro alio curamus: aut falso vomitiones & alia accidentia quæ narravimus, ad alias partes referimus, tæti hoc non ad pulmones, quæ tamen præcipue affecta pars est, pertinere: Ex ut quod sentio obiter dicam, cum ad puellum acciti essent tres celebres Medici, unus solum affectum pulmonem intellexit, & quandam speciem peripneumoniz suspicatus est, unde sectionem venæ suavit: Sed falso subesse ulcus cogitavit, nesciens inanem hanc tussim erysipelatis pulmonis pathognomicum esse: Omnes ignorarunt vomitiones illas, frequentes, dejectiones frequentes, ingentem admodum sitim & opinionem majorem, in inflammatione pulmonis apparere solere: quorum ignorantiam ut detegam, ne forte sese excusent quod nullo loco legisissent, aut animadvertissent talia symptomata contingere inflammato pulmone, citabo Hippocr. qui illum puelli morbum mihi vere expressisse videtur: Ita lib. 2. de morb. in omnibus suis observationibus ex monumentis admitandus, Erysipelas in pulmone sit cum Pulmo nimium fuerit repletum, quod contingit ab ardore, febribus, labore, intemperie: Et cum perrepletus fuerit, plurimum sanguinis ad se trahit, maxime ex magnis venis tenuissimis ac debilissimis: Postquam traxit, febris ex ipso fit acuta, tussis sicca, repletio in pectore, dolor acutus in anterioribus ac posterioribus partibus, maxime circa spissam magnis venis calefactis vomunt subcruentum, aliquando lividum, vomunt pituitam & bilem animo linguuntur ab sanguinis transmutationem deperente contingente: atque hoc maximum signum est in pulmone genus erysipelatis & si assidue febris in vasis perseveraverit. Itaque ex contractu Hippocr. apparet hæc maxime symptomata: erysipelate tentato pulmone contingere solet, dolore sterni, vomitiones, tussim siccam, deliquium animi: quod mirum esse potest, Sed hæc contingunt majora vel minora, plura vel pauciora pro humorum varietate: Nos autem observatione trini hoc affectu laborantium, certo scimus febrem (licet sit occupatus Pulmo) non eodem perpetuo tenore affligere ac fœvire, nam quia erysipelatolæ affectionis comes est, & præsertim à tenui seto, sit ut flammæ sit calor, cuiusmodi in palæa accendi solet & evolare statim: si autem puritis, solida firmaque esset materia, & pars quæ inflammatur solida, ut hepar, perseveraret febris & calor eodem modo quo in candente ferro: Deliquia animi quæ hic contingunt, nos admodum perturbarent, ignotantes tale aliqui contingere posse inflammato pulmone, & triviales Medicos secuti, ad malignam qualitatem jactationes istas, deliquia animi & virium jacturam referabamus, non autem ad propriam affectionem pulmonis, ut Hipp. fecit lococitato: Movit quoque alvi fluore, sed duobus de causis contingere potest, tum quia ventriculus ipse afficitur, & quemadmodum leipothymia cum prehendit per consensum pulmonis, ratione ichoris à pulmone resudantis, & ratione attractionis ab ingente calore pulmonis, ut Hipp. annotavit, Ita quoque debilitas aliqua in ventriculum cadere potest, à qua lenterie aliquid simile contingit: Ac revera in puello nostro chylosa nonnulla prodire: Secunda causa hæc esse potest, quod ichor à pulmone resiliens ferire possit ventriculum & intestina, hinc alvi inferioris fibræ laxantur, hinc fluores: *Pernellius* ut in multis accura-

tus fuit, ita in pulmonum affectibus observavit quæ de Pulmonum morbis, quandam notitiam petipneumoniam, cujus idea apparet in ægro à nobis proposito, *Tennis, acris, multaque deflillatio* (inquit) & *cerebro confertim effusa in pulmonem interdum ardore & incendiis, æstus ac febrem inferens: plerique eam affectionem peripneumoniam nomine designant, in qua tussis spirandi difficultas, & lenta febris sensim conficitur, sive ulcere, sine spuntione cruenta: In puello nostro vere expitmitur morbus, Et cum deflillatio est, tussis sicca, febris non ita ad manum mordax, rubor generum, dolor sterni (quod notandum) virum dejectionis ingens, perceptio summa caloris in pectore, non est dubium quin inflammatus Pulmo sit: Ac notari debet ex locis citatis, aliquid erysipelatolæ in pulmonibus concipi bisariam, aut eam tussim, aut sine tussis, saltem quæ magnam afferat molestiam (nam subest tantula): Si cum tussis, distillatio est ferina, diluens calorem, unde febris non ita ferociparet, illi incauti moriuntur, nihil extundunt memorabile: à capite præsertim manat causa fovens morbum: Si sine tussis, à venis parvis & magnis refugit sanguis, qui in pulmonem illabens & incurrens, potius attrahitur, fovet incendium: Et illud est quod volunt Medici memotandum, veram Peripneumoniam oriri excusso tenui & bilioso sanguine à cordis dextro sinu in venam arterialem, hinc totum Pulmonem occupatur, hinc inflammatio: Quod si verum est, in inflammatione pulmonis sectio venæ potius videtur celebranda ex interiore dextra: Tameu *Fernelius* ex sententia quorundam in inflam. pulmonis secari vult internam cubiti sinistri: Ratio ejus hæc est, Quoniam pulmonum venæ ex dextro cordis sinu procedunt, hic autem in sinistram parietem venæ cavæ inseritur qui per alam sinistram in cubitum excurrit: Inter morbos qui occurrunt Pulmonum afflicti cogniti sunt difficiles, nec enim signa nervosa sunt, sed maxime ex parte æquivoca. *Ballonius*.*

*Tussis sicca, &c. Tennis humor eludens spiritum* ] Hippocr. 1. de morbis, Peripneumoniam quandam & pleuritidem describit, quam sine spuro & siccam vocat, quæ hæc quadrant: Ex, inquit *Ballonius* lib. v. Epid. non tam in humore & tumore phlegmonode consistunt quam in phlogosi & vagabunda afflato aut adustione: jugulant homines incautos, & minime cogitantibus Medicis: Harum auctor est sermone acris, subtilis, malignum, efferum, eludens exclusionis anam & pepsini occasionem, à quo siderantur pulmones repente: Signa sunt rubores generum fugaces, tussis inanis, indolentia fere, jactationes, ariditates linguæ & extenuatio præter rationem, dolores pungentes & fugaces.

*Sitis quæ explorari non poterat* ] *Galenus* febris Acedens sedem inquitens, de siti, quæ ejus pathognomicum est, ita scripsit, In una corporis parte, quæcumque illa sit, interdum causas gignitur, interdum in toto corpore: Si in toto corpore, Sitis adeo necessaria: cum verò in una parte, non de necessitate Sitis infertur, nisi pars ipsa sitim pariat: Omnino primum id facit os ventriculi, deinde ventriculus, post stomachus, post Pulmo, & subinde Jejunum intestinum: Hic Pulmonem quarto loco statuit *Galenus*, raram tamen à pulmonibus sitim incedentibus inextinguibilem sitim excitari: Simili exemplo id firmat *Ballonius* in Paradigma. 3. S. N. inquit, intolerabili Siti cruciabat, male affectos pulmones & jecur facies demonstrabat, in gargareone quoddam inodiosum, ac si angina esset inervatissima, loquendi magna difficultas, non febricitabat multum, inopinato 7. die natura irritata moliri vult aliquid, nescio quæ materies in pulmone conclusa moverat, ac si abicessus aliquis esset, jactatur, resurgit sepe, siccior, mors: Illa sitis ingens à pulmone calefacto oh pituitam partem nata erat: Erat vel erysi-

erysipelas in pulmone, improprie dictum ab Hipp. 2. de morbis : denique hoc fuit pleuripneumonicum: Simile passus est Therapsius Galenus, cum enim inextinguibilem unius mensis sitim sustinisset, oborto leni dolore lateris, intra quadriduum interit.

*Deburat missi sanguis* ] In ejusmodi peripneumonia & pleuritide sine spato, An vena secunda? *Hippocr.* lib. 1. de morbis ita scribit, Fit Peripneumonia & Pleuritis sine spato, ambobus ab eadem causa, & siccitate, Siccant autem & calida cum nimium calefecerint, & frigida, ubi nimium frigescentur congelatur autem latus, & quæ in ipso sunt venæ, & convehitur: quantum in ipso est bilis & pituitæ, id à caliditate resecatur, & dolorem inducit & febrem, Hinc venam secare

convenit in manu (plenitidem aut hepatidem, juxta utram fuerit morbus;) Tamen lib. 3. de morbis dum pleuritide sicca, & sine spato loquitur, bimestationis quidem multæ commemorat, at nunquam phlebotomizæ. Sic hic accuratos & sagaces esse Medicos oportet: Cum autem meminit pleuritidis siccæ à frigore, à quo congelatur in plenitide latus, videretur explicare ideam earum pleuritidum quas 3. aphor. per hyemem grassari scribit. Nam in his frustra tentaram sectionem venæ sæpe vidimus; cum potius consilio *Hippocr.* sit venientium ad tepescientia & pægorica medicamenta: Quod prudentiores Medici, & qui non tam solent id remedij accelerare, nec ex vulgi opinione pendere, id faciunt.

§. 4. Multi incauti eripiuntur ob inflammationem Pulmonis, quorum in Pulmonibus nihil reperitur aperto cadavere, nisi quod *vestigium aliquod flammæ* apparet, Et hoc idiotæ non animadvertunt, Quod accidere verisimile est cum Erysipelas Pulmones obfidit. *Ballonius. Epid. & Ephem. lib. 1. p. 23.*

*E*rysipelas Pulmonis aliud à priori describit *Hippocr.* Lde morbo, in text. 8. Cum pulmo, ait, ab igne facto tumet (videtur) hæc inflammatio præcipue fit à sanguine, cum in seipsum pulmo attrahit sanguinem & continet; hic autem morbus æstare sub canicularum præcipue fit, Sic igitur æger ab hoc affligitur, Tussis incidit sicca, & rigor, & febris, & rectæ cervicis ispiratio, & labor vehemens in pectore, (ob sanguinem) & nates di-

latat, & aperit, ut equus currens, & linguam exerit, ut canis æstare ab aura, quæ est in æstu summo, ustus & tumor habet pectus, & paucis atque longo intervallo lingua hæsit, & rubor in oculis, & pruritus sentit in toto corpore, & præ labore decumbere non potest, sed ipse se ipsum præcipitem jacit ac devolvit inquietudine laborans, &c.

§. 5. Vir Rever. biliosus & melancholicus, post multos animi corporisve labores multam sanguinis rubicundi cum tussi copiam rejecit, qui auxiliorum ope visus est melius se habere, quamvis febris Assidua reliqua fuerit, quæ his septem diebus transactis aucta est, post cibum & nocturnis horis magis increfcens: conquestus etiam est per biduum de sinistri lateris dolore, eoque non admodum intenso, cui per hoc tempus aliqua tussis, somni breves, difficilis spiratio conjunguntur, nihilominus desistente dolore, febris in dies magis augefcit, & præter somni brevitatē, in hoc tempore adest siccitas & ariditas linguæ sine siti, dolor universi corporis, dorsī præsertim, mingendi difficultas, lotia clara & feces duriores: Ego supposito sanguinis profusionem præcedentem à Pulmone fuisse, & eam non præcesserit dolor, potius per anastomosi factam esse quam per diæresin, existimo in substantia Pulmonis laxiori relicto, illius partis inflammationem concitavisse, deinde corruptionem & gangrænam; & ob id non esse mirum si in primis diebus adfuerit tussis & dolor, deinde parte affecta canerosa reddita, omnia delinuerat. Febris assidua à cibo & horis nocturnis ingravescens ex affectione proposita proficiscitur: An vero etiam febris fixa conjungatur, in dubio relinquo. Mingendi actio fere ablata, & siccitas linguæ sine siti, proveniunt ex facultatis harum partium deficientibus; cum non reperiantur aliæ causæ in quas possint referri, quia ratione siccitatis cum non pereipiatur sitis ob delirium, sequitur ex defectu facultatis sitiferæ symptoma procedat; Idem die de mictione fere ablata.

Alij Medici putabant morbum futurum diuturnum, cum symptomatibus augefcientibus spatio duorum dierum suffocatus obierit. Antequam secaretur cadaver, sciscitatus quæ mea esset opinio? respondi corruptionem Pulmonis in parte sinistra versus dorsum vergente, quemadmodum in consultatione dixeram, Et secundo cadavere ita inventum est. *Letitius à Fontenelle consulti. xlix.*

*P*arte sinistra ] Adnotavit *Jeanbertus* cap. 7. de aff. febr. Thoracis in Pulmonis non esse necesse totum Pulmonem inflammari nam sæpiissime unam aut alterum lobum tantum id pati, quod infinitum cadaverum apertio ipsam docuit.

*De sinistri lateris dolore* ] Vide quæ dicta sunt de Pleuropneumonia lib. 2. Ut hinc constet sæpius affici Pulmones cum sola plura in vicio esse creantur.

§. 6. Rev. Pater post multos labores & in aëre perniciosè moram, ut & sub radiis solaribus, febre Assidua cum destillatione ad partes spirituales, tertianæ duplicis formam referente fuit constitutus, à qua transacta xi. die visus est evasisse: Deinceps dum in novis erroribus versatur, in febrem Assiduam delapsus est, quæ à longo rigore exordium semens, cum dolore sinistri lateris, cujusdam gravitatis thoraci insumebentis, cum tussis initio sicca, deinde *progressione humida*, in qua pituitosa flavitie & errore persusa apparente, spirandi difficultate vehementi, cum pulsibus mollioribus, languidis & inæqualibus, malis rubentibus. Hic i4. die recidivæ suffocatus obiit.

Vifum est fecare cadaver, eum omnino ego praefagirem in pulmonibus offensionem esse. Secto cadavere, inventa est altera pulmonum pars aucta in magnitudine, ut quadruplo major esset quam altera, & durior, qua secta multa a quas fetida fuit expurgata, & caro inventa densa, dura & rubra, quemadmodum esse solet Hepatis caro, & ab eodem latere etiam musculi intercostales non sine lésione inventi sunt. *Lelius à Fonte consult.*

**T**Uffo humida, &c.] Notandum in febribus continuis aliquando accidere excretaiones etueltas aut subtraetas, unde non illico colligendum adesse Pleuritidem aut Peripneumoniam. Hinc Hippocr. aph. 47. 4. *In febribus non intermittentibus excretaiones sanguinolentas livores, & gravolentes biliose, omnes mox a fiunt.* Quae materia non tam thoracis est quam aliam partem, qui excrementum deponunt in Pulmones, ubi per moram alienum induit colorem. Aut contingit talis excretio cum huor in Pulmonibus congestus, accedente febre essentiali, solvitur, & extenditur. Talem excretionem *Schaeperus* vocat, *Hippocr.* vetam autem à Pulmone manentem, *Wolff.* quae index est inflammationis partes thoracicas obducentis. Pythion; Epidem. part. 4. sect. 5. sexta die varia & cruenta extollit, cum tamen nec pulmonicus nec Pleuriticus foret, Nec à capite malum esset, sed tantum ab influxu materiae cuius ea non aderat copia ut inflammationem pareret, aut forte incendium non conceperat.

Cum destillatione ad partes spirituales) Nec tamen inferendum quaecunque è pulmonibus extenduntur ea

è capite destillasse, sicut enim cerebrum ob sanguinis copiam, qui sinus ipsius membranarum implet, si crudus sit, excrementa continuo colligit, Ita & pulmones, quorum vasa sanguine plena sunt, si ille excrementa scateat, copiam illius coaccervant.

Poss multas labores) Sunt ex Medicis qui causas procatarticas negligunt, sunt qui plures faciunt: cum extra corpus posita sint, videntur negligenda, tamen ad diagnosis & curationem non parum habere momenti: Vulgus fere totus est in causis externis & frustra eas causas tanti facit, Nec enim videndum quod morbum faciat, sed quod tollat ait *Celsus*, Externae causae internas & antecedentes quasi irritant & provocant, ab externa enim causa fere fit initium morbi. Huc pertinet quod *Gal.* scripsit 1. Epid. ad histor. Signi, Causae externae diutius febres excitant si corpus morbo non sit oppositum, Et ita laborasset *Silvius*, sed quia iam ad aliquid deterius aptum & comparatum erat corpus, Ideo gravi morbo est implicatus, unde statim morbi initio gravia diutius symptomata apparuerant, &c.

§. 7. Nob. N. annorum xl. constitutionis sanguinae, pleniorisque habitus, circa 4. Febr. 1677. cum febribus accidentibus incidit in pectoris angustiam, respirationis difficultatem, sequente sputo cruento & concurrente urinae suppressione: Prout autem erat vir magnanimus, ita parum vel nihil hunc affectum curans, Heidelbergam proficiscitur, ibique deterius habens, venae sectionem instituit, & post biquum Darmstadtum repertens, omnia symptomata magis ingravescere sentit, unde Francofurtum sequenti die sese confert, ibique Medicorum opem frustra implorat viribus naturae, ob gravia symptomata succumbentibus. Adhuc autem praeter signa Peripneumoniam comitantia, Difficultas urinae, qua mirum in modum affligebatur, cui fortassis ansam praebuit *denegata feri copiosioris dissipatio* per habitum corporis, ob aeris hyberni frigidioris inclementiam, in quo praedictum iter initio morbi susceperatur, inprimis cum alias etiam nephriticis obstructionibus zger interdum laboraret. Desit et difficultas urinae remedium usu, sed adhuc sputum cruentum, dyspnoea, nullus dolor in pectore, calor p. n. summaque virium imbecillitas aderat, ex quibus signis facillime Pulmonum inflammatio lethalis colligebatur. Ingravescente ergo virium imbecillitate 25. Febr. tumor pedum succedit symptomaticus. Ac 26. viribus pedetentim oppressis, & uno atque altero pedum digito livescente atque emoriante, circa vesperam, praecedentibus diebus praesentibus levibus deliriis, saepius cum sopore quodam obortis, animam reddidit.

Aperto cadavere, in pectoris cavitate serum sanguinolentum copiosum aderat; Pulmones quorum substantia alias spongiosa, undique sanguine crassiore, qualis venosus est, scatebant, extremis eorumdem partibus induratis & nigricantibus: Cor flaccidum & intus penitus exanque, conspiciebatur, antirectina sanguine putrido flagibus percolato replebatur, unde paulo ante mortem copiosus sanguinis odoris deterrimi, ob imbecillitatem retentricis summam, etiam exercebatur. *Horslius observ. ix. lib. 3.*

**D**enegata feri copiosioris dissipatio) A redundante & exstante in vasis feto potest totius Peripneumoniam, si praesertim fervida adit viscerum intemperies, id enim sponte, praeter copia vel accedente ambien-

tis calore, aut etiam frigore, (unde suppressio sanguinum) fervorem & incendium concipiens, à sanguine secedit, exandante in Pulmones, ob raritatem & motum ad excipiendum opportunos.

§. 8. D. Franciscus Chaynis uxor D. Rival Aurifabri Genevensis ætatis annorum 36. à sex mensibus gravida; nephriticis doloribus obnoxia, quæque saepius calculos excluderat, quinta morbi die, 12. mensis Januarii anni 1672. me accersiri juber, Pharmacopæi curæ ante contumissa; Erecta cervix spirabat, cum febre continua gravativo pectoris dolore, tussis aliquando sicca aliquando humida, rubore intenso genarum, siti inextinguita, lingua arida: accesserunt vigilæ & non à morbi die, *relapsus* cum delirio & deglutendi difficultate: Eductus sanguis fuit omnino corruptus, & quem triduo ante obitum, etiam argenteis spasmis

temerario ausu Pharmacopæus, incisa utriusque manus, eodem tempore salvarella, educi curavit: Urgebant præterea hypochondriorum dolores & flatuum superne & inferne eruptionis. Primo ad ægram ingressu Peripneumonia laborare pronuntiavi, & eaque lethali, tum ob graviditatem, juxta aphor. 38. sectio 5. Tum ob vehementiam symptomatum, sanguinis corruptelam: Pharmacopæus uni nephritidi intentus fuerat (etsi nullæ tunc ejus essent querelæ ac libere permearent urinæ, quæ subjugales semper fuerunt) ac febris extinctioni: Urgebant assidentes mulierculæ abortivi exhibitionem, quo dispendio fœtus salvaretur matet. Ea XIII. morbi die extincta, Magistratus cadaver apertiri jussit, quia maritus pridie obierat; quanquam morbo omnino dissimili, convulsus & catalepticus: Suspicio enim fuerat assumptæ in cibo cleutæ.

Aperto cadaveris abdomine, in conspectum venit uterus, cui fœtus firmissime annexus habetur, & non ita pridem extinctus, intestina, tum tenuia, tum crassa, flatibus mirum in modum turgibant hinc illa anxietas & orthopnoea toto morbi decursu urgens. Accedente extraordinaria hepatis, etsi sanissimi, magnitudine & vitio pulmonum: Cystis fellea 44. lapillos continebat, quorum major fabam æquabat splen integer erat; Renes flaccidi, male colorati, omni pinguedine destituti: uteretes summe dilatati, in longitudinem producti, contorti flaccidi. Reserato thorace, prodiderunt se in pulmonibus vestigia inflammationis, qui tumentes, lividi, male colorati, taboque & putre undique distenti, in conspectum venete: Edacem fuisse postea didici, etsi inter dissecandum assidentes, percunctanti mihi & magnitudinem jecoris admiranti, negaverint.

**C** *Ravatio pectoris dolore, tussi, robore, &c.*) Sicut Phlegmone pulmonum manifestis aliquando seprodit indicis, sic sæpe latet etiam exercitatos illius cognitio adeo ut variè illud peripneumonia. Id quod accidit non tantum ratione humoris illam committentis, qui varias affectus ideas exprimit, sed præsertim partis affectu: Prout enim Pulmo partibus summis vel imis, anticiis, posticis aut lateralsibus, laborat; profundis & intimis aut superficialibus ac externis, ita hac vel illa specie affectus se prodit: His adde varias illos constituentes partes, parenchyma ex vesiculis innumeris conflatum vasa arteriosa & venosa, ac tracheæ arteriæ truncum & ramos, connexionem item & cum variis partibus coherentiam, à quibus singulis singulare quid exurgit: Summe Pulmonum partes inflammatione si tentantur, quia his appenditur tracheæ arteria, anginosum quid exocutitur; affectione summum guttur pertingente, adeo ut quidam eam anginae speciem (cynanchen vocant) in qua nihil neque foris neque intus apparet, meram obolem peripneumoniz esse arbitrentur, si supermas pulmonum partes invasit affectio, Non secus ac urinaria vesica calculo laborans, sui affectus in summo cole indicium exhibet. Imom pulmonis loborum phlegmone obfessorum paulo difficilior est dignotio, quod hi fere liberi, nullique parti adstricti, nisi forte aliquando diaphragmati (quo in casu cum hoc sursum retrahatur, difficilior evadit respiratio) cohercant. Vasa præterea tantum minima, eaque fere capillaria, eos perperant, unde parciore inflammationis materia, hinc noxa gravis emergere nequit. Sin laterales pulmonum partes phlegmone habet, pleuritis fere ejus comes est, quia exudans per porosam & meabilem eorum tunicam tanies pleuræ affligitur, à qua eroditur, unde affectus prius symphaticus idiopathi-

cus evadit, hinc peripneumonia pleuritidis specie primo imponit, ac in progressu uterque affectus conlociatur. Postquam in pulmonum partem si fluxu itruat, dorsalem pleuritidem invehit, de qua *Hippocr.* lib. 3. de morb. rit. 40. Præcisus fere tactam, ejus assidens signum est mictio rubra, incalescente scil. sanguine in majoribus vasis pulmonum illi regioni substratis. Obsecutus est hic affectus in infancibus, qui quæ lædunt effari nequeunt. Anno 1669. obiit mihi puella duns annos nata, quæ citra tussim & dyspnœam intra quindecim dies cum mihi septe tabida interit, Dorsum illi totum statim post obitum inensile livor, ab inflammatione proculdubio vicinæ pulmonum partis. Antici pulmones inflammari fere vultu rubore suffuso, præsertim malis, se produnt: Sed maxima & præcipua exurgit differentia pulmonis inflammationis, prout partes intimæ aut superficialiæ obfidentur, ratione vasorum quæ in partibus profundis insignita sunt, minora in externis, unde gravius aut minor, affectus. Hinc de affectu sede olim plurimum fuit digladiatum, teste *Aureliano*, alii si quidem venas Pulmonis tantum in malo teneri volebant, ut *Diacles*, *Erepsitatus* vero arterias, *Apollonius Herophilus* utraque vasa. *Asclepiades* autem bronchia ipsa: *Praxagoras* partes pulmonis quæ sunt spinæ conjunctæ: *Demetrius Herophilus* cum *Celsus* voluit Pulmonem tantum affici, Ex parte enim si fuerit tumor ille pleuritidem esse dicebat. *Soranus* totum corpus hac passione vexari dicit, sed vehementius Pulmonem, atque inde nomen desumptum Peripneumoniae, Differentias ab humoris incubens diversitate missas facio, quas repetere ex *Hippocr.* lib. 2. de morbis, De Viis acut. & lib. de morbis internis.

§. 9. Quidem in Febrem Assiduam lapsus est cum tussi, dyspnœa, dolore ad dextram thoracis partem. Pars dextra pulmonis fuit inventa corrupta, Et ejusdem lateris pleura male affecta. *Lib. 2. tit. de Lateris dolore.*

§. 10. Circa novillimum mensis Novemb. anni 1607. cum Virum Illustrissimum jam quindecim dies febris, arthritidis, sopor aliæque symptomata crudeliter exercuissent, ecco derepente insolita accessit respirandi difficultas, ad sublimem aecedens & recti spiræ, eaque dolore universi thoracis superioris comitata, atque gravi illo quidem magis quam pungente, & una sufficula, sed rara. Eo dolore quarto die evanescente, supervenere sopor *generumque rubor*, febre interea spirandique difficultate increbescens. Quem morbi progressum tamen ipse non viderim, sed ex relatu tantum ægri & domesticorum, atque triduo dunta-

duntaxat ante obitum vocatus fuerim, Illico Peripneumoniam urgere & jam ad suppurationem & brevi ad mortem tendere significavi, cum tamen pro febre simplicis catarrho conjuncta duntaxat ab omnibus haberetur: nam & pathognomonica signa cum affectum evidenter arguebant, & præter spura toto morbi tempore alba, viscida, spumosa prorsus, rotundaque æstus, suffocatio & velut *leiposthymia*, nec non ephidrosus superiorum partium cæteriæque accidentia confirmarunt satis, quibus non multo post difficultas in spirando gravis, sudor toto corpore diaphoreticus successit, à quo sensim *labefactari functiones omnes* & stertor subsequi cepit. Tum præter dejectiones alias, semper abominabiles, tunc fetoris expertes, hoc quoque memorabile fuit, quod in illo ipso agone, antequam exspiraret, è naribus per 4. horas distillavit humor albidus, tenaxque & foetidus omnino, ac vere purulentus, sed excoctus, qui in pulmone ebulliens sua sponte in nares despumaverat: cujus etiam reliquias repletum iri in dissecto Pulmone denuntiavi, & revera observavi, quanquam longe major portio ante mortem distillasset.

Postremo cum viscera & hypochondria, intestinaque cum ventriculo & mesenterio, integra ac inculcata omnino fuissent reperia, Præter Renes calculis prægnantes & cæteroque, sanos, Solus Pulmo insigniter tumidus & quodammodo excelsus reperiens, in isque unus humor albus & tenax & purulentus dilirescens. *Car. Pifo de morbis à sero sect. v. cap. I.*

**A** *Rthorist*) *Galenus* lib. de Theriaca ad Pilonem annotat affectus Pulmonum eoque lethales doloribus arthriticis facile succedere: Locus est commemoratione dignus, qui sic habet, *Alia vero medicamenta quæ podagricis in morbi auxilio bibunt, ad pedem quidem humores deferri vetant; sed horum spersum humiditatem non discentiam, majorem quendam morbum faciunt; nam fluxionem per corpus obervantem Pulmo semper obstruendi necessitatem motus, & propter corporis sui raritatem ad istam excipiendam facilius, totam ipsam ad se trahens, ita hominem suffocat, quod periculum non raro conspicimus.*

Catarrho) *Avicenna* lib. 3. sen. 2. tr. 11. cap. 13. scribit à catarrho Anginam; Pleuritidem & Peripneumoniam generari; quæ sententia in mentibus multorum alias radices egit. Sed male credunt Medici quicumque materiam in pectore coacervatam à capite in subjectas partes præcipitari, cum potius verisimile sit materiam pituitosam quæ è pectore extenditur, ejectamentum esse totius massæ sanguineæ in thoracis partes detrusum. Potissima ratio qua nituntur, ea est, quam ex *Aristotelis* lib. de Somno & vigilia ca. 4. deducunt, Dari scilicet ab imis partibus ad superas anathymasiam, ejus in cerebro fiat condensatio, hinc in subditas partes defluxio, non secus ac in secunda ætatis regione condensantur vapores & in imbres convertuntur, unde reciproco motu fiat mutus in per superas & inferas partes fluxus & refluxus. Vias autem per quas in specie à capite materia catarrhosa defluere ad Pulmones & thoracicas partes, voluerunt esse tum conspicuas, ossis cribriformis ductus, nares, palatum, fauces asperamque arteriam. Tum albidus, arterias & venas, spatiaque subter cutem à vertice in cervicem ac tempora, per quæ humores in faciem, collum, guttur, dorsum, subditasque omnes partes diffunduntur, unde exterioris distillationis fomes quam commentus est *Fernelius*. Sed quantum ad has vias *Doct. Schneiderus* lib. 2. de catarrh. sect. 2. cap. 20. firmis rationibus probat humorem pituitosum & excrementum subter cutem capitis fluentem, ad foramina ossis cuneiformis & cribriformis nec manare, nec illac transiri habere. Lib. autem 3. sect. 1. cap. 6. pluribus demonstrat catarrhum non ex cerebro, quasi peculiare ejus recrementum, oriri, sed potius ex tota massa sanguinea, atque ejus materiam una cum sanguine per vasa circumvehi, ac tandem in extremitatibus egeri. Et quibus fundamentis statuendum Catarrhum Peripneumoniz originem non dare, sed potius humorem pituitosum ex massa sanguinea ejectionem in Pulmones per arterias & venas quod Pulmonum situs & substantia clare indicant;

Cum enim, hi (molle rarumque viscum) infinitis vasis refert, cor, sanguinis officinam, in sinu suo excipit, haud modicum excrementi ex sanguinis elaboratione redundare credendum est: tum ex eorundem venis ichores multos excludere, quos facile excipit fungosa Pulmonum substantia: ubi enim vasa hæc multo turgent sanguine, quicquid superfluit aut transcolatum in eorum substantiam detruditur, postea per bronchia excluditur & expectoratur: quæ materia, si præ multitudinem, vel cruditate, lentore aut caliditate intus cohibeat nec expelli queat, ab ea, vasa angustiora ita replentur & obstruuntur, ut hinc prohibita transpiratione conculcati incalescant humores & inflammationem pariant, ut docet *Baronius* lib. 3. cap. 14. de Pleuripneum. Quæ sententia *Hippocr.* antesignanum habet, Is enim lib. 1. de morbis, *Pulmonis*, ait, *inflammatio fit quando coctum in lumbellatamque pituitam & bilem propter calorem ex vicinis locis pulmo ad se traxerit. Ac lib. 4. de morbis v. d. 4. Pulm. inflam. fit cum ad se Pulmo sanguinem aut pituitam salsam traxerit, neque rursus dimiserit, sed ibi collecta, & coacta fuerit. Quod autem de vaporum ascensu in cerebrum adstruunt, inane est imaginationis commentum. Annuus quidem vapores, ut reliquis partibus, ita capiti communicari interdum, at non ut vaporem simpliciter, sed quæ in humorem conversum, simulque cum massa sanguinea circumductum: Præter enim venas & arterias nullas reperire est vias, quæ ab hepate, liene vel cerebro ad cerebrum tendant; addè interjecta vaporum ascensus impedita, septum transversum & alia, ut palatum fumis è ventriculo per œsophagum sursum tendentibus: hinc *Crato* Tomo 1. conf. 1. *Car* vapores calidi & humidus potius per ventriculum ab hepate ad cerebrum, quam per venas ad caput deferri videantur, causam non reperio. Atque iterum dubium insolubile restat, qua via excrementis hujusmodi susceptis per venas & arterias, cerebrum se liberet? Erudiri qui cupit, redeat ab lib. 1. Tit. de catarrho. Huc pertinet alia non minus difficilis questio, An aliquid à capite decedens, in pulmones per asperam arteriam dectrare possit? Nos quanquam *Galenus* potius portionem aliquam in pulmone hac via dilabi asserat, *Hippocr.* tamen sententiæ lib. 4. de morbis assensum malumus, qui præter spiritum, nihil omnino illac transfluere existimat. Ac recte dominans *Schneiderus* lib. 3. de catarrhis. Si quædam portio, inquit, portio inter bibendum in Pulmone semper trahatur, illud visum una nocturna perturbatione & convulsu referretur, quanta enim vis potentia materia in ramis aspera arteria cumalere-*

*int? non ne ea hic stagnabit? nam non potest decurrere: Nec Pulmonum vasa illam imbibere posse videntur, cum sit tam crassa: Ac vasa aspera arteria sunt itinera anime, si illa materiam potentiam conciperet, nonne spiritus omnino intercluderent? Si gutta ex potu in laryngis fistulam in bibendo aliquando deerrat, quam vehementer homo torquentur? Hoc quoque clarum exinde evadit, quod dum aliquid cibi vel potus deglutitur, necesse est gulam dehisce, hinc per naturæ solertiam factum est, ut verus guttur diducta anteriore gula parte, runc fiat ipsius gutturis depressio, ob quam prohibetur respiratio, cum enim cibum deglutimus, clauduntur epiglottis artificioseque si quando sit deglutitum, omnino spiritui negatur via, quanto magis cibum; potui intercludere ingressus? Autopsia quoque ostendit gutturis cartilagini Arynoidi operculum quoddam cartilagineum à natura esse superimpositum, quod lingulam vocant, cuius magnitudo equipollent cartilagini hiamæ, quo ex ore claudatur, at id frustra à natura conditum esse credendum, si usui dicto non inserviret: Quod experimentum per coloratas porciones factum, id in canibus tentatum non iniecit. Si quicquid repletum in bronchiis, illud Baronius fuisse air vel humoris biliosi, vel porracei vel crocei aliquid aut si fides danda, auctori libelli de corde, id potius per quidam translocationem aut reclusionem per poros ignoros factam, credendum. Ex his constat, si nihil quoque tenuioris substantiæ per haustum aut linctum in asperam arteriam descendat, nihil quoque pituitæ aut humoris potu crassioris leni simul ac videnti, in pulmonem descendere posse: Demum, concessio portionem aliquam per dictam viam in pulmones prolabi, an inde arguas totam illam illuviem, quæ per anasthasin exundat, e capite in asperam arteriam extillasse, ipsa in egressu rursim excitat, cor non in eadem in ingressu? At vero peripneumonia, si ejusmodi humoris in pulmones illapsam causam agnoscit, cur eadem non omnibus æque contingit, quibus cararrhus familiaris est?*

*Epididymus* Mali sunt Hippocr. 4. sent. Sudores circa caput & clavicularum apparentes, fiunt enim vincentis ægritudine ob aestum, impetum & violentiam; iique sudores omnino sunt symptomatice, à quibus ægri imbecilles facile exolvuntur.

*Sudor toto corpore diaphoreticus* Sudorem uberioris manentem, etiam criticum ægri, perniciosum esse, prostant exempla. Unum afferam insigne quod an. 1674. accidit. Uxor Mercatoris Genevensis, exente Julio febre prehensur intermimente, cujus paroxysmi inæquali admodum passu incedebant; aliquando xiv. horarum spatium expletes aliquando quinta aut sexta desinentes, nullo invasionis observato tempore aut ordine, alias alternis diebus, alias bis unica adorientes: Comes fuit capitis dolor, quem mulcebat epithema ex nucleis persicorum aquis verbenæ, sambucæ, ol. rosar. &c. comparatum. Fatigavit ab initio nausea & vomituritio, sedata ab exhibitio sale vitrioli, cujus opo pituita multa & bilis exclusa: Cardialgia biduo post exurgens, defuit usu Emulsionis seminum citri. Sudores multi ab initio morbi, humorum exsuperantia argumenta. Sanguis tum à brachiis, tum ex venis aut elicitus, sero diffusebat; hinc crisin per sudores ad futuram prædixi. Die morbi xiii. ma-

§. 11. Anno 1663. Autumno, cum per totam fere Italiam tusses, peripneumoniz, & malignæ pleuritides, epidemialium morborum instar grassabantur, atque multos occidebant, inveni in omnibus quos secui, quasi totos pulmones sanguine media ex parte putrido repletos, turgidos, atque mirum in modum induratos. *Collet in Observ. Anat. & Chirurgicis.*

§. 12. R. P. Febre magna correptus est, eaque continua, cum Siti Spirandi difficultate, tussi, &c. Pulmo mortui totus sanguine repletus mirum in modum tumidus apparuit: itaut non vasa tantum turgent, sed per totam substantiam sanguis conglobatus scilicet duritiam

non pulsui admota, levis circumacta percipiuntur, cum in cataphoram inclinatione, quæ exuperantis cacochymiz leposæ indicia; Cucurbitulas siccas à cervice ad imos lumbos admovevi cura, quarum subsidio desierunt contractuunculis, & excusis sopor. Intraente xiv. die universalis convulsio, sed nec vehemens nec diuturna corpus concutit, crisis proxime prodromus, Sudor enim ubertum manat, quem ultra bihorii spatium procihi prohibeo, exolutionis vitium metu; Agram tamen adstantes sudoribus disfluente ad plures horas concedunt; unde leipothymia ingruit. Stragolorum partem ideo detrahi jubeo & indusium, non lecus madidum quam si aquæ immersum fuisset, cardiacisque recreare; Statim resurgunt vires, recolligique se natura, pugnam instauratur; Redit sudor, sed cum contractuunculis, quæ metum incutunt assidencibus, non item Medico, qui perispecto virium tenore, & censum indole, quas semper prægrediuntur symptomata, formidanda quidem si die non eritico, & si natura certamini impar sit; nequaquam ubi virium robur constat, & dies legitime pugne in dicta adest. Terror tamen muliercularum animo impressus, consilio meo prævalet, qui rem naturæ committendam suadeo, nihil molendum ea die quod naturæ vim inferat, satis esse illi auxiliatiles porrigere manus, Si quid aliud urgeat, eam jam frano potius quam stimulo indigere. Alii tamen advocantur Medici, qui mulierculis, de hystericiis symptomaticeis sollicitis, credulas aures præbent; quanquam toto morbi decursu, ne minima ureti affectus indicia se exhibuerint. Internis femoribus vesicatoria affligi impetant, quorum vis ab inexhausto madore eluta, etiam toto quadrihorio hæserint. Spe frustrati, porro ferrum ignitum ibidem admoventum convolvant, quod prudens Chirurgus affigere recusat: (mibi vero obstanti febrem à feri orgasmo ortam esse, cujus porro ad cerebrum delata initium nervorum vellicet; Diem esse criticum, cum expulsiōe critica, quæ naturæ regimine concedenda sit, præsentem vitium tenore; accidentia terrifica, cum sudoribus finem habitura; Medicum eo in casu spectatorem esse debere, non actorem; Ex consilio Galeni, ea diē ne clysteri quidem locum esse, Cucurbitulas scarificatas pridie, occurrentibus isdem symptomatibus, proficuas, e re potius fututas si quid molendum, quod naturæ motui non adversarentur; interum cerebrum degradare valeret; & liberare tum à levibus spasms, tum à cataphoræ.) Reponunt cuncta hæc esse hysterica, cavendum esse ne vapores gravius caput occupent lethaleq; accersant spasmosque de causâ præscriptis ante vesicatoriis validiora imperant, atque quæntem visitationem ad horam viij. vespertinam indicunt. Sed ut ante, irritus sit cataplasmatum effectus, à sudorum copia, qui adeo ubertim manant, ut simul cum his anima evolarit septima hora, circa sextam adveniens non madidum modo ægram, sed æquis instantem invenio; Pulsus plenus adhuc, sed undosus & obrutus, cujus nec systole nec diastole discerni poterat: Ut non modo verisimile sit, sed etiamnum certum, si coercitus fuisset sudorum impetus, protrahendumq; eruptionis criticæ tempus, ægram morbo defungi salutariter potuisse.



zumularetur; Cor & circumfite venæ sanguine mirum in modum repletæ inventæ sunt; Imo & sinister finus cordis sanguine repletus. *Vide lib. 2. tit. de Spato sanguinis.*

§. 13. Virgo brevi morbo sublata est, ante tamen biennium altum ducebat spiritum: ante obitum Febris Continua accedit, quæ sub noctem intendebatur. E thorace aquæ virosæ magna copia effluxit, Pulmones erant syderati. *Lib. 2. tit. de Tabæ.*

**E**t velut *leipsothymia*) Quibus inflammari Pulmones, animas sæpe videtur deficere, tum ob phlegma contentum, quod saturitatem quandam inducit; tum ob vaporem, tum maxime quod cordis regia accensa, animus præ incendio videatur deficere: accedit revocatio caloris & spiritus ex omnibus partibus, excitatio *phlegmæ* capite accenso, evocatio humorum, ichorumque à partibus inferis, quod *Hippoc.* observavit in Coacis, qui loquens de quibusdam quibus totus Pulmo cum cor-

de inflammatus; ait, animi deliquia iis contingere: An cum animus linguere videtur, à sectione venæ (quæ hic præsentis & unicum medium) temperandum? Nequaquam, imo ea sæpe repetita sanguis copiose detrahendus, nec tereri oportet istis deliquiis, non sunt enim *evanescentes*, nec maioribus & *typhoides*, quæ sæpe adeß ob cordis incendium: Et experientia, & ratio & iudicium Medicorum si quando alias hic maxime elucet. *Ballonius.*

§. 14. Vir Illustris sanguinæ & biliosæ temperationis, in primo senio constitutus, qui multis ab hinc annis ruborem non naturalem in genis ferte cum pustulis extuberantibus confuevit, Cum Venetias appelleret, ex nimis laboribus, & vigiliis in Febrem Assiduam decessus est, cujus cum diuturno rigore cepit initium, cum tussi, dolore pungente & respirandi difficultate ac pulsu duro, aspero instar ferræ, quæ auxiliis adhibitis septima die visâ est minor reddita, ut sputa non amplius cruenta, sed alba conspicerentur. Transacta septima die, tussus febris cum rigore invadit, cum tussi & maxima respirandi difficultate, dolore non ita intenso, ad mediam thoracis partem porius vergente, cum pulsu magno, undoso, & spuitione cruenta nigricante uberrima, ut mirum videretur unde tam copiosa exspitio proficeretur, ut aliqui ex Medicis ex capite proficisci opinarentur: Lotia sanorum similia conspiciantur, fæces vero biliosæ apparere incipiebant; Adeß ingens faciei rubor.

Plurimis auxiliis adhibitis, non cessantibus vigiliis & respirandi difficultate, decima die accessit pseudodelirium, & pulsus redditi sunt parviores, tandem XIV. die vitam cum morte commutavit: Secto cadavere, pars dextra Pulmonum fuit inventa corrupta, nigricans, tanquam sanguis concretus, Et ejusdem lateris etiam pleura male affecta: Me hæc omnia prædicente, cum alterius Medici opinionem non amplecterer, quod materia noxia à capite prolaberetur.

**M**ea sententia fuit Virum Illustr. in primis diebus proculdubio ex morbo laterali laborasse, adfuerunt enim 4. signa Pleuritidis propoßita ab *Hippoc.* & quintum à *Galeno*, Febris scilicet acuta, dolor lateris assiduus, difficultas spirandi, tussis, pulsus durus, celer; inæqualis: Febris hunc affectum comitatur ob inflammationem & situm partis laborantis, quæ cordi proxima est: Dolor Pungens sequitur, quia membrana, pars nervosa, inflammatione tentatur, & continuum solvitur. Difficultas respirationis accedit, quæ *Gal.* 3. de loc. 3. debere esse frequentem & assiduam affirmat, quoniam pars respirationis instrumenti laborat & dolet: prohibet enim dolor quominus instrumenta respirationis plurimum attollantur, unde respiratio fiat parva & crebra necesse est. Tussis vero succedit, quia ex pleura

laborante inflammatione, quæ pars est tenuis & rara, ob necessario aliquid humiditatis resudat, quæ pulmone communicatur: Pulsus vero ob febrem necessario est celer: propter vero nervosam partem male affectam, insigniter durus, sed minor quam febre conveniit: Postmodum vero ex Pulmonis inflammatione conflictari, pleuritide in peripneumoniam commutata, imo spuitiones copiosæ & nigricantes ipsorum pulmonum caloris naturalis corruptionem confertim factam, non medioere indicium præ se tulerunt: Cujus affectionis causa proxima est sanguinis biliosi ad pulmones defluxio, prava qualitate affecti: remotiores vero Jecoris intemperatio fervidior, mala dispositio pulmonum & erroneæ exteriores. *L. à Fonte Consultatione xci.*

§. 15. Adolescens 18. ann. optimæ ceteroquin constitutioni ex vitæ inordinato incidit in Continuum cum respirationis difficultate: cumque aliquandiu, nihil proficientibus remediis laborasset, diarrhoea superveniente obilit.

Secto cadavere, præter pulmones etiam Hepar erat inflammatum. *Io. Valsalv. Runtlerum observ. 21.*

**D**iarrhoea) Sive bile ex choledochis, sive recrementis sanguinis inccique nervosi ex arteriis & ductu Pancreatis in intestina effusis, *Hippoc.* mala 6. aph. 16. *Velfghium.*

*Diarrhoea superveniente*) Cur peripneumoniz & pleuritidi fatalis pleuramque sit superveniens diar-

rhoea, causa refertur in propagationem inflammationis quæ à partibus spiritalibus ad naturales transierit. Inflammatum Jecur fuit per confusum à Pulmonibus, cujus inflammationis diarrhoea soboles fuit.

§. 16. Illustr. & Reverend. Matthæus Zane Patriarcha Venetiarum, sanguinæ & biliosæ temperationis, qui aliquibus abhinc annis difficultate excretionis *facies* laborabat, quæ

*ariores & Ictericorum similes deiecebantur*, vigilis obnoxius, mense Iulii, post multos animi corporisque labores, præcipue *ad iram concitationem*, in Febrim Assiduam delapsus est, quæ in principio accessionalis videbatur, cum longo rigore invadens: secunda autem maior accessio primæ correspondens per decem horas anticipavit, in cuius remissione sudor copiosus insequutus est; deinde febris continens fuit animadversa, aliquot horis nocturnis augmentum capiens. Lotia erat sanorum similia & feces, aderat maxima spirandi difficultas cum tussi, & alba pituitæ exspitio, interdum etiam purior: *ruber maximus in genis*, non poterat in sinistram latus nisi cum difficultate decumbere: aderant vigilæ & somni breves, cum sudationculis circa pectus & collum; siccitas linguæ & labiorum albedo: pulsus magni, interdum molles, qui in sexta die in quarta pulsatione facti sunt intercepti, quo tempore etiam biliosa deiectio. Adhibitis remediis res tamen semper in pejus delapsa est, ex quo factum est ut alter ex Medicis pronuntiaret febrim esse redditam malignam, de inflammatione Pulmonis ne verbum quidem, 14. die vitam cum morte commutavit.

Secundo cadavere, fuit inventus tumor in parte sinistra pulmonis, ex cuius sectione materia foetida fuit educta: quæ mea duntaxat fuit sententia, atque *lapis in vesica fellea ingens*, totam vesicam replens. *Lalius à Fonte Consultat, 32.*

*Febris Ictericorum similes deiecebantur*) Albicantes scilicet & panæ, non sollicitæ earum excitatione stimuli defectu, à bile alio delata obnegatum exitum à calculo vesicam felleam replente.

*Post multos animi corporisque labores*) Hipp. 2. de morbis. Erysipelasin pulmone fieri ait, cum nimiam fuerit refrigeratus, quod contingit ab ardore febrium labore, intemperie; Et cum perfrigidatus fuerit, plurimum sanguinis ad se trahit. Inflammatio autem hic potius facile contingere sanguine bilioso reddito, à bile non exclusa, sed illi commixta, impedita alius exelatione ob calculum in vesica: Anno 1672. curanda mihi obigit mulier inflammatione

pulmonum laborans, cujus cystam felleam replebant 44. calculi.

*Ad iram concitationem*) Fernelius lib. 6. cap. 5. pathol. annotat decrepitum quendam senem in iram mirè propensum, post decessum sine felle ac sine cysta inventum esse, in cuius sede calculus ingens concrescens.

*Ruber maximus in genis*) Hippocr. 2. prognost. meminit ruboris genarum in purulenti, ob calorem pulmonum & ob assiduam tussiculam; ait Galen. in comm. part. 60. In Coacis peripneumoniz signum *luxurians* dicit, politico dicendi modo, i. e. ruborem genarum.

§. 17. Illustriss. & Rever. Offredus de Offredis, sanguineæ & biliosæ temperaturæ in ætatis initio, post usum glaciæ luculentum; at labores corporis vehementes, in febrim assiduam est delapsus, quæ cum ventriculi offensione & vivo liquidore, in principio per circuitus succendi visa est, cum immensa respirandi difficultate, ut decumbere non posset & suffocari videretur, cum rubore genarum ac linguæ & labiorum siccitate & albedine cum tussi & pectoris graviditate quadam, cui in fine tertiz diei sudor copiosus successit: in toto tempore vigilæ, circa frontem & eollum sudationculæ, lotia alba crassiora, feces vero sanis similes: Pulsus magni, molles urinæ quales sexta die (dum per tres horas somnum capit) præter sudorem universalem deiciuntur, biliosa, lotia turbulenta prodeunt, maculæ magnæ, cineritæ per cutim erumpunt, pulsus magni, molles, sed in quinta pulsatione intercurrentes percipiuntur: In fine sextæ diei succrevit delirium, pulsus redditi sunt in horas languidiores, in fine septimæ ad meliorem vitam fuit perductus.

Secundo cadavere, Pulmones fuerunt inventi tumentes & pravi coloris, sed non fuerunt secti, cum operatio fuerit facta ab ignaro barbitonfore. *Lalius à Fonte consultat, 112.*

*In febrim assiduam est delapsus*) Hinc stabili pōit Placeti opinio, statuentis pleraque febres, quæ vulgo pro symptomatice habentur, primarias esse, quibus cetera comites, inflammationes succedant; cum sepe contingat ut sanguis præ copia, fervore, tenuitate aut impuriore nature gravis, in venis subsistere nequeat, & vel statim in prima febris invasione, vel in progressu vi nature propellus, è venis vel arteriis in partem aliquam decumbat, hinc in parte, in quam decubuit, novum morbum pariat, febrim scilicet comitatem non symptomatice, ut bænus creditum, cum morbum non sequatur sed illum præcedat illiusque causa sit: Indicio est sic eoque, quod hæc febres, aut sequam doloris aut inflammationis alicujus partis indicia se proferant, cum calore & subsequente calore prebendant &

quandoque horis aliquot præveniant. Talès febres sepe oñiuntur, cum in viscera aliqua interna, præsertim carnosa & sanguinea, venis quæ copiosis referta & cordi vicina, tales influxus sunt, quod ob situm & constitutionem ad influxum humorum recipiendum frequentissime fit in pulmonibus. *Vide Riverii Pr.*

*Pulmones fuerunt inventi tumentes*) Hippocr. 3. de morb. lib. 14. morbum affinem describit. Quam pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & creta cervicis spiratio, & acronum respirat, & frequenter anhelat, & intumesceat, & vates expandit utiat equus ex cursu, & linguam frequenter exerit, & pelvis semper ipsi ligam videtur & gravitas in ipso esse, &c. Salus de Erysipellate Pulmonis interpretatur.

§. 18. Dissecui comitem A. Gonzaghe, & inveni omnia vasa Pulmonis, ex tripliei genere, magis tamen aspectu arteriæ ramos, plenos sanie simili lacti, adeo ut nullus prorsus Boneti Anatomia Tom. III. R adesset

adefset sanguis. Eratque Pulmonia mendosa: Diffecui etiam puellam 13. annorum, cujus morbus jam diu erat in capite, à suppressa purgatione per ulcera, nec adventantibus mensibus correpta febris. Omnes hujusmodi fluxiones necessario adducunt febrem æstuosam, non tamen ardentem, quoniam materia putret prope eor, & implet vacuum pectoris, & est humida & cruditatibus permixta. *Vide sc& 17. Observ. 2. lib. I.*

## OBSERVATIO XLVI.

*Febris Lethargica à Pulmonibus putredine affectis.*

**V**idua Domini Garnier annos 45. nata in morbum incidit: habitu erat satis succulentis, alba, genis rubentibus: Aegritudine aliqua animi detinebatur qua se eximere non poterat facile: Circa æquinoctium autumnale, cum præcessisset temporis constitutio inæqualis (qualem pauci admodum animadvertent) putredinis parens, in morbum incidit. Primum totum corpus maculis rubris, ac si morbillis laboraret, aut si ingens æstus foret, erat desc&atum, nonnullis corporis torpor, appetentia dejecta, ignavia, rerum omnium contemptus, cum aliqui prudenter rerum omnium satageret & ad omnia munera obeunda esset alacris, quod magnam morum dissimilitudinem significabat, & ad judicandum de debio æncipitque exitu occasionem porrigebat, Febris continua fuit, de nocte maxime exacerbabatur, nec exacerbationis ullum erat signum quod anteiret, Sed confusa erant omnia, magna non ita febris apparebat ut ea nos moveret: Febres eo tempore grassabantur mali ingenii, *Friv& fallaces* erant, nam nec incendii indices erant magni, & sedimentum laudabile satis, & enz&rema continebant: *Com&osa* erat, nec nisi interrogata respondebat, alicui tamen judicii nullum erat signum: capiebat satis belle cibum oblatum: Diebus judicibus nihil natura movit, nihilque excrevit nisi arte sollicitata: Dejectiones variz, putres admodum, Sanguis bis missus plane putris: *Vires plurimum deie&te* apparebant, præsertim animales, quarum etsi non magna necessitas est in morbis, tamen ad judicandum nobis magnam præbent occasionem: Primis decem diebus exactis omnia satis moderata pacataque fuerunt, sed ab xi. aut xii. die magnum apparuit incendium; Ex intervallis *grav&olentissima* dejectiones, levia deliria, oculorum lacrymarum involuntariarum, *genarum*, ac præsertim sinistrarum, *rubor satur* admodum. Tandem cum urinam redderet involuntariam, aut retineret ac si suppressa esset, *involuntarie quoque alvus desc&deret*, xiv. morbi die ab illa exacerbatione manifesta, *xx. autem totius historiz morbi*, cum *sudore magno* (nullus autem toto tempore febris apparuerat) delirari us, taciturnitas magna, tremores & quasi subsultationes manuum aderant? Potus omnes sine discrimine admittebat, non sitiebat graviter febriens; potus veluti in profundum desc&dere videbatur: Cum colluere os aqua juberetur, non poterat ore rejicere, bene ratiocinabatur; Interiit.

Aperto cadavere reperti sunt pulmones veluti putres, costis adhærentes, Intestina plena fugaci retroque flatu, cum *serosis humoribus* in spatiis & inanibus foraminibus abdominis, *qui meteorismum inferebant*. *Ballonius conf. 45. lib. I.*

**I**n morbum incidit, &c.) Hæc historiz intelligi volumus sæpe morbum satis securum apparere, cum tamen per se funestus sit, nec satis parvæ diatheseos argumenta appareant; In plerisque initio morbi observamus totam corporis enim maculis rubris suffusam, quibus tamen nihil præterea alienum contigit, sæpe enim, aut sanguinis æstus, aut cum fervore quodam juncta malitia aliquid tale promittit, sed illud periculi nihil junctum habet, sola aut sectione venæ, aut blando cathartico quicquid est prævenitur: Tamen tribus quatuorve argumentis malignitas & cacoethia morbi deprehendi poterat, 1. in eruptione illorum exanthematum positum erat, nam nisi ingentis incendii, tanquam manifestæ occasionis excusatio subsist, quoties apparent, aliquid maligni subesse demonstrant. 2. In dejectione virum subita, quoties enim virtus non constet, nulla præsertim præunte evacuatione manifesta, aut simili aliqua re quæ jacturam faciat virium, aut cum febris vehemens non adest, malum illud est ut signum, Arguit enim aliquid aliud subesse latens, quod minimo momento magnam in viribus æconomiz naturalis mutationem afferat, & quod notandum est, quodque Medicis frandi fuit, facies non concidebat ullo modo, ut ex Hippocr.

Febricitantium non omnino levitet, corpus idem permanere & nihil minui, vel etiam plusquam possit contabescere, malum, Nam illud morbum fote longum significat, hoc autem imbecillitatem: Ubi *Galenus* notandum vult byeme, & cum plenitudo magna est, non collabi habent corporis, tamen malum non esse signum: Sed cum mediocritas febris est, & tamen non mutat corpus, nec in colore, nec mole, nec character, aut cum in his immutatur plus justo, Dubium non est quin hoc malum non sit; Nam non concidit nec collabi, & meatuum densitatem significat & contumaciam materiz: Concidere autem plusquam ratio postulet, imbecillitatem magnam significat, ita tamen ut collapsus illius non sit causa aliqua externa, At in muliere proposita febris erat & *grav&olentissima*, & tamen non concidebat, nec moles, nec color mutabatur, nec character, quod nec ad securitatem, nec ad duntaxatam apparebat, cum xiv. die interiit.

*Præximo totius morbi historiz die, &c.)* xiv. die interiit, qui xiv. erat exacerbatione, Nam per 13. dies satis alacriter habebat, & in actionibus naturalibus & animalibus, ac omnia pene securitatem pollicebantur. Sed quod intrus venenum latebat,

cum natura nihil movisset, signa sue malignitatis compir-  
cedere, hinc febribus confusus, acerrimi caloris perfusio,  
mox ejusdem contemperati significatio. Atque ita  
morbus fuit acutus, si ratio habebatur exasperationis  
morbi, non totius historice. Dicendum ergo verisimile  
fuisse morbi quidem ratione citius quidem illam inte-  
rere, sed ætatis ratione, quæ adhuc constabat, factam  
ut qui morbus ante periret debere, prorogaretur  
ita *Silvius* (hist. 2. sec. 3. lib. 1. Epid.) cum à causis pro-  
catarticis in morbum incidisset, non tam lethali morbo  
est simplicius ob causas procatarticas. quam quia  
occasione alie essent quæ corpus morbo opportu-  
num reddebant, alioqui ratione causam externam  
in levem febriculam lapsus fuisset, sed lethalia sym-  
ptomata quæ primum æque flatim apparuerunt, indicio  
fuerunt insignate materiam malam, quæ à cau-  
sis illis externis excitata lethali morbo ægrum im-  
plicavit, Ergo, cum sanctissimo morbo detineretur,  
ejus tamen vani sustinuit propter ætatem ad xi.  
diem.

*Graviter rubor (sæpe admodum) Szpe & optimus color & charactet in ægris apparet, cum tamen morbus ad interitum tendat, tribus de causis, 1. ratione aliquando, ipsius febris, quæ suum multum tennem vaporem effert, qui viriditate aliquam faciei, fallacem tamen, asserit solet. 2. Si febris ea non sit ingens aut colligans: Observavimus enim aliquando, febres colligantes & pestilenciales (quas pestilenciales heclicas vocat Galeus) primo quoque tempore in speciem quandam marasmi ægros coniecisse. 3. Si qui ægrotat Pulmonum vitio sit obnoxius: qui enim illi affecti sunt, rubore sæpe suffunduntur; qui Medicis minime advertentibus imponit maxime; quod in hac muliere apparuit: Accedit quod qui præpingues sunt, ac optime habiti, non ita facile collabuntur, aut si extenuentur, illius extenuationis magna non sese producat argumenta.*

[illegible]

partes eas calefacit, cum ad cœlum revocatur per modum inflammationis, eandem deferens, ex eventu refrigeret: In acutis itaque malum hoc, sed & in minoribus morbis longum fore morbum significat, nam & focus multiplicem significat, & materiam

*Comarosa erat, &c.* } Aderat comarosa affectio cum vigiliis, & cum dormiret, quamvis comarosa, facile tamen excitabatur, Coma autem aliud simplex est aliud Vigilans: hoc ab uno humore non fit, omnium iudicio sed à mixture humoris tenuis calidi, & crassi frigidi: Tamen apud *Galenum* in part. 1. Prorhth. Comatis vigiliis duplex est causa, una sanguinis copia, qui ratione copiz comatosam affectionem invehit, ratione autem tenuioris substantiz, quæ in illo est, vigiliz quoque accidunt. Altera cum bilis mixta est pituitæ, Utrum deterius? posterius. His autem signis deprehendes à sanguine esse, præterea quæ dominatum ejus denotant, nimirum si primis diebus celebrata ex ante sectione evase, aut usurpato alio remedio, & copiam sanguinis evacuare solito, & acrimoniam tenuioris ejus partis temperate consueto, non cesset coma vigilans, talis symptomatis causam itacue-re oportet billem pituitæ commistam, cujusmodi affectio fuit malieris nostræ.

Cum serafis humoribus qui meteoriformum inferre-  
batur] Cu venter non detumefcebat quamvis abundet  
alvus ferretur? An ista ventris elevatio conferebat  
in quovis morbo [aph. 35. 1.] partes quæ ad imum  
ventrem & umbilicum attinent, habere crassitudinem  
bonum sit, extenuati vero ac collabi malum. Col-  
lapsus ille malus, & ut signum, quoniam indicat ea  
extensio naturæ imbecillitatem, Et ut causa, quo-  
niam cum partes subjacent à succulento quadratoque  
aqualculo cum juventur, casu illo ac extenuatione  
deterius habeant ac propterea nec bona in ventricu-  
lo *juvare*, nec in hepate *ajuvare* fiat. Itaque ab  
æquali hypochondrio juvatur & codio & excremento-  
rum expulso, At in ista muliere an laudabile nequa-  
torum. Nam cum à natura habet, molle, æquale esse  
debet nec depressum, clarum, nec calidum, nec frigi-  
dum, nec durum, nec meteorum, nec cum botbo-  
rygmis, qui aut humectata alvo, aut urinae proflu-  
vio aut flatu cessant in febribus essentialibus (nam cum  
motu naturæ fit) non autem in symptomaticis, cum aut  
pulmo, aut fœcus, aut lien laborat (nam symptoma-  
tis rationem habet & inani conatu id fit) *Hippocr.* sen-  
tentia 4. aphor. At contigit in ista muliere ut alvus  
fluere tamen falsam speciem æqualitatis hypochondrio-  
rum referebat, & marmura obandiebantur, quæ non  
cessabant ulla excretionis ratione. Sic suspecta erat illa  
hypochondrii elatio nam inventa intestina plena fla-  
ta cum fetoris humoribus in spatiiis abdominis qui me-  
teoriformum inferrebat. Sic elatio, subductioque alvi  
non quicquam de meteorismo detrahebat: Ac primus  
*Hippocr.* in Coacis observavit meteorismum in mor-  
bis, alvo & suppreffa & subducta; utrumque malum  
Verba sunt, *Quibus Præcordia elevantur alvo suppres-  
sa, malum, maximum autem in morbis talibus languis, &  
grivus alvi humectatur, supple, quibus præcordia  
etiamnum elevantur, malum.* Elevatur enim tam à  
maligno, live sit status, live humor tenuis, setosus  
pituitis, Ideoque in illa Patetidis expectabamus: Ad  
tale expectandum invitabat alia *Hippocr.* sententia in  
Coacis, *Hypochondriærum à sensu cum Sopore anxio-  
so in caput delente, parotidem excitat.* Sed quia gra-  
vissimissima exercebantur, elato manente hypo-  
chondrio comate perferente, si patetidis conspiceret,  
malum ut signum, apparituram credebamur. Verum  
enim quod scribit *Hippocr.* *Ex hypochondrio, diu assi-  
sta, & alvo graveolenti, à bifissus circa aurem occi-  
dat.*

*Pulmones veluti putres* ] Unde coniecimus hanc à Polymone Lethargicam fuisse. Vide lib. 1. Tit. de Soporosis aëthibus in hist. Dom. le Boindre.

*Urinae fæcibus erant* ] Non satis laudabile sedimentum habebant, hoc non mitum cur interierit Nam *Galenus* c. 3. lib. 3. de Crisibus, ait observasse fœnamquam quendam interierisse qui judicaretur cum urinis coctis, Et hoc colligunt quidam neminem interire posse apparetibus signis coctionis in urina: aliter tamen res habet, eam *Galenus* non solum vult requiri coctionem sed & excretionem: tamen enim sit & cocta & secreta materia, tamen nisi excreto modo natura sit satis, interibit etiamnum æger *Ballenius*. Adde hic Polmones fuisse affectos, at ex *Galenus* præcepto, in morbis eorum ad spumam potius quam ad urinas attendendum esse.

*Cum sudore magno* ] Verum illud competi, Qui à levi sudore somni sunt expertes, & nullum ardore febriili consurgant, malum: Nam qui bene judicantur, suaviter dormiunt: Et quod levis sudor ioanem conatum naturæ significat, quom melius esset perasmo incumbere quam frustra excretionem moliri, quod in hac ægra maxime apparuit.

*Gravolentissima dejectiones, Involuntarie ab eis defendentes* ] Quæ excrebantur erant gravolentissima, propterea que non poterant non sollicitate facultatem expultricem intestinorum, & tamen non meminerat quiete matulam. Quod arguebat impotentiam iudicis, & rationis eversionem, involuntaria enim erat excretio. Hujus duas causas reddit *Galenus*. 1. Proth. A t cum mens ægotat, aut cum partes per quas excretio fit non sentiunt: adde cum humor per semordax non est, ita ut sponte feratur; quanquam vix fieri potest quin sentiantur si intestina valent: Textus Hippocr. est, *Si ex ventre tenuia ægro non sentiente exeant, si extra se non sit, malum, ut Hepatica*, i. e. Exercitio illa tennis materiz, non sentiente ægro facta, declarat vel non generari biliosum humorem ob imbecillitatem Hepatis: Vel si generetur, non excretur (quanquam hepatica excrementa maxima ex parte acta sunt) sic declarat propriam affectionem Hepatis: Non abs re autem adjectum est, *Si æger lapid se sit*, ne quis puterit istam involuntariam excretionem læsa ratione fieri, ita enim signum imbecilli Hepatis non ita esset manifestum, sed putretate denotaret affectum cerebrum. Item non declaratur ulla offensâ nervosi generis, propterea quod integra sunt intestina. Si ergo involuntaria sit illa excretio stante ratione, non læsis intestinis, signum est imbecilli omino Hepatis. *Ballenius* lib. 1. conf. xlv.

*Circa æquinoctium Autumnale* ] Autumnales morbi, & præsertim febres pessime sunt, Et levi de causa febriis reperit ob humorem aduionem & penitiorum vitæ putredinis: nam cum humores per æstatem adusti sint, imo & partes internæ quadamtenus siccate sint, & squalidæ factæ, maxima est in febrem aptitudo & proclivitas: nec facile morbi tales depelluntur, quia balneales sunt: Ac præclarum esset philosophari de humorum & morborum autumnalium proprietate, Nec enim inequalitas temporis bonum malorum auctor esse videtur, ut placet

veterbis, Est alia quedam abditior & secretior causa, An quod eo tempore serum dominatur, ut placet *Hippocrati*? An quod ubi est infirmitas, ibi est morborum proventus & contumacia, At autumnus peculiariter hominibus conciliat imbecillitatem, Nec vis elocet, & apparet ut aliis in temporibus: Quod declarant ipsæ arbores quæ folia relinquentes, omnes senescunt, Si id quercubus evenit, cur non hominibus quercubus imbecilliori? *Ballenius Ephemer. & Epid. 1. 2. p. 176.* Quod suspicio esse debeat venenata via in omnibus fere morbis autumnalibus, id pater maxime, Ægri facile emaciantur, liquecunt, cum tamen videantur sat belle habere, & nullum aut exiguum dolorem se sentire fateantur: Febres lente sunt, continue symptomatice, nam in diathesi consistunt & contumaci quadam obstruptione & vitio partium, declarant dolores qui paroxysmis & exacerbationibus redeuntibus sentiantur, &c. Nullus credat quæ sit fœnata symptomatum illos morbos comitantium, ut Medici circa ea debeant potius esse spectatores quam actores Idem ingeolium videntur habere quod & carcinomata, ac non minus si ægrotant credendo. *Ibid. in pag. 8.*

*Deliria &c. bene rationabatur* ] Qui fieri potuit ut male affecti cerebri tot essent argumenta, nempe coma quodammodo æpyoria, tremores nonnulli, deliria, excretiones involuntarie, obliuio & despectio omnium rerum, dissimilitudo morum omnium, &c. (quam naturalis præ se ferat malum esse ait *Hippocr.* in Coacis) Si inquam tot tantaque fuerint male affecti cerebri argumenta, qui fieri potuit ut tamen ratiocinatio integra fuerit?

Respondet *Galenus* l. 3. de sympt. causis cap. 3. Ex aduionibus quæ ab uno principio mauare certant, quodam magis una qualitate gaudent quam altera ut coctio, quia sine motu aliquo fit, in calido & humido consistit potius: attractio expulsiōque, quoniam cum motu aliquo impetque fiant, in sicco potius consistunt: *Ballenius* ait aliud esse lædi offendit cerebrum in eis functionibus quæ animales esse dicuntur, & ad ipsius ægeris pertinent, Aliud lædi in illis quæ adeam partem pertinent quæ mentis & consilii est: priori modo dicitur læsum in animalitate, posteriori in ratiocinio. *Vide Consilium supra citatum pag. 207.* Excell. *Willis* solutionem expartium cerebri distinctionem querit, Delirium excitatur, ait *partes 2. lib. de Anima rurs. c. 10* in quantum spiritus animales, aut oleis irritati, aut in confusionem acti, hac illuc intra globulosam cerebri compagem (ubi phantasia & memoria sedes habent) æmulus & tumultuosa moventur, Ejusdem partis aut regionis incolæ spiritus, somno primo occupari, & ante alios quovis orio indulgere incipiunt, qui phantasiæ & memoriæ actus creant, hi contempe à cerebri exterioris potis in quibus exspariant solent, decedentes, in penitiora ejus medullalia se recipiunt, ubi tanquam otiosi decumbentes, spiritus ibidem constitos in patem desidium allecant, aliosque inde in nervosum genus emanantes, & ab assuio revocant, ac ad otium sollicitant. Ob spiritus autem animales intra cerebri medullium, sive corpus callosum, irregulariter commotos, Animæ rationali conceptus incongrui & noemata confusa obijciuntur.]

## OBSERVATIO XLVII.

Febris assidua à Pulmonibus purulenta, duræ, cum vitio Cordis, Pericardii. 1. Ab Aneurysmate cæliaca arteria, obstruata à pituita concreta. 2. A massa pingui libera, in sinistri Cordis sinu, cum vomitibus pulmonis. 3. In mulieris peripneumonica vena cava reperta substantia carnea à corde exorta. 4. Febris assidua ab abscessu sub ala sinistra, & suppuratione septi transversæ. 5.

§. I. Quatuor annorum puella febre Continua extincta erat: hæc curiositati nostræ anatomizæ immolata post mortem, Pulmones exhibuit collis & sterno firmissime adherentes.

berentes, multis locis duos, multo pure fluentes, & utraque parte, quod rarius occurrit, pure repletos: Pericardium, panni lanei crassitie, nigricantem cordis circumdabat substantiam: Interim neque dyspnoea, neque tussicula ulla, neque phthiæseos specie laboraverat: reliquo enim corporis habitu bene constituta, carne solida & pingui erat. Ad do verò plurimos me in hacce nostra Hollandia secuisse, qui Pulmones altera parte habebant exulceratos: raros qui utraque, qui tussi aut dyspnoea laborabant non adeo multos. *Theod. Kerckringius Observ. Anat. 72.*

**P**ulmones costis adherentes) *Rislanus Anthropol. lib. 3. cap. 11. de Pulmonis ad costas adhesionem disputans.* Hæc colligatio, *agunt*, si ampla & arcta fuerit, ita ut pulmo costis immediate adhereret, molestam dyspnoeam, etiam in sanis hominibus, affert. Huic ex adverso occurrit *Massa*, & affirmat istam coherentiam Pulmonum cum Pleura cordi utilem esse, ne Pulmonum mole prematur, nec ullam spirandi difficultatem afferat. Conciliatio difficilis ni dicas cohesionem naturam dyspnoeam non inferre. Revera anno 1671. circa Christi natalitiam, cum dissecandum curarem quadragenarium ætatis, ex casu in dorsi mortuum, (de quo lib. 2. tit. de Respi. diffid.) Pulmones nudi in illo per breves fibras pleuræ annexas deprehendi, quem nulla unquam dyspnoea vexaverat. Eam autem quæ vi morbi prægressi aut comitis accidit, anhelitus difficultatem

paret, ut quibus pulmones tumentes sunt, ac parenti chyma crassum, vel vitium adeit simul in vasibus pneumatis, aut diaphragmate, &c. quorum læsiones illi Pulmonum coherere potius impediunt.

*Qui tussi aut dyspnoea laborant non adeo multos.* Nisi exempla occurrerent quorundam quos exulceratio Pulmonum male habuit, hætica febre non accedente, imo præsentem habuit corporis euforiam cum libertate actionum omnium vitalium & naturalium, vix fidem obtineret allatum exemplum. Verisimile est vitium in solis constitisse Pulmonibus, procul à corde; cætera hæmatum rectè processisse. Cum accedit Phthisis, notam moris massam sanguine, aut alia quadam diathesi vitiosa infici, ob quam alendo corpori ineptus fiat, simulque labem Pulmonibus iungat. Vide *Bennetii Theat. Tabidorum Exerc. xxii. & alias.*

§. 2. Anna Burgundia, 33. annum nata, sanguinea, potatrix meri nulli secunda, Ingluvici dedita, Febrem incurerat stipata n. siti, cibi fastidio, vigiliis, orthopnoea, corporis jactatione, aliisque symptomatis: Inter quæ non obscurum locum habebat Pulsatio vehemens supra ventriculum: quem pulsum ego arteriæ celiacæ multis animo meo versatis, conieceram, quibus elevandis malis nulla præsidia profuere: verum indices augefciente pulsatione, diurnos labores & extrema virium detrimenta jam passam mors occupavit.

Cadaver dissecando, comœrtum est Mesenterii membranam, quæ à peritonæo deducitur, multo circum cruore suffusam atque intentam, nihil interim mali mesaræ vasibus expectis: quoniam autem nobis opinio fuerat male patientis arteriæ celiacæ, ad hanc nos perlustrandam nostrum studium appulimus, eandem ab omni proximo corporum objectu expedientes. Exorti igitur ab inferioribus, postquam ad arterias emulgentes pervenimus, superata jam parte quæ magis arteriæ primos divaricans sentit, corpuscula offendimus tria ex pituita concreta (hujus est uber modus arteriæ longæque amplior quam venæ) vi caloris opinor sibi incumbentia, quæ obturabili cujusdam modo arteriæ ductui sic offarcta transversim erant, ut spiritui se transfundenti præcluderent viam: Continuo autem ad superiora facto transgressi, tandem celiacæ sese obrulit, ita dilatata ut compressum pugnum admitteret, quæ naturæ suæ modo vix annularis digiti crassitudine æquar, in quo sinu sanguis abunde stagnabat atque, grumosus, in putredinem abeuntis imaginem præ se ferens: à quo uno arteriæ sic depravata ita profecta interitus causam nemo est qui dubitet. *Ex observat. Nicolai Larchei Medici Rom. apud Severinum lib. de Abscessibus p. 11. 280.*

§. 3. Cum in Myrtilletistudio Medico vacarem, & inopinato quidam è Sereniss. Electoris Saptis, octiduo spatio à Febre quadam symptomatice jugalaretur, exenteratio demandata est Archiarro, & sequentia notata digna memoriæ infixi.

Abdomine secto, omnia salva & juxta loco posita invenimus: Ubi vero sternum à costis separatum, & pleura dissecta, statim animadvertere lieuit utrumque lobum Pulmonum valde flaccidum, dorso cum pleura firmiter adnatam. Lobis in superiore parte dissectis & manibus compressis, nihil erat conspicuum nisi spuma; sed circa medium alia sectione per transversum administrata, iterum lobis compressis, subito mullæ parvæ vomitæ, instar apicum digitorum eruperunt, quibus uterque lobus ad infimam usque partem, qua diaphragma appropinquat, testatissimus erat. Corde aperto, in sinistro ejus ventriculo, invenimus massam quandam fibrosam, pinguedinem referentem, nulla parte adnatam, sed liberam ovi columbini magnitudine.

**M**assam quandam, &c.) Hujus materiei faciem mentionem *Clar. D. D. Westerm. Dissert. de Apoplexia p. 114.* Sed nullus dubio quin eandem materiam in arteriis invenissemus si modo inquisitio debita facta fuisset: Interim hoc mixtum dignum, Nobilem illum

nonquam de ulla pectoris angustia conquestum, sive tussi, sed exercitio queisti & choream n. quotidie vacabat, cum tamen pulmonum minima saltem pars in superiore parte sana esset. *D. Goshof, Christianus Wittenstern in Miscell. cur. anni 1671. Observ. 135.*

§. 4. Vidi ego in dextro cordis ventriculo mulieris, quam Peripneumonia suffulerat, radicem enatam, carnosam, albidam, flaccidam, quæ prodians ex corde, & cavam venam

subiens, propagabatur usque ad caput & os factum: Eadem carnea substantia ex sinistro vetriculo prodibat: Quod in quatuor cadaveribus Peripneumoniacis subinde observavimus. *Observatio Neretii Medici Florentini.*

§. 5. Virgo dolbat sub ala sinistra cum tussi, Febre assidua. Inventum septum transversum in interiori parte suppuratum, cum abscessu sub ala sinistra. *Lib. 2. sit. de Lateris dolore.*

## OBSERVATIO XLVIII.

*Febris Continua à Jecore inflammato, & corde hinc marcido. 1. Ab Abscessu in concava Jecoris parte. Spigelii obitus. 2. Ab inflammatione extremi lobi Jecoris dextri, cum Mesenterii parte collo ligata. 3. Ab insigni Jecoris tumore. 4. A vitio Jecoris, cum lapillis in cysti. 5. Ab Hepatis tumore cancroso. 6. Ab inflammatione Lienis, Hepati communicata. 7. A Lienis inflammato Fernelii obitus. 8. A phlegmone Hepatis partim suppurato, partim in scirrhum desinente. 9. A Tuberculis & furunculis id obsidentibus. 10.*

§. 1. **A**Nno 1596. Virum quinquagenarium disaevi: hic inflammatione Jecoris laborabat, quod visui torrido ac adusto conspiciebatur colore: perusta aurem ejus membrana, parenchyma universum in purillaginem abierat, maximamque puris copiam effundebat, porissimum ea sui parte gibba quæ diaphragmati adhaeret. Adfuerat Continua febris, quæ cordis succulentiam nativam ita consumpserat ut pyri in modum contractum conspiceretur, stacidum plane, haud aliter ac si pulmonem tetigisses: Huic pulmo variis locis costis adnatus conspiciebatur. *Pet. Parvum observat. 19.*

§. 2. Expendenti mihi aphoristicam Div. Hipp. sentent. quod se. *Ex bubone febres omnes mala præter diarias.* Cum inviserem præcl. Virum Adrianum Spigelium, Celeberr. Anatomicum, & vivis sublatum, cum bubone sub axilla sinistra anno 1625. annor. 47. non levis mihi scrupulus occurrit, nunquid ex bubonibus fiant solæ Ephemeræ, vel putridæ etiam: Ex Hipp. enim sententia in aph. proposita: expressa luce clarius statui videtur, ex Bubone febres putridas quin etiam fieri posse: Non enim dixisset, *Ex Bubone febres omnes mala præter Ephemeræ*, si ex bubone fierent solæ febres ephemeræ: Cui subscribentes omnes fere Medicinæ scriptores asserunt, fieri posse ex Bubonibus, non solum febres Ephemeræ, sed etiam putridas. Atque de putridis id palam fit ex præsentis Spigelii morbo, à quo extinctus est, quem ferè contrinué observavi 63. dierum spatio quibus decubuit. Hic etenim Vir Præclar. ex indicis digiti punctura, dolorem & tumorem insignem in sinistro brachio passus est, cui successit abscessus seu bubo sub axilla, cum dolore adeo gravi, ut non solum, brachium, sed & rotum corpus immobile factum sit, cum Febre acuta sine annotationibus manifestis, inappetentia, vigiliis & gravi virium languore: vigesima sponte erupit abscessus & multam saniei copiam rriduo effudit, suberuentam, fortidam, liquidam, à qua remisit dolor, adeo ut in latus affectum decumbere potuerit, quod antea fieri non poterat: Perstitit tamen Febris vehementia, cum tensione & dolore dextri hypochondri ad claviculam usque: cui successit diarrhoea, primo biliosa, mox & saniosa, non dissimilis materiz ex abscessu emanantis, quod ansam præbuit dubitandi nunquid esset dysenteria vel abscessus Jecoris: cum vero nulla præcessissent tormina, non ramenta, aut intestinorum erosiones, in Jecoris abscessum conspirant sententiz, cum præsertim præteritis annis abscessus ventriculi per vomitum expurgatus fuerit: Interim plurima interna & externa fuere præscripta, cum durante febricula, eum dejectione materiz saniosæ 63. die extinctus est.

Dilecto cadavere, occurrit abscessus in concava Jecoris, juxta prognosticum. *Ben. Silvaticus cent. iii. consil. 18.*

**E**X his patet putridas quin etiam febres ex Bubonibus fieri posse, quod præteritis annis à me fuit observatum in Nob. matrona, undecima extincta febre petittentiali, cum bubone in inguine dextro suppurato & aperto: Quod si Galea, consulamus, i. de differ. febr. ubi de Ephem. ex bubone, adstruit expressissimis verbis solas Ephemeræ ex Bubonibus fieri: Quæ ex Bubonibus, *agunt*, febres fiant, calefaciunt semper partes continuas, donec ad cor usque calor febrilis propagatur, Non pervenit autem ad ipsum putrida fuligo, sed ibi permanet, loco bubonis circumscripta, sola alteratione per continuum facta, usque ad cor perveniente calore, eo prope modo quo in his qui Solis calore deamur: E quibus verbis competissimum redditur ex bubonibus putridas fuligines ad cor non elevari: quæ ideo neque febrem putridam fieri: Pro solutione contradictionis qua dissentire videtur Hipp. à

Galea, statuendum Bubones factos à causa occulta non inferre putridas, sed significare noxam viscerum principum, ac propterea malas esse ratione signi non ratione causæ: Non enim excitant febrem putridam, quoniam purescdo illa cor non subit per vapores putridos: ideoque ubi legitur in aphor. *Ex bubone febris*, legendum, *ex bubone febre, omnes mala præter ephemeræ*: Illæ enim omnes possunt esse cum bubone, & non ex bubone: dein probatur, Putridus vapor in cor exhalans, & ab eo remota parte ignobili, non inducit febres malas: sed e mundicia sunt partes ignobiles & inguinum partes distant à corde, Ergo ex se non possunt facere febres malas, sed solum eas significant, putridis etiam fuliginibus ad illud pertingentibus, ex Hippa. 6. Epid. 10. quod *Abscessus vnius glandularum signum quod deinde sunt germina habentium, cum aliorum tum præcipue viscerum, vultu autem sunt.* Ubi intelligit per germina habentium, affec-

affectionem eorum partium cum quibus habent rectitudinem. Atque ideo si bubones appareant recto auro, significant affectionem cerebri. Si sub axillis, cædis, si in inguinibus, hepatis: Subjungit tamen, *et non aliterum*, quia non semper servatur hæc rectitudo, ut in casu nostro, in quo jecur erat affectum, & nihilominus bubones fuit sub axilla sinistra, non servata rectitudine & convenientia: neque ratione situs, quia fuisset in parte dextra: neque ratione loci, quia fuisset in inguine, & non sub axilla sinistra: Cujus tamen dii rectitatis causa provenit à punctura digiti valde dolentis. Semper enim natura adfuit, medio sanguine & spiritu, in sub-

stium partis dolentis, ideo confluit ad brachium finistram hæcque materia in glandula, & non ad manum & digitum decubuit, duplicem ob causam, vasorum sc. copiam in glandulas diffusorum, per quæ fluit materia. 2. Ob laxitatem dictarum partium, cujus ratione expulsa materia quæ confluit, inde repellere non potuit.

*Ex indicio puncturae* Non fecus atque in nobis viscere aliqua male affecto aliud eodem modo afficitur: ac digiti etiam morbus in Inguen decumbit, tamen quæ intersecta sunt multa nihil mali sentiant: Sicut enim unius animalis partes, inestque in his porus quam aliis quædam ad se invicem affectio. *Synopsis lib. de Infammis.*

Anno 1677. 18. Julii dissectum est Genevæ cadaver Juvenis Francofurtensis anno 20. nati, qui subita morte abreptus est: boni erat habitus & robustus, à vino abstinentes apud hospitem, solam ingerens aquam: Inter sodales mero indulgens: Dicto anno à vere ad finem æstatis Epidemice fuerunt febres Tertianæ simplices & duplices, paucissimis, imo nemini, quod sciam lethales: Febre autem prehensus hic quoque Juvenis continua, sed non ardenre, accedente primis diebus diarrhoea copiosissima, biliosa; cum quadam cataphora, & carnis rerumque omnium fastidio: Toro morbi decursus; qui trium septimanarum, frivolidus admodum fuit, peissimam officialem tamen fastidians, frigidam anxie exposcens: Pridie ante fatalem diem gravis leipochymia, comire rotius convulsione prehendit: Postridie frigidam perens, his vocibus Gallicis, *Je boirois bien de l'eau du Rhosne*. Ego libenter aquam Rhodani biberem, dum vocem ultimam profert, intercepta ultima syllaba, & in faucibus hærente, exanimis coneidit.

Postridie cadaveris anatome instituta: In medio ventre nullum insignie virium deprehensum est, forte quia à minus accurata manu sectio peracta est, Cor intus & extra sanum apparuit, Pulmones dextra parte costis, annexi, coloris erant variegati, In imo ventre sær notabilis aquæ cruentæ copia reperta est 2. Jecur immensæ magnitudinis & crassioris, (qua de causa vorax erat juvenis) ima parte livens & niger, prægressus inflammationis notas gerens 3. Cystis fellea omnino exhausta 4. Intestina & ventriculus immensæ amplitudinis, flatu admodum turgida: 5. Mesenterium ad os, circa lumbos manifeste livens & rubens, cum annexa coli parte: 6. Ren dexter insignis magnitudinis, sed integer. 7. Lien formæ rotundæ sed citra aliud vitium: Fœtor insignis ex eo ventre nares feriebat: Ex his causa morbi non subitæ mortis apparuit, nisi ad tetrum halitum cor ferientem & cerebrum, syncopen & convulsione inducentem. Mirum vero Lumborum abfuisse dolorem aut æstum.

§. 4. Illust. N. Febre continua prehensus: Jecur immani tumore extabuerat, vitium in superficie, interius durum *Lib. 3. tit. de Diarrhoea.*

§. 5. Socrus N. colico dolori obnoxia in Febrem assiduam incidit: Cystis fellis lapillis erat plena: Hepar albicans. *Lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 6. Vidua N. per multos menses decubuit Assidua febre affecta: præterea percipiebatur tumor in abdomine versus umbilicum, ad dextram partem inclinans, isque durus, qui non erat dolorificus nisi cum premeretur, Aliquando dolores acres humerum dextrum occupabant, & latus ipsum ut pleuritidem mentirentur: Aperto cadavere inventum est Hepar tumorebus scirrhis, & magna ex parte suppuratū refectum: in cujus extremo adnati erant duo tumores cancrofi, usque ad umbilicum prominētes; qui in Hepate esse non putabantur; quia non erant in loco hepatis naturali. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

**D**olores acres occupabant humerum dextrum] Unam animadvertere oportet quod ad therapiam & diagnosis imprimis facit: Omnes Jecatorias, i. e. quibus grandius Jecur, amplius, tumentius & calidius, cum febribus magnisprehenduntur, maxima ex parte tempore urgentis febris dolores in claviculis & secundum omoplatas sentite satis vehementes: In pleuritide quidem, cum uno loco inflammatio aut phlegmone consistat, tamen in parte longe remota, ob communicationem & continuitatem membranarum, dolor intolerabilis sæpe sentitur, qui majores sæpe molestias exhibet quam ipsa pleuritis: Ex signa diagnostica pleuritidis, aut superiores aut inferiores partes occupantis *Hipp.* 1. Acut. desinit ex dolore aut claviculis aut infra regionem occupante: Hepate accenso aut inflato, aut per insignem febrem æstuantem admodum, dolor potest ad jugulum pervenire: Reperito enim bifariam dolorem tensum ratione ipsius

jecoris surgere, Aut enim Hepar nathis costis alligatur, & tunc dolor ad clavicula percipitur ratione distantie membranarum: Quibus non alligatur, à vasorum ipsorum potius quam membranarum distensione dolor surgit, Et, ut *Galenus*, de loc. propriis venæ arteriæque dicit veluti in longitudinem extense chordæ speciem tenet: Quod notandum, ut cum hos dolores in febribus aut inflammationibus Hepatis ortos videris, frustra de catarrho communicatis: probabile enim est dolores pro partium affectionum litu esse aut *dispositos aut* *dispositos* *Balloonum consp.* 77. lib. 1.

*Neque in Hepate esse putabatur &c.*] Notat Cl. *Glyson* Anat. Hepat. cap. 1. non eundem esse in vivis & mortuis Hepatis situm, cum alius positum in his reperitur: Nempè raro fundis ventriculus, & hepat & diaphragma latus, quantum eorum connexiones sunt, propelluntur; partim ut hoc passio pectoris inane impleatur; quod alias, recedente à pulmonibus



nibus spiritu, contingeret, partem etiam quod muscu-  
lis abdominis post obitum frigescente, simul rigidio-  
res magisque teni evadant, unde fit ut viscera inferio-  
ra vehementiore nisu sursum agantur quam ut dia-  
phragma ei motui resistendo sit, partemque istas supe-  
riora versus impellant.

*Hepar tumorebus scirrhis & magna ex parte sup-  
puratis, &c.* Hepar Tumorebus & frigidis & calidis  
obnoxium est; imo hi aliquando ab improprio reme-  
diorum usu, in illos desinunt: Calidi tumores, inflam-  
mationes dicuntur, oriuntur ab assiduâ facta humorum  
calidiorum affluxu, accedente aliquâ partis obstru-  
ctione: In abscessum facile illi abeunt, plerumque  
lethalem, quare Medico curæ sit ne eo affectus vergat:  
Nec minus cauto opus est ne duri & scirrhi tandem  
evadant: Nihil refrigerantium usu dum suppurationem  
arceat fatigamus: Frigidi autem Hepatis tumores, vel  
ejus parenchyma obdunt, vel vasa, vel tunicas, horum  
unum vel duo, vel plura, Qui totum simul parenchyma  
occupant, ædematosi fere sunt, quorum soboles est

aut hydrops aut cachexia: sicut horum quandoque cau-  
sa sunt: Hoc in affectu totum viscus spongiz ad instar  
æqualiter totum intumescit, humores serios undique  
que absorbens; à quibus vasa & tunice flaccescunt ha-  
meantur, crassiemque non naturalem adipiscuntur:  
Hinc interdum in immensum molem excrescit, soli-  
tumque pondus duplo aut triplo superat, Tumores He-  
patis peculiari triplicem habent originem, impedio-  
nempe sanguinis in finibus vasorum Capillarium Poræ  
transita, inultima venæ cavæ capillamenta per ipsas  
Hepatis substantiam: vel ob stagnantem humorem bi-  
liolum, quia is è Poræ finibus in portâ biliariâ obacu-  
minus expedit pertranscat; vel ob utriusque hujus  
transitus commune aliquod impedimentum: A primo  
illorum tumorum imminet atrophia aut saltem dimi-  
nuta nutritio: A secundo, Icterus flavus vel niger, con-  
spicuo sanguine, unde variz egrotudines: Tertius utri-  
que malum invehere aptus est: Sunt præter hos alii qui-  
dam tumores, ad hepatis parenchyma potius referendî,  
videlicet struma, steatoma, atheroma, melicicis.

§. 7. Vir Illustr. Dominus Thomas Trenchard, ætatis consistentis, temperamenti mo-  
lancholici, habitus gracilis & rari, spleneticus, hæreditario quodam jure à parentibus de-  
rivato, acutissimis ventris doloribus, colicæ æmulis, crebro molestatus; Hic Nobil. affi-  
nem in Comitatu Hamptonensi invisorus, eo loci profectus incidit in *febrim continuam*,  
satis acutam, cum vigiliis, & sinistri hypochondrii dolore, ad humerum usque tendente,  
in quo acerbos admodum dolores passus est, ut de nullis aliis esset querulus: Adhibito in  
consilium Medico, Venæ sectio instituta basilicæ dextræ, n-glestâ rectitudine, quam ob-  
servare solent Practici, præmissa tamen pro more clystere: Tulapia quoque & alia exhibita;  
quibus nihil proficientibus, sed malo in pejus ruente me quoque Dorchesstria accersiri curat:  
Consensu equo, quinque milliaria progressus, ab alio servo in via obviam facto, iter  
differte jussus, quod Herus melius haberet, Domum revertor, hyeme validissima solli-  
tio proxima, nive omnibus candescens: Quid sit elapso solum die iterum vocat quod  
esset ei ordinarius, sed antequam ad eum pervenire poteram, morbo superatus naturæ sa-  
tisfecit.

Dissecto à morte corpore, Omentum in se circumvolutum, & umbilicum versus ad for-  
mam orbiculi conglobatum invenimus: Lienem vero totum putrefactum, & parte interna  
penè absumptum, mala adeo materia; picis instar liquida, nigra, foetente, ut minime essemus  
ferendo; Hepar etiam, sima sui parte, in consortium malignitatis raptum erat, ubi putredine  
corripi incipiebat; Reliqua salva conspiciebantur. *Fridericus Lofsius, Observ. 45. l. 1.*

*Omentum in se circumvolutum, &c.* Proculdubio  
in hoc subiecto Omentum viciosus à liene hu-  
mores in se suscepit, cum iis tantum partibus adhe-  
rescat ad quas rami splenicæ fuculi perveniunt, unde

toties acutissimos dolores colicæ æmulos, perpassus est  
in sinistro hypochondrio, & præsertim in cavitate illa  
omenti, sub diaphragmate ex venenâ, Omenti, coli  
& viscerum contextu nata, & vix exitum habente.

§. 8. *Ioh. Fernellius* uxoris morte ita repente perculsus ac prostratus est, ut ante xij. ab ejus  
funere diem, ex summo animi moerore ac angustia in febrem inciderit Continuum: Ad septi-  
mum hujus morbi diem cum urinz inclarescerent, & febris symptomata omnia multò le-  
viora facta essent, qui illi opem ferebant Medici felicem exitum unâ cum ægro expectabant:  
Verum ad xi. mirum in modum exasperata sunt omnia, ideoque æger urinarum cruditate,  
arque aliorum symptomatum fevicia permotus, ac mortis metu perculsus Doctissimos Regis  
& urbis Medicos aliquot in consilium adhibuit. Hic febre Quartana aliquando confictus  
fuerat, & toto vitæ curriculo non solum vino oligophoro aqua abunde diluto usus est, sed  
etiam extra passus æstare, frigidæ potu sitim explere solitus erat, unde Lien non parvum læs-  
videbatur: Inde enim acoris consudans sensus ori ac faucibus integrum jam biennium inerat  
qui nullis remediis discuti potuerat: Quam ergo causæ quædam externæ, hæcque graves adme-  
ndum, acerbissimum moerorem attulissent, superveniente uxoris obitu, quo omnia exaspera-  
ta sunt, humor in Liene collectus tandem incallescens arque putrescens, inflammationem ejus  
visceris peperit, unde & febris accensa est continua, quæ sensim increscens, ita naturæ vires  
omnes attrivit, ut eam xvij. die nobis mors immatura eripuerit, anno ætatis lxxij. Christi 1557.

Causam inieritis ex anatome pervestigantes, è lienis inflammatione perniciem mansisse  
judicavimus; quum & valde tumidum & prorsus lividum ac virescens id viscus esset, & scal-  
pello dissectum magnam sanici instar picis nigerrimæ copiam profunderit. *Gul. Plantius in ejus  
vita.*

**A** *Crisis in febribus sensus, &c.* Ob succum Pancreaticum acidiorum redditorum, juxta *Franc. Sympium* *Clas. Walle* quartanæ originem non humori melancholico adscribitur, sed sanguinis liquori, à natura dulci, spiritulosa & balsamica, in acidam & nonnihil autem, instar vini acedens, degenerante; ob spirituum

penuriam, atque sanguinis partem terrestrem seu tartaream (quæ constat imprimis sale & terra) nimiam exalationem, adeo in finem effecta aciem sanguinis massæ inducit; Vide plura apud eundem lib. de Febribus. cap. 4.

§. 9. Amplissimus Præses M. *Bowetus* extinctus à Quartana continua, eaque conjuncta cum phlegmone Hepatis, ex parte suppurata, & ex parte in scirrhum degenerante: Cujus phlegmones Hepatis initium Quartanam præcesserant vel annum integrum ante. *Car. Piso de morbis à sero scilicet. l. p. m. 40.*

§. 10. Sæpe Iecur animadvertimus Tuberculis & Abscessibus instar furunculorum obsideri, nullo hypochondrii dolore, nullo tumore, nullo decubitu, difficili: *Febris* solum inerat non admodum ardens, cum siti, cum cibi fastidio, cumque alvi profluvio interdum in mense multos perseverante: ut ideo difficile malum, quemadmodum & substantiæ corruptelæ, ab intemperie calida, aut ab obstructione Internosceretur. *Fernelius Pathol. lib. 6. cap. 6.*

## OBSERVATIO XLIX.

*Febris Continua à corruptione gangranosa in parte Renis interna. 1. Ob Apostema in fine ureteris. 2. Ab Abscessu in sinistro Renis parte exteriori. 3. Ab inflammatione Testiculorum & meatus urinarii. 4.*

§. 1. **I**uvenis post diuturnam gonorrhæam, cibi potionisque immoderationem febre Afflicta afflictaur, quæ horis vespertinis magis augetur & amplificatur cum lotiis crassioribus & pituitosioribus. die diarrhœa varia subsequuta est, quæ usque ad xix. permanens, vires maxime deiecit, unde siccatas linguæ, faciei rubor, inquietudo & totius macrorum successit, xx. lotia uberiora prodeunt & turbulenta, quæ tamen clarescunt: Quamvis varia adhibita sint, semper adaucta est febris & symptomata succreverunt, adeo ut xxx. accesserit rigor, cui successit febris vehementissima cum rubore genarum & pulsuum maxima frequentia & celeritate, quare die xxxiv. in plenilunio interit.

Secundo cadavere inventa est corruptio gangranosa in parte interna Renis dextri, ut lotia turbata gradum coctionis, quemadmodum erat opinio alterius Medici, non significarent, sed ex mea sententia alterius Renis corruptionem: Adeo ut et si *Galenus* non comminiscatur nisi de lotiis turbidis quæ ex gradu coctionis suboriuntur, Medicus, si sit Philosophus, debeat etiam alias causas indagare. *Lalius à Fonte Consult. 133.*

§. 2. *Matrona nephritica*, febre continua laboravit, quæ ad marasimum lethalem ipsam deduxit, genita quo tempore pus conficiebatur in apostemate, quod calculus à rene in ureteris finem delatus, excitaverat. *Vide lib. 3. tit. de Hypogastrii doloribus.*

§. 3. *Illustr. Abbas* à 14. diebus, temperaturæ sanguineæ, post cibi potionisque immoderationem, duobus affectibus potissimum detinetur, scilicet distillatione à capite in subdilas partes, Alter est Febris assidua sine certo ordine tenens, post cibum & horis vespertinis more duarum tertianarum incremens, in quibus ita se habet ut se vix morbum persentire asseveret, cum dormiat plus consueto, nulla caloris mordacitas persentiarur, urinæ tamen copiosæ prodeunt albo sedimento refertæ, hæque multo uberiores quam ingestis respondeant optime se habet ad ea quæ offeruntur: horis vespertinis facies rubicundior inspicitur, præsertim circa genas, nares & aures, quam aliis temporibus: adest tussis sicca, assidua; pulsus humiliores & frequentiores percipiuntur: ea quæ excernuntur sunt similia sanorum: In regione Renum non mediocrem fervorem experitur, neque sine adminiculo incedere potest: xx. die facta minoratione ex flore cassiæ, præter excrementa fecalia multus sanguis corruptus fortens fuit excretus, tandem die 40. interit.

Secundo cadavere inventa est corruptio & abscessus in sinistro Renis exteriori carne, me ita prædicante antequam cadaver feceretur. *Lalius à Fonte Consult. 68.*

**A**lter ex Medicis in principio pronuntiavit ægrum ex duplici Tentiana assidua laborare, ac progressu temporis reddidit esse malignam decrevit: verum talis opinio sine examine non est prætercunda, Nam febris Tentiana spuria cum sit morbus calidus rotinus, ex bile prædominante, eaque in venis putrente proveniens, indicatur ex pulsu maximo, frequenti & celerissimo, non ita tamen ac si sola bilis febrē incenderet: excrementis biliosis, cum dejectionibus, cum urinis: ex calore acris, mordaci, si, ex causis præcedentibus, quæ bilem angere poterant: ex febre quæ ordinate augescit ac etiam in-

clinat: Talia autem in proposito casu non inveniantur neque oris amarus & inappetentia, quæ sunt biliosæ propriæ: præterea ex hac positione symptomata in historia propolita in suas non possunt referri: Nam quod ad causas externas spectat præcesserunt quæ sanguinē cumulate potuerunt: Febris vix ab ægroto persentitur, quod in biliosis febribus accidere non consuevit, ob vapores acres qui ad superficiem transmissi, dolorem lassitudinalem efficiunt: Deinceps in febribus biliosis conjunguntur vigilie, non somnus plus consueto diuturnus, ut in præsentī casu: Calor percipitur acris, in

in hoc tempore fere nullas; locia sunt subruia, neque ita copiosa & alba, ut videre est in hoc tempore, ut nberime reddantur: Neque in febre biliosa xgri bene se habent ad ea quae offeruntur, ut in viro Illustr. contingit: Deinceps febres biliosae habent ordinatum auctioris & remissionis ordinem, qui non observatur in praesentia, quamvis semper post cibum & horis nocturnis magis increseat, nam assidue sine certo ordine increscit, & minuitur: Neque in biliosa febre facies inflammata horis vespertinis rubicundior circa genas & nasum, & tussis assidua sicca percipitur, & Excreta sanorum similia, aut difficultas incedendi, aut standi sine adminiculo reperiantur, quae omnia in praesenti casu sunt manifestiora quam ulteriori demonstratione egeant. Reliquum est propositam Febrem in alias & veriores causas referamus, in sanguinis scilicet ad Renis sinistri carnem defluxionem, inflammationem & corruptionem efficientis: Quae mirum si dolorem non persentit in renis regione, cum viscera non sentiant, sed sensus solum in pellicula cooperiente reperiantur, quae aliquando renum fervore aut inflammatione praecedente absuntur: quemadmodum fortasse Viro Illustr. contigit, qui alias dolore vehementi in dorso costis nobis altiore, usque ad lienem se extendente, fuit correptus, cui mingendi difficultas

conjugebatur, & febris assidua, qui Colicus fuit indicatus, cum fortasse renis sinistri inflammatio fuerit: Quod per aliud tempus accidit in casu Illustr. Praet. Episcopo Aquini, in quorum altero in Rene abscessus, In altero vero corruptio fuit inventa: Quae tamen de rebus renum nunquam fuerit conguessi: Quare non erit difficile symptomata proposita in suas causas reducere: Quare faeces sanorum similes egeruntur? quia partes naturales non laborant calor autem & rubor in genis & naso ex vaporibus sit à loco affecto ad caput exhalantibus, & similiter somnus confusus diuturnior: Tussis autem sicca conjungitur, quia Renes spiritalibus consentiant: Loria admodum copiosa redduntur, laesa facultate renum retentrice & eorum calore nimio serosam sanguinis humiditatem attrahente: Pulsus parvi & angusti sunt ex calore ad locum affectum contractione, cum in ea parte aut inflammatio vel magis corruptio reperitur: Quod vero febris sine certo ordine increseat & minuat, manifeste autem post cibum increseat, & horis nocturnis, hoc est internarum inflammationum aut corruptionum signum evidencissimum: Persentiat maximus renum fervor, neque facile sine adminiculo Paciens stare aut incedere potest, quia Renes morbo calido afficiuntur, & eorum consensu etiam instrumenta motui destinata laeduntur.

§. 4. Sacerdori topus in meatu urinario obortus est urinam suppressim: Tonsor cathetrem imposuit, hinc dolor, inflammatio, Febris Continua, &c. In mortuo topus repertus est, ac ex violenta perussione catheteris ingens inflammatio testiculorum. Vide lib. 3. tit. de febribus

## OBSERVATIO I.

In quodam à febre duplici Tertia Continua extincto, vermium in ventriculo & intestinis quantitas ingens deprehensa.

**F**ebre duplici in Tertia Continua correptum mortuum secuti, in quo quanta esset vermium copia dictu incredibile est; ipsi enim in ventriculo & intestinis conglomerati atque conservari per oesophagum ad os usque ascenderant, absque eo quod alexiteriis remediis copiose xgro administratis enecati fuissent, Vermes porro ex materia heterogenea genitos, aliquos albos, aliquos rubros & alios nigricantes aspeximus. Dom. Panarolus Penec. 1. Observ. xli.

## OBSERVATIO LI.

Febris continua à Mesenterio pure referta, 1. Ab ejusdem abscessu. 2. Ab ejus tumore & abscessu. 3. Ab ejus & coli inflammatione in abscessum desinente. 4.

§. I. **V**irgo in dolores colicis similes incidit, contra quos cum nullum remedium genus valeret, misella febre quotidie cum rigore insigni repente, doloribus jam dictis associata post paucos menses marasmo consumpta est.

Dissecto ventre, ingens copia puris, quo tum mesenterium refertum, ac quasi turgidum erat erupit. Ex observatione Th. Merhammi Archiatri Bavarici.

**C**um nullum remedium genus valeret Ignoro scilicet morbo: Diagnosin autem abscessum mesenterij, ut Riverius praet. lib. 13. cap. 3. interduum facillime est, interdum difficillima: Si ab inflammatione ejus partis fiat, ea ante percepta & diutius perseverante indicium est inflammationem descendi non potuisse, sed fuisse suppuratam atque in abscessum conversam: At verò, quando abscessus ab humoribus pravis, in mesenterio diu commorantibus, ac tandem putrescentibus exoritur, difficillima est illius diagnosi; ita ut plurimi auctores, qui talium abscessuum observationes scripserunt, eos non nisi post mortem & dissecta cadavera innotuisse referant: Licet enim ut plurimum tactu dignosci valeant, aliquando tamen tam alte sepulti sunt, ut neque tactu ipso deprehendi possint, & partis sensus adeo est obtusus ut nullo dolore interdum sese prodant: Quomodo autem haec (quae variis modis contingunt) distinguenda sint, vide loco citato.

Febre quotidie cum rigore insigni repente] Spigelius lib. 1. de Semitertiana febrem hanc, cerebri horribilibus insigne, plerumque ab intestinorum & mesenterij inflammatione oriri observavit. Jacovius comm. ad aph. 9. lib. 3. sect. 2. Coac. Hipp. meminit puellae quae in levem quandam febrem incidit tertiana intermittenti haud dissimilem, sine dolore in ventre, in cuius corpore dissecto magna puris quantitas circa uterum inventa est, cum intestinorum colore subnigro: Idem comm. aph. 76. lib. 5. f. 2. observavit in febre Tertiana cum rigore non ita ordinata exoriri suppurationem in imo ventre, cuius nulum signum memorari dignum praecesserat, unde subito effuso pure supra intestina, aut intestinis ipsis ad pyloricum perductis improvisa mors sequuta est.

Febre associata] Absque febre genitum mesenterij abscessum memorat Rhodius centur. 2. observ. 99. in quodam Chirurgo Patavino, qui initio saniosa deinde

deinde biliosa & pituitosa cum dolore & debilitate virtutum reddidit: faeces, præter eas quæ clysteribus evocantur, nihil parvis habebant: Præterius credidit mesenterij abscissum adesse; Nec absonum eo

rupto, loco nempe interiore, nullam persensisse febrem, à qua, ut & torminibus plane immunis esset. Recte divinasse docuit eventus, quum paulo post is mundo excessisset.

§. 2. Illustr. N. Febre valida correptus cum vomitu, 14. transacta, in alvi eruentiam dejectionem devenit, ita ut sanguinem nigerrimum, corruptum, pessime olentem, ad 15. libras pondus excreverit, unde animi deliquio correptus, omnes cum proxime morituum credidimus: nihilominus cibis per intervalla optimis refectus, vires resumpsit, ita ut, etsi Febri Continua, licet non ita intensa & uniformi continuo vexaretur, nihilominus salutis spem præberet: sed tamen cum quotidie faeces conspersas sanguinolenta saniofaque materia excreberet, in diesque magis, ac magis emaciaretur, infinitis prope remediis adhibitis, 63. à decubitus die occubuit, cum tamen postremis diebus ingens urina profusivum supervenisset, ita ut quinque libras & amplius quotidie per plures dies emitteret.

Cadaver dissectum fuit, atque in mesenterio ea in parte superiori, qua intestino recto collectum abscissum coniecimus, illoque disrupto, putridum sanguinem ea in copia profusisse non dubitavimus: Sed quod mirum est, nunquam per totum ægritudinis tractum, præterquam extrema die, qua illi venter intumuit, de illius partis dolore conquestus est: *Marc. Donatus histor. mir. lib. 4. cap. 7.*

Nunquam de illius partis dolore conquestus est) *Fernelius* mesenterium sine dolore inflammari solumque gravitatis habere sensum docuit: At *Riolanus* exquisito prædium observavit: Admodum sensibile esse arguit dolor Colicus notus, & origo ejus à peritonæo cujus dolor acer: Multitudo nervulorum, à plexu mesenterij maximo oriundorum, oculis obvia, dubitare non sinit de ejus sensu: facti eorum exiguitas ut hic ipse multiplicior sit quam existeret, nisi cum plurimi simul dolent: *Clar. Willis* in Nervorum descriptione cap. 27. existimat acerrimos cruciatus qui in colico dolore nobis excitari solent, non à materia excrementitia intestinorum cavitatibus inclusa, neque semper ab humore acriorum tunica impacto; ac sæpius à succo nervoso acrimonia quadam imbuto, atque intra hunc plexum stagnante provenire. *Marc. Donatus* ait mesenterium esse partem instrumentalem ex similibus constructam, venis, scilicet arteriis, membranis, glandulis & adipe: quæ omnes partes (membranis dumtaxat exceptis) sensu carent: quæ etiam membrana cum platana pinguedine circumveitiantur, rationi haud diffonum est nullo, vel saltem hebeti sensu donari, & per consequens dolore nullo effatu digno mesenterium ipsum: Objici-

tur historia à *Benivenio* allata cap. 33. de quodam *Juliano*, alvi torminibus diu vexato, in cujus mesenterio abscissus repertus; Difficultati satisfacit, dicens, dolorem illum non in mesenterio, sed intestinis per consensum excitatum, ea potissimum in parte, cui mesenterij pars abscisso laboransungebatur, qui quidem cum multa materia repletus existeret, suo pondere intestina comprimendo, vel deorsum trahendo dolorem in illis excitare potuit: quinimo & ab atrahili materia contenta, acri & mordaci, potuerunt extolli vapores eadem qualitate præditi, qui intestinorum tunicas, insigni sensu donatas vellicando dolorem generare potuit.

*Ingens urina profusivum*) *Warthon* adenogr. cap. xi. à lubricitate nimia vasorum mesenterij urinae copiosissimam profusionem (qualis in diabete contingit) oriri censet: Ut ejus retentionem diuturnam, magnæque simul quantitatæ excretionem, asperitatis certum indicium esse ait, quippe quod asperitas retentioni, lævitas autem excretioni perpetuo favent. *M. Donatus* causam deducit à facultatum naturæ debilitate, inducta à sanguinis effusione, unde setosus & aquosus sanguis genitus sit, quod in cachecticis evenire consuevit: hinc sero venis oppletis, id per consuetas vias tandem externæ contingit.

§. 3. *Isabellæ N.* venter intumuit, accessit Febri Continua ad extremum durans: Mesenterium tumore miro surgebat: In eo infiniti abscissus. *Lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 4. *Juveni* dolor fixus in hypochondrio sinistro, in regione colli cum ardore, siti, Febriacula Assidua &c. Inventus est abscissus in mesenterio & colo, ea potissimum parte quæ fuado ventriculi subternitur. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

## OBSERVATIO LII.

*Febri Continua à Pulmonum putredine. Renis dextri, Duodeni, Omenti, colli vesica, &c. Obitus Francisci primi Galliarum Regis. 1. A vitio Hepatû purulenti, Coli nigrescenti, Epiplois putris. 2. Hepatû sphacelati, Pylori, Epiplois inflammatione, ac tenuium intestinorum inflammatione. 3. A loco Hepatû inflammato, Pyloro, Pancreate, Mesenterio induratis, Pulmonibus purulentis. 4. Ab humore putrido in capsula cordis, calculo circa valvulas dextri ventriculi, cum vitio pulmonum, hepatus, lienis. 5. A corruptione inducta tægori, Lienis, Intestinis, veneno adscripta. 6.*

§. 1. *Franciscus primus Galliarum Rex* Febribus Intermittentibus postea Continua occubuit, referente *Thuano* tomo xv. historiar. lib. 3. calendis Aprilis anno 1546. Mane facta est dissectio corporis Secto abdomine, omentum ruptum ad pubem & ad ventriculum sese exhibuit, sicut intestina, suo veluti velamine ablato nuda spectarentur: Sed quæ parte duodeno & pyloro incumberebat nigredinis speciem & corruptelam referebat, Duodenum

denum putre, purulentum: Venter inferior tunica ruborem cum nigrore mixtum representans, humorem atrum, majorem etiam quam pro ratione assumptorum copis, continebat: Gula ulcerata saniem subrufram eructans: Putris pulmo, dextra parte costis ad spinam sic pertinaciter hærebat, ut inde sine dilaceratione divelli non potuerit: qua parte sectione facta vitiosa sanies effluxit: Cor & lecur, Ren sinister plane illæsa, Lien non admodum insigniter affectus: Ren dexter ultima parte purescens, à quo exortum vas seminatium exemptum, colluvem in partes adjacentes effuderat, sic ut in illis omnibus insignes corruptelæ apparetent: In collo vesicæ, ulcus latum pure multo refertum: Sub pube dextra omnia purulenta, & ipsa substantia gangrenosa Scrotum, parastatæ & partes omnes testes ambientes simile vitium contraxerant: Animæ rationalis sede integerrima: Tam variorum affectuum, tam diversos focos obsidentium certæ eum sint causæ, nullum tamen ad generationis primordia referendum esse, aut in posteros transire posse affirmare non dubitamus. *I. Cosma Holzachii. Observatio.*

§. 2. Dysentericus Febre continua affectus interit: Hepar erat sphacelatum & Epiploon cum Pylori inflammatione & tenuium intestinorum *Lib. 3. tit. de Dysenteria.*

§. 3. Scoto dolor erat ventris, lumborum, cum Febre assidua, siti, &c. Hepatis lobus orificio ventriculi posteriori erat affixus, qui nigricabat ab inflammatione: Cum Pyloro induruerant pancreas, mesenterium: Pulmones purulento ichore erant pleni. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 4. Metacatoris filia, antea frequenter hæmorrhagiæ obnoxia, ac proinde cachexia fere consumpta, in febrem biliosam Continuum incidit: Ordinatam vinum laxativum (cum ab aliis omnibus abhorrebat) inde pejus habet: Enema præscribo, leniendi ventris gratia, simul non neglectis alterantibus & corroborantibus: Succedit autem pervigilia, dolor capitis, intumescencia ventris, cardialgia frequens, sit pulsus intermissus, convulsioniones prehendunt, *anæsthesia* tandem totalis adest, fluxu alvi symptomatico succedente: Prognostico facto, roborantibus tantum naturæ suppetias ferre conati sumus, imprimis tunc temporis ubi exacerbatio *nephritidis* vehementissima affligebat, quam admodum leniebat roborans istud cujusvis mihi commendaveras in palpitazione cordis dolorifica, Chrysolithus videlicet præparatus cum lapide bezoar, margar. magisterio, &c. Hoc sæpius adhibito, non tantum ad miraculum vehemens cordis dolor remisit, sed rediit etiam appetitus cum somno moderato: vires vicissim colliguntur quadantenus: pulsus, qui per octiduum fere nullus, jam vermiculans, post intermissus redditur: Sed plenaria restitutione gravius erat mailem, ob incipientem hydropem: qua de causa virium recolectio diuturnior esse non potuit, ideoque paulo post naturæ debitum solvit.

Post mortem aperitur: abdomen ichore fetido plenum, Omentum putrefactum, Lien atque Hepar scirrho laborabant: Pulmones pleuræ adnati, cum capsula cordis, in qua humor putridus: cor duplo majus, bubulum referens, inveniuntur: quodque notatu dignum, circa valvulas dextri ventriculi calculus ex Tartaro concretus, instar minoris castanæ, nucis compressioris, membranose valvularum substantiæ adnatus conspicitur, vehementioris *nephritidis* proculdubio causa proxima *Greg. Horslius observat. lib. 4. obs. 47.*

Causæ *nephritidis* causas) Et proculdubio vasa ordinariam circuitum, qui hinc incaluit, putredinem contraxit, &c.

§. 5. Curæ meæ commissus est Dominus Contant, febre Continua laborans, cujus primis diebus comites fuere vigilæ, capitis dolor: præsertim occipitis, durities & contentio utriusque hypochondri sine dolore, cum mæsticia summa, quam pariebat metus ne simili morbo, qui fratrem exrinxerat, detineretur: Robur nihilominus aderat virium, *epidæmæ* erat, per cubiculum, imo aream deambulans, appetitu non carens, maxime vini, quanquam solis juseulis ex Medicorum præscripto uteretur & pisana officinali: Ter illi missus fuit sanguis ante diem septimam, bis in brachio, semel in pede, quæ venæ sectio eum immunitatem omnino reddidit à capitis dolore: cæcæ alvus quotidie sublucebatur, exhibebantur Iulepi hepatici, foras hypochondriorum adhibebantur à quotum usu remittebat eorum durities manifeste: Tandem symptomatis omnibus remittentibus aut mitescentibus, cum evidentibus coctionis in urinis notis, octava die lenis purgatio & epistastica exhibita est, cui non defuit optatus successus: Toto eo tempore, quanquam non remitteret febris, sublevatum se testabatur, solitis deambulationibus insistens: Res eo in statu ad xi. usque qua se lecto tradere eoactus fuit: xii. incanduit febris, dejectiones aliquot biliosæ superveniunt, sitisque intenditur quæ parva hæcenus fuerat: *Buyatius* Medicus vacuationes symptomaticas aliquando dari pronuntiavit quæ periculum denuntiarent, hæc vero ejusmodi esse non credere, quæ de causa venæ malæoli sectionem ad diem sequentem præscripsit, dummodo levis illa diarrhœa consistere: At vero eum die xiiij. audior foret, sanguinis missio facta non est: quæ ob rem injecto, juxta dicti

dicti Medici præscriptum, clystere, xiv. fluor ille ventris multo liberalior fuit, viresque ægri deſcendebat, qui tamen circa vesp̄eram subſtitit p̄æne, ſed ſuccedentibus atrocibus hypochondrii dextri doloribus & totius ventris: Accerſitus DD. *Montan*, dolorem illum adſcripſit humorum meſtaſi factæ à parte ignobili ad nobiliorem, periculumque denuntiavit, Dom. D. *Monſierius* xvj. die morbi ſupervenſens, t̄te explorato morbi & ægri ſtatu, in hepar factam eſſe humorum depoſitionem aſſeruit, nec procul adfuturam mortem, quæ die ſequenti adfuit circa noctem & morbi 17. Septembris 27.

Poſt die cadaveris diſſecandi gratia cum locum dictum adiſſem, rem peractam reperi: avidus tamen cognoscendi hypochondriorum & inteſtinorum ſtatum, ob ſummios dolores quos ea in regione perpeſſus erat æger, qui paulo ante obitum toxico ſe infectum fuiſſe credere mihi dixerat, laxatis ſutris coram Dom. *Garnier*, deprehendi ventriculum ſanum & integrum, at hepar & lienem omnino putrefacta, præſertim hepar quod lividum erat & lactis coagulari iuſtar friabile: Inteſtinorum tunicam exteriorē corroſam & laceram diverſis in locis, cum ulcere, cujus oræ calloſæ erant, è quo materia purulenta prodibat, tantæ amplitudinis ut apicem auricularis digiti poſſet admittere, ac ſubitantiā inteſtini cujuſpiam omnino perſaſerat, quod quale fuerit designare non poſuit, quia in abdomen conſuſa conjeſta eſſent: cujus capacitate ſeroſitas bilioſa exundabat, abominando & horribili ſectore prædita, cujus libræ circiter ſex deductæ fuerant ab eo qui diſſectionem ſuſceperat: Neque eorū neque pulmones vidi, graveolentiam veritus, quæ referente Dom. *Garnier*, in ſtatu erant naturali, ſi Pulmones aridiores non fuiſſent. Dabam Villettæ Antoniz anno 1662. Octobris 2. Julien.

**N**Os infra ſignati, examinatis interioribus partibus cadaveris Dom. A. Conſtanti inteſtiniſ pluriſ in locis exulceratis, è quibus unum perforatum: Hepate & Liene corruptis intra bidui p̄anum, per quod doluerant, Aquis & ſetofitibus intra abdomen capacitatem, extraordinarie fetidis collectam, aliſque ſymptomatis funeſtis, concludimus dictum Dominum morte violenta occubiſſe, induc̄ta è cauſa maligna & veneno lente actionem exerente, quod ſubſtantiā ſe non prodidit, ſed tantum effectibus: Quod aſſerimus 2. Octobris 1662. *Montan* D. M. *Garnier*, Julien.

Domini *Corbet*, Procurator Regis Vienne Delphinatus, relationē præcedentem, quia res eſt momenti, communicatam mihi voluit; Eæ præſertim de cauſa, quia rumor erat deſunctum è veneno exhibitum interiſſe, quamobrem ſententiam meam quoque ut proſetrem voluit.

Ego D. Medicus Facultatis Monſpelienſis, Lugdunenſi Aggregatus, infra ſignatus, certum facio me legiſſe, & ad amuſſum examinaſſe relationes factas à Dom. *Montan* Doctore Medico, ac magiſtris *Garnier* & *Julien* Chirurgiſ Delphinatibus, morbi & eorum quæ ædnotata ſunt in cadavere aperto Domini A. *Cantant*: Quæ de cauſa cenſeo morbi & mortis cauſam adſcribendam eſſe inſigni caco-

chymix & corruptelæ humorum cujus malignitas proles eſt & alumna: nec non vermium copix febris comirum, quandoquidem æger morbi initio famelicus fuit: Inteſtinorum unum pertuſum fuit, è quo mæſteria exiens, univerſum abdomen implens, putrida, abominando ſectore donata fuit (proculdubio ob lumbricorum ingentem copiam mortuorum & in inteſtiniſ corruptorum, quos proculdubio videre li- cuiſſet iis apertis) & inteſtinorum exteriorē tunicam exulceravit: meſenterium & epiploon corrupti, nec non hepar & lienem, ante intemperie affecta & imputritibus infecta: quandoquidem ab initio morbi obſervata fuerat inſignis in utroque hypochondrio tenſio, iis familiaris qui parva unantur dicta: Neque enim locus eſt conſtituendæ legitimæ exhibiti veneni ſuſpicioni, cujus nullum ſignum univocum extat, cum ventriculus (qui primam veneni impreſſionem, ore dati, ſemper excipit) integer & ſine labe repertus ſit: Adde his memorata ſymptomata febris à vermis induc̄ta ſetè familiaria eſſe, quod hoc tempore præſertim innotescit, quæ Delphinatum finitimasque regiones peragravit, (Gratianopolim præſertim anno 1650.) plurimis funeſtæ: Arque hæc eſt mea ſententia quam propria manu firmavi: Lugduni x. Octobris 1662. *Gras*.

## OBSERVATIO LIIII

*Febres continue lethales, exuſtis viſceribus ob denegatum potum.*

**S**Unt quidam qui eandem fere legem in omnibus febricitantibus ſervant, nimirum ut caveant maximopere à frigida potu: quam ob cauſam anno 1649. infinitus propemodum ægrorum numerus è vivis ſublatus eſt, cum tamen febres eſſent continuæ, cum mixtione diverſorum humorum, & præcipue bilis, non tamen ſolz, qui cum ſiti maxima torquerentur exuſti obibat.

ſectis cadaveribus ventriculus, cor, pulmones & reliqua viſcera tanquam exuſta apparebant. Domini. *Panarolus* Pentec. 30. Obſerv. viii.

**F**Rigida potus ſicut in febribus ardentibus, eſt ſtate media, in juvenibus optima temperie præditis, ſuavitate, optimis, communij Medicorum conſilio approbatur, Ita etiam in febribus, ubi humores ſunt mixti, tanquam inutilis & inſalubris exiſtimatur:

*Boneti Anatom. Tom. III.*

Quare diligenter advertat Medicus ne ipſum adminiſtrando aut auferendo ægrorum morti exponat: Ego unciam, ſed xij. & xv. imperabam: 2. immediate ante prandium vel cenam 8. aut 10. uncias aquæ hordeaceæ adminiſtrabam: 2. quo facio in omnibus aut

S ..... urina

urina copiosa, aut alvi fluore oborto, furdi & farui paulatim abque febre remanserunt, & diligenti postmodum cura adhibita, faruitate & sordiditate surgata, integre fuerunt sanitati restituti, non neglectis interim aliis praesidiis, sed in hoc solus tantum coassistebar: Aquae isti hordeaceae imposuimus aut frondes, aut cortices citri incisos cum succo limonum, quae mediante nullus perijt. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO LIV.

*Febris continua extincti vasa omnia sanguine depleta reperta sunt.*

§.1. **A**Nno 1641. Novemb. v. dissectum fuit corpus Principis *Ferdinandi*, Hispaniarum Regis Franciae, qui lxxx. diebus Febri continua obiit, ætatis xxxij. ann. Sublatis corde, hepate, pulmonibus, adeoque dissectis venis & arteriis, vix cochlear cruoris in cavum thoracis confluit. Plane nimirum ostendit hepar exangue, cor vero instar cremenz faciedum: Biduum ante mortem plus edisser si ipsi concessum fuisset: Fuit nempe per venarum sectiones, purgationes, hirudines ita exhaustus, non desinabat tamen Tertianæ typum servare. *Hæmontius Tract. de Febribus cap. 4. §. 16.*

§.2. In cadavere febre extincti in vasis, vix libra sanguinis superstes fuit. *Car. Pifo lib. de morbis à sero sect. 2. p. 2. cap. 4.*

§.3. Anno 1663. oblit in Gallia Serenissimus Princeps H. ab A.D.L. annos 63. natus, pusillæ staturæ sed vividæ & robustæ constitutionis: Huic febre continua prehenso tam stitida dicta Imperatur, quanquam largiori alimento, si concessum fuisset, libenter indulgisset, tamque frequentibus venarum sectionibus ex deplentur, ut aperto post obitum corpore, vasa omnino exhausta reperta sint, viscera autem omnia integra, nullatenus, ut in senæ, flaccida & marcida. Adeo ut facile constiterit magis illi funestam fuisse medicorum industriam & sollicitatem, quam ipsam vim morbi.

§.4. Febres ardentes alimentarios humores corporisque substantiam calore suo absumunt: scribit *Hippocr. lib. 1. de morbis. Qui ex febre ardente moriuntur, omnes ex siccitate moriuntur.* Et referunt authores quidam sanguinem rotum fuisse absumptum, ut scribit *Argentarius ad cap. 2. lib. 2. ad Glauconem de Mutio Medices, Arcis Pisanæ Præfecto, in cujus cadavere ne gutta quidem sanguinis reperta est. Primisiosus de vulgi erroribus lib. 2. cap. 6.*

## OBSERVATIO LV.

*Febris continua à nimia obesitate inducitur.*

**O**Blati mihi sæpe infantes ex iis quibus lac nimia copia fuerat exhibitum, qui febre Continua brevi tempore extincti: quorum dum mortis immaturæ causæ causam indagabam, omnes ita pinguedine obsecos inveni, ut vix scirem quo vultrum anatomicum adigerem, *Vid. lib. 3. tit. de vomitu.*

## OBSERVATIO LVI.

*Febris Leipyria à Pulmonum inflammatione, exsiccatione & tæbe se prodente. 1. Ab Erysipelate eorum. 2. Ab eorum inflammatione maculas relinquente. 3. Typhodes ab inflammatione Pulmonum in suppuratum abeunte. 4. Leipyria ab Erysipelate ventriculi. 5. Ab Hepatis inflammatione in abscessum, ulcus & gangranam desinente. 6. Ab inflammatione extremorum Hepatis laborum nigredine se prodente, Lienis communicata, cum insigni cystis fellæ magnitudine & repletionem. 7. Febris Leipyria tertianaria ab utraque inflammatione corruptionem invehente, cum Pulmonis patris & Iecoris vitio. 7.*

§.1. **I**llustriß. Marchesia Rangona tribus ab hinc diebus sollicitatur febre continua, à genere ardentium, imò etiam Leipyria: pulsus enim 1. magnus est, celerissimus, frequentissimus atque etiam durus nonnihil, languidus tamen, qui Galeno teste, biliosas febres non omnes consequitur, sed lethales tantum, §. 2. *Sitis licet non sit insignis*, ob humorem à cerebro in os assidue delabentem, insignem tamen calorem febrilem intus urentem indicat, alias enim ægra non sitiret, nec aquæ potum, usque adeo expeteret. 3. Vigiliæ quoque immodiæ febris hujus naturam patefaciunt, quippe quæ vaporum à bile putrescente in caput elatorum acrimoniam consequantur: Caterum quoniam cerebrum distillationis principium multis frigidis abundat excrementis, sero continue in somnum propensa est, dormire tamen vix potest, brevem etiam temporis spatio, unde colligitur *Cerebra vigil.* 4. Temporum insignes pulsationes dictæ febris pariter sunt indiciæ, humores enim biliosi facile sursum tendentes temporum arterias subeunt, eoque congressu membranas, tum internas, tum externas invadunt feriuntque, ideoque 5. capitis dolorem suscitant, ita ut 6. quidam Delirii præludia detegantur: quandoquidem morbum perquam gra-

tem & acutum minime ( ut deberet ) sentire videtur: interrogata enim quomodo se habeat ut plurimum bene responder: Quod mentem laborare indicat juxta aphor. 6. sect. 2. 7. adeft Spiratio frequens, laboriosa, & cum stertore quodam, à virium languore, usu aucto, ob viscerum, præsertim spiritualium, ingentem æstum, atque viarum spiritus angustiam, capitis fluxionem in asperam arteriam consequentem, unde stertor: 8. Jungitur huic febri dolor dextri lateris, non punctuarius & acutus, sed admodum mitis non continuus, sed longo temporis intervallo interjecto leniter suscitatus, qui parte laborante exterius pressa excitabatur, minime certo loco circumscriptus, sed modo hanc, modo illam dextri lateris partem invadens. 9. Excrementa, ut fæces & lotia, multa bile repleta sunt: nec obstat quod pituitosa etiam admixta biliosis excrementa conspiciantur, nam ex præcedentibus cruciariis sunt collecta: quæ cum spumosa sint, magnam viscerum & venarum ebullitionem indicant: fæces non solum biliosæ spumosæque conspiciuntur, sed læves etiam ac nonnihil pingues, quæ nativum viscerum calorem ab ingenti calore putredinali & febrili violarum denotant, ut humores eliquantur, deinde carnes & pinguedines: Lotium autem primis morbi diebus rufum fuit & saturatum, tunc tamen, infimi caloris nativi soboles, crudique morbi indicium, deinde confusum apparere cœpit ob sanguinis & humorum, qui in venis sunt majoribus confusionem, corruptionem & putredinem, cum putredo omnia perturbat, permisceat & confundat: 10. Sudores circa caput, collum & pectus, una cum copiosiore urina erumpere cœperunt, qui mali, quia nullum in cæteris excrementis apparente coctionis signo, exigui, subfrigidi, febre non deficiente & in die pari promoti sunt: 11. Insignis calor percipitur circa thoracis & ventris regionem, licet exteriores corporis partes interdum frigidae, nonnunquam moderatè calidæ contingantur interiores tamen semper uri affirmat ægra hinc linguæ nigredo, tamen non multum arida cernatur, ob mareriam à cerebro in os assidue distillantem: Ex quibus colligimus febrem hanc putridam & continuam, non solum biliosam & ardentem esse, verum etiam Leipyriæ naturam æmulari, cujus focus est in venis quæ ad partes spirituales ad jecur & hypochondria spectant, quod patet ex illarum partium æstu, dolore, atque hypochondriarum, præsertim dextri, elevatione potius quam renitente tumore, Febris autem binas exacerbationes quotidie habet, mane nimirum & vespere, læves tamen, ac tertio quoque die, sed per dies pares manifesta exandescencia apparuit, Cum vero maxima esset inter nos opinionum ambiguitas, statim discussi non amplius rediturus, verum hora quinta circiter sequentis noctis ( die morbi quinta ) summis precibus accessit, Ill. Ægram inveni valde siticulosam, anxiam & inquiete se jactantem, cujus extrema frigida non amplius incallescere, difficulter & cum stertore respirantem, prompte tamen loquentem, Quibus omnibus exacerbatis symptomatibus præcepti delibatio ita impetuosa accessit, ut præclusa spiritus via temporis brevissimo momento præfocata perierit.

Dissecto cadavere reperti sunt Pulmones pene tabefacti & exsiccati, præsertim quoad partem sinistram, Etenim, licet secundum propriam substantiam, in summam maciem succitaremque dextri quoque Pulmones ob eandem causam incidissent, multa tamen excrementitia humiditate suffusi ob inflammationem à sanguine pituitosa ea in parte inceptam, molles & flaccidi apparebant, imò corruptio quædam in membrana pulmones succingente ejusdem lateris dextri manifestè coacipiebat: Partes igitur internæ, ut prædicebam, non autem externæ, afficiebantur, nisi alio quodam leviori & peculiari affectu: Zecchini consultatione xxvj.

**I** Mo etiam Leipyria ) Cujus species *κρυπιδες* vocantur, ad erysipelate circum Pulmonem consistente, quemadmodum scriptum est apud *Ætium* lib. 5. cap. 89.

*Pulsus magnus, durus, &c.* ] De pulsu in hac ægra peculiaris est ratio: Peripneumonia enim laborantium Pulsus ideo molles evadunt, quia pars inflammata ( Pulmo ) suapte natura humida mollis est & laxa: ac cessante hac causa rationi consentaneum est effectum quoque inde pendentem cessare, quod hic locum habuit, cum pulmones reperti sint pene tabefacti & exsiccati, quorum partes internæ potius afficiebantur quam externæ: Zecchini ibidem.

*Satis licet non sit insignis* ] Cum vident Medici pleuroque febre satis insigni laborantes parum sitire, aut nullam probabilem rationem afferant, aut distillationem à capite causantur Melius Galenus part. 1. lib. 4. Acut. Interdum Causis in una parte, interdum in toto corpore gignitur: Si in toto corpore, Satis omnino parum, Cui in una parte, non necessario, nisi pars ipsa sitim afferat: Omnium autem primum id facit os ventriculi, deinde stomachus, post Pulmo, subinde jejunum intestinum, Id quod notandum, Atque inde colligere possis attractionem ichorum in totum corpus, non tantum in majores venas causam esse Causis: Sic in habitu corporis accenduntur ichores, & febrem committunt, & dolores insensibiliter patient, & sudoribus solvuntur, Et ab habitu maxime sudor manat: Si ergo ventriculus, hepar, os ventriculi, jejunum intestinum, stomachus, & sitis & febris sunt foci quidam, item & corpus totum plenum ichoribus, quid est cur ad generationem febres continuas recurramus ad venas internas majores? *Ballonius* consil. 2. lib. 2. Sed præter defluentem à cerebro pituitam sitis vehementiam extinguentem, altera in hoc casu subest causa, scilicet instrumenti propria affectio, quandoquidem Lingua nigra fuisse dicitur, quanquam non arida, ob assidue distillantem in os à cerebro pituitam: Lingua cum sit nigra exstasque, totus stomachus, cui illa continuè est, eo pene modo affectus est: hinc arenis suis partibus & supra modum succatis, non percipitur sensus indigentis, quia nervus subiectus linguæ non est eo modo affectus & dispositus quo esse debet, atque super-



ficis exalta & torrefacta, in quibus causae frigeris prima impressio & sensus esset debet.

*Cautiones in somnium propensa est.* ] Hanc refert quae lib. I. de Soporosis affect. dicta sunt ubi de Lerhargo & Palmationibus.

*Causa vigil.* ] *Avicenna* notavit plures ardenti febre biliosa correptos interdum somnolentos potius quam vigiles esse, pro nimia humiditate huic aetati familiaris, quae ratio huic pertinet.

*Quadam delirio praesidia.* ] Delirium tacitum non omnes agnoscebant, quamvis enim nec absurda loqueretur, nec temeraria moliretur, nihilominus quid morbum gravissimum acutissimumque fere non sentiebat, atque sibi ipsi in singulis propemodum dissimilis erat, mentem aegrotate facile intelligebatur. *Zecchini.*

*Dolor lateris.* ] Cum dolor hic non sit punctorius & acutus, sed admodum mitis, non continuus, sed longo temporis intervallo interjecto leniter fusciturus, eumque certo loco minime sit circumscriptus, sed modo hinc modo illam dextrae lateris partem invadat, haud quidem Pleuritidis accidens (qui fallor) censei potest, cum praesertim nulla vel exigua tussis adfit, eaque rara admodum excitetur, notha namque pleuritide laborantes assidue tussire solent. Quinobrem dolorem hunc aliunde pendere arbitror, nimirum a sanguine bilioso pulmonum venas replente ac partium inflammationem quindam fuscitante, quo quidem certis quibusdam horis magis minusve fervescit, ideoque membranas pulmones ambientem distendente, dolor ille concitetur: nam licet pulmones non sentiant, eorum tamen membrana sensu aliquo non caret. Quod autem cutis affecti lateris cum carne subiecta contractam doleat, non tamen existimare debemus doloipsum hunc affectum fuisse tantum externum, quamvis consultores ita sentirent, nam praeter extremum affectum, quem non nego, quique nullius est momenti, cum aegroti super illud latus facile cubare possit, alium eumque graviorem affectum, Pulmonum lateris dextrae substantiam & membranam simul laxisse vexando, hanc patet quod super latus oppositum nullatenus cubare possit, certissimum sane interioris affectus sedis argumentum. *Zecchini.*

*Non punctorius.* ] Quod dolor lateris non esset punctorius & acutus sed mitis, ex eo Consultores asseriebant notham esse pleuritidem; h. e. musculorum costalium externorum inflammationem, quod praeter febrem continuam, lateris dextri dolor & spirandi difficultas cum tussicula quadam adessent, & parte laborante exterius pressa dolor excitaretur. Constitabant, quia si fuisset Peripneumonia, ut ego affirmabam, tria potissimum habuissimus signa, 1. Pulsus mollem (qui tamen in hac aegritudine erat) 2. maxillae appressissimae rubore suffusae, ob vaporum copiam qui ab inflammationis & ebullitionis loco excitantur. 3. cruentum aut rubro colore infectum sputum excerni solet, ut docet Gal. 2. de loc. cap. 9. quod in hoc morbo non fuit observatum: Quod spectat ad lateris dolorem, argumentum facile diluitur si prius consideremus quid sit Pleuritis exquisita & notha, quidve Peripneumonia: Ex quo sita Pleuritis, ut omnes fere arbitrantur, est inflammatio membranae costas cingentis, vel musculorum illi continuorum in parte interna: Notha autem est musculorum externorum lateris inflammatio: Interdum verò dicunt Pleuritidem falso putarant, esse dolorem cum insigni spirandi difficultate, ac cum febre, procedentem a copia crudorum succorum, qui in vacuum thoracis locum, aut in pulmonem repente se ingerunt, membranamque succingentem distendunt. Nos autem *Hippocr.* in lib. de loc. in hom. t. 91. Pleuritidis nomine Pulmonum alterius duntaxat lateris inflammationem intelligimus: Peripneumoniam autem nomine, Pulmonum

secundum utramque partem inflammationem esse affirmamus: Quare semper in hac fuit sententia ut Lateris dolores magna ex parte ad pulmones pertineant, raro autem ad membranam illam costas cingentem, cum in pluribus praeteritum corporibus post obitum dissectis aegrotum, qui communiter accepta Pleuritide peritisse iudicabantur, non membranam hanc affectam fuisse, sed Pulmones observaverim una cum sua membrana laceratos & corrosos: Sed ut ad institutum redeam, Illustr. aegram non libere musculorum costalium inflammationem asserere, quod abij censebant, nam cum diligeret observare laborantem hanc decubitu in partem affectam facile sustinere non posse, posse autem in latus oppositum cubare, certo assererebam sedem affectum internam esse Pulmones, nempe una cum membrana eos circumcingentes: Ex dolore namque gravi, sed non punctu, cum steretosa & difficili respirazione, atque pulsu magno, languido, & cum multiformi inaequalitate, facile intelligebam Pulmones inflammari. Nec obstat quod de tribus signis deficientibus, assereretur in medium, quoniam incipientes morbi omnia statim signa manifesta haudquaquam exprimunt. Atque ut ordine retrogrado procedamus, quod ad excreta attinet, etsi in hoc affectu non semper ab initio interitusendum aliquod ex Pulmone excernatur, plerumque tamen per morbi incrementum ac vigorem cruentum ex eo detruditur, quoniam illud est quod tenue ex inflammato loco tandem exadat & excernitur: Neque etiam inter hujus morbi initia tanta in loco inflammato ebullitio excitatur, ut vaporum sublatum cum copia male rubore coarctantur. De Pulsu autem peculiaris est ratio alibi annotata. Cur vero inflammationis hujus signa, sitis nempe, dyspnoea, & tussicula manifeste apparent: alia autem, nempe pulsus mollis, malarum rubor, & sputum cruentum inflammationis inchoante delitescerent, ea ratio adduci potest, quod haec unum duntaxat morbum, peripneumoniam videntur, sequi debent: illa vero non solum hujus incipientis morbi soboles erant, sed, & destillationis, & febris, & angustiae cujusdam valorum ad Pulmones pertinentium, qui quidem affectus jam insignes erant & patentes. *Zecchini.*

*Insignis calor circa thoracis & ventris regionem.* ] Hinc *Vallesius* 1. Epid. 5. aegro 1. notat, & ex eo *Riccius*, Pericarum esse febres acutissimas & perniciosissimas fieri sine interna aliqua phlegmone: Quare nunquam omittebam curam hypochondriorum, thoracis, capitis, uterique, & vesicae, ut omni ratione investigemus quae harum partium insigniter labores, ut ei, quod ad fieri possit, subveniant.

*Febrem hanc non solum biliosam & ardentem, etc.* ] Consultores febrem hanc malignam censebant, quod ferina symptomata morbi essentiae, calori, sc. febrili minime responderent: Ego autem talem non judicavi, quia morbi maligni non solent decrescere aut remitti, saltem ante eorum vigorem: quare cum haec sitis quibusdam horis remitteret, malignam non credidi. Nisi malignitatis nomen latere sumus pro magno & pernicioso, quomodo *Hippocr.* 1. Epid. febres autumnales, quibus cum cardialgia ferinaeque symptomata conjunguntur, minus malignas appellat, quod tempore familiares sunt: Nam licet interdum febris ut remitti judicaretur, ut nonnihil aegri quiesceret, non tamen ipsam febrem suapte natura remisisse iudicandum est, sed ipsius duntaxat declinationem exactionis factum fuisse: Quare hinc deceptionis occasio erat, quia illi qui ad erant, copantes statim praesentem declinantem exactionis quietiorem cum statu ejusdem acerbioris, aegram melius sese habere, febrem, declinare falso existimabant: Ita 1. Epid. *Philem* coarctatur febre tam acuta & maligna ut die 6. obierit,

objicit, tamen secunda inclinante die cuncta symptomata remittebant, nec non tertia die mane & ulq; ad meridiem visus fuit immutatus à febre. *Zoechius ib.*

*Præcepta de febre &c.*) In quæstionem vertebatur num ejus inhibenda gratia, & suffocationis periculi vitandi, phlegmæ, dropacæ, vel in fincipite inustionibus, mox *Hippocr.* redundantes in cerebro humores exsiccare & foras trahere expediret. Id statim præstandum contendebam, ac Consultores objiciebant, Si futuram times capitis excrementorū à calore febrili fluxione, cur id remediū proponis quod valentius excrementa capitis liquabit quam febrilis calor? Resp. Liquatos à medicamento humores foras quoque prolici, unde impetus fluxionis cohibetur: cujus operis simile exat exemplum apud *Galen. 5. meth. med. cap. 14. Zoechius.*

*Pulmones pene tabefacti, &c.*) Verisimile est Pulmones tantæ immoderationem siccam, tabidamque affectionem hanc, tam brevi temporis spatio quo ægrotavit minime contraxisse, sed multo antea, tum ex naturali quadam ad ipsam propensione, acceden-

te senili ætate, tum etiam ex victus ratione prægressa quippe cum animi & corporis laboribus, vigiliis & frequenti jejunio, pietatis causâ, dedita esset. Id.

*Hypochondriarum, præsertim dextræ, elevatione.*) Quamvis primo aspectu suspicio mihi nata sit incipientis in hepate inflammationis, quod simul observassem tumorem quandam adhuc etiam subsistentem circa jecoris regionem cum corporibus nonnullis à natura datum sit ut hepar fibris quibusdam ita collis inferioribus hæreat, ut hoc vincere laborante distingoque costarum regionem dolor infester, atque pleuriticis speciem referat, quod multis ab hinc annis observavi & experimento comprobavi diligentius tamen singula mecum perpendens dolorem hunc ex Pulmonum illius lateris inflammatione proficisci existimavi, difficultas enim spirandi, angustia, steror, pulsus magnus, leghuidus, atque multiformiter inæqualis, una cum spū inter tussendum spumoso excretō, comitæque dolore, licet non pūctū, Peripneumoniam cumularissime indicant.

§. 2. Erysipelas Pulmonis paucis attingunt, quia forte raro occurrat: Ejus exemplum vidi mense Septembri anno 1678. in puella xymenthes nato, filio Dom. de la Combe Diversitoris, cujus domui appender insignæ trium Regum, Traditus fuerat nutritici educandus extra domum, cui redditus bene habitus & pedibus valens, sine auxilio deambulans xiv. diei mensis: Die sequenti, scil. xv. febre corripitur, quam comitabatur sitis inexhausta, vomitus omnium ingestorum ac diarrhoea, (aut potius Cholera morbus) ac oculorum motus convulsivi: Ab exhibitis granis vi. lapidis bezvartici orientis & tantundem margaritarum præparatarum, ex aq. eerasor. nigr. cum saccharo cando, melius se habuit, nam sedatus uterque fluxor, oculis nitor & conviventia rediit, adeo ut omnia in tuto viderentur, Sed exactis xij. horis convulsiones, in oculis tantum manifestæ redeunt, calor intus refugit, adeo ut ad ætū omnino frigeret, cavantur oculi, ambiente eos insigni livore, mors denique desinente sexta die obrepit.

Consternati parentes, quod ante annum alius puellus morbo acuto quoque fuisset abreptus, apertionem cadaveris optarunt, Hæc priusquam susciperetur, anasarca per totum affectum se obtulit, ubique enim digitorum impressa vestigia remanebant: Aperto abdomine, omentum vix umbilicum pertingebat, pinguedine destitutum: In ventriculo & intestinis flatus, Colon, in vicinia cystis felleæ, atque lato ambitu impense flavescere: *Tecur* pallidum erat, qui color familiaris peripneumonice, tincturam ad se attrahentibus pulmonibus: Annexa illi Cystis turgida, exterius coloris saturate viridis fovea, cui inseritur, admodum excavata, quæ duos dig. tor complicatos admisisset. *Mesenterium* glandulis, scatebat innumeris magnitudinem naturalem excedentibus, ab obstructionibus tumidis, quod intempestive puero solidioribus fuisset exhibitus: Unde ætrophia illi immincebat, si vita fuisset protacta: *Ren* uterque quam decebat major, ovum gallinaceum maximum mole æquans. Sinistri viscosa erat figura, parte enim convexa planus erat, quasi à superincumbente pondere depressus: Discissus arenulas plurimas pelvi inclusas continebat, nec non ureris subditus, puri temixtas: Cui forte Anasarca ortus adscribendus, quod unicus Ren esset in officio, sero hinc in habitum effuso, *Thorax* antem mortis causam continebat: *Cor* pro ætatis ratione majus. *Pericardium* aqua destitutum, *Pulmones* parvi, exangues, antica parte colorem nativum & formam servantes. Postica rubiundissimi, inflammationis erysipelaceæ notas gerentes, citra duritiem & renitum: Respiratio non multum difficilis fuit, illi similis quæ ob usum ad ætū accidit: Tussis toto morbi decursu absuit, quod sola intemperies citra humoris copiam molesta esset.

§. 3. Tantum in Leipyria febre renitentiam alexipharmacis omnibus observavimus, ut mortuis ægrotantibus, scilicet pectore, maculæ nigricimæ inventæ fuerint, per totam Pulmonum substantiam dispersæ & alre penetrantes: Pulmones hoc modo variegari *Paridi* pellem æmulabantur. *Dem. Panarolus Pentec. 2. Observ. 14.*

§. 4. Quidam longo tempore ob vulnus in pulmone decumbens, eo tandem putrescente à Febre Typhode cohabitavit: Illi mediæ pars pulmonis consumpta ac pure soluta spectabatur. *Vide lib. 2. Tit. de Phthisi.*

§. 5. D. Rubat. (*Vide lib. 3. tit. de Ventriculi dolore*) de ventriculi æstu conquerebatur: adeo Febre Leipyria: Fundus ventriculi parte internâ nigricabat, tanquam ab igne ustulatus. Pars externa lienem respiciens livebat, & pars coli vicina.

§. 6. Famulus cerevisarii Delphensis misere ultra annum decubuerat, annos natus 36. Per integrum annum dolore hypochondrii dextri conficiebatur, atque in autumnio fe-

brem habuit non observantem typum, lentam tamen, qualis in corruptela substantiæ lecoris fieri solet: duravit deinde hæc febris, typum non retinens aut observans, per totam hyemem sequentem, quæ neque hominem in vere reliquit, & perduravit deinde ad æstatem usque &c. Cum autem per annum quasi tæbe consumptus foret, maximos dolores perpeffus, ac tunc faciem Ictericis similem haberet, qualis contingere fere solet omnibus Ictericis, tandem C. Ericium accersivit, quo statim repudiato cum opem non sentiret, variorum Empiricorum opera usus est, ita ut tandem ad extremam atrophiam devenerit: Ego quoque accitus, hominemque inspecto, admirari cepi, cum in vita virum magis consumptum macilentiorēque nunquam vidissem, cui tantum pellis rugosa una cum ossibus restabat, lecore enim ita contabescente totum corpus tæbe absumptum conspiciebatur: Deinde huic non solum facies erat citrina, sed universum corpus flavum evaserat, etiam albedine oculorum in citrinum colorem plane conversa, quod & jecinorosis & Ictericis evenire solet: Aderat & huic Tussis sicca, admodum molesta, hominem omnino consciens: hypochondrium deinde dextrum apparebat durum & valde subtumidum, & omnibus hypochondrium deinde dextrum apparebat durum & valde subtumidum, & omnibus conspiciendum, musculis abdominis plane consumptis & extenuatis: urina vero tenuis erat, sed supra modum tincta & ignea, ut vinum rubrum ac diaphanum videretur: Sed & oris siccitas eum molestabat, *presente febre hectica*, ac pulsu vix apparente, & magis sub noctem intensæ: ceterum modo alvus adstricta erat, modo admodum liquida & plurima biliosa liquationis instar egerebat: postea iterum fuit arida & sicca: Præterea aderat & cibi fastidium sitisque inexhausta, ita ut aquam frigidam ac gelidam magna in copia hauserit, Ad hunc postquam ultra anum laborasset, ingressus, cum ab initio huic sanguinis extractio esset prætermissa, idque male in Epatis inflammatione & apostemate, nunc id nullo modo licuit, in homine jam tæbe & hectica febre consumpto, ipsoque humido radicali etiam absumpto: Ego vero apostema in hepate confisistum atque incurabile pronuntiavi, & non diu post meam opinionem confirmavit cadaveris sectio: nam tumor admodum durus paucis diebus è regione epatis ita immensum excrevit, ut omnibus appareret, non sine dolore: quod signum erat abscessus futuri, nam si simplex scirrhus fuisset minus doluisset: quare prædicto prognostico eum pro deplorato habuimus, cum apostema Epatis confirmatum non curetur, At postea eum idem tumor laxior fieri inciperet, febre magis invalescente, suppurationem expectavimus: Hinc cum apostema maturum appareret, & materia satis esset deducta ad sanam, remittebantur quidem prædicta accidentia, gravitas tamen major remanebat, cum materia in uno loco magis congregata videretur, & tactu lenitas & mollities sentiretur, duritie, quæ prius sentiebatur, in totum ablata: Statim autem cognovimus ex dolore redeunte, ruptionem appropinquante, punctione & febre rursus increscente & gravitate majore: Cum tamen per se non rumperetur abscessus, ut Chirurgus ruptionem juvaret impetavimus: Verum cum ejusmodi ingens apostema non rumperetur, Chirurgum lasitavimus ut ad incisionem procederet, sed in corpore debili & exhausto id tentare noluit, vel non audebat; existimabat enim quod tandem per medicamenta apposita rumperetur: Verum cum illud non succederet & escharam quasi induxisset, denuo me in consilium adhibuit: Ego autem cum ex signis presentibus animadverterem quod pus totam ventris cavitatem occuparet, potissimum è regione Epatis, ubi tumor ingens laxior apparebat (nam motio puris & fluctuatio quædam exaudiebatur) ulcus jam factum in Hepate, malignum, putridum & corrosivum judicabam, quod hominem subito è vita tolleret, nisi uestio (ut veteres Medici facere solebant) vel incisio aut apertio statim fieret scalpello vel phlebotomo aliquo, quæ licet etiam in homine deplorato & viribus exhausto periculosa haberetur, tamen tentandum fore: ne æger statim ex putredine puris intus collecti exspiraret, Ideo & secundus Chirurgus advocatur qui incisionem statim agendam censuit, præhabito tamen prognostico quod cura coacta & periculosa foret, tamen tentanda ne ulcus in pectus procederet: interim si fieret, atque æger animo desinqueret, sicque vitam finiret, id in manu nostra non esse, cum vires exhaustæ essent, in reera potius anceps quam nullum remedium adhibendum: Cæterum ægro ipso, tum amicis instantibus consentientibus, Chirurgus dextere suo officio functus est; prima vice post adhibitam incisionem sanie virulenta & sanguinolenta absque pure excurrente, at cum vulnere impositum esset liamentum, quod secunda visitatione admovebatur, materia viscosa, putulenta, foetida, copiosa emanavit, cum tanta foetore ut ratam domum eo impleret, ita ut vix quiescam nostrum in cubiculo apud ægrum persistere posset: Cum vero materia foret viscosa, ut eo minus exire posset, denuo coactus est incisionem ampliorem facere, quod etiam deerrime peregit, neque interiora læsit: exivit tunc materia admodum foetida & putulenta amuræ similis: unde conjecimus omnia interiora corrupta, & hepar similiter, & ægrum non evasurum amicis prædiximus, juxta aphor. xlvij. 7. Tertio autem die ab incisione caro exterius facta est livida ac in gangrænam mortificata: nec tantum caro externa, sed

& interior, quod cognovimus ex ingenti putredine & fetore qui ex loco incisio exhalabat dum vulnus reficeretur, non aliter quam ex homine eadaveroso & demortuo: præterea dum Chirurgus paulatim pus propelleret, & ad exteriora labia vulneris deduceret, tanta cavis apparbat ut & interna tandem etiam corrupta spectarentur: Paucis, septimo die ab incisione peracta mortuus est.

Ex de mortuo cadaver incisum, Et in tota ventris capacitate reperta copia puris valde fetentis, ut præsentis in cubiculo perdurare vix potuerint. Occupabat autem pus tam partem sinistram quam dextram sub toto abdomine, usque ad imum ventrem, & repertum est omentum à pure virulento consumptum, peritonæum quoque disruptum & putridum conspicebatur, similiter & intestina nigredine & plumbeo colore infecta spectabantur: Hepar autem durum videbatur, ingentis magnitudinis albicans aurem circa stomachum, sed in gibba sui parte, prope nothas costas, nigrum, exustum ac plumbeum, in esthiome non transmutatum: erat enim hepar circa illam partem potius esthiomenatum, ut ita dicam, quam ulceratum: & in parte gibbosa, paululum deflectente à costis, gangræna infectum: Erat pus in hepate conspicebatur, potius vero in concavitate ventris, quod ab hepate disrupta membrana eo defluerat: præcipua autem Hepatis corruptio erat in parte dextra, versus costas spurias, & circa musculos: intercostales quineriam similiter nigredinem contraxerant: Costæ quoque spuris tanquam igne combustæ ex esthiomeno, nigræ & exsiccationem contraxerant, ita ut carbonis instar nigræ adustæ frangerentur: Ulceratio vero ad musculos abdominis processerat, magis in parte dextra, qui muscoli similiter tandem nigredine & gangræna affecti erant: In parte vero hepatis esthiomenata potius virus & sanies spectabantur quam verum pus: mirum fuit quod hic tamdiu vixerit: Antequam autem in illam tabidam & siccam dispositionem, tum dolorem dextri hypochondrii incidisset, multis antecanis fuerat valetudinarius: (P. Forestus Observat. X. lib. XXI.)

V Erisimile est hunc prius inflammatione hepatis laborasse, demum duriciem subsequutam, postea apostema, deinde abicellum, tum ulcus: ita ut ex gibba ejus parte esthiomenata tum gangrænata, sanies ad partes circumstantes fluxerit, & partes adiacentes, ut costas ipsas, esthiomeno infecterent: Et quia ingens fuit abicellus, etiam in parte concava, facta disruptione pus etiam defluxit in capacitatem ventris, intestina tum omentum ipsum ac peritonæum inficiens: Diaphragma tamen nullo modo læsum spectabatur, quare & mente consistit per totum morbi decursum, nisi paucis horis antequam more-

retur, cum falso imaginaretur se cerevisiam coquere. Solent enim moriari, ut longa observatione animadvertimus, plerumque ea imaginari atque facere, & illas actiones obire quas in vita maxime exercebant. Idem ibidem.

Febre magna sub noctem intensâ Galenus 1. aph. 12. ait morbo lateali & phrenindi magna ex parte per tertium diem accessiones fieri: Suppurationibus autem quæ ventri eveniunt, aut hepati & ribi, quotidie & magis ad noctem: qui vero ex liene laborant, & omnino exatrabile, per quartum. Cum empyematicis Febres sub noctem ingravescat vide lib. 1. Tit. de Phthisi §.

§. 7. Puer novennis, filius Dom. Bruyere Genevensis, strigosus, scabie diu infestatus, quam nec purgationes, nec usus feri lactis, aut alia præsidia delere potuerunt, Tandem mense Maio 1677. febre prehenditur continua, cum extremorum frigore, vomitu continuo ingestorum & dejectionibus crebris, imo cholera, unde ad marasimum intra quatrimum deductus, quarta dies illi lethalis fuit: Quæsitum à parentibus quæ causa fuerit morbi? Respondi cum Dom. D. Cramero esse inflammationem visceris alicujus naturalis aut plurimum, à qua instat cucurbitulæ raperetur calor exteriorum partium ad interiores, juvante penuria sanguinis in toto, cujus portio restituitur tota circa locum inflammatum consistere.

Quod superstes esset frater similiter macilentus, scabie quoque herpetis naturam millacei æmulante infestatus, operant Parentes dissectionem cadaveris, quæ die 8. Maii instituta est, me præsentem & D. D. Cramero: Referat thorace Pulmones flaccidi se exhibuerunt, exsanguis, paucum cruorem nigrum continentes: quorum dexter lobus costis & diaphragmati arctissime adharebat, sinister liber erat: Cor omni pinguedine exutum erat, marcidum, rugosum: pene nulla in pericardio aqua: Aperto abdomine, peritonæi & omenti nulla vestigia, intestina flaribus tumida: Ventriculus vacuus, parvus, vix ovum anatinum æquans; præsentium pluribus glandulis duris repletum: lecur magnum, aliquibus in locis parte convexa scirrhum, concava parte circa extremos lobos gangræna infectum à prægressa inflammatione: Cystis fellea insignis magnitudinalis, viridis coloris, tumida, ovi gallinacei mediocris magnitudine: quæ dissecta effudit bilem succo porri coloratorem, olei consistentia, unciarum duarum circiter pondere: Lien forma erat pene rotundus, sinistri ac jecur circa extremitatem infimam labe infectum: Renes ambo sanis sed majores naturalibus: Cætera rite se habebant. Per sanitatem paucissime edebat, ob angustiam scilicet ventriculi nativam, qui rotundus erat. Vide Gal. in arte parva.

§. 8. Domina de Bobigni, cum per annos aliquot sensim atque paulatim emacruisset, omne alimentorum genus fastidivisset, & ut loquitur Hippocr. Σύντονος ἔχουσα τὸς πύλινους,

tandem repente ac inopinato est extincta, ac cum cibum nec esaperet nec appeteret (apud Hippocr. autem *καταψαλναι* significat cum aliqua appetentia accipere) quotidie vivendo moriebatur & moriendo vivebat, prehensio est paroxysmo febris Tertianæ typum referentis: tertio post die idem paroxysmus, à quo revaluit & fuit *αὐτοψαλναι*, & habebat more solito, locum & deambulationem cogitans: At accessit rigor *αὐτοψαλναι*: Tertiani & tertii paroxysmi: fuit rigor ingens & tantus ut ab eo non potuerit, ut loquitur Hipp. *ἀναψαλναι*: Totum erat sane *ἀναψαλναι*, interna conflabant incendio: sequenti die fato concessit: conquirebatur maxime de dolore ad hypogastrium.

*Invenitur aperto cadavere Pulmo aliqua ex parte inflammatus, Epar exsiccum & mali coloris: Sed uterus erat corruptus & quasi gangrena affectus, plenus tabo & sanie, quæ erat durior.* Maritus per tres annos fere abstinerat à congressu: forte si ager fundusque cultus fuisset melius cum ea actum foret: laborarat olim *πρὸ γυναικὸς*, qui erat tetri odoris, aliqua ex parte & fere omnino suppressas erat: Interit fere à veneno interno & genitivo: Hæc cum alias secundanda esset; (quod mirum) eum formellam conceperat, fluctabat ista materia, etiam copiosa: cum marem, aut minor erat aut fustebatur. *Jacobus Thewart Nota. 2. in cons. 96. lib. 3. Conf. Ballontii.*

**P**ulmo aliqua ex parte inflammatus, sed uterus corruptus. Ob duplicem focum febrilem febris redditæ est intensior, alias ut notat *Ballontius lib. 2. Epid. p. 122.* cum partes principes laborent *διαφθορῆς* febris maxima ex parte est veluti levis & symptomatice, ægrique incantis medicis eripiuntur: Quo modo *Condei Principis* uxor à partu interiit à corruptione uterorum, quod non animadvertierunt Medici: Hippocr. l. 1. de m. mul. hoc animadvertit, qui non requirit febrem ardentissimam in morbo uteri per corruptionem: imo ait *αὐτὸ βαρύτερον* i. e. blandus mixtis & debilis calor est.

*Uterus quasi gangrena affectus*) Quæ sæpe sequitur illius inflammationem à subsistentibus lochiis, & sanguine intra uteri fungosos parietes concluso: tunc remanet tentus uterus ac durus, non secus ac si contineret adhuc factum: Eo in casu *Fernelius* è brachio detrahit sanguinem: *Pareda* monet considerandum non unde fluxit sanguis, sed in quam partem influxit, & proximam venam secare jubet. Reverta nihil & securus est è pede mittere, ut irriteretur uterus ad excretionem istius sanguinis putris & lechiferi. *Riolanus Encheir. Anat. cap. 36. lib. 2.*

## OBSERVATIO LVII

*Pueri Febre maligna affecti viscera vitalia & naturalia varie affecta fuere. 1. Mulieris ab eadem extincta Pulmones putridi, Hepar inflammatum ac ventriculi tunica interior, Ileum intest. ex parte gangranosum. 2. Febre maligna ut plurimum ab inflammatione ventriculi & viscerum pendet. 3. Maligna, putrida & hectica juncta à Pulmonum vitio, Iecoris, Lienis. 4. In Puella à febre maligna mortua, Ventriculi vitium notatum, Hepatis, Cystis felleæ, Intestini recti. 5. Febre maligna in Thorace sedem habens, cujus cavitat aqua putrida, subnigra plena, Pulmones unius lateris & pleura corrupta. 6. Febre maligna à multiplici viscerum naturalium & vitalium vitio. 7. Ab inflammatione, hinc necrosi eorundem omnium viscerum. 8. A veneno exorbito, viscerum prope omnium naturalium corruptionem inducente. 9. Febre maligna ab inflammatione Renis sinistri, nigredine se prodente, spinali medulla communicata. 10. In pluribus partibus quorundam à febre maligna extinctorum Vermes deprehensi. 11. A febre maligna morsum habuit omnia viscera nigricantia, sphacelata, ventriculorum putridum. 12. Alium ventriculum pustulis plurimis conspersum. 13. Alium in cysti felleæ calculos. 14. Feb. maligna ab inflammatione plerorumque viscerum. 15. A vitio ventriculi & Iecoris post venenum assumptum. 16. Ab ardore febrili in malignis aliquando sanguis concrevisit in venis. 17. 18. Aliquando fluidus permanet. 19. 20. Calculi in vesica fellea febre maligna laborantis. 21. Ob ventriculum cordis dextrum extraneo corpore repletum, Sinistrum ex parte. 22. A Pulmonis & Lienis sphacelo, quorum sola tunica superflua: Ubi industrii Picoris industria cerebri conformatio describitur. 23. Malignus morbus, pustulis malignis infra mammillam sinistram se prodens, Ob labem Iecoris maculis luteis conspersi. 24.*

**S. I. F**iliolus septennis J. L. Baronis de Himton. ob varios in victu errores, doloribus intestinorum jam pridem obnoxius, Novembri elapso vomitionibus porraceis, alvi fluxu putrido, æruginoso interdum & variegato tentabatur; febre insuper exacerbationibus sub noctem cum anxietate, morfu ventris, nausea, stridore dentium, frigore extremorum, & siti inexplebili stipata: Per totum morbi cursum intractabilis pessime se habuit ad oblata, medicamenta pariter & alimenta, solis gelatiæ ex C. C. & rasura Eboris in ecrevisis tenui solutis refocillatus, quas etiam sæpissimo, præmissis ructibus aliquot acidioribus, anxius extomachavit: Fauces interim aphisis & albicantæ mucilaginis usque ad linguæ radicem conspuebantur. D. D. *Meera* memorata symptomata & una cum materia membranosa rejecta de phlegmone & sphacelo ventriculi hesitantem tenuerunt. Eam tamen non esse ex nobilitate partis affectæ, morbum tam lethalem in tot dies productum ferendo imparis, ex partium

necessario consentientium incolumitate, ex euphoria denique ad ejectionem consequente, passus est sibi persuaderi: Ob similitudinem potius substantiæ, materiam jam prope lumbriorum formæ dispositam, vel forsan particulas esse lumbriorum putredine fractas coniecimus. Circa 8. morbi diem aacerisus sum, consentiente autem D. D. *Meara* ad expurgandam morbi mineram in primis viis malignitate vermiformi putrescentem, infusum Rhei mane exhibetur, coctione quadam in urinis apparente: ix. quo septies ferebatur alvus, excretionibus summum incendium redolentibus, sub nocte tamen ingravescebat febris consuetis stipata symptomatis. x. Summo mane substantiam quandam nigricantem, viscidam & quasi curiformem summa cum inquietudine evomit, ex quo sedatior aliquantulum ad somnum se composuit: nox eadem: xi. delirus in lecto contineri noluit, laudano vero opiato sub nocte consopitus sibi restitutus est: xii. consimilis materiæ semel ac iterum cum priori molestia portio efficiebatur. xlii. xiv. Nausea, vomitus & diarrhœa aliquantulum sedabantur, ita ut appetitu quodam ad iuscula incitari videbatur: Exacerbationes nocturnæ omnino cessabant, nisi quod pro stridore dentium narium pruritus continua scalpendi impetu urgebar. xv. Sedatis igitur symptomatis, discessimus, Pharmacopœo interim iunctis consiliis infusum rhei repetendum cardiaca, aquam deinde caponis cum scobleboticis destillandam ad fereula ordinaria curavimus: xx. alvus decies dato pharmaco ferebatur, nocteque sequenti resocillatus maliculus curæ à Pharmacopœo tradebatur: Ar, quod per diem unam vel alteram delirium venenum jam tandem majori cum ferocia excanduit, ita ut perseverante fluxu, rebellis & colliquativo, emaciatus ad marasimum ducebatur: xxvii. denuo vocatus, in tam stupenda macie, quâ potui diligentia viribus incumbere, cæterum de felici eventu omnino despondens, in morbo pariter ægro intractabili, modis tamen quibus licuit omnibus contendimus: cataplasmatibus præsertim, anodynis & roborantibus *οὐ καὶ τὸν ἀποφαινοῦν τὸν ἐν τῷ μυνίμῳ* muni-mus, sine pricis exanguem reficimus, præcipue laudano opiato tanquam sacra anchora hæremus, alius quo continuo egerendis conatu farigato, vel minimas parate inducias impossibileduximus: Hisce tentatis, alvus supra quam sperari potuit denuo sistitur, regio abdominis mollior & plenior assurgit, excrementa, quæ bis tantum vel ter in die deiecit, coqui parumper & ad mediocritatem quandam reduci videbantur, perseverante tamen nausea & rerum omnium fastidio, seseque per intervalla prodit pestis cum fluxu bilioso, sincero, pingui, spumoso, fortido conspicua & ipsissimis visceribus radicitus impacta: xxxvii. materiam jam quarto ver-miformem rejecit, unde continuo in pessum euntibus novo opus esse consilio, si quicquam adhuc superesse remedium speraverint, propono: xxxvii. Glar. D. *Dikes* accessus, vix dum audita historia conceptæ opinioni de morbi causâ calculum suum adjecit, de prognosi autem paulo confidentior, fluxum istum perniciosum nec frænari posse nec debere pronuntiavit, nec exangue sceleron renutriti, nisi veneno in ipsâ culina & organis nutritam inservientibus hærente per cathartica profligato: Vicit viri sententia, feliciori forsan omine obeunda in principio morbi & constantibus viribus, ubi nec macies, nec facultatis lapsus cæteris omnibus intentionibus ingentibus præpolluere: Eadem nocte Merc. dulcis cum resina Gialap. in syrupo garyophyll. propinabatur: sequenter deiecit fœtida & pinguis sine evidenti virium ruina, de vermibus autem sollicitus, eosque medicamento parere nullus dubitans, repetitionem hortatur pulveris & infusionem hydrag. vice Julapii: xli. Summo mane sub priori regimine administratur purgans urante, sed in minori, ut par fuit, quantitate & minori molestia: sub nocte levi deliquio, tremore manuum & motus impotentia affligebatur: hinc vino albo Valleriolæ concessio, & laud. op. gr. i. ad ulteriorem spirituum dissipationem præcavendam, somno se commisit: xiv. sub mane, sudor diaphoreticus tempora & frontem occupavit, qui post horam unam vel alteram laxatis spiraculis, per totum corpus calidiusculas erupit, sub vesperam, recreato parum & ad motum habiliori, carnes vitulinæ (poscenti sane) offerebantur, quas tandem succo spollatas exspuit, noctemque sentit insperato prægressis auspiciorem, cessante forsan natura & indomitæ pesti succumbente: xlv. Hæc interim tanquam læta auguria D. *Dikes* una cum Illust. Patre in ulteriores erigunt tentamina: Sub nocte reperitur pulvis compari regimine, minori tamen evacuatione, pita urna natura penitus deficiente nihil ultra periclitari placuerit, præsertim Doctore se subducente: xlix. Mane sanguis tenuis & ichorosus, tanquam ex liquamine Pulmonis, reciprocatione spiritus per asperam arteriam in os ferebatur, linteis intro-missis emulgendus: hora 3. pomeridiana frigidum & exangue simulacrum tanquam exuvias deposuit Nobilis infans.

in aperto eadavere, rudi & in exercitata manu aperto, quæ observari potuerunt hæc sunt 1. Eechymomata circa musculos transversos 2. Peritonæum nigricans & putridum 3. Omentum sicut & mesenterium extenuatum & omni pinguedine spoliatum, 4. Ventrículo laxus & inan-is. 5. Intestina flatibus distenta, pellucida, excrementis vacua, internis quin etiam tunicis & fibrarum omni genere exuta 6. Ileon colore flavo variegatum 7. Epar in parte concava lividum: Venucula fellis quintuplo quam par est tumidior. 8. Pulmones exusti, aridi & mucagine alba ob-duci

ducti 9. Cordis ventriculus sinister sanguine grumoso repletus. Io. Venae majores vice sanguinis sero repletæ. D. Bidgood in hislor. rarioribus Edmundi de Meara, p. 161.

Quia diffidium fuit inter dictum D. Bidgood & D. Meara circa idem morbi, hic controversiam natam fuisse placet, Ego sane ( *sic Edm. Meara* ) Cùm conspexissem dejectiones fetidas pingues, cum obscuro vixore nigrescentes, nec non materiam vomitu rejectam carnis putridæ ac nigricantis frustulis frællimâ, fateor me non tam hæsitanter quam confidenter pronuntiâsse Nob. Præter corruptum fuisse phlegmone & sphacelo, vel ventriculi, vel alterius culculipia in visceris ventriculo vicini, cumque in consensum trahentis, unde frequens nausea & pertinax anorexia: Sed quum aliis aliud videretur, & considerassem signa abscessuum in visceribus lactantium non semper esse ostensiva, ac promptum non esse partium substantiarum puritagine liquecentem à muco vermiformi, vel materia in vermes abiuta distinguere, nonnullaque in hoc ægro symptomata conspicerentur, non minus affectibus vermiformis quam viscerum abscessibus communi, statui nec meis voris, nec aliorum placitis pertinaciter obniti, sed quæcunque rationem, quantumvis ambigam, unde aliqua spes salutis, (quæ in viscerum sphacelo nulla est) affulgeret, amplecti, præsertim quum ægri vires nondum concidissent penitus, ideoque omnino descendius non videretur: quare ut morti, alias inevitabili occurreretur, elminthagogis consensui: Quam rectè autem conspexerim viscus aliquod puritagine conceptisse satis est indunt multa à Dom. Bidgood in cadavere annotata: Quid enim aliud arguant epiploï & mesenterii absumptio, cavorum hepatis livor, peritonæi nigrities & putredo, musculorum abdominis fuggillatio, nifio mentis & mesenterii corruptelam hinc ad cava hepatis, inde ad mesenterium & abdominis musculos serpentem? hæc autè à vermis non processisse testatur ipsum interaneorum stabulum à putredine immune, & nulla in eo vermium aut vermiformis materis inventa vestigia: Quare non possum non mirari D. Bidgood, hanc observacionem testem ocularem, adeo adhuc de morbi causa ambigere, ut videatur dolere elminthagoga à D. Dike administrata tempestivius, h. e. in morbi infirio, non fuisse exhibita: In omenti enim aut mesenterii sphacelo, quid obsecro præstitisset Mercur, dulcis cum resina Galapæ, etiam constantibus viribus exhibita, nisi ut mortem properantem acceleraret? *Hætenus D. Meara.*

*Responsum D. Bidgood.* Quam confidenter D. D. Meara de sphacelo ventriculi pronuntiaverit, diffidentis auguria de læto eventu satis abunde restantur: liberum autem sibi sit sua sui conjecturas optaverim tamen stabilliora in sui gratiam fundamenta quam quæ ex anatome defuncti ducebantur: Novit sane vir in præxi exercitissimus, morbi epigenesin ab essentia suis propriis diacriticis dicimere: quid aliud ex immunitate interaneorum, quibus nulla vermium aut vermiformis materis vestigia, colligi voluit? quibus datis propagata putredine partes vicinas corruptelam subire nobis quidem assensum videtur: itane vero ipsissimum interaneorum stabulum à putredine immune? quomodo tandem fibris & tunicis exuta, maculisque insuper variegata se videunda obtulerant, misera scilicet morbi una cum partibus exclusa, tæbe prius venenosa per plates septimanas liquaris? Non est igitur ubi nlerius Clar. D. misereur me in tam obscura & recondita morbi natura hæsitare, quin sibi potius suæque sagacitati plaudat, qui tam infallibiliter de morbo pronuntiat, cujus nulla dari signa ostensiva lubens proficitur. *Responsum D. Meara:* Confidentiam meam de sphacelo non ventriculi magis quam mesenterii aut alterius partis ventriculorum in consensum trahentis (quam urinam rationi nimis consonam non comprobasset Insuper Nob. Pueri obitus) & tæ probe nosti, & abunde restantur lrepe ad

D. Fowler paulo post discessum meum exarare, tum prognosticum de eventu morbi minus prospere, tum occasione tu me clam fuggillare solebas: Si autem teum fecitiora pollicente aliquando consentiret vilius sum, si ideo factum aerea significavi, & jam proficeat, tum quia non ignocabam latentium abscessuum signa non semper esse ostensiva, ideoque non oportere medicum prognostici nimis esse securum &c. Equidem in principio abscessum non sine causa mihi vilius sum suspicatus, de quo tamen ob nonnulla symptomata aliis etiam morbis communia ambigi posse non dubitabam. Jam vero, ex observatis in defuncti cadavere colligo abscessum non amplius probabilem sed plane demonstrabilem esse: nec stabilitatem quæro fundamenta quæ ex dissectione anatomica eruta sunt: abscessum quidem omenti & mesenterii investigatio viventibus ægri medicos exercitissimos diu teneri suspensum, in defunctis obvia est & perfacilis: Enim vero imponit mihi Dom. tua, dum ait me infallibiliter de morbo pronuntiare, cujus nulla dari signa ostensiva proficeat: Dicit, fateor, abscessum in visceribus latentium signa non semper esse ostensiva: atque hinc rectius collegit Dom. me insinuare voluisse ejusmodi abscessum signa, licet non semper sint, esse tamen aliquando ostensiva, prout revera accedente dissectionis luce anatomica innueneri viscerum abscessus, quorum in vivis nulla fuit suspicio, ad oculum non raro monstrantur: Hinc ego me rectè collegisse arbitror mesenterii & omenti sphacelum, non autem vermes, morti Nob. Pueri occisionem præbuisse quum in intestinis & ventriculo nulla puritagine aut vermium, in mesenterio & omento luculenta apparerent vestigia corruptelæ & spædi, hinc ad peritonæum & abdominis musculos, inde ad hepatis cava serpentis: At tu sis me concedere corruptelam alicujus organi partes vicinas propagata putredine subire posse: Fateor, sed nec fallus sum, nec fætor, membrum incorruptum & putredinis expert, qualis fuerant hujus ægri ventriculus & intestina, partes vicinas propagata, quam non habebant, putredine corrumpere potuisset: Tu quidem in histologia, intestina fixis ac runicis exuta fuisse dixisti, quæ facile in distorto sunt à transitu materis purulentæ ex mesenterio & omento puritagine liquecentibus, salva & integra intestinorum substantia, abradi & absumi potuisse non disceat; at quomodo eadem substantia integra & incorrupta, materia vermiformi illic contenta, mesenterium, omentum, peritonæum, abdominis musculos & cava hepatis ita corruptum pere potuerit, ut necrosin & sphacelum illis induxerit? explicato arduum est: hunc nodum me prævidi sagacitas, propterea que in chistula data addidit intestina inter dilectanum maculis variegata apparuisse: Ego hic, ne quid gravius dicam, candorem in te desidero: In clara morbi historia dixisti intestina vasa pellicula, de maculis altem silentium: cur jam maculis variegata prodeant, facile est citra virgulam divinare.

*Facies æthiops & albicans maculagene &c.* [Quam] doque in febribus, ac præcipue circa eorum declinationes contingit lingua, palatum, gingivas, imo totius oris & gutturis cavitatem, materia viscosa, albicante & velut quadam crusta oblitari, quæ sæpius deserta, statim nova repullulat, & si diligenter os fricando & colligendo, crustola hæc materies crebra vice abstergetur, suffocationis periculum ægri non raro subeunt: Ejusmodi affectus recens natis sæpiissime excitatur, solent enim plerique intra dies xiv. effervescentia extrema, cum maculis latis & rubris per totam cutem fundidi: Quod si hæc tubonis suffusio minus liberè erumpit, aut debito citius evanescit ut plurimum crusta hæc albicis in partibus oris succedit: Hoc symptomata, quando hoc ritu infans molestat,

molescat, lactis visio solet adscribi, ut pote quod acriminis affectionem otis ulcerosam indicat. In febricitantibus idem vaporibus crassis & fuliginosis à ventriculo elatis vulgo tribuitur. Mihi autem verisimilius videtur quod in utriusque affectus hic à totius sanguinis, (& forsitan aliquatenus humoris nervosi) imparitibus circa has partes depositis oriatur: etenim quoties in utriusque humoris massa aliquid extraneum intus confusum continetur, quod nec sudore sit dissolubile, nec per vias facile amandatur, illud sepiissime cum serosa collavie circa os desigatur, unde affectus catarrhales, tumores, spurationes molestæ clementer enim pro malitiosa ciborum humorum salivalem hic loci uberem insensendi debet, per patentes hæc & assuetas excretionis vias, natura sæpe quod superfluum est, aut aliis molestis fœces amandare nititur: hinc à mercurio exhibitio, cū & tunc, & succos nervosus, particulis ejus minutissimis dissilvis abinde referuntur, easque sero obvolutas excretione moluntur, quia nec per urinas, sudorem aut alia via metuentia hæc corporiscula intus confusa exterminare queant, quod reliquum est per arterias, alioquin ductus, qui salivam ori suppeditant, eandem serosa latice obvoluta expellere nituntur: Patet etiam in febribus, cū à longiori sanguinis deflagratione materies adusta plurimum congeritur, cujus non minimis pars post cilsin residua, adhuc citius & succo nervoso confunditur aut cetero aliove loco defixa ab eisdem diutius resorbetur, probabile est quod hæc materies diuturna coctione pessetetur, adeo ut fere glutinis instar crassescat, quare nec sudore, nec transpiratione insensibili dissilabilis, nec per vias urinae excretui habilis, quod demum arteriolis

aliisque salivæ ductibus in palatum desilientibus, (ut pote vitæ excretionis via) sensim emeret, & protinus præ crassitie suæ in lentorem lapsum concretæ: Eadem ratio tenet de Infantibus, quorum sanguis à cordibus in utero contractis impurius factus, statim efflorescentia exterius facta depurari solet, quæ si ob materis crassitiem haud rite succedat, statim hac via, velut potentiori, impurioris vilcose exterminantur: Novi quendam in declinatione febris, cui non solum hujusmodi lentoris incrassatio in partibus oris succedit, verum salivatio copiosa, velut ab assumpto mercurio, cum fœtore anhelitus; item linguae & gingivarum intumescencia per plures dies ciebatur. *Thomas Willis lib. de Febribus cap. x. §. 1.*

*Fœces intus aphthæ* ] ex plurimorum sententia causæ Aphtharum sunt defluxio & capite quasi stillante. Rectius sentiunt qui eorum originem ex humoribus fetolis & actibus in toto corpore redundantibus, tanquam causa antecedente deducunt: Sic aphthæ luis venereæ loboles ex mæsa sanguinea veniunt, tanquam ejus retinimento, nec à cetero atcessunt.

*Premissi ruitus acidioribus* ] Hinc Sylvii de le Bæ sententia firmari videtur, qui à succo Pancreatico acidior, vel vomitu excreto, vel per halitus assurgente Aphthas produci censet, præsertim in Infantibus, qui acidum ex ore spirant, tormina patiuntur, lac concretum sursum ac deorsum excernunt, alvi excrementa vitidia & acidum odorem habentia dejiciunt, denique insulsi epilepticos sustinent à redundante & vitioso succo illo pancreatico.

§. 1. In sede febrium facio cum Sylvio esse intestina tentia: Id sensus docet, exempla obvia sunt, unum communicabo ex schedis paternis, Mulier germana Patavii, robusta & corpulenta, nonnulli pinguis, sexagenaria, nihil excrevit per alvum spatio novem dierum, nec clysterem admittere voluit: Incidit in febrem Malignam cum vomitu bilioso, motitur post bidduum.

Aperto cadavere pulmones fere putridi, Hepar parum scirrhosum & inflammatum, Ventriculi tunica interior inflammata, Intestinum Ileum in medio gangrenosum & putridum (ut ruptum sit inopinato ex contactu) tota pars, supra gangrenam ilei, inflammata intus in tunica interiore, ut supra modum venæ mesaraicæ magnæ & turgidæ fuerint: Pars Ileii inferior tota coadit, ut nihil pertransire potuerit: A quo succo ista inflammatio sit, sensu judicare non possumus, nisi faciem experientia sua præforat Magnus Sylvius, *Thomas Bartholinus cent. iij. Epist. 86.*

In sede febrium facio cum Sylvio esse intestina tentia ] *Clar. Sylvius Prælex lib. 1. cap. 27.* censet Febrem omnium continuam causam esse bilem aut lymphaticam (sub qua succum pancreaticum, ipsamque adeo salivam comprehendit, quatenus ipsa deferuntur ad cor) aut utramque vitiosam, & in dextro cordis ventriculo effervescentiam continuam producentem: Intermittentium vero succum Pancreaticum aliqua sui parte, in uno pluribusque Pancreatis ductibus lateraliibus obstructis, stagnantem, ac mora sua ibi actionem factam, atque acrimonia ista acida per pituitum plus

minusve viscidam & obstructionis causam, via vi parata penetrantem, ac in tenue intestinum effusum, vitiosamque ibi cum bile ac pituita effervescentiam excitantem, quæ ad dextrum quoque cordis ventriculum per intervalla perveniens, pulsus p. n. frequentiores inducat. Hinc, cum bilis, tam per mesium Cysticum ductum, quam Hepaticum, in Intestini duodeni finem, vel Jejunii initium deferatur, Pancreaticus quoque succus per ductum à Virsungio reperiatur, in tenue Intestinum hians, effundatur, merito febrium sedes Intestina tentia stantur.

§. 3. Credo Helmontio sedem malignarum Febrium esse in ventriculo: Id testatur Anatomie illorum qui eo morbo extincti fuerunt, Observatus enim est ventriculus cum Intestinis inflammatus: Unde ingens illa vis, vomitus, faucium ardor & alia appetentia oriuntur: Ex hujusmodi profecto sectionibus & oculari demonstratione certius de sede affecta indicamus quam rationibus & conjecturis. Firmat historia supra §. citata &c. Non abumilia vidit in dissectis febricitantibus. *Spigelius lib. 1. de semitertiana cap. 16.* Romæ infiniti agroti anno 1649. febre continua occubuerunt, in quorum scdis cadaveribus ventriculus & reliqua viscera tanquam exusta apparebant, teste *Panarello Pentecoste 4. obs. 8.* quare refrigerio & humectatione postea multos sanatos scribit. *Th. Bartholinus cent. 3. Ep. 4.*

§. 4. Nob. adolescens relicta Germania, Brixia ad diem 27. Junii anni 1572. in itinere alvus ei primum fluere coepit, idque durans per dies forte xv. debilem valde reddidit: Quo fluxu tandem cessante, iterum convalescit, nisi quod faciei color usque cineritius remansit: Porro circa



circa Januar. medium alvus ei strictior reddita, remansitque deinceps semper ita, ut nisi supposito adhiberetur rarius sedes haberet, forte tertio vel 5. nonnunquam etiam sexto die laxari prunorum atque passularum, uvarum doctarum non potuit; nihilominus tamen comedit multum & hilariter nullos sentiens dolores, aut capitis gravedinem ullam, victus ipse cum ceteris nobis communis; Ei vinum sine aqua, & extra prandium vel cenam nonquam bibenti, nec excessum ullum facienti, semper fuit gratissimum: Inguente ætate ei in facie pustulæ obortæ sunt rubicundæ; atque ad diem Aprilis 29. Febri tertiana duplici laborare cepit, à quo Doctorum auxilio mox liberatus nunquam satis feliciter valuit: Cenans nihilominus ac prandens more solito, usus subinde lactis sero usque ad decimum septimum Junii, quo denuo per integros decem dies incepit vi febris putridæ & hecticæ decumbere, ac Medicorum præscriptionibus parere, quoad 26. præscripti mensis, statim post solis occasum vitæ diem ultimum clausit.

Hujus igitur cadaver cum post horas x. vehementer intumesceret, nigerque sanguis e naribus erumperet, diversa suspicatus ut aperiretur omnino volui: Quocirca in aperto corpore primum Pulmones pustulis affecti, omnino putridi sunt reperi: Lien nigrior & grandior, Jecur ponderosum adeo & plane exsiccatum; Stomachus cum reliquis partibus purus & integer, continens adhuc aliquantulum brodii hordeacei, 4. horis ante mortem sumpti, apertum ex pus fetidissimum edidit odorem.

Cum igitur prædictus Nobilis ad minus mensibus novem semper maxime sobrie, imo fere maximo etiam excessu quam temperatissime vixerit, ab excell. Medicis causas scire desidero. Unde alvus adeo stricta permanferit; Deinde unde Jecur, unde Lien usque adeo affecti, atque pulmones tam valde putridi redditi sint, & unde mors ipsa provenerit, cum tam in ægritudine quam extra nullum commiserit errorem: ejusque optima habita sit ratio, victum quoque semper habuerit optimum: Nam aer hic Italicus morbi hujus causa extiterit, & an diutius forsitan in Germania vivere potuisset. Postremo quoque unde cadaver post mortis horam x. prius inceperit intumescere, & tantum cum maximo fetore nigri sanguinis copiam per nares ejicerit, &c.

**D**E affectibus quos passus est Nob. Juvenis, de illius morte, necnon de iis quæ post mortem sunt subsequuta, ut ex arte loquamur, hoc unum in primis statuendum est tanquam manifestum & confessum, juvenem hunc à primordio generationis inæ Jecur calidissimum habuisse, caput vero humidius, & pulmones satis imbecilles, matrem non usque adeo sanam quo factum est ut Jecoris caliditate humor melancholicus in diem magis magisque augetetur, iode obstructions, & propterea etiam caloris incrementum, ex quo Jecinoris incendio omnia mala tandem sunt subsequuta, Etenim Gal. 6. de diebus crit. 3. & 1. de loc. 7. dicebat Affectio jecinoris sensum animæ, moraque temporis lesionem in alimento percipere & calorem contrahere: quare mirum non est si ex generatione humoris melancholici, & propterea frigidi alimenti, color ille lividus & cineritius exortus est: Siquè ex multis obstructionibus Jecur exaruit & Lien humidior factus est. Etenim cum plurimum sanguinis melancholici generaretur, atque ad lienem transmitteretur, neque virtus lienis tanta esset ut humorem illum distribuere aut absorbere posset, hinc Lienis tumor subsequutus est: Et hanc esse causam putamus cur Jecur siccus, ac veluti aridum in cadaveris sectione observatum sit, & lien humidior apparerit, quod 2. loco quærebatur: Hinc etiam apparet causa cur post alvi profluvium alvus adstricta permanferit: Etenim sicuti alvus fit humidior quando cibis in chylum conversus parcius distribuitur in Epar, sic rursus siccior & adstrictior redditur cum omnis humor in ea contentus ad Epar ferretur: & si citi parcius distribuitur, vel quia plus assimilatur quàm in Epar indiget: vel quia citius trajectur quam Epar attrahat, idque vel ob multitudinem bilis expultricem irritantis, vel propter alvi vim retentivam debiliorem: sic omnis humor ad Hepar ferretur, vel quia minus sumitur quam Epar indiget: vel quia Epar sui caliditate citius attrahit quam par sit, & omnem chyli humiditatem absorbit, imo propter obstructions venarum Epatis ad intestina bilis non transmittitur, cujus causa facultas ex-

pultrix proclitatur, atque propter caliditatem & siccitatem Jecoris, intestina quoque sunt calidiora & sicciora, & ob id ad retinendum robustiora, ut mirum non sit si in hoc, Nob. Adolescente, præcedente alvi profluvio, subsequuta sit alvi adstrictio, non quod cibis plus jecto fuerit substractus, sed propter jecinoris caliditatem & siccitatem, quæ omnem fere humiditatem absorbens, adactam fortasse propter obstructions quam carabillis quoque transitus ad intestina fuerit impeditus, & vis retentiva intestinorum facta fuerit robustior & siccior, & hæc uti arbitramur, est causa illius quod primo quærebatur: Quod vero & humorum exulsi, cum quadam pravitate in corpore conjuncti, fuerit in causa ut pulmones putrescerent, ex hoc facile conjectari licet, quoniam fieri potuit, ut vapores & pravi succi in caput delati, cum in optimum nutrimentum commutari non potuerint, ob humiditatem capitis compuruerint, qui ad pulmones transmissi pustulas in pulmonibus excitarent, aut cum pulmones suapte natura imbecilliores extiterint, ob pravam alimentum pustulæ illæ fuerint excitatæ, aut utroque modo percepti fuerint: quibus pustulis excitatis, uti patet, febribus Maligna & fixa fuerit excitata, uti voluit Gal. in 3. Epid. 1. Hoc autem persuadete quoque videntur rationes & caratibus insignis qui apparuit, ut mirum non sit ob pustulas illas veneficas & malignas, quæ vitæ & materiam veneficam generarant, calor nativus pulmonum fuerit extinctus, unde putredo illa pulmonum insignis, & tandem mors per suffocationem est sequuta, quod 3. & 4. loco quærebatur: Quod cum ita sit, ut mirari debemus si post mortem intumuit, cum hoc sit opus materię veneficæ, in iis præsentem qui per suffocationem pereunt? Quoniam humores & spiritus à proprio principio in materiam deleteriam revocati, liberi & soluti, quin imo ab eadem refugientes, quodammodo ad partes optimas delabuntur, & sic universum corpus attollunt, & ora venarum aperiuntur, unde sanguis effluere solet, quemadmodum in hoc præfati cadavere consigit, & cujus naribus sanguis niger & melancholicus,

lancholicus, & ob insignem putredinem valde foetidis effluat. Ex hoc est quod postremo loco in dubium vocabatur: Ut concludendum sit materiam hanc, quae febrem excitavit, & tandem mortem induxit, venesicam quidem fuisse, sed in corpore genitam, quod ali-

quando in corporibus male affectis contingere potest. Quare non acri Italico, non pravae victus rationi, non ineptis importunis medicamentis, non alicui causae externae, ed pravae illius corporis constitutioni malum hoc est adscribendum. *Consilium Scholaej exet.*

§. 5. Parentes Illustriss. Ernesti Nassovici Comitis filiae, annum vix egressae, 23. Junii 1655. per litteras conquerebantur, quod filia eusarum, florida & bene habens enormi diarrhoea correpta fuerit, altero die aliqua ex parte sopita, sequenti vero cum vomitibus recurrente largius: Advectus 24. Junij deprehendi duritiam in dextro hypocondrio, calorem totius p. n. sinum, pervigilias, capitis dolores, alvi excrementa alba, virium prostrationem, quibus 26. Junij supervenient Epilepsia finem vitae imposuit. Post obitum tota dorsi regio fuit nigra à nucha ad sinem spinæ dorsi, ventriculus vero in sinistra parte nigricans & quasi putrefactus, viridi humore refertus. Hepar scirrhum decem unciarum, Vesicula bilis grandior & nigra bile inflata: *Intestinum quoque nigricans*: Renes unciarum quatuor, bene dispositi & sani, ut & Lien, Vesica, ipsumque Cor unciae unius & dimidiae: Cerebrum vero librarum quinque copiosa aqua circumfusum erat, aderant ipsi pustulae aqua plenae: *Thomas Bartholinus, ex comm. I. Dan. Harsii, Cent. iii. Observ. 80.*

Parentes defuncti venenum fuisse propinatum suspicabantur, quibus manum nondum date potui, cum cordis constitutio reperta fuisse integra, nec videretur decessendum sit à causis manifestis & cognitis ad obscuras & dubias: sufficiens enim videtur scirrhus Epatis ad vitium debilitatem: bilis quoque copia in ventriculo retenta & concervata, ad exulcerationem & extinctionem calidi nativi atque exsiccationem humorum radicalis ipsa symptomata indicabant praesentiam bilis & motionem ejus, quae tanto deterior quanto magis recedit à naturali colore, uti fuit reperta praesina, viridiosa & atra, cujus exhalationes & vapores convulsionem, phlogosin & alia procuraverunt. Sententiam rogatus à Clar. Viro existimavi malignae febris

fuisse symptomata: Idem enim morbi quarto die ad exitum properantis id indicare & quod fere in malignis febribus ventriculus intestina &c. observentur laesa & inflammata: Oritur autem febris à bile, eaque à naturali statu declinata, propter Epatis scirrhum, sine dubio conatum, quo transcolatorium ejus *mannu* fuit interceptum: Epilepsiam vero à bile suscitari *Averrois* comprobat, & à maligna venenaeque qualitate *Fernelius*. Frequens sane id symptomata febribus malignis, praesertim in teneriore aetate.

*Intestinum vilium nigricans* [Idem quoque *Cent. iii. lib. 2.* notat intestinorum nigrotem familiarem esse illis quos malignitas aliqua jugulavit.

§. 6. Virgo 31. annorum integro biennio ante mortem laboravit copiosissima narum haemorrhagia quae non nisi venae sectione sisti potuit: paulo post incidit in cachexiam & hydro-pis initium tumescentibus pedibus & ventre inferiore, remanente cachexia: Menses fuere inordinati, aliquando non fluebant penitus, aliquando nimis erant copiosi: perduravit tamen haemorrhagia, quae aeternis diebus crescebat, xiv. vel xv. die ante interitum corripiebatur tussi molestissima & sicca, nonnunquam quid foetidi exspuebat, sentit punctiones & dolores in regione Hepatis, vomebat bilem corruptam, prae sinum ac cum ea vermem oblongum aliosque similes vermiculos: Ego ad eam vocatus *deprehendi febrem malignam*, quam comitabatur subsequencia symptomata, delirium, vigilia, inquietudo, sitis inextinguibilis, vomitus materis corruptae, dexterae partis faciei resolutio levis, hypocondrii sinistri ac lateris pectoris sinistri maximus dolor ac aestus: Nulli laeti incumbere potuit, color faciei flavus ac subniger: urinae erant subnigrae, ex dextra nare frequenter per intervalla aliquot sanguinalis guttulae promanebant: Post multos perpeffos cruciatus morte occubuit.

Mortuam secuti, atque primo occurrit vena umbilicalis (quae in omnibus adultis manus ligamenti obtinet) sanguinalis copia turgida atque extensa; in quibusdam locis, ubi haec vena contorquebatur, instar varicum tuberosa: Hepar justam habuit magnitudinem, sed erat album, tuberosum, inaequale, durum & exangue, ut vix sanguinis guttula ex dissecto epate exierit, ex gibbo nihil, ex sinistram partem parum, Thoracis aspacitas dextra erat aqua subnigra & putrida plena, continebatque ejusdem aquae cantharus & dimidium: Pulmonis dextra pars in ea cavitate collocata cum pleura corrupta ac nigra fuit: Ventriculus micum in modum copiam fecum tum flatuum inflatus ac tumidus reperiebatur: laveni & duas vesicas urinarias, alteram naturalem & in sua sede collocatam, alteram ex matris collo dextro latere prognatam, naturali vesica duplo quasi majorem, lotio plenissimam & duabus tunicis, ut naturalis vesica praeditam: Hic nullus meatus aquam vel emittens conspiciebatur: Uteri corpus erat scirrhum callosumque reliquae partes satis integre apparere. Caput non aperui, *Valcherus Caeter libello observat. Anat. & Chirurgiae.*

Itaque inquirendum unde febris malignitas & pulmonis corruptio enata sint: hoc quaevis nolumus difficultatem habere videtur: satis enim notum est malos humores ad putredinem aptos, facile putrescere si visceri alicui calido impacti atque infarcti ventilatione destituantur: Porro acrimoniam putredinemque acquirere, quae continentia atque proxima, quaeque corrodunt putrefaciuntque, quae multo magis

faciliter.

facilisque contingit si hi humores ab initio acres fuerint: Idcirco nemo de hujus pulmonis corruptione & maligna febris, quæ ex corruptorum humorum malignis vaporibus procreata est, causis am-

bigere poterit: *Idem.*

Malignam febrem à vitio Pulmonis substantie oriri D. *Pavarrus* Pentec. 2. obs. 14.

§. 7. D. de *Malortie*, Viri magni in militia nominis, ætatis annorum circiter 42. continuè vomitibus per aliquot retro menses vexatus, qui nec bolis ventriculum detergentibus & aliis catharticis, nec corroborantibus internis aut externis sisti poterant, cum siti intensa, bilis copiam maximam in ventriculum confluentem indicantibus, sub finem Maii incidit in febrem quæ duplicis tertianæ, vel quotidianæ continuæ typum præ se ferebat, à multa biliosorum & pituitosorum humorum simul copulorum putredine: ex duplici Tertiana post octo dies facta est continua simplex: vomitus non desinebat; capitis dolor comitabatur & ardorem in lumbis percipiebat: Post injecta enemata emollientia & refrigerantia spatium dierum bis missus est sanguis ex cubito, qui pituitosus & crassus erat: postea hirudines venis sedalibus apposuit, quæ capitis dolorem & rerum æstum placarent, sed inflatur ventriculus dolorificè & hypochondrium dextrum, unde compatiens Hepate, & ad inflammationem tendente, sexta die auriginosus evasit, sed tamen absque febris remissione, quod juxta *Hippoc.* Aphor. 62. Sect. 4. perominosum est. Die 8. (cum septima sine evacuatione ulla critica effluxisset) purgatus est leni infusione rheï & aganici in aq. endivivæ, cum addita Elect. Cathol. 3ß & Syrup. ros. laxat 3vj. & conf. hyacinth. ʒi. ad vires respiciendo, quia pulsus erat contractus, propter oppositam naturam à vaporibus malignis, unde sese expedire non poterat nec explicare: Vires deinde cadentes subire studuimus aquis & pulveribus catdiacis, & præcipue lapide Bezoartico Orientali, variè & extra pastum, & in ipsis ferculis administrato. Non dabat magna virium prostratis insignibus sanguinis evacuationibus locum, pugnâvimus tamen cucurbitulis, venæ sectionis vicariis, ad partes infimas cum leni scarificatione, & citra illam, ad revulsionem vaporum malignorum à corde: Enemata frequentia in eundem finem, vel quotidie, vel altero quoque die injiciebantur.

Die nona obiit, Introspectum cadaver exhibuit nobis epiploon corruptum cum fibris non coherentibus: *Mesenterium scirrhosum in sui origine & corruptum, putrem lienum, Cavam epatis partem scirrhosam & inflammatam, Pulmonem*, quæ costas attingit, inflammatione tentatum, Pancreas putrefactum, Ventriculum pure repletum & in fundo pinita crassa ac viscida, unde vomitus illi pertinaces, lasardum: internam ejus tunicam aliquantum exulceratam, Nihil in renibus & ductibus urinariis, omnia inibi alias integra, sed absque sero ullo: Intestinorum internam tunicam eadem, ut ventriculi, nonnihil ulterius juxta abrasam & ad exulcerationem pronam. Sic in misero illo corpore *admirabile* fere reperiuntur, *Riverius*.

Cavam Epatis partem inflammatam. Pulmones inflamm. tentati Ex *Riverio* Prax. lib. 17. cap. 2. In febrium acutissimarum & perniciosarum curatione hoc diligenter advertendum rarissime eas fieri sine internis & peculiari visceris cujusdam affectione & plenumque inflammatione. Quare nun-

quam omittendam curam hypochondriorum, hepatis, thoracis, uteri, rerum & vesicæ, ut omni ratione investigemus quæ harum partium insignis laboraret, & ei quoad fieri potest subveniatur: Quod et *Vallesius* comm. in lib. 1. Epid. agro 1. desumpsit.

§. 8. Dux *Candeleus* obiit Lugduni xxvij. Januarij anni 1658. circa sextam vespertinam, extinctus à febre continua maligna: Postidie eadem hora dissectus est à Magistris *Regnant* & *Charavet*, Chirurgis, coram D.D. *Rhodio*, *Grassio*, *Guillemino*, *Garnerio* & *Falconeto* Medicis Urbis Aggregatis, atque hæc in cadavere adnotata. 1. Totius dorsii epidermis inflammata & ex dimidio divulsa; Ad partem lumborum infimam gangræna duobus in locis, unaquaque latitudinis semicoronati ægeatæ quam plurimæ minores circumcirca ambiebant. 2. Aperto espite, non solum cerebri meningis phlegmone tentatæ fuerant, & vasa plurimum distenta ac repleta sanguine adusto nigroque, sed & tota cerebri substantia, præsertim cerebelli, reliquis partibus magis inflammata cum siderationis initio. 3. Pectore explorato, musculi omnes phlegmone occupati & exsiccari comperti sunt, mediastinum, pleuram, septum transversum inflammatio quoque invaserat, necnon universos pulmonum lobos, parte postica sideratione omnino correptos: pericardium paucissimam aquam continebat: cor inflammatum, admodum flaccidum, quod immersum vini spiritui, in quo plurima aromata infusa fuerunt, cardica & putredini reluctanter, condituræ gratia, inde summe foetens exemptum est. 6. In imo ventre Epiploon corruptum apparuit, cum maximè intestinorum partis mesenterii & pancreatis inflammatione, 7. ventriculi interiorem tunicam phlegmone etiamnum invaserat, in qua alicubi conspicuæ maculæ lividæ, præsertim quæ lecur spectat, 8. cujus tota substantia inflammatione correpta erat & sphacelo tacta, præterea in tota parte cava. 9. Splen incensibilis

conceperat, in colore immutatus. 10. Renes quoque æstus notas præ se ferebant, & marcidii erant, Venæ omnes, cava & azygos sanguine destituta, 11. Exempta viscera & pelvi cupreæ imposita, horæque spatio tantum in ea derenta, eam decolorem & nigram relinquerunt.

§ 9. Ego subignatus certum facio me Romanolam venisse 26. Septembris anno. 1662. accersitum à D. Antonio Galian, morbo derento, febre scilicet continua molestis symptomatis stipata, nempe dolore continuo rotius ventris, accerbiori tamen ad hypochondrium dextrum: sicut inextinguibili, sudore frigido capitis & pectoris, vigiliis perpetuis, & caloris naturalis extinctione. A quorum symptomatum violentia postmodum circa vesperam extinctus est.

Die sequenti urgente Nob. Matrona Maria Chol, uxore defuncti Dom. Claudii Galiani, Romanolæ Domini, eadaver à Magistro Claudio Garnier Chirurgo, Cremis incola sectum, in quo partium nobilium insignes læsiones à nobis deprehensæ sunt & viscerum imi ventris, scilicet hepatis, lienis, intestinorum, mesenterii & omenti: Hepatis enim & Lienis substantiam putredine invaserat, extraordinario fœtore se prodens: Exulceratio aderat in intestinis, præsertim rectoribus, quorum unum exiguo foramine retundo rebratum erat, exitum materiz purulentæ, pulsi simili, bili commixtæ, admodum fœtidæ concedente: Omentum & mesenterium ardore rosta & pene putrefacta: E quibus enumeratis partibus compressione facta exsudat biliosus humor, à quo abdominis capacitas replebatur necnon à flatu odoris terribissimi: Insignis illa distarum partium intemperies, atque maligna corruptio, suspicionem faciebant morbum ab exhibitio veneno inductum esse, sed lente operationem suam exerente, cujus natura ab effectis demum intelligi potest, alienis omnino à morbis vulgaribus: Supra dicta vera esse assero, in quorum fidem nomen meum apposui, Montan D. M. Octobris 2. 1662.

**H**epatis substantiam putredo invaserat, fœtore se præ se ferente, 7. ad Febrem malignam pertinet febricula illa, quæ imperitis Medicis sæpe later, à Gal. 5. de Læss. cap. 7. descripta, ex sanguine sanioso in jecore ob imbecillitatem ejusdem genito, & postea ibidem putrescente, sicut in fluxus hepatici progressu aliquando evenit: Prava enim est casualisque sanguinis corruptio, quæ malignum vaporem exspirat: Hanc sæpe curavit olim Job. Prevostus, ait Vesichius in observat. Epistagmate.

§. 10. III. Comes annum ægeus 52. corripitur febre lenta assidua, horis vespertinis magis exardescente, ante 7. exhibetur leniens à Medico: loco venæ sectionis, admoventur sanguisugæ venis quæ in extremo ano sunt positæ, quæ interdum purgare consueverant, sistitur sanguis à Barbitione caligine pulveris aceto permixta, febris adaugetur, superveniunt maculæ in toto corpore latiores, violacei coloris, sensum & motum utriusque cruris amittit, lotium supprimitur 14. die obiit.

Dissecto cadavere intelligo renem sinistram compertum esse nigrum, & ab eodem latere etiam spinalem medullam affectam. L. à Fonte consult. 59.

**E**X propositorum accidentium diligenti animadversione pro certo habendum III. Comitrem ex maligna febre laborare, quam non vulgaris putredo pepulit, sed hostilis & perniciosa, eaque in humoribus alimentariis accensa, quamvis Medicus primo loco dicens vix febrem afficeret (quandoque enim febrem malignam cognovimus non facili est) quod accidentia quæ postea supervenerunt manifestè declarant, ut maculæ latiores rubræ, violaceo colore perfusæ id palam faciunt: Motus vero perditus utrinque cruris & coxæ, atque actio vesicæ ablata & perditæ non solum hæc in evacuationem venarum hæmorrhoidaliū, improprie ante venæ brachii sectionem administratam, sunt referenda, sed etiam in suppressionem earundem, ex caligine aceto acerrimo permixta factam: Sanguis enim ad partes superiores depulsus, malignam in tenuibus inflammationem produxit, quæ spinali medullæ communicata, posuit spiritum ac virtutis animalis infusionem arcere, quæ per propagines nervorum sexti

paris vesicæ impetitur, verum etiam ex medulla spinali, quæ partes inferiores lumborum transiit, excursit, ut vegetioris sensus compos effecta, ea quæ ex naturæ legibus sibi molesta sunt persentient, excutiat atque depellat: ita etiam precludit spiritibus ne fluant per nervos qui ad coxas & crura, ex infimis lumborum vertebriis, atque ossis sacri 4. foraminibus emerferunt, omnes fere in unum funiculum conjuncti parte posteriore, quæ coxa amplissimum gerit, in crura protrudunt: Imo & humoris repoli malignitate sentiendum est copiam spirituum dissipari, qui ad spinalem medullam & partes inferas delegantur. Idem.

Febre Lenta, assidua) Hinc patet errare Platerum dum negat à Renum putredine perseverantem febrem induci, quod portio putrescens minimè subsistat sed per urinam continuo disfluat: Nam à corrupta parte per venas, in sanguinis circuitu, vel vapor vel portio putrescens ad cor remeare potest unde febris generatio & augmentum, quod probant exempla adducta.

§. 11. Grassabantur febres malignæ perechiales in ebullitione Hafniensi 1659. intra & extra muros: Multi qui de dolore ventriculi conquerebantur, concitato vomitu, vermes spithamam longos revomuerunt, & febre extincta ad sanorum consortium redierunt; quod sæpe quoque in Nosodochiis sibi commissis observavit Exercitatus Medicus & Chymicus D. Absolvere Pagan. De verme admirando à dextra nare Nob. viri Cæsennatis post febrem acutam rejecto, legendæ disputationes tres apud F. Alfar à Cruce cent. 3. de quæsi. per Epist. Bartholinus cent. 6. hisser. 19.

Medicorum praeclarissimi tum fide digni mihi significarunt non unum vermem, sed aliquot, in hominis lenticulis extincti vel oppressi cerebro inventos, qui nam in cerebri substantia, nam in duræ matris sinibus lauerint, non sat scio: *Coiter in appendice observ. Anatom. & Chirurgic.*

Ex corporibus eorum qui febre Hungarica, Theriade mortui sunt, vermes nonnunquam confertim prorepisse animadverti sunt: Id quod experimento didici eum nemo subesse suspicaretur: Nonnulli crassi quidem sed non ita longi per aures prodisse visi sunt, quales etiamnum in Peste observavi, unde evincitur eosdem facile in seivissimis capitis doloribus, ex prava venonataque eluvie, quæ in cerebri ventriculis aliquibus coacervatur, nasci posse: Et dem faciunt Anatomici nonnulli, qui inibi conspectos deprehensosque testantur: quæ causa etiam fuit cur vulgus circa initia hujus luis febrem hanc Cerebri vermem multis in locis nominarit. *Conradinus cap. 10. febris miscell. Hungar. therioidis.*

Quidam Matronæ post capitis vehementissimos & diuturnos dolores, pestilentis hemitritzi, dissecta calvaria magnam putredinis vim ostendit circa substantiam cerebri, Et inter meninges rum vermiculorum tum cimicium incredibilem copiam. *Gemma in appendice oper. cosmocrit. de Hemis. pestilenti.*

§. 12. Iob. Jac. Heilmannus Med. & Chym. doctissimus historiam retulit de quodam febre maligna apud Germanos laborante, cujus nasi extremitatem rubra quædam macula obsederat, symptomatibus benignum quid portendentibus, nec cibi appetitu plane dejecto, unde certam recuperandæ salutis spem æger conceperat: Sed nox obitum præcedens sinistra portendebat, omnia quippe in deterius ruebant, ignis quidam internus viscera comburebat, cujus ardorem externo ac culinario igni nihil cedere ajebat, donec latius serpente veneno miseriam vitam cum felici morte commutaret.

Dissecto cadavere omnia viscera nigrescentia erant & sphacelata, quin & ventriculus ipse adeo computruerat ut sine ruptura & læsione digitis atrectari nequirit, quocunque enim digitorum artactu disrumpebatur, cavitasque relinquebatur manifesta.

§. 13. Post febrem ardentem passus est in Galliis recidivam Generosus quidam Polonus: Medici de recidiva consulti variis portionibus medicatis, venæ sectione & aliis remediis frustra contra prostratas vi morbi vires luctabantur, nam potiones omnes vel respuebat vel assumptas revomebat, unde satis cessit.

In aperto cadavere nullæ partes ullum vitium visæ sunt contraxisse, sed omnes nativæ temperiæ sanæ comparebant: In ipso tamen ventriculo pustulæ quamplurimæ hinc inde conspicebantur, quas à calore malignæ febris fuisse elevatas tanto minus dubito quod semper fere ventriculus in hujusmodi febribus vel escharam vel inflammationem, vel alia hujus ætus contrahat. *Th. Bartholinus cent. 3. hist. 92.*

§. 14. Patavii in collegium Anatomicum cadaver deportatum febre maligna extinctum, in cujus vesicula felleæ calculi in globum convoluti, instar globulorum asperorum thoracis inventi sunt: quibus fractis substantia piecem nigram æmulari videbatur, forte exhibile supra modum assata & inersata. *Ex observ. Iob. Bilgeri Medici Campodunensis ad Greg. Hortium Tom. 1. p. m. 142.*

§. 15. Mulier spatio novem dierum nihil per alvum excrevit, quæ tandem in Febrem malignam incidit: Pulmones fere erant putridi, Hepar parum scirrhusum & inflammatum: Intestinum ileum in medio gangræna obseßum, cum inflammatione in interiore tunica. *vide tit. de ventris dolore lib. 3.*

§. 16. Agnovi virum qui uxorem reliquit, & ab ea se separavit, & dedit ei venenum, quo facta est Tympanitica, & supervixit paucis annis forsan sex aut septem, & ego curavi eam, sed sanare non potui: Iecur autem per venas corrumpit colorem linguæ & perducit ad lentas febres, & morbum facit similem naturali: Et ego vidi Hieronymum Bertolinum ita laborasse quasi esset amphimerina, sed quia eo pervenit ut lingua esset omni fuligine nigrior, & adeo aspera & arida ut appposito orichalco non posset avelli, ideo exstimavi esse venenum: Eoque dissecto apparuit ventriculi imum quasi excoelatum, & jecoris superficies tota convexa nigerrima, *Cardanus lib. 2. de venenis cap. 1.*

§. 17. Vidi aliquoties in febribus ardentibus malignis concretum sanguinem intra venas, instar medullæ sambucinæ, quod observatum fuit à *Fernelio* in Physiologia. *Riolanus Exercit. Anat. lib. 2. cap. 27.*

Similem sepe numero ex venis maligne febricitantium se collegisse affirmat *S. Pauli Digress. de Febr. malignis* §. 80 adeo dissimilem florido & naturali sanguini, vix ut duodecima illius pars sanguinem, cuiusque crassum saculentumque repræsentaret, valde rancem & glutinosum, sero omni carente, ita ut rotare vata & invertire, quibus exceptus erat

sanguis, licuerit: Ejusmodi sanguis ardore fit, et *Lindeus in Selectis pag. 644.* depascente quicquid est chymosi in massa: Piceus vero, cum igne contritum oculo, quasi cineris dolosi: Tunc vero nigorem concipit exustione biliosi, lentorem vero excoelatione fibrosi quod in eo est.

*A Fernelio (C.) lib. 6. Physiolog. cap. 7.*

§. 18. Vidit Dom. *Paylon* doctiss. Medicus & Anatomicus Parisiensis, in juvencula mortua febre ardenti, sanguinem concretum intra venas, à claviculis usque ad inguina: & intra arterias sanguis coneretus erat similis sebaceæ substantiæ, sive medullæ sambuciæ porose similis: *Riolanum in fine Anthrop.*

§. 19. Sanguinem in cordis ventriculis & vasis majoribus fluidum, nec post obitum grumescentem in cadaveribus febrî continua defunctorem aliquoties, & nunquam v. f. emissum febre maligna ægrotantibus observavi. 1. *loc. Vespertini Exercit. de Apoplexia. p. 429.*

§. 20. Non solum existimamus eum aliis medicinam facientibus, vivorum pestiferorum sanguinem extra corpus manere fluidum, sed etiam peste extinctorum in corpore similem fluiditatem servare, Quemadmodum hoc semel per experientiam didicimus. *R. de Graaf de Saco Pancreatico cap. 8.*

**S**i inquiratur quas mutationes in substantia, aut consistentia sua sanguis veneno infectus subear, ut propere vite sustentandæ minus idoneus reddatur? Respondeo, venena quædam sanguinem fundunt, ejusque ferositatem nimis præcipitant, ut sunt pharmana, quæ vel purgatione deleteria, aut urinae profluvio, aut torus intumescentiæ, vel discoloratione, vel pustularum eruptione plurimam ferosi latius secretionem faciunt: Interea magna ebullitio cinoris massæ inducitur, quæ spiritus vitales valde disperduntur, sal s & sulphuris particule à coctione nimis exaltantur, & sæpe afficiuntur, ut ideo Ictericia aut flava aut nigra inducatur: Sunt alius generis venena longe periculosiora, quæ *Sanguinem congelant*, ejusque mixtionem destruendo corrumpunt, scil. massæ sanguineæ primo congelationem, deinde putredinem inducunt: cum enim spiritus cruoris è veneni contagio profligati dissipantur, liquoris mixturæ aquabilis solvitur, quare particule crassiores se mu-

tuo implicant & (instar lactis ab infuso coagulo; aut spontanea acicentia) invicem coagulantur: hinc cruor in vasis grumescit, ut minus prompte in his circuletur: Hujus portiones coagulatas, interius in cordis sinus delatæ, illic stagnare aptæ sunt: adeoque crebras syncopas & leipochymias patiunt; exterius advenit, & intercirculandum in cute defixæ, modo uberius congestæ, per totum corpus nigredinis suffusionem inducunt: modo parcius dispersæ maculis tantum, aut vibicem instar stigmata purpurea, cæteraque malignitatis phenomena efficiunt: Sanguinis autem coagulatio ipsum ad putredinem seu corruptionem cito deducit, uti videre est in sanguine extravasato, qui cito nigrescere & putrescere solet: Etenim spiritus exhalato, in cruore residuæ sulphuris & salis particule: à se invicem discedere, & mixtionis vinculum dissolvere, unde putredo solvitur, incipiunt. *Willis de Febribus cap. 12.*

§. 21. Patavii in cadavere Germani febre continua mortui calculi reperti trianguli, quadranguli, omniumque formarum, carbonis in modum nigri.

In cadavere Cuc. Illati eorum obitæ, febre Maligne extincti, Offredus septem calculos angulares nucis avellanæ magnitudine observavit. *Joh. Rhodius cent. 3. observ. 2.*

**C**alenti reperti trianguli, nigri &c.) Sicut cysti fellæ calculus obiecta oritur Icterus, remanente scil. bile in Jecur & venas hinc in habitum corporis diffusa, Eodem pacto ab eadem in Jecore coacta, vel ad venas translata & putrescere, febris nasci

potest; quæ maligna evadit si bilis æruginosa sit vel atra, qualis fuit illa Germani de quo supra, in cujus cysti reperti calculi carbonis in modum nigri, atræ scil. & teterridæ bilis soboles.

§. 22. In corde viri 28. annorum à Veslingio anno 1642. dissecti, observavimus ventriculorum dextrum phlegmonoso corpore pingui repletum, quod imo cono siemiter annexum, ascendit ad parentem venæ arteriosæ ductum illumque obstruxit: In sinistro ventriculo ejusdem substantiæ minor portio aderat: Ut interceptam sanguini viam resarciret provida natura, paruit anastomosis illi amplo foramine, inter venam cavam & arteriam venosam, qua sanguis, ut in fœtu, in sinistrum ventriculum ferebatur: Sive quod natura coalescere orificium hoc non siverit, sive quod leviter coalitum urgente necessitate vi reseravit, & sanguinis impulsu, certe longo tempore materia à phlegmone fuit congesta, & à calore cordis assiduo exsiccata & indurata, Quin mortis attulerit homini necessitatem, vix dubito: Febre maligna intra triduum extinctus fuerat, quod aucta per calorem malignum materia, meatum sanguini liberum intercepterit. *Bartholinus cent. 2. histor. 46.*

§. 23. Pistoris depingo originale, per orbem notissimum, ignota Febre deletum: incidit in febrem presentiano & mense, quam tertianam, intermittentem credidit simplicem simplex Medicus, quæ dere alterius veterani consilium dum explorat, missionem sanguinis fore necessariam pro exigentia morbi, & temperamenti sanguinei, percipit & exquiritur: mox ratione delicatæ complexionis blandam solito more præscribit solutivam præsanam, ne activiori medicamento quateretur nimis abdominosa moles: quo pacto per quinque continuos dies visibili febre immunis statuitur, unde præparatam materiam quinque syrupis expurgandam pharmacum construunt, propinant; & hos mixtas in humoribus evacuavit vires, moxque leve sequitur subdelirium, brevique quasi positus in Apoplexia obit, cedens tandem naturæ, quam toties vicerat pistoris, inexpectatæ morti. Attoniti Domestici cadaveris imperant ciffectionem, cui præsens quæsitus ego, lividi primùm corporis intencè rubentes observo genas, mox pectus fecari fatago, in quo

fani cordis incredibilem vidi magnitudinem, Talem pulmonis corruptelam, ut illius substantia dissoluta simplici tantum membrana, tanquam in sacculo contineretur, quo reciso, copiosa effluxit nigerrimi & foetidissimi sanguinis, ac corrupti Pulmonis quantitas: Similimum pulmonis vidimus Lienis statum, cujus integra tantum membrana fluidam pariter ac corruptam illius substantiam, præter nonnullas Malpighii glandulas continebat: Ulterius, metastasim in easpie conjiciebant aliqui, quorum gratia cerebri tentavimus dissectionem, Ideoque secato cranio crassissimo, futuri, que adeo compactis ut deesse viderentur; Ablata dura meninge, tenuis occurrit admodum crassa, ut attoniti suspicaremur an tenuior aliqua inferius lateret, triplicique cerebrum illud involveretur meninge, quod non successit, sed hoc unum observabile, Piam matrem crassitie & densitate duram æquare: Ablatis itaque duris hinc meningibus, corticales cerebri anfractus ita pulchrè distinctos detegimus, hoc est, inter se adeo separabiles, ut notabilia vacua remanerent, cum in aliis capitibus arcta contiguitate anfractuose copulenter: Anfractuam ergo hæc conformatio verè industria, dum æque bene ac intestinorum gyri semetipsis distinguerentur, & ideo si pia mater per corticales cerebri ambages undequaque se insinuat, cum illa crassa adeo extiterit, per consequens illa ablata notabile remaneret spatium inter anfractus, tanto magis considerabile quanto copiosiores gyri: substantia verò cerebri universa naturalis omnino & sana, præter solitam serositatem in minima quantitate, & corporis colorem nonnihil flavescantem.

**S**ymptomata totius morbi progressu inobservata non scrutor, incredibile nullatenus nullam extitisse diagnosis tantum morbi, ut assilens fateatur Medicus: equidem febris latuit maligna, de qua loquitur *Fernelius* lib. de Feb. cap. 17. *foris motus in interiorum verò contrahens*. ex oculis autem emerit excitata pharmaco, dum duplex inflammatio purgantium non resistit viribus, tebrileque fermentum mutans à phatamico vires, effrenatas concitat sanguini effervescentias, inflammataque parti flammis adauget, quomobrem non immerito cum antiquis recentiorum consensus, nunquam satis purgantium reprobat damna in inflammationibus, cum autem præcipuus in febricitante sit copus statum noscendi sanguinis, utrum nempe in compage sua nimis sit stricta, quapropter excrementa intricata sanguini adeo complexentur, ut secerni ab ipso nequeant, quod sanguinis coagulationem nonnulli vocant, an diverso modo subvertatur error, quando scilicet ab heterogeneis particulis fermentis secedit in partes, sive quoque dissolvitur, ut corruptus usque ad fibras communiter nuncupatas, & tunc per parenchymatum poros se insinuant alibi stagnat, putrescit, partesque ipsas corruptipit, ac universo æquini maligna communicans vitia, unde spiritus non elaborat sanguis, quinimo veneni assumens naturam hoc inscit, vitamque maligne perimit: ita affectus sanguis in hoc casu in partes spongiosas intruens in ime filtratur, inde corruptivam inducens fermentationem, illas adeo alterat, ut nec propriam retineant substantiam, sed in foetidissimos degenerent ichores propriis parenchymatis membrana simpliciter inclusos.

Quid autem sciendum de rara pie matris crassitie & diducta anfractuorum cerebri contiguitate? Vere suspicor multum contulisse suæ perfectioni in pingendo, cum in hac arte excellens fuerit si quis alter, Equidem hæc unum est quod cogitatio sit ab anima, non ab organis, ideoque cum bruta non cogitent, illa probabiliter catere statuunt Cartesiani; cogitationis autem scrutari vires, animæ ut essentiam indagare, idque exigere videatur aliquid supra animam, quia in tantum materialia, & omnia mortalia, cognoscit anima, quæ ut aliquid supra illa, cum firmiter materialis & immortalis, nullatenus in operando depêdet anima ab organis, ita in fatuis, in quibus principes animæ facultates non exercentur uti debent, aliquid in cerebro insoliti apparet, Ex-

go scrutari animæ operationes à corpore dependentes, nil aliud est quam organorum vires contemplari, quid scilicet, & quomodo concurrant in operationibus, & ad id non requiritur aliquid supra animam, cum hæc sit supra sui corporis organa: posita ergo tantæ cognitionis possibilitate, querendum est utrum à particulari cerebri conformatione dependeat ingeniorum diversitas: profecto cerebri anatomie suam detegit in omnibus structuram sece consimilem, quamvis probabili conjectura suspicari possumus an cerebri fibræ Wilisiane in omnibus ejusdem sint modificationis, quod non ita facile oculis observabile: Interæ ingenij vires in particulari animati cerebri conformatione dependere similiter credo, verum non tantum in hoc, sed à diversâ sanguinis constitutione, ex qua major vel minor spirituum perfectio & copia consistit; ita accidit maniacis, in quibus non pervenitur cerebri structura, sed spiritus animales ab indole miti & benigna in acerrimam degenerant, ita hypochondriacis, in quibus sanguis ater, spiritus gignuntur nebulosi, ex quibus tot phantasmata.

Cum ergo ingenij vires consistant in particulari sanguinis, & animali cerebri configuratione, possumus industria erueri tanti pectoris: & primo cordis insolita adeo magnitudo arguit copiam notabilem rarefacti sanguinis, qualiter systole expulsum, quæ dum in anfractus cerebri perveniebat, capaciores exigebat, ut facilius & celerius filtraretur, ne sanguis subsequenter irruens ita copiose seu mox noceret: ex copioso autem sanguine rarefactione naturaliter, copiosi & spiritus, ex quibus ingenij robur verum quamvis spiritus sub tenuissimo liquore decipiantur, summe sunt tamen exhalabilitatis, quapropter piam meningem crassiorem effecit natura, ut illos retineret facillimè dissipabiles, à nimis laxa cerebri structura, tum etiam ut cerebri anfractus sua interpolatione dilatarer ad faciliorem sanguinis instillationem: copiosi ergo spiritus, cum libere per diductos cerebri anfractus permearent, libera etiam fluiditate per corpus callosum expansari poterant Unde in ingeniose imaginabatur, ut puta tantum originalis per Italiam celeberrima imaginationis suæ viribus abstracta depinxerat nullis inquam dedit exemplaribus. *Ex Communicatione Excellentiss. Et Clariss. Dom. D. Joh. Baptiste Laurent. Medici & Professoris Turinensis.*

§. **S**erenissimus *Christianus Dux Brunsvicensis & Luneburgensis*, cum multis annis inordinatè vixisset, cruda multa assatim ingeresset, acetariis, oleribus, fructibus hortensibus crudis, & ejus generis difficilis concoctionis cibis corpus onerasset, incidit in febrem quartanam, qua curata aliquandin bene habuit: Notandum tamen quod in ipsa febre quartana cum usus esset vomitorio ex rad. szari, & multas cruditates magna cum perturbatione & molestia rejecisset, (nam oleribus & difficilis concoctionis cibis se ingurgitaverat) juravit se nunquam vomitorium deinceps assumpturum; Quod cum ego animadverteterem, & tamen Princeps ipse una mecum quamprimum restitui vellet, neque id absque vomitoriis commode fieri posse perspicerem, pilulis meis febrilibus, quibus ante singulos paroxysmos usus est, admiscui aliquantum pulveris rad. szari, quod tamen in parva quantitate fuerit, sæpius tamen usurpatum multa per vomitum eo ipso die, quo assumptum erat, rejecit, & quidè excrementa viridia, tenacissime coherentia, quod omnibus adstantibus admirationem movit, convaluit post id & rectius habuit: Postea tamen cum sissimè crudis & difficilis concoctionis cibis iterum usus esset, incidit in gravem morbum, quem quidam, cum aliqualem calorem naturalem præter naturalem perciperent, febrem malignam judicaverunt, quod ego postmodum adveniens factum inveni: Nam cum nossem Principis, qui alioquin temperantissime vixit, in rebus crudis & cibis herbaceis intemperantiam, statim prospexi ex cruditate ortum quicquid mali erat, neque in eo deceptus sum, nam post aliquot dies propinato aceto bezoartico, & aliis medicamentis ad rem pertinentibus, ejecit Tæniam, sive vermem latum, ruptum & per partes emissum; ita tamen ut tota longitudo ulnas circiter novem compleret: id factum est die 22. Maii 1626. Antequam is excerneretur, & aliquot diebus post, quiescere non potuit, sed corpus hinc inde jactavit, donec exhibitis medicamentis expulsivis alexipharmacis (propter suspicionem veneni, vel ex mortuis vermibus intrinsecus nati, vel extrinsecus dati) cordialibus & confortantibus paulum tranquillior fuit: Intetim die 1. Junii advertimus infra sinistram mammillam novem pustulas lividas, sive tubercula sicca, instar fragi per medium dissecti & oppositi, ejusdem cum fragis, sed obscurioris aliquanto coloris & asperitatis, sine pure protuberasse, unde veneni suspicio aucta est: Vires inde fractæ & mentis hallucinatio nonnulla sequuta est, loquutio etiam ita precipitata fuit, si quid diceret rari intelligere potuerint, nisi quid esset sæpius togarint: Initio Princeps multum vomuit, præsertim assumpto cibo & potu: cerevisiam, qua alias delectatus fuit, vinum fastidiens, semper rejecit, vinum retinuit, neque quicquam incommodi inde sensit, aut caloris præter nat. concepit: Pulsus initio propemodum naturalis, uriaz quales jumentorum, postea prope ad statum naturalem in colore, substantia & sedimento pervenit, pulsus vero magis magisque languidior factus: In medicamentis assumendis difficilior fuit, nam vestita assatim appetivit, concessa respuit, & cum corpus maxime calidum servare debuisset, omnia tegumenta rejecit, & præterea aqua rosatum, & aliis refrigerantibus caput inundavit, eum tamen neque in pulsu, neque in urina, neque in tactu totius corporis ullum caliditatis signum appareret: Medicamenta, tum quæ ad exonerandam saburram, tum quæ ad excludendos vermes, extinguendam venenum, conservandum cor & resiciendas vires singulari virtute facere videbantur, diligenter administrata sunt, omnia tamen in pejus ruere, pulsus sese subducere & vires in horas labasci, appetitus posterni, donec tandem spretis omnibus humanis placide obdormierit d. 6. Junii 1626.

Aperto ad condituram cadavere, propemodum omnia viscera sana inventa sunt, solus ventriculus & intestina vitium contraxerant: Ventriculus enim mucoso phlegmate redundabat, & tunica ejus interior obscuriore, quam pro natura, colore imbuta fuit: Intestina etiam plurimum pituitæ crassæ & mucosæ continebant, & interior tunica, in intestinis tenuioribus fere nigricans, rugas instar plicarum orbicularum in intestina intrinsecus continua serie ambientes formaverat. In Colo. veto de lato vetmæ, sive tæniæ, particula ad longitudinem prope quinque ulnarum reperta fuit: Pulmones plane integri fuerunt: Cor nihil vitii habuit, nisi quod dexter ventriculus solito flaccidior visus sit, & in eodem vesicula albicans ad longitudinem & crassitudinem digiti, utrinque acuminata, pisciculum dixisses, qua dississa & rupta, cum aquam contineri putassemus, materiam pinguem, crassam instar axungie reperimus: Hepar magnum fuit & omni labe caruit, nisi quod quatuor quinqueve locis ad magnitudinem folii menthæ, macule lutei coloris apparuerint, carne subiecta similiter ad corruptionem vergente, reliquis partibus tum quæ ad colorem, tum quæ ad substantiam omnibus integris: Lien, quemadmodum & Renes omnis labe fuerunt expertes, Membrum virile supra modum flaccidum una cum scroto nigrorem contraxerat. *Ex observationibus Adami Luchtenii Regis Danicæ Medicis in Aulis medici Bartholini anni 1672. p. 25.*



*Febris Epidemica Nervoso generi & Thoracis partibus infesta 1. Febris Epidemica et inflammatione Pulmonum 2. 3. Epidemica vermiculosa. 4. 5. 6.*

§. 3. **C**irca æquinoctium vernalæ anni 1661. puella novem circiter annorum ægrotare cepit, imprimis absque calore & siti intensis, appetitus dejectio & virium languor accesserant: insuper vertigo fere continua molestabat, eum crebro leipothymia metua, ut sæpius animi deliquium instare putaverit: cujus ægritudo quoniam Tussi crebra & humida stipata fuerat, primo tantum frigoris susceptio putabatur, verum intra paucos dies ista Tussis plane convulsiva evasit: adeo ut inter tussendum, diaphragmate sursum elato, & cum systole sursum repetita, ita aliquandiu retento stridor ingens & velut suffocativus ederetur: dein apertius Febricitans, ac de siti & calore conquesta, noctes insomnes cum insigni corporis agitatione ducebat, atque prope diem delire loquuta de veste sua aquas delapsa querebatur; cumque omnia in pectus ruerent, motibus convulsivis primo in artubus, mox in facie & subinde toto corpore tentari cepit, paroxysmi crebra vice, nempe bis aut ter intra horam repetentes; gravissime urgebant, adeo ut misella hæc intra nycthemeri spatium, a quo affectiones spasmodicæ graviore exortæ fuerint, spirituum animalium tenore labefactato penitus sanum obierit: Dum paroxysmi convulsivi urgerent, pulsus erat plurimum inordinatus; ac sæpe intermittens, etiam vomitione crebra afficiebatur.

Cadavere dissecto, symptomatum in hac febre præcipue urgentium rationes & vestigia clarius patiebant: Nam calvaria: olla amota, statim vasa meninges perreptantia, sanguine plurimum turgescere conspiciebantur, quasi fere tota cruoris massa in capite aggereretur: Venis enim circa viscera imi ac mediæ ventris scissis aut disruptis parum sanguinis effluxit: Porro membranæ istæ, ubi cerebellum invessinunt, atque alius infra te ipsum à cerebro derivunt, sanguine pluribus in locis extravasato suffusæ, colore atro purpureo insigniebantur, ut minime dubitandum esset, quin phlogosis sive inflammatio, illic circum circa excitata, convulsionum adeo atrociter infestantium causa fuerit: Integumentis hisce ablatis, cerebri substantia prorsus madida, & humore aquoso supra modum irrigata videbatur: quinimo ejus cortice exemplo, ventriculi omnes aqua limpida erant impleti, cujusmodi pellucidi liquoris plusquam libram semissem eximere licuit, Ventre inferiore aperto, viscera omnia in eo contenta satis facta & sana testæ inveni: Ventriculus, licet inani vomitione crebro laceratus, nihil præter liquorem nuper ore ingestum continebat: etenim neque in ipso, nec in appendice ipsius lumbrici, aut aëres humores (qui sæpe ejusmodi convulsionum causa perhiberi solent) reperiebantur: Intestina tenuia pluribus in locis minus involuebantur, à viscerum istarum motibus convulsivis; Thorace aperto, pulmonum cava valde rubicunda, & velut suffusa, imo in quibusdam locis quasi livida & fere nigra apparebat, ex eadem ubivis discissa ichor tenuis & spumofus exudabat: *Th. V. Illis pathol. Cerebri cap. 3.*

**E**x his phenomenis prædictæ febris pathologia facile colligitur, nempe in hac ægrotante, sicut & in plethiquæ aliis, sanguis febriliter effervescentis statim recementa sua tum in Pulmones, tum in cerebrum deponere, quare serosa colluvies utriusque compagem illico inundabat, dein propterea sanguis, & hic & illic à debita circulatione præpeditus, circa partium affectarum confinia plurimum conservari, demum sitignare, poros & meatus infarcire, & quasi phlogosin inferre cepit: hinc obferum in Pulmonibus copiose aggestum & calore afflatum, tossis molesta cum spatio crasso & decolori plerumque isti morbo supervenit: Atque ob similem affectionem intra synsphas excitatam, vertigo, scoromia, stupor, aliæ pathemata cephalica laborantes fere constantiter incessant: cujusmodi affectus in hac puellula, propter cerebri constitutionem prius inveteratissimam graviore fasti in apoplexiam terminabantur: Si prædictæ ægritudinis raris formalis & causæ inquirentur, facile hic constat liquoris cerebri & nervosi generis irriguum fere simul atque sanguinem in culpa, & symptomatum præcipue urgentium causam immediatam fuisse: Nempe in quantum iste latex, statim à primo morbi insultu solito pauperior & quasi effusus evaserat,

propterea in toto corpore languor & enervatio cum lassitudine spontanea ac impotentia ad motum, cumque tubita corporis instabilitas ægrotantibus accidebant: Porro quatenus idem liquor partibus heterogeneis, scilicet partium nervosis partem explosus referretur, idcirco Strupor formationis sensus, undinum & muscutorum subsulsum & contractura, nec non vertigo, scoromia aliæque affectiones cephalicæ graviores intordebantur: Porro aliquatenus ob succi nervosi labem, non cito aut facile emendandam, morbi solutio aut sanatio ardua ac diuturna exiit: At vero siquidem lacteis hujusmodi vitium à sanguinis dyscrasia, etiam à cerebri constitutione prava necessario dependet, quales eorum diatheses morbidæ fuerint & quo ritu hæc febris symptomatis ortum vel somitem præbuerint, videamus: Quod prius, videtur quod ob anni constitutionem illidam & humidam, ac à Borea (cujus nimirum corporicula sanguinem & succos corporis nostri conditura velut nitrosa imbuunt, eosque exagitando contra putredinem muniant) minime perissimam, sanguis in plerisque hominibus, ac præsertim in pueris, adolescentibus & senibus, instat aquæ stagnantis proindeque stum contrahentis, valde impuræ & particulis heterogeneis repletus, atque ad lentorem & aequali-

aquositate vergens evaserat, in quo scilicet spiritu ac sulphure putore aliquantulum depresso, particule aquosae, cum sale & sulphure impuro simul cunctis, nimis exaltarentur: quapropter sanguis tum propter crassam ejus vitiatam, ob particulas heterogeneas in sinu ejus ubertius congestas, effervescentia febrili aut sua sponte, aut occasionaliter, aut propter contagium suscipiendae habilior factus est: proinde ut plurimum hoc tempore febricitarent: Attamen sanguis à miseria febrili & suscepto effervescent, non statim cum aperto incendio, sed tanquam ligna viridia foco imposita, cum flamma velut suppressa ac fumo plurimum involuta exardescere: quapropter materies morbosica, intra massam ejus aggesta non (uti in febre regulari) deflagrando absumi, ejusque reliquie stato tempore per crisin exterminari solebant, sed tamen mox à febris initio istius materiei portio ingens in caput vel thoracem, vel simul in utrumque suffusa, & postea iisdem partibus continuo suppeditata, aut praedictis cerebri & nervosi generis affectionibus, aut tussim cum dispositione tabida, vel simul utrisque ducebat atque ob hanc rationem circa initia hujus morbi, cum pulsus debito celeriore, & urina rubicunda & contentis saturata, sanguinem ab intemperie febrili effervescente indicabant, aegrotantes de calore aut siti minime conquesti sunt, quia nimirum sanguis effervescent impatiens & recrementum sua illico in liquoris nervosi penam, aut in pulmones deponere: quare intra haec receptacula symptomata peiora statim acciebantur: postea tamen morbo in statum evecto, calor nonnihil acris, cum lingua scabrie in aliquibus satis molestus esse solebat: quinimo in omnibus febribus *lenta & velut haetica* perdurabat, quae nec sudore nec transpiratione insensibili ita in totum amoveri potuit, quin illa quotidie, praesertim à postu, licet tenuissimo, redintegraretur: quod eadem ita contigisse videtur quia succus nervosus faculentis à sanguine depositis satur, eas postea haud in copia tam uberi excipiebat, quin recrementum isthic una cum humore nutritio (siquidem & hic particulis solidis alendis minime absumeretur) intra massam sanguineam testantia, ipsam usque febriliter effervescente fecerunt:

2. Praeter hanc *sanguinis diathesin* morbidum ab anni intemperie contractam, videtur & cerebrum ab eadem *resorptione* in partemata praedicta proclive factum: cum enim longo temporis tractu venti austrini cum humidioris aeris constitutione jugiter spirarent, proinde cerebri meatus & pori plurimum laxati & aperti, ejusque compages nimis dissoluta, humoribus fetosis & particulis quibusvis heterogeneis aditum facilis praebant: quare sanguis valde faculentus & aquosus, quam primum à febre efferveret recrementum fetola & sordis suas statim intra *resorptionis* fauces nimis potente ingerere: Enim vero, quousvisque est qui non humido caelo de capite nimis opplet & spiritum torpore queritur: quia scilicet recrementorum humores in cerebrum à tali occasione laxatam irruunt: E contra hujus poris à frigore intenso aut siccioris aëre contractis, sensus & facultates omnes vegeti magis & expediti perstant.

Hinc symptomatum & accidentium praedictam febrem comitantium facile erit rationes extricare: enim quod haec febris anomala in pueros, adolescentes, feminas & viros phlegmaticos potissimum deficiebat, in causa erat, quoniam in istiusmodi corporibus sanguis aquosior, minus perspirabilis, proindeque colluviem fetosam, & faculentiam heterogeneas coagulare aptus est, quin & cerebrum humidius debilitate existens, sanguinis recrementum quavis facile suscipit: quare observare licet ejusmodi personas in convulsiones propter *alias resorptionis* oriundas, magis proclives reperiri: Insignis Atro-

phia tam cito huic febre supervenit, quoniam ob succi nervosi depravationem nutritiam sania ab eo pendentia (quae prout alibi ostendimus, sunt maxime activa) profinus defecerunt, quamvis enim minime concedimus humorem nervosum solummodo nutritum esse, sed materiam partibus alendis destinatam in massa sanguinea preparatam per arterias dispensari, tamen arbitrari fas sit liquorem cerebri & nervosi generis irriguum, sub ratione causae efficientis alimentoniam plurimum conducere: hic enim spiritu animali turgescens: succum nutritium cuilibet parti à sanguine allatum aënat & vigorat, eumque in corporis alendi meatus ac intimos recessus admittens & velut intro manducans, assimilari quare cum hic liquor economus adeo depravatur ut spiritus animales, circa nutritionis opus requisitos, haud rite suppediit, membra quaelibet ac partes, velut sto nachus in toto suo vitiatum nutrimentum quodvis oblatum, vel respuunt, vel proprium in usum recipere nequeunt: propterea quidem in hoc morbo moles sive habitus corporis ut plenior aut oësius, plus ac citius deterebatur: quam in febre causone, ubi à calore intenso, aut sudoribus copiosis longe plus evaporatur: ejus ratio est, quoniam in febre ardenti, licet sanguis valde effervescent copiosius exhalat, interer tamen aliquid nutrimenti jugiter apponit, quod singulas partes, liquotus nervosi beneficio adjuvat, facile excipiant & assimilant: verum in ista *lue* *resorptionis*, quoniam materia nutritiva satis apponatur, tamen spirituum *resorptionis* defectu nutritio potius inhibebatur: 3. Ob praedictas rationes etiam febres ista durissime protrahae vix unquam critiche judicari, ac difficulter medicamentorum opo curari solebat, materies enim febrilis statim à morbi initio in liquorem nervosum irrepens, ab ejus sinu aegre postea, & nonnisi longo tempore exterminari poterit: quippe hic latex motu segnis, inque vas obstrictis lente saturiens, non uti sanguis effervescentiam depurativam, sive fermentationem sponte concipit, neque medicamentorum vires ad eum facile ac illibate pertingunt, sed aut aliis partibus prius impenduntur, aut siquidem heterogeneae sunt, à cerebro incongruum quocvis respuente, potius excluduntur: siquidem ob hanc rationem, quaevis cerebri & nervorum affectiones, medicinae velut opprobrium facientes, difficillime sanantur. Itaque in hac febre, si quando labes cerebri & nervosi generi impressa tolleretur, vel tussis immanis cum spuro copioso, vel tur ores & abscessus in collo succedebant, scilicet materia morbosica à sanguine resorpta, & rursus deposita vel in thoracem, vel in glandulas & emunctoria juxta cervicem consistit: Ceterum hic morbus contumacior existit, quoniam & sanguinis dyscrasia non facile emendaretur: nam licet ab initio latex ejus recrementis, usque in nervosum liquorem suffusus minus ac inertius efferveret, postea tamen receptaculis hifce oppletis, & faculentia morbosica, ac insuper materia nutritia partibus solidis alendis minime impensa, usque in cruore residues ipsum aggravant, cique propter molestem hujus non miscibilis exclusionem, effervescentiam non secus ac in febre haetica assolent, aut fere continuam aut subinde repetere aptum inducebant: Enim vero saepius observari in hac febre, à jussulis avenaceis, decocto hordei, alioque victu tenuiori, non minus ebullitionis in sanguine concitari quam à jure carniū consummato: nempe utrobique succus nutritius, & chylo in sanguinem suppeditatus, siquidem in nutritionis opus non impendebatur, velut quoddam heterogeneum, & non rite miscibile sanguini molestiam inferebat: atque ob hujus succi superfusi particulas, cum fero copiose amandatas, *Urina* valde

*crassa, rubicunda, & contentis plurimum saturata existebat.* Etiam ob hanc rationem alvus plurimum soluta fuit, in quantum sanguis, in loco nutritio satur, minorem chyli portionem & visceribus exungebat, atque istius, quod ipsi inferebatur parrem intestinis reinfundebat. Intemperies insuper febrilis tandem citius inhaerebat, quia donec regimine animali restitutum nutritio rite petageretur, matres ista superflua in massa sanguinea congregabatur. *Willis. Le. ubi vide huius febris curationem.*

*Intra hebdomerum statim factum operis* Febrem hanc epidemicam diutius me protraxit, at, vix critice judicatum, medicamentisque refractatam. Huius tamen puellae fatum acceleratum fuit, morbi quoque historia brevior, ob accedentem spasmodum frequentiam & vehementiam.

*Membrana cerebri sanguine pluribus in locis extravasata &c. Pulmonum caro valde rubicunda &c.* Aliquando vis ipsius febris in partem aliquam sevit, ut aeger tantum vel se capite dolere dicat, vel remibus, vel aliqua alia parte: Quod evenire puto, vel cum peculiaris in parte aliqua infirmitas est & vitium, vel cum febris ipsius subiectum est potius quidam teter vapor, qui prout vel in illas partes, vel in has tepit ita quoque sui notas & signa exhibet. Audivimus observatum esse ab *Hippocr.* in Coacis locum videre non contrigi rigores aut horrores inanes in febrium paroxysmis, translationem in caput asserere symptomaticam, id est, dum effertur vapor febrilis a foco, aut tenuis ichor, qui naturam perturbans & calorem efficiens, eundem fors intro evocat, unde aut rigor aut frigus insequitur periodicum: Quod si hoc frustra fiat & potius recta caput vapor appetat, ac si constitatur firmeturque sedes in capite dolor oboritur saevissimus, & adjuvantis in toto capite caloris sensus excitatur, in ceteris partibus nil simile percipitur, Et vulgus se febrem

in capite habere narrat: Item in passim vagantibus febribus periodicis, cum sensum morbi extinctum videatur, ceteri quibusdam diebus, ac si novus paroxysmus suscitandus foret, calor aut in capite summus, aut in alia parte, & dolor excitatur: quod fit aut ob pancha rem materiam, aut quia ea nondum satis apta est ad patrendum & motum: Denique in febrium inconvulsum paroxysmis, praeter consuetudinem quaedam symptomata apparent, aut ingens capitis solius dolor aut brachii, aut cruris, aut velut incubus, aut suffocatio nonnullis quaedam contracturae convulsionibus similes, non autem manifestus quidam calor apparet in toto corpore, à quo febris suam essentiam trahitur. Quod fit meo iudicio propter aliquam separationem & sectionem a arteriis, quae non per venas, sed per arterias, aut nervos, aut inanes quasdam membras inrepens, insolentia quaedam symptomata promittit ac gignit: Quod & confirmant ea quae scripsit *Gal. de Cris. l. 3. c. 9.* cum rationem reddit cur in pancha capitis febrium, sive delirium accesserit, sive alioquin membri sideratio peritum hominem sciendum est, si non optimum aliquod signum accesserit: Ex quibus omnibus apparet, contingere saepe ut moveatur materia, tum suo ipsius nutu atque sponte, utpote animata & excitata suo spiritu & ichore (nullus enim humor sine aut flatu aut ichore cito impellitur) tum naturae vi pellente, & tum in partem aliquam vitaeque impetus ille & impressio redundante quae possit an satis sit in nam tantum partem vim istius tempestatis febrilis redundasse, an in totum corpus: nam si in totum corpus malum aequiliter tepat, plures & partes & facultates laeduntur contra melius esset diffundi hoc totum vitium & in multas corporis partes dissipari, quam ita confertim & gregatim in unam principem partem insultasse atque impetuivisse, *Salernus.*

§. 2. Temporibus inconstantibus morbi equidem fiunt inconstantes, dummodo illorum perduraverit inconstantia: sed quando ipsorum inaequalitas uniformis aliquandiu persistit, prout factum est per duos annos fere continuos, ut plurimum fuerunt austri, ventosi, frigidi, pluvii, & cum maxima aquarum illuvie, morbi supervenientes constantes apparent & fere uniformes: Cujusmodi sunt febres hoc tempore grassantes, non Bergomi tantum, sed Bononiz, Veneris, in Foro Julienis, agro Paravii, Vicentiz & fere ubique locorum; In his enim omnibus locis populariter saevierunt febres, non quidem vere Pestilentes, quia licet multos interfecerint, ut plurimum tamen fuerunt salubres, nec alicui communicatum fuit contagium, sed sunt Ardentis spuriz, ad continentium naturam accedentes invadentes, cum vi, vigiliis, comate vigili, paraphrenitide, & aliquando cum vera phrenitide, vernibus & cum periculis erumpentibus, plerumque rubris, aliquando violaceis, nigris diversis temporibus, ut plurimum circa septimam, & in puerulis cum morbillis & variolis, Et urinis tenuibus, aliquando crassis & turbidis, & aliis accidentibus malum morem harum febrium commonstrantibus: haec febres viros magis quam mulieres affligunt, eosque ut plurimum infra secundum senium constitutos, si praesertim plethorici, biliosi, aut melancholici fuerint, si locorum humidorum fuerint incolae, si in compositis vixerint, immo diu in caluerint, vixeri indulserint, vitiosive succis redundaverint, raro Claustrales, rariquam minus in compositis videntes.

Originem autem habuerunt haec febres ut plurimum a putredine circa viscera naturalia ideoque & vermes fuerunt excreti, & diarrhoeae non raro subsequutae, cum critice tum symptomaticae: Fere tamen semper sese insinuavit putredo in totum venosum genus, non sine aliqua Pulmonum inflammatione, ut apparuit ex dissectione Cadaverum: Hinc quoque factum fuit ut fere in omnibus apparuerint peticulae; pluribus supervenerint sudores aliquando diaphoretici, non raro salubres, & fere omnes iudicati sint per urinas copiosas. *Ben. Silvaticum consil. xiv. cent. 1.*

**H**anc febrium sicuti causa adequata fuit vel insignis exustio, vel excellens & vera humorum peccantiam corruptio, aliquando superante natura, aliquando eadem superata, ita causa communis fuit inaequalis aëcis intemperies, quoad aëvas qualitates, cum excessu humilitatis quoad pas-

sivas: Hinc enim accidit ut caput pluribus humiditas sit redditum quam conveniat, & interna viscera vitiosis humoribus cujusvis generis, à praedominio tamen ferosis & biliosis fuerint repleta, impeditaque ipsorum ventilatione, cum à cutis conspersione, propter ambiens frigiditatem, tum ab internis obstru-

obstructionibus compertuerint, & putrescendo febrium predictarum cause fuerint, cum enarratis symptomatibus pro varia parte affecta, & diversitate dispositionis partium principium; Foveri quidem potest hæc febris ab annonæ charitate, cujus interdicta est major congestio vitioforum humorum; hæcque ob causam pauperes febricitant magis quam divites & frequentius intereunt; non tamen annonæ charitas fuit causa principalis harum febrium, ut quipiam suspicari possit, non enim divites his febribus fuissent correpti, utpote qui annonæ charitatem non fuerint experti: Quæ cum ita sint, sperandum etiam est morbum hunc pestilentem non futurum, dummodo austriacæ constitutiones tandem non perdurentur hinc aer non solum in temperatus fiat, verum etiam corruptionem & putredinem concipiat per admissionem vaporum putridorum: Quod ne fiat, ventilatione, ignis accensionibus, viarum mundities & diligenter cadaverum humationes erunt necessaria: Pro curatione autem harum febrium insitendum refrigerantibus, exsiccantibus, diurentibus à partibus principibus, deobstruentibus, bezoarticis & vires conservantibus: Ideo inter Chirurgica principem locum obinet venæ sectio: Si vires non permiserint, venarum sedalium apertionem laudamus, & ratione revulsionis à partibus

principibus, & ratione vacuationis à venoso genere: Postea cucurbitulas cum scarificatis, cum non scarificatis, lumbis & infernis partibus applicandas censemus, frictiones & inunctiones injungimus, dummodo natura non tenet excretionem materię per alias partes corporis: Vesicantia præstantaneum & tutissimum semper remedium fuit: Inter Pharmaceutica laudamus blandas alvi subductiones, cum natura non transmittit cum impetu ad cutem: Largæ parationes aquæ hordeaceæ aut feri lactis caprini cum spiritu chalcanti, refrigerant enim, firim sedant, urinam movent, sudorem alliciunt & omnibus intentionibus satisfaciunt; non omittis Bezoarticis, frigidis vel parum calidis, nec valde adstringentibus: Medicamenta ex citro sunt tutissima, Aqua ex toto citro: Margaritæ præparata sunt exsiccantia, diuretica, sicciora temperatissima, Inter externa Oleum scorpionis Matthioli, &c. Idem.

*Supervenerint sudores plurimi.* Ad sudorem proclives esse qui Pulmones habent calidos, quia tenuis obtinent humores observat *Walens* in sua methodo medendi: Ita phthisicos sudoribus continuis ferme diffuere videmus, & in tantum debilitari ut Medicus vel maxime accessum habeat viribus illorum succurrere & sudores impedire.

§. 3. Sæpe decipiuntur Medici, Peripneumonix speciem pro febre mali moris & maligna judicantes, & pro tali curantes: Et dant febres hujusmodi epidemiales vagantur, Si corpora eorum qui perierunt secta sint, maxima ex parte inveni labem, vel in extremis lobis, vel in parte postica pulmonum, quæ ad gangrænam per exiguum tendebat: Id ipsum etiam accepit à Doctore celeberrimo, qui se eadem experimenta multoties observasse testatus fuit: Ideo cautè in his procedendum est ut cognoscat pars affecta.

**I**N Pulmonum affectibus non plerumque respiratio læditur, quod provenit, partem ex natura affectum, partem ex situ, Nam Tabes, vel ulcus Pulmonum, ex se respirationem non lædit nisi per accidens, cum scilicet pus vel purita in arterias eorum recipitur: Similiter pñitis, quæ in pulmonum substantia recipitur, respirationem parum aut nihil lædit, nisi cum vasa obstruit, & ita ad cor ingressum vel egressum cohibet: aut pulmones magnificando, inanitatem prætoris, quæ ad libere respirandum requiritur, repleri facit: Imo neque ex inflammatione particulari pulmonis, quæ scilicet extrema loborum ejus, vel partem aliquam externam, & maxime posticam obideat, nisi maxima sit illa enim cor potius præfectionem paritur quæ magnam actionem; neque ob id arterie ocludantur, vel comprimantur, Et ideo non sequitur neque ratione or-

gani, neque ratione aucti caloris necessitas magnæ respirationis, neque impedimentum illius, nisi leve: Inde sæpe decipiuntur Medici, quia hæc est Peripneumonia specier, &c. Ideo cautè in his procedendum est, ut cognoscat pars affecta: Quæ ex levi, sed angustiosa respiratione, & subdificili in aliquo latere decubitu, sicuti ex pulsum molliore, ex sudore circa pectus & cervicem, cum adiant malignitatis notæ, colligi debet: Et maxime cum alius bene ab extremis evacuatione sublevari, licet parum habita ratione languoris virium & febricitulæ convenire videatur: Cognoscitur etiam ex Pulsum inæqualitate, nam ex parte affecta celeriores & majores, vel crebriores & oppressiores erunt. *Schaffius Nafius meth. med. Part 2. p. 298. Vide Lal. à Font.*

§. 4. Initio hyemis 1663. districtu domini Veneti universo, morbus quidam malignus & epidemicus grassabatur, quo plerumque lx. millia hominum, ut ferebatur, cum horrore & febre corripiebantur: Horum nonnulli cito interibant, ceteri brevi evadebant.

Sectione cadaverum instituta, mira & vix credibilis vermiculorum minorum copia apparuit, causamque, quæ vel experient' similis nondum in mentem venerat, manifestavit. N. S. Gemtarius, ex illis locis redux, quamprimum ad nos appulit male habere coepit, sibi quoque propterea meruens ac simili morbo decumbere cogeretur, consilium nostrum expetit: Purgandum censuimus spec. disturbith. cum Rhabarb. 3i. pulv. sem. sanroñic. lalap. ana 3ss. mis duas dozes sumpsit, juravitque se copiose purgatum plusquam bis mille vermiculos vivos excrevisse. *G. H. Velschius observat. Medico physie. hecatostea 2. §. 59.*

**A**Nno 1673. mense Augusto & Septembri, vagant' est febris epidemia apud Segusianis finitimosque locos, adeo maligna, ut *Burgi*, *Metropoli*, Ubi populosi quidem, sed non magnæ, plusquam feracem menstruo ipatio interierint: Res ad Regem delata, qui Medicum salicem mittit, exploraturum num Pestis immuaret, & an Medici Patrii congruis

uerentur remediis, Sed non multo felicior successus penes ipsum fuit: Interim casu innovit, vera tunc illius antidotus, Omnes ad unum ægri lumbri, eos, eosque vivos, egerebant, qui vino irrorati citissime necabantur; hinc concessio vino, quo severè ægri interdicebantur, morbus ex lethali salutaris factus.

§. 5. Non unum vermem, sed aliquot in hominis lenticulis extrinseci e cerebro inventos narrat Cœter in appendice Observat. Anatom.

§. 6. In capitibus eorum qui Febre Hungarica mortui sunt, cum gravissimis capitis doloribus, deprehensos vermes testatur *Conradinus* cap. 10. de *Febre Hungarica*. Vide lib. I. sect. 1.

## OBSERVATIO LIX.

*Exanthematum Pestilentium origo in partibus internis, Imo quandoque in Perioestio, sedem habere ostendit Anatome.*

**D**idicus *Petterd*, miles Anglus, robustus, mense Maio, peste correptus, carbunculum in manu habuit: Ad hunc tertia morbi die vocatus est magister *Cornelius* Chirurgus; Ipse ante ædes in quibus decumbebat æger mihi casu obviam factus, rogabat ut una cum ipso intrarem: invenimus ægrum jam morti propinquum, corpore plurimis exanthematibus purpureis obdito, quapropter ipsum Deo commisimus: Post discessum disputatio inter nos orta est de causis, origine & forma exanthematum: Ego inter alia cum *Fernelio* statuebam illa non esse solius cutis maculas, sed etiam partium subjectarum: Alter id negabat & dissectione unius aut alterius exanthematis se id facile demonstrare posse dicebat; Convenit inter nos ut in eadavere prædicti militis (qui intra semihoram à nostro discessu moriebatur) refrigerato, postera die levem incisionem experiundi gratia faceremus: Ipse in femore levem in cute tantum fecit dissectionem, credens subjectas carnes maculatas non esse: Verum se plane deceptum videns, altiore facta incisione istarum macularum progressum inquisivit, ac *Fernelium* vera dixisse confessus est: nam invenimus maculas illas ab ipso perioestio initium ducere, & latiore basi pyramidis instar per medios musculos recta sursum usque ad cutem ascendere, atque ibi in conum terminari: Chirurgus hac experientia nondum contentus, in brachio supra cubitum alia facta incisione, idem adhuc semel inquisivit: ubi invenimus basin duorum exanthematum (quorum progressum quærebamus) adeo profunde sitam non esse, neque ad perioestium usque pertingere, sed à duro tendone cujusdam musculi originem sumere. *Dionisius Merbroeck de Peste lib. 4. historia 32.*

**T**Radunt *Jac. Pontium*, Medicum Lugduno Batavum, quondam ejusdem rei periculum fecisse, & invenisse quod exanthemata ab ipsis ossibus initium ducere: Proculdubio etiam *Fernelius*, ejusdem rei oculatum experimentum sumpsit, nam lib. de Febris. cap. 18. inquit. *Exanthemata ut corporis summa, ita & interiora viscera musculos, nervos, cæterasque partes solidas obsident, ex hisque primum ducunt originem.* Sic etiam *Joh. Morgagni* scribit non tantum exteriorem corporis habitum, sed & interiora viscera atque

musculos ejusmodi papillis obsideri, non secus ac per variolas & morbillos: *Anne Hepar, Lien Pulmo*, alique interna viscera, hujusmodi pestilentialibus exanthematibus etiam infestentur, de eo oculatè experiendum non habeo propterea quod licet contagium à dissectione muscularum parvi faciam, illud tamen ex aperture cavitatum abdominis & pectoris, fusius in altas intrare posse credam. *Vide Ex. Barthol. conf. de Anat. Pract. 3. 3. p. 13.*

## APPENDIX

*De Exanthematum Pestilentium, Bubonum, & Carbunculorum generatione, ex Eodem.*

**N**emo Medicorum hætenus Bubonum, Carbunculorum & Exanthematum historiam à vero certoque fundamento descripsit, fortasse quia vel naturæ veneni pestilentis ignorantia, vel rei gravitas, vel contagii metus omnes à curiosiore hujus necessariz scientiæ inquisitione deterruit. Hinc erratum non in una aliqua parte, sed in toto, ut demonstrabimus: Venenum Pestilens cum sit acreum & subtile, corpus humanum subiens raro ad cerebrum primo, vel hepar una eum humoribus deferitur, sed partim ob substantiæ tenuitatem, partim quia cum inspiratione plerumque in pulmones adducitur, facillime ac citissime venenatam qualitatem imprimit sanguini arterioso, è dextro cordis ventriculo in pulmones impulsio, qui ista labæ infectus ad sinistram cordis suam descendens, vitalitatis arcem impugnare ac labefactare incipit. Huic insensibilis tyranno cor se statim opponens, fortiter cum eo colluctatur, omnesque vires intendit ut dirum ac molestissimum hostem quam citissime foras expellere ac longissime à se ablegare possit. Hoc autem venenum, si paucum ac debile, & solummodo tenui seroso vehiculo junctum fuerit, interdum vel solius naturæ vi, vel medicamentorum tempestivo subsidio, brevi temporis spatio cum sudoribus per poros cutis expellitur & dissipatur, antequam sanguinis massæ aliqua pars ab ejus contagio corrumpatur: atque tunc unica fortis sudatione ita restituitur tales infecti, ut nullum mali vestigium relinquatur; Si vero venenum fortius, & ipsius cordis penetralia altius ingressum fuerit, eique firmitus inhaeserit, tunc ab ejus pravâ infestaque qualitate stimulatam viscus, istius veneni quam maximam potest partem longissime à sese, qua data commodiore via, dispellit, eamque interdum eum impetu, una cum seroso lymphatico vehiculo, ad axillarum glandulas (quæ vulgo dicuntur esse cordis emundatoria) deponit, antequam ab ejus

contubernio aliqua sanguinis arteriosi pars in arteriis majoribus notabiliter corrumpatur, quæ in iis insigni acrimonia falsas lymphatici influentis liquoris particulas, cum effervescentia quadam figendo (sicut in Chymia, aquæ tartari particule salæ, affusione pauxilli olei Vitrioli, illico cum effervescentia quadam figuntur & coagulantur) insignem dolorem, & propter earum impedimentum profluxum, conspicuum tumorem faciunt, quem *Bubonem* appellant Medici: Reliquam veneni partem eor quaquaversum à se dispellere, & quam celerimè potest è suis & arteriarum liminibus ad alias partes exturbare nititur, antequam ab istius insensu hospitis contubernio, & ipsum & ipsius proximum nutrimentum, vitæque fulcrum, sanguis spiritusque vitalis corrumpantur & extinguantur. Hanc fortem expulsionem etiam molitur per arteriam aortam, in quam sæpe magna hujus perniciosi veneni pars deposita, una cum sanguine arterioso, cui immiscetur, sursum ad cerebrum ascendit per arterias carotides, in eoque varia symptomata excitat: Ab ejus veneni malignitate gravatum ac stimulatam cerebrum eum suis membranis, illius quam maximam potest partem, & glandulas in faucibus & pone aures deponit, quæ in iis Salivalis liquoris fixationem cum effervescentia inducens, Tumorem dolorosum facit, ut sub axillis fieri didicim: Sæpe etiam eor magnam istius veneni partem per ejusdem arteriæ aortæ ramos descendentes, ad inguinum glandulas propellit, quæ & ibi Bubones excitat: Si vero venenum illud acerrimum sit, & à corde per arteriis aliquas, una cum sanguinis parte cui inhzret, ad cutem propellatur, in eaque non nihil subsistat, quocunque loco subsiterit, caustica & deleteria sua vi particulam, quam occupat, adurit instar cauterii potentialis, & mox unam pluresve exiguas vesiculas (quales per ambustionem etiam oriri solent) excitat, sique illam encendo *Carbunculum* facit: Quia autem venenum illud cum sanguinis, cui inhzret, parte à corde huc illuc, quæ data via, propellitur, hinc fit, quod non semper in uno, sed multis in diversis corporis partibus Carbunculi exsistunt: Si vero non ad cutem, sed ad aliqua viscera, partese interiores hæc veneni propulsio fiat, tunc in iis Carbunculi oboriuntur, gravium symptomatum causæ & ægris lethales, quales interdum in membrana Pleura, ventriculo, intestinis, pulmonibus, renibus, generari docet usus: Notandum tamen Carbunculos non semper hanc internam causam habere, sed interdum etiam, licet rarius, à fomite aut contagio extrinsecus in cutem incidente, eique, mediante nonnihil viscoso vehiculo, adhærente, excitari, atque tales sæpe curiculum suum absolvere sine ulla notabili cordis læsione, præcipue in talibus hominibus quibus cor validum est: Carbunculus autem ut plurimum ab exili adurente pustula, interdum à pluribus parvis pustulis, seu vesiculis paulo post in unam vesiculam cœsuntibus, rarius sine vesicula seu pustula exordium sumit hinc pars pungitivum dolorem sentit; qualis in gangræna adesse solet, & brevi magis magisque emoritur, ac nigrum vel cinereum colorem acquirit: Quæ vero Carbunculum in circuitu proxime circumstant partes, alterantur (sicut etiam in gangræna & sphacelo fieri solet) valde inflammantur, & acriter dolent, easque natura coquendo ad suppurationem deducit, antequam perfectæ mortificationis labes in illas quoque proferpær & mediante illa suppuratione corruptam ac emortuam particulam à sanis separar ac ejicit: Fiunt igitur Bubones & Carbunculi à veneno pestilenti, quod eor ex sese per arteriarum cavitates ad alias partes expellit: In quo expulsionis opere si cor, vel ob summum veneni acumen, ejusve firmiorem inhaesionem, vel ob propriam debilitatem, aliudve impedimentum, diutius occupetur, neque satis citò & fortiter se expedire possit, facile multæ spirituum vitalium (i. e. subtilissimæ sanguinis arteriosi) particule, ante veneni ex arteriis egressum, sine putredine corrumpuntur & quasi extinguuntur, atque tales cum reliquo nutrimento sanguine ad frigidiores partes, nempe membranas, tendines, ligamenta & periosæa delatæ, ob earum suofrigidam constitutionem, mox in iis paulo crassiores evadunt, summamque mobilitatem deponentes, ex illis partibus pyramidalis formæ, à latiore basi paulatim versus acumen ascendunt, (instar fumi lampadis recens extinctæ musculorum aliarumque intermediarum partium substantiam porosam, ob aliqualem superstitem tenuitatem, insensibiliter transeuntes, usque dum ad cutem perveniant, in qua ob externum frigus nonnihil econdensatæ, & à cutis densitate, detentæ, magis consistantur, & maculas illas constituunt, quas *Exanthemata* appellamus: Quæ maculæ majores vel minores, & hujus vel illius coloris sunt, prout magis vel minus corrupti sunt illi spiritus arteriosi, & majore vel minore quantitate, à partium calore magis minusve sursum, seu versus cutem feruntur: Plerumque autem sunt coloris obsoleti purpurei, & exactè rotundæ, granum piperis majusculum, vel etiam parvum, in circuitu magnitudine referentes: aliz formæ, alizque colores non tam communes frequentesque sunt, quamvis interdum reperiantur: Tandiu autem per illas intermedias partes corrupti illi spiritus arteriosi versus cutem ascendunt, quousque à partium calore propelluntur, quo deficiente, mox in partibus quasi coagulati subsistunt, sique coloris (purpurei, subnigricantis, violacei, alteriusve) maculas in illis relinquunt, quæ in eadaverum pestilentium dissectione, non minus intus quam foris inve-

niuntur, & plerumque ab aliqua membrana, ligamento aut periosteo, latiore basi in aëmea versus cutem assurgere comperiuntur: Interim quia partibus quibus inhærent nullam molestiam aut corruptionem inferunt; videtur venenum, quod dictos spiritus corripit, in iis esse extinctum & emortuum, exque sine veneno esse: Posuimus verò Exanthemata oriari ab arterioli spirituosioris sanguinis sine putredine corruptis seu extinctis particulis, per arteriarum minimarum extremitates exclusis seu expulsi: Illa est vera Exanthematum materia, quam veram esse varia docent: 1. Quod insensibiliter, sicuti solent spiritus, transeat partes carnosas aliasque intermedias. 2. Quod exanthemata pestilentia sint sine tumore. 3. Quod persistant sine inflammatione. 4. Quod sint absque dolore. 5. Quod non ludent manifeste partes per quas transeunt & quibus inhærent. 6. Quod non separentur instar carbonculi, nec suppurent instar ulceris: Quæ omnia, aut saltem aliqua ex his necessario adesse deberent, si secundum opinionem vulgarem, producerentur ab alicujus humoris putredine, inflammatione vel ebullitione: Verum viam esse, quam posui, docet Anatomie, quæ primo ostendit Exanthemata non esse solius cutis maculas, sed illas ab interioribus partibus initio sumpto ad cutem ascendere nec minus inhærere interioribus quam cuti: Deinde demonstrat multo latiores arteriolas versus interiores membranas hiare quàm versus cutem; atque hinc naturam laceratam longè facilius corruptas spirituosas sanguinis arterioli particulas effundere, & per latiores vias deponere versus interiores membranosas partes, quam per angustiores versus cutem: quæ tamen ob tenuitatem jam deficere incipientem, à vicinarum partium calore propelluntur, ac per incumbendum carnosarum partium latiores poros ascendunt ad cutem, in qua sub cuticulæ densitate, à frigore externo incrassati subsistunt, diutiusque maculas efficiunt, quæ semper longè periculosiores sunt quàm Carbunculi aut Bubones, non ut causæ, sed ut signa; quia in his cor adeo validum est ut perniciosum venenum versus externas partes depellere, & sanguinem à pestilenti corruptione præservare possit: In illis vero adeo debile est, ut nec venenum foras expellere, nec sanguinis corruptionem avertere possit, quod brevi sequitur mortis indicium est: unde fit quod ex sexcentis peste laborantibus vix unus evadat cui exanthemata in cute apparent. *Diemerbroeck lib. 1. de Peste. cap. xiv.*

## OBSERVATIO LX.

Variolæ lethales ob adjunctam Pulmonis inflammationem. 1. Variolæ & Morbilli etiamnum partibus internis bellum indixere. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. In hepate pueri à Morbillis extincti vermes reperti. 11. Morbillis retrocedentibus uteri sphacelus cito lethalis succedit. 12. Ossa quorundam à Variolis extinctorum erosa fuere. 13. Hepatis gangrena successit 14.

§ 1. **Q**UAMVIS morbi anno 1675. epidemii, paucis exitio fuerint, malignitatis omnis expertes, inter quos *Variola & Morbilli*, tota ætate vulgares, nonnullis tamen lethum inulerunt, vel ob prævium morbidum apparatus, vel quia pars aliqua nobilis antedebilis fuerit, in quam sevitiam suam clam exeruerint; vel quia partibus etiamnum internis perniciem attulerint; vel ob naturæ ignaviam, quæ virulentum humorem omnem foras pellere non potuerit: vel quia ejusmodi exanthemata certis quibusdam familiis magis injuria sint; indies sunt foveæ altius vultui insculptæ aliique nævi superstites: Mirro in curatione errores nimium frequentes, & abusus remedium quæ à centro ad peripheriam turgentem sponte humorem incitant, à quibus incandescit & effertur, præceptisque in partes principes irrunt: Lugubris fero Serenissimus Princeps *Georgius, Hassæ Landgravium*, qui cum Sereniss. Fratre paucos ante menses Genevæ appulerat, annum xvij. agens, nobis reluctantibus ereptus est: lunii die xxv. pro more mensæ accubuit; bihorio post, hora seil. secunda pomeridiana, supervenit vomitus, phlegmatis non cibi, nihil enim in prandio assumpsit, accedente lumborum & imi ventris dolore: Qui S. P. à consiliis Medicis erat, Excell. & Clariss. Dom. *Cambach*, nephriticum affectum suspicatur, quod alias non semel S. C. arenulas cum lotio exclusisset, idque mali per illustri Familix gentilitium esset: Quamobrem clysterem lenientem & anodynum præscribit, à quo bis alvus æmmora, nequaquam tamen remittentibus symptomatis: quin protinus si illis adjungit febris, veloci pulsu & magno se prodent, fiti & aliis: Quæ cum mihi narraret Clariss. Medicus, ab Ejus sententia discedere coactus fui, atque percussus ejusmodi symptomatis, tunc familiaribus illis qui Exanthemata illa sine fovebant, de Variolis aut Morbillis imminetibus, protinus suspicio innata est, vel maxime quod in florido vultu oculi splendore micarent, neque adhuc S. P. tributum hoc pependisset: Cum præsidia necessaria animo versarem, illico celebre illud & necessarium se obtrahit, Sanguinis missio, protinus, & priusquam exanthemata se proferrent, quarto fere die erumpentia, celebranda; ne elapsa occasione periculum internæ phlegmones, aut nimii fan-

guinis æstus incurreret S. P. At quia cum admodum Splendida Persona res erat, citra Seniorum & Saniorum consilium nihil moliri placuit: Porro quod nox ingruens generosi illius remediū usum prohibere videretur, Interim oculorum, faucium, æstus & vigiliarum immineentium provisio habita, præscripto collyrio, gargarismo, julepo, refrigerante & humorum tumultum compeſcente: Poſtridie Junij xxij. simul eum aurora tres alii advenere convocati Medici, experientia & doctrina celebres DD. *Alexander Deodati*, Facultatis Decanus, *Stephanus le Clerc* Senator, & *Johannes Bonetus*: qui exploratis explorandis consultatione quo nobiscum inita, unanimi consensu propositam sanguinis missionem adprobarunt, eamque sine remora faciendam, Eo quod, experientia testis, illi, quibus mature demitur, facilius & felicius morbo defungantur, quia dempta farcinæ parte, levaraue eo, quo velut onere premebatur natura, reliquum facilius superet, expeliat & concoquat: Additum febrem Exanthematum productricem de synochorum genere esse, quas sanguinis fervor inducit: Pustulas emergere prægresso ejus in valis orgasmo, fermentatione, & despumatione, quæ non potest esse non nimia in juvenili ætate, temperamento sanguineo; tempestate vernali simili, accedente uberiori viſtus ratione, sanguinis feraci: Consentire regionem natali S. P. solo tepidiorem: Nec prohibere inassuetudinem, alias præclusum iri fores non venæ sectioni modo, sed cuicunque alii remedio: Imo allatum decantatum illud, primam venæ sectionem perpetuo salutiferam esse: Apud nos ex arte factam efficax esse, citum & tutum præsidium: Interni æstus viscerum argumenta esse, linguam asperam, ad radicem nigricantem, incipientis alveoli phlegmones aut cacoethiæ præſagium: Equam antem venam, & quæ quantitas sanguinis demenda esset ulterius perquisitum? ac citra discordiam alterutrum pedis vas tundendum esse decretum fuit: Ejus quippe beneficio totius corporis depleta vasa, stante circulationis sanguinis doctrina, hinc beneficium in totum redundare: Febres pleraque tunc vagantes cephalalgiam, imo & delirium sibi adſciscere, quæ symptomata ejusmodi auxilio præcaverentur: Minus terrificam fore inexperto S. P. quod cutum oculorum effugere liceret: Minorique vitium dispendio fieri, quod pedes à fonte caloris sint diffusi.

Tertio ergo à decubitu die, ante septimam matutinam, utroque S. P. pede in calidam demerso, quo tumentioris venæ electio fieret, è dextro sanguis eductus est, qui citra aliqualem virium casum rivulose ad uncias septem effluxit, vas dividendo perito Chirurgo & venifica Mag. *Dentand* junior: Reclinato in lectum S. P. temperandi interni æstus gratia, & roboris patium principum, exhibitur julep perlatum: Circa meridiem leves pustularum efflorescentiæ, quæ sub vespere delirerunt, saltem oculorum aciem effugiebant: Quamobrem è re visum fuit illis quorum curæ commissus S. P. expulſivam Emulsionem præbere, ex semine mali citrii, eard. bened. napiq. scorzonæ, scabioſ. borrag. conf. hyacinth. margar. ppriis, &c. quo latentis variolæ iterum se proferrent, & impugnaretur cacoethia jam tum suspecta; Arebant enim fauces & radix lingue cum nigredine, absque *aliquo* sibi: Admotus eodem tempore vivus visio cordis regioni, speciebus cordialibus temperatis conspersus.

Nox sequens implacida fuit & insomnis, per quam pustularum, sed exiguarum in vultu & manibus, sinistra præsertim, copia emerſit: Febris erat mediocris, sitis non intensa: ideoque ad reliquiarum lætentium faciliorem eruptionem, capillum vini oligophori, ejusque dilutissimi (quod avide expectabat S. P.) semel concessum adjecto ovo sorbili: Lingue fauciumque scabritiei leniendæ ergo, præscriptus est astacorum succus, cum aquis convenientibus elicitus: Ad noctem sequentem præscripta Emulsio cardiaca leniens leviter diaphoretica, quia natura se-gnitus operi incumbere videbatur; admotique iterum cordi & plantis pedum pipiones, quo infratevellerentur vapores mentis aream invadentes.

Die v. Junij xxiv. hora iv. matutina, exhibuit se nobis vultus pustulis, sed latioribus conspersus; jectatio insignis erat & mutandi cubilis subinde desiderium: quod quanquam, retrocessionis metu, severe prohiberemus, consequi tamen à S. P. omnino sui juris, non licuit, quin in aliud grabatū transilierit: Interim lingue scabrities cum faucium nigredine augeri, ac raminarum venarum intumescencia: Unde jam tum phlogoseos partium spirabilium epinio innata, consiliumque de illis ferro dividendis caprum, quæ aperte atrum cruorem, quamquam saliva multa dilutum, effuderunt: Pryalismus frequens S. P. molestus erat: Inſpectæ fauces crassa phlegmata adhaerentia ostendebant; Ad meridiem & vespere intendebatur lingue siccitas, cum appetitus potus imminutione, ea propter ad bibendum compellendus fuit S. P. quo pulmones humectarentur, (quo arescere vox fusca & obscura ostendebat) & fauces crassa pituita obſeſſe eluerentur: Siccitatem adaugebat lingue *adæquatus* & æris (ore perpetuo biant) introſusceptio: Pustularum magna erat inæqualitas, quædam enim depreſſæ, aliz eminebant, hydatidibus aut phlyctænis similes differebant & magnitudine, pauca erant magnæ, minimum & miliacearum ubertas; præsertim in facie & malis, in quibus, cum rubore *inſusceptum*, densissime conſiſſe, herpetis miliaris speciem præ se ferentes, adeoque af-



fectus ex variolis & morbillis misti, cum suspitione affectorum pulmonum; quanquam ab-  
esset tussis & libera esset respiratio: Iteratum Julep perlatum & Emulsio ex cancriis.

Die vi. Junii xxx. mane exanthemata paulo extensiora, linguae siccitas adaucta, scabi-  
ties, nigrities: Vox propemodum rauca & tremula: deglutitio difficilis, sitis absentia, pul-  
sus creber, sed sine anomalia, parvus & dispar affectui, calor mediocris, anxietas summa &  
volutatio in lecto; urinae à naturalibus non aberrant neque colore neque consistentia, par-  
tium thoracicarum praesertim affectuum indicium: Quae cuncta oppressam naturam ob  
materiam in praecordiis latitantem arguebant: Ea propter ad eucurbitularum subsidium  
confugiendum fuit, eo in easu venae sectionis vices obtinentium: quae senario numero ad-  
motae sunt lumbis, natibus & internis femoribus: quae quantumvis addita fuerit scarifica-  
tio, nequiquam tamen cruoris elieuerint, quod totus in pectus confluxisset: Exinde porre-  
ctus fuit Pulvis ruber Pannonicus, cum cornu cervino praeparato philosophiae, ex aquis  
scabiosae, card. ben. Paulo post obrepit somnus, sequutus sudor pustularumq; nova erupit  
lingua purior apparuit, minus aspera & crassa: Nocte instante, hora octava, sudor iterum pro-  
rumpit, quo detergo S. P. hilaris fuit, vultus rumentior & exanthemata manifestiora.

Nox praecedens diem morbi vii, Julii primam, implacida fuit quam S. P. sine somno tran-  
segit: Variolarum eadem quae pridie conditio, febris fuit manifestior, pulsus inaequalis & de-  
bilio, alvus dura, cujus molliendae gratia injectum clystma ex carnium jusculo, oleo amygdali-  
no, saccharo & paucis nitro depurato ad refrigerium: unica sequuta dejectio, sed larga cum  
scybalis: Pustulae in brachiis & collo tumorem servabant, subsidentibus his quae in vultu: Genae,  
dextra praesertim, herpete miliaceo infectae videbantur, rubore intenso suffusae: Calor totius  
acer & mordax, pulsus creber: Circa quintam vespertinam somnus obrepit suavis, cum  
exspectatus hilans fuit S. P. coenam sumpsit, exacto bihorio Julep perlatum.

Diem viii. Julii secundam, nox praecessit quiesca, etiam somni fere expertus: faciei variolae  
eodem in statu, in brachiis & manibus exteriores cum maturationis levibus indicis: Pulsus  
quam pridie sedatior, lingua adhuc purior, abscedente foeda crusta circumvestiente: Data  
hora vi. dozis apozematis refrigerantis, alterantis. x. clyster injectus ob subsistentem alvum  
& ad refrigerium: A prandio animi angor S. P. occupat & de morte imminente cogitatio:  
Vespere alvus sponte & copiosissime solvitur, serosis prodeuntibus, superstiti ad desicci-  
dum inani stimulo, quamobrem lectum ut repeteret sollicitandus fuit S. P. cui redditum  
somnia duarum horarum invasit, à quo moestus experexit, respondere lassitudo renuens.  
Dehinc Pulsus de magnitudine remittit, firque crebrior, cum caloris intensione, tactum  
acriter ferientis, linguaque iterum aspera fit, à disruptis eam obsidentibus pustulis. Porum  
ex toto malo citrio dissecto, cum aqua & saccharo avidè exoptabat, qui illi paratus ex de-  
cocto radic. scorzonerae, cornu cervino, portiuncula citrii & saccharo. Ad septimam ves-  
pertinam somno iterum prebenditur S. P. quo solutus ter alvum, at minus copiose depo-  
suit: Pustulis, in magnitudine admodum inaequalibus, interspersae erant maculae morbillis  
affines; exanthematum autem plurima subsidebant & retrocedebant: quaedam puriformis  
erant, at revera inania. Labia, palpebrae densissime ab his obsidebantur. Oculorum aderat rub-  
or cum coruscatione: Sinistri adnata tunica ad minorem canthum ecchymosi erat foedatæ  
Alvi cohibendae causa praescripta est tinctura rosarum Julepo Alexandrino commiscenda:  
Vaporibus cerebri permelebat, quos revellere satagemus pipionibus plantis pedum  
applicatis. Cordi item admotus sacculus ex cardiasis pulveribus confectus. Quoties potus  
& jusecula offerebantur, praemittebatur Pulvis ruber Pannonicus cum margaritis.

Dies ix. Julii iii. noctem sequuta est pacatiorem, hilari & benigno vultu nos excepit S.  
P. oculis nitor restitutus, pulsus vero creberrimus, parvus, calori, qui acriter tactum ferie-  
bat, non consentiens: alvus substitit, sitis mediocris, semel enim per noctem potum ex-  
petiit. Exanthematum eadem conditio: Circa meridiem S. P. taciturnus fuit, vix ad inter-  
rogatas respondens. Pulsus plenior & aequalior apparebat. Sub vespem somnus irrepsit,  
sopori proximus, excitatus occupati cerebri indicia dabat, vellicationem  
ægre ferens & protinus in somnum relabens: Exinde manifeste vires collabi; inde spes, in  
sola juvenili ætate, collocata, retro collapsa referri; pulsus enim eum inaequalitate in horas  
minor fiebat: sopori etiamnum stertor accessit, eluto gutture desinens & absterfo viscido  
adhærente illi mucore. Ad merinoctium major virium ruina, viralium & animalium: pul-  
sus ex intervallis delitescerebat, ex intervallis resurgebat, colluctantis naturae cum morbo ar-  
gumentum, hujus autem dominatum tenentis. Frigescabant extrema, ob retrocessum ca-  
loris ad intimas partes quem revocare tentabamus pipionum applicatione.

Dies x. Serenissimo Principi fatalis fuit. Julii iv. circa secundam matutinam incanduit fe-  
bris, non tam ex pulsus micatione quam vultus rubore & calore acriter feriente manifesta.  
Subsequentus est universalis sudor, ubertim manans & calidus, sed infrugifer, imo noxius  
subsecuto inde spirituum, ac proinde virium insigni resolutione, Interim dum animae consis-

hic Venerandus Pastor ingruit valida sed brevis totius convulsio, animæ abiturientis opinio-  
nem faciens, ad horas tamen aliquot cohibitz cardiacorum efficacia & auxilio, quæ tandem  
horis pomeridianis terris valedixit, eam efflante lenissime & citra ullum suspitium Serenissi-  
mo Principe.

*Observata in cadavere Serenissimi Principis Georgii Hassiæ Lantgravii, &c.*

1. Nullæ maculæ, seu petechiæ in habita corporis deprehensæ, ac insignis livor à summa  
cervice ad imos lumbos expansus: Pustulæ plurimæ artus & pectoris regionem obfidebant  
nullæ in abdomine notatæ.

2. Aperto corpore, intestina flatibus tumida apparere.

3. Musculi abdominis & thoracis excarnes & sine pinguedine.

4. Omentum lacerum, discerptum, mediâ duntaxat intestinorum partem cooperiens.

5. Mesenterium integrum.

6. Ventriculus contractus & inanis.

7. Hepar summum incolume, sed magnum, Extremi lobi nigricabant.

8. Lien sine labe.

9. Cystis fellea cruorem nigrescentem continebat.

10. Pancreas naturale.

11. Renes salvi: Sinister dextrum duplo mole superabat. Pelvis dextri aliquid muci conti-  
nebat.

12. Copia insignis cruoris nigri in cavitare pectoris & abdominis.

13. Cuncta massa sanguinea nigricans, adusta, naturali crassior.

14. Pulmones sinistra parte liberi; dextra infirmâque costis & dorso annexi fibratum  
membranearum ope, (idem observatum in Cadavere Serenissimi Fratris Parisiensi dissectione, referente  
Clariss. D.D. Combac.) Per te dextra concava inflammari: Lobus sinister superior maculis  
nigris confusus erat: In dextro animadversus abscessus incipiens, jamque purulentus.

15. Cor integrum, sed parvum, quale generosis adscribitur.

16. Pericardium humore pene destitutum.

17. Vesica urinaria inanis & parva.

18. Lingua & Fauces variolis obsitz erant.

19. Ab his immunis epiglottis & tota aspera arteria.

20. Caro musculosa valde sicca & nigricans.

21. Cerebrum intermedium.

Interiorum viscerum examen non Variolas solum  
Serenissimo Principi, unctas fuisse, sed præcipue  
cacochiam, ex intento metaphreni lumborumque li-  
vore se prodentem, pulam facit: Cladis vero potissima  
causa existit Pulmonum non una simplexque læsio,  
quorum uterque lobus diversimode affectus fuit: Potro  
quoniam cum exanthematis solis pugnam initum  
existimatum sit, Malignitatem tamen, etiamnum ab in-  
itio, & cum suscepto consultatio suspensam fuisse, testi-  
monium perhibent qui delibantibus Medicis addi-  
tere: Reræ levit. Ph. natus erat ingruente morbo:  
Lingua aspera & ad radicem atro colore tincta: Pulsus  
calori acri non respondens: Urinæ toto morbi decursu  
naturalibus affines, Sitis exigua præscriptis causis sifi-  
feris, insiduum jure cum morbi indolem designabant:  
Hanc vero cacochiam in inflammationi cuiuspiam internæ  
adhibendam esse, priusquam humorum occulto vitio,  
recentiora signa innuebant. De Pulmonum læsione  
erit aperte non constaret, quia respiratio far erat libera,  
ab erat tussis, halitusque oris nihil ingratum affiebat,  
Ex lingua tamè quæ in morbi progressu æstivationis  
apparuit, densa tumida, & nigra, ac rarinarum vena-  
tum illi insiditum intumescentia, illos inquam lobis  
non fuisse expertes jam tum quodammodo constabat.  
Nec alio consilio illi tum valorem fæ. a fuit apertio,  
quod beneficium epu. odi phlebotomia in ipsos  
pulmones contrivari non ignorarentur: iteratæ enim,  
in brachiis faciendæ ex artis legibus, ad inflammationis  
progressum cohibendum, nobis est accip. potestas,  
aque ad natum auctor: Medica præcepta fuisse con-  
cinnanda.

His concurrentibus, enim nemissi sit abreptum  
fuisse desiderati Principem, quem è mortis

fucibus nullæ manus, nisi Divinæ eripere valebant:  
Presidia enim variolis adversantia, omnino alia sunt  
quam quæ Pulmonum phlegmoni destinantur: Hæc  
multiplicem & repetitam venæ sectionem exigunt, ex-  
haustiendi quippe pulmones, & ad sanguinis egestatem  
deducendi, quo progressus inflammationis arceatur. At  
noxiam esse sanguinis missionem ab exanthematum  
eruptione, imo lethiferam esse, vulgaris tumot est: con-  
tatum tamen docente experientia, qua teste multi le-  
tho proximi, jam jam lassocandi, saluti restituti, statim  
ac ad aperta vena est affutim eruptibus variolis, quas  
ad exteriora presidium id evocat, nedum retrocedere  
cogit, quod ab impetibus traditum. Eadem faciat Nob.  
juvenis ex illustri Chaboriorum familia, annis xviii.  
natus, quæ per paucos vero dies ante S.P. suum Variolis  
prebentis est: his ad maturitatem deductis, levit alvi  
suis fuisse circumspiciæ subita earum delatentia, febris  
exandescens, imo phrenitis, præcæptem enim se, ni  
cæntum fuisse per fenestras dedisset: Pulverum alexi-  
teriorum & expulsiuorum exhibitionem caterva ad-  
stantium urgente strene obstitimus. Ego & Excell. ac  
Clar. D.D. Alexander Diodati, qui præscripta in mal-  
leolo venæ sectione, (unde sanguis, etiam pede in aquam  
non demerso manavit, eodem ipso momento sedatum  
delatum, alius deferbat ac exanthemata uberius eru-  
pere) desperata valetudinis Nobiliss. juvenem saluum  
fecimus.

Malignitatis autem habitam fuisse rationem Medi-  
camentorum præscriptorum series ostendit, quorum  
ope tota exanthematum materia ad corporis ambitum  
detrusa fuit: nulla quippe in interioribus visceribus  
visui se obtulerant quæ pulmones si excipias, saliva &  
illata fete apparent.

Cuncti iter in capacitate abdominis & thoracis re-  
pertus, dubitandi ansum præbet, cultroque anatomico  
ejus effusio asseritenda sit, an causæ intrinsecæ, quando-  
quidem dissectio anatomica condituræ cadaveris gra-  
tia præcipue suscepta, accuratam & sedulam manum  
postulare non videbatur, ut ideo ab incursa vasa ma-  
jora læsa esse videretur, quod Clar. D. D. *Combachio* pla-  
cuit. Si tamen effusi cruoris qualitas, aut, crassi & pene  
concreti pendatur. Si pulmonum affectus, grâvi in-  
flammatione imo & abscessu tentatorum, Nil absurdi  
dicturus videtur qui sponte referata hæc vasa sangui-  
fera asseruerit, sanguinis actionis eorum quodpiam  
erosione, vel orificia ut hiantur cogente: Totas enim  
in thoracis capacitate confluxerat, inde per discissum  
septum transversum in abdominis cavum, quamobrem  
indignia vasa inania se obtulere: Inde ratio deducenda  
videtur quod admodum cucurbitulæ, quamvis adhuc  
scatificatu inanes remotæ sint illam autem valorem re-  
stitutionem, & cruoris extravasationem, tum demum  
contigisse censendum est, cum gravis syncope quæmor  
ante obitum horis S. P. pene abitulit, tunc temporis  
a nonnullis disrupto interno tuberculo adscripta, aut  
tetro cuiuspiam vaporosi ventriculo insessa; At si fixa  
illa fuisset, nec tanto molimine ad vitium revocatio-  
nem opus fuisset, quæ exinde manifeste arteri, opinio-  
neque ciculis collabi visæ sunt: Candidæ denique Arterię  
ab ergastulo separatio idipsum innuere videtur, citra  
vel leve fupulsum superna repens, quod mortis ge-  
neris his præsertim accidit quos subita sanguinis eruptio

abripit. Gravis læsa alias juvenum obitum præcedi,  
naturæ quod licet cum morbo dimicant.

Vitæque cum gemitu fugit indignata, sub umbra  
quod certamen in S. P. observare non licuit, ob naturam  
prædictis suis destitutam, sanguine scilicet & spiritibus.

Cruoris color ater, incendii febrilis interiora detra-  
stantis index fuit, qui vix & ex intervallis tantum adter-  
riora & expandebat, retractus ad viscera ab eorum  
causitate & phlogoseos pulmonum magnitudine. Inde  
quoque causa repetenda quod pepasum nullum te-  
ceperint pustulæ, qui à calore tepido non intenso per-  
ficiuntur, & quia poris generatio sanguinem dominanti  
ruræ capacem, nec omnino ab ea alienum suppedit.

Dum condituræ incumbere Chirurghi macula,  
ante non animadvertisse, oculis se obtulerunt, quæ ju-  
dice Clar. D. D. *Combachio*, Petechiæ erant, Assensum  
vero ut non præberem, (patet Vix. Excell. & nihil  
amicissimus, in causa fuit, primo Petechiarum indoles,  
quæ in mortuis se produnt sed statim ab excessu, dum  
caloris supersunt vestigia, tenuem materiam ad ambu-  
tum trudentis, adhuc dum mobilem: Extincto vero ca-  
lore, oclusis omnino poris & densatis, humoris nulli  
expulsi expectanda: secundo Earum macularum egi-  
go, quæ nihil aliud fuerunt quam pustularum, seu va-  
riolarum, toto morbi tempore admodum depresso  
reliquit, absterisa scilicet emollientiori & cutis superficia  
excedente parte, à frequenti per spiritum vini elotione  
imo & absterisione.

§. 2. Observatum quosdam ab interitu dissectos, quibus Iecur, Lien, Pulmones, omnia-  
que interiora, haud secus atque cutis, sordidissimis papulis manantibus scatebant: *Ferndis*  
*lib. 2. cap. 12. de abd. rerum causis.*

§. 3. Id mihi videre licuit in duabus puellis, quarum una quatuor, altera 17. annos nata  
erat: utrique enim ex morbillis mortuæ & dissectæ interiora viscera crustosis pustulis, his si-  
milibus quæ in cute emergunt, obsita visæ sunt. *Parenti lib. 19. cap. 1.*

§. 4. Illustr. quidam Comes Variolis correptus ob febris & *Dysenteria* vehementiam  
primo die morbi mortuus est. Dissecto Iecur, Lien, Pulmones & intestina haud secus atque  
ipsa cutis sordidissimis papulis manantibus scatebant: unde forsitan factum quod in extis Glo-  
riosisissimi Romanorum Registalia quidam notantes, dixerint gravissimis affectibus obnoxium  
fuisse, quos propter ad senium non aspirasset. *I. D. Horsius observ. Anat. 9.*

**D**ysenteria vehementiam] Alvi fluxus sanguineus omnibus pueris Variolis cum alvi fluxu sanguineo le-  
thalis solet esse in variolis, adeo ut *Roverius* ex botantibus unicum evasisse asserat.

§. 5. In aperto cadavere Illustr. Principis Regiæ Mariæ Auriacæ, Londini Variolis extin-  
ctæ. 1. Cutis exterior scedata hinc inde apparuit rumoribus seblividis, & totum dorsum, hy-  
pochondrium utrumque & thorax, cum pustulis magnis sanie multa repletis: 2. Aperto ab-  
domine Omentum apparuit semiputridum & superiori parte aliquantulum consumptum, nec  
non prope Lienem valde inflammatum: 3. Lien omnino mollis, flaccidus & semiputris: 4. Ven-  
triculus anteriori parte inflammatus, intus aphthis multis, & in fundo longiori glandula præ-  
ternaturali obsitus. 5. Hepar parte summa maculis scedatum & prope ad gangrænam usque in-  
flammatum, cum summa parenchymatis flacciditate. 6. Pulmones ex utraque parte pene  
putridi & sanguine nigricante pleni, & tota superficie maculis & pustulis insignibus con-  
persi. 7. Cor melle, laxum, flaccidum & parenchyma ejus ferme consumptum. 8. Rencs satis  
sani, nisi quod sinister ad inflammationem tendere videbatur, *Th. Bartholinus cent. 3. abs. 29.*

**E**tiam interiora viscera exanthematis scedari non  
semel vidimus. Plerumque in pulmones sese ex-  
onerans infectus febris acutæ sanguis, putredinis in  
illis labem impimit. De piscatore refert ab *Heer* Ob-  
serv. Spudan. 12. Pulmonis lobum dextrum pure ha-  
buisse refertissimum, in sinistro quindecim abscessus.

Similis abscessus materię fontentis in morbis acutis in-  
statu Urbani 1061. grassantibus observavit *Leisius* à  
Fonte cons. 3. Causam invenio nullam nisi quod per  
circulum has partes universus pene sanguis transeat,  
motamque trahat in viscere maligno æstu, facillime.

§. 6. Infans nuper natus Variolis inficitur quibus suffocatus interit: Cadaveris resecti  
thorax aqua viridi repletus cernebatur. Parentibus persuasum ex ulcere dimanasse, quod  
ex collo improvide depulerant: crediderim verius ex pustulis exstillasse, quibus in variolis  
etiam

etiam Pulmones solent infestari, unde suffocatio: Vescicula biliaria versus intestinum duodenum obstruata causam aperiebat obstruataque alvum infans passus fuerat: Hepar, ut in infantibus solet, inflatur & magnitudinis & figuræ, exsuccum tamen & pallidum supra intestina instat omenti sternebatur. Lien à sano vix diserebat. Pancreas pustulis plenum, & cor circa basin profundius adipi immergebatur. *T. Bartholinus cent. 4. hist. 42.*

§. 7. Equiti Torquati D. de Rochefort, filio annos 12. nato erumpunt Exanthemata: Cum defevire viderentur, spiritus & expectoratus eruentum, necnon melius cruentum, idque abunde: Coguntur Medici, etiam presentibus exanthematibus, venam aperire, *Evacuato per viam urinarum sanguine*, tandem moritur.

Aperito cadavere, internum etiam corpus æthymatis scatebat: Rupta erant vasa sanguinis, & in regione renum multus collectus erat: Hoc symptoma novum deprehensum est. *Ballonius Epidemier. & Ephemer. lib. 2. pag. 207.*

**E**vacuato per viam urinarum sanguine ] Inter signa maxime lethalia variolarum, unum sanguinem, & sanguinis per alvum, os, nates excretionem, &c. eccenset *ætherum*, quod ejusmodi sanguinis erupcio summe sanguinis acrimoniæ & malignitatis indicium.

§. 8. Experientia confirmat quod sæpius interius etiam undique variolarum eruptionibus viscera fuerint infesta, quemadmodum scio id ipsum in corpore demortui cujusdam Landgravi junioris, ex variolis obeuntis, fuisse observatum, ubi propter malignæ materiei copiam, non tantum exterius undique totum corpus inficiebatur sed interius etiam ipsa viscera pustulis scatebant. *Gregorius Harsinus oper. Tomo 1. p. m. 140.*

§. 9. Unum in mentem revocabo, Variolas inter morbos cutaneos reponi, quia id quod in his manifeste se prodit, est cutis scedario: nihilominus in dissectionibus fere semper viscera reperiri, non secus quam eutem, his tuberculis conspersa, lienem, jecur, pulmones, pancreas, & reliquas interiores sedes hac labe infectas. *Roder. à Castro, Qua ex quibus lib. 3. c. 16.*

§. 10. Grassantibus Amstelodami Variolis anno 1669. inter alios unus, cui postea quam cum ardentissima febre natura variolas foras protrussisset, ex subito repereussit intro recessere; nec procedebant ad requisitam hoc in morbo, si sanandus sit, maturitatem: hinc puer omni expectatione citius suffocatus subito interiit.

Quantumlibet ingrata videretur ejusmodi corpusculi contrectatio, tanti mihi tamen videbatur scire tam tubicæ suffocationis causam, & viscerum interiorum tali in morbo constitutionem, quam alicuius Anatome revelaret, perperuis tenebri involveret sepultura: Inveni ergo Pulmones ita undique Variolis intus & foris plenos, ut nihil prorsus in his sani conspiceretur. Erant autem Variolæ istæ in vigore suo, maturæ & pure turgentes, quæ etiam flavæ cujusdam aquæ tantillum in cavitate pectoris infuderant: ut mirum non esset tam misere afflictum viscus non sufficere potuisset respirationis officio: Ubi descendendo ad inferiora, ecce tibi Lien, non minus quam Pulmo infectus, tumidus & durus: Intestina hinc inde tantummodo apparebant vestigia Variolarum, quasi gemmis distincta, sed Hepar intantum & sanum persistenter. *Theodorus Kerkringius Observ. Anatom. lxii.*

**P**ulmones ita undique, &c. ] Observavit Mag. Ludovicus Noel Chirurgus Genevensis peritissimus, jam nonagenarius proximis, visitationi cadaverum Præfatus, Quotquot Variolæ adoluerunt, nisi pectus illis ob-

§. 11. Puer cum Morbillis laboraret, & ratione eorum vita functus esset, dubium erat inter nos morbilline partem interiores, viscera puta affectissent & oblixisissent: Clariss. Campolongus puerum aperiri jussit ut viscera aliquid passa essent cognosceret. Eo ergo aperto, habita primum ratione Hepatis, cum in sanguine hic morbus sedem habere censeatur, invenimus vermes plurimos in ipsis venæ Portæ ramis, & quidem in ipsis Hepatis ramis: quorum alii quidem viuentes adhuc, alii vero emortui: hi rubri, & pro ratione loci in quo continebatur oblongi erant, satis item magni, sed molles ad tactum, gibbosi item quoad superficiem, ratione corporis concavi in quo geniti secernunt. *Ex observationibus Joh. Banhini.*

**I**nter Medicos fuit disceptatio non levis, quidum nimirum & quo loco h. genus fuerint. Existimavit unus genitos esse in intestinis, & hunc per venas Mesentericas in Portam, & de hac in aliis venas Hepatis deductos fuisse: Alii putavit genitos quidem in Hepate, non tamen in utroque pectore existente sed eo mortuo, Tertius determinavit genitos esse in Hepate pueri viventis, & aque genitos esse ex sanguine putris permixto, Cuius sine opinionibus & ego sum. *Idem.*

*Vermes plurimos.] Vermes in variolis observatos*

fitum sit, Peripneumonicos interire, quia nampe hoc mor variolas committens in Pulmonibus cohibetur, nec foras exiit.

quoque memorat *Tb. Bartholinus cent. 5. hist. 20.* Cum Variolæ, inquit, infantes adultosque 1636. per Universam patriam defunderent, & sequenti anno per multorum mortes vagarentur, observavit Bergius Norvegorum D. Tremblerus in filiolo lanonis 4. annorum variolas decumbere, & jam vix spiritum amplius haurire poterat, vermen spiritum longitudine 6. naribus extractum ab adstantibus, quo extracto statim è vita discessisse. De variolis verminosis plura annotavit *Rhodius cent. 3. obs. 64.*

§. 12. Anno 1675. Dominica SS. Trinitati sacra, venit Thorunium Illstr. Comitissa à Dithiof, &c. cum Nana Russa, 36. annos nata, jam per octiduum nephriticis doloribus gravissime divexata, quibus tandem paulum sopitis, novum symptoma supervenit, Morbilli purpurati eum febre continua, qui eum altera die mox evanuiscent, natura jam & doloribus nephriticis summe debilitata succumbente, accedentibus levissimis convulsionibus, eadem vitam cum morte committavit.

A morte ipsius Illust. Domina causam ejusdem mortis repentinæ indagare cupiens, ut scio cadaveris institueretur rogat, quam etiam me presente peregit Georgius Grunach, Chirurgus, ubi tum cor inventum est flaccidum sine ulla pinguedine, & absque humore in capsula ejus Pulmones lividi: Ren sinister, omni iridem pinguedine, destruebatur, in quo calculus pinguis magnitudine repertus est: Ren autem dexter naturalis similis fuit, in quo etiam calculus qualis in sinistro, sed minor latitabat, In ureteribus nihil, Vesica ab urina vacua: Uteri autem fundus tam ab extra quam ad intra sphacelo correptus fuit, qui etiam absque omni dubio tam repentinæ mortis causa erat. Hoc in casu Epigenesis Red. Cassrensis pulchre confirmatur, Vide l. Quæ ex Quib. Simon. Schultzeus in miscell. cur. ann. 1674. 1675. & 1676. pag. 221.

§. 13. Quoad prognosin Variolarum & Morbillorum, affinitate summa conjunctorum affectuum, asserere licet subesse deleteriam & contagiosam qualitatem, non humoribus solum & partibus carnis infestam, sed ipsis etiam ossibus, quæ ab ea lue non secus ac à Venerea corrodamur. Id quod non solum anno 1598. experiri licuit, sed & sæpius per longum vitæ stadium à Dæo mihi concessum. Insigne vero suppeditavit exemplum & mirum puella quinquennis circiter, filia Claudii Pique Regij Bibliopegi, quæ ob Variolis decubus per mensem, natura autem veneni non potente, abscessus sterni regioni innati sunt & humerorum commissuris, hinc humor virulentus sterni ossa omnino corrosit & separavit, simul cum epiphysibus ossium humeri, simulque partem maximam capitis homoplatæ Testes habeo Dominum Myron, Regis Consiliarium & Medicum, & J. Doreau, Comitæ Bryanei Chirurgum, coram enim illis dictam puellam cultro Anatomico subjeci, in qua prædicta à me deprehensa sunt: Rolinus Marie, Conspiciolorum Venditor Parisiensis, ad me adducit eam puellam quatuor annos cum duobus mensibus natam, cui universum corpus pustulis conspersum erat, ossa præterea brachiorum & crurum putridis abscessibus, fracturis cum putredine, tentata, comite febre ardente, cui manum admoveere recusavi, postridie morte succedente: In multorum præterea gingivarum caries & putredo deprehenditur, magno cum foetore: ejusmodi corruptio ortum ducit à putridis vaporibus, ex interioribus partibus ad os elatis, ac plerique eorum quanquam magna adhibita diligentia intereunt; In multorum præterea cadaveribus à variolis interemptorum impressus natus & intemperiei notæ insignes in visceribus observantur, in jecore, liene, intestinis, hinc plurimi in hydrope delabuntur, phthisin, raucedinem, dyspnoeam, diarrhoeam cum ulceribus intestinorum, ac tandem mortem, prout pustulæ in partes internas sævierunt non secus ac in exteriores: Quoad has, non solum inde deformes evadunt, vultus præsertim, à pustulis & ulceribus cutem pervadentibus & carnem subditam erodentibus, unde sæpe cicatrices superstitæ sunt, sed & quandoque motu articuli privantur, cubitorum præsertim, corporum, genuum & pedum: Quibusdam excitas omnimoda inducta, alii audiendi facultate orbati sunt, alii odorandi, ab exescente carne in narium & aurium canalibus, quod in cæteris corporis partibus accidit, tam interioribus, quam externis: Tandem assero, omnes abscessus, quibus, ob variolas tentantur pueri, & morbillos sufficienter non erumpentes, veneni & malignitatis expertes non esse, ob humoris virulentiam, ob idem difficillimæ esse curationis. Paucis, Si corpus à variolis & morbillis non rite expurgetur, æque molesta & periculi plena exoritur symptomata quod à Lue Venerea. Pareus operum lib. 20. cap. 1.

§. 14. Mirro programma quod immaturus Episcopi Halberstadenis apud nos obitus à me Væ. Rectore Academico exegit, ut haberes anam de gangrana Hæpatidis, quæ sive causa sive effectus exitit, una cum variolis in tam teneo corpore deprehensa fuit, cogitandi. Henningus Arnifaus Epist. ad Greg. Horstium.

Causa est annotatione dignis ejus exemplum neque vidi neque legisse memini: frequenter tamen id ipsum fieri possi non dubito, cum experientia confirmet quod sæpius etiam undique variolarum eruptionibus viscera fuerint infecta: cum autem necessario febris sanguinea cum putredine majori concurrant in tali casu, facillime fieri poterit, ut prævalente calore febrili in visceribus sanguificationis præ cæteris corruptatur, impinguis cum propter curam undique pustulis exulcerata-

tam & incrassatam transpiratio & ventilatio difficilior sit: Si enim inflammationes internæ, ipsiusque jecoris, teste Hild. de sphacelo, non raro delinunt in gangrenam, non video cur non id ipsum sæpius etiam fieri posset tunc temporis, ubi variolis, undique satis quidem expulsi, gravissima symptomata partium internarum inflammatarum nihilominus perdurant, eo usque donat ægrum penitus jugulent. Gr. Horstium Tem. 1. p. 149.

## OBSERVATIO XI.

*Variolarum nova species, Rossalia dicta, lethalis duobus infantibus, ob supervenientem pulmonum inflammationem & abscessum.*

Puellæ septenni & pueri novenni quomodo Rossalia interfectioni fuerit, ad scribam, Scilicet cum uterque in vado jam constitutus esse putaretur, præter expectationem novo symptomatum turbine abripitur, viæque naufragium pati cogitur, illa quidem maturius, hic vero paulo serius, cum enim consuetæ symptomata, utpote 1. Intensus calor, 2. rubor universalis, 3. sitis, 4. delirium, 5. catarrhas ad fauces, 6. appetitus dejectio, &c. remississent, cuticula squamatis exoriari inciperet, dolores quin etiam extremorum lenirentur, Ecce, morbi die XII. novus rigor puellam invadit, quam novus calor urentissimus insequitur, tanta pravorum symptomatum syndrome stipatus, ut ante dici naturalis elapsus spatium, *vixit cum morte permutatis* oboriretur. Sic Rossalia quidem tota evanescebat, sed pessimam post se sobolem reliquebat: quippe pedibus, erubus, scroto, ventre ac facie puer intumescibat, cum genarum nonnullo perpetuo quodam rubore. Febricula irregularis ipsum fatigabat, *tussiebat*, sed pauca expectorabat, eaque spumosa saltem & pituitosa, difficulter respirabat: septiduo antequam moreretur, noctu tanta respirationis difficultate corripiebatur, ut nonnisi erectus spiraret: nullibi præ summa anxietate consistere poterat: de pondere intra pectus conquererebatur subinde, stertebat moribundorum instar, facies tota nunc pallascebat, nunc lurida reddebatur, nunc aliter pingebatur: Pulsus intercipiebatur frequentissimè, uti & respiratio: breviter jamjam expiraturum credebant omnes: Post exhibita discutientia, resolventia, expectorantia, & spiritus ac eorū resicientia, meliuscule nonnihil habere incipiebat, donec à meridie rupto pulmonum abscessu, & pū & sanguinem atrum tulli rejiceret: De abscessu itaque certior factus, infanti abstergentibus, putredini resistentibus & expectorationem promoventibus; interpositis interim roborantibus necessariis, sed quid sit Septimo à paroxysmo isto suffocativo die anxietas eadem revertitur & circa meridiem ægrum perimit. Cum igitur Pulmonem inflammatum fuisse, & in abscessum inflammationem dudum transisse, ex sigis minime fallibilibus didicissem, urpectus primo omnium aperiretur suavi.

Eo aperto, tota Pectoris cavitas aqua citrina diffusa, Pulmonesque ambo toti lividi & gangrenosi conspiciebantur. Quin finitè dissectus in interiore sua substantia magnum itidem abscessum ostendebat, reliquæque ipsius substantia digitis contrectata facillime disfluebat: Postquam ad abdomen perventum est, innatabant simili aquæ tota intestina: Omentum prope consumptum viscebatur & ad superiora retractum: Hepar pro individui ratione portentose magnitudinis erat, subpallidum, & tam longo, qua ventriculū contingebat, lobo præditum: ut non tantum totum ventriculū regeret, sed & in sinistrum usque hypochondrium exporgeretur, atque Lienem, qui minutulus erat, de sede sua versus renem sinistrum deprimeret: Vesicula fellea & ipsa prægrandis erat atque pallescens: Hæc pueri est historia. Michael Doringius Epistol. xviii. ad Sennertum

ILLud tacere non possum auctores qui de Variolis & morbillis scripserunt, in enumeratione specierum ut plurimum esse mancos & nonnisi solutum distictum duarum specierum meminisse, cum tamen experientia multo plures suggerat, quod vel mulierculis nostris notum est: Proferam igitur ipsi usitatas nomenclaturas, quæ sunt *Blattern*, *Scheffelattern*, *Masen und Rubeeln*, sive *Roeheeln*, corrupte enim peo loqui videntur: Sub nomine dicitur *Blattern* Variolas communiter sic dictas intelligunt, quoniam una sed multiplici facie erumpunt: quippe aliæ minores, aliæ majores, aliæ mediciores existunt: Aliæ præterea ichthiosæ, aliæ saniosæ, ut sic appellationem apparent; Nonnullæ tandem, quædam frumate protruduntur: quædam facile quædam difficulter, & cum gravibus symptomatibus expelluntur: quædam protinus ac inanus ac circulo cinguntur rubeo, aliæ tubulidæ per multos dies quædam cito, quædam lente suppūant, &c. *Die Scheffel blattern* per Crystallōs exprimit Ingrassias de Tum. p. n. tom. I. p. 194. Quoniam scilicet in his quædam per universum corpus dispersæ pustulæ efflorescunt, lupini magnitudine, plius minusve alt. ac instar crystalli resplendentes, quibus deinde apertis aquositas quædam effluit: Hæc omniū minus periculosa sunt, & quandoque ex improviso citra notabilem calorem & invaleſcentiam infantes prehendant, Ingrassias rursū aliud quædam phlyænas bullasve, ab Amœna vesicæ nuncupatas esse opinatur: *Die Masen* Morbilli sunt, qui gravibus

nonnunquam, perinde ac Variolarum nonnullæ, si panus symptomatibus & ceteroquin nisi error quipiam interveniat, non frequenter lethales: *Die Rubeeln* sive *Roeheeln*, à rubore proculdubio sic denominatæ, nostraticas sunt pustulæ, sive tubercula pustulæ, rubæ, nunc magis minusve copiosæ, sive circūferentis ut plurimum singulatiter ab invicem distinctæ, acuminatæ, morbillorum instar, cum calore ac tussis invadentia, quandoque etiam hæmorrhagia vel vomitus præcedunt: disparent instar morbillorum, & hæc hyme plerumque alvi fluxu judicantur sunt, at hæc magis quam morbilli periculo vacant: Nescio an satis rectè ad *Mogiliarium*, quasi militare seu miliarium Ingrassias, referre possim, eo quod mili granis ista tubercula non valde sint absumilia, hæc quandoque cum morbo solitatis invadunt, quandoque Variolis interspersæ sunt, quandoque etiam his persanatis demum superveniunt: Præter dictas species, alia quædam insolentior, contagiosa tamen & ipsa, ante annos aliquot primum mihi observata est apud. D. Abt. Sellenam, ubi quarto quintove die à primo mulieris corpus universum à capite ad calcem usque tanto rubore perfundebatur, ac si universali erysipelate occuparetur: terminabantur 7. & 8. die, rubore disparente sensim atque epidermide squamatis postea decidente: Consulsi super isto affectu varios auctores, qui tamen eum agnovisset, vel descriptisset inveni neminem præter citatum Ingrassiam: Is enim l. c. p. 194.

peculiarem quandam morborum speciem, mensuram sanguinis, ut opusatur, occultam infectionem insequentem introducit, quam Neapolitani vulgo Rosellam, sive Rosellam nuncupant: Si quidem maculae per universum corpus plurimae, magnae ac parvae, signatae ac tubae, cum vix effusa digno tumore insit multa (ita habet textus Ingrassiae) festim distincta erysipelata, dispersae sunt ut totum corpus ignitum appareat: Dices istam descriptionem non quadrare affectui à mi nominato: Imo vero quadrat, aio, Si enim tempora istius affectus diligentius perpendas ovum ovo non est tam simile quam meus iste obfervatus affectus Rosellia: praeterito namque autumno aliqua multa exempla item mihi oblata sunt, quae effecerant ut haecenus cum diligentius paulo de eo cogitarem, tum pro singulari ad te scribendi argumento, eundem nunc selegerim: Verum itaque est de initio & inclinatione, quomodo scribit Ingrassias, quod maculae per universum corpus purissimae magnae ac parvae, ignitae ac tubae, cum vix effusa digno tumore, instar multa (agnosce verba Ingrassiae) scorsim distincta erysipelata dispersae sunt: hoc enim liquido affirmare possumus quod non tantum in principio res sic se habeat, sed & in declinatione, cum tumor iterum dissipare ac calor remittente incipit, maculae insit petechiarum hincinde sub conspectum veniunt: postquam vero morbus à quoque iam plene allequutus est, totum corpus, ut loquitur Ingrassias, ignitum appareat, ut haud immerito ignitum erysipelati id ac malare queas: E tenuiore ac, fervidore sanguine oritur iste tumor atque, nonnulli albis erysipelas, &c. Praeterea circa Rosellam sequentia etiam praeterito anno annotavi, Nimirum urgent plerisque 1. graves capitis dolores, cathartici ad pectus & fauces delabentes, quorum illi tussis & Pulmonum inflammationes, hi pro materiae diversitate morum suffocationis, vel ob humorum visciditatem in vias respirationis decumbentes, vel tonsillarum & adiacentium partium inflammationes invehunt, 2. calor ventris, adeo ut sublaro lecto faciem altissimum non minus feriat quam si ad focum aliquem confisterent. 3. Sitis inexhausta 4. summae cutis licetitas & asperitas 5. vigilis assidue 7. Deliria nunc magis nunc minus gravia: Atque haec in ipsa morbi à quoque maximam partem videntur: In augmento nonnullis nares stillant sanguine: omnibus vero toto morbis decursa appetitus prostermitur & alvus obturatur: urina impensae flammae est, crassa & cruda: pulsus admodum celetae durus: ubi vero ad declinationem tendit, calorque ac tumor corpus paulatim desereret incipiunt, tunc demum 1. maculae illae petechiales quarum supra memi 2. Rubor genarum, pulmonum inflammationis cetus index, qui pitem ob universalem totius corporis expandescentiam tam distinctè animadverti non poterat, conspiciantur: Terminatur ut plurimum translatione materiae ad articulos extremorum, cum tam dolorifico tumore ac rubore, qualis apud arthriticos esse solet: hinc caris reliqua corporis squamata detrahunt: mox pedes ad talos & ad furasque intumescunt, urinae crassescit & tutescunt: hypochondria tenduntur primum &

respiratio difficilis redditur, paulo post abdomen ipsum in tumorem attollitur: Ipsi autem nonnulli magnolabore & post multas demum septimanas, cum hydropici incipientes, ad pristinam sanitatem deducuntur.

*Vita cum morte permutatio, &c.* Ergone nemo moritur in morbi declinatione? Sed revera obit in aetate morbi succedente, scilicet inflammationis pulmonum & pectoris hydro, à quibus suffocatus missilis perit.

*Novus rigor invadit* Solabatur me quidem initio apbor. §3, 4. Si rigor febre ardente laboranti superveniat, morbi solutionem promittit: tubabat enim primum non tantum 4, 6, ejusdem sec. Si rigor invadat febre non terminante, agro jam debili, letale est. Ex 29, si in febris sexto die rigores fiant, indicatio curae est, ciliis: quo trinitum Medicorum axioma verificatur, dies paucos non incide morbi motus qui salutis sit. Idem ibidem. Sed notanda est Rigoris origo, cuius enim aut ab ulcere, aut a vase: citius aphorismi spectant rigorem a materis vasis congesta bitum, quae cuticem expectet expulsiorem: In pueris, quo pueri rigorem peperit parvulus humor abiectionis conclusus.

*Tussibat difficiliter respirabat* Tussis & difficilis respirandi male cartho impuratur quae potius ab inflammatione pulmonis & thoracis hydroe oriatur.

*Tota Pectoris cavitas aqua citra reserata* Quia ratione aqua illa in pulmone & thorace generet omnino consideratione dignum: Ego in ea sum sententia, cum Hepar & Pulmo frequentissime simul afficiantur (id quod in asthma, ut hoc obiter dicam) semper fieri puto, potest materia illa ex Hepate per venam arteriosam ad pulmones derivari, vel etiam in ipso pulmone generari: Cum enim Pulmo viscidus, quod non solum pro sui nutritione alimentum coquit, sed etiam sanguinem cordi praeparat: si male habeat, in coctione illa multa excrementa & etiam abdomen aqua repleta fuerit, ea proculdubio in pectus inde teguigabit. *Servatus Responso ad Doringium, Epist. xx. cent. 4.* Sed cum Variolae non solum in externis partibus, at etiam in omnium viscerum superficie erumpere soleant, Quid vetat idem de Rosellia asserere, atque ex pustulatum, pulmonum tunicam ambientium disruptione, aquae coagulationem in pectore deducere: Ejus autem, quae in abdomine reperta est, à pustulis in jecoris, lienis, omentis, mesenterii, atque tunicae partium huius ventris membranis abortis, aptis? Humorem autem Roselliam facientem lymphaticum esse, ostendit pustularum pelluciditas, ob quam Caytalli nomen indidit Ingrassias: Veque à sanguis arterialis & venis *quasi* & *venis*, ejusque in curam viscerumque membranis disputatione oritur Variola & Morbilli: Sic ex humoris, lymphaticis vasis coctis, limpidi & pellucidi ebullitione, atque eas, in partes transmissione & dispositione, Rosellae origo videtur, cecidit. De Rosellia agit Mercurius commun. in v. 10 lib. A Epid. ted. 1, negatque esse cum esse Ierusalem, nisi concedat culpa Medici, praeteritum si sanguis fiat melleus, quam omnino noxiam dicit.

## \* APPENDIX.

### De Variolarum malignitate.

**A**Nno 1660. Neocomi Helvetiorum epidemice erant variolae mense Martio: tunc temporis junior ancilla aet. 14. nata diebus aliquot operam navaverat colligendis samentis in vine purgatis: regat illa heram vacationem ab officio mane qua hora ad opus redeundum erat, quod male se haberet & variolas se fovere diceret, denegat immittis hera, Procedit ergo ancilla ad opus, cui toga dia, nivifera & pluviosa, incumbit, Sub vespere madida ad me deducitur, digiti annularem manus dextrae potrigens sphacelo correptum in quo prius intentum ardorem perceperat, Quid agendum rogatus, abscindendum radicis pronuntiavi, ne manus sincera traheret, id quod praestitit Chirurgus, tenaculis incisuris destitutus, ope scalpri & mallei: manum digito conficit, paucosque intra dies convaleuit puella.

*Plerumque à Febre Pestilenti extirporum interiora viscera à phlegmone siderata reperta sunt. 1. Pestis & Febris Pestilens ventriculum praesertim adurit. 2. 3. 4. 5. Carbunculus Pestilens in ventriculo. 6. 7. In quadam Pestilentia serpentes, lacertae. 8. 9. In alia vermes in corde reperti. 11. Pestis Bobus infesta, quorum cystis fellis lapidea facta. 12. Bubones pestiferi vermiculis scatentes. 13. Caro substrata in lethiferis usulata.*

§. 1. **N**Ovi mulierem cui in pelliculas crassas & glutinosas non solum Lingua, sed & Oesophagus universus cum ventriculo, tandem & intestinorum tunicae putruerunt. Hæc inter initia sitiens magnopere, vinum austerrum & rubrum sumpsit in uno die, prope ad quantitatem librar. sex, unde sic illi gustur incanduit ut nec liquidiores cibos transmittere, nedum medicamenta potuerit: Obit illa miserrimo fato damnans humana praesidia, multumque impatiens, quod ne potui quidem accipiendo in acerbissima Sisi, viam aut instrumentum commodum respirarent: Urina huic alba semper inter calores maximos totius corporis, in quatenus odor gravis & pisculentus in dies augebatur, unaque fluebat primo fufuracea quædam, inde & pellicula magnæ, & postremo pus manifestum, villis, festuicis, tuniceisque variis intertextum, Aderant Singultus, ructus assidui cum tanta doloris acrimonia circa præcordia, ut tanquam parturiens miserrime clamitaret: Sed post deliria parva ventris torsio supervenit, ac primum foetida purulenta dejectio, per sedem incredibili copia profluxerunt: inde & sanguis per os & per posticum, cum dolore punctili vehementi atque ita per acerbissimos cruciatus extincta est paulo post vicesimum diem.

Profecto ea membranarum defluxio, pro quantitate sui, certum morituris prænuntium misit, nam ex Hepatis, aut Pulmonis, aut Cordis sideratione contingerant, ut etiam per Anatomem deprehensum est: Plerisque dissecto corpore universa hæc viscera; aut major illorum portio: nunc nigra, ut carbo quispiam visa est; nunc suppuratis pustulis plena: Fit enim facillime ut per consensus tunicarum pituita concretescens jugiter adhærescat, eademque salior aut virulentior, subjectam oesophagi linguaeque substantiam depascatur. *Gemma Cosmocris. lib. 2. cap. 4.*

§. 2. Plerumque notavi Pestem circa Stomachum prima sedilia loasse: Quidam enim continuo Vomitu dejectus, dolorem capitis ingentem sensit, ac mox delirium, deinde & soporem per intervalla passus, xvj. horarum spatio obiit, multis deliquis præviis.

Optabam autem scire unde tam celeriter, tantoque symptomatum furore oppetivisset, nec Chirurgus adesse cuperet, tandem cultro dissectionem institui, ac Stomachum illius inveniri eschara triplicijam perfecta pertusum: Qualiter olim videram stomachum anellæ perforatum quæ Arsenicum volens biberat. *Helmont Tumuli Pestis p. 109.*

§. 3. Chirurgus Atenacensis cadaver Peste cum Vomitu mortuum dissectuit, & reperit in ventriculo, à latere officii superioris, locum quandam longiusculum, circiter magnitudinis atriculi pollicis, qui nigricabat instar carbunculi: Has autem escharas ab inflammatione, & magno æstu febrili oriturum certum est. *Dierbroeck. lib. 4. de Peste hislor. 15.*

§. 4. Carbunculis ventriculum atque intestina affici posse, Naturæ scrutatores varii, fide digni, in cadaveribus apertis observarunt: nec vel experientia vel ratio contrariatur, hinc vomitus vel singultus. *P. Barbet de Traicté de Peste.*

§. 5. Neotericus quidam refert intus in corpore carbunculos, anthraces & exanthemata, qualia forinsecus efflorescebant, apparuisse; Mihi hoc antea erat inauditum, credo tamen verum. *D. Gallus Eischenreuterus Epistola ad Gesnerum.*

§. 6. Carbunculus pestilens non externas modo partes obsidet, sed, & quandoque interiores, utraque interdum; Si cor prehendatur, nulla exterius nota apparente, mors præ foribus est ægris odendo, bibendo, ambulando, fato cedentibus: Si pulmo, diaphragma, aliæve respirationis organa occupentur, mors intra horas xxiv. obrepit: deficiente enim respiratione suffocatus æger extinguitur: Si cerebrum, phrenitis detinet & furor, ac tandem mors sequitur. Si excretionis lotii destinatas partes venenum aggreditur, ischuria ægrum necat: Lethale quoque est si ventriculum invadit, id quod accidit Gubernatori Nobilium puellarum in dicto *Hessel Dien*: Erat is juvenis Monachus, procerz staturæ, erectz, robustus & quadratus, Ordinis S. Victorii sacri, quem febris continua prehendit cum ariditate & febricit lingue quæ & nigra, ob summum interiorum æstus & vapores putridos inde elatos, (ex vulgi enim sententia, si impense calet furnus, ad ejus ostium calor diffunditur,) linguam eanis instar præ cursu anelli exerens: siccis inextinguibilis molesta erat, eomite leiporthymia, vomituritione, morte tandem triduo post succedente & præcedentibus totius convulsionibus: Nobiles puellæ adeo celeri conspecta morte & symptomatum vehementia, veneno interceptum fuisse asserbant: quamobrem dicto Xenodochio præfecti apertis cadaver Monachi jubent, Ideoque Medicus & Chirurgus mecum convocati.



Eo dissecto, in fundo ventriculi vestigium simile ab impresso cauterio actuali reperimus, cum eschara vel crusta unguis magnitudinis: reliqua ventriculi pars contracta erat & dura: Inde omnium consensu iudicatus est sublimatum vel arsenicum assumpsisse, visa eschara profunde penetrante: Dum vero cadaveris dissectionem futura jungerem, plurimas nigras maculas hinc inde per corpus sparsas adnotavi: tunc revocato coetu, coram illis ostendi purpuram esse vel exanthemata: Cum vero obstitarent Medicus & Chirurgus, pollicum morfus esse asserentes, negavi id ob multitudinem macularum, assumpta praeterea acicula, eaque profunde plures in partes adacta, eutim elevavi, postea forficibus dissecui, atque subdita caro nigerissima deprehensa: Color praeterea lividus consideratus, nasi, auricularum, unguium, imo totius corporis solito nigrior; vultus praeter ea immutatio ut vix agnosceretur: Sic mutata sententia unanimi assensu relictum Monachum, Carbone pestifero exstinctum esse, non alio veneno. *Paracelsi Opera lib. 22. cap. 36.*

**N**on externas modo partes) Quod & Celsus lib. 5. cap. 28. asserit, quoniam Commentator Rubeus obit, & merito videatur, cum externi signa asserat Celsus: Id ipsum asserente Plinio lib. 26. cap. 1.

qui duos Consulares obisse Carbunculo refertur: Quorum alter Iulius Rufus, Medicorum insectis sequebatur. Q. Lacinus Bassus, pollice laeva manus evulsa ac ab semetipso, tanti parvo vulnere ut vix cerni posset.

§ 7. Ad militem quendam peste laborantem, una cum Adolpho Fildar Chirurgo vocatus fui, huncque carbunculos quatuor habentem & gravissimis symptomatis infestatum invenimus, nempe summa anxietate & inquietudine, magna virium deiectione cum crebris deliquiis & vomitu violento, qui jam per aliquot horas duraverat: Praesagio mortis facto, tamen antidorum exhibuimus, quod cum revomisset, paulo post animam Creatori reddidit: Inter me & Chirurgum incidit sermo de causa vomitus pestilentis: cumque ego inter cetera statuerem illum plerumque induci à veneno pestifero ventriculi tunicis, & imprimis ipsius orificio superiori firmius infixo, eique magis quam aliis partibus communicato propter cordis viciniam, &c. Dixit ille hunc vomitum plerumque induci à carbunculis in ventriculi tunicis enatis, idque se ab experientia scire: nam ut illius vomitus causam certius cognosceret, se aliquando cadaver Peste cum vomitu emortuum, ac jam refrigeratum dissecuisse, & in ventriculo à latere orificii superioris invenisse locum quendam longiusculum, circiter magnitudinis articuli pollicis, qui nigricabat instar carbunculi, quæ nigredo tunicas ventriculi transiens, aequè foris quam intus conspiciebatur: Etiam, si vellem, se quoque in praedicto mortuo milite illud demonstraturum promisit, Verum nobis non placuit irritare crabrones, & aperta abdominis cavitate contagii periculis non exponere: illud credere quam videre maluimus. *Isbrandus de Diemerbroeck de Peste lib. 4. histor. xv.*

**V**erisimile est carbunculos interdum ventriculi tunicis non minus quam aliis visceribus nasci, ac multoties lethalem vomitum inducere: Verum ab hac tamen causa vomitum pestilentem non semper dependere, vel inde liquet quod multi cum vomitu evadunt, quod fieri non possent si à carbunculis semper induceretur. *Idem.*

\* Carbunculos quatuor habentem) Solent hi Anthraci, seu carbunculi, in quasvis corporis parte excitari, non certis partibus, quemadmodum Bubones, adstringi; Solent iidem usplurimum pustulae modo primum se manifestare, & quidem, nunc albicantis, nunc flavescantis, lividioris, nigricantis, quamvis semper ad nigredinem tandem abeant: Ardor insignis adest ut pars affecta sit videatur ac rodi: nec diu pustulae speciem servant quin mox Tumorem duriores in unam versas sui circumferentia ostendant, sicut in sui medio & centro in ulcus excedens aperiantur, quoniam in numero quaqueversum ambulat & vicinas partes mire depascit, unde oculos nonnunquam inde excidisse notum est: Sed & post

curationem subinde contingentem fœdæ ac praegrandes cicatrices remanent ob carnis multæ depredationem: Caro autem omnis Anthracibus corrupta corruptionem gangraenæ similem peritur, ad intumescionem namque integramque mortificationem deducitur. Enim vero, cum in Anthracibus ardor corrodens observetur, ab Acri illos fieri arguo, ergo vel ab Acido, vel à salso lixivo, nec enim datur tertium: ab Acido lincinationes quidem ac rosiones produci notum, non item ardorem: A Salso lixivo ardorem quidem rodentem produci testantur cauteria potentialia cupi admotæ: Ab eodem in pestilentibus anthracibus ardorem urentem ac rodentem produci confirmat buryrum antimonii, ipsorum progressum & quaqueversum serpentinem vim sistens, In illo autem adest acidum acre saltem lixivum temperans & infringens: Acidum illud ipsi inesse evincit aqua ipsi affusa, & spiritum virrioli, philosophicum dictum in se alliciens. *Franc. Sylvius, dea Med. Prae. append. tract. 2. §. 472.*

§ 8. Memoratu dignissimum atque horrendum quod in Pannonia contigisse narrant, natus passim in humanis corporibus viperas ac laeertas anno 1540. quæ mille hominum in dies post cruciatus acerbissimos interficerent, nulla Medicorum arte vel industria succedente. *Saxonia Panthei lib. x. cap. 1.*

§ 9. Eo ipso tempore quo sudorifica febris in Britannia vixit, Pannonia propterea quoque humidæ pestilentis vim fuit experta, dum non modo natus passim in humanis corporibus viperas ac laeertas narrant, &c. Sed altera Pestilenti febre tunc quoque vexante: quam etiam nunc fevissimam experiuntur, Theriodem, sive vulgo Vermem vocant, à Vermium

vermium copia in cerebro ipso magna ex parte redundantium: Cuius meminit *Jordanus de Pestis* phaenomenis tract. 1. cap. 9. *Idem ibid.* cap. 38.

§. 10. Anno 1637. quo sereniss. Dux Saxoniz *Bernardus Weimar* Burgundiz Comitatum invaserat ingenti clade, corpora utrinque caesa aërem putore adeo infecerant, ut Pestilenti febre multos passima bripi notaverit Vir principis dignitatis: Hominum & equorum eadavera non alia stragis indicta aperta exhibebant præter Jecora Bufonibus searentia: Miasma illud pestilens, intro cum aëre susceptum, seminis ejusmodi infectum similia animaleula in corporibus gignere potuit. *Ex communicatione Excellentiss. & Nobil. D. Stoffelij Sereniss. Principum Winerbergensium Consiliarij & Ephori.*

§. 11. Vermes aliquando in Pestiferis febribus, in ventriculis cordis fuisse genitos audivimus ab hominibus fide dignis, qui ejusmodi ægrotantium cadavera secuerunt, quamvis verisimile sit raro admodum istud contingere. *Vidas Vidius junior de curatione membratim lib. 7. cap. 1.*

§. 12. Tota cystis interdum lapidescit, quod testatur *Fernelius* lib. 6. *Pathol.* cap. 5. qui in decrepiti cujusdam senis cadavere, loco vesiculæ fellæ lapidem invenit: In Polonia olim innumeri Boves exorta quadam Peste interiere, in quorum eadaveribus dissectis nihil fuit repperit, nisi quod vesicula fellæ tota in lapidem facti conversæ. *Gothofr. Meibius Fundam. Med.* cap. 16.

§. 13. Didici ab *Athanasio Kirchero* pestiferos Babones vermieulis scatere, quibus tempore pestis aër refertus est: illque adeo exilibus ut solo microscopij adminiculo deprehendi possint. *Mouconis in Ephemerid.* pag. 62.

§. 14. Dum Parisijs in Nosodochio dicto *l'Hôtel Dieu* artem Chirurgicam facerem, Pesto laborantes ægros inveni, atque in quibusdam tumores in emunctoriis apparentes postmodum delitescerent animadvertens, morte subsequuta, Curiosus in parte indagavi causam, atque adacta novacula, deprehendi carnem ustularam, quasi à ferro candente inustam. *PARANS OPERUM* lib. xxij cap. 36.

\* **Tumores in Emunctoriis apparentes** ] i. e. Bubones-Triplecium autem Bubonum apud medicos sit mentio, (inquit *Franc. Sylvius Append. ad Praxis* tract. 2. §. 463.) Pestilentialium, Venereorum & non malignorum dictorum, scil. ab affectibus comibus, malignis vel non malignis; Bubonum vero omnium causa cum sit sanguis ob suam acrimoniam, vel visciditatem, vel aliud vitium in conglobatis glandulis hærens (vide *Scholia ad §. 2. Obs. 9.*) atque illas in tumorem attollens, accedentibus pro vitii diversitate symptomatibus diversis, consideranda Pestis affectuum cetera symptomata, quo vitium sanguinis determinetur; Ubi notandum difficilius ad sui maturationem deduci Bubones Pestilentes quam alios, & dolorem ardoremque molestiorem habere in plurimum comitem; Ex ardore autem Bilem, Biliosumve humorem, h. e. sale volatili constantem peccare merito judicamus; Quinimo in Pesto, quam istis, magis in culpa esse hunc talem facile agnosceret

qui modum quo sit inflammatio consideraverit, cum scilicet sanguis vel in extremis vasis obstructis stagnat, vel ex iisdem quacunquē de causa apertis effusus aut in partium substantia, aut in cavitate aliqua colligitur, & parte ejus maxime spiritali secedentes reliquæ acidæ salæque aciores factæ in sese agunt vitiosæ, & ita quidem ut se mutuo alterentur utrum animali debitum corrumpant, imo in pus nunc laudabile, nunc vitiosum mutant: Si proinde in non maligna dicta Inflammatione Acidum sanguinis tandem superat ejus Amarum, nonne dicemus probabiliter in maligna idem desiderari, & minus potens tunc esse Acidum, hoc est in malignis pestilentialibusque Bubonibus sanguinem abundare, magis quam decebat, Bile, habere saltem ipsam actionem, aut humorem similem, sale puta volatili & acri constantem, minus autem Acidi continere; Ex nostra autem sententia Venenum Pestilens in tali Sale volatili consistit.

## \* ADDITAMENTA.

### OBSERVATIO I.

*Hælici anatome cujus cor flaccidum exsuecū, pericardium aqua destitutum.*

**A**Perto coram Prætor cadavere hominis quadragenarii, à temperamento & victus ratione strigosi, x. aut xij. diebus post vehementes inflicti istius mortuo, unde citra vulnera plurima excitata ecchymomata, Reperi cordis involucrium aqua, quæ illi ex naturæ lege inesse deber omnino destitutum, Cor vero omnino flaccidum, exsuecū. *D. Caronius in Zodiaco med. Gallico.* p. 128.

### OBSERVATIO II.

*Quartanarii defuncti cor pallidum, flaccidum sanguine destitutum repertum est.*

**V**idua quædam, annorum circiter 63. per tres quatuorve septimanas febre *Quartana duplici* laborans in morus denique convulsivos incidit, ac deinde morrem obiit. Post obitum cordis parenchyma videbatur colore pallidum, prorsus flaccidum, substantia sua carnosa ita ablampta ut nihil ferme præter venarum & arteriarum filamenta sub membrana lægentia apparetur; Et in ventriculis vix sanguinis nigri quicquam nec in pericardio feri quid inventum; magnis enim Domina hæc terroribus, mororibus, atque curis confecta fuerat. *Iob. Herwingus Obs. med.* 69.

**M**otus convulsivos ] Spasmus qui hypercatharsi, immensis hæmorrhagiis superveniunt aut moribundis accidunt oriri ait Willis Tractatu de Affect. hystericiis & hypochondriacis, non ex Naturæ irritatione, sed ex nimia tum ipsius, tum facultatis animalis prostratione, quippe in magnis languoribus spiritus animales plurimum distracti, aut absumpti, solitum in nervoso genere tensitatis sive irradiationis filum ac continuitatem sustinere nequeunt, quare ab invicem divulsi, ac quasi in manipulos fracti, dum rursus aduniri queant, nixus motivos ubique divisos, & quasi per subsultus ineunt.

*Terroribus, Maroribus*] Mætores, tætores, enras ad Quartanam disponere non est dubium, cum pituitæ, quæ nempe fermentescente febris illa non minus

multoties oritur, & quæ polyposis concretamentis perquam adcommoda est. ut & acidi succi proventum augent: Quin & pathemata illa non sanguinis tantum generationem retardant, sed spiritibus vitalibus & animalibus, eisdem depascendo & suffocando, bellum indicunt, adeoque tandem ipsas eorum officinas contabescere faciunt: Hinc Hipp. 6. Epid. sect. 8. de humano animo testatur, quod si una cum morbo incensus fuerit, corpus depascatur: Imprimis vero carnosam cordis substantiam succo & virescentibus exuvant graviore animi impetus, non secus ac reliquis etiam corporis carnes ab istis macerantur & macrescunt, id quod vel externa taliter affectionum facies ut plurimum docere potest.

## OBSERVATIO III.

*Quartana febris lethalis, à bile atra in cavitate ventriculi & ejus venas occurrente.*

**Q**uartana Febris Serenissimum Ducem Primo simplex invasit, quæ tum à Medicis parvipenderetur, præcipue quodtisdem diebus nonnulli seniores Quartanam quarta accessione evasisent, quæ res mihi nova non erat, quoniam alios etiam senes ita convalescere observaram: At hæc quarta accessione duplex facta est, & longiores valde accessiones habuit, sub quæ, ac præsertim sub frigore atrum humorem evomebat, illumque valde acidum & serventem sed non admodum multum, cujusmodi à me in disputatione esse in ventriculo judicatum: Quin porro vomitu post paucos dies quiescente, triplex ipsa febris extitit, quæ accessibus adeo longis essent ut continuarentur, nec multo post continua penitus est effusa, ac sine ullo frigore crescebat, semper quidem major facta usque ad finem vitæ: Tanta scilicet fuit congestio in eo illius humoris copia, ut jam amplius à natura non posset ejici, & demum ne evens quidem propelli, minus in illis à putredine sustineri: quemadmodum facile pro visu fuit considerata ea corporis conditione quæ in disputatione descripta est, adeo ut cum primum mihi allatum esset ipsum quadam levi febre initio correptum esse, quam medici occasione destillationis fuisse dicerent, ego eam & quartanam fore, & homini necem allaturam pro certo affirmavi, quanquam alii salutem diu pollicebantur, postea vero sæpe modo salutem in propinquo esse, modo mortem instare aiebant, ut ipsi in hanc vel illam accessions partem incidebant, & quoties jam de salute desperandum videretur, tunc febrem esse malignam & venenosam dicebant, atque ad beazar confugiebant: malignitatis tamen nulla evidens signa erant, nam nisi ad extremum vires nunquam aperte imbecilles cognoscebantur: Sub febris quidem compressionibus, ut fete sit, pulsus, & alia virium imbecillitatem præferebant, tunc vero medici serio mortem in limine esse dicere, & venenositatem imò venenum, esse in causa asseverare, & cum non posse nossem instantem supervivere asserere: qui tamen paulo post calore febris emergente salutem certissimam, & in proximo affirmabant, & interdum quinque tantum dies ad integram valetudinem & vires recuperandas poscerent, quæ res non semel sed pluries itis contigit, ut sæpenumero eadem die repugnantia loqueretur: Ibi ego ex præteritis accessionum rationibus futuras compressiones prævidens, horasque earum prædicens, tum terrores & responsa medicorum iisdem horis futura ante oculos ponens videbar vaticinari, melioribus tamen horis semper eundem mortis metum professus: Quæ potro mors sub accessione incidit, sub compressione primum viribus collapsis, strangulatisque, sub calore postea paulatim dissipatis.

Extincti ergo corpus cum est dissectum, Ventriculum habuit atro succo plenum, tanta copia ut vix calice comprehendere potuisset: Per mortem nimirum laxatæ venæ humorem elabi permiserunt, venis ventriculi valde magnis & attritis: ipsius vero humoris nigredinem rubor aliquid occupabat: Splen erat exiguus, quemadmodum in disputatione vidisti à me coniectatum: Jecur valde firmum & solidum, nec tamen magnum: Habitus corporis admodum carnosus, & adeo pinguis, ut pinguedo omnia intestina & viscera occuparet, maxime quidem renes & cor; ea vero pinguedo, quæ omenti est, ventriculum totum amplecteretur. *Guarmonius Consultat. 388.*

**A**los etiam senes &c.] Recordor me aliquos decrepiti ætatis vidisse simplici febre Quartana extinctos, eaque intermittente, qui sub horrore maximo illo concutiente decessissent: In hac inquam febre vires nunquam malignitatis indicia præbuerunt, nunquam urinx ipsæ, quæ exustionis solummodo indicia contineret, non etiam mali generis putredinis, ut fecissent si facilius conturbatæ aut perturbatæ, nullam delirii genus habuit, quamvis caput interea val-

de afficeretur, ne postremis quidem diebus, quibus per spirituum consumptionem, & refrigerationem ab halitibus melancholici humoris, una cum defuncto spiritu inducuntur facultates cerebri infirmabantur: ut enim imbecillitas ad frigus & defectum spirituum sequitur, sic perversio & perturbatio admodum ad putridos vapores, præsertim vero cum illi sunt multæ putredines. *Idem.*

## OBSERVATIO IV.

*Febris Hemitritans à scirrbo hepatis & exulceratis Pulmonibus ortus.*

Puella annos circiter v. nata anno 1643. ab aliquo tempore morbillis laborabat, ex quibus 20. Maj. incidit in Hemitritum, per cujus rotam decursum adstrictionibus alvi continuis ut & doloribus circa regionem hepatis atque dyspnœa summopere divexebatur, ex quo nihilominus convenientibus medicamentis debite adhibitis ad tempus fere convaluit: donec tandem 7. Junij recidivam passa, inter alia de summo dorsi cum comite cutis excoriatione, ac regionis ventriculi dolore conquerabatur, adeo ut his in dies auctis corpus atque vires interim magis magisque consumpta atque fracta nimis mature inopinato acceleraverint mortem.

Aperto corpore deprehendimus 1. Omentum dilaceratum inferius delapsum, Colon intestinum & ventriculum deorsum extra sedem suam propulsa, inflata, Hepar magnum ultra modum, scirrhosum, Ita ut pondere quatuor libras superaret, extendebatur usque ad Lienis regionem, imo infra eam: Vesica biliaria albicans erat non turgens, atque in hujus fundo materia viscosa: parenchyma Hepatis superne, ei regioni diaphragmatis, quæ circa dorsum est, per latitudinem, adnatum erat valide: Ren dexter duplo major sinistro: In thorace, dextra Pulmonum pars corruptioni jam proxima, plusquam mediam pectoris partem occupabat, sinistra vero omnino erat absumpta & in pus commutata, quod in mediastino superne, infra & ad latera adnato, veluti in sacco compresso, erat conclusum, quod etiam post factam incisionem non profluit: Cor denique non erat pendulum, sed sursum compressum, ab hepatis magnitudine comprimente Diaphragma & Intestina, ac in sinistra parte magis locatum. *Mantissa ad Observat. Plateri pag. 43.*

## OBSERVATIO V.

*A Sanguinis missione febris extinctio non semper expectanda.*

Refrigerationis sanguinis gratia solum sanguis non est mittendus: Probatur exemplo Cardinalis Tolotani, in cujus cadavere nullus fere sanguis, febris tamen ad extremum usque duravit halitum, *Rolsnickius M. m. spec. pag. 372.*

## OBSERVATIO VI.

*Tertiana febre decumbenti à crebriori vena sectione, vasa omnino exhausta fuisse.*

Febris Tertiana decumbenti medicorum consilio vices septies vena fuit aperta; qua sanguinis profusione cum mortem accelerassent, aperto cadavere ne guttam quidem sanguinis inventam fuisset publica fuit fama, *Rolsnickius mech. sp. p. 384.*

## OBSERVATIO VII.

*Diaria febre extincti cadaver exhibuit Lienem maximum, totum epigastrii spatium occupantem.*

Anno 1633 Monspelij in Nosocomio fuit cadaver rustici Diaria febre demortui dissectum, In quo inventus Lien ingentis magnitudinis, ac ponderis duodecim librarum. Occupat enim totum sub epigastrio ventris spatium, ut & ad Jecur quodammodo allideret. *Johan. Helvvigius Observ. Med. 98.*

## OBSERVATIO VIII.

*Febres acutæ raro sola putredinis ratione sunt lethales, sed ob adjunctum Tumorem, aut grave vitium internum.*

Fieri in morbo alia possunt quæ citius mortem moliantur, nam ad febres, quæ ex se morbi sunt, neque alios morbos sequi cogantur, morbi alii sæpe accedere consueverunt, natura à putredine & copia vitiosorum humorum laessita, & se exonerare coacta, humores vero etiam continere certis sedibus non valente: Etenim partibus externalis corporis densioribus & adstrictis factis, humorum excretio aut expressio ad interiora convertitur, & viscera petir, præcipue vero Pulmones propterea quod laxiores aliis partibus sunt, Et Cor, quod facili sua agitatione & calore, cum bono sanguine malos etiâ humores ad se sub febris ad ducit, per faciliq; eos repellens in pulmones intrudit, *Quam rem nos vidimus creberrime cadaveribus resellit;*

rara enim inveneritis corpora quæ sola putredine extincta sint, febre omnia etiam per acutissimas febres extincta cum Tumore aliquo, aut alterius generis vitio in visceribus inveniantur.

Mitto enim quod *Pulmones* semper invenietis colore purpureo, præsertim versus dorsum, & venis admodum nigris, nam hoc è defluxu sanguinis è corde, illuc etiam post mortem factò evenire potest: Vos invenietis sæpe Pulmonum corpus durum aliqua sui parte, ipsosque pleniore, & non raro pus continere, & interdum etiam cum gangræne notis & sphaceli, ubi fere membranae pulmonum tam succingenti costas, adhærescunt, ut ab illa nisi per incisionem separari, altero saltem in latere, tam quam humor lentus à putredine exsudans, cum spiritum intro extraque ductus sic illas partes conglutinet atque colliget, calore maxime humorum lentum & firmum reddente, adeo ut credere quis possit membranas sic ab origine fuisse conjunctas, certe deduci non possunt nisi lacerentur, aut novacula diligenter adhibita intersecantur: Videbitis in aliis sæpe *Iecur* mutatum, aut durum, aut fractu facile, cum eoque lienem sæpe numero affectum, at interdum: Aliquando invenietis *cerebrum* aliqua corruptione depravatum, sæpe venis admodum nigris, in iis maxime qui delirant, Aut pituita multa onustum cum somnos & stuporem habuerint *Guarionius Consultat. 549.*

## OBSERVATIO IX

*Febris continua ab inflammatione sinistri Pulmonis in putredinem abiens & Abscessu Iecoris.*

**A**NNO 1657. mense Martio obiit Dominus B. Illiæteus, primarius Parisiis Præfestim errore propriorum Medicorum inscitia: Genio indulgebat, sanguinei erat temperamenti, plethoricus, *αἰμοψύχος*, medicæ artis regulis parum auscultans, Tribus ante obitum mensibus podagra prehenus est, illi jam pridem molesta, neque sanguinis missio facta est, ratione urgentis frigoris: Vide quam egregie ratiocinabatur adulator V. qui illi erat à consiliis medicis? Omnino necessaria erat venæ sectio, sed maxime hyeme, ob prohibitam insensibilem transpirationem, Podagra citra sanguinis missionem defuncto Erysipelata toto corpore suborta sunt, indicium sanguinis in vasis æstus perciti; cesserunt illa ad motis nonnullis topicis remediis: Exacto sextiduo intensus succedit ecatarrhus, originem videlicet præbente plethorica constitutione, neque tamen ideo celebrata fuit phlebotomia, Purgationem in ecatarrhi declinationem distulit æger, quæ intempestive suscepta est, à cathartico enim omnia conturbata sunt: Postmodum febris continua succedit, una cum catarrho in pectus decumbente, quare decumbere coactus fuit: In ædibus suis habebat medicum sed nomine tenuis, in *partibus* scilicet ut existimo, *infidelium*, qui pertinax fuit in ea sententia, & hæresi sanguinem non esse educendum, ratione urgentis frigoris: Accurrit illico *Valotius* comitibus duobus aliis medicis, qui plurimas instituerunt sanguinis missiones, sed intempestivas, præterierat enim idoneum tempus: Nosodochiorum ægrorum felicior est conditio; Octava die exhibitum à Medicis nescio quod catharticum, à quo adauctum malum: Quia vero de insignibus doloribus internis conquerebatur, Laudanum præbuerunt, quod nihil aliud est quam Opium, aut potius venenum fucatum: Ne vero abrumperetur Sacramentorum series, datum & vinum diu: venenum, Emeticum; Fiduciam adhibebat Illustris æger vitæ spontis Acumini ingenii proprii & prosperæ fortunæ, cætera contemnens, mors tamen obrepit, nemini declinanda. Munere præstantissime functus est, desiderium sui omnibus relinquens.

Aperro defuncti cadavere, repertus est Pulmo sinister putridus, cum Abscessu Iecoris, quæ nullas medicorum suspicatus erat. *Guido Patinus Epistol. Gallice editarum 66.*

## OBSERVATIO X.

*Febris Leipyria citra viscerum inflammationem à sola humorum malignitate, ob-variolas suppressas.*

**F**ilius N. tres annos natus laborare cepit febre acutissima, quæ statim ab initio ad vigorem pervenit; aderat perpetua sitis & inextinguibills, quæ ab initio ad finem perseveravit, & intra quinque dies extinctus est: extremorum frigiditas sæpe apparuit, & postremis diebus perseveravit, ita ut febrem Leipyriam referret.

Aperto cadavere nulla inflammatio apparuit in ventriculo, intestinis, aliave parte, cuius magna erat suspicio ex symptomatis propositis: Et cum nulla causa appareret tantorum symptomatum, omniaque symptomata essent bene constituta, existimavi graviora illa symptomata à maligna & venenata qualitate prædiisse, Ex variolis nimirum tunc temporis grassantibus, quas puer ille non potuit excludere, ob nativam quandam imbecillitatem, & venæpi vehementiam. *L. Riverius cent. 2. Obs. 83.*

## OBSERVATIO XI.

*In cadaveribus eorum quæ febribus malignis extincti sunt coagulatio sanguinis non semper reperitur, sed inflammatio viscerum.*

Ego aliquæ mecum non sine valetudinis damno in cadaveribus febre maligna & petechiæ interemptorum dissectis, non coagulationem hanc sanguinis in ventriculis cordis & vasis majoribus invenimus, sed potius Pulmonum, Hepatis, Mesenterij aliarumque partium interiorum inflammationes deprehendimus, de qua re videri poterit *Spigelius* de Hemitritico. *L. Jacob. VVesperus Tract. de Cuncta aqu. cap. 5. pag. 53.*

**A**n coagulatio indubie veritatis sit? non disceptabo, non possum tamen non addere me hæmorrhagias narium, uræ, renum, tum Paravii, tum in his oris, easque periculosissimas & enormes sæpe evenire observasse, nonnisi à sanguine tenuissimo, admodum fluxili, servidissimo, extrema arteriarum capillamentorum oscula referante, quam in virgine jam letho vicina nonnisi ichthyocolla in iusculis carnis, & aqua pro emulsione amygd. dulc. cocta, scil. sanguinem incrassando, compescere valuimus; quod postea in aliis casibus facere consuevimus non sine exoptato successu; præterea curavi, in principio hujus febris venam secari curavi, verum tantum absuit ut coagulationem aliquam animadvertere potuerim in sanguine, ut fibrosam quoque nulla ratione, longo tempore, quovis in loco positum concreverit unquam: id postmodum aliis temporibus comperi, quamvis rarius in febribus malignis, & fere nunquam nisi primo die venæ sectionem, & quidem solummodo in plethoricis & affueris, urgente simul pleuritide &c. nunc fudeam. Exc. tamen *S. Pauli* in *Waxg. Baro* de vera; unica & proxima causa febrium malignarum & Petech. esse statuit coagulationem sanguinis intra vasa: Sed si quæ aliquando occurrit cruor concretus, non multum ab similibus fuit illi qui in violenta morte, aut alio aliquo morbo interemptorum cadaveribus omnibus frigidus reperitur: At postea sanguinem in his febribus coagulati ac propterea minuta vasa pervadere non posse, ne utique tamen id à frigore fit, neque illa congelatio quædam reputanda est; nam ipsismet *S. Pauli* L. c. §. 19. calorem in sanguine, qui ipsissima febris est. postquam calorem febres ephemeræ comparavit calori in liquore à balneo vaporario, in Synocho imputari à balneo Martis, in Putrida à balneo Arenæ, in maligna & pestilenti similem statuit ab igne aperto prolecto, Et licet dolose benignus & blandus plerumque appareat, insigniter tamen penetrantem & adurentem contendit §. 14. sc. à sero & sanguine adustis,

## OBSERVATIO XII.

*Febris maligna petechiali extincta ostendit vitium Iecoris, vesica fellea lapillis obstructa; ventriculi materiam vitiosam in cavitate & venis continentis: Pulmonum sanguine melancholico refectorum, Cordis flaccidi, livescantis, &c.*

**C**um Reverend. & Illustr. Princeps Henricus Julius, Halberstadtensium Episcopus, Dux Brunsvicensis, &c. 7. Jul. ad convivium invitatus esset, sub aperto Jove ad multam usque noctem bibisset, videbatur tandem dolorem aliquem ex redundante crapula circa ventriculum manifeste sentire: Domum delatus vomitum clere nitebatur, verum cum se incassum agere videret, somnum ad matutinas horas protraxit: Sequenti die in omnibus membris lassitudinem & veluti fractionem sentiebat; aderat præterea febricula quædam furtiva; Ego persuadere conabar, ut quo citius, eo melius, præmissa aliquo vomitorio, ad venæ sect. animum applicaret, sed Princeps Illustriss. fastidiosum medicamentorum ductus consilium rejecit, quia perseverans in solita victus ratione morbo veteratori & ludioni liberiores in corpus libidinem exercendi copiam fecit: Er jam quarto die etsi videret fieri aliter non posse quam ut lecto committeretur, nullo tamen modo ad vomitorium aut aliud remedium persuaderi potuit: Antecedente tamen nocte ab exhibitio extracto Bezoartico (etiamsi non omnino rationabile videretur) pro eliciendo sudore, sudor extitit non admodum copiosus, sed tenax & quodammodo glutinosus: Altero statim à sudore die venam communem in dextro brachio secari voluit, unde sanguinem aterrimum maximeque glutinosum, ad 3 v. circiter extraximus: Tum vero prima vice morbi vehementia apparuit, & manifestabatur magis *Febris continua maligna*, correspondens duplici Tertianæ, ob exacerbationes quotidianas, quæ bis etiam in

die exoriebantur, semper à prandio pejus habebat: aderant vigilae nocturnae interruptae, Vomitus & diarrhoea bilis porraceae & zruginosae, cum crassissima pituita adjuncta: Aderat singultus omnium gravissimus & prope incomparabilis: Cum animadverteret Princeps primam statim noctem, eamque criticam sibi adeo molestatam fuisse, consensit tandem duos alios advocari medicos, die à morbo 8. Illi in eandem ivere mecum sententiam huiusmodi naturae eorum per vomitum esse imperfectum: Dedimus pro Digestivo aliquoties iusculum alteratum cum syr. acetoso simplici ad juvandam vomitionem quod aliquoties eduxit materiam viridissimam & maxime zruginosam. Porro cum illud non sufficere unum videbamus, & in hypochondriis venisque metastasis magnas insuper obstructions advertebamus, ad medicamentum aliquod solenne pro pravorum humorum pleniori eductione progressum facere animati fuimus, Quod cum renueret Illustr. vix obtinuimus ut sequenti die infusio agar. & thei cum mechoac. & Syr. diafor. in exiguum quantitatem redacta sumeretur, quae aliquid praestitit, sed non ad voluntatem nostram; quare reliquum clysteribus repetitis supplere oportuit: Ventriculi autem affectiones & Singultus pergebat, cum perpetua urinarum cruditate, pulsuque admodum debili: Suadebat ratio praeparare & purgare materias illas, sed vix topia ferebat Princeps: Infusio exhibuimus infusionem mechoac. cum modico Tait. praeparati in cerevisia factam, qua exigua vacuatione multum juvabatur, & spes erat omnino, si obsequens amplius fuisset, futurae sanitatis, verum se sublevatum quodammodo sentiens, etsi febris perseveraret eadem, magis magisque intrinseca medicam, damnabat, solis topicis & bezoarticis contentus: Hinc crescente pravorum humorum copia & malignitate, perseverante singultu, urinis crudis, pulsu debili, circa iij. coeperunt per universum corpus erumpere pustulae quaedam latae, parvim petechias, parvim variolas, parvim morbillos, etiam aliquid aliud referentes, sed prope omnes rubrae & pruriginosae supra cutem manifeste elatae, cum levi delirio; usi frictionibus, cucurbitulis dorso & inferioribus partibus applicitis, unde sanguis primo ascerimus & crassus exiit, & sic à delirio ulteriore liber evasit: Atqui cibum admittens nullum, sensim labentibus viribus, auctaque malignitate manifeste, xxii. morbi die placide obiit.

Cadaver apertum est, & 1°. Pinguedo exterior omnino lutea apparuit, ratione continui caloris. 2. Intestina flaccida plena, artamen bene colorata. 3. Renes pulchri & vividissimi, nisi quod in sinistro aliquod exulcerationis initium apparebat. 4. Jecur in substantia quidem bonum, sed in colore ciceribus rubellis assimilatum. 5. Vesica fellea repleta decem levibus lapidibus, extra luteos, intus nigricantibus, qui tamen facile dissolvuntur, minima vero bilis portio inventa. 6. Venter satis quidem magnus, sed extra lividus; apertus materiam continuit ad 3 vii. circiter coloris sanguinei, non tamen ira rubescens, substantiae crassae cum parvulis quibusdam frustulis misti coloris: Hanc quidem materiam omnes in iudicio judicavimus causam fuisse praeternaturalis istius Singultus & destructi appetitus: Et certe erat ista maligna omnino, & iudicio nostro nullomodo probanda: si vero illa in corpore ipso ex naturae erroribus progenita, aut potius aliunde de foris causata, non determinamus; Venae portio ipsius ventriculi ejusdem plane cum materia intus contenta coloris insigniter apparebant; membranae vero saepe carne tenues erant & subtiles. 7. Lien parvus admodum & flaccidus: inde judicavimus jecur à materia melancholica non bene potuisse purgari. 8. Thoracem quod spectat, Pulmones sanguine melancholico referti & tumidi, unde dyspnoea circa finem morbi. Idem aspersus erat maculis hinc inde viridicantibus, cum albedine quadam circumcirca manifesta. 9. Cor admodum parvum & flaccidum, coloris livescens, succi paucissimi & nigerrimi. 10. Guttur & oesophagus purus & omnino mundus. 11. Cerebrum pulchrum quidem & copiosum in substantia, sed in dextra porissimum parte non nihil inflammatum unde venae valde inflatae & rubicundae apparebant. G. Theophilus Bierlingius Adversar. curios. cent. 1. Obs. 1.

[In omnibus membris lassitudinem] Lassitudo spontanea triplex statuitur, una Tensiva, quae intendi videtur corpus, orta à plenitudine vel copia humorum fibras distendente: Altera ulcerosa, ubi aegri, cum moventur ulceroso sensu afficiuntur; ex humoribus acris & pungentibus ac quasi vulnerantibus cutem & subjunctam carnem excitatur: Tertia contundens vocatur, quando aegri moventur sibi omnia membra corquassata & confusa arbitrantur, & calorem cum motu & tensione sentiunt: Oriri creditur ab humore vitioso copioso transfuso in totam corporis molem; qui musculos explefacios ita attollit; ut phlegmoni per similes affectus videatur; At, cum in Lassitudine spontanea, plerumque Febrim intermittentem comite idem sit molestus sensus qui in ea quae corporis motum vehementem aut diuturnum consequitur, quo & animales spiritus consumuntur, & muscoli exercentur multum fatiganturque, necesse esse indicat Frane. Sylvius App. 1. 10. §. 369. ut aliquid alicui vel utrique simile accidat corpori per talem

febrem intermittentem: Intermittebat autem febre non raro spiritus animales copiose consumi, aut ipsorum saltem productionem novam impediri certum est: Unde non mirum censeo si tunc aegri patientur lassitudinem talem qualem solet producere animalium spirituum consumptio, motum vehementem aut diuturnum corporis subsequens: Sed praeter hanc causam in febris Intermittebatibus aliam statuit, Humorum nempe halituumque multifariorum & quidem vitiosorum, translationem quaquaversum, ad ipsosque adeo artus, artuumque musculos, musculorumque membranas, ceterasque partes valde sensiles quae ab ipsis tum gravantur, tum roduntur ac mora mordentur, adeoque non minus defatigantur ac si motu diuturno ac vehementi essent exagitatae: quos namque diutius, simulque vehementius agitatae sunt ac totae partes, toties dolore lacerante urgentur, quod videretur adscribendam humoribus, ob spirituum animalium magnam depredationem motui notato debitam acrioribus:

Cum

Cum vero humores illi aciores facti febres producant molestas fieri nequit ut ab iisdem humoribus non rodantur, emordeanturque partes sensiles, parianturque affectionem similem lassitudini descriptæ.

*Magnæ obstructions* ] Obstructiones laudat Sylvius fieri censet quoties toto præsertim corpore, capite saltem cum partibus maxime vicinis, ab æstu solis, foci, balnei, vel potu generosi, vel aromatico; corporis mori vehementi aut febre ardente &c. incallescens solvitur solito magis pituita eadem-

que transferatur quaquaversum per arterias venasque cum sanguine; aut per vasa lymphatica, vel propria cum lymphâ, vel proprio liquore inibi præparato. A superveniente autem congestim, satique manifesto frigori, nunc æris ore patulo inspirari, nunc potus imprudenter magna copia ingurgitati, denique coagulari eadem, paritque in ipsis subsistens notatam obstructionem, quam subsequuntur aliquando tumores aliquando ardores. Quæ causæ pleræque in prædicto Principe occurrerunt.

## OBSERVATIO XIII.

*Febrâ maligna ob vitium Pulmonum inflammatorum, Cordis pinguedine obruti.*

**V**enerandus Abbas cum exipit agrotare, ea febre tentatus fuit quæ Tertianas accessiones haberet, & non solum frigore, sed horrore eam accedens vexaret, at sub finem quintæ diei, quæ cum accessu, pulsus tam exilis tamque languidus visus est (quamvis minus creber esset) ut rem ipsam longe aliter se habere judicarem, in quo iudicio ego confirmor hoc vespere, nam color quidem major est, & pulsus crebrior & aliquanto major, tamen non multo firmior est factus de quo ego sic statui, quod hoc mane esset hora compressionis, sub qua ipsi venis & cordi minor esset micandi necessitas, ita tunc iudicii mei prolationem ego suspendi, ut viderem prius febrem apertam, quo constituto, & urinarum adjecto statu, quæ turbidæ sunt, etsi non admodum coloratæ, quæ ante longe fuere turbidiores. Ego non possum non suspicari hanc febrem malignam esse, & ideo à Tertianæ naturâ longe remotam; neque bilem solum aut sanguinis tenuiorem partem certa corporis sede comprehendisse, sed & omnem sanguinem, & ubique infra caput vitare, non putredine illa exurente, & humidum absorbente, sed sanguinem tamen dissolvante, h. e. quæ humidum ejus evoacet.

Mortui aperto eadavere, sed sero admodum, torum bile suffusum erat, albis partibus natura inluteum omnibus mutatis, & carnibus in obscuram & nigrum, *tercore neque ad Lienis colorem, ut solet in mortuis, inclinatis*, neque ad pallidum sed ad lividum & terreum quendam colorem, sanguine intrus atro, quasi per corruptionem ut facit, partim in bilem flavam partim in atram versus esset, Pulmones, ut solent, à tergo ad lienis colorem erant conversi. Cor sine pituita illa solita in mortuis, sinus suos exiguo sanguine suffusus habebat, & iatus quasi percossi cordis carnes referebat, Extra vero tanta pinguedine obrutum ut mirabile videretur, quæ pinguedine etiam totum corpus scatebat, penitus lutea, & quæ cordi obvoluta erat non solum lutea, sed ad cuspidem ejus etiam in viride vergente, ut si esset corrupta: Factorem vero corpus citum habuisse visum est, nam octava hora à nece, ferri ejus odor non poterat, *Christ. Guarinonius Consult. 141.*

**N**on putredine illa exurente &c. ] Duo namque ego putredinis genera in nostris corporibus invenio, alterum quod sit vi obstructionum, & conclusionis, & concalescentiæ multæ, quæ exustionis est similis, alterum illius putredinis est quæ infirmitatem humorum in corruptionem proclivium, & partium continentium vim suam minus integram tenentium & educendo humido una cum proprio calore fitur enim succi fructuum, & uvæ, malis tempestatiibus compari facile cælo vel minus calefacto putrescunt, sic sæpe sunt in corpore humores ita male coacti, ita in sua natura parum firmati, ut facile in putredinem debantur: Etenim cum calorem suum perfecte non sentiant assequuti, non possunt in sua natura contineri, quin à quocumque externo calore suo humido & calido priventur, maxime cum partes eos complexæ & servantes fuerint imbecillæ: hoc vero genus putredinis à speculatis valde remouit est, nam sicut in eo quod per exustionem fit natura sæpe sperat putredinem, ita in altero facile succumbit, *Idem.*

*Pulsus tam exilis* ] In universo corpore vitium esse censeo & jecore præsertim, cor tamen infirmum primum in pulsibus sentitur, non quod revera aliis partibus infirmius sit, sed quoniam spiritus ipsi vitiani sunt, cor verò meliores ad se trahens, eminentiores partes illis privat, unde Pulsus in brachiis sunt infirmi, & magis in uno quam in altero, ut pejor

sanguis & spiritus in uno aut in altero est: ita vitij pulsuum causa non semper in corde est, sic enim pares partium pulsus essent semper, quæ enim uni terro sunt similia, & paria, inter se similia & paria sunt; ergo vitiorum causæ sæpe in partibus suot, ut infirmitatis, inequalitatis cujusque & etiam celeritatis, ut calor major in aliqua parte esse potest, unde etiam crebritatis causa esse posse videatur verum quoniam quandoque iocundum pulsationis cum cordis mora est, crebritas nunquam sine cordis consensu esse potest: major itaque potius fiet aut minor pulsus, celerior & tardior, aut etiam inequalior in parte, ut calore & frigore majore, & vario humore pars tenebitur: quo constituto possumus statore, & rectè, quod pulsus infirmus esse potest & cor infirmari magis quam alia viscera à medicis creditur, tamen non semper ita est, nisi proprio morbo affectum fuerit, alioquin illud valentissime sese ad extremum usque tueri potest: ita prius partes quas tangimus infirmum pulsuum habent sæpe, quoniam cor de spiritu & sanguine impuro majores partes ad se trahit, reliquas alijs reliquit: Itaque hæc summa est quod non semper possumus debilitas vitibus cordis responderi, cujus rei signum est quod cogitatio sepiissime bene habet, & sensus, motus tamen debilitatur; sæpe etiam morus validus est nisi morbus in capite valde possit, sed cerebrum bene habet, quod exiguus spiritus illis satis-



ficiat, tamen pulsus infirmi existunt, qui cum in extremis partibus sint, etiam ad vasorum amplitudinem copiam majorem spirituum requirunt quam motiones faciant, & longe majorem quam sensus, ut in hoc ægro conspicimus, in quo imbecillimi pulsus artuum, motiones tamen robustæ sunt, robusti magis sensus, pulsa qui in hypochondrijs sentiuntur, vehementi manente, quoniam sit ab arteria cordi proxima. *Idem.*

*Cor extra pinguedine obrutum, intus &c.* ] Inde exilitas pulsus deduci potest, pinguedinis enim moles cordis explicationem liberamque sistolem & diastolem impedire potuit, cum paucitate sanguinis in ventriculis hinc cum modicus in arterias influeret, accedente vitio cordis substantiæ, non debilis non potuit esse pulsus.

*Pulsus crebrior & aliquanto major* ] Syllivius de le Boe App. Tr. 9. §. 109. ex suis principis pulsus durante calore febrili frequentioris, ac simul solito minoris, id quod hinc infrequentius contingit, & malum portendit, causam esse ait quando anterior fuit succus Pancreaticus paroxysmum febrilis excitans, à quo consueque inspissatus fuit sanguis ut à bile dominium occupante, atque in corde æstus causam excitante, nequeat tamen sanguis eo usque rarefieri ut simul pulsus fiat pro ratione caloris magnus. *Robustiores* pulsus durante calore febrili fieri dicit quoties spiritus animales majori copia & à sanguine secedere, & ad omnes partes, ipsamque adeo cor propelluntur unde universis quoque animalis motus itidem pateantior plerumque observetur. Hujus autem secretionis copiosioris causam putat Bilem ceteris humo-

ris prædominantem, atque universum sanguinem magis fluidumque præstantem, unde facilius unde copiosius puta secedere varios ex sanguinis massis liquores: *Debiliores* contra si spiritus animales pauciores à sanguinis massis secernantur pauciores ad motus & sensus organa deferuntur: Illud autem fieri censet ob *succum pancreaticum* viscosum, atque acerbum magis quam acidum sanguini, aut durante frigore, aut continue majori copia admixtum, eundemque plus minusve coagulantem, & ita quidem ut à bile durante calore dominium habente satis solvi, & ad partium variarum secretionem disparti nequeat nuda facile patet hos Pulsus durante calore febrili minores debilioresque nil boni portendere, quin potius periculum magnam manifestare: hinc non mirum si aliquando subito pereant ægri tales, præsertim quando absque causa ejus manifesta, qui prius habuerant durante calore pulsus satis magnos & robustos, paulo post obtinent parvos ac debiles: Signum enim est humorem acidum vel acerbum aliquandiu in quibusdam ductibus pancreatis lateralibus subsistentem vitari, atque invite fonte, corde, sanguinis effervescentiam vitalem ita turbare ac invertire, ut facile extinguatur ignis vitalis, ipsaque adeo vita pereat: illud autem non raro evenit non tantum in febribus epidemicis, verum alijs quoque tum intermitibus tum compositis, quoties præsertim nunquam immunes sunt à febre ægri, atque permanente in ipsis caldere sit tamen pulsus tum minor tum debiliior, ut plurimum mortis metum incutens, ipsamque plerumque tandem producat &c. vide *plura l. c.*

#### OBSERVATIO XLIV.

*Febris maligna in Corde focus habens.*

**I**n hoc ægro non aliam febrem existimo quam malignam, nedum continuam: Malignam vero intelligo quæ putredinem sequatur, vel mali generis, quæ propria corruptio mixti est, vel quæ etiam in locis sit ad cor sitis: unde quanquam humor admodum acris non sit, & vel sanguineus vel pituitosus sit, neque acrem calorem efficit, malignam tamen febrem facit, quoniam humores penitus corrumpit, & cor opprimit, vidimus sæpe in mortuis dissectis Cor habuisse tanquam stipitem pituitosum, qui detractus ramos totidem haberet quot vasa à corde in pulmones pertinent: Vidimus alios capsulam cordis habuisse plenam humoris in pus conversi, qui fere ad extremum vitæ per tres dies liberati à febre visi essent: Alius quibus membranae succiagentes costas essent luteæ, & erysipelatoso effectu corruptæ, etsi minime in tumorem elatæ, quibus tamen urinae fuerunt subjugales quoniam corruptio ad venas quoque festinabat, quanquam erysipelata ipsa viscera per se etiam malignam febrem faciant, unde non sit mirum si in malignis febribus sæpe urinae ad naturales accedant: Hic certo loco prope cor putredinem esse, neque ad venas pervenire credo, sed circumscriptam & cencusam in aliqua parte esse, cum qua cor conjunctissimum afficiatur, ad ejus tamen ventres putredinem non transiit, nam ventres cum arterijs & venis conspirant, ad corpus totius cordis emanare affectum inflammationis, & per corpus aliquod arteriosum membranosumque. Arterias quoque maxime affici in ipsis malignis febribus mihi nota summa est, quod efflorescunt sub eis in cute puncta rubra, quæ non ipsum sanguinem, minus cum qui in venis est, sed spiritum sanguineum, qui in arteriis continetur, effervesce, & in vaporem liquari indicant, tum per oscula ipsarum exprimi: Sanguis enim crassus nigresceret subito, imo spirituosus is sanguis debet solo fervore dissolvi, non etiam putredine, alioquin suum colorem non servaret, quod habere potest arterijs calefactis, & dum vasa crudo & lento humore impediunt sunt eorum membranæ aliquo inflammationis genere correptis, propter obstructions & concaustionem, membranæ inquam affectis tumore sive erysipelatode sive phlegmonoso. & per ipsas longius effuso, corde succingente dicebam cum membranæ vasorum, cor earum initium cum sit, maxime consensit, & ab illis maxime afficitur, una cum sanguine, & pro modo affectus infirmum sit, & una arterijs imbecilliter movet: Linguam animadvertit à ventriculo, cum quo tunicam communiceat, & per ipsum à jecore maxime affici: A pulmonibus autem, cum quibus ventriculus nihil commune habet, sæpe minime affectam vidi: In hoc ægro affectu cum sit cor credo maxime sui in corpore affectum, & cum eo ventriculum

male habere, non humoribus communicatis, ut à jecore sit, sed consensione caloris vitati, unde etiam malæ & nares extreme rubentes videntur: Si materia etiam in capsula cordis collecta sit, cor ipsum, non sanguis aut urina afficietur, & cum corde arteriæ potissimum: A corde autem ita male se habente, præter pulsus animus quoque anxius factus est, nihil sine anxietudine agit, cujus causam ignoret & supra morem agens etiam se apud se non esse indiget. Et hæc moris læsio mihi species pessima est insaniz, quæ non à capite vaporibus febrilibus pleno, sed à corde anxio & oppresso venit, & fere mortale in omnibus animadverti: Ex quibus moriturum citò hominem crederem, neque auxilij locum ullum esse existimarem, parte tam principe tum oppressa, ut pulsus præcipue indicat, & dictum insaniz genus, eaque à remedijs remota, & jamiam tabescente, ut pulsus durities, parvitas & imbecillitas ostendit cum summa frequentia. Hic xii. die extinctus est *Guarionium consultat.* 198.

## OBSERVATIO XV.

*In Peste carbunculi extræ emergentes, alios intra latentes, supponunt, Exanthemata male affectos pulmones.*

**I**N Peste illud à nonnullis fuit animadvertum, quod quibus Carbunculi exterius existissent illis, si ipsi tumores in trunco fuerint, viscera quoque similibus infecta fuere; Sic autem rem respondisse, ut cum illi tumores in inguinibus, Jecur, cum in axillis existissent, cor id haberet. Quibus vero Exanthemata effloursissent, ijs proprie Pulmones male haberent. *Guarionium consultat.* 349.

## OBSERVATIO XVI.

*Malignæ febres ut plurimum à putredine sunt.*

**M**iror ego magnos Medicos qui malignitati febrium credunt resistere quibusdam, quibus nihil educitur è corpore, & potius in eo omnia comprimatur, cum malignæ febres multam putredinem contineant qua ipsæ consistant, Quod licet in cadaveribus sublato morte ejusmodi cernere. *Guarionium consultat.* 384.

## OBSERVATIO XVII.

*Les Pestifera in ovibus & juvencis ob vermes hepar depascentes.*

**A**Nnis 1663. & 64. quibus mactatarum ovium, vitulorum & invencarum Hepar, reliquis visceribus nullam prætematuralis constitutionis faciem exprimentibus, vermes prosectoribus obtulisse, fidem fecit experientia abunde, adeo ut lanio eo tempore quo siquens est mactatio nullius hepar inventum sanum asseruerit: In gregibus hoc in Ducatu ovarijs præcipuis quatuor, junctim spectatis, cum 3000. oves fuerint numeratz, vix xl. tandem superuisse relatum: Vermis id genus hi: undinem prima facie referre videtur. Ad opilionum quorundam mentem esu numulariz melum hoc contrahitur, quod vix verisimile, cum planta hæc ex Matthiolo, vim habeat glutinandi sitque vulneraria atque omni ætate lætus sit plantæ proventus, mali autem rarus: Cervi quoque & lepores in campis & nemoribus vel mortui reperi, vel oberrantes languidi: menstrua hæc sunt strages quæ dicto spatio terminata venatorum curam simul terminavit, Demortuorum autem & moribundorum corpora Hepar & pulmones putrilagine corruptos & spaciellatos exhibuerunt: Cervorum hepar similem vermium sortem edidit: Inter domestica præprimis ovibus & juvencis calamitas hæc fuit infesta, equinæ, caprinæ & suillum genus ab hœc malo mansit immune: Oves fuerunt sine discrimine omnes tum seniores tum agni; quin & fortium utero conclusorum hepar simili labe fuit infectum: vitulorum quorundam fuit vitiosum: Anniculorum autem & biennium invencorum juvenicarum sæcus fuit vermium; Armenta autem & boves annosi rarissime laborant tum quia durior eorum constitutio, tum quia alimentum siccum, firmum fere toto anno vorant, In nonnullis hepar solum in insignem excrevit molem, in nonnullis simul pulmo &c.

**M**ateria proxima sit omni vermi accidentaria lege in animalibus genitorum, unanimi physico-rum suffragio, ita & horum substantia, sunt corrupta putrida, sive signis sit, sive hepatis portio corrupta sortida; omne autem putridum ex se & sua natura vermes generat, id quod Arh. Kirkerus Scrutipio de peste comprobatur: causa putridæ hujus substantiæ remota cum malum sit commune, communis esse debet, quæ

vel in Aëre, vel cibo & potu quaerenda: Aer quidem ratione (non substantia, quæ quia simplex & subtilissima mutari nescit) accidentium varijs exhalationum è terra & aqua & rebus putridis effluvijs, & vermiculis infectus corpus nostrum alterare & immutare potest; sed pulmonum substantiam quam totam subit, cordisque regiam citius quam hepar invadit, malitique & pravitate sigillum incessanter sanguini & spi-

& spiritibus cor transeuntibus imprimis. Plurimum autem brutorum pulmones vitio tum carere omni: *Aqua* accidentium variorum ratione pariter spectata cum variis in corpore distributa partes alius, necvis imprægnatur qualitatibus ad ruinam disponere videtur partium compagem facilius: Ex sane quædam novis qualitatibus anno 1664. fuisse admittatas nonnullis in aquis strages arguit: Aquam vase conclusam, folisque expositam, mox in vermes animari quotidiana docet tum in maritimis navigationibus, tum intra privatos domuum parietes experientia. Num seminio vermium facunda aqua, à brutis hantia, facunda evasit in corpore, vermesque hepatis dulcedine allecti fixam ibi collocarunt sedem? Ego licet Aquarum adulterationem data ratione convictus non negem, posteriori tamen vacivas aures præbere prohibeor, cum quia dissiliis etiam in locis, aquarum vigore superbiens calamitas illa hepatica fuit soborta: tum quia partes Oceanicæ animalis reliquas dulcedinis laudes æque conspicuas advenisti non occuparunt.

Ad *vulnus commune* igitur, sive pabulum, idque adulteratum pluviarum frequentia, tum Rubiginum vehementia confagere malo: frequentissimi anno 63 pluviarum recurrit ante f. et quam suam iuricolæ in segetem immatrerent falo: m humidis bruis sub dio commorantibus dederunt nutrimentum; qualis aotem ratione qualitarum cibus, talis sanguis, qualis sanguis, talis partium constitutio: humiditas vero excedens latam putredinis viam sternit, cui auxiliiatrices manus æstus insignis pluviosum tempus excipiens tulit, ejus injuræ bruta impatencia, largiori aquarum potu majorem æstuantibus, & ex præcedente nimis humido pabulo labefactis visceribus asperserunt labem, Accessit frequens *Siderum salus*, ut *Plinius* loquitur h. e. Roris noxii allapsus: *Meteorum* quæst meteor. p. 321. noxium Rorem vocat minutissimas gattas illas quæ splendens sole tacite depluant, rebusque nascentibus adherentes sunt exitio, *Virgilius*. lib. 1. Georg. *rubiginem* appellat.

Mix & frumentis labor additus ut mala fruges Effert rubigo.

Scilicet rubigo ferrum, ita Ros ille noxius lædit vegetantia. Ros ille mellius cruda pluviam in se continet, & vaporem incoctum, qui proinde adherens oleibus; plantis, arborum folijs & graminibus facile corrumpit, abique in virus quod quidem dulcedine pecoribus imponit, at calore urente rubiginem satis affert, cum destituatur humido alibili, variisque interdum ludat figuris in fructibus & folijs, in quibus serpentum figure ex uredine in pomis aliquando conspexit: Neque vegetabilium tantum sed & animalium constitutionem ros ille putrefactum labefactat; eo magis quò majori ille pollet malignitate & acrimonia: Noxio hoc rore juveni & oves nostras largius insuper inescatæ, cum sine dubio hepatis labem contraxerunt: materiam illam multi dixerunt sulphuream, sed rectius forsan arsenicalem, vel auripigmento affinem; quamvis & his tangeret sulphur, sed pure factum & corruptum & pariter hoc sal causticum & adurens, & Mercurius principia reliqua

uniens & neciens ut ait *P. J. Faber* Panch. l. 4. c. 49. malignitatem de super ortam adaugent aquarum inundationes, excrementaria, serpentum, bestiarum & lacertarum ex antris materiam variisque virulentarum quiscularum fordes eluentes & in pascua eum limo deponentes. Adeo pabulo inquinato si bruta vescantur, concepte virulentæ truculentiam non possunt non incurrere &c.

Sed cur *Hepar* præprimis non consiliet aut ventriculus concepta malignæ putredinis labe, angustum vermicibus domicilium aperuit. De pabuli conditione hepar restari veteres non lauit: Ex *Vitruvius* habemus quæ suscepto de salubritate locorum ex hepate agnoscunt oppida condi antiquitus ceperunt. Quodam jecur præprimis putredinem concipiat spiritumque vermium fiat marsupium substantiæ rationi hoc imputandum censimus, etenim ex *Galeno* 4. dex. p. 12. Sanguis est mediocriter condensatus, mollis, insignis magnitudinis, dulcis, calidi & humidi temperamenti, atque hinc ex alimento humido & pravo, & ex hoc genito sanguine quem omnium abundantem excipit facilius quam viscera reliqua assidue laborare & ad putredinem disponi potest: *visceris* fructus est profluvium, quod biliosum reddit caustica & urens rubiginis facultas, suæ qualitaris characterem humotibus imprimens, inde diarrhoea biliosa seu cholera, in brutis nascitur: sed si nulla fermentationis lege humorum pravorum fiat separatio & excretio, majorem hepar sufferre tenetur multam: *Ventriculus* cum malignitas involucri alimenti caustioribus conclusa lateat, illam cum alimento à se expellat, adeoque ita affici nequit: Cor quidem communicatum, ab inferioribus chylum infectum admittit, sed impresso sanguinis characterem cito in arterias illum transmittit omnemque à malignitate intentatè injuriam calidi, quo abundat spiritumque ope amoluit, *Lien* numerosa arteriarum sobole instructus spirituum vitalium ministerio pariter maligni hostis atrocitatem eludit. *Hepar* vero arterijs & spiritibus vitalibus non ita munitum, larum ingredientis & diutius hic commoranti hosti concedit campum, qui fractas jam ab interperie humida vires magis frangit ut nec feliciter suo fungi munere, nec sanguinis per venas ad cor circulationem debito modo undequaque promovere queat. Subsistens itaque alicubi materia prava putredinemque concipiens ipsam deinceps hepatis substantiam inficit, & causa putredinem hepatis inferens proxima audit, Hepar ita affectum materiam vermium generationi uberiori & aptam, locumque caloris suavitatis spiritus obtemperanti congruum subministrat: Quid si ingestum cum alimento venenum soli hepatis specifica qualitate contrarium fuerit: Quamvis vero omnium quorundam *Pulmones* heterogenam illam vermium prolem exhibebant per consensum cum supra ad pulmones circulationis lege, sive vermiformi sanguine, sive seminis apparatu, ex hepate id esse subortum dixerim, vermes, qui sui maleplaciti dulcorum hepatis & pulmonum substantiam depauperant facile? *Christophorus Frommiius* *Observo*. 188. *miscell. curios.* *anis* 7.

## OBSERVATIO XVIII.

*Apertio aliquot cadaverum Febri maligna Pisis Anno 1661. grassante, jugulatorum; ex descriptione Clariss. Joh. Alph. Borrelli, ad Clariss. Marcellum Malpighium transmissa.*

## EPISTOLA I.

**M**E detinuit curiositas aperendi quædam Cadavera in hoc Zenodochio, ut patere præsentium morborum natura, quæ mihi evidens facta videtur. Plerumque incipiunt cum

cum Typo februm tertianarum simplicium, capitis gravitate, dolore stomachi, oris amaritudine. Septimo die febris fit continua, undecimo maligna evadit; & quibus alvi fluore non succedit, decimo quarto die & interdum citius moriuntur.

In quatuor cadaveribus, quorum sectionibus interfui, nulla notabilis læsio in pulmonibus visa est, excepta æquali ariditate ab ardore febrili forte inducta; in reliquis sani apparuerunt. Mesenterium pariter & glandulæ in ipso contentæ nec putridæ, nec corruptæ erant, ut dubitabatur. Substantia quoque hepatis & lienis nullâ læsione afficiebatur: vesica tantum biliaria insigniter turgibat; & insuper ventriculus eodem humore bilioso affluebat, & in aliquibus intestina eodem colore tincta inventa fuerunt. Hoc est illud totum, quod adhuc usque observatum fuit in omnibus huiusmodi morbo extinctis; eundem magna siti & ventris dolore laborantibus; alijs delirio, oris amaritudine, vomitibus, inquietudine magna afflictis. Post alvi fluorem levamen supervenit: Patet, nullius auxilij esse sanguinis missiones, quia nulli, qui petij, defect huiusmodi remedium, etiam ter repetitum. Hic in usu non sunt magnæ purgationes, ideo earum fructus ignoratur. Quidam sibi persuadent, nullissimam esse sanguinis missionem hirudinibus: sed quia talis effectus nullam percipio rationem; nec intelligo, quodnam sit discrimen, supposita sanguinis circulatione, inter missionem sanguinis à brachio, & illam quæ fit ex alia parte, mediantibus hirudinibus: dubito an casus hirudinibus famam conciliaverit, cum ipsæ fortè non convenient. Ut demum me servem amicis meis, præter consuetum vivendi modum, uxor refrigerantibus, & haustibus aquæ singulo mane jejuno ventriculo, & circa vespertas misceo eidem aquæ aliquid spiritus sulphuris, vel aliud acidum: in reliquis hilaris vivo, & audenter totus sum in philosophando, & tandem te unâ cum D. D. Fracastoro, & Cassino veneror.

## EPISTOLA II.

**N**unc adest Tertius, nempe Dominus Antonius Bononiensis, tibi notus, juvenis ingeniosissimus & curiosissimus, qui & ipse contrectavit cadavera. Huic nullius juvenis fuerunt diligentia & infinitæ cautiones in ejus curatione adhibitz. Unico clystere optime purgatus, & deinde cum heri ex consilio medicorum medicamine minorativo, ita ab ipsis vocato, purgatus fuerit, inveni Dominum Gorniam deterritum, quia non observaverat effectus, quos ipse expectabat ab evacuatione, & ab usu ciborum & potus copiosi cui spiritus virtuosi & alia similia immiscebantur. Ad calcem hujus epistolæ addam si quid novi hoc mane acciderit. Intentio mea est, & ipsi contenti erunt, repetere alios clysteres efficaces & deinde instituere sanguinis missionem. Vt Tibi mentem meam aperiam, usque ad hunc diem non possum timere, Si ferendum est iudicium ex omnibus alijs morbis nunc grassantibus; à quibus nullus evasit absque spontaneo, aut promoti alvi fluore; & ex adverso omnes, qui perierunt, cuncti delati fuerunt ad sepulchrum brachijs, pedibus, & alijs partibus ulceratis; quapropter, Domine mi, hæc constitutio non est similis illi, quæ vigeat annis 48. & 54. quia tunc universè in cadaveribus reperiebantur pulmones gangræni & tabe penitus confecti, reliquis cæteris partibus absque læsione. Nunc pulmones exigui, & fere nulla affectione tentantur, dempta quidam ariditate in parte anteriori, orra ex febre, quæ excepta in reliquis optime se habent; nec aliud reperitur, quàm copia illa bilis, quæ ut dixi, non consequitur, sed præcedit; etenim in principio morbi sepiusmi adest in ore maxima amassitudo; sicut accidit mihi tribus elapsis diebus, cui succurrere studui, sumens Cassiæ uncias duas, quibus lubricitatem corpori conciliavi, quod videretur mihi optime egisse: Ex ita alijs evenit, quare ruz sententiæ acquiesco, nempe quod possint venenata semina inspirata cum aere tanquam fermentum segregare copiam illam bilis, quæ deinde est causa febris. Apparet etiam in his morbis ut plurimum non esse malignitatem, quia agonizantes permanserunt per decem & duodecim etiam dies, quo tempore aliquid solaminis aliquando consecuti sunt, demum mihi relatum fuit, Domino Antonio, elapsa nocte bilis magnam copiam per alvum purgatam esse. Insuper hoc mane ex altero clystere multum excrevit, ideoque remansit satis liber, hilaris, & sereno capite, febrisque diminuta est.

*Responsio Clariss. Malpighij ad progressæ Epistolæ qua Scholij loco erit.*

**M**illi pergratz fuerunt Cognitiones, quas potestima tua die non continebat circa morbos nunc grassantes, & pro majori mea requie & informatione libenter scirem an inter quos perierunt in isthac epidemia, mortui sint aliqui, quin principio morbi vomuerint, aut per inferiora excreverint. Etenim scio, hic involatam esse methodum, in principio ejusmodi morbi per inferiora alvum excreverit, & materiam, ut ajunt, diminuerit lenientibus & minorativis. Insuper mihi videtur valde novum ubi adest copia bilis à sanguine secreta partim ad ventriculum, intestina, & primas vias delata, sicut mihi refert, in isthac constitutione accidere, necesse sponsum alvi excretionem non sequi; cum nobis sit notum, ubi natura irritatur, ut observetur est in quibusvisque morbis vehementibus & repentinis, & etiam ipsis accessibus, impelli & evacuari bilem cystis felleæ, & cæteros humores facile, licet non sit origo & basis morbi. Circa de-

demum naturam & curationem praesentis Constitutionis me tibi submitto, qui observaveris, dum praesens adeo, accidentia & deinde cadavera, sola principia pro philosophando in hoc casu. Vni tantum in hac me terret, nempe si morbus dependet à putredine sanguinis, quam sequatur copiosa bilis secretio, unicum remedium esse, prohibere illud fermentum, cuius nos adhuc nique ignoramus remedium & modum. Insuper si morbus curari posset evacuando productam bilem & secretam, ars deberet habere signa temporis, cum secreta esset, cui adhuc usque ignota sunt; etenim tibi melius, quam mihi constat, in liquidis, in quibus statuto tempore fir-

mentatio, non haberi posse secretionem panis determinatam, nisi determinato tempore; imò remedia quibus communiter intendimus separare & evacuari, scilicet purgantia agere irritatione, vel meatuum apertione, quae cedit locum illi, quod est fluidius, vel saltem simile; ideo videmus, purgantia remedium in morbis raro operam ferre, quia non attingit punctum separationis & edactionis, quod fortasse natura absque alterius auxilio sola egisset. Utinam observo ubi adest multa bilis sanguini confusa non accidere febrem, ut observatur in icteritia, & alijs similibus morbis.

*Tertia Clariss. Borelli in eodem argumento Epistola quae rursus loco Scholij erit.*

**P**RO responsione doctorum, cognitionem humanissimae tuae epistolae, primum dico, ex multis infirmis hujus Urbis, majorem partem in principio alvum adstrictam habuisse, licet aliqui etiam in principio fluidam haberint, & vomuerint, & fuerint cum linguae amaritudine: verum est, ut dixi, generaliter hos medicos dicere, omnibus illis, quibus supervenit alvi fluore spontaneus, vel concitatus; melius se habuisse, & sanatos fuisse. Quod porro hic solemne sit exhibere minorativum in principio, videtur hic de facto verificari in medicis advenis Patavinis, & speculative etiam in his, qui sunt hujus regionis, qui deterriti ab exemplis, quae acciderunt anno 55. cum omnes illi, qui purgabantur, morti subiecebantur, retinent pariter illam terrorem, ideoque à missione sanguinis principium curae instituunt circa secundam instantiam, ubi tibi satis novum videtur, ubi adest copia bilis à sanguine secreta & transmissa ad ventriculum & primas vias, ut accidit in hac Constitutione, necessario non accidere spontaneum alvi fluorem; hic sane ego primum non audeam dicere, omnem illam magnam copiam, quae reperta fuit in ventriculo, ibidem adfuisse in principio morbi, cum successive potuerit augeri, ad mortem usque, & licet alvi dolores, quibus afflicti sunt universi infirmi, ut mihi testul' camperatius Xenodochij, videantur arguere bilis copiam in intestinis, non video, necessario debere accidere alvi fluorem, quia non omnes humores, qui sunt aëres, & erodentes habent vim promovendi alvi fluorem, cum saepissime observemus multos liquores artificio factos magis erodentes, minus concitare fluorem. Duo exempla afferam. Acutum simplex erosionem magnam excitat in lingua, & faucibus, & in his sensum producit qui maxime duplicet, sed postea distillarum multoties, acquirit dulcedinem, & pariter est magis penetrans, & magis efficaciter corrodit metalla & alia mineralia, quam strea, & cum erat acidissimum. Similiter in ventriculis quorundam piscium reperitur quidam succus, cujus sapor est valde similis muris olivarum, & saepissime dulcior & tamen est aqua fortis ita penetrans, ut piscium ossa brevi tempore deterat, nec aliquid damni affert membranis ventriculi & intestinorum, quia illic residet tanquam in proprio loco nec irritat, nisi stimulat intestina ad egerenda cibaria per secretam in alijs animalibus, quae vescuntur pariter durissimis ossibus, ut sunt falcones, reperitur idem succus ventriculi similis lacti dulci, vel parum salito. Et ecce tibi indicari succi maxime erodentes, qui non stimulant, nec irritant facultatem expulsiivam. Hinc elicitur fieri posse, ut fermentum vel semen venenosum, quod in hac constitutione grassatur, separet urique magnam bilis quantitatem, sed nescio, an sit ejusdem naturae bilis, quae in sanis hominibus reperitur in vesicula

fellea. Et cur ergo credere nequeo, eam esse penitus diversam, cum sit venenosa: & licet in se habeat amaritiam, non est opus ut habeat facultatem purgandi, & irritandi membranas, intestinum, ideoque poterit excitare dolores capitis, absque eo quod simul facultatem expulsiivam. Circa methodum medendi hujusmodi morbis, fateor, me illam ignorare; verum si ad experimentis documentum quoddam deducere licet: cum observatum sit omnes sanari, dejectionibus spontaneis, vel arte excitatis, humorum biliosorum: quorum deinde tanta copia reperitur in cadaverum vesicula fellea & ventriculo: & è contrario: cum certum sit, alvo adstricto, mortuus esse: cur non debemus credere, quod continua immixtione illorum humorum, quos solet natura sponte expellere in illis, qui sanantur, non debeat pariter auxilium haberi: & licet fermentum remaneat, nihilominus naturam imitari oportet: quia fieri potest, ut ipsa gravata aut beneficio feculis, aut transpirationis, vel alteriusmodi expellat supradictum venenosum fermentum. Pergis, Vir clarissime, hoc te deterrere in isto negotio scilicet, si morbus dependet à perturbatione sanguinis, quam sequatur copiosa bilis separatio, unicum remedium farorum esse, prohibere illud fermentum, cuius nos ignoramus remedium. Hoc totum ego concedo, sed optimum puto interim sequi naturam, & experientiam, quae his morionibus purgantibus, ut jam dixi, bonum opus complevit. Deinde adest si morbus curari posset sola evacuatione bilis productae, fas esset, ut ars haberet signa temporis, quibus separatur, quia in liquidis, quae ad tempus fermentantur, nisi statim temporibus non evenit fermentatio. Hoc totum ego agnosco, sed interim non mihi videtur error, modo sensibilibus aliquo clystere, modo levioribus moventibus educere illud, quod continuo separatur; tu as deinde, remedia, quae communiter creduntur vim habere separandi & evacuandi, probabiliter agere irritatione aut meatuum apertione, ideoque extrahere fluidius, & quod prius occurrit; & habere esse rationem, cur purgantia ut plurimum in febribus, in quibus est amarities & bilis, non proficiunt, quia non attingunt punctum separationis. Ita sane est, sed in casu nostro, experimentum nos rutos reddit, levis purgantia expellere, quod est nocuum, alter enim sequi febrem, ut observatur in icteritia. Hoc primum nescio, an concedere debeam in similibus morbis bilem esse dispersam per quasque artetias & venas, quia memini, me experiri esse, immersa papyri portione intra urinam coisusam, qui faciem & oculos maxime croceos habebat, illam extractam fuisse nullo croceo colore tinctam; quod significat, in sanguinis massa non adesse illam bilis copiam, quam medici somniant. Insuper non mihi videtur curum phi-

Isophari tam absolute de natura rerum à sola-mutatione, quæ habetur vel à permanenti coloris, vel saporis; quia pro certo habeo ob innumera experientia, colores multis modis immutari posse in eodem liquore; & ex diverso posse perseverare eundem colorem, licet in primo casu nulla mutatio essentialis supervenerit liquoris, & in secundo, licet de sano factus fuerit venenosus. Hujus rei afferam tibi exemplum probatum in nostra Academia. Accipe rosas siccas per aliquod temporis spatium maceratas in spiritu vitrioli, cui adde, magnam aquæ copiam, & habebis ad instar rubini. Liquorem maxime rubicundum. Tujice deinde aliquas guttas olei Tartari, & idem liquor evadit coloris viridis ad instar Smaragdi. Iterum infundas paucas guttas olei Sulphuris, & idem liquor denuò fiet maxime rubicundus, ut primus. Qui igitur judicium ferre vellet de naturâ liquoris à calore, in hoc casu valde erraret; primus enim constabat aqua simpliciter & paucis guttis spiritus vitrioli, quod est salutarium & gustui suave, & in secundo casu, erat permixtum quoddam apta ad edecandum hominem. Pariter saporem mortis olivarum quantum differt à naturâ & facultate illius succi, qui reperitur in stomacho piscium; & quis crederet, saporem lactis, qui oblectatur in illa aqua fortis stomachi Falconis, tantum differe à lacte Caprarum, quandoquidem color & sapor sint adeo illi similes? quod si natura totiusmodis facilis potest variare colores absque mutatione substantiæ, & diversarum substantiarum mixtio-

ne producere eundem colorem & saporem; quomodo scire poterimus, colorem illum croceum cutis intericorum occiri ab eadem bile, quæ colligitur in cystide fellea, aut ab aliquo alio in Cæce genito? vel si proveniat ab ipsâ bile extravasatâ per minutas Cutis porositates, partem illius in venis supersse; ad febrem accendendam? & præterea, licet in venis portio quædam decineretur, eam debere febrem concitare absque mutatione naturæ: ex his omnibus videor posse conjecturâ elicere, ab exemplo ictericæ non posse dubitari de eo, quod nobis experimentum demonstravit in his morbis modo grassantibus, à quibus videmus edocti uniformiter de omnibus morbis ferendum à nobis non esse judicium. Hoc dico, quia mihi persuadebam; in his cadaveribus, cum sit morbus epidemicus ab aëre dependens, nos observatos fuisse pulmones tabidos & gangrenatos vel saltem melenecurium, sicuti reperitur in febribus, malignis dictis; & sicut ego observavi in epidemia anni 1648. & tamen me deceptum vidi. Modo sicut hæc epidemia differt ab illa, suspicere possumus, alias adesse maxime insolitas. Sed ego vasa fero Sæmum; nec recordor, me libere loqui de re, quæ ad me non pertinet, præsertim tecum, qui maxime & summo studio circa hujusmodi morbos laborasti, ex hoc argui oblectationem, qua fruor, tecum disquirendi; & exiguam cautelam, qua uxor, cum disquiret cum amicis tam charis, qui me amant, & ferunt illo modo, quo facis.

## OBSERVATIO XIX.

*Anatome pueri variolis malignis extincti.*

Filiolus mercatoris apud nos famigeratissimi, annos circiter novem natus, animi ad hilaritatem compositi, sed ingenij aliquantum obtusi, à multo tempore nonnihil asthmaticus, sed alias satis agilis & promptus, circa principium mensis Octobris Anni M. DC. LXXXIX. de inguinis sinistri dolore, cum aliquantillo tumore conquestus est; sine tamen æstu vel rubedine partis. Parentes rescito, quem filiulus in fornem horreo ingestum fecerat, saltu, anxii statim hæsitarunt; nam fortè hernia, rupto sive laxato peritonæo, oborta sit; quamobrem medico in consilium accessito res exploranda offertur, qui nullam hæc enterocœlem agnoscere voluit, sed ventosam solum membranarum dilatationem esse persuasit; hinc medicamina præscripsit huic malo opponenda, quæ cum non statim ex voto succederent; solliciti magis parentes generosiora inquirere remedia statuerunt, eamque in finem, connivente Medico, Chirurgum simul advocant, medicamentum famosissimum non procul ab urbe degentem, qui inguinis tumorem obiter inspectum, ac minus inflammatorium esse comperiens, adhibitis suis remediis intra paucos dies discussit. Cum autem non longè post idem puer Arthritide vagâ leniter constictus cepisset, idem medicaster denuò in auxilium vocatus; ægrotulum per quindecim dies; quotidie semel super accensum vini spiritum, exhibitis simul internis sudoriferis, sudare curavit, sicque patientem uræunque sanitari restituit, ut, qui antea rectus incedere nesciverat, jam bene satis progrediretur. Inter hæc, cum asthma subinde recurreret, Agyrtæ sibi persuaderet, illud non nisi à strumâ provenire, licet parum admodum in collo animadverteretur, pulverem pro Botio, quotidie diligenter usurpandum, commendat. Tandem verò die 16. Novembr. 1689. Filiolo purgans aliquod jalapinum exhibet, ex quo multoties primâ die cum Torminibus acerbis dejecit; postridie vero adhuc alvum fluidiorem habuit, simul ac de doloribus continuis sinistri epigastrii conquestus; parum comedit, parumque tum sitivit. Die 18. ejusdem mensis febricitare jam, pejusque se habere cepit, quo permoti parentes ab Agyrtâ desieiebant, & ad Medicum suum ordinarium redibant, qui accedens puerum feбри acutâ, cum fixo epigastrii dolore, decumbentem animadvertit, fastisque indicationibus ab ærimonis humorum, sanguinisque hinc inde in glandulis & tubulis minimis stagnatione desumptis, antifebrilia præscribit ac diaphoretica, variolas, quarum eruptarum suspicionem habuit, expellentiâ; quâ medendi methòdo per quatrìduum continuatâ id præstitit, ut pustulæ hinc

usquequaque, sed majore tamen numero in facie atque artubus tam superioribus, quam inferioribus, erumperent, simulque aliquot dierum spatio incrementum, ac more variolis consuetum augerentur; ad eam tamen altitudinis & maturitatis perfectionem non elevabantur; ad quam in pluribus alijs prospero eventu pertingere solent; tumebat quidem facies, pustulis undecumque repleta, sed plimpebræ tamen nunquam penitus occludebantur: præterea febris cum suis symptomatibus nihil miscebat, dolorque Epygastrij contumaciter persistebat. Medicis his perterritis, prægnosin jam sanestam formare coepit, idque tanto magis, quod insequentibus etiam diebus à diaphoreticis, tam si quàm blande volatilibus, ab emulsionibus nasticinis, alijsque mixturis cardiaco-fudoriferis nihil melius haberet adolescens. Esi enim mador aliquis semel atque iterum è cute erumperet, Febris tamen nihil unquam remisit, quin deliria, inquietudines, aliæque funesta symptomata jam accedebant. Tandem variolæ sicari, & fusæ nigraeque evadere incipiebant, emaciabatur adolescens, tussiebat multum, ob vires magnopere attritas nihil exferreare valens; ardebat urina, alvus frequens erat & liquida; deliria crebra; appetitus dejectus, horrebat inprimis calida singula, solo hinc lacte per aliquot dies nutritus. Atque sic paulatim vires magis exolvi, naturaque fatiscere perrexerunt, donec tandem noctu diei sextæ Decembr. postquam extrema membra primum, hinc & reliquæ, versus medium usque ventrem, partes actu frigida redâerentur, ipseque adolescens placide expiraret; atque animam creatori benigno altiore in sedem remitteret. Parentes morte Filii charissimi summopere contristati, veram hujus funesti eventus causam scire cupientes, cadaver aperiri voluerunt; quam in rem ego simul cum ordinario Medico postulatus, sub vespere diei septimæ Decembr. quo tempore cadaver jam penitus frigidum, illud apertendum adgreddior, ubi primo statim intuius pectus totum, hinc & Epygastrium inprimis sinistrum, prorsus lividum & gangrenatum apparuit. Abdomine autem inciso, ejusque involucris, divisis, intestina comparuerunt inflata, quæque superius jacentia primo statim visui occurrerunt, naturali se peius facie offerebant, dum vero eadem curatius examinando ab invicem separabam; Ilei tandem portionem in Epygastrio sinistro sram, spithamæ unius longitudine, rubicundam, livida interstitia venis, adeoque gangrenatam offendi: hinc per mesenterium plurimas glandulas majores, minores tractui intestinorum confines notavi, lividas eas, sed satis adhuc molles. Ipsa quoque magna Astellij glandula, non secus ac pancreas alterum Virsungianum nonnihil lividum adparuit. In intestinis tenuibus glandularum plexus nonnulli sidentati, inprimis autem glandula solitariae intestini coli tumentes, & nigrae extiterunt. Hepar & magnitudine & consistentiâ fuit naturale, verum quoad colorem in basi, quâ dorso incumbit simulque diaphragmati adjaacet, ut & in peripheriâ illius livor aliquis ad digiti latitudinem conspiciebatur. Quocumque autem parte hæc viscus incidebam, sive sanâ sive sphacelatâ, sanguis niger, isque fluidus plane emanavit. Lien similiter in extremitate sui inferiori qui gallinacei minoris magnitudine niger prorsus & sidentatus fuit, sanguinem quoque fluidum incisione factâ emittens, cætera magnitudinis debuit; inter Lienem & ventriculum, subter membranas omenti, pinguedine destituti, glandula hærebant quinq; præternaturaliter tumida, rotunda, livida, sphacelata, quarum maxima exæquabat magnitudinem Nucis moschatæ; hæ glandulae exterius livida aut cærulea, interius substantiam exhibebant ex rubro livescenrem, & gangræna corruptam. Renes fuerunt naturales. Diaphragmatis pars, quâ hepatis portio sidentata tangebatur, simul livida cernebatur. Elevato hinc sterno, utriusque lateris pulmo humidus visus, cujus vesiculæ quam plurimæ, imo innumeræ satis notabiles, partim aëre, partim spumoso sero turgida existebant. Color interim pulmonis mirè varius, hinc albicans, illinc livens, nigricans, roseus, violaceus, &c. Sidentatas portiones multas, sed nullum tamen abscessum, nullas pustulas exhibuit. Pericardium ultra duas feri limpidi Uncias continebat: Cordis arteriæ, venæque sanguinem merè fluidum habuerunt, sine ullâ pituitâ coagulâtâ.

**P**ericulosa fuit admodum sectiones corporum febri malignâ extinctorum, novi plures inde in similes incidisse febres, à quibus vix liberari poterunt. Minus tamen periculi in se habent, si cadavera perfrigerentur, si tempus hibernum, æreque gelidus. Plura hinc forsitan in Adolescentis illius cadavere adnotare licuisset, nisi propriæ valetudinis ratio habenda fuisset, tantoque id magis, quod à Variolarum insulubus hucusque per Dei gratiam immunis exciterim. Aliqua interim notata maxime digna hæc Anatomie exhibuit: quorum primum est sanguinis fluiditas, acido-

corrosivis plus minus volatilibus particulis adsorbenda; sunt qui arsenicalis naturæ, alii aliis virtutibus illas faciunt; A. quibus naturalis massæ humoralis crasis, atque consuetus particularum sinus invertitur, atque valdè perturbatur, ut, cum remedia jam deficient, quæ naturalem dispositionem restituere valeant, humores necessarij semper in suo motu circulante præpediri, tandemque hinc inde prorsus stagnando mortem inducere debeant; Secundum est, quod non tantum partes externæ, sed internæ plures, in medio & infimo ventre similibus inflammationibus deleterius aff-

flicæ fuerint : atque ita in omnibus hæc lue,  
 vel etiam febrî malignâ decumbentibus contingere,  
 mihi firmiter perfuadeo ; usque adeo enim  
 vel nimis copiosum , vel nimis acre est tale ve-  
 nenum , ut subinde prius in glandularum interna-  
 rum tubulis obhæreat , seseque affigat , quam in  
 externas sub cute fitas glandulas miliares circa pe-  
 cticulum febre præcipitari pariat. Notabile , quod  
 in externâ pectoris atque abdominis superficie  
 adolescentis hujus , vix decem variolæ conspici-  
 fuerint ; sed inus delinquebat hostis , glandulas  
 plures , quæ dum naturaliter se habent , vix in  
 conspectum produnt , occupans , easque primum  
 infirmum , intrumefaciens , tandemque in gan-  
 gram & sphacelum lethalem converrens. De-  
 bellatus hic hostis fuit generosissimæ alexiphar-  
 macis atque diaphoreticis , sed successu minus o-  
 perato , adeo enim profunde infixæ fuerunt spicalæ  
 venæ , ut inter tenaces obstructionum inde in  
 tubulis ex glandulis enatarum radices , & vim  
 potentissimorum quoque remediatorum nulla am-

plius existeret proportio, sed paulatim humorum  
circulatorius motus inhiberi, machinamque destrui  
deberet. Inflammatio autem ilei intellectui, ut-  
rum soli variolaram veneno adscribi possit, val-  
de dubio, quin dolor ille Epigastrii, de quo Æ-  
gellus, postmodum exhibuit ab Agytâ purgantis ja-  
lapini, statim conserui caput, & ad motum us-  
que perterrit, magnam mihi suspicionem movet,  
particulas quasdam corrosivas resinolâ illius reme-  
dii non tantum fibrillis ilei infixas, sed & plures  
aliâs sanguinis lactici communicatas fuisse, quæ  
postmodum impedimentum quoddam attulerint,  
quo minus Variolæ bene per omne corpus erum-  
pere, & ætiores particule ad externam super-  
ficiem expelli poterint. Usque adeo Medicus  
Practicus sibi caveret à prescriptione ejusmodi  
fortiorum purgantium, ubi vel variolæ, vel  
malignæ febres meruende sunt in subiecto.  
*D. Theodori Zwingeri Ephemerid. Germanic. Dec.  
ij. Ann. etc.*

## APPENDIX.

*De veneni variolici vi in pervertenda ac immutanda sanguinis & humorum  
crassi.*

**M** *Artha* Meade ancilla nobilissimi Domini *Baroni de Coventry* duodeviginti annos nata, die 24. Januarij 1691. derepente Cephalalgia & Lumbagine immani cortipiebatur, cum autem sese non calore, sed potius algore sensisset persusam, rara hanc affectionem esse Nephriticam, ubique in domo obambularat, totâ nocte sequenti, gelu jam admodum sè-  
viente, Conseruo suo zgotanti ministrans evigilavit, cum potius in lecto somno indul-  
gendum erat. Unde spiritus frigore & vigiliis pænè extincti minùs pares ceitâmini cum  
Veneno incundo reddebantur, Proximo die, cum jam ego morbum Variolosum pronun-  
tiarâ, in curru, cautela maxima adhibita, in domum Amicæ suæ (ut perecupiebar) secun-  
do Morbi die deducebatur. Die morbi tertio, mensis nimirum 27. Pharmacopola accer-  
sit, post Bolum nescio quem præcedenti nocte exhibitum, nulla efflorescentiâ in Cute sè-  
se prodente, audacter è Venâ Cubiti *Æxiv.* vel *xvj* sanguinis eduxit, qui cum imperu ex-  
silebat, atque nullatenus, Rheumatici sanguinis ad instar, conrescebat, fibris penitus pri-  
vatus. Die Morbi quarto mane ego accersitus animadverti universam Cutem efflorescen-  
tia continua & plana, inenſe rubra, non scarlatina verum quasi levi & plano *Erysipelate* per-  
fusam, maculis rubris minoribus, & nigris maioribus ubique per totum pectus sparsis. Uri-  
nam insuper *Ægra* reddidit copiosè & frequenter atque sinceri sanguinis ad instar intensè  
rubram. Dormiebat quidem quadantenus, verùm oppressa & languida, atque pulsu tre-  
mulo & inordinato laborans, sese plurimum atque pænè perpetuò iactabat. Prognostico  
igitur funesto prius prolato, *Timetur. Ros. succ. 2q. Cinam. hard. & Spirit. Sulph. extract. atque*  
*Saccharo albiss. edulcorat. præscripti pro potu ordinario, atque chartulam unam Pulveris se-*  
*queris cum haustu Julspij quarra quasque hora exhibendam jussi, ʒ℥. Pulv. Bézard. Magistr.*  
*Spec. Confect. de Hyacinth. ʒ℥ ʒ℥. Coral. rub. ppt. ʒij. Pulv. Serpenter. Virgin ʒ℥. M. pro v. Chartu-*  
*lis. ʒ℥. Aqu. Cinam. hard. Stephan. Germin. Querc. Ceras. nigr. ʒ℥ ʒijij. Acet. Stillat. ʒv. Symp. Myr-*  
*sil ʒ℥℥. M. F. lulp.* Sub finem autem quinti Morbi diei sanguine confertim è Bronchiis ex-  
sillente suffocata perit, labiis & manibus (uti in Confluentibus Variolis plerumquè contin-  
git) quadantenus ab inani Naturæ nisu tumefactis. Cadavere inspecto Cutim deprehen-  
di (visu horrendum) ubique planè nigricantem, proximo autem die colore cæruleo imbu-  
tam, qualem colorem etiam omnia linteâ sanguine conspurcata Aquæ Saponaceæ primùm  
immersâ planè exhibebant, ac si fuissent arte tincta, quæ labes haud facillè delebatur.

Clariss. Ricardus Morton de Febribus inflammatoriis  
& in specie de Variolis Hiflor. 39.



## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBER QVARTVS

## SECTIO II.

## De Tumoribus præter naturam.

## OBSERVATIO I.

**Tumor in Capite**, propriam cerebri substantiam continens, ab eversa utraque cranii tabula. 1. Tumor prope muscolum temporalem, à materia è cerebro per foramen in cranio egesta. 2. Natta in scincipio, vas sanguiferum ex cranio accipiens. 3. Nattæ varia materia. 4. Tumores capitû Lympham variâ consistentia continens. 6.

§. I. **G**ALENUS lib. de Tumor. contr. nat. ait phlegmone sæpe tentari ossa, quod verum nobis compertum: & id ipsum affirmante Hippocr. 2. 2. Epid. Nec solum inflammationi obnoxia sunt, sed & cariei & putredini, præsertim in Luc venera affectis & Elephantis, quorum cutis & caro sæpe exterius sana apparet quibusdam in locis, cui subjacent ossa cariosa, foraminulenta, corrupta, imo sæpius cum deperditione plurimæ eorum substantiæ: Quod non nisi veneni participem materiam agnoscat, facultatis inexplicabilis: Fidem faciet historia sequens. Quæstor Viduz Illustr. militis Præfecti, nomine du Frisny, Sylvanectinus accersendum me curavit ob tumorem quem in capite gestabat, inter os occipitale & parietale, ovam gallinaceum magnitudine æquantem, Dubius an aperiendus esset, pus subesse ratus: Aderant Medici duo: totidemque Chirurgi, artis periti, quibuscum ea de re consultatio habita: Perspecta Tumoris specie, ejusque incremento, non repentino sed lento, adnotataque in eo pulsatione (quæ erat ipsius cerebri) quam à substrata arteria pendere existimabam (compressio enim manu tumore, subsidebat is & imminebatur) cerè credidi adesse aneurysma, negavique aperiendum Tumorem hæmorrhagiæ, hinc subsequatur mortis metu: Medicorum vero alter, è Chirurgis item unus, periculi expertem esse apertionem asserchant, purique concluso exitum concedendum: Ad licem inter nûmero pares dirimendam censi advoeandum Dom. Fabrum Regis Medicum ordinarium, ejus esset de apertione faciendâ aut secus, determinare: qui illico consensus ceteris, adesse pus, quod nullo periculi metu vacuandum esset. A me tamen munitus de aneurysmatis suspitione, ob signa assidentia, mutata sententia, non attingendum esse tumorem pronuntiavit, ac cum eo non secus ac cum aneurysmate transigendum, quæ mea fuerat opinio: Re deliberata Lutetiam reversus sum, at æger triduo post è pago Sylvanecto proximo Chirurgum accersendum jussit, qui statim, nec hæsitabundus, pure refertum Tumorem dixit, periculi quo expertem esse apertionem: quæ ab eo instituta est, procedente non pure, sed propria cerebri substantia, quam biduo post mors excepit.

Defuncti caput apertum fuit per Adamum Hannequin, & Hamardum Cheronium, Barbiton-  
sores & Chirurgos Sylvanectinos, qui unanimi consensu asseruerunt Tumorem ex propria  
cerebri substantia constatum esse, ac deperditione utriusque cranii laminæ ad magnitudinem  
Nobilis fossari. Cautus ergo sit Chirurgus in aperiendis ejusmodi Tumoribus. Ambt. Pareus  
Oper. lib. xij. cap. xxxij.

**P**hlegmone sæpe tentari, &c.] Inflammationis cum  
hæc vis causam ex percipere quilibet circulationis  
nisi sanguinis gratus non erit, quàm ex Clariss. Ana-  
tomici Librandi de Diemerbroeck Anatom. libro se-  
cundo, capite octavo, huc transferre æquum est.  
Ulus Pulsus est, Sanguinem in corde dilatatum  
per arterias ad omnes corporis partes propellere, ut  
eo omnes nutriantur, & singula aliquam ejus par-  
tem propriis facultate coquant, immotent, æque in  
substantiam sibi similem convertant, eamque appo-  
nunt, residuum verò per venas ad cor remittant, ut in  
eo iterum dilaretur, spiritalisq. novamque vigorem  
resumat.  
Cum autem continua Pulsus reciprocatione san-  
guinis assiduus fiat è corde expulsio, necessum est ut  
cor è cava assiduo hauriat quod deplendis denovo  
ventriculis sufficere queat: Verum quandoquidem  
cava nunquam exhauriuntur, & præterea arteriæ, in  
quas continua expulsio fit, præter motum non im-  
mescunt, necessario sequitur motum hunc circulari-  
ter procedere, & sanguinem ex corde continue pro-  
pelli in arterias, ex his in venas & partes nutriendas,  
inde

inde à venis minoribus redire ad cavam, & sic tandem ad cor: Hanc circulationem imprimis confirmantes efficacissimæ rationes.

1. *Sanguis in corde in arteriis propulsi copia:* quæ tanta est, ut ejus ne centesima quidem pars ab assumptis alimentis subministrari possit, cum illa propulsio æque procedat in homine qui per biduum triduumve jejunavit, atque in alio qui bene pastus est: ac proinde nisi sanguis ex arteriis per venas reflueret ad cor, brevi in corde deficeret materia propellenda: præterea disfrangerentur etiam omnes arteriæ brevissimo tempore, & partes, in quas insluit, mirum in modum intumescentes: Quippe Cor hominis sani, florentis ætatis, una hora ter mille, vel paulo plures pulsus facit: *Cardanus 4000. Bartholinus 4400. Relsinkius* in seip. q. numeravit 4420. Si singulis pulsibus in aortam propelleretur sanguinis dumtaxat scrupulus unus (minimum pondus homino, nam drachmas duas, imo plus expelli, in vivorum canum sectionibus docerantopsia) Præterea si in venæ sectione homini in brachio facta, quantitatem sanguinis certissime profluentis consideremus, ac simul perpendamus quantum interim per myriadas aliarum venarum, quibus per nullam ligaturam circulationis impeditur, eodem tempore circumferatur, quod univertum cor transit, facile animadvertemus in homine singulis pulsibus non paucas guttulas non unam vel duas drachmas, sed multo plus, forte semi unciam, vel unciam rotam transire, quod ipsum melius adhuc apparet in arteriotomia, in qua, si quod ex parva arteriola secta singulis pulsibus in sinistro cordis ventriculo in arteriam propelli, quantum ex singulis & omnibus arteriis propelleretur si apertæ essent, facta computatione una hora per cor transirent sanguinis libris mercatorie circiter octo, ergo spatium quatuor horarum transirent ultra xxx. libras, atque verosimile vix est tantum sanguinis in toto hominis corpore contineri: Cum autem à tanta copia neque arteriæ præter modum distendantur, neque partes illæ intumescant, neque etiam cava alique venæ inaniantur, certum est sanguinem in arteriis impulsam per venas reflueret ad cor.

2. *Situs valvularum in venis*, qui talis est ut sanguis per eas libere possit profluere ad cavam, nihil vero à cava ad minores venas, imo si fistula Cavam infles, nihil illius flatus minores venas ingrederetur; Si contra minores venas infles, mox flatus progredietur ad majores & sic ad Cavam.

3. *Ligatura in vena sectione*, hæc quippe in brachio & cute in jicitur supra locum secundum, atque inde subrus intumescit vena, quia sanguis per arterias versus extremas partes impulsus, per venas redit & sursum ascendit, cumque ad ligaturam pervenit, sistitur, unde tunc vena intumescit infra ligaturam, & sanguis ulterius ascendere nequens, cogitur per infistum vulnusculum effluere: soluta ligatura iterum definit ejus effluxio, quia tunc sanguis per rubulum sumum satis parulum facilius potest ascendere, quam per angustum vulnusculum egredi: (Si sanguis è singulari sit mittendus, vena supra ligaturam tumet, ibique tunditur: sic enim è sinibus cerebri per singulares in axillares, hinc in cavam corde superiorem viam afficiat) Ad hæc si ligatura illa tam stricta injiciatur, ut sanguis per ipsas arterias versus inferiora permeare nequeat (quæ alioqui profundius sit à medio cruri ligatura non facile occluduntur) tunc etiam nihil effluit ex incisa vena, quia sanguis per arterias non impellitur versus inferiora, qui per venas ad superiora ascendere possit, rursus vero soluta nonnulla illa ligatura arcta, & arteriæ pulsus liberius penetrante, mox iterum ex incisa vena effluit sanguis: Præterea etiam quilibet venarum & arteriarum in

vivis animalibus ligatura vel compressio, ostendit sanguinem per arterias propelli à corde, per venas vero profluere ad cor: nam supra ligaturam, scilicet versus cor, intumescunt ligatæ arteriæ, ob denegatum sanguini transitum: detumescunt autem venæ, ob liberum sanguinis ad cor effluxum: Contrarium contingit infra ligaturam.

Hæc tres rationes solæ satis efficaces sunt ad dictæ circulationis probationem. Alias vide apud Harveyum, Riolanum, &c. Unum adjiciam de modo circulationis, de quo duæ sunt sententiæ, una Riolani, quam pauciores sequuntur; altera communis, quam maxima Philosophorum pars amplectitur, statuitque Circulationem sanguinis fieri per anastomoses quarumcumque arteriarum & venarum, quibus oscula arteriarum cum venarum osculis uniantur, & in semutuo patent, ita ut ubicunque sunt tales Anastomoses, ibi fiat circulario: Inde ego concludo, ubi Anastomoses ille non sunt, ibi circulario non fit: Hanc sententiam defendere admodum difficile foret, quippe Anastomoses illæ in majoribus vasculis paucæ sunt, & licet forte in minorum vasculorum exitibus finibus copiosiores esse possint (quod nihilominus per autopsiam ubique non patet) tamen propter summam talium venarum angustiam paucissimum sanguinis per eas transire, imo ne sexta quidem vel decima pars, quæ per arterias propellitur, venas subire possit: Præterea, quo modo quæso à sanguine per illas Anastomoses transiente nutriendæ partes, quibus in transitu isto nihil conceditur vel tribuitur? Denique posito circulationem solummodo fieri per dictas Anastomoses, quomodo tunc in Anasarca (in qua serum non solum vasculis concluditur, sed partium substantiæ necessario inhaeret, totam enim copiam in solis vasculis cumulari nemo sanus dixerit) circulario illa procedet è partium substantia in venas? an ferum illud, quod in isto morbo crudius ac crassius est, per exhalationem ex arteriis egressum, rursus per inhalationem ingrederetur in venas ut per cor circuletur, & inde ad vias utinarias defluat, per easque expellatur, sicut morbum hunc per copiosum urinae fluxum nonnunquam solvi praxis & Medicorum observationes docent? Quomodo etiam maghi partium molles tumores sæpe brevi tempore subsidunt, sine ulla manifesta vacatione, si humores extra vasa in ipsa partium substantia contenti non redeant in venas? & quomodo eas cum arteriis ad fines suos unitas ingredi poterunt? At qui hæc satis superque communis sententiæ errorem demonstrant.

Ex dictis bene perpensis verus Circulationis modus statim innotescit, patetque sanguinem non tantum circulari per dictas Anastomoses, verum etiam per ipsam partium substantiam: Impellitur enim per arterias copiosus sanguis, cujus bona quantitas per minimarum arteriolarum fines effluit in poros substantiæ partium, ejusque ad nutritionem tantum apponitur cuicque parti, quantum necesse vel apponi vel assimilari aptum est: reliquum vero ulterius procedit, & hiantia minimarum venarum partium inhaerentium oscula subit, atque sic ulterius progreditur ad majores venas. (Sanguinem in partium poros influere, per eosque in venas redire, liquet ex iis quæ diximus de hepate lib. 1. cap. 13. & de cerebro lib. 3. cap. 5. & 11. & ex quocunque levissima cutis lésione, è qua vasculis illis ubique mox sanguis exit) Verum quia minimæ arteriolæ in partium substantia aperte desinunt, angustissime sunt, hinc quidem multo plus sanguinis transmittunt quam ad nutritionem opus est, sed interim non minor sanguinis copia superest, quæ per eas in poros substantiæ effundi nequit: hæc ut in arteriis non restagnaret &

corrumpetur, aut partibus molesta esset, Protoplastes ante dictas Anastomoses, ut illa redundantiæ per eas transiret in venas, concessit: qualem insignem anastomosen annotavimus ad ingressum Lienis, item duas alias in fœtu existentes, unam (scil. in ejus corde per foramen ovale, alteram in arteria pulmonari, quæ pariter cum aorta conjungitur: Præter quæ magnas, etiam verosimile est plurimas parvas & minimas anastomoses dari.

Non est quod à sanguine extra arterias in substantiam partium effuso, metuatur Tumores, inflammationes, putredines, apostemata, &c. nam propter arteriolarum in substantia desinendum angustiam, non plus insinuat quam per poros commode transire, & à venarum osculis rursus imbibiri potest: Atque, dicar aliquis, in valida corporis exercitatione & calefactione sanguis multo validius & majore copia impellitur quam aliis temporibus, ergo tunc (saltem nimia copia influet in partium substantiam & dicta mala producit: Respondeo tunc sanguinem ratione majoris caloris esse tenuiorem, & poros quoque latiores, ut facilius transire possit: Verum si pori, vel à contusione, vel à subita refrigeratione aliave causa angustiores evaderent, aut sanguis in partibus crassior fieret quam ut venarum angusta orificia subire posset, tunc brevi tempore nimia ejus copia (nam influxus per arterias contrariè procedit) in partium substantia cumlaretur, atque dicta mala statim generarentur: *Hæc enim est vera & frequentissima causa pleuritidis, peripneumoniz, angina, phlegmones omniumque inflammationum cum tumore.* Quam causam non perceperunt illi qui per solas valorum anastomoses circulationem fieri arbitrantur: docent enim ob denegatum commodum sanguinis transitum, vasa quidem ad summum repleri, hincque partes à repletis vasis in tumorem distendi (quasi vero vasa ita distendi queant ut inducere possint duorum triumve digitorum altitudinis tumores, quales sæpe conspiciuntur) sed quia in repleta vasa plus sanguinis impelli nequit, hinc sanguinem in iis coactatam novo arteriosi sanguinis affluxu destitui, sicque refrigerari, non vero inflammari: verum non considerant sanguinem totum per venarum anastomoses non transire, sed majorem ejus quantitatem in poros substantiæ partium impelli: è quibus si non satis cito redundans quantitas in venas profluat, ob causas supra dictas,

tunc necessario fieri partium tumorem, & quia singula affluentes guttulæ arteriosi sanguinis seorsum conferunt calorem, hinc à sanguinis in parte nimio augmento fieri nimium augmentum caloris, & ab hoc intenso calore fieri sanguinis cumulationem, effervescentiam, partisque Inflammationem cum tumore: Inficiæ tamen non evadunt, illam effervescentiam interdum etiam fieri posse à paucis, sed acris, & ad effervescentiam prono sanguine, in aliquam partem effuso, tuncque fieri inflammationem sine insigni tumore, ut in Erysipellate.

Hujus Circulationis sanguinis (intelligo sanguinem cum aliis quibuscvis et admixtis humoribus) multiplex & summa est necessitas atque utilitas: 1. Per eam quælibet sanguinis particula partem & ordine quodam apte hinc ad nutritionem; nam cum in corde non fiat longa coctio, sed tantum celeris quædam dilatio, propterea chylus primo transit per cor non acquirit summam sanguinis perfectionem, sed pluribus transitis modo hæc, modo illæ particule subtiliores, & corpori alendo magis apte evadunt.

ij. Cum sanguis in partes propulsus, quo longius à caloris sui foco recedit, eo magis refrigeretur, & ad alendum minus aptus evadat, omnino necessarius est ejus reditus ad caloris fontem cor, ut in eode novo incalcescat & attenuetur, sicque novam perfectionem induat, qui reditus per hanc circulationem procuratur.

iii. Sine hac circulatione, neque sanguis ad partes alendas propelli, neque à nutritione residuus via cum chylo ad cor referri posset.

iv. Hujus beneficio medicamentorum assumptum & applicatorum vires per totum corpus, aut magnam ejus partem feruntur.

v. Per hunc sanguis in continuo motu permanet, atque sic à congelatione & putredine preservatur.

vj. Per hunc cognitionem, causæ multorum morborum clarissime innoscunt, de quibus antehac aut nihil, aut obscure scriptum, & graviter inter medicos altercatum ac dubitatum fuit.

vij. Per eandem etiam Medici certas plurimorum morborum curationes instituire noverant, de quibus aliqui magna ex parte per incertas conjecturas indicare consueverunt.

§. 2. Puerulo trienni (*De quo lib. i. Tit. de ocul. affectibus*) duabus ante mortem septimanis exortus est Tumor prope musculum temporalem sinistram; quem, ab obitu, ablata cute vidimus peculiari, eaque crassa satis membrana obductum intra cutem craniumque hætere; cranium exiguum habebat foraminulum per quod materiam ejecerat natura.

§. 3. I. Eberlin Vir robustus, 30. annorum, qui ex scala præceps paulo post Apoplecticus interijt, in syncope dextro habebat tumorem cum folliculo, quos Nattas vocant, olivarem, nucæ juglande minorem, qui vas sanguiferum ex poro cranij emergens recipiebat.

**N**Arta, Tumoris cum folliculo species, non infrequenter caput occupat: omnes arteria quadam, à qua nutrimentum & augmentum capiunt, præditæ sunt: Succinguntur intus peculiari tunica: Contenta non unius generis sunt: In quibusdam inveti substantiis pinguem flammam concipientem: in plurimis cretaceam solam vel sero perfusam: Familia hæc est inter primarias hujus generis tumores obnoxia: Si basis angusta sit, sera equina sensum magis magisque contracta decidunt, quod aliquoties à me factitarum fuit, si verò basis amplior ac constrictionem respuat, in summitate vultus oblongum insigo, contenta exprimo, & basi, ubi, cen per pediculum, nutrimentum sulci-

pit, inde cum pauillo gossypii buryrum antimonij solum, vel cum limento digestivo permixtum, ut scaruriginem obturem: nisi enim pediculus abscindatur aut erodatur, brevi repullulat: Tumores hujusmodi à Chirurgis temerariis & imperitis uno ictu amputatos novi, largissima subsequente hæmorrhagia, quæ vix sisti poterat, non sine vitium prostratione, Antimonij buryrum nullos dolores, hulum prurum excitat, nisi imprudenter labia cutis capillatæ attingantur, interna enim pellicula sensus expers est: Natta apud Istum, vas sanguiferum è cranio emergens accepit, quod præcandebat furculis arteriosis à dura meningē ortus fuit: *Uterq. Hist. Apople. 10. p. 321.*

§. 4. Homo procerus, sanguineus, habitu corporis robusto, ob facta strangulatus, Natum gerebat in aspite: In hac denso involuero aperto latebat farinacea materia: In alijs Natis ex se ruptis purulentam observavi. *Th. Bartholinus Cent. 1. hiflor. 32. §. 33.*

**F**arinacea materia ] Natta, Testudo, Talpa ad melicerides, atheromata & steatomata referuntur, quorum materia peculiari tunica aut folliculo clauditur. Plasteris non ab humoribus excrementitijs horum Tumorum generationem deducit (eo quod quæ ejusmodi originem nata sunt, stabilia sunt, sed putredini opportuna) sed ex succo alimentari parti nutriendæ destinato, quasi jussu crassior, in similes tumores degenerat, ex quibus Sarcomata fiunt: sin ædmodum crassus, Scirrh: Tumore vero non adeo duro existente, tandem in abscessum transire docet, diversam materiam continentem pro succo, qui Tumorem genuit, diversitate ac cum alijs humoribus mixture: nec tamen sicuti abscessus à sanguine genitos in pus abire, sed in alium sub-

stantiam propria cysti conclusam: Hinc Melicerides, dum Atheromatum, Steatomatum originem deducit: *Sennertus*, cur talis humor è partibus effluat, atque inde sub cute tumor exciretur, causam esse putat quod membrana unamquamque partem vestiens & ambieas jam vi externa & violenta, sed interna, rum-pitur, aut eroditur & exulceratur, ut ita iacta via vi, succus alibilis ablato erumpat, cum non sistatur aperte: Id tamen ne temere fiat Natura provida non permittit, sed ipsam membranam amplius extendit, effluentemque succum cohibere nititur, quod in arboribus fieri videmus, in quibus exteriori cortice lëso simili plane modo nodus forte matur.

§. 5. vi. Aprilis 1671. In infante 13. septimanarum, caput multis modis deforme reddebant Tumores varij, Tres imprimis, quorum unus superiora versus se extendebat, alter inferiora magis respiciebat, Tertius anteriora petebat: Diversæ naturæ dissecti observabantur. Primus enim, qui superior & maximus, aliqua parte cartilaginis substantiæ erat, alia membranosa: illa cavernulis plurimis prædita, utraque liquore purulento, plumbei coloris, repleta; Secundus, qui inferior, vesiculam representabat, hydatidibus varijs donatam. Continebant hæc, figura & magnitudine differentes, Lympham modo liquidam, modo viscidiorē: quod vero ab hydatidibus liberum, limpidissimam exhibebat aquam: Tertius, qui anterior, variz conditionis substantia constabat, molli imprimis spongiosaque, ejus siquidem exteriora spectentur: duriore vero cavernosaque, si interiora cranio vicina: Lymphæ crassioris insignis hic occurrebat quantitas: Præter dicta notabile hic, i. intra meningem tenuem & cerebrum Lymphæ pellucidæ tenacisque insignem contentam fuisse copiam: ii. Eo loco quo auricula naturaliter situm obtinet, & excrescentiam ossæam, semicircularem & sinum notabilem se exhibuisse, nullum vero ad anteriora auris transitum: iii. Circa tempora vas aliquod occurrisset materia nigricante repletum: iv. Tumorum horum primum aliquot diebus antequam dissecaretur cadaver, apertum subito fuisse; naturæ imprimis opera, magnamque Lymphæ copiam effluxisse, hæc affuso aceto præcipitationis ope coagulum exhibuit coloris lactei; evaporatione vero leni gelatinosam, at flavescenstem magis materiam: Quæ res speculationi illi ansam præbuit, Annon in Lympha ipsa nutritionis nostræ fundamentum constitui jure queat, Quod valde probabile videtur, & præter alia etiam *Pueri hujus summa Extabescencia* valde suadet. *Gerardus Blasius Observat. med. 1.*

§. 6. Juvencula xvj. mense feliciter peperit scetum sed debilem: Caput nucem juglandem vix superabat, Tumor vero capiti superna parte adnatus erat, universo capite major: Mortuo infante Caput apertum, atque in ipso cranio inventa exigua cerebri portio, quam pro cerebello habuit Chirurgus, in Tumore vero substantiam cerebro valde similem *Th. Bartholinus Cent. 3. hiflor. 51.*

## OBSERVATIO II.

*Tumori, seu Sarcomati oculo dextro subnato, resecto, aliud sub oculo sinistro successit, Ex fungosa & pituitosa substantia constans utrumque, atque à dura meningorum ducens.*

**P**uella quinque annos nata concrementum carneum Oculo dextro subnatum habuit, pugnæ contractum æquans, à plerisque Chirurgis pro Carcinomate curatum: Hæc meis manibus commissa tractanda, nulla propemodum habita medicamentorum fiducia, Sarcoma resecui simul & inuissi, quod brevi coalitum est: 70. vero aut 80. à resecto die, Tumor sublividus, inæqualis, inæquis, indolens, tactui nonnihil cedens, multis undique circum venulis septus, sub oculi sinistri palpebra subnatus est, qui paulatim adauctus, jam totum sinistri lateris, tempus, & auriculam, necnon eervicem late occupabat, quin & genam, adeo ut os obstrinxerit ad capiendam escam angustissime: Eodem ipso tempore ex adversa parte simillimus hujus tum figura tum colore, tum etiam progressus morè modoque operis eervicem humeris exæquasset, quod vitij complementum duorum cum semipie mensium curriculo peractum est: Illud autem silentio non obducendum est, quantumvis tubera naturæ modos excederent, eam tamen puellæ patientiam fuisse ut nunquam fuerit de morbo conquesta vel vagitibus molesta: Tandem pridie Cal. Novembr. obiit.

Tubera hæc infecta *Fungosam* & pituitosam, suo folliculo contentam *substantiam* nobis aperuerunt. Ad hæc & aliud relatu dignum offensum est, Cranium tractantibus nobis, mirum farramea è rimis calvariae per amplum, à durâ meningē ad tubercula ista perens, per quod scilicet materia de cerebro ad tumores alendos transmitti fuerat consueta: Postremo dictū mirum ad hæc cuncta erit, pedes utrosque puellæ negatos diremptosque primordio, alimento scilicet amplo à superioribus ad se raptos; *Nicol. Larcheus Med. Romanus ad M. Aur. Severinum in lib. de Abscessibus p. m. 150.*

**F**ungosam substantiam etc.] Cojos origo fuit à meoingum cerebri occulto vitio: Iode eodem fungi plerumque pullulant, quamquam & aliis in partibus subiacenti notat *Severinus Epist. ad Febrinium Hild. Cent. 1. Observ. 36.* Quod vero pedes utrosque puellæ defuisse narrat *Larcheus*, alimentumque ad superiora raptum dicit, *Glossonij, Warrhoni* & aliorum sententiam firmare videtur, succum nutritium suppe-

ditare cerebrum quibusdam partibus, qui ad crura hoo transmissi, & in capite redundans, exuberantiam illam produxerit: Ceterum Tumorum ejusmodi cysti conclusorum, ea est iodole, ut si dum refectur, eoque magis si ad canceri naturam accedant, qui raro aliqua in parte demitur, quio in alia iterum geminet.

## OBSERVATIO XV.

*Monstruosus Menti Tumor, Steatomacicus, cui ulcus cavum & profundum adjunctum.*

**M**Entum eandem seni mulieri Bivatæ adeo excrevit, ut mediam ulnam Augustanam in longitudine & latitudine etiam adæquaret, duritie Scirrhum repræsentaret: Pars dextra Gingivarum lætevit: & ex ore ad pugni, vel ovi anserini magnitudinem excrevit: Qui Tumor ulcus cavum ac profundum habuit, ad medij digiti longitudinem, eo in loco ubi dens evulsus fuit: hoc cibus humidus & potus eo appellens formavit: Tumor Menti fuit durus & renitens, concolor & solum dolens ob pondus, at gingivarum laxior: In mento exulceratio nulla, nisi ubi ab adpellente attritum fuit: Excrevit tandem in ingentem molem, & oris introitum quasi totum occupavit: Mors itaque lenta superveniens deloribus eripuit.

Aperto Tumore in cadavere, caro nulla fuit visa, putredo nulla, sed quod excrevit steatomati, seu Natæ Itatorum, simile fuit, Tebum referens, Tota moles resecta à corpore ponderabat libras sex ponderis Augustanorum, & quartam libræ, quod sunt uncie centum. Dissectus Tumor, spongiosum album erat quod accrevit, sebum compactum referens, ut in abdomine & tenebris bovm videre est, sine ulla humiditate: Cavum quod erat, à dente exempto relidum, illud continebat quod expotu & cibo eo declinavit, pattes vero ejus nec erant humidæ, nec putredinem passæ sunt.

**M**onstruosum huic Tumorem cur in humerum, Natæ Itatorum posueram, paucis exponam: Reverti egra sensim admodum Tumorem hunc accrevisse, primordia sumptisse in ore: Cum enim primum senium ingressa, serviret quibusdam Patrij & mercatoribus in coemodis varijs, & majori onere carnis pondus ex macello portaret, sensu aliquid in ore distendi, seu, ac vulgariter pronuntiavit, jumpi, quod ob absentiam doloris plane neglexit: Gingivarum itaque pars dextra luxuriare cepit ac intumorem atroli: huiusmodi & simul mentum, cujus cutis æqualiter in latitudine & longitudine ita ab succrescente distensa fuit, ut intra annum monstruoso tumore exuberaret: Qui putus erat adonodum ut scirrhum mentiretur, eum tractare optui, cum in nervosis locis scirrhus tractatus in cancrofa degenerasse viderim ulcera: Nec Chirurgus maum admoveere voluit, qui negavit se toto cursu praxis, suæ, qui fuit annorum lxiv. talem tumorem confexisti: magna vero hæc moles, & monstruosus Tumor mentis, nullam læsit facultatem, quamvis extruberans ex ore gingiva cibi introitum prepediret: Dolor oculus nisi à ponderis erectione & duricie ubi tangeres, sola caro gingivarum luxurians mollis erat, tumeo ob distensam cutem vasorum divaricatorum oculis exposita erat: Ito exulcerata luxurie gingivæ sator ex assumptis.

Peccectios l. c. 28. Narrat ex genere Tumorum steatomacicorum esse scribit, oriturque in omnibus corporis partibus, eandemque cum illis agnoscere causam: Scratoma vero, Tumorem esse exprimentem saniem sevo similem, ob pituitosum humorem sensim

lenteque auctum, coadunatum & induratum, seu in substantiam sevo similem coactum: idem c. 25. Ethane Narrat in nostra egra fuisse steatomacicum tumorem ex Pauli descriptioe l. 6. affirmare possumus, quia ejus contentum sevo simile fuit, Tumor ipse durior, ac ad tactum renitens, fundum solidiorem habens, maxime ubi adhæsit incurvationi maxillæ: Aetius Tractab. 4. l. c. 8. Steatoma ait esse Tumorem adipem in se continentem, molem tuberum, concolorem & ad tactum lenem, in principio quidem pusillum sed temporis progressu ampliari: A melicetide & atheromate discerni tactus mollitie, quod videtur cum mente Pauli pugnare, qui ait dignosci steatoma à reliquis abscessibus, quod durior sit illis & ad tactum renitens: Sed Aetius mollitiam hanc respectu Strumæ potius intelligit quam atheromatosis & melicetidis: In causa canores Chiturgi consentiunt, quod ab humore pituitoso prodeat: Mihi videtur Platerus noster proprius accedere & veram causam assignare Tract. 3. e. 3. Ubi situm nutritientem crassiores horum abscessuum causam ponit, peccantem vel qualitate vel quantitate: Illi enim ejus symmetria ad alendas partes ad prime conveniens est, sic ejus ameti earum substantiam depravat: Natura ad pulsuum si quidem soccum cum diluere nequit, quia aut uberius aut corruptus, maturo aggregatur, in sano corpore adpositione decenti, in ægro in decenti: Humor itaque alibilis, seu nutritientum hoc ad pulsuum, vel adhæret, vel adnascitur, vel innascitur parti, quare ipsa incrementum sumit, non dissimile sibi ipsi colore, cum ille qui apponitur soccus sit familiaris, & similis parti cui apponitur,

ter, & quasi alimentum, sepius sola copia luxurians, afferens secum molliem aut duriciem; succus si quidem hic est alimentum tertii conditionis soboles, cujus peccatum nullum aliud quam quod crassius est, aut tenuius, aut copiosius: Nostra ætate ideo album erat, & crassius ac durum, quod alimentum hoc futurum luxuriabat circa nervos & osseas partes, illarumque futurum alimentum erat, unde & membranz ex eo generate sunt, quibus humor inclusus cohererebatur scirrhum non abiit, quia calor coquens harum partium fuit in alimentum, ut sic loquar, adpositus non induratus, qualis ad scirrhī perfectionem requiritur: quare ex adpulso quotidie alimento in molem

excrevit pars: & quia succus similis fuit, qui sensim, non ad ægros in illum locum fluxit, indolens mansit. Recte porro hos non manum adhibuisse docemur illo Peccotij L. c. 18. Natta, quæ vas est implicata; nullo, passio attingi debet propter periculum quod sanguinis hæmorrhagiæ inest. Memini me in Italia in quodam ordinis S. Francisci in collo Nattam eximi vidisse, quam magna hæmorrhagiæ, hinc mors excepit. Nos non hujus causa, sed quia à nervosis partibus non pendula fuit, sed ita firmiter adhæsit ut ipsam mentum videretur: Spasmodum itaque & calumniam declinare decrevimus. *Hæstetterm casu vij Decembris.*

## OBSERVATIO IV.

*Tumor Collo adnatus, cum brachii intumescencia, à copiosa pinguedine & sero inter musculos. 1. Tumor affixus asperæ arteriæ per totum collam radicibus diffusus. 2. Tumor circa laryngem à Ductu salivari devio. 3. Infra mentum durus, ab obitu evanescens. 4.*

§. 1. **V**BI sanguis sulphuris sui & salis legitima proportione orbat, facilis est putredo; aut vermibus apta corruptio, & succorum benignorum degeneratio, quæ sæpe in generationem copiosæ pinguedinis, sive lardum, sive aliud quid mentiat, facessere potest. Conspicissimum id erat 1670. in Nosodochio Argentinenſi, ubi exenteravimus puerum, cujus collo, supra axillam sinistram, ingens Tumor accreverat, cujus, separato bino involuero, cutaneo, & proprio, substantia steatoma verum erat, pondus librarum v. civilium: Brachium ejusdem lateris admodum cum manu totum æqualiter intumuit; dissectum copiosissimam infra cutem exhibuit pinguedinem, effluente copiosissima aqua ex musculorum interstitiis: Omne vero reliquum corpus macies exederat: aſcites abdomen. *Joh. Val. Villum in Altis med. Thom. Bartholini anno 74. & 75. & 76. p. 134.*

§. 2. Viduz N. succrevit paulatim Tumor insidens firmiter lateri asperæ arteriæ: Ad instar carcinomatis repertus est, radicibus diffusus per quæcunque colli partem *Lib. 3. tit. de Deglutitione laſa.*

§. 3. Quos Ductus Salivales curiosa D. D. Nic. Stenonis sæculo nostro manifestavit industria, mihi in Vitulo dierum xiv. perſecuranti, quod in eo sese animali clarius quam in homine ostendat, quiddam occurrit quod observasse non pigebit Chirurgos, dum aliquando circa Tumorum expugnandorum contumaciam nequicquam suam ludunt operam: Deslexerat enim Ductus ille (cujus radices Parotis conglomerata, quique ostium suum in buccis repetens, ibi se exonerat) versus laryngem, ibique humoris sui, qui ore excipi solet, exitum non inveniens, Tumorem ingentem excreverat, lenta materia redundantem: Annon hæc Fistularum, ad stuporem perpetuos usque humores suppeditantium ut causa dici, ita ex eadem posset inveniri via eadem facilius perſanandi: *Theodorum Kerkringius Observationum Anatomic. Lxvlij.*

§. 4. Janus N. Phthisicus obiit, (*Videlib. 2. Tit. de Phthiſi.*) Ante semelſtre spatium obortus tumor infra mentum durus, quo impedita fuit solidorum deglutitio &c. In asperæ arteriæ nihil heterogeneum visum, nec ullum istius tumoris vestigium, unde verosimile est à flatibus fuisse excitatum.

## OBSERVATIO V.

*Bronchoceles. Variæ materia. 1. 2. 3. 4. 5. 6.*

§. 1. **G**ONGROA vox ab Hippoc. usurpatur 6. Epid. 3. 14. & Bronchoceles significat: Latinis *Herniam Gutturis*, Tumor est Gutturis & collo ianatus, à Græca voce γύγγος proprie significans eminentiam aut appendicem rotundam arborum truncis innascentem: à *Plinio*, 17. c. 24. dicitur *Fungus*, *Clavus*, *Patella*: *Theophrasto* 1. hist. plant. c. 13. olivæ vitium est à Sole exultæ: Affectus mulieribus familiaris, prout à nobis de aneurysmate dictum: Bronchoceles autem vox generica est, multas sub se complectens species & differentias: Aliquæ enim ad melicerides accedunt, aliæ ad steatomata, aliæ ad atheromata: Aneurysmatis quædam soboles: In quibusdam reperta caro stupida, i. e. dolore carens, vel parvum inducens: Suum unaquæque signum dat, & an curationem admittat vel secus: aliæ parvæ sunt, aliæ magnæ colli anticam partem totam obtegentes; quædam cysti carent, aliæ habent: Quæ curationis capaces sunt aperiri debent cauterio actuali vel potentiali, aut scalpello, atque simul

semel exempto corpore extitit ibi conelaso: Nisi licet, repetitis vicibus auferatur, alioquin postmodum ex arte curato & ad cicatricem deducto. *Parvus operum lib. viij. cap. ix.*

**B**ronchocele est Tumor colli vicinis laryngi, qui originem habet ab humore ibi collecto, vel à glandula thyroideae cartilaginis productione, quae saccoma producit: vel est abscessus ex arthromatate aut stesomate, vel hydrope; Bronchocele, non ut plerisque visum est, ex immodicis clamoribus, aut ex potu aquae ex liquefactis nivibus, quae Alpiniis aliisque montanis in usu est, sed ex crassa lenaque pituita, quae eo sensim è capite, ejusque partibus externis per aures posteriora devolvitur ex *Fernelio*. Dubitare licet an materia contineatur inter musculi latum &

extremum sub musculo lato tota sit abscondita: non ibi collecta materia non potest extrahi, quia spatium musculorum insinuat: Si extra pateat, poterit sanari & cicatrici: A flatu solet incipere, qui distendit separatque cutem à membrana carnosa, vel ipse musculus latus à subjectis partibus separatur: In istud spatium sensim fluit materia, pro cuiusque temperamento & constitutione varia: Sensim accrescit & tumescit non per venas sed, per tubulos quos natura creavit. *Job. Rolandus Enchirid. Anat. lib. 4. cap. 7.*

§. 2. Anno 1626. Bronchocele in opifice Inauratore anteriorem totam colli partem apprehenderat, talis quatuor digitos tumore: qui aneurysma est existimatus à copulibus, propterea quod sub eo, vivente homine perfentiretur pulsatio non exilis: Nihilominus id equidem retuli ad jugulares arterias, quatum ex summet compressione necessarius erat sensus: Reperta est cystis sanguineae prope membranæ, quæ amplo veluti sacco ab externa facie ad usque tracheam arteriam ab ea compressam extendebatur: Intus laminulae veluti sanguinea concreta, & carnes pulmonis atrioris substantiam referentes, universam loci amplitudinem compiebant, nisi quod superne concretus humor flavidior, gelatinam vulgarem propemodum referens, existerat: Disces nunc nostro parergo collarium quod est, Non injuria quidem magistro Inauratori productum istiusmodi vitium, quod genus opificum l. *Langius* judicio miro, subiectum est bronchoceleis viroso argenti vivi contagio. *Idem ibidem p. 169.*

§. 3. At Bronchocele quæ multæ fidæ sunt, glandulas continent prærubras & præduras: Tales enim visæ in puella Parthenopylaei D. Mariz, per nos secta. *Idem ibid.*

\* **I**N colli parte anteriore plures sunt glandulae, quæ Bronchoceles sunt subjectæ. Ex sententia *Stenonis*. Glandulae cribra sunt hoc modo confirmata ut dum ex arteriis in venas per capillaria transit sanguis, liberatè à sanguinearum amplexibus seorsus partes, & aloris vi per convenientes sibi poros expellantur in capillaria lymphaticarum, concurrente nervorum, extremis venis affixorum directione, eliso per sensum perceptionem mentis imperio subiectam. Quomodo appositæ glandularum officium, in seri separatione, seu lymphæ, positum, explicatur. Hinc & Bronchocele, generatio, quæ est glandularum anterioris parti colli incrementum & Tumor: Cum etenim Glandularum munus sit secretorium & excretorium,

& ad has quatuor vasorum genera ferantur, Arteria Vena, Lymphatica & Nervi, si succus vel humor ab illis illius facili tramite non decurrat, sed in glandulis subsistat, ob quampiam angustiam aut suad transmeantibus vitium aut acidi exuperantiam, cui omnis concretio assignatur, hinc Tumorum glandularum ac Bronchoceles causa repetendatur verò in collo potius & frequentius quam in alijs partibus ad tantum incrementum ille perveniat, id contingit vel quod collum aeri pateat, plerumque nudum adeoque concretioni humoris perlagentis occasionem præbeat; vel singulari humoris aut glandularum illius loci proprietati, ab quam certis in locis endemius sit ille effectus.

§. 4. Homo sub Alpinus Bronchocele prævastam multos annos cum angore passus, tandem ab ea strangulatus oppetit: Quam nos vixitæ partem, grumos ingentes sanguinis undique circumfusus, cum à nativis quibusdam carunculis offendimus: Porro sunt mea quidem opinione Bronchocele præterque cum super-vomitu vasorum impenso dilatatorum complexæ. *Idem ibidem par. 172.*

§. 5. A pueritia deturpabat Bronchocele collum *Petronelle Desnos*, anellæ mez, quæ phibica obiit anno 1660. cum hydrope pectoris & abdominis: Invalescens morbo, colli tumor augmentum fovebat, ut ad pectoris angustiam accederet tracheæ arteriæ compressio ab illo tumore, hinc respirandi summa difficultas.

Ea defuncta cadaver aperiri iussi & Bronchocele dissectari, quæ nihil aliud erat quam ingens glandula albescens, pure undique scatens & imbuta, illi omnino similis quod Pulmonem substantia continebat. *Ex observat. propriis.*

§. 6. Bronchocele, teste l. *Langio Epist. lib. 1. 43. Tumor est pendulus circa guttur, à bocij ventrosi poculi similitudine* Inter cutem & asperam arteriam, auctore *Celsio* inerefcit, in quo modo caro pituitosa, modo humor aliquis melli, adipi aut pulci similis membranulae includitur: Pro humoris tum calore tum concretionem, & caloris magnitudine, temporisque spatio alia atque alia formæ, in alijs & diversis abscessibus sunt, nempe duræ, molles, liquidæ, rubræ, flavæ, albae; crassam enim materiam in duriciem temporis processu eogit calor vehemens: quæ si nigra sit carbonis speciem repræsentabit: Mediocre vero calor medioeris in pus mutabit, liquidam digeret: Hæc quidem communi omnium sententia Bronchoceles est materia, Verum ego quæ compererim in resectis compluribus defunctorum Bronchoceleis referam: Anno 1625. *Bronchocele cadaveris, educta struma* libræ unius pondo, quæ sic adstricta gutturis venis, ut mi-

mirum quomodo fuerit avulsa, *Tempora hinc homini pressa*, atque invicem adducta, sicut confirmaret aperte iudicium Physiognomorum nostrorum: qui temporum angustiam naturalem strumarum effectricem ponunt. *M. Aur. Severinus lib. de Abscessibus reconditis p. 168.*

**T**empora hinc homini pressa. ] Ad mali productionem confert prava capitis constructio: Nimirum cum existente magna capitis prominentia portica, deest antica, cum compressu temporum lateribus ascendente; quibus meatibus coarctatis, cum non habeat effluxum humor per transitus, & emissaria anteriora, recurrere cogunt in posteriora, & ad glandulam piruitariam, unde vitium in sinces traducitur deumum: Adhuc est debilitas capitis nervi his praefertim pueris quibus diu manserunt inconfusa futurae, & incommixta commissurae. *Severinus Tracl. de Pedagogone. part. 3.*

## OBSERVATIO VI.

Strumae suffocationem afferentes, ad stomachum, pulmones, mesenterium diffusa. 1. 2. Strumarum insignium collum obsidentium anatome. 3. Strumarum pertinacia pendet a seminario subius delitescente. 4. Magna in colli ambitu, sub axilla sinistra, orta ab internis Pancreatis &c. 5. Struma ingens sub inferiore maxilla, a secore iis infecto pendens. 6. Strumarum Anatome 7. A faucibus ad os usque pubis extorrecula. 8. Struma per totum diffusa 9.

§. 1. **J**uvenis strumis, quae galam asperamque arteriam simul adeo compresserant, ut neque potus vel ipse aer transire posset, intermoritur: Dissecto cadavere, repertae fuerunt in officio stomachi, pulmonibus, omento, mesenterio, pancreate, ipsis intestinis & circa vesicae collum. *Nicolaus Fantanus Respons. & cur. Med. pag. 66.*

§. 2. Juvenis 14. Decembr. 1676. universum collum strumis obsitum habuit Amstelodami, Cuius cadavere aperto mesenterium universum strumis inventum & viscera pectoris repleta: *Henricus Roombusius Observat. Chir. Belgic. par. 2. p. 167.*

**J**unguntur nonnunquam in uno corpore diversis locis scrofulae, sed non credo dependentiam: Strumulos esse sano mesenterio contra *Riolanum* olim defendi: Ex inventis novis lux non parca affulget, quam veteres ignorarunt, Lactem enim thoracis in mesenterio exoritur colli venas ingreditur: An autem immediate chylum suum glandulis colli introdant, du-

bitor: Mediate vero id fieri per circulum non equidem negaverim, sed tum non magis strumae in collo enatae a mesenterio dependent, quam in reliquis partibus quae succo nutriuntur: A jugularibus autem lymphaticis ortum & incrementum scrofularum colli majore specie veri deducit Doct. Jac. Heor. Paulli. *Bartolomaeus.*

§. 3. Testor me in cadaveribus eorum quos strumae in partibus exterioribus coedabant, reperisse plurimos tumores strumulos in mesenterio, alios magnitudine nucis jugladis, alios avelanae, pisum, imo pugni mole aequantes, mater a gypsea vel purulenta repletos. *A. Parvus Operu 1.7. c. 21.*

§. 3. Nobili Austriaco adolescenti, aliquandiu in Galliis versanti coeperunt scrofulae in ambitu colli nasci, nec solum illic, sed & sub axillis glandulae intumescere atque indurari, uti & exiguae in pectore, dorso sub cute se patefacere, augebanturque illae in collo in dies, Et licet Medicorum opera uteretur, nullus tamen inde successus sequebatur: Martio mense anni 1670. cum priora parum profecissent, ad fortiora progressi unguento ex hydragyro cum inunxerunt, unde exputio frequens & copiosa subsequuta, coeperuntque grandiores scrofulae nonnihil detumescere, sed mox iterum cessante spuitione augeri: Emplastrum de *Vigo* fait appositum, additis varijs emollientibus: Tandem majoribus & eminentioribus strumis, cataplasmata, ut si fieri posset suppurarentur, imposita fuerunt: diu haec sed sine fructu usurpata bona interea victus ratione usus, atque Dieta, ut vocant, cum usu decocti Guajaci ad sudores movendos ad multos dies: Cauterium in utroque brachio inustum, assumptis itidem quae defluxiones cavent cerebrum siccando: Cum nulla spes, cum ad thermas sulphureas ablegarunt. Verum huc Basileam veniens mense Julio, meum quoque consilium audire voluit: Cum itaque horrendum illum affectum inspicerem, multasque glandulas durissimas, ab utraque aure ad thoracem usque universum collum occupasse, adeoque implevisse, ut caput veluti collo duplo ampliori insertum appareret, praeter alias glandulas sub axillis satis magnas, atque parvas quasdam sub cute in thorace hinc inde prominentes, exiguas aut nullam curationis spe conspiciens, suasi ut in patriam thermarum illarum sulfurearum, quas Medici Lugdunenles suasent, utendarum causa proficisceretur: verum cum & apud nos in Helvetia viciniae tales haberent thermae, maluit illis eo loco uti: quare eo profectus, & septem septimanarum spatio caes bibisset, denique huc rediit nihil melius se habens, nisi quod juxta dextram aurem tuberculum lividum supra tumorem eruperat, & juxta sinistram protuberantia magna, tumorque durissimus colli anteriora premens deglutationi & respirationi impedimentum magnum afferebat: Misericordia morus, volui adhuc quaedam experiri ex efficacioribus, nam sectionem aut ustionem in tam magna mole, locoque nobiliore, ob colli venas majores suadere neutiquam potui: Adhibui itaque emplastra ex cranio uto, luto fornacum uto, ebore fossili, additis gummatibus multis & melle scyllitico, sulfure trito aliisque efficacioribus, unde videbatur tumor aliquo in loco leviter minui, sed mox iterum incre-



crefcere: Tuberculum quoque illum prope aurem dextram, nucis inflar adauctum, tandem cuticula abrafa fanguinem emittebat, & medullofa materia ex eo prodibat, unde tamen non fubfidebat: dein etiam in medio tumoris enafecebat oblonga caro dura extuberans: quae in canero prodire folet, adeo ut *Srofalus aliquas in Cancrum degeneraffe crediderim*. Hifce peractis, exceperunt pedes admodum tumere, atque difficultate fpirandi & deglutendi maxime angij, donec 20 Octobris fubito, accedente quidam defluxione, fuffocatus fiquae extinctus fuerit.

Sectione facta per longitudinem colli, tribus in locis trium digitorum profunditate, aequam mufculi confpicerentur, latera vulnerum, ficuti porcis in dorfo aperti. Jardum fiffum, album, fic & hic alba fiffa, craffa apparuerunt: in quibus undique toto ductu glandulae nunc paruae, piffi, nunc majores, fabe inflar, fed mutuo fibi coherentes, & totam illam albam, mofofam, undique opplentes, deprehendifuerunt, quas fane remedijs abfumere uti fuiffet impoffibile, ita fectione eas eximere, ob mortis periculum, inconfultum. *F. Platerus. Obferuat. lib. iij. pag. 693.*

**O** Riuntur Strumae ex humore craffo & lento, quem vulgo pituita fumi effe ftatuunt cui interdum etiam melancholicus admifcetur: *Platerus* tamen non fine caufa hic monet non fati rectè vulgo ftatu ex fola pituita aut melancholia hos glandularum tumores deduci: Er his enim fit Strumae, & ejufmodi tumores alij ortum habere, non tam diuturni effent, fed putredini & corruptioni obnoxij, & in pus mutarentur, ut alij ex humoribus fimpliciter excrementisq; orti tumores, ipfe vero è fucco nutriende hos tumores orti ftant: cum enim Glandulae quum aliae carnes craffiore fucco nutriuntur, fi is quantitate & qualitate moderatus fit, eas in fuo naturali ftatu conferuat: Si vero qualitate, & imprimis quantitate excedat, tumores varij excitantur: Etenim fi aliquid humorum plane excrementitiorum admifceatur, tumores ejufmodi citius in abfcefsum abeunt: Si vero fucus ille nutriendi fufficiens fit, fed copiofior quam ut parti omnis apponi poffit, in ejufmodi tumores degenerat: naturaliter enim talis humoris non plus in corpore generari debet quam ut partibus illis nutriendis fufficiat: Si vero plus ejus generetur, relium tumorum caufa eft: natura enim ut vitiofos humores alios ad alias partes protrudit, ut in facie eryfipelas, bubonibus, &c. videre eft, ita etiam quod in alimento eft ignobilis non partibus nobilibus apponit, fed glandibus: unguibus, capillis, quae propter, etiam fi talis ignobilis, feculentus & craffus alimentum plus generetur, natura rectè agens ad illas partes cum quibus habet convenientiam, glandulas fcilicet protrudit, ex quo pro-

inde etiam carnem, aut carni quid fimile generare tentat: unde etiam author Defin. medic. Strumas dicit carnem ficcantem: & *Aetius* ex *Leonida*, carnem fubalfcentem facile augetcentem: Er quidem peculiari membrana Strumae includuntur, quae & ipfa à facultate formatrice, quae omnibus partibus viventibus infusa & nunquam otiofa eft, produetur: Dum enim ab humore affluente fuperfluo membrana diftenditur, & forfan etiam rumpitur natura novae quafi membranae texturam aggreditur *Sennertus Prae. lib. 2. p. 125.*

*Vaguento ex hydragro cum innaturat* Strumae unus alexicacos Hercules vincit & opprimit: fana autem profula per os maligna pituita quae in capite redundabat, illincque in fubpectas partes dilabat: illarum caufa fuerat: *Ballonius conf. 14. d. 3. De Salvatiane artificiali vide Rofficium meth. fec. p. 589.*

*Srofalus aliquas in Cancrum degeneraffe* Quidam artis periti in Chera dum cognitione & curatione ta-cillarunt, à pituita illas nafci putant, & ad calfacientia & ficcantia recurrunt: item ad hydrotica calfacientia, hinc in malum cancrum fit conversio & transfus, illa pituita incalefcit plus aequo & exasperatur: At, ju ex *Platone* notat *Galenus*, pituita non quavis nocet, fed falfa aut acida: falfa eft atque bilis foboles & affinis hinc quibus in facie gutta eft rofacea, in ijs cherada & cancrorum eft feminarium, Sic gravis error èmittitur in ufu calfacientium remediocum, & antiquitas prudentius pteferit pferi Serum lactis, affine lac, fyrupus Regis Saporis: *idem confilii. lib. 1.*

§. 4. Variae funt Strumarum fpecies five à loco five à materia: Externae diu funt innoxiae, fed internae brevi periculofae: funt autem vel ex pituita fola, vel permixta cum fanguine aut atra bile: quorum humorum concurfus, fi quidem exficceatur à praefante aestu, producit nonnunquam in ftumis vel gypsum vel verus calculus: Struma à fanguine ac pituita, vertitur facile in pus: sed eo quae non tendit, elice illam cum involucro cui inluditur, sed potius conjunctim quam fegegatim: Cavendum enixe ne quae remaneat reliquiae, quas tamen tolles deinceps pulvere mercurij praecipitati, caute illis infperfo: Sed maxima moleftia erit à feminibus sub qualibet struma elanculum delitescenibus, quae licet mole fiant exilia, neque multum difcrepantia à forma feminum lupinorum, producant tamen perniciofiffimam inexpugnabilem strumarum fegetem: *Semina autem haec* obtulit nobis aliquando orpha notrophium publicum, in collo puellae ab hoc morbo fuffocatae: Erant vero haec adeo frequentia, ut non quina aut fena, fed interdum dena vel vena occurrerent in eodem loco: sed eo fempere ordine ut majore incuberent minoribus, declinante fenfui ufque eo ipforum magnitudine, ut tandem vix aequarent femen fefaminum, inclufa nihilominus qualibet fua tunica & apta producere majorem strumam: Manentibus itaque his feminibus, repullulant continenter eadem strumarum germina. *N. Tulpus obferuat. lib. 1. cap. 46.*

**S**emina autem haec *Riolanus* Encheir. Anat. l. 1. 18. In menterij glandulis fedem & radicem ponit omnium strumarum in corpore, easque nunquam fortas erumpere ait nifi Mesenterium fuerit strumofum: quod verofimile non videtur *Excell. Th. Bartholino Anat. Refform. lib. 1. cap. 20.* quia 1. ut remote

causa effe poffunt & per accidens, 2. inter strumas capitis & menterij glandulas nulla communio: 3. plures funt strumofi qui fanas habent glandulas. 4. Omnes forent strumofi, quia in omnibus haec glandulae. 5. Sub-Alpini strumofi aliam menterij conformationem habent. 6. Strumae à quovis humore

ejusdemque regionis impleatur: Nota vero *Risla-*  
rum non absolute dicere, Strumas in collo emergere  
nisi affectum sit mesenterium, sed cum adjectione  
Magno numero: Excell. *Bartholinus* tamen de-  
dit lacteis Thoracis, cap. 3. in Dubiis, Mesenterii

sympathiam cum collo agnoscit & axillis per tubu-  
los lacteos, ob quam præteritum circa jugularem ex-  
teritiam emergant ejusmodi tumores, quia proximior  
est infectioni lacteorum tumorum.

§. 5. *Pnella* Leodienfis ann. 14. cum diu Strumis multis, & magnis & hinc inde suppuratis  
atque exulceratis in colliambitu, & sub axilla sinistra laborasset, tandem 28. Octobris 1638.  
extrema macie consumpta obiit.

Aperto cadavere plurima notatu digna in abdomine, thorace capereque deprehendimus:  
Etenim, præterquam quod abdomen & thoracis pars dextra citrini coloris aqua repleta es-  
sent, ipsum quoque pericardium tanta ejusdem aque, sed paulo candidioris copia surgebat, ut  
ad scalpelli ictum cum impetu profileret: Sinistra autem thoracis pars aquæ expers omnino  
erat: Arteriola cordis dextra ramida in suo sinu humorem continebat viscidum flavescen-  
tem: Cordis vero viscus lividum, durissimum, exsiccum ac exhaustum erat: Jecur passim fi-  
brillis membranaceis diaphragmati, peritonæo, ventriculo, & immediate suo parenchymate,  
cartilagini ensiformi annexebatur, & in sinistram usque hypochondrium se supra ventricu-  
lum extendens arctissime Lieni adnatum erat: Lien solito major longiorque ad renem fini-  
strum usque se dimittebat, & cum ejus membrana adiposa firmiter coaluerat: Mesenterium,  
Omentum: Pancreas, innumeris magnitudinis notabilis Strumis scatebant: Imo ipsi perito-  
næo, diaphragmati, mediastino, uterique ligamenti plures infederant, alix quidem castaneæ,  
alix nuciæ avellanæ, alix cicoris magnitudine: Ad orificium ventriculi superius duas notavi-  
mus, glandis quereinæ magnitudine & effigie, Trunco venæ Portæ una magna admodum  
incumbebat: Jecur, Lien Pulmo, præter Strumas majusculas quas hinc inde obtinebant,  
tota interius exteriusque quasi grandine conspersa erant, multæ etiam, mulli coriandrique  
grana vix superantes, in intestinorum tunicis conspici poterant, ut & in singulis renibus hu-  
jusmodi minuta unita: In duræ meningis parte dextra unam quoque pisi magnitudine reperi-  
mus, quæ cranii interiori tabulæ adhæserat, & in ea cariei rudimenta excitarat: In cerebri  
ventriculis & basi aqua copiosa erat, ipsa substantia alias satis firma: Quæcumque autem  
alibi Strumas disseceamus, eæ eandem prorsus materiam cum illis continebant quæ in collo  
& sub axilla jam suppurati & exulcerati cœperant: Erat autem illa serosa & uberi vacino ovi-  
love non abfimilis, in una quidam magis alba, in alia flavescens magis. *O. Henricus observ.*

§. 6. Retulit mihi *D. Regemorterus*, se in aperto cadavere viri cujusdam (qui per aliquot an-  
nos ingenti Struma, juxta linam inferioris maxillæ regionem laboraverat) repetisse Hepar  
intus forisque innumeris glandulis, pisi fabæque magnitudine, repletissimum: Eadem trans-  
versum sectæ, nihil prorsus humoris effundebant, verum ex gypsea quadam pituita compositæ  
in figuram substantiamque adenibus persimilem condensabantur: Ideoque Hepar in ingentem  
molem, atque immane pondus excrevit, adeo ut duplo majus, triploque gravius solito con-  
spiceretur. *Franc. Glisson Anatom. Hepatis cap. viij.*

**H**epar intus forisque innumeris glandulis Mal-  
pighius qui Hepatis substantiam & interiora  
inter alia accuratissime perspexit Lde Hep, cap. 2.  
inter alia observatu digna notavit totam ejus molem  
constare ex acinis glandulosis, & diversis vasorum  
propaginibus, interque commercium intercedat: At-

que in suis observationibus concludit Hepar esse  
glandulam conglomeratam bilem fecerentem: Quæ  
glandulas in statu præternaturali augmentum capere  
sunt, non fecus ac in cæteris corporis partibus vero-  
simile est.

§. 7. Anno 1663, die 22. Junii *CJ. Sylvius* in Nosocomio Leydensi secuit *Saram Iansen*, 20. cir-  
citer annorum, Virginem, in cujus cadavere occurrerant, (*Vide lib. 2. Tit. de Respiratione laesa*)  
Glandulæ plures notabiles in Mesenterio: Ex Glandulis colli Conglobatis dissectis & pressis  
albicans quædam materia pulacea & veluti gypsea erumpebat: Conglomeratæ vero vicinæ  
nihil mali erant passæ: Ex glandulis mesenterii dissectis plane similis materia exprimebatur.

**N**on nisi emollientibus singularibus gypseam il-  
lam glandularum materiam emolliri posse a-  
pebat: Quærenda putabat ejusmodi remedia quæ  
non tantum emolliant sed materiam magis fluxilem  
reddant, scrofulariam, squillam & ex ea parata me-

dicamenta, ut & gummatæ, galbanum, sagapenum,  
ammoniacum, &c. commendabat. *Ex Observa-*  
*tionibus D. Joh. Henrici Breckfeld Medici Dani, In*  
*Alliciis medicis Thom. Bartholini anni 1673. Obser-*  
*vat. xvj.*

§. 8. Serofule sunt Tumores p. n. glandularum colli, propria tunica contenti: *Partes affectæ*  
*sunt Glandula conglomerata colli, Salivales hodie dictæ: Causa, Glandularum totius corporis mu-*  
*tas (quod certissimum esse puto) est Lympham transcolare: Necesse est ergo Lympham cras-*  
*sorem hujus affectus esse causam, unde illarum primo durities, postea sensim accrescens, per-*  
*tinaxque tumor: Interdum mobiles sunt, interdum ossibus adhærent: Interdum Glandula*  
*salivaris inferior interdum & superior afficitur: Interdum hæreditariæ sunt, interdum epi-*  
*demicæ: Ossibus adhærentes fere incurabiles: In hisce non utor nisi cura palliativa, ut & in*  
*illis quæ in cancerum vergunt atque dolent: Indicaciones curativæ, Lympha crassa incidenda,*  
*Beneti Anatomia Tom. III.*

temperanda, vacuanda: Glandulae emolliendae, humor, si praestet, discutendus vel maturandus, & tandem escharoticis, ubi aliter fieri nequit, assumendus: Virgo biliosa, macra, scrofulosa, multiplicibus vexata, satis cessit, febre continua illam emaciantem, h.e. hectica.

Aperto cadavere reperimus mille ultra glandulas, majores, minores, à faciebus ad os passim usque: Eiusdem erant coloris, flavi scilicet, quem aperta eute oculis nostris objiciebant Scrofulae in collo. *Barbette praex. l. 2. c. 2.*

**S**crofulae sunt Tumores p.n. (&c.) Glandulae dividuntur in *sanas* & *Morbosas*: Morbosa in *Penfiles*, *Concatenatas* & *Late Connexas*. Penfiles sunt Polypus, Glandulae in inguine, Bronchocele, Sarcocoele. *Concatenatae*, quasi catena globulorum, ab auriculis per colli longitudinem ad clavículas descendunt, & majores cernuntur in pueris rachitide laborantibus, in strumosis, & in corporibus obstructis & cachecticis: *Late Connexas* generali nomine *Scrofularum* veniunt, ac in duo genera dividi posse videntur. Earum enim aliae perpetuo augentur, aliae modo minuantur, modo stabiles permanent, modo de loco in locum transferuntur: Illae generali nomine Scrofularum apud auctores veniunt: Hae appellantur ut plurimum generali nomine *Strumarum*, quas Reges Angliae atque Galliae solo attractu mederi vulgo creditum est: Ut vero lucidius haec species ab invicem discriminentur, hic signa nonnulla distinctiva afferam. Scrofula mollior est, Struma durior: Illa pallidior, & frequenter ejusdem coloris cum cute, haec est rubro livescit. Si vero aliquando contingat Scrofulas rubescere, color floridior est minusque lividus: Porro scrofula mollior est, & ut plurimum minus profunda: Struma immobilior profundiorque, Item altius in tumorem attollitur Scrofula, Struma magis compressa jacet: Acutius quoque haec semit & dolet, Scrofula est stupidiore. At haec racematim frequentius crescit, rarius Struma.

*Tumores p. n. g' andularum colli propria tunica contenti* Waribon *Adenogr. cap. 40.* Scrofularum à Strumae distinctione facta, utrarumque generationem tradit, Scrofulae, inquit, perpetuo augentur, & ad ingentem magnitudinem excrescunt, nempe ad xxx. librarum pondus & amplius: Verum praeter glandulosas carnes, habent quasi in cystis varii generis succos congestos, qui earum molem plurimum adaugent: credibile est hosce succos concretos excrementa quaedam esse rejecta à carne glandulosa in ejus nutritione: carent enim haec glandulae vasculis generis excretoriis, & propterea necesse habent excrementa sua in cystis, in substantia earum efformatas, congerere. Quae una ratio est cur in tantum molem excrescant: Altera esse potest, quod earum venae improporionate videantur earundem arteriis: hinc enim sanguis per arterias effusus copiosior est quem is qui per venas reducitur, unde necessario fit ut eadem in dies augeantur, Addebat quod nervus earum glandularum perquam exiguus est, uti ex sensu earum obruto videre est: Si enim illas (cutaneis partibus prius dissectis) aculeis pangas, dolorem vix percipiunt, cum ergo exiles adeo nervos habeant, cursum esse incrementum ab arteriis potissimum accedere, nervosque superfluae materiae vel auferendae, vel in alias sedes transferendae impares esse.

Posterioris generis tumores, qui à nobis specialiter *Strumae* dicuntur, non perpetuo augentur, sed modo crescunt, modo minuantur, tandemque evanescent, modo stabiles permanent, modo à parte ad partem transferuntur: Hae Strumae vase *Reductorio* magis proportionato gaudent, eoque potissimum nomine à priore genere discriminantur: Cujusmodi autem generis vase id fieri putandum est? Profecto praeter arterias, venas & nervos nullum illis aliud adhuc est repositum: Videntur utique venas obstruere

fuis arteriis proportionatas magis quam in Scrofulis fieri diximus, quae causa est cur non perpetuo augeantur, Venae enim tantumdem repositae possunt quantum arteriae affundere, nisi forte contingat sanguinem per Strumae substantiam transirum impediti, quo casu strumae quoque continuo augentur, plurimum donec vel indurentur in scirrhum, vel liber sanguini transitus per earum substantiam iterum concedatur, postquam enim indurata fuerint, nequeunt amplius sanguinem ab arteriis recipere, nec se ulterius distendi patiuntur: concessio autem sanguinibero transitu, quantum illius ab arteriis allatum est, tantumdem pariter à venis regegitur, adeoque augmentum cessat: Quomodo autem hi Tumores de loco in locum transferuntur? Nervorum certe opera potissimum id fieri crebibile est, Statuimus enim nervos posse aliquid vel afferre ad partes, vel ab eisdem auferre: Utretus statuendum est, ubi nervus aliquis turgidulus redditur, facile eum eructare portionem humoris, quo turget, in partium interstitium, quae terminatur: Si vero aliunde contingat ut idem nervus depleatur, fieri potest ut iterum attrahat materiam prius effusam, eamque sic in se attraham, vel ad glandulas suas emunctorias, vel ad alias corporis partes derivet: Si eandem ad glandulas emunctorias deferat, materia excernitur, Struma minuitur & nunquam evanescit, nulla nova in ejus locum succrescente, quem admodum frequenter accidit in Strumosis iis qui unguentis ad Salvationem movendam illinuntur, Si quidem in illis, nervi humiditates suas in glandulas emunctorias, nempe maxillares & scrofulas copiose expiunt: unde iidem nervi depleti, maiorem denuo ad se rapiunt, nimirum eundem quem prius eructaverant, & ad dictas glandulas emunctorias deferunt, quibus per fistulam excernitur, Strumaeque absumuntur: Sin vero nervus se in alia cuniorum interstitia exoneraverit, exurgit statim novum Strumae rudimentum, in quod materia Strumae prius genitae sensim deriverit, adeoque Struma à parte in partem deferitur: Verum praeter genus nervosum, ipsum venosum quoque translationis huius non parum auxiliatur: postquam enim nervus in hunc modum coeperit deplere humorem in strumae cysti congestum, partes circumjacentes protinus flaccescunt, arteriae minus pronitantes languidiusque sanguinem effundunt, infusio immutatio omnis, si quae prius esset, cessat, parsque affecta temperatior redditur, transit interim sanguinis per eandem liberior multoque expeditior fit, & in venas haud difficulter affligitur, nec tantum sanguis de novo affluens, sed & ille grumosus, qui ab arteria prius in partem effusus habebat, nunc mobilis exiit, unaque resumitur & circuitu solenni circumducitur, scilicet tota illa portio ejus, quae laxata jam partis perspiratione, non prius in aëris avolaverat: Ttes itaque exterminandi Strumae modi enumerari possunt, nimirum cum vel radicalis earum materia in cysti congesta, à nervo reitorberit: vel sanguis affluxus facile à venis reducitur, vel transpiratione libera parti conceditur: Transfusionis vero causa prima & praecipua est nervus, qui primum rudimentum novae strumae ex materia à parte detracta congerit, verum ad hujus rudimenti complementum arteriae & venae quoque nonnulli contribunt: Strumae variae à partibus ad partes transferuntur, modo à

latere ad latus, modo à superioribus corporis partibus ad partes transferuntur, modo à latere ad latus, modo à superioribus corporis partibus ad inferiores, aut contra: modo ab exterioribus ad interiores, vel vice versa, modo ab articulo ad articulum, vel modo aliquo ab his mixto.

*Lympham crassiorem.* Aliquid austeri simul peccare statuit *Decker* notis in cap. cit. eo quod in cancro aliquando vergeat: cancerum autem ex acido austero produci probat ex doloribus lancinantibus, pungentibus, quodque semper propemodum cancro laborantes sint melancholici.

*Unde illarum prima durities.* Glandulæ morbosæ alie molles sunt, alie duræ: molliores facilius sunt curationis, siue enim discutere velis, siue suppurare, facilius cedunt, duræ difficilius.

*Interdum mobiles sunt.* Mobiles sunt omnes quæ inter partes cutaneas generantur, ubique sitæ sunt: quæ vero in musculorum interstitiis sunt, eorumque sub eis adnascuntur, non libere moventur, sed ad motum masculi: Illæ vero quæ periostio, aut ligamenti articulorum adnascuntur, immobiles planæ sunt. De Struma costis adherente, vide historiam ex *Paranolo*.

*Interdum hereditaria, &c.* *Platerus*, qui causam in semine & facultate formatrice in utero querit Scrofulas, ubi sunt aliqui loco familiares à parentibus in liberos propagari statuit.

*Aque dolent.* Ut quæ inflammatae sunt, sua enim sponte dolent: quæ ea carent, nisi vis aliqua inferatur, indolentes sunt: Inflammatae porro differunt inter se, quod alie ad suppurationem tendant, aliæ ad indurationem, scitrum & dispositionem cancerosam, alie ad ulcerationem, eamque vel simplicem vel fistulosam, vel cavernosam, vel etiam ulcus cum carie offum.

*Indicationes curative, &c.* Vide Scholia prima sub finem.

*Ad faucibus ad os pubis.* Glandulæ concatenatas vocat *Warthon*, cum quasi catena globulorum ab articulis per colli longitudinem, ad claviculas descendunt, & majores cernuntur in pueris rachitide laborantibus, in strumosis, & in corporibus obstructis & cachecticis.

*Eiusdem coloris.* Quædam cuti concolores sunt, alie discolors: priores perpetuo benigniores: posteriores, nimirum è rubro livescentes, maligniores habentur. *Idem.*

*Salivales hodie dictæ.* Inter vasa Lymphatica superiora insignes sunt ductus Salivales dicti, tam superiores quam inferiores intra oris cavitatem internam conspicui, qui magnam Salivæ copiam continuo in os vel ventriculum deponunt: horum ductuum superiorum inventor primus est *Clar. Anatomicus Nicolaus Steno*: Inferiorum Excell. *Warthon*, qui de eorum vi cap. 21. Adeoogr. sic disserit: Usus harum glandularum Scriptores hæcenus lauræ, ut & ipsæ Glandu-

læ: utinque cerium videntur esse partes excretorias, manereque publico fungi: ubicunque enim vas excretorium peculiare reperitur, non putandum est frustra conditum fuisse, sed speciali cuidam excretioni destinari: Cumque excretio quælibet determinati excrementi, humorum residuorum deputationi inserviat, quod in emolumentum totius cedit, sequitur hoc ipsum esse officium publici: Restat adhuc inquiremus quem peculiarem humorem hæc glandula secretat, node eandem excipiat & quis sit ejusdem post excretionem visceratissimus est humor hinc salivam esset per Salivam non intelligo crassum illum viscidumque humorem, qui è tonsillis secreti aut tussi (spumam dicimus) exprimitur, sed illum tenuem & aquosum quem Græci *saliva* vocant: hujusmodi verò humorem ex hac glandula, per suum vas in os expui oculari experientia testari possumus enim vero in partibus hujus canali, tam in homine quam in bove, humorem salivalem manifeste deprehendimus, neque quicquam præterea inerat: quare cum hoc adhuc nomine careat, licebit appellare Canalem siue Ductum Salivalem, si quidem tenuem illum humorem, quem proprie Salivam dicimus, quique ad masticationem necessarius est, sub anteriore inferioreque in linguae parte in os effundit: Jam inquirendum à quibusnam partibus, & per quas vias hic humor in glandulas salivales derivetur? Credibile est è Nervot genere profundi, siquidem corporum tum humidiorum, tum siccorum (modo hypochondriacæ) salivam copiosius expuunt: illa, quod eorum nervi quoque superflua humiditate madescant, hæc per consensum nauseantis ventriculi: Etenim nervus sexti paris, cuius magna pars in ventriculum disseminatur, origine haud longe distat à nervis ad has glandulas delatis: Unde nervi maxillares facile per consensum cum inordinato motu ejusdem sexti paris, excitantur ad consimilem motum moliendū, & copiosas humiditates in maxillares glandulas exprimunt, &c. cuius rei testimonium ulterius exhibent masticatoria omnia medicamenta, item acra quævis & pungentia in ore retenta, salivam quippe copiose proliciunt: Porro in magnis salivationibus, quales Mercurii opera ciantur, nervi multum exsiccantur & à superflua humiditate liberantur: quod vix coningeret si nervi ad peissimum nihil plane conferrent: Præterea haud facile dictū est, in quem alium utrum tanta nervorum copia in has glandulas deferatur? certe plane motui nihil conducatur, nec multum sensui, quoniam ab objectis sensibilibus longius abunt: quare aliquid vel apporant vel auferunt afferre autem, non auferre aliquid, ex eo constat quod ea glandulæ sint excretoræ: Denique major est quantitas materie salivæ per has glandulas excretæ, quam facile credas ab exiguis illis arteriis & venis quæ ad partes has deferuntur adferri posse: Non negamus tamen quia forte arteriæ quoque aliquid ad hanc humoris illius accumulationem conferant.

§. 9. *Riolanus* lib. 2. Anthropol. c. 5. de mesenterio, scribit Scrofulas in corpore nunquam erumpere nisi mesenterium strumofum fuerit, Quod etiam testatur *Guido & Ingrassias*: Eiusmodi mesenterium fere innumerabilibus glandulis repletum reperi in Nob. Dominæ cadavere, quod quoniam totus corporis habitus scrofulis quasi refores erat asperui, & in hydropsi, quæ obit, causam inquisivi. *Iob. Scultetus Armament. Chirurgici observ.* 39.

\* *Innumerabilibus Glandulis Sylvius de le Boë* Append. Traité. 4. §. 54. Glandulas in statu sano in omnibus omnino corporis partibus, & parenchymatibus siue carnibus, adesse statuit, sed tam exiles ut visum fugiant, sicut vasa capillaria in tunica oculorum adnata tam exilia sunt ut non videantur, in oculorum autem inflammatione conspicua evadant. Ideoq; inferi qui semel aut sæpius in statu p. n. & circa plexum cho-

roidem, & in pulmonibus, scilicet observabit glandulas prænomatas, præter omnem rationem denegat easdem quamvis perexiguas in statu sano: Conjecturis ansam dederunt. Glandulæ in plexu choroideæ, nonnulli in statu p. n. observabiles, quas ait ad insignem magnitudinem, nisi puta majusculi nonnunquam ascendere. 1. Glandulæ in pulmone, siue tubercula glandulosa, minora vel majora in quibus aliquando

pus varium contineri sectio manifestavit. 3. Glandulae in variis corporis partibus manifeste in strumosa vel scrophulosa constitutione, adeo ut nunc tantum satis exiguae in mesenterio & colli lateribus secundum naturam apparentes in magnitudine ac duritiem prodigiosam excreverant, sed insuper infinitae pene alias ignotae tum sese manifestarunt, & quidem omnes conglobatae, non item conglomeratae, quas

integras & salvas permanere observavit, licet conglobatae ipsi adnatæ plurimum efficerentur. *Wathen* in Adenographia glandulas naturales prae modum tumidas observavit in singulis propemodum corporis partibus: *Malpighius* substantiam cutis habere glandulas plurimas statuit; *Sien* singulis cutis poris suas glandulas subjacere asserit.

## OBSERVATIO VII.

*Mamillæ Sinistra Tumor, in ulcera deficiens, lethalis ob insignem interiorum viscerum læsionem. 1. Mamma tumor scirrhusosus; radicem habens scirrhusam, in costis venam nigricantem. 2. Mamma Tumor cum exculceratione, cujus Glandula exculcerata, putrescentes, cum vitio uteri. 3. Mamma Apostema ex lacte coagulato, congestum habens pus inter glandulas & musciculum pectoralem. 4. Mamma Strumosa ob strumas in Pancreate, Mesenterio, Jecore & Testibus; 5. Mamma Tumor, pro cancro habitus, substantiam habens durissimam conglobatam. 6. Mamma cancer excitatus à vitio viscerum tuberculis obscurum. 7.*

§. 1. **N**obilis Matrona cum forte sordes ablucendi ergo balneum esset ingressa, nescio quid in cupa apprehendere annitens, sinistra nati. milla læsa est, verum quia parum aut nihil inde doloris sensit, tanquam levius vulnus conrempsit & neglexit. Subsequentibus inde diebus loco affecto Tumor quidam, interdum indolens fere, succrevit, qui tamen citra negotium industria Chirurgi sublatus est: Enatae successu temporis plures pustulae sunt, quæ in ulcera tandem terminarunt; Sollicita interim Nobilis Matrona de Canceri successione, Medicorum consilia adiit, verum nescio quo fato se Paracelsico concredidit, qui indubie deleteriis pharmacis potionatam necavit.

Vocatus ad condituram & sectionem defunctæ, sectionem ab ensiformi catilagine ad os usque pubis molitus sum: hic sese primum aqua intra peritoneum copiose collecta obtulit, cujus flavescens Chirurgi assistentis pelvim bis complere licuisset: Stomachus & intestina portentose inflata & aqua turgida erant, Jecur durum, lapideum, & integre labefactum: Lienis vestigia nulla, præterquam putrida & fetentia: Pulmones, dextri præsertim lateris, putridi ac nigricantes: Cor exiguum admodum, in se contractum & corrugatum, huic pericardium ita adnatum videbatur ut unguibus avellere opus habuerim: In dissecto utero materiam albam, lapidefactam atque durissimam, ut vix cultro discindere licuerit, invenimus: Mammæ crucis in modum divisi, quarum caro dura admodum, nigrescens, sed non omnis putrida conspiciebatur. *Ex observationibus Georgii Gernerii Medici Austriaci.*

§. 2. Mulieri viduæ in mamilla sinistra tumor sensim excrevens prodit durus, quem alii scirrhum, alii cancerum esse judicabant, qui cum diu durasset, tandem in abscessum conversus & suppuratus, in ulcus abiens sanatus est, relicta cicatrice admodum inæquali, labiisque duris, &c.

Hæc tandem plurimis morbis labefacta, è vivis excessit, &c. mamma sinistra quæ scirrhus laborarat, circa radicem scirrhusa, ut & circa papillæ radicem scirrhus erat candidus, glandulam representans: In costis, vena lata nigricans latebat. *Platerus obs. l. 2. p. 503. Vid. tit. de Febribus.*

§. 3. Nob. Matrona sinistra mamilla læsa est, verum quia parum, aut nihil inde doloris sensit, tanquam levius vulnus neglexit, Subsequentibus inde diebus loco affecto tumor quidam, indolens fere succrevit, qui tamen citra negotium Chirurgi industria sublatus est, Enatae successu temporis complures Pustulae sunt, quæ in ulcera tandem terminarunt: Sollicita matrona de canceri successione Medico, sed Paracelsico se concredidit, qui deleteriis pharmacis potionatam necavit. Mammæ mortuæ crucis in modum divisi, quarum caro dura admodum nigrescens, sed non omnis putrida conspiciebatur: In utero dissecto materiam albam, lapidefactam, adeoque durissimam, ut vix cultro discindere licuerit, invenimus. *Ex Clariss. D. D. Georgii Gernerii observationibus.*

§. 4. Infantida femina sexta à partu septimana capite patratum secluse expiat: Sinistram mammam ex lacte coagulato Apostema occupavit, quod ipsa natura exiguo facto foramine cepit expurgare: Glandulis ad pectoralem musciculum usque remotis, inter has & musciculum dictum magna puris copia sinum efformavit, illiæso musculo. *Th. Bartholinus cent. 1. hist. 92.*

**E**X lacte coagulato apostema occupavit] Notat *Domin. de Marchettis* Anatom. cap. 10. Quod quando mulieres lactant, tunc canceri in mammis generari non possunt, licet multi tumores, ut ait, ip-

sis inhæscant, qui quidem facile curantur: Temperamento lactis impediante ne Cancer generetur, quia sua temperie retundit acrimoniæ sanguinis adusti.

§. 5. In ea meliore quæ strumofam habebat mammam dextram, utrumque Testem strumofumprehendi, utero æqualem, Jecur vero multis glandulis albis & latis, foris & intus conspersum erat: totum denique mēfenterium & Pancreas strumofum. *Riolanus Anthropol.* lib. 5. cap. 1. & *Schola Anat.* cap. 3.

**T**umorum & alcerum Glandulosis partibus insistentium, causam non à sanguine, sed à Liqueore Nervo vitio deducit Ingeniosissimus *Willisius* Tract. de Anim. Brutor. part. 2. ap. 12. Observare est air, stagnata corrosiva hand potissimum in sanguine producta partibus affigi, sed multo frequentius in *liquore nervo* procreata, cum laticis ejus in partibus nervosis, aut earum emunctoriis deposita, Apoplethmata, ac ulcera phagedænica, septica aut alias caecothica producat. Hæc enim læpissime in Glandulis, vel juxta tendines aut membranas excitantur: Cumq; humor ab iis decidens primo tenuis & æquosus est, postea artatus, valde facidus, & corrosivus evadit, indicio sane ipsam Liqueorem nerveum in ejusmodi patrilaginem abire: Horum ratio si inquiratur, facie occurrit laticem *cerebrus & appendicis nervosæ* irrigui, una cum spiritui obilit. lis volatilis copiam ingentem in eo continere: Si quando igitur adeo depraverit iste, ut spiritui depresso particule saline in florem degeneres à bim. at corpuscul. ul sulphurea afficiant, plane corrosivus & stygius ev. dat. Quapropter Tumores ac ulcera maligni moris in partibus Nervis, earumque emunctoriis præcipue contin-

gant, ac ibidem à levi occasione excitantur (uti cum Mammæ muliebri læsioi parvæ cancer succedit) quæ si quæ dem humor nervus in transitu suo impeditur alicubi stagnat, statim spiritum depresso, ut a volante, particula salinæ, à volatilitate in acorem degeores, coloris alicui mox incunt, atque corpulculæ aut terrestria, aut sulphurea, aut alia aliis generis sibiim. arripicor. s, in Tumores au. Scirrhusos aut Strumofos, aut Cancerosos congelari incipiunt: Cumque hoc ritu à liqore Nervo stagnante, & concretionem heterogeneam moliente, Tumoris velut minera in quapiam parte coëstatur, ejusdem liquoris jugiter affluens supplementa in partem viriositat. indolem pervertuntur, quibus etiam accedunt impuritates atrabilariæ à Sanguine alii sive humoris suffulz, quæ junctis viribus (velut cum diverfi sales ac sulphura conjunctim destillant ut) effectationem augent atque in parte affecta materiam septicam, ac instar aquæ stygiæ elcharoticam constituunt: Juxta hanc ariologiam Tumorum ejusmodi anom. a. Iorom, uti & affectus Strumosi phænomena ap. rissime explicantur,

§. 6. Ego aliquando ad nobilissimæ mulieris dissecandum cadaver vocatus, reperi in altera ejus mamma corpus, quod crassitie gallinæ cum ovum æquaret, *durum & compactum*, asperiusculi calculi adinstar, *pro Cancro* à Medicis & Chir. gis, dum ipsa viveret, *habebatur*, quod illi hæc durities, dum vel leviter comprimeretur, esset valde dolorifica. Sed & paucis ab hinc annis vocatus ad curam mulieris quæ pari modo laborabat, Medicis Chirurgisque Cancrum subesse affirmantibus, fortiter obstiti, non enim profundius defixus hærebat tumor, non erat pat. tis habitus à narivo calore mutatus, non venæ in ambitu tumentes, non ulla aderant alia Canc. ri syllogistica signa: nam & illi mulieri st. ta & sua periodo fluebant menses facie totoque corpore bene habita & colorata viscebatur, ab omni dolore immunis, nisi cum pars affecta comprimeretur: Sed nec ex eo tempore vel tantillum accrevit Tumor, nullum aliud malignum accedens supervenit, uno etiam nunc alacris vivit, corpore & mente bene composita. *A. Pareus Operum* lib. 6. cap. 18.

**Pro Cancro habebatur**] Chirur. g. vulgares multos alios perverfos tumores & postulas, sicuti & funicululum, & carbunculum, cancos quoque nominant, Uti & tumorem sub oculo in illius orbita natum: polypum in naribus, gangrenam gingivæ, ulcera præputi. Cancros vocant: A quibus tamen veter. Cancer longe diff. r. Carcinus dicitur: Hic extrinsecus in omnibus fere corporis locis nasci potest, ac semper uno modo prodit, sed forma nonnihil variat, aliquando cum tumore alio composuit: Tuberculo edig. vix dum conspicio, ab inst. o emergit, mox ad pil. inde avellans, postea nesci, tandem ad pom. minoris majorisq; magnitudinem sensim ext. r. scit. Canc. rum verum dictum, unde nomen obtinuit, apposit. sua circumscriptione & forma referens, non altum, quem Cancerum noli in quoque vocant, & venas in eo cancro pedibus illas assimilantes, inde Canc. rum appellari falso putant sed ve. ß. cancum, eumque potissimum maximum, cum uti ille, sic & hoc tumor, totundus sit, inæqualis, tuberculis quibusdam exuberans, & venis in ambitu nig. r. d. us, colore lividus & obscurus, durus in super, dur. que veluti crusta, uti cancer obductus, si m. i. r. que p. in subje. di h. i. e. n. s. unde quoque quod quod quod p. p. r. b. a. n. d. i. c. i. t. u. r, p. e. r. n. a. c. i. t. u. r. t. e. n. e. a. t. u. r. can. c. u. m. a. p. p. e. l. l. a. t. u. r. Archigenes potavit: Dolorem aliqui & nec ab inst. o fere nullum, aut contemnendum talionem affert, unde & tunc nihil quasi æst. m. i. t. u. r, negligiturque, punctioibus

tantum quibusdam curis, ac si acu fierent, se patefaciunt, quæ tandem una cum tumore augentur atque increment. Tandem vero tumor hic curæ aperta retractaque d. nudatur, tuncque Carcinoma dicitur (sen. Cancer exulceratus): E quo sensim sanies puris, putrida, subdava vel subviridis, mox nigricans co. titus eminar, caroque inæqualis & corrupta nonnihil apparet, & stris vel styriis procul ext. r. s. & prom. i. o. e. n. t. e. s. p. r. o. f. e. r. t. u. q. u. a. m. labia tumescunt, dura atque inv. r. i. s. a. m. b. i. a. n. t. u. r, quæ interdum adeo augentur, ut reflexa magnam faciei partem occulas. s. t. a. s. in collo. totam auriculam illi veluti inieram continuasse ob. i. e. r. v. a. r. i. m. : s. a. n. g. u. i. s. q. u. o. t. i. e. s. o. y. d. a. m. Carcinoma relinquitur, ex eo d. d. u. r. i. t. *Platerus Prælexis* lib. 2. cap. 17. & *Observ. lib. 2. p. m. 313.* n. b. s. p. l. u. r. i. m. a. e. x. e. m. p. l. a. c. a. n. c. r. o. r. u. m, d. i. v. e. r. s. a. p. a. r. t. e. s. o. b. i. d. e. n. t. u. m. p. r. o. a. l. i. i. s. i. m. m. o. r. i. b. u. s. a. b. a. l. i. s. a. c. c. e. p. t. o. r. u. m.

**Corpus durum & compactum in mamma, &c.]** Du. ros quatuor efficitur: ac Tumores incutunt mammæ, Glandularum, Strumarum, Scirrh. Canc. r. i. Sed hic quidem ex adult. s. p. e. r. p. e. t. u. o. g. i. g. n. o. r. f. u. c. c. i. s, quom ob causam & terribissim. ipse est & gravissim. sympt. o. m. a. s. r. o. r. q. u. e. : R. liqui omnes, ut oon ex adultis bu. o. r. i. o. r. i. b. u. s. p. r. o. d. i. c. i. u. n. t. u. r, sic looge minus inest: sent. i. Has ob res, ut hoc utrumque genus facillimè discre. r. u. s. est, ita difficilis aliquando ceteri distinguntur. Sed scirrh. totum frequentius mammæ corpus, occu. p. a. n. s. i. m. m. o. b. i. l. i. s. est propemodum, Strumæ Glandulæ

que, neque totum mammae corpus occupant, neque immobiles sunt, sed prehensis digitis huc illucque distracti possunt: Difficile autem Glandulis & Serum discriminem poni, ac multi facile confuderint utrumque nomen, propterea quod ostenderit Galenus Strumam esse scirrhum in glandula Glandula autem quid sit, nisi induratum quasi scirrhodes tuberculum plane non invenies apud eundem virum ubilibet, nihilominus apud Aetium Tetr. 4. sez. 3. c. 5. leges accedere aliquid ad strumas glandulas: Ad omnem modum deteriores sunt plane strumae, ac difficiliiores contumacesque glandulis, imo quae longos in annos naturae & medicam entis inexcussae manent: quamquam autem per dierum intervalla rarum & momentaneum excident dolorem, ceterum immutationem nullam doloris aut tactus inferunt: Itaque falluntur hi qui affectum ejusmodi sub mamis Cancrum arbitrantur insanabilem, & curatione tantummodo fucato tractandum volunt: Porro cum non hzereat quamquam subiectae carni, concolor sit, venisque rurgentibus septus non variceat, Cancrum nisi quis inruditus, non dixerit: Itaque cum ejusmodi Tubercula mihi se offerunt, extrahenda statim propono, ne vitii mora negotium posthuc incurabile faciant:

Nimirum potest scirrhus in laxa parte, facto sacculum actionum cumulo, in affinem cancrum facillime, Severius de Abscessibus Anom. l. 3. p. 192.

*Corpus durum & compactum, &c.* Interrogum Hildanus Cent. 6. Observat. 39. esset-ne Verus Cancer mammae, in quo similis materia alba, &c. reperta fuerat? Affirmative responder. Materiam illam crassam, albam ac sevo similem, in medullis tumoris Cancro si repertam nullam asserere dubitationem verumne se cancer, quod se observasse asserit: ut plerumque tamen nucleum cancri durissimum esse, quod subcellares materis, ratione doloris in loco affecto coacta, per ulcus effluit, remanentibus crassioribus quae in scirrhum concreverunt: Quod si dolor fuerit vehemens, continuus & diuturnus, uti plerumque fit in cancro exulcerato, humores indifferenter ad partem affectam conflueret, ex quibus biliosi facile evacuantur per ulcus, uti & sanguis ipse, (quotidie enim fere sanguinem ex carnosius ulceribus exillare videre est) atrabilis vero in scirrhum, & punita in sebum concrevit, quae tractu temporis, ob malignam vim humoris atrabilis, & intemperiem calidam partis affectae, paulatim quoque in scirrhum abibit, & naturam cancri induit.

§. 7. Clinicae mulieres mammas puerperarum sacculos pulvere salviae, suberis, salis & myrtillorum, gossypio exceptos & repletos admovent: Iis quibus tenellus Pulmo & fluxionibus opportunus, periculum creant, nam inde incalescit pars, ac ob viciniam, mammae pectoris noxam communicant, si vel minima ingruat aeris intemperies: Accedit aliud à sacculi duritie malum, confusione in mamma facta, cui vix mederi licet, Id olim observavi in matrona cui ab admoto ejusmodi sacculo confusio in mamma accidit, unde emerfit tuberculum fabae magnitudine, rubrum, quod nulli cessit remedio, quia ab initio neglectum: Ter ab eo tempore peperit, & quamvis alia admota, impressa tamen labes remansit, augmentum perpetuo sumens, nedum desinens: In postrema graviditate latus affectum totum obsessum fuit Cancro, malignitatis eximiae notas ferente: Cum irritam optimorum Medicorum videret operam, Empirico se commisit, qui post partum sanitatem successuram asseruit, interim tumorem augmento prohibere stegit, nummosque emulgens, guarus vaserit mortem illico in hac in mammas irreperet successuram auferit quod etiam contigit, quia morbus statum attingerat: Matrona hae opinionis conceptae ad finem usque fuit tenax, id mali non aliunde quam à confusione facta ortum fuisse.

Ejus cadavere aperto, viscera omnia praecipua tuberculis avellanarum majorum magelludiae & rubris obsita reperta sunt: quorum origo fuit à lacte repereventium usu, post praecedentes partus eo translati, *Lodovica Borghefia, alias Bourfier, Obstetrix Gallica, Observat. lib. I. p. m. 140.*

## OBSERVATIO VIII.

*Tumor infra cartilaginem Ensisformem ab abscessibus juxta hepar. 1. Tumor juxta stomachum ob lobum hepatis illuc productum. 2. Ob lobum lienis. 3. Infra lienis regionem ob ileum flatibus distentum. 4. Ob partem ilei conglobatam. 5. In latere sinistro ob incrementum mesenterii. 6. Circa mueruatam cartilaginem ob excrecentiam in gibbo hepatis. 7.*

§. 1. **N**Ob. Ioh. Chr. à Gich ante quinquennium, ex maxima refrigeratione aerum totiusque corporis, & vehementi subitaque animi consternatione, tussi fuit correptus & destillatione, quae paulo infra cartilaginem ensiformem tumorem excitavit, qui fuit subdurus colore aequalis, & sine dolore sensimque, aegro vix percipiente auctus est: accedente vero victus ratione prava, cum insuper cutis & studiis continuis obrueretur, & necessarius remediorum usus negligenter, supervenit caehexia, appetitus dejectio, vomitus creber à vehementissima Tussi oborients: Tandem tumore illo insigniter aucto, & cute abdominis, ob illius incrementum nimium extensa, aeger curvatus, & in se quasi retractus, cum summa molestia & dolore ingredi coactus, & sae oleis stomachicis satis calidis saepius cum valentiore frictione inungere compulsus fuit: sed Tumore, tussi, appetitus prostratione, virium omnium debilitate indies magis magisque ingravescentibus, & supervenientibus insuper faciei & pedum tumoribus, ad *D. Volcherum* confugit & chirurgos: Ille tumorem istum jecitavit esse abscessum, & sectione opus fore, quod cum aeger concederet, & alii ejus sententiam subscriberent, hamato cultello, ad pugni magnitudinem elatum mollem & acuminatum aperuit:

aperuit: quo facto non sine admiratione adstantium, magno impetu eruperunt *plurima vesice*, partim disrumpæ, partim integræ, tenui & pellucida aqua refertæ: harum aliquot magnitudine erant ovi gallinæ, vel ovi columbini, nonnullæ minores quæ inter tæssendum satis longe protrudebantur: Cum his vesicis simul emanabat humor quidam crassus, visco concretus, vel etiam sevo non dissimilis, præterea aquæ purissimæ non parum: Unde triplicem materiam ad hunc tumorem, quem abscessum steatomaticum esse iudicaverunt, concurrisse existimabant: Vesicarum, secundum observationem Medicorum & anatomicorum, fuisse ultra trecentas compertum, quæ quateris vel quinis vicibus exierunt, & vix capaci satis vase, quod quatuor libras continebat, excipiperuerunt: Deprehensus est vesicas istas in abdomine, (quod D. *Falckerus* sæpius in anatome corporum sese animadvertisse perhibebat) primo fuisse generatas, deinde per violentissimam rursus in istum locum propulsas, Quia ab aliis musculis est liber, & abdominis longi musculi satis procul à se distant, & propterea facile abscessus admitunt: Estque verisimile à violenta ista concussione, & rursus continua vesicas fuisse liberatas, & ex colluvie pravorum humorum non exiguum esse generatam putredinem: Tercio die post apertionem ita frequenter vesicæ exire cessaverunt, ac sequutum est postmodum, & viscidus humor, non ita tamen copiosus ut antea, postea materia reddita est tenuior, livida & fetida admodum: Exhibita medicamenta cum purgientia tum astringentia, itemque per vices corroborantia & exsiccantia cum minimo tamen fructu: æger enim inde non quidem debilior factus, sed non sensit inde magnam levationem: mansit fastidium cibi, præsertim carniæ, rossis tamen renisit, venter intumuit, reliquis membris atrophia laborantibus, nec ausuit febris lenta, Bona tamen victus ratione, & Medicorum diligentia fere annum supervixit & tandem marasmo obiit.

Post obitum, observatum fuit primo Hepar grandius solito & colore livido, In superiore parte versus diaphragma, abscessus sese in eo obrulit plenus vesicis, & materia purrida circumdatus, quasi cartilaginosa membrana, qui corripuit Hepar & erexit usque ad Cystin felleam: Similiter in pulmonibus adhuc major abscessus inventus, fuitque purrida materia contenta in utroque abscessu, ferme 6. librarum pondere: Tercius abscessus magnitudine ovi anserini, infra Hepar ad intestinum colum erat annexus, cujus membrana erat pariter densa: Meatus iste felleus in intestinum quoque fuit intercepsum, & in ejus exitu collecta materia puris albi, in peculiari abscessu magnitudinis ovi columbini: Cui satis naturaliter sese habuit, attamen exangue, inque loco sanguinis fibræ nigre, viscidæ sunt reperiæ: Ventriculus, lien renes, omnia adhuc fuere integra. *Ex Observationibus Joachimi Camerarii.*

**P** *lurima vesice*] Que ortum debeat vas glandularum serosis ab *Olaus Rudbeck* repertis hæc p. n. affecta varios possunt inducere morbos, præsertim, humore aliquo viscido, crasso vel mucilaginoso, obstructa, Alciæ, &c. Siquæ illa, quæ inter

musculos abdominis & peritonæum repunt, aliquo obstaculo ocludantur, vesiculæ eo loci generari possunt, ruptæque tumorem hydropicum intercutem, musculos & peritonæum facili negotio procreant.

§. 2. Famulæ febre lenta affectæ apparuit circa stomachum Tumor rotundus, itaut ibi apostema esse videretur, Inventus est lobus Hepatis supra stomachum ascendisse. *Vide titul. de Febris.*

**C**irca ventrem Tumores fiunt vel in toto ventre, & erit Hydrops, vel in aliqua parte, ut inter umbilicum & Xiphoidem, in quo frequentissime decipiuntur Medici, Nam ventriculi tumorem potissimum oris Ventriculi esse credunt, Verum situs, durities, gravitas, & quæ consequantur hepatis affectionem, ut cachexia, Jecoris tumorem indicant: Quod

si enim febre & dolore est inflammatio, si durities est simul cum febre & dolore, scirrhosam inflammationem denotat. Possunt etiam ante febrim scirrhum perferre: Tumores autem ventriculi magis paulo supra umbilicum, & cum inflatione ac tensione potius, quam cum duritie esse solent. *Rondeletus de Dignosc. morbis cap. 10.*

§. 3. Nobil. Dom. N. Obstructionibus hypochoadriorum & tumoribus ab adolescentia obnoxius, tandem in hydropem lethalem incidit: Dum confectus rentur à Medicis præcordia, obvius fit tumor globosus in epigastrica regione, ad levam deflectens, cuti concolor, indolens, pommæ medio cre per medium dissectum referens: quem ante plures annos se gestare asseruit: Inspectis visceribus, exhibuit se Lien impense magnus, hypogastricam regionem attingens, cui adnata erat ecchyli illa exterius protuberans. *Vide lib. 3. tit. de Ventris Tumoribus.*

§. 4. Mæmini me vidisse ægrum, cui infra Lientis regionem enatus Tumor durus, quem per duos annos possit: Medici qui illum sub cura habebant, quia multam urinam emittebat, foribus & lithibus Tumorem illum discutere nitebantur, sed irritis remediis, & superveniens aliis accidentibus obiit æger.

Ego vero causam sciendi avidus cadaver aperiri jussi: Tumor ille exrendebatur usque ad extremitatem llei intestini, quo aperto nihil præter feces admodum induratas reperimus, quarum pars ex intervallis, ratione ponderis exercebatur; rotunda, viridescens &



durissima, sed clysterum ope : Iacensus autem calor proximæ Aortæ advenientes novas feces indurabat, quæ prioribus adjungebantur. *Sanctorum in Artem partiam, p. m. 611.*

**S**imili in casu idem improbat acres clysteres, foras & inunctiones calidas, quæ ulterius materiam exci-  
cant; Exhibet oleum amygdalinum ad uncias *xxxviii*:  
nis vicibus : Enematis utitur ex eodem oleo & hinc.

§. 5. Pueri triennis intestina turgida & lucida sunt reperta : Una tenuis intestinalis pars intra se contracta ac convoluta erat, quasi in se infarcta, ut duritiem quandam, tanquam Tumoris speciem referret. *Vide lib. 3. tit. de Ventris Tumore.*

§. 6. Scetus dolebat in hypochondrijs, lumbis &c. Supervenit Tumor circa costas notus sinistri lateris ad os xiphoides prominens : Induruerant pancreas & mesenterium, & in molem supra modum laram, longam & crassam excreverant &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 7. Matronæ aderat Tumor durus ad tactum circa mucronatam cartilaginem, coniciens, oblongus : Gibba pars hepatis videbatur tanquam novum corpus sinæ superstratum, à qua dependebat Tumor oblongus instar pyri. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

## OBSERVATIO IX.

*Tumor & elevatio costarum, ob Tumorem intra pectoris cavitatem. 1. Bubo sub axilla sinistra à Iecoris abscessu ortus. 2. Tumor totius in phthisico à causa abdita. 3.*

§. 1. **C**uidam costarum Tumore suborto, folliculus membranaceus citrea jugulum, aque bullis nigris, & massa triū librarū cancer laminatim concreta refoertus, costisque affixus deprehensus, una cū aqua in pectore & saniosis pulmonibus visis. *Schenckium Filium in Observat.*

§. 2. Præf. Adr. Spigelius à vivis sublatus cum Bubone sub axilla sinistra: Repertus abscessus in concava Iecoris parte. *Vide tit. de Febribus.*

**C**um Bubone sub axilla sinistra] Bubones tumores sunt in Glandulis oborti, sed conglobatis non conglomeratis; quamvis enim in plurimis corporis partibus sibi adhaerent hæc binæ Glandularum species, afficitur tamen sepe numero alterutra in sua integritate permanente altera : Ita serophule, earumdem glandularum affectus, non tantum in collo, verum in ipso mesenterio, glandulas conglobatas tum scotissim exsistentes, tum glandulis salivaribus & Pancreatis conglomeratis adnatas occupant illæsi huc : Sic in Peste conglobatas artuum glandulas in collo, ad aures, sub axillis in inguinibus, & alibi quoque, ubi aliquæ tales observantur obstant Bubones, integri conglomeratis, hoc est, simili tumore haud correptis, quamquam has, licet in peste non teneant integritas esse non credamus; cum sanguinis massa in hoc officium mire afficiatur & corumpatur : Queritur proinde

de quæ sit Glandularum conglomeratarum & conglobatarum differentia, propter quam ab eodem sanguine ad utraq; effluente afficiantur ita conglobate ut in Tumorem, Bubonem dictum abeat, sine tumore permanentibus conglomeratis : Respondeo cum affectio illa non peti possit à sanguine eodem ad utraq; glandulas delato, rationem petendam esse à diversitate Glandularum sanguinem eundem adnutrentium, eo quod conglobatarū substantia sit mollior & tenerior, conglomeratarum autem salivarium, & pancreatis, solidior ac durior; cum sit igitur mollior & tenera conglobatarum substantia, facile illis adhaerent, & minus ab ipsæ expellitur quicquid acre est in sanguine, aut quovis alio modo vitiosū, & inde diversi oboriuntur ita sepe in ipsis Tumores *Sylvius de le Bœ Append. ad prax. Tract. 2. §. 449. Et seq. De Bubonibus pestiferis ex eodem vide Icholia ad §. 14.*

§. 3. Joan. N. tabidus interijt: in pulmonibus nihil eorum memorabile reperitur quod mortem attulerit: decem ante eam diebus tumidum corpus, sed Tumore fugaci fuit: *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

## OBSERVATIO X.

*Tumor in Abdomine à duobus tumoribus cancerosis in hepate. 1. Plures Tumores à tumoribus in mesenterio. 2. Tumor in situ ab intestinis extra situm. 3. Ad umbilicum à rupto peritoneo. 4. A scirrhus fundo uteri adnatus. 5. Ab omento conglobato. 6. A pure inter musculos transversos obliquos conclusa. 7. Ab Hepatis Abscessu. 8. A parte Lienis indurata. 9. A Rene excrecente prope umbilicum se efferente. 10. Tumor circumscriptus circa umbilicum à prolapso illuc hepate. 11.*

§. 1. **V**idua N. habebat Tumorem in abdomine versus umbilicum, ad dextram partem inclinantem, durum: In extremo Hepatis adnati erant duo tumores cancerosi, usque ad umbilicum prominentes, pugni magnitudinem æquantes, fere continui : In Hepate esse non purabantur, quia non erant in hepatis loco naturali &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 2. Nicolaus N. varios Tumores circa umbilicum, premens manibus, peteiepiebat : In mesenterio sex tumores tunicati deprehensi, pugnum aequantes. *lib. 3. de Ventris Tumore.*

§. 3. Fortis diversis cum visceribus extra naturalem abdominis cavitatem propendentibus natos Medicorum solertia nobis commemorat : Quod xij abhinc annis videre mihi datum fuit referam : dum nempe primiparæ, hæc in urbe, vivum enixa fuerat puellum, prope umbilicum in sinistro latere, rotundo tumore, & caput infantile magnitudine multum sperante, deformatum, qui tamen sacro ablatus fonte, paulo post interijt,

Quare ut adpareret quid intus aleret tumor ille, apertio ejus fuit concessa, ubi portio intra magnam intesticorum inclusamprehendimus, copiosa flavesciente aqua abdominis viscera, ceterum naturaliter se habentia, nec ullâ labe deturpata, circumfluente: Innotuitque una cum peritonæo tendinosam illam musculorum abdominis partem, quæ lineam albam constituit, fuisse disruptam, sicque per datam portam erumpentibus intestinis, extensioni spæm cutis substantiam celsissè, ac tumorem istum, ob regionem umbilicalem, quam occupaverat, inter omphaloceles referendum: In cujus causam occasionalem cum inquireretur, non nisi à saltu in terram è loco altiori circa finem gestationis facto, rupturam illam accidere potuisse, Puerpera retulit; damno suo confirmans quantis gravidæ subinde exponantur periculis, dum præter tot morborum, quibus obnoxie sunt, molestias, facile etiam levissimo quandoque ab errato nexum fetus indelebilem imprimunt &c. *Lucas Screeckius Junior. L. Filium in Miscell. curios. annon. 6. & 7. 341.*

§. 4. Primiparæ difficilis partus contigit quia inferiore adhuc abdominis parte erat tumida, obstetrices alium adhuc latere foetum dicunt: Ego omphalocelen adesse pronuntiavi cum uteri hydrope: Sectione facta umbilicus ruptus, ac uterus aqua plenus reperiuntur. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. Uxor N. grvida partui proxima, Tumorem durum, magnum, quem obstetrix caput infantis esse putabat, in sinistro latere, è regione umbilici gestabat; Scirrhus erat insignis magnitudinis in fundo uteri incipiens, *Vide tit. de partu difficili lib. 3.*

§. 6. In Nobili adolescente, annos 19. nato, Omentum versus umbilicum ad formam orbiculi, latitudine palmi conglobatum multis glandulis differtum observavi, quod totam illuviem exceperat, Liene consumpto, & Mesenterio ac Pancreate putrefactis ex abscessu. *Riolani Anthropol. lib. 2. cap. 13.*

**S**æpe observavi, ait *Riolani Anthropol. lib. 1. cap. 13.* Tumores abdominis prominentes versus umbilicum, qui neutiquam fiebant ab humore intra musculorum à abdominis spatia conciuo, Ab omento multis humoribus, facto & ferreo producti, quod est annotatum ab Hippocr. lib. de Loc. in homine, ubi *vasa pinguedinis vacua fuerint, & à splene florente ac angustante in omentum defluerint, ut pote vicinis valde exsiccatis, & vasa habens eoque vacua &c.* Apbor. 37. lib. 7. id aperte declarat, Quibus hepar aqua plenum in omento eruperit, sic ventris aqua repletur, & moriuntur. Et *Hydrops*, ait idem L. de morbis mulier. incalcescente Liene, & obibente aquam liberaliter hauriam, quam tandem in Epiploem deponit: Et lib. 4. de morbis, asserit vitio Lienis Hydrope fieri: Et a sinistra, ait *Galenus lib. de Atra bile*, existimabant Omentum Lieni adnexum esse

se instar Mesenterij, ut sordes ejus visceris exciperet: Lucetia inventum fuit in Epiplois, ad vesicam utique pendentis, membraneo quodam veluti sacco, apothema pure ibidem conservato distentissimum, ex *Rousselle* lib. de Partu Cæli. Non mirum igitur si omenti substantia facile augeatur & intumescat, & quamvis tenuissimum sit in tanta ténacitate dum humoribus differtum est, insignem crassitiem acquirit, æqualem peritonæo, quod sæpe observavit idem *Riolanus*: Itaque ob adhesionem quas habet omentum cum hepate, ventriculo & liene, huiusmodi ab his partibus in ipsum derivari possunt: Vidit Aquapendens omenti marsupium universum, atro crassoque humore repletum: Imo status bypochondriacos, in melancholia fluctuante Diocles, hac cavitate concludi, & sinistra parte percipi certum est.

§. 7. Reverend. Episcopus Colonienfis D. Antonius, ex Comiribus à Schauenburg, constitutione corporis sanguinea, circiter annos xl. natus, ex alia febre in qua tanam incidit, in Autumno anni 1557. Aqua ubi circiter verum tempus nonnihil respirasset, huic neutra adhuc valetudine freto, se insinuat Ambrosius ille Magyrus, annuis mendacium libellorum vel prognosticorum: plaustris nimis natus, qui cum quidem graviter laboratum prædixit, evasurum tamen si à medicamentorum usu caveret. Interim venam illi pertundi jubet balneumque præscribit, confusus hic prognostico; opem Medicam tandiu respuit, donec à capite & finitimis partibus primum circa sinistram scapulam decumberet humoris copia, qui neglectus lento refluxu musculos ventris sinistro intersecevit: ubi excitata phlegmone, pus genitum copiosum putridissimumque continuas partes decubitu assiduo vitiauit, tandemque ad lævum perinzi latus resedit cum tumore, qui à Chirurgo sectus ingentem fetidissimi puris quantitatem reddidit: hoc tamen postea nonnisi ventre compresso fluxit, quare viribus indies magis ac magis flacciscentibus, post septimanas tres, de ventris inferioris incisione, ex cujus sinu pus defluere existimabatur, ab ijs serio agitur qui curationi intererant: Ego eo ablegatus, vulnere conspecto; corpus emaciatum, viresque impendio prostratas, cum pulsu debili, ac de hora in horam magis inclinante, comperi: Quare nihil spei in sectione ponendum esse, sed extrema imminere judicavi: hora matutina mortem proximam significavit plusus interceptus: paulo post hic in Domino obdormivit.

Ventre circa umbilicum inciso, tanta copia puris putridissimi effluxit, ut ex ventris plenica vo id exundare jam crederent, qui antea in ea opinione fuerant: At sectionem prosequuti, inter musculos transversos & obliquos cloacamprehendimus: In sinistro autem latere cor erat flaccidius, ex gravi & continuo exhalante ferienteque vapore putrido; Atro adhuc sanguine nigricabant venæ corcingentes: In vesicæ collo coctum delitescbat pus album, quare

ne urinam continere potuit aliquandiu, quod ad calculi lationem referebatur, sed aliunde id contractum apparuit: In ventriculo quiddam instar humoris biliosi innatabat. Reliqua viscera, uti & universi corporis partes, videbantur illaesa. *Videtur lib. observationum.*

**S**i a medicamentorum usu caveret) Observavit tamen *Balloonius* tempestatem quandam (paradig. 132.) in qua magna fuit Quartanarum seges, ac quibus sepe adhibita medicamenta & pugnatum remedijs generosioribus, ijs omnibus productum fuisse febrem: qui verò remedia neglexerunt principio exacto, eos intra breve tempus incolumes exitisse: Item anno 1571. multos quartanarum decubuisse, ac eos qui sine remedijs destituti sunt omnes pene convalescere: quibus curiose adhibita remedia, eos fere interijssent. 1. *Epist. & Ephem. p. 27.* Quisquis ergo videtur illi Ambrosio *Magistro Wierum*, Sed distinctio Quartanarum adhibenda & subjectorum quibus insident: Prima illa tempestate (anno 1581.) verè fuere Quartanae & primaræ, alteri non. Incedentes febri, ut in *Illustr. Episcopo*, qui ex alia febre in Quartanam incidit: In altera tempestate eos adhibitis remedijs fere interijssent refert qui macilentis biliosisque forent, quod febres istæ potius à bile essent ulla quam à force sanguinis: Cum ejusmodi mitius agendum esse constet, nec remedijs bilem usam offerendam: *Illustr. autem Episcopus san-*

guineæ memoratur fuisse constitutionis, cui plethora in cacochymiam abiit, utriusque remedijs purgationis scilicet & sanguinis missionis indigens, quorum neglecta copiosus & congestus sanguis, cacochymia imbutus, in musculis imi ventris decubuit, ibique lethalem abscessum induxit.

\* *Lento defluxu musculari ventris sinistri &c.* Fuit Tumor in musculis epigastrii, qui hoc nomine discernuntur, quod musculi figuram quandam revincunt cui insunt: Sunt magna ex parte abscessus vel scirrhi, & magis sub umbilico quam superiori parte, vel quia humores facilius decumbunt in inferiorem vel quia vena inferioris partis oriuntur è venis ortis à ramis venarum, ex quibus vena colli uteri oriuntur, quæ crassiorem & magis melancholicum sanguinem continent, ob id virginibus & viduis isti Tumores frequentiores sunt, & magis sunt in medio ventre, scirrhi vero supra, aponeuroses musculorum, abscessus autem magis ad latera vergunt & inter musculos obliquos vel inter transversum & obliquum ascendente. *Rondeletius de diagnosi morbi c. 10. pag. 664.*

§. 8. Quæ parte recti musculi ad sternum pertinent, puero cum abscessu in ventre Tumor manifestus, digito eedens obrigit: Vocati fere omnes judicant abscessum in rectis musculis: alij in ventre, quia attenuato vehementer puero & consumptis musculis facile eminet tumor: Paucissimi in Hepate, quod quibusdam Hepar totum ventrem ad partes sinistras pertendat. Aperto loco exitus virosus & graviter fetens, corrupto peritonæo: Abscessus sedes in parte Hepatis, quæ illis perveniebat, Quod magis apparuit mortuo & dissecto puero, *Hollerus libello observat. §. xxx.*

§. 9. Ante annos quatuor venit *Laufannam* mulier 30. annos nata, Tumore magnitudinis infantis in sinistro latere sub umbilico laborans; rotundus erat ille, & facile ex una in alteram partem ducebatur.

De hoc Tumore multæ variæque fuerunt opiniones, Tandem mortua per dissectionem à me adhibitam veritas annotuit: Invenimus enim Lienem adeo magnum ut inferior pars ipsius (quæ in tumorem rotundum indurata erat) ad os pubis fere propenderet *Fabritius Hildanus Epistola lv.*

**E**pistolam integram, quæ multa & quædam Tumorum durorum, & eorum qui abdomini innascuntur, horumque curationem complectitur, notari dignissimum, exscribere placet, Si affectum illum, de quo scribis, videre (summopere enim in hujusmodi affectibus requiritur ocularis inspectio) & manu mihi tractare liceret, sedem ipsius invenire non usque adeo esset laboriosum, ut arbitror; Tumorem tamen hunc ex causa primitiva originem traxisse rationi consonum est, quandoquidem equo dejecta mulier, facile inde sequi potuit confusio, confluxus humorum, tandemque Tumor, qui quia contractu durus est & doloris expertus, forsitan aliquid de natura scirrhi contraxit: Ad scirrhi tamen generationem longum requiritur tempus, ideoque si recens est morbus, vix scirrhus tumoribus erit annuum crandus: Sæpiissime mihi occurrunt Tumores rotundi, tactu duri & doloris expertes, in quibus nihil reperitur præter aquam; quæ durissima membrana continetur. Horum Tumorum unum ex abdomine puellæ novem annorum excidi, quæ convalescit: Oriuntur item Tumores ex pituitosis humoribus, qui nihilominus tactu sunt duri: In Matronis tumore ex contusione ortu ad carpum dextræ curavi, qui adeo durus erat ut ab omnibus scirrhus excisus iudicaretur: Aperto tumore humorem lactido non abfimilem ex eo extraximus, qui aeri expositus intra xxiv. horas in lapillos concretus est: Me-

branam quoque postea extraximus densissimam: In hujusmodi autem tumoribus membrana extenditur humore, non secus ac instat a vesica, quæ & tactu dura percipitur, quamvis nihil præter statum continet: De sede autem Tumoris, de quo scribis, nihil certi ausus statueré, cum ad id inspectio ocularis sit necessaria: Quia tamen in extrema parte abdominis percipitur tactu, & ipsius magnitudo facile circumscribi potest, utero vix inhaeres existimo: Vterus enim dorso incumbit ossi item sacro & lumbis annectitur, adeoque intestinis obregitur, ut in ipso tumores & scirrhi nisi in maxima magnitudinem exceverint, exteriori percipi non possint: Ego in dissectionibus aliquoties scirrhus satis grandes in utero inveni, qui tamen cum in vivo essent exteriori non percipiebantur: De mesenterio idem statuendum: Neque si in Vesica lateret Tumor ille, facile perciperetur tactu; Vesica enim mole viscerum intestinorumque sub osse pubis deprimunt: adeo ut in ipsa tumores & calculi, quatuorvis magni fuerint, in extrema parte ventris non appareant, nec manū apprehendi possint: Sed & excreta urinæ maximam pariunt difficultatem tumores in vesica, ut in illa virgine nulla, aut saltem exigua est difficultas: In Omento scirrhus nunquam, phlegmones aliquoties mihi videre contigit in ipso tamen omento generum tumores posse oriri non dubito, sed exteriori percipiuntur: Vide quoque Tumores & Absces-

ins inter mufculos abdominis: Ante aliquot annos vocatus sum ad Marronam quæ de dolore magno è regione ventriculi aliquantum ad latus dextrum congrebaratur: Ego tactu Tumorem ad latus lineæ albae, sub mufculo recto, apprehendi, quamvis exterius nihil appareret: Aurhor fuit ut mufculus & cutis ufque ad abfcelfum incidereetur: Spectrum vero confilium, quod nullum indicium abfcelfus conspicuum efferet; non diu post ad interiora ruptus est. In vacuum ventris deflaxo humore, de novo exorta est febris, leiporhythmia & dolor magnus sub umbilico, ita ut paucis post diebus è vita decesserit: Sabandos quadragenarius & robustus, ex contufione Tumorem sub regio-

ne hepatis contraxerat: laborantem inventi febris, ardore magno, nansea, gravibusque alijs symptomatis: Summam, sed frustra, adhibui diligentiam ut in halitum resolveretur materia, tandem inter peritonæum & mufculos abdominis materia conflavit & abfcelfum excitavit, qui exterius vix percipi poterat, Abfcelfum incidi, unde pus foetidum effluxit; ulcus per mentes aliquot apertum servavi, donec tandem sanitatem recuperavit: Ex jufmodi autem tumoribus abdominis, difficultatem aliquam in excernendo urinam confequi poffe rationi consentaneum est; quantum enim ad expulfiorem urinae faciant mufculi abdominis, omnes sciunt: Anatomici.

§. 10. Interdum Ren dum extuberat supra modum, versus umbilicum prominet, quod scirrhofum mefenterium æmulatur, *Riolanus Anthropol. l. 2. cap. 26.*

§. 11. In Nosocomij nostri Pædotrophio Vienna, infans natus cum tumore circa umbilicum ad pugni magnitudinem, coloris lividi: Chirurgus loci, omphalocœlem gangræna tactam ratus, medicamenta calidiora gangrænam, & tandem sphacellum compescencia applicuit, inde aucta inflammatione miscellus expiravit, Medicus ordinarius, D. D. Vesinus, aperire cadaverculum jussit.

Inchoata sectione ad Tumorem dictum, vixque cuspide cuspelli adacto, jam Hepatis substantia in conspectum prodijt, Inde parebat Tumorem ex prolapso Hepate (forfan à conformationis vitio) & non ex umbilici protuberantia ortum traxisse, divulsa linea candida quæ inter rectos mufculos constituitur: Cum vero mihi eadaverculum pro confectiione sceleti concessum efferet, præter inflammationem Hepatis, ac dispositionem gangrænosam in mefenterio, observare mihi nihil lieuit insoliti ac curiosi *Laurent. Folschigel Miscellan. Chirurgicalium anni 1671. Observ. 88.*

## OBSERVATIO XI.

*Tumores in Hypogastrio, vel interfemineo à Renibus suppuratis interdum excitantur. 1. Tumor supra Inguen à fetu ibi collecto. 2. In Inguine à copia puris ibi collecti. 3. Hypogastrij à scirrho in vesica. 4. A sciatomate prope vesicam. 5. Inguinis apostema vermicibus scatens. 6. Infra Inguen ob putrem pulmonem è regione mali. 7. Circa pubem incipiens, ad umbilicum extensus, à materia purulenta inter duas tunicas mefenterij collecta. 8.*

§. 1. Abfcelfus mufculorum abdominis, qui fiunt in imo hypogastrio, antrosum vel retrorsum, vel etiam in interfemineo, sæpissime accidunt ex suppuratiõne renum, transfusa & delabente purulenta intra duplicaturam peritonæi, ut à nobis multoties observatum fuit in apertione cadaverum post obitum *I. Riolanus Anthropol. lib. 2. cap. 24.*

§. 2. D. Contia gravis facta, paulo supra regionem inguinis dextræ, Tumorem cum duritie ovi magnitudine habuit. Dissecto mortuæ latere fœtus quinque pollices longus reperitur &c. *Vide lib. 3. tit. de Hypogastrij Doloribus.*

§. 3. Rudolphus N. cum dolore intestini coli, Tumorem mollem habuit in inguine dextro, ibi, in principio coli, ingens fuit eumulus puris, quod partim eo descendit, partim procreatum est. *Vide Tit. de ventris dolore, lib. 3.*

§. 4. David N. Tumorem durum è regione Vesicæ gestavit: Schirrhus magnitudinem ovi gallinaeci adæquans in ipsa vesica deprehensus. *Lib. 3. tit. de Ischuria.*

§. 5. Olzus N. circa inguina Tumorem gestavit exiguum qui in magnam molem exerevit. Prope sinistrum vesicæ latus tumor comparuit, capitis virilis magnitudine, vesicæ adnatus. *Vide lib. 3. tit. de Ischuria.*

§. 6. Vidi in Puella Tumorem magnum inter Ilia & Inguina, quem incidendo Chirurgus quidam, me præfente, reperit plenum vermicibus: Quidam miles Mutinensis in Hospitali Carmelitano habebat multos Tumores intrinsecus & extrinsecus, quos vidimus post ejus mortem (nam ex illis mortuus est) qui Tumores erant pleni Vermibus parvis, qui videbantur pediculi. *Gab. Fallopius de Tumoribus p. n. cap. 4.*

Resectam didici ab Illustriss. Dom. de Mayerne mulieri mammam Carcinomate affectam, quam cum microscopio examinaret, infinitos vermiculos animadvertit: Hinc forte ratio deduci potest cur mulier, de qua *Mauritius Cordæus* comm. 7. in lib. 1. *Hæper. de m. m. Cancro* ulcerato rotam faciei partem

dextram depascente liberata sit, continuo ad motus pullis gallinæcis in laminas discissis: suavitare scilicet carnis allicti vermes illi adhæserunt, relicta infuaviori. Ideoque crebra admotione factum ut adhærentibus vermiculis, pars affecta ab illis liberata sanitatem consequuta sit.

§. 7. Dom. *Crozonius* querebatur de Tumore paulo infra inguen oborto, & ad natem propinquum: dolorificus erat, diuturnus, digitis cedens quidem aliquatenus; sed eorum non manebant pressa vestigia, ut in *phymatis* phlegmaticis: Diutina præterea quadam *inssi* molestabat: Tandem cum dolores multos sustinisset, & ad diartem à Chirurgis male revocatus fuisset, temporis successu Tumor, qui summam natem occupabat, in suppuratum est versus, pus in profundo delitescat: Excreta tanta copia ut omnem fidem & opinionem superaret. Mortuus est, Pulmo inventus est patris è regione ipsius mali. *Ballonius consil. 46. lib. 2.*

**P** *Hymatis*. Quibusdam visum est esse, in ipsa præsertim uate, meliceris, sed argumenta & signa ejus non relucebant. *Idem.*

*Tussi molestaretur* ] Inde arrepta occasio inquirendi. fontem & principium mali dictum Tussicuculos nonnunquam abscessu ad scrotum oborto capi ac detineri, id quod huic conrigit: Et quæ materia & obsecit scrotum, & obfessum tenere potuit, majore sui parte abscessit in inguæ & propinquas contiguaque

partes: Et cum natura esset melancholicus, Tumores isti ad Varicosos potius accedebant, & nonnihil de natura Luparum retinebant. Magna vero posita est vis in diuturnitate ista tussis & natura temperamentoque ipsius ægri adductus est locus ex sect. 1. lib. 1. Epidem. hac maxime pertinet. Nec repugnat rationi ut tussis diuturnæ cesset quoniam testis inuenit. Et Testis tumor à tussi cessit ac allevatur: quod mirum esse debet. *Idem.*

§. 8. Cuiusdam circa pubem Tumor prognatus qui vesicæ orificium compressit, interdum augēbatur, interdum minuebatur, unde causa statibus adscripta: ita tamen tandem auctus ut sese ad umbilicum & lates sinistrum extendit. In mortuo inventa collectio materiæ purulentæ inter duas mesenterij tunicas, quæ occupat majorem inferioris ventris partem: *Vide lib. 1. sect. 9. observ. 37.*

## OBSERVATIO XIII.

*Tumor in Dorso ad suppurationem deductus, pus ad thoracis cavitatem effudit, in quo Empyema indicit. 1. Spina Dorso Tumor flammulentum salvis visceribus. 2.*

§. 1. **A** No 1670. Tumoris mulieri in Dorso juxta vertebra enatus Tumor ex meliceridum genere, capitis infantis magnitudinem æquans, qui tandem mortem induxit. Aperto cadavere, cavitatis pectoris pure repleta reperta est, quod erosa pleura & obvijs membranis & masculis viam in dictam locum sibi fecerat, ex illo tumore effluxum. *Ex communicatione D. Bailly Chirurgi Genov.*

§. 2. Dom. de *Salinis*, Nobilis Benearnensis morbo chronico diu derentus, tandem inflammationem gutturis, & Spinae dorso Tumorem passus est, quibus perijt. Dissecto cadavere omnia viscera sana reperta sunt, & Tumor ille dissectus nihil nisi ventum emisit.

**N** *isi venientum* ] Necessè est igitur venenatam quandam in hoc vtro inclusisse auram: Vel aërem ibi à calore debili genitum & corruptum medullam infestasse spinalem, cujus affectus pericu-

lissimi sunt, quia substantia eadem qua cerebrum consistit: est enim cerebrum oblongatum & ejus appendix. *Petrus Borellus Observ. 28. sent. 1.*

## OBSERVATIO XIII.

*Tumor in Lumbis à medulla spinali nuda obortus. 1. Ab abscessu in Rene vicino. 2. Tumor in Lumbis varias nervorum propagines habens. 3. 4. Tumor è regione Ollis facti, per ductum hepatis insertum. 5.*

§. 1. **P**uella præfecti cujusdam in Marchionatu, cum septimanatum esset citet xvij. anno biennium aperta fuit. Mater dum utero gestaret, de scalis delapsa super dorsum, dein tetrore percussa ex conspectis cujusdam gravissimis ulcetibus, puellam hanc conventi tempore enixa est, cui spina dorso perfecte luxata erat. Supra vertebra lumborum Exerescencia magnitudine ovi, mollis, diversi coloris, cui secundinam applicarunt, cataplasmata apposuerunt, tandem meum consilium triduo ante mortem experire: Cum viderem Exerescenciam hanc vesicæ instar humore repletam, & meruerem ne forte ex actiori humore ossa laderentur, ut aperiretur suaseram: Ipsi resistētibz, jussi applicare ol. chamæmel. & rosar: ad doloris & caloris mitigationem, quod cum ea nocte ter applicatum fuisset, rupta vesica materia serosa, purulenta, foetida, effluxit & vesica concidit; Altera die abstergentibus & anodynis, uti jussi: Tertia die convulsionibus correpta obiit.

Aperto ergo loco affecto, meatum nullum qui ad abdomen penetraret reperi, licet essent qui existimarent urinae portionem ex vesica eo deferri: Verum ipsam spinalem medullam denudatam reperi, itaut duz verberæ lumborum desiderarentur, integris reliquis existentibus. Offane hæc ab ipsa materia foetida acri fuerint putrefacta dubium apud me est, cum nulla ossium frustula à me fuerint reperta, nec in reliqua vertebrarum parte lachry-

nem observare potuerim. Facile ego patiar mihi persuaderi naturale hoc esse vitium, idque excelsi matris. Ex observationibus Clar. Viri Caspari Bauhini.

§. 2. Rogatus una cum Chirurgo hujus Civitatis, accessi, puellam 9. circiter annorum, quæ Tumorem insignem habuit in dextro latere circa lumbos: Diu illam traiecit Chirurgus emollientibus, tandem me præsentem aperire decrevit, effluxitque ex inflicto vulnere puris cum sanguine permixti sat magna copia: Abscessus apertus deinde convenientibus remediis tractatus, sed elapsis tribus septimanis vitam cum morte commutavit pateriens.

Apertum cadaver nihil aliud notabile exhibuit præter renis dextri conformationem: Illius namque parenchyma plane consumprum erat, solat restare pelvi magna, crassa, dura & sabulo plena, ex qua egressus nriser itidem magnus & crassus, qui antequam desineret in vesicam, sabulo fragmentisque minoribus lapillorum repletam: Utereris autem parietibus sat firmiter adhæsit calculus, figura & magnitudine caryophylli aromatici, istus habens materiam nigricantem quasi pro basi, quam omnes circumstantes mecum pro concreto sanguine habuere, cui extrinsecus adnatus cortex albus inftar sacchari candi, aut tartari crystallati pellucidus.

**F**orte grumus sanguinis ab exulcerato rene ad vesicam tendens, in via adhæsit parietibus ureteris, qui successu temporis à præterlabente sero sabulo sensim inersatus, grandior adhuc evasisset, si diutius supervivisset mortua: Non enim novum calculos in vesica aut renibus, insularum more fieri, quæ ex parvis initis sabulosis, medio in flamine, dum subinde positis fundamētis aliquid accedit tenui, aliunde vi atque impetu aquarum avulsæ, in ignotum excrevit ambitum. Sic dum grano

arenæ in renibus aut vesica aliud adjungitur granum, huic aliud, aliis alia, calculus inde excrevit non ultimar magnitudinis, sic acui cranali adnatus lapis. Vide *Barbolicum* cear. 2. Epir. 78. Quæ generandi modum demonstrant pelliculæ illæ quibus inftar capæ componitur calculus, quæ si recentes & friabiliores, tandem separari possunt, donec ad centrum & primum calculi ortum fuerit perventum. *Carolus Rayger in miscell. cur. ann. 1672. Observ. 185.*

Afferam hic exemplum accurata bilance ab anatome penculatum, Tumorem videlicet rapiformem in lumbis, scetui in vulva enatum, ob rapam prægnanti matri improvide denegatam: Cujus repulsæ ergo lumbos suos ubi percussit, mulier animi impotens læsit tanto peritellum fœtus sui corpusculum, ut inde in lumbis enata sit ipsi insignis rapa: quam angustiori pediculo innixam quo auferret Chirurgus, constitinxit eam arctissimo filo, deinde stragens emortuam scalpello excidere, Verum antequam res eo devenit, jam emoriebatur infans.

Cujus defuncti cadaver ubi perscrutata fuit anatome, vidimus spinæ medullam plane læcetam, & nervorum propagines tam varie per tumorem dispersas, ut non fuerit in manu Medica excrecentiam hæc quoeunque modo demere quin protinus demeretur & ægro vita, à qua se vitia propterea sedulo deterrendi erunt Chirurgi, quoties se offeret similis tumor jam sexties nobis visus. *N. Tulpus Observ. lib. 3. cap. 30.*

§. 2. Pauperecula 7. mense prægnans, cecidit supina in lumbos, sed sine evidenti cutis noxa: at infans in lucem editus habuit insignem Tumorem in lumbis, quo ad aperto effluxit ipsi quidem frequens aqua, sed non minus ipsa vita.

Qua sublata, vidimus spinæ vertebrae ut læceras sic late à se laticem disparatas, & nervos spinalis medullæ tam perplexo errore per tumorem dispersos, ut vix ullibi possisses scalpellum sine manifesto vitæ periculo: *Idem.*

**P**regnantes cecidit, &c. mulieribus gravidis ut plurimum damni dant repentinas terrores & inopinatum infortunium, sic nihil æque illas offendit atque impotens repulsæ, aut gravior aliquis lapsus. Indens impetu vel hanc vel illam corporis partem: Cujus instantis licet flocci penemito faciant prægnantes, plurimum tamen detrimenti capit inde fœtus, etiam debite formatus quem talia infortunia tam tuncipiter nonnunquam deformant in ipsa valle, ut nulla arte id postmodum dispellat. In quo certe apparet impervestigabilis Dei potentia, cui æque facile est hominem immutare ac formare.

*Insignem tumorem* Obulit se nobis hæc diu post similis Tumor, sed dissolutus in ipso partu, eventus tamen æque infelici, cum ob gangrenam consumment illico effractus laceri tumoris oras, tum ob den-

datos nervos per tumorem passim dispersos, quos circumlitans atrædo immuraverat, ut non liceret infanti vitam protogare ultra diem tertium.

*Uix posuisset scalpello, &c.* Eam calamitatem si quidem reformides Chirurge, cave sis impio vide unquam apertis quod tam facile occidit hominem: Sed notes idem pediculum quod hic animadvertum in lumbis, utique evitandum in molli illo tumore qui insidet nonnunquam dilatatis calvarie furtis, in quem novacula directæ ledit facillime cerebrum illic effusum, Et nihil sequitur cogitans noxas illi cui veteras auxilios: Quoad eius itaque in tantis tenebris fieri poterit uteræ circumspeditione, & consue potius in tumore tam ancipiti ad emplastra & fomenta discutientia quam ad sectionem vite humane adeo penitiosam. *Idem.*

§. 3. Anno 1608. Matrona Paterniacensis gravis, cum artolagasos, qui velox ventolastato exuberant, avidè appeteret, nec concederentur, reliquum gestationis tempus

multis cum molestiis contrivit. Tandem xx. Martii puellum non tantum supra modum debilem & extenuatum, verum etiam rei appetitæ signatum peperit. Nam è regione ossis scapulae Tuberculum habebat, quod horum artolaganorum formam omnino præ se ferebat, id ovi asserini magnitudinem elevatum, inæquale tamen, aqua & flatu repletum: membrana, qua investitum fuit, adeo renuis atque porosa erat, ut humor serosus copiose per illam exsudaret, hinc vires adeo imminuebantur ut quarta die ætatis expiraret.

Ante sepulturam quum partem affectam inspicerem, cavitatem ductumque inter 4. & 5. vertebrae lumborum inveni, Non tamen in medio spinæ erat ille ductus, sed aliquomodo ad latus dextrum vergebat: mater enim cum cibum hinc avidè appeteret, dextra locum illius fricaverat. Rotundus erat ductus ille & communi peristolio investitus, ejus magnitudinis ut minorem digitum facile exciperet. Per ductum autem hincce vas quoddam membranosum, suisque quoque venis capillaribus præditum, ex ipso cavo hepatis, extra cutem (ubi dilataram exuberantiam illam efformaverat) descendebat: Ad latera præterea duo alia vasa, quæ ex arteria magna proveniebant, tuberculo inferebantur. *Hildanus Centur. iij. observ. 56.*

## OBSERVATIO XIV.

*Mentula & Scroti monstruosus Tumor, à materia subcandida crassa glutinosa, uberi vaccino simili, &c. genitus.*

Consistentis Vir ætatis, habitus crassi sed caeochymici, ruber facie, monstravit in Nosocomio monstruosam mentulam, verrucis prægnantem innumeris, acinos botris agglomeratione æmulantes: Pars quædam tumida, renitens, cuti concolor, instar globi rotunda abdomini adhærebat, quæ capiti modo nati infantis magnitudine respondebat, hæc carebat verrucis: Coles ad stuporem magnus, tumidus, longitudinis cum scroto circiter ulnæ Augustanæ. Præputium retroactum citraglandis radicem nescio quem tumorem erexit dedit, qui copiosis, subfuscis verrucis luxurians, glandem instar collaris moderni, quod ex multiplici passio ad simbriam flocculis exornato consistitur, ambivis: Glans tuberosa & in vesicam quasi sublata, palma fuit longior & pugno major, ob ligamentum aliquomodo retractis, quam verrucæ obtegebant copiosissime, quales in oculo Gallorum Indicorum conspiciuntur, cum furor eos agitat. In hoc tuberoso virgæ capite Sinus fuit repertus, in cadavere dissecto, in quem è pene defluxit serum (Aberat enim corpus penis à scirrhuso hoc excavato tumore spatio fere trium digitorum) quod per foramen saltem stillavit; at canalis ligæus, quem panum vocant, immixtus, libere & assatim fluxit, omne id quod ex vesica è depositum fuerat; intravit & cum retinuit sine aliquo dolore: Corpus penis non intumuit, ut sectio docuit, sed quod ambiebat testes & colem, scirrhusum pro hospite recepit tumorem, ac innumeros in superficie cutis luxuriantes monticellos verrucarum. Undique enim compressæ, copiosæ, parvæ, duræ, ac arte in se invicem glomeratæ ac connexæ pustulæ, verrucis myrmecidis non dissimiles, eum colis & scroto ambiebant, vestiebant ac cooperiebant. Scrotum ipsum durum, renitens, extensum, magnitudinis capitis viri, tuberosum, inæquale, quasi herniosum, ac si sateocele univæsi scroti esset: cutis superficies verrucis copiosissimis tegebatur: monstruosiorẽ mentulam vidi nullam: Cum miles esset, quibus venus ludò est, & scortari ab eis non alienum, levis veneræ credebatur soboles; at Medicus & Chirurgus ejus Nosocomii miserum ad me ablegarunt, cum nullam aliam haberet labem: Vulnus ante plures annos in bello glans penis acceperat abbastra, quod neglectam fungosam contraxit labia, quæ tamen non potui observare: A glande præputium fuisse retractum retulit, quod tamen in verrucosos intumuit monticellos: Scio monstruosiorẽ fuisse hanc mentulam quam meus depinxit calamus, aut delineatio pingentis: Hæc mentula resecta à corpore, ad pensam ad libram & dissecta fuit, cum miser anno 1626. in Nosocomio ex cachexia hydropica expirasset. *Hachstetterus Casu viii. centur. vi.*

*Hanc eandem historiam ibidem pertexit, ac his verbis describit D. Daniel Geiger, qui dissectioni interfuit.*

Quod nuper me dissectioni scroti alienius monstruosi interesse passus sis, Vir Exe. gratias quas possum maximas ago, memorabilis certè, nec mihi unquam antea visus fuit affectus: Quod vero etiam ex me quid illic observarim scire desiderasti, nescio an tuo isti hoc desiderio satisfacere queam.

Cum hic æger anno 1626. Novembris 18. die mortuus esset in Nosocomio, cachecticus, & jamjam ad hydropem pede lento gradiens, cum pedes ejus jam sentirent melcm, pedibus angustiam, anxietatem, & spiritus sublimis esset ac difficilis, placuit cadaveris monstruosam dissectare mentulam, quam à corpore resectam & phalangi adpensam, librarum pondus habere cognovimus quatuor & mediam: Cure sectione aperta, penis adparuit corpus albidum, compactum, durum, renitens, cuti firmissime adhærens, quod ad corpus usque penis

nis dissectum. ipsam integram consuetæ longitudinis & latitudinis apparuit, facili ejus à tumore scirrhuso erat separatio, Glans penis fuit exigua, colore albida, sed ejus cutis globosa, intumorem extensa, in superficie tuberosa, verrucosa, seu innumeris verrucis invicem compactis supervestita: intrusissimum quendam habuit, qui videbatur in scirrhusa illa duritie insculptus, in quem penis ab hoc sinu longius retractus serum deposuit, quod per panum ex corpore exiit. Tumor hic originem sumpsit, serpsit appositione ab hac parte laxa, & totum penem ambivit, & in sacco testium maximam molem causavit ac si Sarcocoele universi esset scroti: Testes vere Testiculos nominare poterimus, quorum jam tumori scirrhuso adhaerebant membranæ vestientes, ipsi corporis exigui, contracti ac corrugati, imminuti, corrupti, fundentes in eisi necio qualis putredinis subceteruleum colorem: Scrotum itaque hoc magnam, inæquale & decies aut pluries communi scroto majus, durum subalbida humorem continebat, siccum, tenentem, & in disseccando sonorum, ac si acies cisternæ cartilagineas pertransiret partes, non dissimilem uberi vaccarum.

Videatur Tumor illum Scroti præternaturalem, pustulis verrucosis (venætarum nomen hoc quædam omnino mihi persuasum habeo) parvis, copiosis, ac ætæ invicem compressis, in circumferentia seu cire referentem, plane scirrhusum fuisse, suamque originem & incrementum à punita quadam crassa, lenta ac indurata axillis: *Galenus* enim duplicem constituit scirrhum, unum durum, indolentem & perinsensum, tenentem, ex humore melancholico naturali ordinatum, alterum vero subdolentem ex crassa & glutinosa quadam punita proveniente. Hanc si ego distinctio nem cum nro tumido scroto conferam, vix me falli potest si illud Scirrhum minus exquisitum, vel cedemat. sum, seu Oedema scirrhusum dicam, qui à punita crassa glutinosa & lenta suum habuerit initium, quod ex sequentibus evidentiùs patet. Nam primo prava defuncti victus ratio, & cacochymica ejusdem corporis dispositio, subscitibere videtur. secundò materia in illo Tumore contenta, quæ subcandida crassa glutinosa & pinguedinis instar solidioris indurata, ubeti vacino similissima fuit, adeo ut non tantum videret, sed & sectione audiri poterit. tertio Locus, Scirrhus enim necque patribus ut plurimum corporis scicribus & durioribus, utpote ligamentis, tendonibus ac musculorum capitibus accidere solet, rarissime inellioribus. Hicantem præparium Halebardæ ista lesam & temere neglectum, fluxionem primò recepit, à quo tandem crescendo malum ad scrotum etiam & proxima vasa spermatica devenit: Est autem præputium seu univ. si corporis cutis, ex genere spermaticarum seu nervosarum, adeo ut *Galenus* nervum sanguine præditum nominat. 4. Principii & incrementi ratio, incepit enim primo in præputio, ab hoc sensu n. se extendendo totum occupavit scrotum, quod scirrhusum minus ex-

quisitorum signum certum, forma externa fuit enim tumor magnus, immobilis, durus & pilis carens. 6. Color, concolor enim fuit, & corporis, seu potius scroti, vivum colorem retinuit: Ex his patet tumorem hunc vere Scirrhusum, sed minus exquisitum fuisse: Ego valde dubito annon etiam tenacissimè huic punitæ me anchosici succi quid commixtum fuerit: color enim dissecti tumoris quibusdam in locis plumbeus, vel ad plumbeum inclians visus fuit & in Testiculis (quibus tamen utriusque quos, exteriores tunicæ *Albuginea* & *Vaginalis*, ut mihi visum, defectum) humor quidam ater & saccos latitante, ac venæ & arteriæ dissectæ cruiore valde crassam, nigram & siccam quæ exillatant: Non veteret etiam hunc Tumorem Catnolos dicere, cum *Pecceius* cap. 13. l. 1. Strumas, seu glandulas quibus eadem fere cum nostro Tumore materia est non tantum scirrhusos, verum etiam ex Aërio Catnolos vocet Tumores: Sarcocoele n. vero nominare neque, etsi & illæ substantia dura pedentem circa testes genita sit, quoniam non subrubra sed albida fuerit, & quia originem n. pene, non in scroto sumpsit. Notum igitur si Sarcocoele quis dixerit, cum & illa scirrhusa sit Tumor me n. habebit repugnantem. Ex consensione vasa n. spermaticorum *F. Platerus*, succo ex vasis illis exsudente copiosiori, fieri sarcocoele scripsit. Creditur luxuriantem humorem nutritientem multum tunc copiosorem agglutinatam hunc scirrhusum à disse. Tumorem: Est autem nutrimentum cum aërio ac nervosorum corporum ultimum subalbida, hinc factum ut & verrucarum corpora glandulosa ac albida disseccatione inventa sint. Non sunt hi cum illis rixæ qui omnia suis humotibus adscribunt, & ex colore tumorem de causa eorum argumntari volunt. *Idem Geiger.*

## OBSERVATIO XV.

Tumor Glandulosus sub Scapula sinistra, à Glandula non morbosa sub cute conclusa. 1. Struma in Humero sinistro ad pectus & dorsum diffusa, costis adharens. 2. Tumor Humero innatus: ob subiectam ossis cariem. 3. Tumor in scapula sinistra lapidem continens. 4. Tuberculum circa Farculam à Pulmonibus ortum ducens. 5.

§.1. Veneficæ vetulæ, ob veneficium suspendi enectæ, cadaver in domo collegii dissectum fuit; Quod potissimum observari dignum, erat Glandula quædam sub scapulæ costâ inferiore lateris sinistri sita, quæ formam mamillæ cum papilla propendens referebat: Derracta cute, Glandula ipsa in conspectum venit, cujus figura erat hemisphærica, latior circa basin, qua panniculo carnoso adhaerebat, sensimque contractior facta in papillam desinebat: latitudo circa basin erat duorum pollicum, altitudo fere unius. Substantia ejus illi mammarum similissima, alba quippe, mollis & spongiosa: vasa habebat arterias, venas & nervos; E medio ejusdem papilla teres, magnitudinis pennæ cygnæ, longitudinis pollicis unius propendebat: Meditullium erat substantiæ glandulosæ, ejusdem generis eum illa totius mamillæ cui continuabatur: exterius productione cutis tegebatur, quæ etiam



firmiter mammillæ adnascatur : papillæ hujus substantia glandulosa aliquomodo per se erat : Etenim moderata mammillæ compressione gutta cruoris ex ea exprimebatur : Nihil præternaturale aut morbosum in hac glandula reperiebatur nisi quod in numero partium redundabat : Num vero Glandula hæc in prima partium formatione ortum duxerit ; an potius à causis adventitiis succreverit ; judicare non licuit. *Varithon Adenographia cap. 38.*

*Appendix de Glandulis sanis varias corporis partes occupantibus in Milite.*

Glandulas sanas valde numerosas nuper vidimus in milite quodam, in Nosocomio Sabaudienfi London, curationis gratia tunc morante : In cujus brachiis & femoribus modo simplices, modo racemarum crescentes sub cute deprehendebantur, & vel in panniculo carnoso, vel eute adiposa sedem habebant : Omnes autem mobiles erant & indolentes, licet pressiuscule contrectarentur. Chirurgus expertissimus, ut huic malo occurreret salivationem innucto Mercurio movebat, sed frustra ; quanquam enim æger ad tempus levamentum aliquid percipere visus est, paulo post tamen morbus, ut prius, incruduit : Chirurgus impetum, facta incisione, unam majusculam ex femore dextro extrahebat : quæ citra ullam purulentiam aut corruptum humorem tota ex solida glandulosa atque alba carne constabat : Quod satis demonstrat dari Glandulas adventitias plane sanas, nisi quod in numero partium præternaturalium recenscantur. *Idem ibidem.*

Glandulas Viri Clar. dividit in *Naturales*, sive *perpetuas*, & *contingentes* sive *adventitias* : Adventitias ait, raro ab initio generantur & ad numerum partium naturalium vix spectant, verum de novo ut plurimum crescunt : Dividit eas in Glandulas quocummodo formatas, & in glandularum rudimenta sive primordia : rudimenta hæc quamquam perfectam glandularum naturam nondum adeptæ sint, quia tamen eo versus tendunt, in eam originem inquirunt. Ad primordia spectant pars mittens, materia missa, & succus recipiens : Pars mittens necessarius est vel canalis æquosus, vel vena, vel arteria, vel nervus : Verum neque vena, neque canalis æquosus (à quo *Scrofularum originem deducit P. Barthele*) quicquam mittere possunt, quia ea vasa tantum reductioni inserviunt : Verum arteria, quæ impetuosè sanguinem in omnes partes impellunt, ad hunc affluxum aliquid forte contribunt : etenim extremitas arteriæ sanguinem in carnem, in qua determinatur, protrudit, vel neque extremitas illi respondens eundem ob impedimentum aliquod, nonnunquam haud expedite recipit & deducit, unde pars illa nonnihil intumescit : motus vero sanguinis sic præpeditus eundem ad novos sibi rivulos querendos aptum reddit : Verum sola hæc aptitudo insufficiens glandulæ principium materiale videtur : Etenim materia, quæ primum rudimentum ejus præbere debet, oportet sit major multo molliorque sanguine, imo ut genitura animalium, vel ovorum albumini analogice respondeat : Primum enim rudimentum glandularum adventitiarum ad formationem tendere videtur : Sanguis vero solus ærior est quam ut formationis principium materiale haberi possit, quin potius extravasatus statim putrefcit : hæc vero materia ut plurimum absque putrefactione in cellulis suis stagnare observatur : Quanquam igitur arteriæ vim concitandi fluxum sanguinis, ad prima rudimenta glandularum novandi, vivificandi gratia, concedendum sit, negandum tamen easdem primum materiam, ex qua generentur, subministrare : Quare aliud glandularum adventitiarum principium materiale querendum est : *Nervus* itaque restat perpendendus. Monstrum familiaritatem magnam & commercium inter nervos & glandulas intercedere, nervosque aliquid vel asserre ad illas vel ab iisdem auferre. Impossibile autem est ut nervi ab his glandulis aliquid auferant priusquam ipse existant, sed necesse est aliquid asserant, ut materia suppediretur ex qua fiant. Succus quem nervi exponunt multo delicatior molliorque est sanguine,

multoque similior naturæ spermaticæ : Si ergo contingat nervi turgentis & repleti extremitatem effundere materiam ejusmodi in carnium interstitia, materia sic effusa statim formationem molitur, & primo cystis sive amiculum, quo tanquam chæco involvatur, effingit : quia vero nova subinde materia è nervo huc confluit, fit ut cystis hæc sensim distendatur, cumque ex ipso augmento necessario extremitates arteriarum & venarum proximas comprimant, accidit ut libero sanguinis transitu nonnihil impedito, aliqua ejusdem portio in tunicam formatæ cystis derivetur, novisque in ea rivulos exculpatur, qui postea in arterias facessunt, quia vero pars in quam hi rivuli immittuntur virtute formatricæ prædita est, ne sanguine jam affuso opprimatur, rivulos alios venales efformat per quos in extremitates venarum circumjacentium superflua ejusdem portio exoneratur : Atque adeo habemus primum glandulæ de novo productæ rudimentum, ejusque generationis modum. Partem mittentem *Nervum*, nimirum, Partem vivificantem, *Arteriam*, Partem exonerantem, *Venam*, item materiam missam *albumini ovorum similem* : Partem recipientem, *carnium interstitia*, & specibus *tunicam*, immediate eandem materiam, seu ovum de novo formatum, investientem. Diximus modo sanguinem non esse materiam idoneam ad glandulæ noviter formatæ generationem, & consequenter hæc arterias, nedum venas aut canales æquosos primum ejusdem materiam suppeditare : Cumque in locis plurimis, in quibus glandulæ generari solent, nulla alia vasa præter canales istos, scilicet arterias, venas & nervos, reperiuntur, exclusis jam canalibus dictis, & arteriis & venis, prima hujusce materiæ coagellatio solis nervis asserenda : Utque hæc sententia clarius constet, in hæc memoriam revocanda sunt quæ adduximus, nervos potissimum seminis materiam in testiculis suppeditare. Cum ergo nervi possint succum seminali similem in alias partes eructare, cumque prima glandularum adventitiarum materia sit ejusdem prope conditionis cum succo seminali, credibile est eandem è nervis similiter originem ducere. Part hoc luculentius, quia juvenes celibes frequenter stromosi sunt, postea vero matrimonio conjuncti nonnunquam sponte euntur, materia nempe olim ad stromas fluens, ad alias jam partes, testes scilicet, divertitur. Idem nitentius probatur, quoniam glandulæ de novo formatæ, conformationem quandam, arterias etiam, venas, nervos, & canales æquosos in se distri-

Arterias habent, & ad aliarum partium viventium morem augentur: unde constat eas primo generas fuisse ex materia similissima seminali, utpote formativa virtute praedita, quam certe nulla pars, praeterquam nervi, iis suppeditaverit. Accedit quod nervi in eorum substantiam, prout in glandulis naturalibus fit, diffeminantur, uti ex doloribus acutis palam est, quibus strumosi sepe in partibus affectis obnoxii sunt: Si autem nervi nihil contraherent ad eorum generationem, vix concipi potest qua ratione se in eorum structuram postmodum ingererent: concludendum itaque videtur Nervos primam glandularum de novo formarum materiam suppeditare.

Haec tamen generatio primorum eorum rudimen-  
tum, in videndum quomodo eadem in glandulas adventitias perfectas abeant: Diximus modo indumenta haec ita se habere ad glandulas formatas, ut ova ad pullos, quare quod in ovo fit quando generatur pullus, idem hic quoque, quanquam modo multo imperfectiore, peragi videtur: habet enim pariter in se materia haec in cyti conclusa vim quandam plasticam, rarissime vero perfectum adeo ut integrum animal constituit, (quanquam tamen aliquando in huiusmodi cytulis mentium generari cernitur) sed loco animalis frustulum aliquod carneum generat, sicut in utero, deficiente formatrice mola gignitur.

§. 2. Puero XII. annorum ab ineunte aetate struma humerum sinistram hinc inde ad pectus & ad dorsum vergens in tantam molem excreverat, ut XL. fere libras ponderaret.

Mortuo secundo cadavere, ita firmiter Struma costis adhererat, ut transacta prius atrophia dilataratione ipsarum ad respirationem prohibuisset. Struma porro substantiae cartilaginosa erat, ut gladio maxime resisteret.

Sed mirum audias Lector, quam recte & quam docte puer iste ante mortem loqueretur Credo equidem hoc evenisse quoniam purgato capite materia ex illo ad strumam quam tidie fluente optima fieret rati cinatio, Dom. Panariolus Pentecosta 1. Observ. xxi.

§. 3. Vincentius Balduinus, Vir infrae aetatis, vixit aliquandiu miserandum in modum ob Humeros, intra annos XV. quater efflavit, quod paulatim increfcens, sive ex vicido ossis contusi succo, sive sanguine eo uberius affluente, in eandem devenit molem, ut nec pectus nec scapula immodicum ipsius onus fuerit amplius ferendo; excitatis non solum maximis nervorum doloribus, verum etiam summa spiritus diffultate, ob luxurians pondus, thoracis motum continenter impediens, cum indefatigabili vigilia: quibus & febris quo evaderet, usus fuit consilio variorum Chirurgorum, quorum alii tumorem emolliere, atque in pus convertere, alii contra luxuriam ipsius arctate fascia coecere, ac nonnulli viriatum os ferrula praecidere adhiisi fuere, sed omnes successu infelici, vix enim ac arteriae huius tumoris latiores erant quam ut pollice humano possissent obturari & ac proinde magis impedimento quam auxilio fuere fasciae: mortemque adeo non distulisset quam maturasset amputatio improvide instituta.

Facto autem vivendi fine, docuit anatome omnia sub cute visci crassissimi ac steatomatis indurisse naturam, patumque discrepasse a vera natura canceri: cuius nomen fortassis propterea huic ossis vitio, haud male impostum a Celfo: Ipsa vero ossa erant non modo a se invicem segregata, verum quasi molleo misuratum contracta, ac prae irriguo madore adeo tenera, flaccida ac mollia, ut instar cereae facillime confringerentur. Tulpus Observat. lib. IV. cap. xii.

**A** Vera natura canceri [Celfus lib. 8. cap. 10. asserit ossium tractum, praeter inflammationem ac distensionem nervorum, interdum quoque cancerum interveni: Et eoque vero per Cancrum ibidem loci intellegitur, variae variorum sunt conjecturae, neque minores sententiarum conflictus: verisimile tamen non est verum hic designari cancerum, nedum sphacelum perperam excogitari: at si quis conjecturae locus, videtur, haec vox adumbrate callotum illud Tumoris genus, quod plerumque sequitur calami-  
tosas ossis fracturas, vel immedicabiles illam eorundem molliem quam imprimis ossi acuta pirata, solidam ipsius substantiam plane corumpens: cuius perniciosissimi tumoris natura, quantumvis haud

parum discrepet a cancro genuino, in eo tamen cum ipso convenit, quod uterque nullis cedat remediis, conspireque perindeque in perniciem aegrorum.

**Ossa flaccida ac mollia** [Eandem alienationem ossibus impunit acida ac maligna quaedam pirata per huiusmodi corporis effusa, quam interdum quinquaginta vidimus occupasse loca, ac depascere tantum non solida ossa, verum etiam canem, & embrahas, nervos, & ligamenta: at quicquid illi obvia; parum interim aut nihil proficiuntibus remediis, quibus insensibilium hunc hostem satagimus domare, sive sponte ex latebris suis prodirent, sive a variolis hanc in arenam productum. Vide Hild. cent. 4. obs. 69. Idem.

§. 4. Lapidis materia est humiditas crassa, viscosa, phlegmatis, aut saniei, aut sanguinis, aggregati in Apostemate, & hoc est rarum: 2. Junij 1567. Ill. vir Carolus Tiercelin, maioris ordinis Regij Eques, cum diem extremum obisset, corpore ejus dissecto, in scapula sinistra Tumorem insignem habere repertus est partibus internis, qui novacula apertus, lapidem quadratum dissimumque continebat, qui a sanguine coagulato ex lanceae ictu genitus fuit: Ferrandus Senior l. de Luthasi p. 11. Ob lanceae ictu & concussionem in latus sinistram, remanserat ingens Tumor praeter naturam, in cavitate cujus inventus est ingens lapis, quadratus, diversi coloris, ingentis duritiei. Idem l. fol. 34.

§. 5. D. Hallerus a multis annis habebat Tuberculum circa Furculam in latere dextro  
Bovetti Anatomi. Tom. III.

pectoris, crescens & decrecens : Tuberculum erudum pulmoni adnatum circa Furculam in latere dextro inventum. Lib. 2. tit. de Hemoptysi.

OBSERVATIO XXV.

Brachii totius tumor pellucidus à lymphaconclufa. 1. Manus tumens ob officulum pollicis cariosum. 2. Tumores oedematofi circa articulos manuum, ob corrupta offa. 3. Paronychia male tractata digiti corruptionem & offis cariem intulit. 4. Clavorum in pedibus pertinacia inde est quod in perioftio radicem habeant. 5. Tumores circa articulos digitorum ob vifcerum corruptelam. 6.

§.1. **V**Idua N tabida post pleuritidem interit : Triduo ante obitum brachium totum admodum inrumpit, pellucidum admota candela : Incifum lympham copiofam emittit. Vide lib. 2. tit. de Exspuitione fœdida.

§.2. Puer doluit in pollice manus finifiro, Chirurgus manum aperuit, effluxitque sanguinem aliqua fanie : Tumorem per femi-annum gessit. Tabidi mortui (Vide lib. 2. tit. de Phibifi) cadaver aperuimus, ibi vidimus spinam ventosam in metacarpi prima regione : Officulum pollicem fufficiens erat exesum : non aurem, quod alias fieri folet, erat nigrum fed album. Tendo quoque erat albidioris coloris, musculi minime putridi. Ex communicatione Clerifi, D. D. Mangolt Medic. Bafilensis.

**S**Pinæ ventosæ materia est serum acre malignitate præditum, & semper articuli afficiuntur : Generatur si pueriua nilis putrefcit & acris fit : Offa primo ea corruptit absque dolore ; hinc humore ex

osse transudante perioftium afficitur (in puero id sine putredine contigit) quod sanum manet : Initio nullum dolorem fenit, tandem de dolore conquiescit est. Idem.

§.3. Puellæ sex annorum tota vita morbis fuit obnoxia, præsertim Tumoribus Oedematosis circa articulos manuum, quibus apertis offa corrupta inveni, nulla tamen fore materia aderat. Lib. 2. tit. de Phibifi.

§.4. Ancilla Viri Rev. D. N. Paronychia correpta est, Illico implorat auxilium Martronæ cujusdam, quæ certam opem omnibus pollicetur beneficio herbæ eognominis : frustra hæc per plures dies admovetur, nam post ingentes dolores tandem digitus gangræna & sphacelo corripitur, ut ad amputationem deveniendum fuerit, quæ à Magistro N. peracta est, præciso supra secundum articulum digito.

Eo secundum longitudinem, post amputationem, aperto, caro & tendines omnino compuruisse apparuit : nigredine tetra affecta Offa, quasi calcinara fuissent, cinerei coloris & friabilia evaserant, adeo ut ineptam esse curationem, nedum insufficientem & affectui imparem cuius manifestum fuerit.

**P**aronychia tumor est in digitorum extremitatibus, insignem dolorem movens, originem habens ex humore acti & maligno, tendines, nervos, perioftium, imo os ipsum corrodere valens, Præmissa foris emolliente & anodyno, fiat disfectio partis affectæ secundum longitudinem digiti, & occurrunt plerumque macula una, item & altera rubicundior, humorem aliquem acrem, exigua tamen quantitate exhibens, mali omnis causam : Post apertionem, primo quoque tempore perficiendam, Theriaca in spiritui vini soluta digito applicetur, toti vero manui Defensivum, sit cutatio plerumque nyctthemini spatio perficiatur.

Amputationem, &c. ] Si hæc pars negligentia Chirurgi aut patientis, in gangrænam degeneret, extirpanda est : Id vero observandum ope forcipis peragendam non esse in secundo articulo, qui os plerumque assalatum effringitur, unde cura promittitur, vel forte inutilis est, ratione fragmentorum superstitum ; sed amputationem fieri debere per scissuram, post carnis circumcissionem, quomodo peragitur in arubus.

§.5. Verruez genus album, rotundum, clavorum capiti simile in digitis plantisque pedum plerumque enascitur, in incessu molestiam & dolorem pariens : hoc sæpius resectum subinde renascitur : Pertinaciæ causa in proximo Perioftio, à quo deducuntur, pendere animadversa est : quo si non pertingar medicamenti aut ferri vis, non mirum si malum identidem sit redivivum : Ab his resectis gangrænam & mortem sequutam esse narrat Borellus cent. 1. Observ. 82. dolorem enim consequurus humorum affluxus ; hi angusto loco coarctati, putredinem concepere, ad quam gangræna, sphacelus, mors.

§.6. Cuidam malus in facie color, & circa digitorum articulos Tumores. Omnia viscera interiora corrupta erant ac foetidissima. Lib. 3. tit. de Inappetentia.

OBSERVATIO XVII.

Femoris stoma gypsea punita & calculis resectum. 1. Crurum tumor à tumefactis eorum glandulis. 2. Femoris tumor ob carnem mucilaginosam lardo similem. 3. Crus Oedematofum ob Emulgentem venam femorali insertam. 4.

**I**da famula N. percussa vehementius, fenit ex inopinato illo terrore nescio quem sibi ortiri dolorem circa genu, cum tumore femoris in dies usque eo invalescente ut post annum

annum septimum videtur, plurimum Medicorum calculis, & non excedere saltem suo pondere accedere quam proxime ad illam strumam quam vidit olim *Benvenius*, ponderantem lx. libras *Observ. 14.* Quam molem hæc virgo septem annos amplius tulit tam animose, ut nemo domesticorum animadvertit unquam quicquam vitii in ipsius incessu: Verum erosa paulatim summa tumoris euse, intrumescens ipsius venis, incrementum in dies pruritu, & carne magis ac magis livescente, nequie ipsa malum suum diutius clam habere, sed coacta id detegere, imploravit tandem pudibunda ac morrens, opem Med. cam, expetens obnixè Tumorem hunc scalpello sibi amputari: qui tamen pervenerat jam tum eo incrementi ac malignitatis ut nemo id auderet: quoscitque festinet etiamnum invisum hunc hostem; & circumferens eum quocunque, incedit non minus expedito ac si nihil vitii femori inhaereret: eompescens interim malignum hoc carcinoma, ultra annum xvij. solo plumbi unguento, cujus licet nihil simili huic tumori utilis.

Difsecto autem post obitum tumore, vidimus eum ut foris glabrum ac inæqualiter protuberantem, sic intus steatomate, gypsea pituita, induratis calculis, dilatatis venis ac sinuosis anfractibus undique repletum, ac extrinsecus expanso femoris musculo ad amussim rectum.

*N. Tulp. Observat. lib. 3. cap. 51.*

§. 2. Sectus à D. Sylvio febricitans & ictericus, cujus privatim aperta crura infinitas glandulas sub cute latere docebant: ut forsitan non incredibile sit annexas esse per universum corpus cutis interiori faciei glandulas minutissimas, ex quibus sudor exprimeretur: adeo ut pori corporis non sint nisi harum glandularum minuti ductus: Esse autem has glandulas in sano corpore adeo minutas ut visum pene effugiant, in morboso conspectiores. *Olaus Borrichius cent. 3. Epist. 97.*

**E**ste hæc Glandulæ, Est. 3. Cutis est membrana crassior, quoad maximam partem ex filamentis valorum sanguiferorum, nervorum fibrarumque nervorum varie inter se complicatis contexta, quibus Glandulæ nævæ rosæ & Lymphæ ductus, sive sudoris & vaporum vasa excretoria densissime interponuntur: Hujus substantia duplex à plerisque Anatomicis perhibetur, exterior nervæ, & interior carneæ, seu potius glandulosæ; pro hujus exemplari tantum cor. rex adducitur: Si cutis nuda per microscopium inspicitur, ex observatione Clariss. *Maignep. primo* sese offert corpus reticulare, cujus foraminibus cæbris continentur non solum ductus sudoriferi, sed & plurimæ papillæ pyramidales, per ordines parallelos & euse erumpentes, & in cuticulam, ubi in plures ve ut fibrillas dividuntur, protense, quas idem *Auchot Tactus* sensuatum statuit: in quoque his substantia cutis habet Glandulas plurimas, quibus mediantibus Lymphæ, sive materies hidrotica ex arteriis per lymphæ ductus, sive vasa excretoria, ad potos deducitur: Enimvero observavit accuratissime *Stenson*, singulis poris suas glandulas subjacere, quæ juxta *Philosop. ultum* majores ac minores existunt. *Philosop. ultum p. 120.* Profecto hunc quendam Lymphæ in glandulis cutaneis, quæ singulos foraminibus sudoriferis subjacent, propter

usus quosdam recondi, quin & juxta copiam & motum ejus diversimodam Glandulas has plus aut minus turgidas existere, inspectio microscopia plane detegit: Latex iste à sanguine per arterias in glandulis hæc deponitur, nempe ut sarcinula hæc deposita, facillius illic per venas redeat; interim illic repositus suos habet usus, &c. *idem p. 107.* Impeditur Lymphæ motus per vasa Lymphatica, tum quando ipsa est glutinosior, adeoque ad motum lentioræ ineptior: tum quando ex parte compacta, vel quovis modo angustata sunt vasa ipsa: Quoties in vas suis obstructio subsistit, & magis magisque accumulata nimium ipsa distendit & tandem rumpit lymphæ, roties eadem in loca vicina, cavitates propinquas effunditur, atque tunc alia via & alia quam decebat, movetur Lymphæ: Ex hæc ejus per vasa sua in corporis habitum distributa & obstructa, hinc raptæ effusione in partes vicinas producunt Dolores variis & Tumores, Caranthis vulgo adscripti: inter quos hæc postremum locum tenet quæ partem brachii superioris usque ad humerum ipsum occupant, & quandoque collum ipsum attingunt: Ad quos etiam referendi qui dolorem ischiadicum mentiantur, atque incesum impediunt, in artibus hærentes, *Franciscus Syrium Praxis med. lib. 1. cap. 30. §. 9. 10. & 11.*

§. 3. Triplex datur generaliter in corpore humano Tumor seu eminentia: 1. Naturalis, sic proruberat caput, humerus, genu, &c. non Naturalis, uti gemino colle sororiant pleni lactei sinus, & venter gravidarum æmulus: 3. Præternaturalis, cujus quamplurimæ dantur species, prout vel ab humore vel à statu, vel mole quadam seu si bstantia corporea, vel omnes dimensiones partes organicæ præter naturam distenduntur: Videas hic varias variis in partibus, non dicam monstrosas sed morbosas Tumorum differtentias, prout hoc vel illo loco natura aberrans humores congerit, non solum in triplici ventre, sed præprimis etiam in artibus: Prodeat in proscenium infans triginta mensium, quem parentes ad me adduxerunt 1671. die 30. Maij, addita relatione à duobus fere annis fissuram femur primo sensum, deinde magis magisque intumuisse: Adhiberi in consilium tonsores, balneatores, carnifices, uti vagem vulgas solam circumerrare, multa incassum applicarunt, quia in tantum excreverat ut magnitudine corpus ipsum quoque tumidum longè superaret, neque binis cum dimidia spiritibus vitæ emetiri circumferentiam posset: adeo hæc omnes opes succi nutritii tanquam ad, inutile receptaculum ferebantur, marcescentibus interim totius corporis reliquis partibus, utpote alimento necessario defraudatis: Extimam cutem venæ quamplurimæ discurrebant, occuportiores, ipsæ vero Tumor hinc & inde contrectatus resistebat, durus, æqualis, non sal-

tem loco sub poplite quandam præ se ferens molliorem : Ipse ergo aspectu longius à statu naturali recesserat partis hujus quantitas & conformatio, quam ut viribus vel manus vel artis ad debitam proportionem reduci posset : neque spes ulla suberat vel discussionis vel suppurationis per ulla præsidia impetrandæ : Cum tamen parentes auxilium efflagitarent, adhibuimus cataplasmata quædam & emplastra emollientia : & in parte sylvestri, ubi videbatur mollior Tumor, & materiz suspicio adesset, ferro aperuimus, sed nihil præter sanguinem exiit, & glandulosa quædam corpora in conspectum se probebant : Cum itaque magis confirmaremur nullo eum modo posse ad pepasum reduci, neque sectioni ullatenus adfore locum, clausimus vulnus, & præter interna, ad anxietates sudoresque colliquativos directa, nil amplius tentavimus : Circa finem Julii, ob decubitus humorum, prope nuper apertum vulnus, & jam consolidatum, uno alterove loco sponte nova erupit fissura, & multum profudit sanguinis, donec raro placide fungeretur.

Unde eo nos contulimus spectaturi qualisnam materia inibi contineretur, ubi facta per longitudinem incisione, apparuit caro per totum mucilaginosa, compacta, instar lardii antiqui, pingue linem mentiens, & tota per intersepta spatia interperfa glandulis, semina cunicularum quam accurate representans : Sanguis fere nullus apparebat, feri modicum, pus nullum, nisi in superiori circa inguen loco, ibi enim modicum puris albi continebatur, & circa os ipsum Femoris quod etiam cariei senserat pilmordia : Corpus ipsum à putredine jam impetiturum dubitantes sectioni committere, quare censuimus curam, quod nota dignum, solito crassiores, licet extensione tanta facta prout us quasi rupta videretur. *G. Welfgangus Medellius in miscell. curiosis anni 1673. Observat. lxxix.*

§. 4. Oblatum mihi fuit cadaver dissecandum, in quo ubi ad Renes pervenimus, adeo luisse in his naturam vidimus ut admirationem omnibus pateret : Quatuor sunt renes in una mole conjuncti, sinibus tamen atque vasis inter se divisi : Plures adhuc exrabant propaggines ab emulgentibus quam sunt notatæ in figura : Non est quod hic plurimis agam in exaranda causam tam alienæ a naturæ ordine compositionis ; Quod hic nobis dicere conveniet, est nos posse putare huic hominem fuisse salacem, ob vasorum semina alium abundantiam : Præterea quod si diutius vixisset (quod illi forte natura concessisset, cum optimo corporis habitu in cæteris constituisset, sed licet ætatem truceque factum jus laqueo de medio abiecit) censendum est crure sinistro fuisse tumoribus œdematosis subditum, propter emulgentem, quæ supra Renem ferebatur, in femore illi statim inseritæ : nam interea dum naturalibus adhuc viribus pollebat (non enim supra 40. annum vixisse facies ostendebat) subest valide ferocem humorem : interea & si aliquid labebatur, facile exercitio, & nativo calore robusto, in huius absumebatur, quod non æque præstitisset si ætatem virilem attigisset. *L. Botallus operum p. m. 62.*

C Onjectura admodum infirma est quam de tumoribus œdematosis sinistri cruris affert *Batal-lus* : præterquam enim quod tales à sero non proveniant, sed à pituita etiam per arterias debebat humor in crus effluere, juxta doctrinam de sanguinis

circulatione : Nunc vero sanguinis portio per cruralem sinistram sessu facta aliquali digestionem per emulgentem sinistram iterum supra renes venæ cavæ descendenti infundebatur. *J. Van Horne, ibidem.*

## OBSERVATIO XVIII.

*Tumor in Genu excitatus à sciatomate xvi. librarum ponderis innato. I.  
Cartilagineus cavitates habens sero repletas. 2.*

§. 1. **P** Atella (sicut & os Tibiæ) replurimum cariei obnoxia ; exinde sæpius fit ut homo summis cruciatibus, si mature succurratur, torquetur : Ratio est quia multis nervis, tendinibus, venis, arteriisque composita est, quæ nimium mota illico humores concitat, qui haud facile medicamentis cedunt, sed collecti persæpe præter dolores, Tumores plurimos eosque pertinacissimos concitant, ut pro multis exemplo fuit ancilla fratris mei, cui cum post obitum in leprosinario secussent genu, Scæatoma librarum quindecim adstantibus ostensum fuit. *Nic. Fontanus Annot. in cap. I. Epitomes Vesalii.*

§. 2. Latum meum secui lapsum ex alto, qui in genu sinistro sub cute scirrhum habuit patellæ simillimum : Scætus autem is vera erat cartilago, & in ea parvæ aliquod cavitates eam sero Crus fregerat ad caput coxæ, fregerat & sternum medium, disrupta & vena cava. *Jacobus Sylvius operum pag. 45.*

**L** Apertus ex alto, qui in genu sinistro sub cute, &c. ) *Sarcoma* frequens in parte postica ex contusione femoris à Longi in & dura sessione live equitatione : Eleganter Sarcomatis materiam exponit *Fernelius*, Noe ex humoris, aut, cujusquam sit affluxu, sed, ex solo partis alimento, hæc enim quæ aut innas, aut foris exulcerata est, si colubetur, affluo alimentum

accessu diffunditur atque luxuriat, sæpe etiam venarum & arteriarum instar ductus producit, per quos alimentum sumit : Sic integra cute, cum subiecta caro consula ruptaque est, ingens tumor sensim exurgit, qui cæterarum partium mole alimentum capessit, nullo quidem dolore, sed exquisito sensu & naturali calore præditus. *Rodolpheus Eschsch. Anat. lib. 5. cap. 3.*

Femorum & Tibiarum Tumor ob vitium hepatis, splenis, pulmonum, genitalium. 1. Tibiarum tumor ob vitium renum, hepatis, pulmonum. 2. Manns sinistrae pedisque tumor ob hepatis vitium. 3. Tibiarum & Pedum ob Pulmonis vitium, Vteri. 4. Crurum Pedumque Inflatione ob Lienis & Jecoris vitium. 5. Pedum & furarum tumor ob suppuratum pulmonem sinistrum. 6. Pedes Oedematosi ob hydropem thoracis & lienis vitium. 7. Pedum tumor ob jecoris, lienis, mesenterii vitium. 8. Pedum Oedema, ob thoracis, hydropem, hepatis lationem. 9. Ob pulmonum cordis, jecoris, renum vitia. 10. Ob vitium jecoris, pulmonum. 11. Ob vitium hepatis. 12. Pedum tumor ob glandulas subcutaneas tumidas. 13. Pedes vesicis obfisi, ob bilem in cysti cohibitam &c. 14. Pedum Tumor adematofus ob pus ex hepatis abscessu, in mesenterium & Omentum il-lapsum. 15.

§. 1. L. N. femora cum tibiis hydropicorum instar aqua erant tumida: Hepar in duabus partibus erat syderatum, Splen purpurus, Penis, Testiculi necrosi affecti, Pulmones nigri, purulenti. Vide lib. 3. tit. de Ischuria.

\* Femora cum tibiis, erant tumida. Hydrops non subito & confestim, sed paulatim generatur, quod fieri solet quoties anctis praeter naturam in corpore, pituita vel sero, sola ipsorum copia distenduntur nimium, si non rumpuntur ad diapedesin saltem de-ducuntur vasa, adeo ut sensim colligatur in ipsorum vicinia effusum serum vel tenuis pituita: Id quod imprimis contingere observamus in parte pedum infiore, atque faciei in pedibus id evenit frequentius quem alibi ob multum humorem, quorumvis fursum difficultus contingentem, unde etiam noctu non raro diapedere solet isem tumor; quando scilicet minor ad-huc existit, disperso nempe quaquaversum sub ipsa cute ac per corporis habitum sero, quo interdum de-mo ad partes infimas delabente, ibidemque hactenus paulatim exerescit item remissus noctu tumor: In facie quoque observatur non infrequenter Tumor aquosus, ibidem permanens, vel iterum recedens, atque noctu praecipuum sese manifestans: Cum autem

contrarium hoc eveniat ejus quod pedibus accideret notum, qui interdum solens magis tumescere, atque noctu detumescere, facies vero noctu intumescat, & interdum detumescat, quaeritur hujus diversitatis ratio? Censeo idcirco noctu intumescere faciem his in quorum corpora tum serum tum pituita tenuis tedun-dat, quoniam tunc capite pulvinaribus incluso atque magis calente dissolvitur quoque magis & foras sudoris specie propellitur serum praedictum vel pituita. Idem vero serum vel pituita in facie partibus externis h. e. sub cute facile sistitur & coagulatur iterum, hinc & parvum tumorem ibidem ostentat, quod adscriben-dum aeri externo vapores illos, humoremve vapo-rum iterum coagulanti: Sistitur facile sub faciei cute pituita vel serum, ob vias illas solito laxiores illud autem quod a massa reliqua cedere potest ac solet fa-cillime serum esse nemo ignorat &c. *Sysem de le Boë Append. Tr. 10. §. 19.*

§. 2. D. Marcus N. diu asthmaticus fuit, hinc tumor hydropicus sibi sinistrae, post & utriusque: Pulmones erant contracti, in quibus serum continebatur, Jecur ex parte scirrho-sum, Renes hydatidibus scabebant. Vide lib. 2. tit. de Dyspnoea.

§. 3. Puella cachecticalatus sinistrum habuit, manus pedesque tumida, dextrum exte-nuatum: Hepar valde magnum habebat, ex parte corruptum, Lien integre sanus praeter spem. Lib. 3. tit. de Cachexia.

§. 4. V. de N. venter intumuit ut in praegnanter: Pedes ac tibi in tumorem sublatæ dorum: Hepar & Lien erant sine noxa, Pulmo semiputris: Uterus libras 87. ponderavit varia materia; etiam pilis infarctus. Vide lib. 3. tit. ventris tumore.

§. 5. Dom. Penso magno abdominis Tumore, & Crurum Pedumque Inflatione laboravit. Lien illi maximus erat totum implens abdomen: Jecur valde durum, obstructum. Lib. 3. tit. de ventris tumore.

§. 6. Puella primo dyspnœa, tussi affecto, in pedibus & suris tempore vespertino tumor accidebat: In sinistra parte abdominis propendentia instar sacci è diaphragmate obviabat, purulentia ferata, à suppuratione sinistri lobi pulmonis. Vide tit. de Febris.

§. 7. Thomas N. fibracula, tussi, dyspnœa detentus, cum Tumore Pedum neque noctu neque die desinente Totus pulmo scabebat seroso humore: Pulmo & Lien putrilaginosi. Vide lib. 2. tit. de Tussi.

§. 8. Celsissimæ N. corpus squalidum, si crura & femora oedematosa excipias: Jecur fuit exangue & decolor, Lien praetumidus, mesenterium scirrhopis & glandulosis tumori-bus refertum. Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.

§. 9. Quidam in Cachexiam cum Oedemate Pedum & dyspnœa incidit: Thorax totus aqua cruenta scabebat: Hepar albicans & durissimum. Vide lib. 3. tit. de Cachexia.

§. 10. Vicentinus (de quo tit. de Phibisi.) Pulmones habuit debiles, unde tussis, &c. acce-debat hydrops pedum non abdominis, qui digiti imprimentis vestigia servabant. Apertum cadaver prodidit cordis auriculam dextram sanguine distentam. 2. Pulmones lividos, flaccidos. 3. Serum copiosum in thoracis cavitate. 4. Jecur lividum, scirrhopum. 5. Lienem majorem

rem solito, flaccidiorem. 6. Grandem calculum in rene dextro, &c.

§. 11. Nobilis in melancholiam incidit: univcrsum corpus frigere videbatur, Pedes processu temporis cedematosi facti sunt: Hujus hepar colore undiquaque nigrius quam secundum naturam apparuit: sed tamen minus nigricans quam Pulmonis sphaeolo correpti substantia: impressorum digitorum vestigia facile retinuit, nec minus facile soluta parenchyma: ris unitaterimas contrahabat. *Lib. 1. tit. de Melancholia.*

§. 12. Catharinæ N. Pedum erat insignis Tumor cum macie totius & dolore hypochondrii dextri: Hepar erat grandius, in cujus medio macula alba, tactu cartilagini molli similis, totum parenchyma penetrans. *Lib. 3. tit. de Hypoch. dolore.*

§. 13. Tentabatur N. superiorem vere ascite simul & tympanite, jam biennium ex difficillima quartana restitutus, sed cum ex eo immemor sui, monitorum Medicorum, totos dies mensesque, inter rationum libros sedentarius confunderet, ut erat prius sacro abdomine tatus, & angustis inter anhelandum spiritus, aggravari paulatim hæc mala sensit, reciprocari frequentius anhelitum & suffocationem minari, tendi ultra abdomen, potissimum autem mæculos farrorios in utroque femine durissimos evadere & gelidissimos, pedes quoque & crura in tumorem metuendum amplari: Advocati tres Medici nihil reliquimus intentatum, sed vicerat infesta morbi vis, & præsertim artus ille suspiriosi pectoris meatus jussu fatorum exsquebatur: Dum autem fomenta Medica adhibentur, imperata in cæteris sub genu utroque interno cauteria, quæ ipsa eadem hora, qua cruris lixivo sal paruit, aqua limpida & copiosa stagnare coeperunt, argumento & maium non solis flatibus, sed humori etiam male nato per interiora femorum decumbenti adscribendum, & liquorem illum invisum in pedibus, non solum musculorum interstitia, sed glandulas quoque quæ sub cute latent nondum, quod sciam, descriptas, occupare, inque tumorem formidandam atrollere: Illas autem glandulas jam ante plures annos, in apertis à morte hydropicorum pedibus videre contingit: proxime adjacent euti, infinitæ numero, suntque ex genere conglomeratarum: hæc cum sibi relicta minutissimæ sint, & fere oculorum aciem effugiant, intumescunt oppido, aqua ex supernis allapsa & distendente. Neque forte alienum fuerit suspicari ab his ipsi glandulis exprimi potissimum sudores & alia quæ ex minimarum venarum tunicis exsudare hætenus credita. Enimvero, non in solis pedibus hæc glandulæ mihi observatæ, sed & in brachiis hydropicorum; nuper etiam in hydropici fabri lignarii abdomine. *Olaus Borrichius Observat. 98. Actorum Medic. annor. 1671. & 1672. Th. Bartholini.*

**H**ippocr. olim lib. de Glandulis hæc addit, inquit, *ταῖς δὲ τοῖς κατὰ τὸν κοιλίαν*: licet hodie forsitan non injuria convertere, *ταῖς κατὰ τὸν κοιλίαν*: Sunt autem pili in universa cute sparsi, quorum ubique comites glandulæ: Quin & antiqui olfescere hydropem non tantum in magis hæere cavitatibus, sed & cuti proxima occupare: unde non interitum modo appellavere, sed & in eodem malo laudavere scarificationes, ut est apud *Celsum* lib. 3. cap. 21. Quæ superficiem dantaxat lambunt, cum paraceticæ penetrant adnque cavitates majores: Patet & hunc explicationem dicti *Hippocr.* lib. 6. aph. 8. *οὐκ ὀδυνώσονται γυνή τε καὶ τὸ κοιλίαν, ἢ πύλινος ὕψαλτος*: Igitur difficulter sanantur hydropicorum ulcera, quod glandulæ sub cute delinquentes novam quotidie & malignam subministrant materiam. *Idem, Ibidem.*

*Ex difficillima quartana restitutus, immemor sui* ] Adjiciam hic non inconvenienter Quartanariis utile esse ut, discussio licet morbo, diu paroxysmi tempus absque, & abstinencia recidivam declinent, nisi ament fata hydropici dicti, qui curatus rogabatur sollicitudine ut horum paroxysmi diu reverenter haberet, etiam paroxysmus omnibus sublatis; sed monitorum neglegentia, cum aliquando rotas sex hebdomadas, sine accessione ullius indicio exegisset, aliquando infasta illa hora, qua paroxysmus recurrere consueverat, lecti acidulculo liberalius sese ingurgitaverat, redeunte ipso momento quartana, & diu pertinaciam suam retinentem: usque adeo verum illud *Celsi* 3. cap. 16. *Si febris quævis, diu tenuisse ejus dies cœperint: eoque vitare frigus, calorem, crudum, lassitudinem: facile eum re-*

*vertitur, nisi à sano quoque aliquandiu iunetur. Idem ibidem.*

*Ex genere conglomeratarum* ] Distinctionem Glandularum in Conglomeratas & conglobatas, vide supra ubi de Strumis.

*Aqua ex supernis allapsa* ] *Exc. Platerus* lib. 1. Prax. cap. de extuberantia, hydropicorum pedum tumorem à sero in eos defluente ex abdomine deducit, non solum eo argumento quod defluente deorsum in crura humore ventris tumor non nihil subsideat; uti & quod liberior sit respiratio, resuscitator illo hæc rursus redeant; sed & quod sponte vel arte aperta in pedibus tumentibus cuticula, sero tunc sensim exillante, successive ventris tumor decrescat: aut si affatim erumpat, vel diu effluxus hic perseveret, penitus quoque recedat, multaque mensura aquæ per hanc viam sæpe effluat, quam nonnisi in abdominis cavitate collectam fuisse ex jam dictis facile licet colligere; cum in pedibus, non solum dum tument, sed & postquam ex parte ob effluxum aquæ detumuerunt, tamen semper adhuc aquæ copiam profundant, tanta mensura contineri minime poterit; nec tumor alius in ascite quam in ventre appareat: Dein, & cum ex læsione vitæcerum in abdomine contentorum, in ventrem aqua labitur, quæ frequentior est ascitis causa, nec alibi quam in ventre hujus aquæ scarifica sit, potestque quoque intumescant, idque ænequum sæpe in ventre tumor observetur, eam ipsam ex abdomine in eos influere, cum extra abdomen nullibi alias collecta fuerit, hæc quoque sufficienter comprobant.

§. 14. *Georgius Gebhardus* (lib. 2. tit. de Tabæ) variis morbis decessus tandem conturbescens obiit; In vesicula fellis, & meatu ejus choleram ad intestina deducere, obstitit

sele massa quæpiam nigra, specie vitætorum lapillorum, qui pileis, ornatus gratia annexi solent, adeo quidem ut bilis reciproco gradu, propter obstructionem spinam dorsæ perforando ad pedes deflueret, ubi concitavit ampullas aut vesicas ovi columbacei magnitudine vel etiam majores, tantum ardorem ac dolorem moventes, ut mirum sit quod non singulis horis æger in syncope incidere, quibus apertis nil nisi chylæ ichori commixta exivit. *Ex D. D. Joh. Fabri Observat.*

**E**xcitavit ampullas tantum ardorem &c. Cholera excitavit ichori commixta. ) Horum Exanthematum generationem tradit Plato in *Timeo*, Quæcumque in corpore inflammantur ardentesque bile flava id habent, cum enim foras exhalat, Græce ἀσυνολή (ἀσυνολή) reservens, omnis generis tumores, (φωρίσματα) emittit in cuncta gignit morbos exurentes plurimos: maximumque cum puro sanguinis admixta fibrarum genus ex proprio ordine depulserit, quæ fibræ eo sanguini datæ sunt, ut nec nimis tenuis nec crassus foret, nec præ caliditate cum humor sit, de corpore effluat, & ne præ densitate motioni sit ineptus, & vix in venis sese convertat. Hunc locum commentario illustrat Ballonius consilio 4. lib. 3. Non est dubium, aut, quin bilis cum accensa fuerit, & foras & intras, excitato summo ardore & deflagratione, molestias non inferat: Quod ante de pituita elbs dictum est, quæ habet suam quandam foras exhalationem, idem de bile dici potest. Unde cum Hippocr. hominum esse ait erysipelas foras exire, id non sit nisi peristam exhalationem & translationem intras foras, Mirum autem cur dicat bilem in habitum corporis effusa φωρίσματα gignere, intras vero ἀσυνολή (ἀσυνολή) enim flatum significat, & aliquid spirituosum, aut inflationem, Et idem facit foris bilis, quod perit intras, hæc enim molestia est ob flatum τὸν ἀσυνολή (ἀσυνολή), quid est aliud quam dicere καὶ τὸ φωρίσμα? nam ἀσυνολή & ἀσυνολή habent aliquid erysipelatis. Dicendum est bilem ubi fervet in habitu corporis, non tam tuberculum, aut verum tumorem excitare, quam tumorem improprie & potius pustulas: Et τὸ φωρίσμα & φωρίσματα ad pituitam potius

quam ad flavam bilem referenda sunt: Tamen quoniam ubi bilis cum sanguine fervet, bullæ & tenues vesiculæ excitantur, ideo parum Medice fortasse ea omnia nomine τῶν φωρίσματα comprehendit: τὸ γὰρ φωρίσμα in bullante humore dicitur: Et ebullientis sanguinis eruptio φέρμα ab Euripide nominatur, quam significationem Plato sequutus: Sed quaeritur hic, Cur bilis cum sanguine mixta fibrarum proprio ordine dimoveret? Quomodo id sit? Primum quid est fibrarum genus in τῷ σώματι deturbare? an fibras elidit, destruit, ut sanguis expertis fibrarum dicatur? Id videtur Plato, & Hippocr. 1. de morbis primus statuisse, Sanguis, inquit, ad sapientiam maxime facit, cum bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consuetudine consistentia ac motu emover, terosum facit ac calefacit. Calfacto hoc corpus concalescit & homo desipit sanguine in serum transmutato, motu non solito contingente & præ febre.

Cum itaque Plato ait de bile, cum puro sanguine mixta fibrarum genus elidi & perturbari, id videtur esse quod scribit Hippocr. A bile sanguinem subeunte ipsum sanguinem tripliciter affici, 1. suam consistentiam amittit, attenuatur enim, id quod non sit nisi fibrarum vitio: Item ex proprio motu dimoveretur, & alium quandam cursum inflectit, 3. calefacit, Unde hæc per bilis subeuntis vim & potestatem: Plato tamen paulo obscurius loquitur quam Hippocr. nam ait genus fibrarum de proprio quodam ordine deturbari ob ipsam bilem: Non dicit fibras corrumpi, non sanguinem attenuari & in ichorem resolvi.

§. 15. Quidam cum febre & dolore ad hypochondrium dextrum pedes habuit oedematoso tumore inflatos: Epar in se conclusum habebat abscessum, ex quo pus in omentum & mesenterium influxerat. Vide lib. 3. tit. de Hypochondr. tumore.

## OBSERVATIO XX.

Tumor Oedematosis manus sinistra, cum ulcere in vola, ab ossibus metacarpi corruptis & demeritis integre periostio.

Pædarthrocace Severini, Spina Ventosa, Ventus Spineus.

**D**um Patavii Studio Medico operam dedi, Nob. quidam Studiosus laboravit per aliquot menses oedemate manus sinistra, quod post universalium usum sub præstantissimis topicis nunquam diminui, sed tandem in vola exulcerari cepit: Quare adhibuimus in consilium Exc. Spigelium, qui postquam ulceris qualitatem specillo explorasset, & os corruptum terigisset, statim tumorem vocavit spinam ventosam, quæ Malum est incurabile & amputationem partis affecta requirit: Provenit autem in Spina ventosa ab humore qui occulta & insensata qualitate primum ossa, citra omnem periostii lationem, atque doloris sensum, corrodit, deinde Oedema efficit minime dolens, & post aliquot menses partem exulcerat: Consensu ægroti oborto, manum extremam supra radii & cubiti appendices scalpello falcato, ac ferta tesecit: cubitoque splenis, vesica & fasciis obligato.

In parte amputata reperi. ossa metacarpi quidem corrupta, sed periostio undique, præterquam in loco illo ubi ulcus, adhuc contenta. Hunc gravissimum effectum fusc describit Marcus Andr. Severinus lib. 4. de Abscessuum recondita natura. Joh. Scultetus Armat. Chirurg. Observatione xc.

Provenit Spina ventosa? Quia accuratè & succin-  
te hunc morbum describit P. de Marchetti, ad  
calcem sylloges observat. Medico Chirurgic. hic artex-  
re placuit quæ de eo tradit: Materia hujus morbi est  
Pituita, Locus effectui semper articuli, nam quam vici  
intermedia primario, quæ tamen si aliquando cor-



rumpantur, id fit ratione sympathiz: *Modus generatus* hic est, Si pituita nutritionis articularum dicta putrescat, aut quodammodo fiat acrior, primo ossa corumpit, & quidem nullo dolore, quibus postea corruptis, periostium labefactatur, cujus *signum* Dolor pungitivus, acutus & lancinans, ita ut patiens referat se veluti spina pungi, unde Spinaz nomen morbo inditum: Dum vero huiusmodi dolore zger divexatur, atque periostium eroditur, nullus adhuc apparet tumor, corruptis vero, & quidem primario osse, secundario vero periostio, materia pituitosa libere permeans per loca carnea, at tollit articulum affectum in tumorem 1. mollem & laxum ac doloris expertem, euri concolorem, qui patefactus durior evadit, confluyente eorum copia, quorum tenuior pars exhalat, superstitie crassior, ex quo insuper emaoat materia serosa, atque specillo os corruptum, prout dixi, se prodit: Ad xxv. annum circiter ut plurimum observavi tum viros tum feminas huic morbo obnoxias, non vero provectiori aetate, nisi antea eodem tentati, necdum convalescerent. *Signa pathognomonica* sunt, dolores ab initio insitit puncturæ spinæ articuli affecti, adolescentia, tumor, mollis, laxus, qui hians serositatem effundit, cui si pus immixtum fuerit, huius ex corrosis partibus canosis aliqua portio gignitur: Quod ad *prognosin*, Hic morbus ægri sanabilis, tum ob assiduum materiz confluxum, tum ratione corruptionis ossis, quæ quo gravior, difficilior evadit sanatur. Incipiens facilius cedit antiquo, nunquam tamen sanandus remota fluxione & sublato toto osse corrupto, vel igne vel ferro: *Curationem* quod attinet, statim ac patiens conqueritur de dolore pungitivo, spinoso veluti, in articulis vel manuum, vel pedum, cubitorum aut genuum, quauquam hoc rarius, sive malleolorum, statim, nullo licet apparente tumore, sectio ejusdem est facienda, à qua non tam cito demittendum specillum, quo os corruptum inæquale percipitur, indicio ejusdem ante ipsam periostium corrupti. Tunc vero prima elicitur indicatio, nempe ejus cariem abra-  
dendi, sine cujus prædij ope, tum in ulceribus, tum in vulneribus, nunquam ad firmam cicatricem deducuntur: Osse vero sublato, curanda carnis genera-

tio, cicatrice tandem indurata: Quod si ob loci profunditatem ferramenta abrasoria insinuari non possint, utendum igne actuali, Dilatato igitur foramine, sectione, spongia præparata, radice gentianæ, medulla sambuci aut forgi, in idem demittenda cannula ferrea utrinque perforata, mox candenti ferramento os corruptum inurendum, quousque perito artificio ex usu videatur futurum, ut statim abscedat: Tum vero curationis quod superest modo superius proposito prosequendum: Quia vero interdum accidit ut totum internodium, maxime in pueris, digiti manus, vel pedis fit corruptum, hoc casu neque ignis, neque ferramentum juvant, quorum loco utendum Trepano tenajori, quo perforanda media pars ejusdem, quæ, forciculis affabre in hunc usum paratis, partes laterales secandæ, atque totum internodium paulatim educendum volvella, cujus vacuus locus progressu temporis carne oppletur, qua quidem in pueris duriore quodammodo facta, & veluti callosa, ossis vice fungitur: quanquam ubi totum internodium et ablatum digitus, muscularis ac caput suum addidit, & cedente carnis mollitie, decurritur: Quod si Medicus accedat facta jam soluta unitate ab ipsa materia pituitosa, ex putredine acriori facta, tota curatio dirigatur ad ablationem ossis corrupti, machinamentis & industria superius propositis, quibus aliquando duo, tria aut plura quin etiam ossicula evelluntur: In ossis vero abrasione, ustione aut evulsione, cavendum ne tendines offendantur, metu convulsionis: Hæc est curatio topica hujus morbi, cui totius corporis cura præmittenda, phlegmagogis, hidsoticis, &c.

*Malum est incurabile & amputationem partis esse requirit* Scilicet consummatum & cum proposita præsidia non suffecerant videntur imminenti Preservationem tradit Severinus libro dicto cap. xix. Curationem, ubi malum levius est, per scalpeli ablationem, cap. xy, ac si profundius sit, per Terebrationem & ferri candentis admotionem, *Ibidem*. Pzdat throacem in puero à nutrice lue venerea hantem, meteurialibus sublata non sine labore magno tradit L.D. Horstius manu ad Medic. p. i. cap. 1. § 2.

OBSERVATIO XXI.

Tumor in capite Pulsatorius Aneurysma in meningibus sequuntur. 1. In summo pectore à dilatatione insigni Aorta. 2. Aneurysma quartam thoracis partem interius occupans. 3. Sub sinistrâ homoplatâ, ob sanguinem ex magna ad caput ascendente arteria, in musculorum spatia effuso. 4. Aneurysma Aortæ arteria. 5. Tumor colli pulsatorius ab Aneurysmate arteria carotidis 6. In Dorso tumor pulsatorius ab Aneurysma aorta è directo. 7. Brachii tumor pulsatorius infelicem ventris sectionem sequutus. 8. Sub clavicula dextra ob aneurysma arteria magna. 9. Cruris ob dilatationem ejusdem arteria. 10. Cruris ruptam arteriam cruralem. 11. Aneurysma fit arteria tunica interna corrosa aut rupta, Externa dilatata. 12.

§ 1. Quidam à bipenni in capite graviter vulneratus ad suturas sagittalem & coronalem, cum dextri sincipitis læsione, convaluit relicta ob abscessum ossis in loco affecto præternaturali mollitie, & quadam cerebri debilitate, cum vagis capitis doloribus, ob quos tenuem victum semper observavit: Ad finem vergente anno 1671. (ictus anno 30. annos) in dicto sincipitis loco tuberculum exortum est, primum cerasum, mox juglandem adæquans, quod tamen fidens tenui suæ dietæ sprevisse visus, donec surgente hoc anno 1672. quotidianum tumoris augmentum advertens curæ Chirurgi se concederet: Hic omnia examinans, in mollis ac pulsantis tumoris in dies accrescentis medio, vesiculam quandam observavit coloris rubri, quam metu inevitabilis hæmorrhagiæ nonnisi post aliquas visitationes cauta manu aperuit, sanguine, ut in Aneurysmate fieri solet, saltuarim profusiente, donec aptis ad id medicamentis applicitis sisteretur: Acuta post dies aliquot febris supervenit, cum ingenti siti, vigiliis, singultu, urina confusa, & tandem erysipelate rogius capitis ac unius pedis, quæ symptomata remedium vi ad tres vel 4. dies remissionis

vila sunt, ac tandem recrudescere enim non dubitis suppurationis signis: hinc tumorem Latius aperuit Chirurgus, ut & retento puri exitum daret, & sibi viam pararet, cujus ductu Aneurysma deieceret: Cum sanguine extravasato nigricans & fortens ichor primum effluxit, quo secum vacuato post dies aliquot tenuis, nec satis coctum pus, hinc inde inter cranium & duram meningem diffundi ac moveri quotidie videmus, ad cujus egressum collationes varias adhibuimus, quæ tamen valde exigua puris partem, ob figuram cranij aliasque difficultates eduxere, relicta autem purulenta ac corrupta materia, quarto ante obitum die universalem induxit torporem.

Mortuo ægro veram morbi ac loci affecti naturam investigare animus erat, sed reluctante vidua, non nisi novacula aperire licuit communia capitis integumenta, sub quibus circa eorum deperditionem utriusque laminæ dextri fincipitis ascendimus, ad magnitudinem thaleri uncialis, per quam extraximus conspicuam grumosi cruoris copiam, duræ matri immediate incumbens: Si cranium aperire licuisset, veram Aneurysmatis duræ matri in ubi sedem ac naturam disciscimus *Herr. & Moenichen Obs. 78. Añorum Med. Barh. an 1671. & 1672.*

*N. melius de Pulsatione tumoris*) In capite tamen nulla, dein in vivis erat homo presente pulsatione, ac maxilla Aneurysma post mortem se invenisse testatur *P. Barbesse Chirurg. cap. 16.*

§ 2. I. Pauli anno 1641. Tumor cum valida pulsatione circa claviculari sinistræ & sterni conjunctionem subortus est, qui in tantum increvit ut exterius pugni magnitudinem multum superaret: tandem ex continua sanguinis excretionem ebiit. In thorace partim sese conspectui dedit dilatata arteria aorta ascendens, cujus paulo supra divaricationem tanta erat amplitudo, ut duas libras sanguinis & ultra capere posset, quæ exesa videbatur. *Vide l. 2. §. 3. Obser. 3.*

§ 3. Disrupta arteria & facta in carne Aneurysmate, Aneurysma in carne eadem ratione ut arteriæ pulsare sentitur, in quo manifeste caro sanguinem dilatatione non astrahit, sed in eam sanguis pellitur: Quale miserandum exemplum in Excerpto Viro Johanne Elemanno vidimus, cui disrupta arteria in Aneurysma quartam thoracis partem occupaverat: quale & observavit *Riolanus Anthropogr. lib. 6. cap. 12. Joh. Balanus Epist. 1. ad Th. Barthol. de motu Chyli.*

§ 4. Cum Ioh. Fabri, ætatis 60 annis, & sedulus Palatii Monspelienfis Scriba, præcipuum juvenis partem in comessationibus, frequenti atque intempestivo meracioris vini potu transgesset, exiit circiter quinquagesimum ætatis annum ægre respirare, & molestissima cordis palpitatione laborare: Ad huius morbi depulsionem suere non solum à nobis, sed & à nostræ Academici præstantioribus Medicis præscripta varia præstida: Quæ cum continuæ & pericax morbus, ob perseverantem malum victus rationem, prorsus contemneret, deterius habuit, & transactis aliquot mensibus, quibus Medicorum consilio nullo medicamentosis est, (volebant si curationis partem chronici affectus naturæ committere) cepit de illius partis, quæ est sub sinistra hominis plura, queri: Inspecta, & optime animadversa doloris sede Tumor insignis mihi apparuit, tactu mollis & cum pulsatione, & digiti pressu totus fere delitescens, & his ablatis recurrens: Cum vero hic morbus jam altas radices egisset, essetque deploratus, vitam cum morte commutavit.

Ut autem & constitutionis morbi, & ejus causæ certiores essemus, Tumore tentatam partem disciscimus, ex qua sanguis crispus, sed viscidus profudit, quo plane evacuato & detergo, apparuit nobis prima arteria sub corde, ex magna ac caput ascendente orta, maxime dilatata & dilacerata: Hæc descendens intercostalium musculorum regionem perrepat: In musculorum spatii coacervatus sanguis, temporis diuturnitate putrescens, illius loci vertebam & costam ita labeatavit, ut ea sola à nobis visceretur. *Antonius Saporita de Tumor. p. 1. c. 43.*

*S. Ennerius* Pract. l. 5. p. 1. cap. 45. censet morbum hunc, quem Saporita describit, Aneurysma non fuisse, sed sanguinis accumulationem, ex rupta arteria, in vicina loca effusionem & corruptionem: Etenim, si ex ejusmodi effusione fieret Aneurysma, certe ille in lrum, & longum, & circumcirca se distunderet, cumque alieno colore tingeret, sicut contingit in conquisitionibus & venæ sectione male peracta, atque id facilius ob sanguinis arteriosi tenuitatem, quod non accidit in Aneurysmate, in quo suis limitibus circumscibitur: Neque sufficit, quod *Platerus* scribit, sanguinem sub cute sibi finem formare (qua de causa incorruptus permanet, quod sic influentis causæ influxu non destituitur, imitatur eorum in quos se arteria, in crassa cerebri membrana infundit, eundemque sanguini extra arteriam effuso esse illo loci arteria, & sanguinem citra corruptionem in arteriam remeare posse: Etenim sinus illi à natura facti sunt, membranisque exacte clausi, ut nihil omnino ex his effluere possit: Talem vero sinum, si quis arteriosus sibi nullomodo formare potest, sed ubi ex arteria exiit, unde quæque sese distendit, & cum ubi cure omnia sunt facilissima, facile, quæ via aperta est, in vicinas partes erumpit, quod & sanguinem venosum, qui crassior, est facere videmus, sanguisque ille in aliquo loco putrescit, quod hystoria à Saporita allata ostendit.

§ 5. Excitari posse Aneurysma in ipsa quoque Aorta, licet nunc videatur, & experientia tamen docuit, & tale Aneurysma favore Nob. *D. Gulielmi Riva*, Anatomei famosissimi videre mihi contigit Romæ in suo Museo, in quo, inter multa alia rara anatomica, conservatur Cor in cævo quodam liquore cum aneurysmate Aortico, sarcocicis farciminatum involutis. ejusdem cum arteriæ dilatatione maxima, aliorumque cordis vasorum circumfuso sanguine in se repleto, amplitudine chyli fere thoracico ad digiti æquamen turgido se deplere vetans: Quid in Lauræ Peronæ cadavere 31. Mart. 1664. in publica administrata se-

atione detexit; *Figuram vide miscellan. med. anni 1670. observ. 18. Ex observat. Jacob. Georg. Elshanti.*

**V**arices venarum in variis corporis partibus orti posse constat ex auctorum observationibus, imò in vasis internis, uti varices in vasis pulmonis olim annotavit *Hippocr.* Nec mirum, venae quippe valvulis ubique abundant, hinc sanguis copiosus & crassius à venis majoribus ad minores fluens ob crassitiem & suam viscositatem ad valvulas vasorum subsistens, & inde incrementum capiens, venae tunicam facile distendere potest, ut non incongrue liceat quoque decisionem dare cur frequentissime in cruribus varices oriuntur, scilicet valvulae in ramo cruruli fortissimae, imò duplicatae sanguini incurrenti valide insistant. Aliter plane res se videtur habere in varicibus, vel potius aneurys-

matibus arteriarum ibi enim sanguis remorem dantes in arteria, summam saepe acquirit acrimoniā qua erodit internam arteriarum tunicam, & hinc excipit Tumorem cum forti pulsū, quod in arteriis carotidibus in collo ut plurimum accidere solet, & interdum quoque in aliis minoribus, raro vero vel nunquam in majoribus: In his enim ratio vix ne vix ejusmodi distensionem admittit, cum tunicarum illarum fortis resistentia istam impedit, nec valvulae adfuit, motus quoque celerior sanguinis quam in venis extet, quae omnia impediunt ne tam cito exciteretur aneurysma. Excitari tamen quoque posse in Aorta citatum exemplum probat.

§ 6. Pauperrimi ejusdem viri Aneurysmate extincti cadaver dissectimus: Videbamus sanguinem copiosum, tam serosum grumosum, tunicas arteriarum utrasque erosas, & claviculam sinistram maxima ex parte carie erosam. *P. Barbette Pract. lib. 2. cap. 3.*

**A**neurysma est tumor paucis digitis illum comprimētibz facile cedens, illique ablati statim rediens, cum forti pulsū: Pars affecta saepissime, imò fere semper, ob arterias carotides, collum est, Observevavi tamen illud in genubz & brachiis: Causa est humor acris, serosus, biliosus, internam tunicam erodens, imò & externam crassiorem, imò & viciniora sibi ossa: Parva curatu difficillima, magna incurabilis, nec curatum in collo vel unicum vidi: Palliativa cura diu vivere possunt: Chirurgi artis propriis

ignari Abscessum judicant, eoque aperto scapello, moriuntur acri illico in eorum praesentia: Tumor ab initio statim comprimendus, humorque acris repellendus: urrumque commode fit per tenuem laminam plumbeam: Quidam volunt ut sanguis affluens interceptetur, arteriam supra & infra Aneurysma ligando, illudque postmodum excidendo curare, Sed hoc remedij genus dolorificum, necatum est, nullum ego vixit conservanda: ergo brachium vel pedem amputare. *Idem.*

§ 7. Cum anno 1557. Nob. Leonardus Velferus ex Aneurysmate interno, quo diu variis symptomatibus confictatus laboraverat, tandem obisset, defuncti cadaver, ut mortis & affectus causam indagarent, sectum, à quibus haec visa *Achilles Cosserus ad Vesaliū* transmissit: Secto ventre apparuere membre naturalia satis bene disposita, In ventriculo & intestinis nullum erat vitium, Hepar integrum & valde magnum, Vena cava item maxima quanta forte nunquam visa: Ea rupta erat qua parte Aneurysma ipsam attingit: Lien admodum brevis, & exterius ex parte subalbidus, ac quasi semiputridus: Cor magnum sano simile & plurimo sanguine abundans: In ipsa Aorta dilatatio non modica, ad palmæ magnitudinem, quae costis & dorsi vertebriis ita erat adnata ut integra separari nequiverit. Ea igitur divulsa, emanavit sanguis tenuis, ruber, & qualis esse solet arteriosus, qui contentus fuit concreto quodam cruore, seu carniformi materia fibris destituta, quam rursus circumdedit subalbidā & dura quaedam substantia transversī digiti spissitudine, colore & specie lardo suillo elixato non ab similis: Tota autem Aneurysmatis compages, cum suis contentis pugnum non parvi hominis, sed ovi struthiocamelī magnitudinem fere aequabat: Costae circa locum aneurysmatis medium erant quasi cariosae, una prorsus (ex fortissimis proculdubio impressionibus) rupta & fracta, similiter & dorsi spondyli eo loco, quo supra diaphragma aneurysmati connexi erant, spongiosi, & ita arrosi, ut uni atque alteri supremi minimi digiti superficies inferi potuerit, citra tamen insignem fœtorem: Pulmonum nulla lœsio, licet exeger copiosum sanguinem aere obitum ipsum exspuerit, adeo ut eo spūto suffocatus adstantibus videretur: Extrema cutis, ubi in dorso Tumor & pulsatio in vivente nonni poterat, à morte livida & sanguine suffusa ad instar flagellatorum: *Joh. Vdaly. Renslerus observat. lxxxi.*

*Eadem historia ab Adolpho Occone, paulo aliter descripta.*

**A** Nec annos plus minus xl. habui cum collegis in cura quendam Patritium, Nobil. L. Welferum: Is ex saltu & concussione equi ferocientis incidit in vehementissimum dolorem Dorsi, qui nulla erat medicabilis arte, plurimis & diversis cujusque generis tentatis: Tandem ex Belgio huc vocatus Vesalius, cui Anatomicis administrationibus suo tempore par non erat, sedam superior, Is ut deprehendit Tumorem aliquem haud ita magnum in Dorso circa vertebrae ap. spinam pulsanem, statim dicebat esse *aneurysma ex dilatatione aortae arterie*: Nam ut in varicibus videmus contineri sanguinem in media vena, ita in hoc affectu in media aorta arteria, idque ex saltu seu concussione equi contigisse

*et incurabilem fore.* Idem assererat se ejusmodi affectus vidisse in Gutture, in pectore, in poplite, in brachiis, & semper inferre extremos dolores & tandem siderationem, nec curari nisi abscissa parte affecta: In ejusmodi Aneurysmate se quandoque reperisse humorem concretum instar glaciei aut humoris crystallini: Interdum veluti sanguinem concretum, aut mollem: In vivis corporibus verum sanguinem deprehendisse in defunctis nigrum & si iterum & cum gravissimis doloribus ægros mori, sponte interdum fieri ejusmodi valorum dilatationem interdum ex causa antecedente, qualis fuit in hoc nostro ægro, qui supra biennium hoc gravissimo morbo confectus, omniq. auxilio medico destitutus, tandem in manus Empirici incidit, qui salutem pollicitus exhibuit catapotia nescio qualia, ex quibus in sanguinis spurum incidit, & miser ille in sinu conjugis tandem extinctus 25. Junij 1557.

Dissecto corpore reperimus id quod Vesalius prædixerat, in ipsa Aortæ arteriæ cavitate Tumorem prægrandem, durum carnosum, ex sanguine arteriali concretum; qui foras etiam protuberans, in dorso dolore & pulsationes inferebat, ejusmodi nimirum qualis in arteriarum pulsu deprehendi solent.

## APPENDIX.

*De infelici Aneurysmatis apertione.*

**I**ncurabilem fore) Sactifico euidam, Mag. Johanne Mailleto: cum ad humeri dearticulationem Aneurysma inebset novis juglandis magnitudine, edixit id sibi aperiri curaret, alias vitam in manifesto futuram discrimine: tutius ipsi futurum si conduplicatis linteis in solani & azoosucco maceratis, caseo recenti & seroso admisto: Si unguento de bolo, emplastro contra rupturam, alii que refrigerantibus & adstringentibus mali imperum rerunderet, si laminam plumbeam imponeret, caligisque uteretur brevioribus: ut ad eam contendendam esset illi thorax ex quo caligas subnoctabat fasciæ loco, interim vitaret omnia quæ sanguinem attenuant & incidunt: præsertim vero a vocis omni contentione sibi temperaret: Hac dicta etsi per annum esset usus, efficere tamen nequivit quin tumor cresceret: Quo animadverso Tonsorem adiit, qui ratus tumorem illum esse ex genere vulgarium apostematum, pyroticum escharoticum, quo apertionem moliretur, sub vesperam apposuit: Exocta nocte sub auroram tanta sanguinis, rupto tumore, prorumpebat copia, ut artorius omnium opem impioraret, atque me vocari juberet, qui ipsi hæmorrhagiam tantam sisterem, ponere quod monitis mihi obsequens fuisset: Vocor igitur, sed cum vix dum æ ilium limina attingissem, jam animam cum sanguine reddiderat: Quare tyronem Chirursum diligenter monitum velim ne temere aneurysmata, nisi forte exigua, & in parte ignobili nec insignibus vas prædita, aperiat, hanc potius curationem aggrediat, Cutis super incidatur dum pateat arteria, patefacta ipsa scalpello undique à circumstantibus partibus diducatur, ipsi reclusi & incurva acus interstium filum trebens subjiciatur, ligetur, hinc abscindatur, intorti filii lapsus ex sese expectetur, dum natura abscissæ arteriæ oras regenerata carne obducatur: hinc reliquum curationis simplicium vulnere modo obducatur, idem ibidem.

§. 8. Napoli quidam 1644. mense Martio, *quum venam sibi jussisset secari*, arteriæ passus est incisionem: Sequuntur Aneurysmæ, quo neglecto abscissum brachium: Visus illo abscisso magnus arteriæ hiatus, adhuc verius alas superstitis: Brachium detruncatum dissectimus, Vix aperta scalpello cute, sanguis exivit copia nigri, sed tenuioris: mox obviam habuimus amplissimo spatio, inter musculos facto, sanguinis crassi & in grumos concreti largiorem quantitatem, quæ extra naturale vas effusa (sive post ligaturam) necessario computruit: Ad arteriam secandi ordinem digressi, ruptam eam vidimus, & in frustula exigua ita divisam ut per partes exilliret, & tantum parte integra quæ loco inferiori sita puncturam effugerat: Nec alia venæ conditio, quæ nusquam apparuit: Tandem arteria à brachio separata, nihil fani ostendit præter subjectam partem, quæ utramque tunicam illæsam servaverat: In sana autem arteriæ parte sinus videbatur, quem valvulam credidi, sed exitus nullus, nisi ostiolem putredo absumpserit, sicut abradentibus nobis visum. *Bartholinus centur. 2. histor. 9. Fuisse historiam tradidit historia singulari Panormi edita, de Aneurysmate.*

**Q**uam venam sibi jussisset secari] Aneurysmatis duplicem agnosco generationis modum, unum à causa externa, vulnere scilicet, arteriæ, sed non tam certum quin sanguis impetuosè inmens in imbecillè tunice partem eam in tumorem non attollat: Alterum ab interna, quæ est apertura seu anastomosis arteriæ: è qua sanguis egrediens in interitum musculorum densatur in thrombum qui sensim adaugetur, magisque per moram excoctus, in carniformem

massam transiit musculus haud ab similem, quæ & repetitur contra, & in sui centro copiam nigri concreti quæ sanguinis continet: Hæc à me suffulso experientia dicuntur, per dissectionem hujus affectus acquisita, de quo tractatus à me editus Panormi anno 1644. Confirmitur hæc experientia *Bogdan* observatio 8. Namquam vero poni concipere, quomodo rupta interna & crassa arteriæ tunica, integra remaneret extra renouissima, araneum relis similis, (quod placet *Sennerto* l. 5.

p. 1. cap. 43.) Aneurysma possit generari, cum ejusmodi tunica cum distinctio omnino ut à rei veritate aliena, Sic autem prior casus astringendo comprimendoque tumorem sanari potest, ita secundum curationem

vix admitti, nisi quis velit comprimendo arteriam, cutemque dividendo, globum carneum auferre, arteriamque disruptam sarcoticis adhibitis nova carne repleve: *J. Van Horne Macroscop. §. 36.*

§ 10. In Collegio Rhemenſi cuidam Sacerdoti Aneurysma erat in cruribus: Aperto cavere reperta est magnadilatatio arteriæ, & sanguis in ea arteria concreverat induratusque: Indurationis causa tribuebatur immoderato rerum refrigerantium usu. *Lat. Theron. Nota 8. in consil. 107. lib. 1. cons. Ballonii.*

§. 10. Dom. Pelet civis Monspelienſis quinquagenarius, atrabilario temperamento peccatus, cum gravissimis curis esset afflictus, post multa symptomata melancholiam hypochondriacam attestantia, passus est tumorem sub clavicula dextra eminentem, & ovi dimidi magnitudinem æquantem, mollem & reliquæ cuti concolorem, in quo pulsatio insignis apparbat: Indicatum fuit esse Aneurysma insanabile.

Eo defuncto, inventa est arteria magna ascendens à corde ad claviculam ita dilatata, ut brachii fere magnitudinem æquaret, & ovum gallinaceum in suam cavitatem facile admittere potuisset: Præterea tunica illius admodum densa & cartilaginea evaserat; quod admirabilem naturæ providentiam notat, quæ tunicæ maxime dilatatzruptionem evitare contendens, eam densiorem ac duriorum effecerat: Sic vidi Renem xxi. calculis reſertum, in magnitudinem altero rene quadruplo majorem excreviſſe, & quasi natura eum amplificare voluisset, ut calculos illos cum minori incommodo continere posset. *Lat. Riverius cent. iv. Observat. 34.*

§. 11. Nos super lethale Aneurysma vidimus in Juvene Nob. ex læſo femore, nec mirabimur, quia arteriam magnam cruralem ruptam in apertione vidimus, unde in tantum tumorem femur excreverat, prorsus quasi scirrhum, ut non tantum ea copia sanguis ex aperto post mortem femore effunderetur, quæ tres measuras nostras impleteret, sed ex sinibus, inter musculos vastos efformatis, sanguinem grumofum, parenchyma hepatis maximi forma & magnitudine referentem, extraheremus. In isto Viro nec sectio tuta erat, aut possibilis, propter magnæ arteriæ, & inter musculos deliteſcentis ingentem rupturam, Nec ligatura ſufficiens. *Th. Bartholinus in miscell. cur. ann. 1674. 75. & 76. p. 58.*

**E**X eodem loco felicem Aneurysmatis curam post infelicem V. S. adducit Anno 1655. Tonſor formine sexagenarie arteriam pro vena hepatica fecit: sanguinis cum impetu fuit floridus, brachiumque intumescit cum quadam venientia, Empiricus hic sanguinis copia ſat longa pro morte emiſſa, quasi te bene gesta vulnuscum deligavit: interea tumor ob sanguinis per arteriæ ostium in musculorum ſpatio effuſi copiam indies attollitur, nec ullis fomentis diſſolvi poteſt Ipſo tandem medicastro ex desperatione fugiente: menſtruo poſt ſpatio aliis adſciſcitur Chirurgus cum Medico, qui periculi magnitudinem attendentes ſtatim adſtingentibus & aërta ligatura tanto malo obviam decerneret eune, sed poſt ſeſſum & caſſo eventus: veſiculæ enim plures & tubercula, quasi aneurysmata, circa medianam & cephalicam hinc inde oriuntur, quæ tractu temporis ſponte rupta tantam sanguinis copiam effundunt, ut ſelectiſſimis remediis liſti non poſſit fluxus iſte per quatuor ſeptimanas, eo quod ob ingentem tumorem arteriæ oriſcium, etiam ſagaciſſimis oculis non patet, donec in putredinem gangrenofam abeunte toto brachio, ſingulis grumofos, ovum gallinarum magnitudine intumefcentem ac inſigni cum ſæore exeret, ac omnis caro muſculoſa, quæ inter ſim omimode computruerat præter tendines, nervos arteriaſque oſſa ac perſoſſa diſſolueret ad humerum

uſque: Tum demum in conſpectum veniens arteria oſcalum convenienter obſtutatum, & caro ablata ſarcoticis, probeque diſſecta ſpatio biſecti integre reſtituta fuit ad naturalium uique: *Hæmorrh. ejusmodi eventum feliciter correxit laudano opiato, ſuper impoſita Empl. ſtictico Colliti.*

Eadem fere modo curatum eſt hic Aneurysma, quod femina quædam ſilium propdum 7. ann. baculo ad ſiniſtram capitis partem capillatam, qua caſuſiſſimè tranſiit, el. graviter percutiens excitaverat, male tumor pulſatilis avellane primo magnitudine, nigricans, mollis & digitis cedens ſtatim obortitur, & oſculi ſpatio in tantum augetur, ut dimidiam capitis partem à ſutura ſagitali per tempora & frontem ad oculum uſque ſiniſtrum occuparet: Conſulti Medici anocæpremediū certifiſſimo vitæ periculo perfectiſſimè dum ceſſantes, ſcalpello vulnuſculum inſiſſigunt, ſtoddique ſanguinis parte quadam emiſſa, quadam vero arctiſſima ligatura & ſtypticis cohibita, dum crebro id agunt brevi reſtituunt, Idque eo quod in tenetis adhuc omnia tenera & coacta ſaciliſſime quod arteria læſa os ſubjectum habuerit durius, ut arctiſſime poterit conſtringi, Hinc arterias temporum & frontis ſaciliſſime aperiri poſſe aſſerit *Riolanus in Encheir. An. p. 332. Johannes Michael Fehr. in miſcell. cur. ann. 1674. 75. & 76. p. 55.*

§. 12. Arteriæ omnes, exceptis iis quæ per cerebrum partesque omnes alias conſiſtentes magis, diſperſæ ſunt, tunica duplici gaudent: harum interna corroſa aut rupta, externa in tantum diſtendi poteſt (abſque ruptura, quicquid alii contradicant) ut Aneurysma cauſetur: Nihilominus abſtumor hic pugni magnitudinem habet, haud fieri poteſt quin ſimul etiam externa corroſa aut rupta ſit: Anatome ſententiam noſtram confirmat: Poterit tamē & tumor hic excitari ab arteria diſſecta, præſertim ſi tunica exterior undique urliant muſculis, & interna propter continuam pulſationem aperta maneat. *Barbette Chirurgia cap. 16. p. 2. lib. 1.*

## OBSERVATIO XXII.

*Varices imi ventris ab iliaca venis ortum ducentes.*

**M**ulier xxv. annorum ob uteri angustiam maxime in partu periclitata est, ita ut nunquam pristinae sanitati restitueretur, sed tribus post partum elapsis annis mortua est. Miſera quæ ipsam pariente & post partum excruciat hęc fuit: Venæ duæ serpentum more volubiles, tortuosæ & varicosæ, ab iliaca venis externæ ad umbilicum usque aſcendebant, majori crassitudine quam digiti pollicis, quæ inspicienti similitudinem literæ lambda Græcorum referebant: maximus deinde secundum mulieris motum fluxus & refluxus fiebat, non sine maxima ipsius patientis læsione; cum enim supina decumberet, statim syncope corripiebatur: quare necesse erat, aut in latus jacere, aut orthopnoicorum more cubare. Accidit aliquando ut fortissimo deliquio corripereetur, & mortua est.

Secundo cadavere, venasillas, alteram ab Iliaca dextra, alteram à sinistra in unum coeuntes globum in umbilici regione observavi, ut in magnam cisternam terminarent: umbilicus denique ipse aperto emerito vaso (nempe vena umbilicali) lecur continuo impulsu sanguinis percutiebat, cum ipsa semper menstruata fuisset. Monstruosum alpe ætu tum ipsa vivente tum mortua. Dom. Panarolus Pentecoste 1. Observat. 7.

**M**isera quæ ipsam parientem &c. ] Quandoquidem tēfex quid venarum dilatatio ad sanguinis motum alterandum faciat explicare, notandum est, aut ob partis conjunctam compressionem, aut sanguinis copiam vel (sive id ipsius pondeti, sive relaxato venarum tono, sive cordi sanguinem non debita vi impellendi debeatur) resistenti difficultatem, venas possitum ampliare: Et propterea in Gravida, propter venam Cavam & utramque Iliacam in infimo ventre à mole uteri compressam, tum propter sanguinis & humorum incrementum, & difficultatem ab intestinis paribus ascensum: Et in virilibus & melancholicis, propter cordis motum languidum, venas tibiarum in magnos Varices distendi saepenumero contingit: sanguis scilicet in tedum præpediſus, aut sufficiens vi à tergo non impulsus, in venis inferioribus diutius sistitur, & tandem pondere suo ac mole eas distendit, ut sub amplius spatium acquirat: Atque ideo ubi lecto iudius se tradunt, vel illic factura enixæ sunt, propter facilitatem sanguinis versus cot. recu. sum, venæ illæ protinus inaniuntur: verum cum longa consuetudine ampliatæ fuerint, non ita facile in priſtinum tonum reſtitui poſſunt aut coarctari, quin sanguinem à corde & vena cava diverſendo, circulationis filum ſerièrque valde interturbent: unde pulſus deſicientia & vitium languor (imo ſyncope, ut in eſſu prædicto) propter venas illas valde dilatatas ſuccedunt: Atque hoc non ita pridem in quodam tuſſico, xl. circiter annos nato, & longa tuſſia pene conſecto accurate obſervavi: Tanta enim varice, ſive vena dilatata in parte anteriore tibiæ ſiniſtræ adeo vere laboravit, ut magni ſcatiminis inſtar à malſculo ad genuſque turgereſſet & eas inceſſu valde moleſta fuerit: quantum quoque ex tumoris magnitudine conſpicere potui ſete duas libras ſanguinis continebat: cum vero in humum reclinatus tibiam egiſſet, aut manu ſacculum illum ſanguinis ſuſum verſus leviter urgeret, tumor ex ſanguine in venam cruralem & cavam tranſmiſſo, pulſum evaſuit: Cum autem in pedes iterum erectus ſtaret, intra breve ſpatium folliculus ille in priſtinam molem aſſurgerebat: quod à ſanguinis novi influxu fieri certum eſt: Cum vero præter pondus illius moleſtiam ſe inſuper imbecillum & ſi paulo diutius ille tumor perſeveraſſet, ſe valde languidum conquerereſſet (quod deſectio ſanguinis & intercepſio cordis pabulo imputandum puto) ad utramque

moleſtiam præcavendam conſulſi ut valde ſtriſta cingula, aut ſciſcia, tibiæ ſen per adſtingeret, & emplaſtrum adſtingens adponeſet, quo in poſſem valde levatus fui. *Richardus Levrier Traité de Cordes pag. 113.*

*Continuo impulsu sanguinis* ] Maniſteſtum eſt in Varicosis ſanguinem è venâ cavâ ad majores, à majoribus ad minores: venas deſcendere: Id enim in varice femoris, pedis & hæmorrhoidibus obvium eſt: Verum ille motus ſanguinis poteſt p. n. contingere, quod debilitatæ venæ ſanguinem ſuſum non mittant ſed colligant, & quod humores ſua gravitate motui naturali ſuſum ſenſitanti & deſcendenti, unde in inferioribus venis ſenſitanti, accedente ſemper ex arteriis novo ſanguine earum dilatationem & varicem faciunt: Ita fontes artiſciales circa eo loca è quibus aſcendunt, rimas poſſitum agere obſervamus, tandem à gravitate aque divulſi, quæ tamen ex natura fontium ſuſum deberet aſcendere: Et omnino veroliſſimus eſt hac ratione Varicem fieri, quia humores in varicosis, quando ad motum in exercitio impetum habent, majorem venæ dilatationem non faciunt, ſed ubi ab exercitio quieſcente, quod minori motui humores obſtiti poſſint & gravitate ſua deſcendere *Walenſ. Epiſ. de motu chyli.*

*Maximus fluxus & refluxus ſiebat* ] In interna venarum capacitate ſiſte ſunt valvule, quæ in ætus diſperguntur, frequentius in ramis majoribus: in cephalicis & cruribus cavæ nullæ: Actio ejuſmodi oſtiolorum eſt ut ſanguinem quadamtenus remaneant, ne conſectum ac huminis inſtar, aut ad pedes, aut ad manus & digitos univerſus inſtar colligantur, & duoque incommoda eveniant, tum ut ſuperiores ætuum partes alimenti penuria laborent, tum vero ætus & pedes tumore perpetuo premantur: Deinde etiam robor addunt venis, quæ alias facile diſtendi aut laxari poſſiſſent, cum ex membratoſa tenui ſubſtantiâ ſint conſectæ: Novum uſum adſecit *Harvæus* ut exacte ſanguini ab inferiſ remeunt ſuſum, ne ab extremis ad centrum corporis ſanguis conſectum excurreret obſtante. *Raſſiſſinus Diſſertat. Anat. p. 364.*

Atque hic videntur conſiſtere cauſa varicum, quod ſanguis craſſiſſe, & gravitate ſua motui ſuſum ſenſitanti, in Valvulis diutius retentus diſtati: nro valvularum ſiſtati: abſque hiſ. ſi eſſet, uniſormiter intumeſcerent venæ & non varicum modo. *Th. Bartholinius Anat. Libello 1. cap. 2.*

## OBSERVATIO XXIII.

*Erysipelas cutem tantum afficiens illaſa ſubjecta carne.*

**I**Ac. de Vala octo annos ante obitum Eryſipelate laboravit in utraq; tibiâ, à quo quidem pulſam huc usque amplius moleſtiam ſenſit, rubor tamen permanſit: Occupaverat rubor ille

pedem quoque, sed ille colorem & cutim mutavit: Nane iterum pes dolet, supraque & infra roborem illum pedes valde tument & splendidi fiunt.

In cadavere dissecto, Liquor tenuis & serosus repebat in corporis habitu inter musculos & pinguedinem, unde ipsa pinguedo mollior. Facta incisione in *Tibia Erysipelate affecta*, vidimus substratam carnem integram, cutē tantum laxa, à qua cuticula facillime separabatur. *Vide Tit. de Hemorrh. lib. 2.*

**O** *Conspicuas rubor ille etc.* ] Erysipelas est Febbris continua, à sanguinis parte tenuiore corrupta & inflammata originem habens, quā ut Natura se liberet, eam in corporis aliquam partem externam expellit: in qua tumor, aut potius (cum tu tot adeo notabilis sepe non apparat) macula rubra lata, dispersa oritur: Vulgo creditur à bile flava originem habere, at quidam potius ex sanguine renai oriri asserunt, primo enim color sanguinis potius quam bilis indicium est, qui rubet est; cum si à flava bile esset pallido aut flavo colore potius, ut in Ictero, pars affecta tungi deberet: Quamquam vero luteum ex rubro nonnihil ad albedinem vergit color, tamen non omni, sed saltem alicui differentie competit: Insuper quamquam color satis vehemens sit, tamen non est tam acer ut in affectibus à bile flavis: unde non tam frequenter exulceratur hic tumor ut herpes, & alii tumores ex bile nati: cum exulcerant erysipelas, id non tam ex ipsius natura est quam ex transmutatione: Idem etiam hoc testant quod q. i. calido & siccō temperamento sunt, ut macri, fusci, ulgri, quod flavae bilis generandae accommodatissimum est, rarius quam sanguinei & obesi, carnosi, rufi, hoc malo infestantur. Et quod carnosae corporis partes, ut femora, crura, facies collum, mammae & similes, crebrius quam aliae occupantur.

*Liquor tenuis & serosus* ] Recte ii sentire videntur qui non in plethoram simpliciter, & copiam sanguinis, sed potius depravatam & peculiarem qualitatem, quae à sanguinis crudioris putrefactione & corruptione provenit, causam huius mali referunt: Maligna enim illa qualitate naturā stimulat, humorem vitiosum ad ambum corporis expellit, ubi nimirum sanguis, imprimis qualitate peccat, atque calidior & biliosior, & peculiari modo Naturae infestus coelestus est: hic enim si qualescunque initium morus, seu in corpore seu extra corpus nactus fuerit, in venis agitur, atque ex illis à natura ejectus ad superficiem cor-

poria erumpit. *In tibia Erysipelate affecta.* ) Decumbit hic humor in carnosarum partium superficiem, ut crura, ubera, faciem, brachia & similes partes, modo in hanc modo in illam, prout haec vel illa imbecillior est, exultat, frangit, contusione, calefactione, frigatione: quo facit etiam sitis, unde plerumque crura occupantur, ut & rarius & mollioris membri, unde nonnulli in facie vel mammae oritur.

*Vidimus substratam carnem integram.* ) Esti verum sit potius à sanguinis tenuiori parte oriri hunc tumorem quam à bile flava, tamen à vera inflammatione etiam differt, quod minus tumeat, minus pulset, minus renitatur & tendatur, non tamen minus, sed etiam magis rubeat & caleat: In vera enim inflammatione sanguis crassior est, & in musculosarum cavitatem & spacia effunditur, hincque facillius suppuratur quam discutitur: contra in Erysipelate sanguis est tenuior, & ex capillaribus venis per poros in cutem diffusus, unde & facillius discutitur quam suppuratur: Quod si in Erysipelate maior sit tumor, id potius nothum est quam exquisitum & periculosum.

*Ossis aures ante obtutum Erysipelate laboravit.* ) Est plurimum scopus sine ullo periculo invadere solent, tamen danda est opera ut diligens curatio adhibeatur, ne aliud malum inde procreetur; Nam Erysip. ab exterioribus ad interiora converti malum est, sicut contra ab interioribus ad exteriora hominum. 6. aph. 15. Ex materia enim illius ad interiora recursu, siue à pravacurione, ut medicamentis repellentibus, siue ætis frigore id accidat, a gri etiam in maximum periculum consilii solent: Malum etiam (7. aph. 1.) ab Erysipelate potius & suppuratio, quare in curatione diligentia adhibenda: quae tamen à Germanorum experientia & observatione quam exterorum libris peti potest, Naturā scilicet motum juvando & materiam ab interioribus ad exteriora excutendo. *Sennerius Lib. 2. de Febr. cap. 15.*

\* ADDITAMENTA.

OBSERVATIO I.

*In Scrophulosis mesenterio plures glandulae reperta, &c.*

**A** N 10 1663. 22. Julij Cl. Sylvius in Nosocomio Leydensi secuit Saram Iansen, Scrophulis laborantem, & hydropem pectoris. Pancreatis substantia bene se habebat, sed glandulae conglobatae ipsi adhaerentes, grandiores & duriores erant: Glandulae plures notabiles in Mesenterio apparebant: Ex glandulis colli conglobatis dissectis & preffis albicans quaedam materia pulsatæ & veluti gypseae erumpebat: conglomeratae vero vicinæ nihil mali erant passæ: Ex glandulis mesenterici dissectis plane similis materia exprimebatur.

*Albicans materia pulsatæ* ) A Lympha concretæ, & crassioris, & male transcolatae per glandulas quam per varios gradus à renitente ad ejusmodi consistentiam pervenire ait Barbetus Nonnulli autem emollientibus singularibus gypseam illam glandularum materiam emolliari posse agebat Sylvius; &

quærenda putabat ejusmodi remedia quae non tantum emolliant, sed materiam magis fluxilem reddant: scrophulariam, scyllam & ex ea parata medicamenta, ut & gummatum galbanum, Sagapenum, ammoniacum &c. commendabat.

OBSERVATIO II.

*Scrophulosis in pede tumores pus fundentes, in puella, cui pulmo sinister absumptus in cujus loco aderat materia gypseae*

**D** Gendrots Chirurgus Parisiensis, aperuit anno 1679. cadaver puellae triennis, post diuturnum asthma & tussim siccam indefinientemque extinctam, cum plurimis scrophulosis tumoribus in pede dextro, pus fundentibus; Nullam pulmonis vestigium latere sinistro adfuit. Sed tantum materia dura, gypseae, costis affixa, membrana obducta. *N. de Blegny Zodiac. med. Gall. p. 96.*

## OBSERVATIO III.

*Colli Tumor strumofus, carcinodes, lethalis.*

**P** Arenas meus p. m. à prima juventute robustus ac vegetus, toto suæ vitæ curriculum nec ullis insignis accidentis morbidis, aut remediis in cuius usum adactus fuisset, sibi conscius, circa ætatis annum 63. I. Jan. 1668. pro prima vice tumorem scrofulosum, avellanæ majoris magnitudine in colli sinistra parte, non procul à glandula parotide, prope venam jugularem, sibi progeminare deprehendit: Hunc ab initio, tanquam levius quoddam tumoris qualis qualis rudimentum, obiter saltem ac negligentius considerans, inunxit aliquandiu hoc oleo *℞. ol. myrtill. massick. spir. cerebint. rectific. ana. ʒj. ol. stillat. rosimar ʒj. opij spir. junip. dissol. ʒss. m. atque Empl. contra rupt. superimposuit.* Hæc autem adeo parum profuerunt ut hic Tumor, ipso non advertente, duorum mensium spatio, longe ultra duplum mole adauctus fuerit, quem jam nucis juglandis magnitudine, rotunditate non exacta, sed aliquomodo depressi, lata fixaque basi, atque mediocriter durum, cuti concolorem existentem, acernatus considerans, de strumoso demum tumore opinionem animo concepit: In cuius incrementi obstaculum ejusque absumptionem sequentibus successive usus est. 16. Apr. uti incepit hoc pulvere. *℞. sacul. rad. aram. ʒj. pulv. rad. eryng. pimpinell. ana. ʒss. sem. agni cæmelon. excortic. ocul. cancr. præp. corall. pr. ana. ʒj. m. f. pulvis tenuissimus, tempore Lunæ dectescens, quoties detrahebatur, subitus madore uduum erat; qua ratione partes hujus substantiæ strumosæ tenuiores adeo absumptæ fuerunt, ut reliquum in massam densissimam pondere quoque gravantem induruerit, loterea illidem indicatis, ex præconcepia opinione insistere pergens, & Fortius resolventes & absorbentes, & pulveris pro struma ordinarii usum, adjunxit, exterum nec hisce remora injici potuit, quin tumor in dies sumpto evidentissimo augmento, duorum pugnorum jam excederet magnitudinem, licet & hæcenus interna & externa, tam universalialia quam particularia usurpaverit: At Tumor hic à variis huc usque ad mortis, atque frequentiori purgantium usu, adeo fuit exacerbatus, ut præter dolorem ineffabilem, quem diu noctuque absque ulla cessatione creabat, ardore etiam intensissimo atque rubore incanduerit, ita ut rejectis omnibus aliis ad furorem hunc demulcendum catapl. anodyno aliquantisper uti teneretur: Incendio hoc diuturno, immanique truciati perenni, sanguis, æstuantem hunc focum conspicuo perlucens, tempore tantopere fuit effervesfactus, ut pituitiam in cerebro abundanter fundens, defluxioni perpetuæ huc illuc decumbenti ansam præbuerit, uti equidem barycoxa, brevis ad sudorem usque proxime accedente, primum correptus fuit: Dein fluxu catarrhoso ad partes colli laxiores exterius delapso, ibidem Tumor è regione alterius ipsi consuebatuæ œdematose phlegmonodes, qui medicamentis suppurantibus in abscessum conversus ad pectus usque juxta musculorum ductum sese extendebat, atque duabus aperturis incisione factis, quotidie puris copiam reddebat: Hoc sanato rheuma viam quæssivit ad Pectus, nunc forinsecus in musculos thoracis irruens, ac pleuritidem notham interpolatis vicibus insistentem, progenerans, nunc per fauces ad laryngem, ulteriusque in pulmones destillans, unde perpetua fere tussi, cum raucedine interdum conjuncta (ob tumore æstom præternaturali laryngis succingentem membranam, glandulasque proxime adjacentes, nimis exsiccantem) respirandi quoque atque expectorandi difficultate (ob monstruosam hujus strumæ molem, asperæ arctius incumbentem eamque comprimentem) miserrime molestabatur: Quo pacto increbescente hac per eandem viam defluxione, tanta humorum colluvies in pulmonibus fuit congesta ut primum ob horum copiam ac lentorem in asthma ticum, acrimoniam vero exulcerantem, in phthisicum tandem incidit affectum, qui etiam tot & tantorum malorum agmen clausit: Præter hæc incommoda, adhuc alio omnium periculosissimo frequentius obruebatur accidente, quo sæpenumero in præsentaneum vitæ discrimen conjectus, in perpetuo detinebatur inopinatæ mortis terrore, nimirum venularum & arteriolarum, hinc inde in ambitu tumoris Strumosi, ob hujus curem, à rot excoriantibus glutinosis impositis emplastris, summe tenuatam, depudatam, quoties superimposita auferebantur, exorta largissima hæmorrhagia: imo quod ipsi non raro, noctu in somno eveniebat, ubi una, vel etiam pluribus simul, ob sanguinis nimiam calefactionem, ibidem venulis sponte ruptis, tanta sanguinis fervidi copia, antequam expergeretur fuit quod calore hujus passim percepto, demum factum profunde batur, ut lecti stragula, lodices ac culcitra, ad stramentitiam usque, cruore non tincta, sed huic penitus immerisa videbantur, quem*



non semel, e somno in ipsius opem suscitatus, in tali statu, tantoque spirituum dispendio pae evanidum reperi: Cum autem omnibus hisce (tumore imprimis interea temporis, assiduo incremento, ad hemisphaerii ipsius capitis aequalem magnitudinem adaucto, qui colli mediam partem, à gutture ad vertebrae cervicis usque suo amplexu continebat, ut & corpore vribusque, continua sordida ac purulenta per tussim rejectione phthifica extreme enervata & emaciat) diu resistere impossibile fuerit, calamitosae hujus vitæ plusquam satur, anno 1671 circa festum ascensionis Christi animam quoque suo creatori transmisit.

Ad hujus ergo Tumoris veram notitiam perveniendum, genuinamque inter tot diffidentes à celeberrimis quibusque medicis, tam contrariis quam exteris, super hanc rem latas sententias, ex ejus penetrabilibus eruendam; nam item absque vitæ periclitatione, experta manu Chirurgica (uti quidem ab Empiricis quibusdam multoties suatum Chirurgis, ipsamque operationem sustinendi, ægrotus summa cum animositate nunquam non promptus atque paratus fuit) rescari potuisset, explorandum: Hunc tumorem radicibus suis ubique musculorum diastrumibus profundissime infixum, ac nodi alicujus arboris trunci instar tenacissime infixum, vasis quoque majoribus adeo arcte, ut necessario ea discindere oporteret, circumdatum, non nisi horæ spatio, vix dum integre, relictis hinc inde portiunculis solum diffieillimis, à collo separavi: quem apertum, ac fere in minutissimas partes dissectum, plane naturam cancri induisse, juxta Clar. D.D. Gaspari Bauhini opinionem, deprehendi, jamque instantanter credidi: Præterquam enim quod paulo ante mortem in hoc tumore plurima cancri non exulcerati signa, ut durities, in aliquibus locis livor, & inter tubercula hinc inde mollities, ac si humor subesset (cui sæpius nunc cauterio potentiali, nunc ferro, interdum ultra dimidiis digiti longitudinem centrum versus confodiendo, exitum parari curavit, nihil unquam, præter substantiam carneam insensibilem, post vulnerationem statim sese iterum explentem offendens) circumferentia inæqualis, tuberculis ac stiriis carneis passim prominens, venæ lividae in ambitu distentæ &c. conspecta fuerunt: Hujus carnem internam semiputridam, compactam, lardo similem, alicubi uber vaccinum substantia & colore referentem (vide in Plateri observ. pag. 330. mammillæ scirrhusi & cancerosi tumoris eum topis exemptis &c. non dissimilem descriptionem) ejus vero centrum cartilaginofum inveni: Hic Tumor integer, mox post amputationem pensus, ibi. cum semisse, pondere superavit: *Mantissa ad Observat. Plateri pag. 83.*

## OBSERVATIO IV.

*Scrophulosi. Mesenterium innumeris glandulis oblitum.*

**S**crophulas in collo, ut plurimum alias in mesenterio latentes præsupponere constans est apud medicos fama, ut hinc Guido de Cauliaco strumarum originem à mesenterio deduxerit, & Riolanus F. nunquam foras erumpere eas nisi mesenterium strumofum fuerit, audacter afferat: Non assentimur quidē universalitati hujus propositionis, cum ratio in quibusdam casibus aliud suadere possit, attamen sæpe sæpius rem ita se habere, tum plures alia apud autores obvia tum sequens hæc observatio confirmabit.

Puer ann. 18. circiter, hilaris & sanus: post obitum parentis contititæ admodum cepit, fugere imò averfari sodalicia, pristina, taciturnus esse neque comedere neque bibere, nisi sæpius à Domesticis ad id irritatus, subsecutus mox languor totius, dein scrophulæ in collo conspuæ, plures augmentum sensum capientes, marcor totius corporis, lenteria ob denegatā chyli dispensationem, & tandem nihil proficientibus medicamentis quibuscumque secundum artem exhibitis & præscriptis, exhaustis viribus mors. Cadavere aperto, Mesenterium innumeris scrophulis oblitum apparuit, quarum quædam ex majoribus juglandem nucem magnitudine æquabant, paucæ superabant, plurimæ minores erant, & per longitudinem intestinorum decurrentes, tantæ omnes, duritiæ, ut non nisi eum difficultate cultri aciem transmittentæ, difficillæ quoque nullum liquorem intra se continebant; & cum tētaminis ergo quædam scrophularum frustula varis liquoribus lixiviosis, æquæ theriacali &c. immergerentur per plures dies, nullatamen coagulati dissolutio inventa fuit. 1675. *Clariss. Dom. Mangolt.*

## OBSERVATIO V.

*Tumor finem dorsi spina occupans, ortum ducens à foramine nativo in medio spinae dorsi inter vertebrae.*

**A** Nao 1678. 20. Aprilis femina annorum XI. non sine difficultate enixa est puellum tantæ staturæ & magnitudinis ut omnes in admirationem traherentur, sed magnitudo illa & obesitas non usque adeo cum sanitate conjuncta esse videbatur, similia enim plane erant membra cæcæsticorum membris, quæ ab aquis intercurrentis distenduntur: Sed præterea ab ipso partu serotum duplo majus & velut aquis onustum apparuit: In fine vero Spinae dorsi Tumor aquosus, magnitudine pugni, primum albicans, mox lividus, & ex nigro rubicundus visus est, ad tactum mollis & admodum latus, in medio vero per longitudinem parum depressus narestrepre sentat in medio bifidas: Mater retulit se nulla in te tor-

gravitate terrore fuisse percussam : quoad reliqua sanus est infans, urinas & alij excrementa sine difficultate reddit, somnolentus est : Ex dicto Tumore paucissimos, & nonnisi cum contrectatur, dolores sentit, mihi contrectanti similis plane viceris veticæ aqua aliquantulum repleti, quæ laxa est & tactui cedit facile, sed in xiterum in figuram pristinam extenditur : De causa hujus mali Medici D. Dom. Jac. Abstinus, Nic. Binniger deliberarunt diu : Obstetrix retulit se aliquot jam liberos in partu excepisse ejusmodi Tumoribus affectos, seque sumiter credere defluxione, factas esse a cerebro : idque probavit. experientia non contemnenda de simili plane Tumore ante annos aliquot in spinæ dorsii termino : De eo casu consultos plurimos Doctores & Chirurgo, nullum tamen incisionem ejus Tumoris tentare voluisse, sed tandem matrem, puerum, quatuor annos natus adduxisse ad experientissimum D. D. N. qui perpenis omnibus suasit incisionem, quæ reluctante Chirurgo facta est : Duo nempe latera Tumoris digitis comprehensa, acu filo holserico appenso perforavit ; sicque sensim quicquid humoris & vaporis interius educebatur, verum mox ab incisione, sive perforatione facta, dolore capitis ineffabili prehensus puer xx. horarum spatio obiit : Ex hac enim morte hujus pueri celeri, dolores forsitan immanes sequuta, haud absurde indicavit obstetrix consensum fuisse maximum cum cerebro & Tumore illo. Id ipsum probare conata est ex eo quod infans crebris defluxionibus in pectus & palatum affligitur, ita ut nonnunquam suffocationis periculum adsit : Si enim, inquit, infans crebris defluxionibus molesteatur, quare non potest fieri ut natura huiusce humoribus abundantibus se exonerare studeat, & qua data porta illos expellere ? Cui assensum præbentes Medici, cautione summa procedendum esse statuerunt, neque ad incisionem tumere deveniendum ; itaque discutientibus & resolventibus curationis initium fecere, die xxi. quibus irritis ad vesicatoria, emollientia & suppurantia transitum fecerunt : Sed cum & hæc inutilia essent ad incisionem quoque deventam, quæ facta est lancetta oleo inuncta, tribus in tumoris locis foraminulis factis, ex quibus guttatim serum, sanguinis colore aliquantulum tinctum effluxit : Vesperti cum parum effluxisse viderent Medici, novas incisiones faciendas esse suaserunt, ex quibus aliquot in locis sanguis purus emanavit, ex aliis serum exstillavit, ita ut semi horæ spatio depletus fuerit Tumor ab aquis, sanguinis tamen adhuc aliquid in illo remansisse visum est ; quem Medici in pus vertendum statuerunt jamque usu suppurantium videbatur materia in illud ibire : Sicut autem hactenus levibus affligebatur infans doloribus, ita jam sat magnos per sentit, quantum causam D. Rothius dicit esse laterum interiorum Tumoris, maximum partem evacuati cum musculis & partibus sanis conjuncti nem, & quoniam illa latera ab humore contento fuere exasperata, hinc tumore subsidente sanis partibus allisa dolorem exciteret maximum D. Binnigerus eundem dolorem illum partim ortum ducere dicebat a vesicatoriis, quæ cuticulam erodendo sepeharunt, ut jam nuda carnis promineret, ex qua vires, etiam ætatis appulsu dolente ; partim ex longitudine & magnitudine immixtarum turundarum : Interim infans magis ac magis emaciabatur, edebat & bibebat quidem, sed continuo ferme sudore diffillebat : Tandem die iv. Maji Tumor visus est imminui, (qui per vires crescebat & replebatur) ac intus exsiccati : Sed summo mane diei v. cum noctem crebris ejulatibus transgisset, convulsionibus per aliquot horas sævientibus, Animam reddidit.

Aperto corporeculi. Ex necre plurimæ adhuc aquæ citrinæ, & proculdubio acerrimæ promanarunt : Interna ulceris facies putrida, Musculorum principia gangræna jam contaminata : In medio autem spinæ dorsii, inter vertebra lumborum ante penultimam & ultimam, foramen adparuit per quod digito auriculari penetrare, & intestina in abdomine comprimere posui : Quæ spinæ perforatio proculdubio periculisque marionis vitium fuit : In Testibus Hydrocelem conspeximus ex quibus dissectis serum subcitrinum, tenue & clarum, materia profusum illi simili quæ ex vulnere, effluxit erupit : Partes circa pudenda gangræna faciem ostendebant : In infimo Ventre putredine affectum vidimus Hepar, item omentum, In Thorace Pulmonis pars sinistra putrilaginem jam concepisse visa est : Cranium non apertum. Ex quibus sufficienter ulcus illud fuisse incurabile.

## OBSERVATIO VI.

*Abcessus supra mastoideam apophysin, letalis, ortum ducens à Pulmonibus ulcerosis, cerebro pure scatente.*

Puero x. aut xi. annos nato ; ante mensem exortus est Tumor, ad suppurationem deductus in apophysi mastoideæ ; aderant & febris lenta respiratio impedita, tussis, vox  
subram-

*fabræ* & totius corporis imbecillitas: Apertus fuit à Chirurgo tumor è quo ingens copia materiz admodum foetidæ prodit; vix autem finita vacuatione æger auditu & voce fere caruit; unde iudicium tulit purulentiam illam è loco diffuso prodiffe; quam obrem remore primo apparatu necessariam iudicavit introductionem styli exploratorij, qui nulla vi ad vertebrae usque colli pervenit; quo in loco non diu post collectio materiz facta est, hinc necesse habuit apertionem priori oppositam instituere: Accurata & sedula tractatio prædictarum incisionum ægri animam ultra quadrimestre produxit.

Illo autem mortuo, facta aperiendi potestate, primo partes omnes imi ventris (si Jecur ultra Naturæ modum magnum exceperis) situm & constitutionem naturalem obtinebant; Ex illis quæ vero Thorace continentur. Pulmones in vitlo deprehensi, qui variis in locis ulcerati erant; pus illi simile quod ex incisionibus factis profluxerat continentes: Caput autem mirandam constitutionem obtinebat, nam & ventriculi cerebri eodem pure scatebant; Apophyses aurem mastoides, coronoides & styloides cario fere ubique exesæ erant, uti & cavatae glenoides primæ vertebrae apophysis odontoides secundæ, & pars inferior occipitalis: *Laudem Baugrandus Zodiac. Med. Gall. anni 2. observ. 16. Julii.*

## OBSERVATIO VII.

*Abscessus Tibiæ amputatione curandus ob subjectum ossis vitium.*

**I**n ædibus Phil. Hacquart, Chirurgi Regij præstantissimi, sectus fuit pes à milite detruncatus, in quo præter alia notavimus per Abscessum exesam & absumptam fuisse tibiz partem, quæ exinde in pede desuit ad quinque digitorum transversorum capacitatem: Eodem Abscessu muscoli pedis ejusdem prorsus glandulosi evaserant: quam metamorphosin satis admirari non potuimus, in diversas conjecturas abrepti. *Ex Actis Medicis Thom. Bartholini anni 1679. Observ. viij.*

## OBSERVATIO VIII.

*Tumor frontis subjectum os corrosum habens, Ex humore viscido, lento.*

**E**minentiss. & Illustriss. Cardinalis & Princeps Franc. Gulielmus, Episcopus Ratisponensis &c. Cum anno 1661. sub cælo minime clemente, frigido & nimbo, catarrhis simul & gravedine infestatus Ratisponam redisset, brevi post scatiebat in fronte supra oculum sinistram, Tumorem quandam initio parvum, mollem, qui in dies altior suecrescit ad magnitudinem mali Punici, ac ultra, absque tamen omni dolore & rubore: Ego unà cum Chirurgo exercitatissimo ad curationem accersitus, statim conjecturam habui Tumorem hunc ex affluxu & collectione inibi humoris pituitosi, serosi, falsi, ortum fuisse; contra quem remedia omnia in cassum adhibui; De incisione quidem mentio fiebat, quam Princeps tamen ob metum hæmorrhagiæ periculose, ex improvidenter forsitan recta frontis vena magna in proximo latente abhorrens, Tandem apertionem per corrosivum quoddam concessit, qua peracta turundæ linimento maturativo & suppuratorio illitz sæpius indebatur, sine omni effectu, quia humor lentus, viscosus intus latens arcte retinebatur, neque turundus profunde satis admittebat: Defatigatus denique Eminentissimus, non quidem ex hoc rumore, sed ex alio subito adveniente affectu, ob commotionem & mororem animi, improvise incidente causa gravi, & obstructione vesiculæ fellis, die 1. Dec. dicti anni mortem obiit.

In cadaveris apertione viscera omnia sana, in suo naturali statu & colore, absque omni prorsus defectu inventa sunt, Cor quidem & Renes magni, itemque cerebrum dissecta calvaria, prægrande, album, & cum meningibus suis naturale ac illæsum sine sero & phlegmate superfluo, præterquam quod in loco Tumoris, qui post mortem statim conciderat, humor lentus, viscosus, coagulatus, subnigricans, nitidus, cum acetabulo quodam versus oculi sinistri cantum externum se vergente, sine omni putredine ac fetore spectabatur: Pericranium vero inibi ad latitudinem rotundam: humoris congesti, cum ejusmodi portione cranii deperditum, dura matre & cæteris cerebri involucribus, itemque muscularibus & cute frontis externa illæsis inventem: Oræ lesi cranii itidem albi, & quasi studio rotundæ incisæ fuerunt, non molles putridæ aut nigricantes, apparuerunt; neque ulla cranii deperditi portio in cerebro, vel involucribus ejus aut muscularibus deliquit. *Idem, Helwigius observat. Medico Physic. xviii.*

**N**on indecanter referemus, Cardinalis Tumorem, juxta Galeum comm. 24. lib. 1. Prognost. Oedematism genus, ut qui fuit mollis, laxus, indolens, prementi digito cedens, non absque concommitati feri salis atque spiritus flantenti, mollis & laxus ab humore pituita tenui indolens, prementi digito cedens, quia pituita secundum Galenum, non solvi unitatem, quæ solutio alias dolorem infert: cum concommitatur feri salis, quod vehiculum quasi est omnis humoris per partes corporis transiuntis. Cum concommitatur etiam spiritus flantenti, quidam à calore insulto, qui nunquam otiosus, alteratur vaporum quandam à pituita soler levare, & intumescere incrementum dare: Et causa quidem Oedematis hujus immediata est humor pituitosus in sanguine redundans per omnes corporis partes, quæm peperiunt, credibile est, res non naturales, nimirum aer nimis frigidus & humidus, cibi crudi confecti, concocti & digestionis difficiles; itemque dyscrasia in nostro subiecto frigida & humida capitis, ex ambulatione & vestitu sub injuria aeris, intemperie partium, partim ex temperamento senili, præsertim pene septuagenarij, æque ob cranij ampli & cerebri copiosi existentiæ: Qualem humorem pituitosum interdum comitantur etiam spiritus flantenti, qui tumens ab ipsa pituita redundante generatur in venis majoribus, ac itidem habent originem ab ære externo nimis frigido & humido, núbilo & astrino, nimia repletionem ciborum et odorum & flantentorum; suppressione hæmorrhoidum & alvo confictum: Generationis modus hujus Oedematis est, quod cum prævaratur natura à pituita redundante, inturgit quæ scilicet expultrix id expellendum, & sic à majoribus vasibus humor hunc abundantem deerrudi ad vasa minora qui ibidem decedunt, à densitate cuius colligitur in, vel sub parte musculosa, & efficit Tumorem Oedematismum: Et Oedematale, quando non succedit morbis aliis effectus quidem est aliam duntaxat, & plerumque annosus, quæm ob frigus suum validum à calore debili concoquit nequit satietatem magni ac festini periculi periculo vacanti Galenus monet comm. 24. lib. 1. progn. Et cum humor iste ob acrimoniam suam fermentare incipit, tunc partes contingentes per omnem dimensionem attollit, Ossa præterea corroduntur, æque cariem contrahere solent vel à causis internis, humoris videlicet præternaturalis viscosi superficialis affluxu, vel materiz affluentiæ pravarie, & feri salis permixti acrimonie, tunc etiam ex humoris affluentiæ occulta proprietate, ut Galeno lib. de morbi causis c. 7. quæ nempe magis

adversatur ossibus quam partibus cæteris: vel à causis externis, utpote ære ambiente frigido, contusione, incisione, & medicamentis acerbis, veluti *Sennæ*, scribit 3. præf. p. 2. c. 13. ac cum omne frigidum; ex Hippocr. sit ossibus inimicum, idemque frigus ambientis aeris Galeno comm. super aphor. Hippocr. de Nat. hum. quam potest penitissime se in corpus infundat, & Hippocr. dicente 6. morbor. vulg. sect. 3. Venas rumpat, quo de *Kalbes* comm. super hunc locum ita loquitur, frigus quia sanguinem mover, & distillationes, venas frangit & passiones hæmorrhoidales facit. Non ineptè igitur eadem Cardinalis tumorem referamus ad Tumorem oedematismum ex pituita serosa, salis, concommitente spiritu flantente, distillationes cararhosas acres, & permutaciones vehementes, causantes, quarum stimulations violentiæ, accedente virtute expultrice, onere suo se exonerante, venas quædam sub cute capitis carnosas in patiente nostro forsitan ruptæ fuerint, ac humor præternaturalis stabilem locum in ossæ frontis prehenderit, motuque sua os mollior, & acrimonie sua, seu occulta proprietate corroderit & consumperit, licet nulla particula erant deperdit inventa, vel indicia putredinis & fetoris ulla non apparebant, cæteris capitis partibus tum internis tum externis ob levorem suam intactis & illis.

Quod curationem ejusmodi Oedematis cum ossis corrosionem, ea facilior est quæ in parulo, assentente Fab. ab Aquapendente l. 3. oper. Chirurg. c. 9. quam quæ sub ossis carnosæ & musculorum latet latet, suntque imprimis tria hic observanda: præscriptio bonæ dietæ & reliquarum rerum non natur. Venæ sectionis & peccantium humorum purgatio tempestiva, ne ad partem affectum humorum major affluxus fiat. 2. Superpositæ cutis & carnis artificiosa sectio, ac ossis denudatio: 3. ossis corrosi vel corrupti ablatio, Initio vero animadvertenda quæ in parte corporis os corruptum sit, nam juxta nervos partis, ut in manibus, pedibus, vel in magnorum ossium capitibus itat in juncaturis: in his etenim propter magnam nervorum & tendinum concursum ac colligantiam, si ve musculorum capita, operationes hæc oo vehementissimi doloris & ipsam periculum, quod insit, nari non debent, secuti etiam ubi magna vasa adsint: Alioquin ossi capitis frequenter corrodi contingit sub tumoribus ut qui luis venerem symptomatibus habentur, qui si diu incurari manserint, os quod subest corrumpitur & corrosus redditur. *Idem.*

## OBSERVATIO IX.

*Fungosa Excrecentia capiti postico aduata, ab obitu resecta & anatomico cultro examinata, exhibuit aqua pellucida è cerebro derivata copiam.*

**C**um Chirurgus Bernardo Heems, accessit ædes Joh. Gerardi Kol, cujus filia confiderabilis magnitudinis carnem fungosam jam à primis nativitatæ horis in occipite gerebat, Medicorum Chirurgorumque variis qui adfuerant exstirpatio ardebat, eo quod quæ præter naturam in corpore humano supersint auferri debere doctrina sit vulgata: Placuit aliis (accuratius omnia considerantibus, maxime qui digitis constitutionem fungi; hujusve cum internis nexum pressius examinaverant) dissuadere operationem dictam, eo quod datam meningem cum portione aliqua substantiæ cerebralis per suturam lambdoideam extrorsum protrusam sibi persuaderent: Observasse nos circa Fungi cervicem molliem singularem, & ossæ substantiæ aliquem defectum; verum equidem, aut du-

ram meningem hic cum parte quadam cerebri loco fuisse motam asserere haud ausi sumus, maxime quod infantem jam duorum annorum sensu omni gaudere observavimus, saltem stoliditatis nihil adesse notavimus: Alia longe res fuit quam *Hildano* proponit *lib. Scissa* libr. 6. observ. 17. Observatam in infante qui nullam vocem edebat, fuisse propter nervos recurrentes, à nimio pondere carnosae molis occipitio adnatæ retractione: Vetulam rugosam facie exprimebat, quia ex *Hildano*, nutrimentum fere totum ad molem hanc deferretur, unde reliquum totum corpus, imo & facies ipsa tabescebat & rugosa fiebat: At filiola nostra corpulenta satis, in diesque semper ad mortem usque, & mente & corpore aucta, tertia quartave ante obitum septimana extabescere incipiebat; simulque ratione aliquantulum destitui, cum virium notabili destructione; Ex eo quod Abscessus, pondere gravis, mole magnus, ob repetitum attactum calorisque interni suffocationem; sponte apertus, aquosi liquoris insignem copiam exhiberet: Liquor hic nihil aliud quam urina pura, quod colligere licebat exinde; quod jam à quatuor vel quinque diebus urinae nihil emisisset infans: corruptio Fungi hujus quo promoveri queat, (ad extirpationem enim devenire ab omnibus improbatum) ligaturæ beneficio nutrimenti accessum ei denegare, consilium visum: At vinculo cervici excrescentiæ injecto cæcitas in infante notabatur, frequensque animi deliquium; eodem relaxato spes omnis curationis vana: Aquæ per locum apertum effluxus continuus semper, usque dum nativo calore consumpto expiravit ægra.

Demortuo in subjecto quo extirparetur fungus sectio conveniens instituta, Eo ablato insignis aquæ pellucidæ quantitas per canalem illico effluebat: deferrebat ex sinu duræ meningis falciformi, qui eandem accipiebat ex ventriculis cerebri: Cranio aperta inerat rotunda, ejus amplitudinis cuius collum fungi fuerat; Durameninx parte superiore ubi cranio cohereret, rarsa valde, divisaque; Ea fornice dissecta cerebri cortex coloris albicantis, debite situatus observatus, nisi quod parte dextra tenuis meninx depressior.

Hic sic perpectis, unanimi consensu conclusum. nulla arte furgum hunc tollipotuiffe, quia potius, quovis modo ablata excrescentia hac incremento datam ansam fuisse, eo quod uberius accessus lymphæ fuisset concessus, si modo tempore permisissent, nec mors citius supervenisset. *lib. Meckeren Observat. Chirurgic. viij.*

## OBSERVATIO X.

*In Spina ventosa ossa semper erosa etc.*

**R**arissimus hic affectus in regionibus, præcipue Septentrionalibus, ossa Tumorem hunc, *spinam ventosam*, ab interiori parte à medulla ossis inchoatione i. festate & perforate ab *abscessu* convulsus fuit. In Nosocomio Patavino Domin Francisci, observare licuit Tumorem Spinam in viri quadragenarii metacarpo manus sinistræ ubi humor, vel potius ichor ille acerrimus non sola metacarpi ossicula, verum etiam ulnæ & radii capita ita rodendo infestaverat, ut ossa illa duo à se invicem separata musculos cum integumentis pertunderent, ibique ad tres. digitos prominere, adeo ut manus esset pendula, quam Chirurgus sequenti die ligatura probe instituta detruncavit, cauterio actuali inulto, hæmorrhagia sublata convenientibus remediis, locum affectum deligavit, Pateriens nihilominus paucis ab hinc diebus fati cessit.

Hujus primo metacarpum, postea ulnam & radium privatim curiosa sectione indagavimus & examinavimus, quæ omnia quoad interiorem faciem plane erosa & corrupta, quoad externam superficiem aliquantulum cariosa deprehendimus, & insuper, in quantum ossa carie erosa conspiciere licuit, in tantum medulla ipsorum ossium sphæclata quasi ac corrupta erat.

Idem in puerulo duorum circiter annorum observare licuit, qui dum lue Venerea infectæ nutricis ubera adhuc dum sugeret, detestabili ac dolorosa *spina ventosa* excruciebat: circa metacarpum manus sinistræ ejusque brachij, ut & dextri cubitum miserrime puerulum affligente, adeo ut jam plura ex metacarpo sinistræ manus & dextri cubiti ossicula carie erosa abicesserint, quæ statim examini curioso subjecta eodem, ut

supra

capta monitum, corrupta ac erosa fuere visa modo, muscularis & integumentis communibus ex parte longiori temporis tractu excisis &c. *Ioh. David Perizius Tracl. de Tumoribus pag. 86.*

**I**nde satis liquet subiectum funesti huius Tumoris esse ossa, & primario eorundem articulos, scilicet: carpum & metacarpum, tarsum & metatarsum, cubitos, genus &c. quamvis non negarim alias etiam corporis partes huic affectui, itidem esse subiectas, ut puellam in utroque carpo, utroque tarso, & circa vertebrae lumbares spina ventosa laborantem cernere licuit: Locus itaque affectus semper sunt articuli, nunquam autem internodia primario, quasi aliquando corrumpantur; id fit per sympathiam: *Spina ventosa* interne primo, postea externe ossa infestat, ut plurimum circa articulos, quia ibi ossa sunt magis porosa, adeo ut accideret ibi stagnans cartilagineus quasi menstruum aliquod dissolvere & ossa perforare queat, quod itidem ob tenellam ossium, & quasi cartilagineam adhuc dispositionem frequentius in prima ætate accidit: *Signa.* Ossa carie infestantur salvo periosio, quod postmodum cum musculo carne discernitur ac quasi perterebratur, binc tumor apparet cum dolore intenso, livor quidam adest, circa ora ulceris rubedo ac quasi inflammatio quedam, ulcus postea fistulosum adest, pauca sanie repletum, potius ichoræ accerrimo, quandoque cum quandoque sine febris. *Causæ.* Marchetti piruitum accensit, *Scultetus* occultum qualiter: *Acidum & Astringens* immediata huius mali causa est, quod omnes probavit effectus, itemque ætas &c. Lac, chylus, sanguis, succus nervosus materia sunt peccans; infantes lac venerea lue infectum sugentes facile in hunc incidunt tumorem, partim quod multis jam scateant humoribus acidis quod ex scabie, pustulis &c. patet; partim quod ipsum lac facillime aciescat, sicque effervescentiam patriat, quippe lac in chylum, post sanguinem conversum effervescentiam propter aciditatem cum reposito alkali, in sanguine excitans humorem separat acerrimam qui ad articulos ipsamque ossium medullam cum sanguine deferitur, ubi stagnans acidissimus fit ipsam medullam corumpens, postea rosione ossa penetrans nexu ac firmitate eademque protrudit, musculos tandem ac cutem perforat & exulcerat, carnem tandem ubi aciditas prævalet exedit, ut gangrenetur ac in sphacelum desinat: *Callosa* inducit *ulcera*, & quasi fistulosa, quatenus ibi latens alkali cum actioni acido coagulari, unde callositas oboritur sicut in lue venerea, in qua non leve dominatur acidum, notante *Sylvio*: *Lac ab acido* in actiores ferotiores præcipitari quid manifestius? *Chylus, sanguinem, succumque nervosum* ab illo itidem infici posse quis negat? &c. Dubium hic oritur, ossa ab interiori parte primo carie infestari ac corradari, imo ipsam medullam ossibus adhuc integris corrosis jam degenerantem ac corruptam deprehendi, ut mihi ipsi in investigandis causis, aperiisque ossibus conspiciere licuit: An potius sanguis, ad vero succus nervosus immediatus fit medullæ & ossium nutrimentum, quod ab acido p. n. infectum, *Spina vent.* inducat? At si ipsa ossa, eorumque medullam perspexeris, nullam quasi cum sanguine affinitatem habere deprehendes, adeo ut eadem sanguine constare neget *Charleston*, multo minus quod medulla ex eo resulet ac nutriatur: plura tamen pro sacco nutritio per nervos ad partes nutriendas delato pugnant argumenta, quod variis phenomenis ostendit laudatus *Charleston* Lab atrophiam partium paralyti affectum, &c. à glutine ex ossium fracturis exillante, quod nec arterie nec vene suppeditant: sed quid in his moramur, ubi in supra observatis ipsam medullam in ossibus spina ventosa extinctam emode corruptam ac putridam quasi deprehendimus? *Mercurialis* sanguinem circa ossa facillime putrescit *Anatomia Tom. III.*

rescere quidem dicit, quo autem pacto non ostendit; *Cartægius* putredinem illam fieri censet quando particule inter se motu fermentationis solvantur: Nonnulli serum acris, vel potius acidum, per periosium percolari, ibique ossa rodendo salvo periosio, infestare credunt quod in spina ventosa non accidit, si quidem ossa ab interiori parte, in qua medulla recondita est, primo corroduntur: Vt ergo hæc causa staturar, ratione corrosionis, doloris, cariei, &c. *acidum fixum corrosivum*; ratione tumoris & inflammationis: *alkali media confilientia* medullam tali modo afficiens & corrosivam reddens, ut ipsa etiam ossa perforet.

Difficulus rarior hic affectus initio dignoscitur, quod ostendit *Severinus Pyrotechn.* lib. II. p. I. cap. 100. *Later ait*, interdum os vitium sub carnoso aruum nloere, sic ut imprudentes facile fallax, verum enim veto qui oculatior est multa subtiliter dispicit, primum loci naturam, sub quo subest os, deinde colorem alienum, qui nullo vel etiam præstanti medicamento permittitur; deinde quod longo tempore vix sanescat; quod si illud accidit, brevi recurrit nlcus; adhuc quod sanies perpetuo tenuis ac ichorosa fit, it. inque copia effluit, præterea quod caro semper hebes ac mollis gliscit, medicamine autem remota, talis rursus increfcit: Postmodum est exploratus medio specillo, qui molliem aut a peritatem ossis docet: Hactenus *Severinus*, ubi autem periosium adhuc integrum ossis subtus corrolo deprehensum fuerit, specillum fallit, nisi externa ulceris & tumoris facies nobis jam cognita sit & familiaris: circa articulos ut plurimum observare licet spinæ instar dolorem pungitivum, tumorem laxum, mollem, qui apertus ichorem, aliquando sanie permixtum effundit; adeo ut facile colligere liceat difficilis esse curæ hunc affectum quo profundam carnem, copiam ichoris, loci effecti situm & naturam, causam inveteratam & pertinacem.

Quapropter præter matum Chirurgicam & Medicam requiritur labor, ut vitiosa ac peccans humorum aciditas corrigatur, evacuetur, alterantibus, purgantibus; primum sibi vendicant locum salia volatilia, acidum præcipitandum, quo lixiviosa reserri debent, non neglectis decoctis lignorum quajaci &c. acidum temperantibus perque poros educantibus, additis diureticis; Salivationem multum valere credo, corrigendo humores acres, acidos, eosque per os vacuando: Specialiorem autem Tumor requirit vacuationem, etiam ferrum, Quamprimum ergo patiens de dolore intensiori ac pungitivo circa articulos conqueratur, evestigio, nulla etiam apparente tumore, sectio loci affecti erit tentanda, os carie infectum querendum, abradendum: sin vetat profunditas loci, vulnus vel nlcus, quovis modo dilatandum; sin nullum patet onficium, ferro id caute parandum, ossis cariosi ratio habenda, candenti ferro inurendo, vel instrumentis ab rasoriis radendo, etiam os corrosum eximendo: Quod si contingat rotum intermedium manus vel pedis corruptum esse, trepanum subtilius commendat *Marchetti*, quo media ossiculi pars perforata forficulis hunc in usum affabile paratis internodi latera secunda, sicque sensum vel cella extrahenda; quo in casu tendines utrobique vitandi, ne malum peius sequatur; illos post mundificandum ac cicatrice obducendum & consolidandum, *Scultetus* cum *Spigelio* malum incurabile exclamat, partis extirpationem suadens. *Ioh. David Perizius Traclat. de Tumor. p. n. cap. 6.*

## OBSERVATIO XI.

*Tumor Femoris lethalis, ob vitium Pulmonis lobi è directo, purulenti, & Splenis corrupti.*

**G**enerosus Dom. Jacobus d'Andrion, eboris Helveticæ Dux, Filius Nobiliss. Domini d'Andrion Exconsulis Genevensis, viri integerrimi, annos natus xxxviii. robustissimus & optimi temperamenti, quanquam negotium aliquando facesseret congesta circa cœcava Jecoris bilis, ardore & gravitate in præcordio dextro se prodens ex interval-  
lis, quam generosi emetici ope excludere consueverat, Anno 1679. in Quésnoy, Flan-  
driz urbe, mense Novembri, vigentique tempestate ob imbres assiduos humidissima,  
Ophthalmia vehemensissima, visumque omnino interceptante correptus est, qua sanguinis  
missionis, cucurbitularumque scapulis admotarum ope liberatus est, adeo ut non diu  
post ex ea statione decedere, prædiciariumque locum alibi assignatum, Chaux scil. Pi-  
cardiz oppidum, conferte se isœolumis valuerit; Paucis veto ab adventu diebus homo-  
plazæ musculos fluxio invadit, hinc metaphræni & lumbares, ac glutinos tandem ischi  
regionem occupans Ischiadicum dolorem invexit; Et quanquam plurima remediis ad-  
ministrata fuerint, tanto tamen impetu in musculos femoris sinistri, partis posterioris de-  
cubuit, ut abscessus insignis inibi obortus sit; ejus, ob manifestum puris conelusi sta-  
tionem, facta est apertio, unde stupenda illius copia effluxit, manifesto sed fugaci so-  
quuto levamine, mors enim paucis post horis itrepsit.

Aperto cadavere, lobus sinister pulmonis, è directo affecti femoris, purulentus om-  
nino & putris apparuit: Splen quoque friabilis & præ putredine dissolbatur: Adm  
die 10. Decembris 1679. Subscripserunt de *Candevine Beaconsfin* D. Medici: *Tondul, Lictan,*  
*van der Lierde. M. Chirurgi.*

**D**imisso Medicorum, qui curam susceperunt  
circa morbi causas ratiocinio, obscuro &  
ab artis fundamentis alieno, verisimile est *evan-*  
*tescenti* materiæ biliosæ, serosæ; heterogenæ  
in loco consueto, scil. hypochondrio dextro,  
facto, partem ejus tenuiorem massæ sanguineæ se  
immiscuisse; unde tenuior ejus pars in oculos,  
pæ tempestatis iniquitate debiles impetum fecit;  
crassior autem musculos prædictorum locorum,  
pulmones & lienem invadit; concutiente forte

venæ sectique intempestiva cacochymia, è primâ  
regione corporis in secundam & tertiam trans-  
cente: Corruptio enim viscerum primigenia non  
fuit, laudatissimæ enim & nativæ & adjectivæ,  
constitutionis fuit Vir Nobiliss. in victu temper-  
rantissimus, sed secundaria à collectione, motu  
& putredine ejusmodi illuviei; cujus portionem  
sinister pulmonum lobus admisit, reliquam lien &  
nominati muscoli.

## OBSERVATIO XII.

*Tumor in regione lumbari, substantiam polyposam continens, ob vicinum  
venem affectum.*

**C**anis tumorem in regione lumbari gestavit, qui nunc augebatur, nunc rursus mi-  
nuebatur, brevi tamen rursus incrementa sumens, sacculo dorso imposito similis  
videbatur: Injuriz externæ repullulanti tumori ansam dedisse credebantur: Tumor  
apertus continuit substantiam polyposam subcreuantam, Ren dexter hunc tumori vicinus  
atrophia consumptus apparuit, in pelvi continuit substantiam grumofam, eoagulatam, &  
officulum quoddam mollius; Pelvis prope nuda erat, parenchymate renis fere omni con-  
sumpto. *Weyferm Tract. de cicuta aqua. pag. 208.*

## APPENDIX.

*Tumor à partu superflus, circa regionem umbilicalem, Excitatus à copia sangui-  
nis concreti in Tuba dextra retenti & manibus  
educti.*

**E**xperientia nos docet *Tubas uteri* insignis dilatationis capaces esse, toto suo ambitu,  
cum ibi genitos fuisse infantes constat, Si quis objecerit, seminis masculi copiam  
ad

ad generationem necessariam, eo pertinere posse; et si introitus ad illas non admodum naturaliter patet, nec distensionis, si requiratur capaces sint? Respondeo neque hanc rationem, neque quamvis aliam, experientie opponendam esse, historia enim sequens clare evincit orificia, de quibus verba feci, non minus dilatationis capacia esse quam orificium internum.

Pridie calendas Maji anni 1676. Domina Langlois obstetrix peritissima, advocari me curavit, quo mulieri cuidam parturienti opem ferrem: Deprehendi caput infantis in cervicem uteri multum proeductum: at cum partus dolores jam ab horis xxiv. defissent morsque imminens extrahendi necessitatem nobis indicarent, id sine mora feliciterque peractum, secundumque more solito eductum: Interim cum nihil ulterius excludendum sese offerret, illa tamen quosdam dolores iterum perpeffa est, Ventrem autem contrahendo circa regionem umbilicalem, paululum ad hepar accedendo, deprehendere licuit corpus quoddam rotundum, mobile, durum, infantis caput referens: id quod & ab obstetrice me indicante adnotatum: At vero quia ex inde colligere licuit hanc mulierem non omnino onere levaram esse, intrusa iterum in uterum manu, perstrataque sedulo ejusdem cavitate & universa, Tubum orificium reperi parte dextra quodammodo hians, proinde inferendi digitum indicem occasio data est, demum proximum, ac tandem integram manum, unde plusquam libras duas coagulati sanguinis eduxi quodammodo indurati: Cum autem nulla alia materia illum infarciret, rotunditas illa de qua mox, postmodum in tantum obvia fuit, quantum partis dilatatio & intumescens concesserunt. *Nicolaus de Blegny Zodiaci med. Gall. anni 1. pag. 13.*

## OBSERVATIO XIII.

*Carnea excrescentia à mulieris inguine pendens, ponderis xxv. librarum, à viscerum naturalium vitio orta.*

IN hospitali Pisaurensi mulier anno xlv. carnosam quandam excrescentiam, ab inguinebus nascentem, pondere fere xxv. librarum patiebatur, quæ non minus illi inter crura pendebat ac ramex intestinalis qui viris sæpe evenire solet, & sacci instar inter crura pendet: Hæc cum à me visa esset, paucis interjectis diebus diem suum obiit.

Eam dissecuimus, & prominentem carnositatem per medium scidimus, in qua nec intestina asservabantur, ut nonnulli putabant; nec intus uterus continebatur, ut alii credebant; sed nec in ea aquositas aliqua erat, sed tota ipsa pendula caro erat, alba, pituitosa, uteris carnem præferens: nam vulvæ os, in parte hujus penduli alta continebatur: Cæterum hæc deformi carnositate incisa ad membrorum naturalium contemplationem nos divertimus, Hujus Jecur ita magnum & crassum videbatur ut sex æquaret libras: Lien transiit, lentore, & magnitudine non recte valere indicabat: Unde membra hæc naturalia cum infecta essent, & male haberent vice sanguinis pituitosum excrementum gignebant, quod ad locum illum declivem: transmissum deformem hanc carnositatem genuit: Istra annum autem pendula hæc admirandam magnitudinem accepit. *Amatus Lusit. cent. 3. curat. 88.*

## OBSERVATIO XIV.

*Genu Tumor serum continens & duo corpora carnea.*

A Perto Tumore genu in eadavere deprehendit D. *Tamponet* Chirurgus Regius ipsum à congesto sero orto fuisse, ac duobus corporibus carnis, quorum alterum minimi digiti longitudine, aselli piscis figuram referebat: alterum media parte minus, gallinæ, in quo caput, rostrum, collum, cauda, omnes tandem partes exteriores distincte conspicue erant. *Nicol. de Blegny Zodiaci Medic. Gallin. anni 1. pag. 77.*

## OBSERVATIO XV.

*Aneurisma Aorta disruptum.*

A Dmodum reverendus Pater Franciscus Bettorus, Metaphysices in Gymnasio Patavino publicus Professor, ætate quinquaginta sex annorum, decem, aut 12. annos pulsationem



pernaturalis in sinistra thoracis parte, ubi cordis praecipue pulsus micat, passus est; quae ab anatomis igitur cordis palpitatio censetur. Ego vero accitus, conieci ipsam laborare aneurismate, ex quo postmodum, multis in casum tentatis remediis, noctu suffocatus obijt. Dissecto eadem vere, cavitatem thoracis dexteram sanguine repletam observavi, cui copia feci superfusa erat, pulmonis dextri substantia consumpta, & sola ejusdem superstire membrana, instar sacculi, quâ dissecta paruit membrana interna arteriae magnae, prius quidem laxata, postmodum vero, cum dilatacióni nullus esset locus, disrupta. Aneurisma itaque fuit in arteria magna extra cor duos solummodo digitos transversos; quò loco sanguis à sinistro ventriculo effluxus, valido impulsu, prius internam disruptam membranam, externa dilata, qui, cum nullum aliud pareret spatium, intra pulmonem dextrum sibi viam fecerat, ubi calore, motu, & compressione, substantiam ejusdem consumpserat. *Petrus de Marchetti. Observ. 48.*

## APPENDIX.

### *De Aneurismatû Naturâ, Causis, &c.*

**A**neurisma vulgo definitur tumor pæternaturalis digitis illum comprimentibus facile cedens, illisque ablatis statim rediens cum forti pulsu.

*Pars affecta* sunt arteriae ubicunque demum in corpore existant. Sic in naso post variolas aneurisma passus est Virgo, quod testatur Acta Hassienſia; in collo familiare est, ad medium prope sternum se extendens vidit Fabricius Hildanus; super meninges cerebri Henricus à Moench; sub sinistra homoplatea Antonius Saporita; in genu, brachiis, manibus, aliisque corporis extremitatibus per sepe occurrunt; imo ipsius quoque aortae aneurisma inter multa alia anatomica rara Romæ in Museo Gulielmi Rivæ, cum corde cui adhærebat in certo quopiam liquore conservatum admittitur est Joach. Georg. Elſnerus de quo in Miscell. Curios. Anno 1670. observ. 18.

*Causa* ut plurimum est externa, quandoque etiam interna; causa externa, est vel contusio & laceratio, vel excisio atque punctio arteriae, vel ejusdem dissensio violenta, qua varix ipsam constituentes fibræ ita laxantur ut sanguini pulsanti cedant. *Causa interna*, vel sanguis vehementius saliens, parietibusque ipsum continentibus durius impingens quàm ferat eandem portionis ejuspiam, ubicunque demum in corpore locatur, tenuior à nativitate textura; vel humor acris sanguini commixtus, interiores arteriae tunicas erodens. Ut autem bene dignoscatur quid sit aneurisma, & quomodo gigni queat, notandum est arteriam illius veram sedem triplicem lamellarum appositione constare, quarum prima sit reticularis, è nervulis, vas sanguineis, membranosis expansionibus, glandulisque eorum sinibus interfectis compaginata, secunda musculoſa è fibris in circulum tortis atque villosis fibrulis inter sese devinctis constructa, tertia seu interior merè membranacea ex planis expansionibus constata. Quis enim sic non videt arteria vel vulnerata, vel exesa, tunicam ipsius exteriorem utpote mollem vasique pleribus constare facillime coalescere, eademque facilitate postea extendi, dum media musculoſa, interiorque membranacea, tum quia sicciotes atque sanguine aliisque succis minus irrigantur, tum quia impetum sanguinis primæ sustinent, apertæ manent, viamque liberam sanguini pulsanti faciunt qua ad exteriorem in magnam & quandoque monstruosam molem distendendam præcediatur. Contra hanc sententiam docet Regius in sua Praxi Medica lib. 4. Medic. si unice historiz sibi à Jacobo de Back enarratæ innixus, aneurisma effusione sanguinis extra arterias, generari, nugarique seu potius delirare omnes qui putant aneurisma fieri, à fibrarum ipsius mediz tunice musculoſae læsione, atque exterioris extensione. Verùm hac in parte acriter & solide ipsi adversatur Diemerbroeckius dum sic habet Anat. lib. 6 cap. 1. Parum considerat clariss. Vir, admodum turpe, maximèque indecorum esse viro docto, sententiam suam calumniis potius, quàm rationibus defendere, ejusdemque adversarios probroſis dictis libentius proſcindere, quàm melioribus argumentis refutare. Præterea non animadvertit, quod sanguis in aneurismate contentus, non corrumpatur, nec unquam apostematâ faciat, cum alioqui sanguis copiosus extra vasa inter partes effusus semper corrumpatur, & inflammationes ad apostematâ generet, secundum Hippocr. Sect. 6. Aphor. 20. Item, quod sanguis extravasatus non possit sibi membranas circumjectas generare, sed quamprimum putrescat. Denique quod in tali humore ab extravasato sanguine producto non sentiat pulſatio aliqua insignis (forte ad locum læsæ arteriæ exigua aliqua percipi videbitur) qualis in aneurismate continere procedit. Scribit quidem Regius medicat. suprà citata (hanc ex casu à Backio ipsi narrato effaxisse videtur, sicut eodem libro pleraque alias ex Horſtio, Valleriola, aliisque exscripsit, easque paucis mutatis, tanquam suas dividit, ut sententiam suam hoc quasi exemplo confirmaret: verùm si de eodem Backii ægro illud dictum velit, tunc historiam male proponit.) in isto vulnere sui ægri ad eleasitæm pene deducto, circa locum affectum apparuisse tumorem valde pulsantem, & quotidie magis magisque incrementem: sed hoc tamen de dicto Backii ægro (quem ille tanquam suum describere videretur) minime verum est.

Nam neque vultus ante meum adventum, ad cicatricem pene deductum est, neque pulsatio in brachio ab extravasato sanguine tumido percepta fuit: quod testor oculus testis. Nam ego ipsemet tunc temporis Roterodami subsistens, ad illam ægrum à Backio ipsi narratum primus vocatus fui, cumque læsam arteriam profundo loco sitam esse, totumque brachium ab infuso inter musculos sanguine admodum intumescere, nec sanguinis ex arteria effluxum ullo modo sisti posse, atque hinc ægrum brevi moriturum animadvertenter, nisi cito remedium occurreretur, consilium dedi de brachio ad locum vulneratum abscindendo, seu extirpando, ut tali modo læsa arteria videri, ac vel ligatura, vel cauteriis actualibus constringi, sicque æger in vitam servari posset. Tunc mox secundus fuit advocatus Medicus Jacob de Back, qui suavitatem quam ad extirpationem deveniretur, prius aliud experiri, scilicet brachium superius fortissime ligare, sicque omnia vasa simul constringere, atque tum raptim discisis musculis, læsam arteriam querere, & inventam filo cerato ligare. Mox dictum factum, nam periculum erat in mora. Incisione facta, sanguis valde copiosus inter musculos effusus, mox effluxit: sed nulla ibi pellicula sanguinem continens observata, nec de tali pellicula observanda cogitatum fuit, imo nec sanguis tanto tempore inter musculos subsisterat, quo talis pellicula generari potuisset, (si modo generari aliquando queat) nam secundo die ab infuso vulnere hæc acta sunt. Inventæ & ligata læsa arteria, solutaque mox injecta superiori brachio ligatura, aliiisque topiis convenientibus adhibitis, æger noster præter expectationem servatus, & brachium bene per sanatum est. Interim ex ipso casu, vel cæcus videat, istam sanguinis inter musculos effusionem non fuisse aneurisma, cæsi Backius hoc ita malè putaverit, & de circumjecta pellicula magnum sibi somnium sinxerit. Certe miror quod Regius tam facile sibi aliquid persuaderi sinarum re quam ipsemet nunquam vidit, (nam hæc sua sententia satis ostendit se verum aneurisma nunquam vidisse, vel novisse) & ex eo mox novum, & tam firmum doctrinæ Medicæ fundamentum construat, ut alios, contrariam seu aliam opinionem bono jure sustinentes, argui, in dè delirare existimet, & dicat, cum potius delirii suspensionem ægrè effagere possint tales *Philosophi*, qui sua tantum inventa & excogitata tanto cum stupore admirantur, ut aliena quolibet, cæsi suis multo meliora, cum vilipendio quodam despiciant, atque rejiciant, & ex aliorum falso relatu mox regulam medicam constituere, quam vere sentientibus assenti malint. Hæc ille. Interim tamen non solus in ea est sententia Regius, quod scilicet sanguis ex diupta vel incisa arteria inter musculos effusus aneurisma faciat; jam enim Antonius Saporta libro de tumoribus, inter aneurismata recenset tumorem inter musculos intercostales situm, è quo dissecto sanguis copiosus, sed olidus profluit, qui mora putrescens illius loci vertebra & costam ita labefactavit, ut cariola sibi visa sit. Sic etiam Paul. Barberte in praxi medicæ, asserit se in aneurismate (quod ægrum occiderat (vidisse copiosum sanguinem, rari serosum quam grumofum; tunicas arteriarum utrasque etosas, & claviculam sinistram maxima ex parte carie exesam. Imo Henricus à Moinichen de aneurismate meningum cerebri suppurato verba facit in Act. Hassæ. Anno 1671. 1672. observ. 78. Verum hoc nihil pro sententia Regii defendenda facit, eam in historiis à Saporta & Barberto allatis, quis non videt arteriæ tunicam anteriorem tantum per plurius annorum pulsationem fuisse distentam, ut tandem abrumperetur, sanguinemque inter musculos effundi permetteret, ubi putrescens eandem ossium vicinorum continuo faceret, tunc vero aneurismatis nomine propriè & vere amplius non venit, sed potius abscessus ex aneurismate. In ultima vero ex Henrico à Moinichen recensita, quandoquidem Vir clariss. post mortem non vidit communicationem immediatam tumoris cum arteriis cerebri meningum, quis non facile credat his non fuisse aneurisma, sed potius aliam quemcumque demum tumorem meningibus cerebri insidentem per earumque pulsationes pulsantem. Simile quid mihi videre contigit ab aliquot annis in puella annos decem nata, quæ tumore à clavícula dextra ad medium prope sternum descendente, eundem colore quam minime interim imminuto, afflicta, me in auxilium vocavit, tumori admodum sæpius manu tantam semper in eo pulsationem offendi, ut minime dubius pronunciaverim cum alio etiam Medico Celeberrimo, illic subesse aneurisma, cui vel attingere sacrum erat, ne sic scilicet disruptio lethalis marureretur, interim tamen post aliquot dies tumor ille pulsatorius per se apertus est, ingentemque copiam puris laudabilis effudit, juvenulaque post deterum & cicatrifatum ulcus bene convaleuit, & adhuc dum sana vivit; mirari merito subit quo demum pacto hic tumor tam impetuosè pulsaret, sed re accuratius pensitata vidimus illum in musculis intercostalibus, & super pleura enatum, sacrum grandiore efformasse, qui ipsius cordis corpori inniteretur, ejusdem vibrationes, quasi sibi proprias nobis exhibiturus: Ea propter cor quasi in continua erat suffocatione, quod nos impedit ex parte circulationi per grandius illud aneurisma tribuebamus.

*Signa aneurismatis diagnostica* sunt, tumor nunc magnus, nunc exiguus, cum pulsu, colore à nativa cutis constitutione non diverso. Mollis est tumor, & digitorum impressioni sic cedens, ut siis fortè sit exiguus, penitus dispereat, sed mox sublatis digitis pari regre diutur celeritate. Quædam aneurismata, ut adnotat Vigierius, non modo cum comprimuntur, sed etiam ex se sibilum

edunt, admodum prope atre, sensibilem, sed hic in majoribus aneurismatis, seu his qui majoribus insident arteriis non subauditur. In veteratam aneurisma minus pulsar, minusque tactui cedit.

Ingentia in axillis, inguinibus, collo, aliisque insignioribus vasibus insidentia, curationem aetnam non admittunt quam palliativam; itaque huc monendi veniant tyrones, aneurismata temere, nisi forte exigua, & in parte ignobili, non aperiant; imo cavent ne cum imperitis habeant illa pro abscessibus suppuratis, aperto enim tumore jugularetur æger. Lethalia in genere creduntur in iis qui a morbo gallico curari volunt.

*Curatio* est vel pro impediendo aneurismate post punctam arteriam; vel pro eo incipiente reprimendo; vel pro eodem jam aucto in arteriis minoribus, vel medicamentis, vel operatione, sanando. Arteria puncta, statim secetur vena in latere opposito, partique affectæ apponantur medicamenta styptica, qualis est succus plantaginis sale communi imprægnatus & inspissatus, item liquor ex eo quod in sublimatione primi entis veneris ex colchotâ restitat, elicurus; item aquæ stypticæ Weberi, Charas, & l'Emery, hisce strictius superligata lamina plumbea, vel quod tutius est sæpe renovatis medicamentis stypticis, proliis interea continuo & incessanter impositis affecto per quatuor aut quinque dies (imo plures, si necessum fuerit) plurium hominibus, per vires hocce in negotio inservientium digitis, quibus scilicet non tantum arteria excisacostriungatur, sed etiam ita firmetur, ut præsidiorum beneficio pulsanti sanguini non cedens, per omnes suas tunicas coalescat, sicque aneurisma minimè enascatur. Advertendum autem, si deficiant homines hacce in cura adhibendi, dum eadem vi ligaturæ peragitur, illam sæpius esse immutandam, ne scilicet constrictione fortiori sine ulla prorsus intermissione continuata, gangræna oriatur. Curiosum est quod observat Horstius & ex eo Hæferus, laudanum opiatum arteriæ punctæ applicatum hæmorrhagiam momento sistere. Aliis expertum est hæc cataplasma. ℞. pulver. sumach, hypocistid, acaciz, sang. drac. aloës, thuris ana ʒ i. Ex his cum album. ovi subactis fiat cataplasma, seu ceratum addita loco ceræ, emplastri contra rupturas particula, applicandum autem est statim in principio, ita ut tangat arteriam vulneratam, quæ sic consolidetur, ubi verò grumus sanguinis est collectus, immediatum remedium cum arteriæ vulnere contractum impediens, frustra admoveatur. De Galeni medicamento ex thure, aloë, pilis leporeis & albumine ovi, tanquam omnibus noto, hic nihil addimus. Lamina plumbea, vel sola applicata, vel succo plantaginis illita cum arctiori ligatura, aneurisma non tantum ex vulnerata arteria arcet, sed etiam illi efformato palliativè quàm commode medetur. Incipiente aneurismate illi mox enarratis medicamentis occurrendum, quibus alii addunt emplastrum è scorpiæ ferri Montagnanæ, de quo vidè in sequent. item sperniolam Crollii &c. Hartmannus tale sibi probatum habet. ℞. Ciner. sicum ʒß. ceræ ʒi. terebinth. ʒij. M. F. emplastrum exteodatur & applicetur sæpius; aliquando balsamus sulphuris adjiciendus est, nonnunquam terra vitrioli purificata addenda.

Efformato aneurismate, vel incipiente, remediis descriptis non cedente, si in arteriis majoribus, collo, inguinibus &c. fuerit, non alia cura quàm palliativa, per adstringentia enarrata, & ligaturas medioeres, erit tentanda. Si vero in extremis, minoribus arteriis, locoque operationi apto sitis reperiat, tentari poterit Hildani cura in sequentibus exhibenda; item illa quam Ettmullerus Parisiis ut ipse narrat vidit peractam in aneurismate dimidium ovum æquante. Adstantes scilicet superiorem aneurismati arteriæ partem digitis ita comprimunt, ut post aperturam infra in ipso aneurismate instituendam nihil amplius sanguinis effluat quàm quod ipsum continet aneurisma, quo evacuato quàm accuratissimè, foramini arteriæ globulum magnitudine pisi ex vitriolo egyptio ad albedinem calcinato bombace probè involuto adponunt, hinc inspergunt vulneri aperto pulverem ex thure & colophonia, reliquam cavitatem replent plumaceolis digestivo ordinario illitis, posteaque vulnus ligant & fasciant, quotidie remouent plumaceolos superficiales, ut in tumoris labiis enatum pus evacuetur, ipsum verò globulum & immediate superinjectos plumaceolos, nequidem tangunt, sed sponte cadere sinunt. Unde fit ut solum sensim vitriolum arteriæ apertæ labia nonnihil rodât, simulque blandè ita adstringat, ut prædicta labia novo quasi vulnere fauciata, per proximum nutrimentum denuò conglutinentur. Si verò exciderit globulus nondum sufficienter conglutinata arteria, novum imponunt, idemque donec scopum attigerint repetunt.

Cura autem, seu operatio in aneurismate ut dictum sit, sed per medicamenta minimè sanabili, peragenda, hæc est. Incidatur cutis loco aneurismati superiori atque inferiori, arteriaque cui insidet inventa, & nudata utrobique colligetur, aneurismaque postea apertum continuò evacuetur & vulnus modo ordinario pertrectetur. Alii arteriæ tantum partem aneurismati superiorem colligunt, aliique rursus nulla præmissa inestione æcum filo cerato forti & duplicato indutur per brachij musculos è regione medij humori profundius trajiciunt ut omnia vasa facile completantur, superimpositisque, pulvillis largioribus atque crassioribus inter filii extrema, super iis quæ-

quicquid demum filum complectitur, arde colligant, ea ratione ligatura nec æque dolorifica est, ac si nuda adhiberetur, nec partes colligandas præcidere valet. Postea per longum aperitur tumor in cubiti flexura situs, tam pro ipso evacuando quàm pro arteria adinveniendâ, quæ, circumjectâ prius ligatura, excinditur, superiorque in medio humore primùm instituta solvitur. Alij tandemur Vigierius in sequentibus adnotat, aneurisma ex arteriæ laceratione efformatum filis desussatim adactis per propriam basim constringunt.



## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBER QVARTVS

## SECTIO III.

## De Vulneribus, Plagis.

## OBSERVATIO I.

**G**o vidi in actu practico, anatomizando capita mortuorum à simili casu, non rupto cranio, nec panniculo aliquo lasso: à sanie enim descensa per poros cranij supra panniculos causatur febris & rigor, & vomitus & singultus, & alienatio, & alia accidentia similia prædictis, per compassionem membrorum inferiorum ad cerebrum, & cerebri ad panniculos, propter saniem eos corrumperentem, & putrefacientem, & tandem mors sequitur. *Iac. Berengarius de Fractura cranij p. 2. cap. 5.*

**I**nterdum contingit cerebrum moveri & agitari à casu ab alto, vel confusione, vel aliquo modo contuso, & aliquos nervos in eo tumpi, vel aliquas venulas, non rupta cute vel cranio; vel interdum cure & non cranio. Et secundum nervos ruptos accidunt membris, ad quæ vadunt tales, nervi, varia accidentia. Et de ista læsione nervorum mentionem facit Gal. ad aphor. 7. Et signum læsionis hujus ab eo ponitur, quod isti efficiuntur sine voce flamm. Et hoc si ad manus adveniat pariens qui loqueliam subito amittit & qui percussus fuerit à re potente movere cerebrum, vel quod ceciderit ab alto, cum conditionibus quæ te persuadeant ipsius cerebrum parit potuisse, etiam non rupta cute & non cranio, vel etiam fracto cranio; firma indicium tuum sub hoc, quod cerebrum possit esse motum, visus malis indicis, nec solum de amissione vocis, sed etiam possint evenire omnia accidentia prænarata, quævis subito non eveniant, & ita non solum judicabis rupturam aliquorum nervorum prædictorum, sed forte rupturam alienius venulæ panniculis contentæ: Sed non ita cito veniunt accidentia venæ ruptæ sicut nervorum ruptorum, sed veniunt eo tempore quo sanguis incipit postea sub ossis putrefieri, tardius & citius secundum quantitatem sanguinis, & etiam secundum locum: quia si inter cranium & duram matrem, tardius veniunt accidentia quam si inter duram & piam: & tardius inter piam & duram quam inter piam & cerebrum: Causas non refero quia per se notæ sunt, Et ista species læsionis est difficilis cognitionis, tamen possibilis maxime per, experimentos, considerata ægritudinis essentia & causa & accidentibus: sed difficilior est cura, quia Medicus forte nescit locum sanguinis & saniei, & necessario desistit à rationabili cura, & sic moriuntur pauperes

ægri: Tamen si datur curandi ratio, talis est, scilicet, quod totum caput medicinis debitis regatur: Advette Lector, quod accidentia prænarata in læsione panniculorum & cerebri, possunt fieri à sanguine putrefacto sub cranio secundum loca ad quæ vadit, & secundum quantitatem: ideo non mireris etiam non læsis panniculis nec cerebro, sed solum à venis ruptis, vel forte nervis, accidunt prædicta accidentia, quia etiam possunt accidere multa ex accidentibus prædictis, non læsis panniculis nec cerebro, & maxime si contingat saniem aliquomodo descendere à superioribus per rimulam ossis, vel forte per porositates ossis reindare ad intra cranium, maxime quando sanies non habet à vulnere liberam exitum. Sint ergo Medici diligentes, & prudentes, & solliciti, quia periculum est in mora, & non dedignentur sæpe visitare ægros, quia per longam moram cum eis veniunt in cognitionem ægritudinis & consequenter quoque curæ. *Idem.*

*Propter saniem panniculos corrumperentem* Signa materiam defluxam supra panniculos, vel ibi genitam demonstrantia sunt hæc: febris intensa, tremor & destructio rationis, & alia accidentia in læsione panniculorum & cerebri, sicut ait *Avicenna* cap. de Fractura cranii, *Et accidunt ante saniescentem, aut post ipsam, ægritudines mala ex febribus, & tremore, & destructione rationis & aliis*: Posito enim quod apostema in capite non veniat ad saniem, adfunt & tremores & febres, & alia prænarata accidentia, & ita à sanie contenta sub cranio potest fieri paralytis, & spasmus, & apoplexia, & alie ægritudines, sicut etiam ait *Princeps loco citato*, *Et cum verificatur necessitas extendendi* (id est fructandi) *or, & extrahendi ipsum, tunc suspiratur, & non expectatur*

*complementum generationis sanies* (scil. in fractura vel sub osse) *quoniam pax est causa malorum accidentium*. Verum est quod apoplexia non evenit nisi ex oppilatione coarctatoria à materia defluente ad ventres cerebri, & hoc potest fieri si panniculi sunt fracti, vel alio modo sanies sit in cerebro, puta si in pia matre sit rupta vena quae causet saniem apoplexiam causantem. Et ita etiam causabitur diversa accidentia secundum loca ad quae transmittetur hæc sanies, & secundum quantitatem, & etiam qualitatem sanies efficietur majores & minores accidentia, & secundum quod talis sanies habet

exitum liberum, quia stante etiam tali materia, quæ non expurgatur, faciet mala accidentia. Ut typi vidi in N. qui habebat fissuram capillarem in crinio, per quam descenderat aliqua materia, Et ad huiusmodi cura eum instrumentis, ut videretur rimula penetraret interiorem superficiem cranii, invenit quod sic cum raspatore, & per fissuram dilatatam exibat modica & fere nulla sanies quantitas, & cessavit febris statim acutissima, & inquietudines, & vigilie, & omnia mala accidentia, & hoc vidi etiam in quamplurimis aliis. *Bersagerius cap. 8.*

§. 2. Filius Dom. Bernardi ab Hatzvelt. decennis, ex alto cecidit, mox vomuit, sanguinemque per nares & aures egressit: verum neque loquelam neque sensum aut morum amisit: Quum autem nec vulnus nec contusio extra appareret sine febre, morbus neglectus est plane, capite alioqui *perpetuo dolente*. Post menses quinque aut sex, collum relaxatum est, adeo ut nullo modo caput erigere, aut erectum, nisi beneficio numellæ ex pelle & xylo cõiecta continere posset. Demum asthmaticus evasit, & relaxatus ligamentis, decimæ undecimæ & duodecimæ vertebrarum metaphreni, Glibosus factus est: Coxam quæque dextram imbecillius movebat. Sub claviculis, ex utroque sterne parte, atheromata conspicebantur: Quum circiter biennium ita cruciatus fuisset, varijs adhibitis presidijs à D. *Henrico Bostero*, collum in integrum, voxque & loquela ex parte restituta: Deinde exortus tumor ad sinistram aurem, inter jugulares venas & asperam arteriam, qui sensum in maximum abscessum auctus, à me incisus fuit: 10. 20. & 30. diebus ultra fibras sex marerie eiecit, extrillavit ea quotidie copia satis magna: Hujus vacationi, benefici Dolor Capitis, omniaque ferè symptomata ex parte lenita sunt, at vires in dies imminebant: Crea 28. martij novus incidit catarrhus, qui in pulmonem & stomachum infloens, tussim, nauseam & vomitum provocavit, sinistram latius resolutum fuit. Nonnulli quoque paroxysmi epileptici acciderunt, & *ulcus in collo penitus exsiccatum* est, ita ut 6. aprilis 1793. decesserit.

Cadavere inciso viscera sic affecta comperimus. 1. Incisa cute, in tumoribus sub claviculis reperiata est copia sat magna puris, iactar pultis, quæ costis & sterni cariem induxerat: 2. Cystis fcllis pregrandis, & intestinum duodenam ubique billioso humore refertum. 3. Epar scirrhosum & obstructum: 4. Pulmo ubique pituirosis & viscidis humoribus oppletus. 5. Lapides quam plurimi ex gypsea materia concreti, & cysti inclusi proxime cor: nimirum in ea parte qua aorta ex corde prodit, & ramos suos versus jugulum mittit; quorum unus magnitudinem nucis superabat, reliqui parviald hærebant autem non tantum arteriæ aortæ & ipsius ramis, qui jugulum petunt, verum etiam asperæ arteriæ & sinistro recurrenti nervo, Ex quibus facile colligitur ratio vocis & loquelæ ex parte amissarum. 6. Capite aperto, lapidem ex simili materia concretum & membranz inclusum, in parte posteriore capitis sub futura lambdoidea, inter duram & piam matrem invenimus, adeo adhaerentem duræ matri, ut nonnisi violenter avelli posset. 7. In tribus cerebri ventriculis, h. e. duobus anticis & medio, ultra duas libras aquæ limpide reperimus: 8. Utriusque collo, tum ad asperam arteriam, tum etiam ad os basilare, & foramen quo spinalis medulla vertebrae ingreditur, penetrabat: Ita ut materia ex ulcere manans, tum ex pectore, tum ex capite confluisse intelligeretur: Verum ob angustias viarum *subtilior pars effluxerat*, crassa autem in lapides concreta erat, quales prope cor visabantur. *G. Fabricius Hild. cent. 1. Observ. xi.*

*Subtilior pars effluxerat*] Lympham fuisse indicatur, quæ limpiditas, tum concretio sequuta, illam enim mox tandem varios consistentiæ gradus acquirere alibi indicaturum.

*Morbus neglectus esse.*] Commotio cerebri duplicem eventum habet, aliqui enim ab ea ad se redeunt, alij moriuntur. Qui redeunt, iterumque loqui & moveri incipiunt, id quandoque abique gravibus symptomatibus consequuntur, restituta facultate animali, spiritumque comitatu libertati pristinae reddito à meatibus apertis: Quandoque ad se redeunt ægri, loquelæque redit, consequentibus tamen gravissimis symptomatibus à disruptione vasorum, sanguinis circa cerebrum & in ejus substantiam effusione, ad quæ febris acuta, delirium &c. subsequuntur: vel repleto

cerebro, sopor gravis, stupor, paralyfis: Imò lesi cerebri facultate naturali, concoctrice & recenterie, materia eiecitur, ad nervos destruitur, sequuntur & alia symptomata, ut colli relaxatio, tumores periculosi in capite, cæcitas, obstructis nervis opitricis &c. Si mox succedat, id fit ob inflammationem subsequenter, putredinem, sphacelum cerebri, aut hujus portionem abruptam, nervum vel membranam avulsam, vas insignè disruptum, &c.

*Collum relaxatum esse.*] A paralytica nervorum utriusque lateris resolutione: quæ si in alterutro tantum contigat, capitis accedit distortio, ut in sinistram vel dextram partem inclinet; de qua consule *Arandum Bostium de affectibus emissis cap. v.*

*Perçusio sinistra partis capitis lethalis ob utriusque meningū phlegmonem, cranij Fissuram. 1. Casus  
lethalis ob Rimam calvaria & sanguinis effusionem. 2. Ob longissimam Frontis Rimam, ad sēlam  
equinam productam &c. 3. Vulnus duplex lethale ob Fissuram inconspiciam & venarum ruptioem.  
4. Ob Rimam patentem & cecam, cum depressione, lēione cerebri & meningum. 5. Ob Fissuram  
in osse Temporum latentem. 6. Ob Fissuram Bregmatis ad dextrum Temporum os productam, &  
lēionem venarum iugularium. 7. Fissura ossis petrosi, cute integra, unde dura mater sanguine &  
pure suffusa. 8.*

§. 1. **M**iles quidam in tempore dextro, supra musculum temporalem, casum vulneratus fuit Mense sept. 1634. Primis septem diebus nihil observabatur quod periculum aliquod minaretur, postmodum vino se obruens, Venere abutens, & ad excandescentiam, propter aurorem vulneris præsentem, commotus febre incepit, venæ sectio omittebatur: minus curatè vulnus deligabatur, & ob supinam tonsoris negligentiam minus ab aëre frigido custodiebatur: supervenerunt vomitus biliosus & convulsiones, paulo post ceu apoplecticus mortuus est.

Vulnere ad cranium denudato, ac ablata cuti, musculus temporalis integer inventus, fuit : pus laudabile & bene coctum occurrit : Cranium vero ubi aëri patuit, denigratum & cariosum reperiebatur cum fissura: Remota cranij olla, dura meninx inflammata & stupendæ crassitie fuerat, trans illam multum ichoris cruenti cum portione puris stagnavit : Tenens meninx iidem inflammata & pure conspersa inventa fuit, ac sub illa ichor fluctuabat. *Ex Ephemeridibus Exc. D. Joh. Burgeoveri Poliatræ Schaffasiani.*

**S**uperueniunt vomitus, convulsiones &c.] Dum tumores tum intra partium vulneratarum poros flugantes, tum extravasati mitiores erant, neque vomitus neque convulsiones ante diem septimum affligerunt. Postquam vero tum ob febrem vinique abusu-  
mores tum intra partium vulneratarum poros flugantes, tum extravasati mitiores erant, neque vomitus neque convulsiones ante diem septimum affligerunt. Postquam vero tum ob febrem vinique abusu-  
mores tum intra partium vulneratarum poros flugantes, tum extravasati mitiores erant, neque vomitus neque convulsiones ante diem septimum affligerunt. Postquam vero tum ob febrem vinique abusu-

*Ceu apoplecticum moriturus est.*] Ceu apoplecticum mortuum scribit vir Doctissimus, quavis enim ante supremam horam omnes actiones animales abolitae fuerint, noluit tamen hunc symptomatum concursum lethum afferentem Apoplexiam simpliciter dice-

re, cum febris sanguinem spiritibus orbans, vomitus illorum instaurationem prohibentes, & convulsiones residuum dissipantes quoque ad mortem accelerandam symbolum contulerint. Quicquid vero apostectici milui isti obvenit, ichori & puri intra meningis cumulatæ, cerebrum prementibus & reliquis spirituum animalium quæsi suffocantibus attribuendam existimo: nam ob duram meningem stupendam crassam ichori exitus, vulneris labj: coarctatis, penitus intercludebatur: unde etiam sub cure incipit pus laudabile inventum fuit, quod ab ichore, si via parvisset, dilutus evasisset. Eius exclusionem proculdubio Vir peritissimas adjuvasset, nisi re demum conclamata accensus fuisset: *I. Iacobus Wepferus Dissert. de Apopl. p. 339.*

§. 2. Juvenis temulentus ictus vehementer in Pectore concidit repente attonitus in terram: Causa fuit partim evidens calvarię rima, partim tang. is ubertim effusus supra & infra cerebri membranas. *Vide lib. 2. tit. de Suffocatione.*

§ 3. Sexagenarius ebrius, de lapso ex altiori loco contraxit in calvaria amplissimum vulnus: mortui interiora capitis perscrutantibus, obrulit se primum frequens humor replens ventriculos cerebri: mox longissima rima excurrens continuata serie per frontem, oculique foramen usque ad sellam equinam, prope ossis cuneiformis medium, quo loci animadvertitur: usque ad ossis cuneiformis fragmentum, ita sejugaturā a reliquo osse, ut manifeste elevaretur supra quasque partes circumpositas &c. Vide historiam lib. I. Tit. de febricitantibus affectibus ex Pulpio.

§. 4. Ianitor Castellì Braceni venabulo supra tempus finitrum inflicto prostratus, duobus capitis vulneribus cum contusione, exigua valde cranij fractura (quæ nonnisi calva per ferrum ablata, & quidem arte tamè inflicto, pilij tenuitate apparuit) brachio ramen dextro resolutus; nam in illa capitis parte, non in sinistra, vix diffractum multum crurion intra cranium effuditur, sine mente, sensu, voce, in tertium diem supervixit. *H. Smetini miscellan.* l. 10. p. 528.

§ 5. Studiosus quidam ab alio Lipsiz vulneratur in Oscipite, rima satis patente & (ut ex sectione post patuit) etiam cæca, parente quidem illa ob plagam seu vulnus exorta, coeca autem forsan ob casum, ceciderat enim; Cranium item erat depressum & fissum, ita ut ossicula membranam pungerent: vocor cum alijs Chirurgis, eosque eodem emplastro, tam ad fracturam cranij, quàm ad vulnera brachij, & alia carnosa uri cerno: Ego vero emplastra de Betonica, ut ad fracturâ cranij urantur moneo, & descriptione Paravinorû exhibeo: illi contra suis farco-  
tis pergere: ego itaque fieri prognostico discedo: Die nono febris oboritur, quâ paralyfis par-  
tis dextre (vergebatur autem vulnus ad latus sinistrum) exepit, subseque desipientia & ob-  
livione. Restituitur quodammodo pure ad Inferiorem cerebri partem eirea palatum delato  
(ut ex sectione postea patuit) verum circa 28. diem omnia feriora: non enim tantum febris, obli-

oblivio, paralyſis iterum dextræ partis, quæ & fortior, rursus oboritur, ſed & ſubſtantia cerebri ſimul cum utraque matre rimam illam ſatis dehiſcentem egreditur: Tonſores hanc videntes eamne ſpongioſam (cum tamen gyri cerebri adverti poſſent, ut & ſubſtantia membranarum tactui pateret) pur. b. nt, & eam ex Theophrasto acerbis aſpergunt: die xl. vulneratus moritur.

Aperitur cranium, & inter ſecundum copioſiſſimum pus ex naribus rejicitur: materia nimis illa per vulnus expurganda ad os ethmoides delata, unde etiã de gravedine ſuper hares coqueſtus fuerat: Remoto cranio, ad oculum *quales fungos Tonſores iſti*, maximo ſui cum dedocore & vulnerati in commodo atroſiſſent, attendebam: Siniftra pars cerebri multo laxior apparebat, duraque mater, quæ erat egreſſa, itemque circa tertium ſuum ſinum, ubi totulare aſcendit, proſuſ livida, Reus itaque ob malam Tonſorum curationem abſolvebatur. *Phil. Salmaſh. cent. 1. Obſervat. 12.*

**Q**uales Fungos Tonſores iſti ] In capitis vulneribus excrementa quedam apparent & exeunt, quæ non Bubironſores ſolùm, ſed & præſtantiſſimo. Chirurgo, in errorem ſeduxerunt, ut ob ſimilitudinem pro ſubſtantia cerebri agnoverint, quod monet *Hipp. 6. Epid.* Affectus autem ille Fungus à ſimilitudine appellatur quia eſt caro mollis, levis, pallida & ſpongioſa, quæ quidem cito excreſcit, lento vero pede retrocedit: quibus notis à ſubſtantia cerebri diſtinguitur, quæ lentius aſurgit, ſolidior eſt & ſuis gyris aſſiquando ſe prodiit: Eorum generationem prædixit *Fabronius Hæd. Cent. 1. Obſerv. 31.* Quæmodum autem in ſtipitibus arborum humores ſempiterni per corticem extuberantes in fungos coaleſcunt, hæc facta exemptæ portione aliqua cranii, ac dura materieſa, ſtatim humores cerebri circa plagam aſſuunt, qui ſive oſſis (u. Al. Aphrodiſius vo-

luit ſive ætæ frigidityte condenſati, iſtaſt fungi coaleſcunt, atque intendum adeo intumeſcunt ut cranium emineant, Poſſunt & ex ſtatu procreari, ſi enim calor cerebri imbecillus factus in materiam, quæ circa vulnus collecta eſt, aliquid agere intendit, & cum procreat, qui quum per tenuem meningem exipitate nequeat, eam in altum elevat: Obſervavi enim hæcenus in hiſ qui fungis affecti mihi occurrerant, tenuem meningem ut platinum integram, caſam autem diſruptam fuiſſe, craſſa enim rupta, factaque diſſolutione vulneris, natura ſtatim incipit eam ſuper tenuem meningem generare, quæ loco tegumendi incumbit, ne ex ætæ injuria nocuentiam contrahat. Sin. inque humores copioſe, aut ſtatu circa plagam colliguntur, tenuem membranam ſimul cum adnata came facile ad iſtaſt fungi in altum elevant: *Vide Lan-gium Epit. Medec. 6.*

§ 6. Non alia re magis deluſi tum Medicos tum Chirurgoſ quàm capitis vulneribus ita notum ut nulliſ ignoret: inde exortum proverbium Capitis vulnera lenia ſæpe videri cum ſint periculoſiſſima. Et quæ fatalia apparent omni ſubiade carere periculo: Confirmavit hoc mihi miſerabile pueri novennis fatum: iſ præceps in caput ceciderat, inde domum delatus maximis cœpit urgeri capitis doloribus, facies & caput totum paulatim intumeſcere: ipſe febre continua laborare, poſtea excrucari, ac tandem debilitatis paulatim nervis, omnibus torpore membris, ac poſtremo Apoplexia enecari.

Chirurgiſ interim nullam in oſſe ſiſſuram animadvertentibus, ubi deſuncti jam doloribus & viſa caput aperio, curatius licuit contemplari quid intus latuerit mali: Detrahta itaque eunt ex capite ſtatim plurimum effluxit aquæ: Circa temporales arterias *hydatides reperta quæ plurimæ*, quarum pars, incræſſatis humoribus, ætheromata, pars ſteatomata, & quedam etiam melicerides reſehebant, quod mihi circa venas in hepate cæterasque corporis partes ſæpius contigiffe viſum eſt, ſed circa arterias, præterquam in hoc puero, hæcenus nunquam: Proſequens autem curioſus indagationem, in dextro oſſe temporum ſiſſuram inveniri exiguam: Diſſecto autem cranio nulla in meningibus ſeſe obtulit inflammatio, ſed aquæ tantillum in cerebro ſubſtantia plane ſæcidea: Nervi autem optici maxime labefacti debito craſſiorem induerat ſpiffitudinem, & ita erant fragiles ut ad manuum contactum diſſolverentur. *Theſt. Kerckeringius Obſervat. Anatom. lxx.*

**H**ydrides reperte plurimæ ] Efformate à lymphæ à valis propriis expreſſæ & veſiculis exceptæ, quales in plurimis corporis partibus obſervantur: Rarum vero circa arterias temporum emiſſiſſe, cum venas

tantum vaſa lymphatica ambitæ animadvertiſſim ſiſ Humoris autem illius in ætheromata, ſteatomata concretionem in abdomine hydropicæ muſcicis obſervavit *Barbette Prax. l. 3. c. 4.*

§ 7. Hafniz 1627. prope Oenopolium repertus eſt horis vespertinis *Radkerus Fauſt*, ſive lapidis angularis aliſu, ſive alia ratione conuſo mortuus: Nullum exterum vulnus, nec ullum repentis mortis indicium comparuit, niſi quod ſupra ſuturam coronalem levis excoꝛtatio cutis fuerit: Igitur Prætoris Urbani juſſu cadaver inſpiciunt aperiuntque Urbis Chirurgi.

Diſſiſſa ante pilola invenerunt ſiſſuram ingentem à ſuperna ſuturæ coronalis parte ad dextrum Temporum os & oculos protenſam: Inter eutem capitis calvariamque copioſius ſanguis ad dextrum quoque oculum confluxerat. Calvaria diſſecta, in dextro latere incumbbat cerebro coagulatus cruor, à regione oculorum ad aurem uſque diſſuſus, quo abſtriſo, in conſpectum venit Fractura oſſis Temporum, longitudine articuli unius cum dimidio, & duos digitos tranſverſos lata: Os Temporum in quatuor partes erat diſiſſum cerebroque impaſſum venas jugulares internas læſerat, unde ſanguis ille in cerebro ſtagnans, & copioſe per os naſesque

cadaveris effusus emanarat. Car periculosa fiat Ossis Temporum vulnera, videndi Hipp. lib. de vuln. cap. Arantius in comm. Pavius ib. alijque. Bartholinus cent. 5. hystor. 5.

§. 8. Quidam cum baculo ad sinistram capitis partem supra aurem percussus, non existimabatur insigniter læsus, nam cutis integra nullam lisionis notam ostendebat, osse interim petroso, quod subest fissa, ac secundum latitudinem magnam rimam habente: Huic mox supervenit Sopor, non tam profundus tamen quin interpellatus facile excitari potuerit: Excitatus vero facile iterum oculis conclusis in soporem relapsus est, donec tandem post dies 14. gravem soporem, à quo excitari non potuit, mors sequeretur: Decubitus toto tempore erat sapiens, urina & alvus raro reddebantur, tandem etiam citra sensum profluebant; lenta admodum, sed nunquam remittens febricula aderat.

Capite hujus post mortem aperto, reperta est durior cerebri membrana si b osse petroso, sanguine omnino suffusa, purulento etiam circa cerebrum humore consistente. Dodonæus medic. Observ. 1.

C Oacussus fuisse cerebrum aperto capite factis apparuit, quamquam & hoc ex ipsa ossis petrosi insigni rima factis manifestum: Neque enim tam violentus ictus absque cerebri concussionem fieri potuit: Car autem non statim mutus factus fuit? Quibus enim cerebrum aliqua ex parte concussus fuerit, necesse est statim mutus fieri aph. 60. 7. Sed hic aphor. non de quavis cerebri concussionem; sed de violentissima tantum, veluti cum cerebrum concuti contingit, ob casum aliquem totius corporis violentum ex locis altioribus factum: jacent enim tunc eodem quo apoplectici modo, absque sensu & motu: Cum vero minus est violenta concussio, non statim muti redduntur, sed tardius & aliquot dies post demum, velut percusso huic contigit, tum & illi de quo Hippocr. 5. Epid. Qui capite, alit. percussus est à Mace donec corrumpitur, tertio die voce destitutus erat, anxietas, febres tenues, pulsus non valde in temporibus, nihil omnino audiebat, neque sapiebat, non quietus, sed quarta moriebatur, humiditas circa frontem, & sub nasum, & usque ad mentum, & mortuus est: Veluti enim ad maximos & violentissimos casus omnia gravissima succedunt, ita minores molesta consequuntur accidentia, aut tardius superveniunt Idem.

## OBSERVATIO. III.

Vulnus capitis lethale, ob lisionem cranij & meningis dura, unde collectio feri in dextro ventriculo, puris in sinistro. 1. Ob lisionem substantia cerebri, cujus portiones ante obitum extantes ablata sunt. 2. Ob pertusum tertium cerebri ventriculum. 3. Ob utramque meningem & ventriculos laesos. 4. Punctura ossis Frontis leib. ob meningem laesam, salvo cerebro. 5. Temporis, ob compressum cerebrum ab osse depresso. 6. Temporis dextri, ob lisionem dura matris male curata. 7. Bregmatis sinistri, ob saniem inter cranium & duram matrem effusam. 8. Verticis & muscule masseteris, ob laesum cerebrum cranium & meningem. 9. Fontis juxta supercilium, ob membranas phlegmonem & sanguinis per cerebri anfractus diffusionem. 10. Temporis dextri à sancti vasis intra cranium. 11. Temporis dextri, ob sanguinem circa musculum effusum, os subdium perforatum, congestionem sanguinis inter cranium & meningem, inter utramque & in ipsa cerebri substantia, cujus duo fragmenta educta. 12. Frontis infra orbem oculi, ob lisionem ossis cribrosi, dextri cerebri ventriculi, & sanguinis ad basin usque ac cerebellum effusionem 13.

§. 1. H ENRICUS N. gladio in capite vulneratus fuit: Chirurgus hoc vulnus flocci fecit, dicendo esse tantum vulnus simplex nec etiam lisionem, quod etiam intra 14. dies consolidavit, & ita ejus negligentia factum quod Henricus tandem septima hebdomade à vulneratione, postquam aliquoties vulnus recruduit, fuerit mortuus.

Sed separata cute deprehensum quod non solum vulnus cefum factum cranium, & quidem os principis sinistram, prope angulum quem facit sutura coronalis cum sagittali, penetraverit, existente in cranio foramine crassitie pisi, longiusculum tamen: Aperto porro cranio, & dura mater ipsumque cerebrum læsum, apparente in margine vulneris corruptione ac putredine: In dextro cerebri ventriculo eximia quantitas materiz serosæ: sinister autem cerebri ventriculus anterior plenus erat succosæ & purulentæ materiz, ita ut vix tria cochlearia eam ceperint: Paulus Ammannus Medicina critica casu xcij. Sequitur Responsam Facultatis Medica Lipsiensis.

A D 1. Questionem, An capitis vulnera, ex doctrina Hippocr. qui nullum capitis vulnus contemendum esse scribit, perse lethalia & maxime periculosa sint? Respondemus, Quod quidem in genere omnia capitis vulnera, etiam si cranium modo superficialiter sit læsum, non sine periculo sine, præcipuis circa foras: Arantem non omnia capitis vulnera per se, simpliciter & absolute esse lethalia, dum magna est differentia inter vulnera lethalia & inter periculosa: sed experientia monstrat, quod non tantum cranij

vulnera, verum etiam meningum, quin ipsius cerebri, præsertim ratione corticis ejusdem, feliciter fuerint curata, si tam à parte patientis quam Chirurgi nihil intermissum.

Ad 2. An vulnera capitis, ubi cranium quidem laesum, vulnus autem ex negligentia nimis cito consolidatum, vulneratus etiam usque in vii. hebdomadam vivit, & iterum munia sua obivit, pro lethalius habenda? R. Quia vulnera cranij ex incuria, vel negligentia, nimis cito consolidantur, & ita pura



lentur materię exitus intercipiuntur, hoc non tam violentę læsionis, quam errori à Chirurgo commissio imputandum, & propterea vulnera talia pro simpliciter lethalibus non reputanda.

§ 3. *An vulnera cerebri in, & per se sint lethalia?*  
R. Non omnia vulnera cerebri, sed tantum illa simpliciter sunt lethalia, quę medullam ejus penetrant: quę autem solum corticem cerebri lædunt, sunt quidem satis periculosa, absolute tamen lethalibus semper non annumeranda.

Ad 4. *Annon in vulneribus capitis (& cranij), quę ex*

*inertia nimis cito consolidantur, multum serpsit ac purulenta materię retineatur, cujus acrimonia cerebrum corrodatur, & patiens pestilens necessest mortis causa.*  
Non negandum quod purulenta & serosa materia tentata, tantum acrimoniam tractu temporis contrahat, quę non tantum cerebri substantiam, alias mollem & spongiosam, verum etiam ipsum cranium corrodat: inde necessario varia & periculosa symptomata, nisi evacuentur tempestive, subsequuntur: Ideo ob has causas omnes causa mortis in vulnerato Henrico tibi minime imputari potest &c.

§ 2. Notabile exemplum nobis Ultrajecti occurrit mense Januario anni 1670. in ancilla Dom. Solingen Medici & urbis Poliatri, cui gravis lapis (ad minimum ponderis 30. librarum) à summitate domus cecidit in superiorem dextram capitis partem, cum magna ossium bregmatis & frontis, circa futuram coronalem diffractione ac depressione, cerebrique læsione: quod cerebrum, biduo post 14. fractorum ossium exemptionem, meningibus adhuc intactum, sursum à lato vulnere epullulare incepit, idque paulatim tanta altitudine, ut primo columbelli, postea gallinacci, denique anserini ovi magnitudine extra craniũ extaret, eaq; protuberantia epulante magno cum fectore sponte separata, rursus de novo repullulavit, & sic diversis vicibus atque putridę, partes sponte deciderunt, ita ut durante curatione substantię cerebri putridi quantitas ad pugni magnitudinẽ separata fuerit, ægra tamen in illo statu vixit usque ad xxxvj. diem, scilicet ad x. mensis Februarij, quo mortua est: Eoque toto tempore in vita ipsi membra constitit, actionesque animales principes bene peragebantur, etsi durante curatione fluctu totius lateris (in quod lapis non deciderat) continua paralyti ab ipso principio detineretur, & bisterve convulsionibus ac singultu corripereetur.

Post mortem ablato cranio, in dextra cerebri parte magna cavitas inventa fuit (propter substantię cerebri partem putredine separatam ac per vulnus expulsum) sese cum putredine exten tens per ejusdem lateris ventriculũ superiorem; simulque à latere ventriculũ tertium, seu medium transiens, usque ad os sphenoidicum: De Diemerbroeck Anatomia lib. 3. cap. 5.

**H**ic memorandus casus docet quam dubia sint illa omnia quę de principum facultatum animalium sedibus aut distinctis, aut toti cerebro æqualiter adscripsis, vulgo traduntur: Cum in hac ægra vita

mentisque illas actiones usque ad xxxvj. diem perstiterint, hasque neque magna cerebri putredo, neque substantię ejusdem ad pugni magnitudinem ablatio impediverit. Idem.

§. 3. Quidam antea bis in capite vulneratus, quo loco sagittalis eoricali jungitur, bis trepanum passus & curatus, poculo feritur in capite, illo ipso in loco qui inter duo trepana medius erat: Vocatur Chirurgus audacissimus & imperitissimus, quique factis suis testaretur verissime scripsisse Hippocr. lib. de Lege: Imperitia malus est thesaurus malęque opes recondita, securitatis animi & latius expertus, timiditatis nutritrix: Ille, ut erat amantissimus poculorum & magnus bellator, apposito ovi albumine, bolo & stupis, biduo læsum non videt: Interim læsus, utroque brachio erutibusque capris, voce etiam amissa, mortuo simillimus jacebat: Vocor rus sesquialtera Leodio diffusum. Viso læso, Chirurgum accersendum curo, quo nusquam invento, à fabro ferrario instrumenta quę habet Chirurgica peto, quibus cum post ablationem siccissimarum stuparum os depressum levarem (quo depresso; ut scribit Galenus libro primo, de plac. Hippocr. & Plat. gravissima sequuntur incommoda, corpusque universum sensu motuque, spiritu & voce protinus spoliatur) statim vocem membrorumque usum recuperavit, atque in lecto sedit: me digressus, monitisque adstantibus quid vellem Chirurgum facere, ille reversus os à me nullo constrabatur, nec enim adhærebat, reposuit eademque quę prius imposuit, sequens quę præcesserunt symptomata: iterum vocatus, eodem quo prius successu eadem facio: ceterum os mecum deferor: Ille nullo negotio os istud, quasi hoc ad curam quicquam faceret se confestimaturum rusticis pollicetur: Veniunt ad me qui os repellant, reddo, Ille cranio rursus aptat & nescio quomodo hominem occidit.

Biduo post accersor à Magistratu loci, eadaver visitaturus: Invenio sub osse foraminulem, quod dura piaque matre transiit, in os basilare desinebat; præsentibus alijs Chirurgis quę præcesserant narro (nam qui curaverat non comparebat) latentibus omnibus non nisi tenuissimo specillo vulnusculum illud pridie mortis quam tertium transibat ventriculũ cerebri inserti potuisse: verisimile censui ipsum, ut semper erat, ebrium, fretillo ita miserum jugulasse dum os se posse reponere stultè credit & stolidè credit. H. ab Heers Observ. med. 22.

§. 5. Nob. quidam Francofurti nocte illuni & tempeſta, per placas divagatus in vigilis urbis incidit, à quibus in offe ſiniſtro capitis ad ſuturam coronalem bipenni acuta punctum, In hypochondrio autem dextro vulneratus, illico conceidit aphonos, die tertio ſuperveniente Epilepſia forti & convulſionibus exſpiravit.

Aperto cranio, valde profundum vulnus, & utramque meningem, ipſoſque cerebri ventriculos penetrans, adeoque anguſtum, ut ſanguis, cujus magna copia ad baſin cerebri deſluxerat, nullo modo evacuari poſſet, reſcriptum. *B. Timæu Reſponſion. medic. 19.*

*Sanguis cujus magna copia ad baſin* ] Sanguis coarctus putreſcensque ſi in nervoſum genus ſeratur, Convulſiones excitare poſſet. Sicuti ex iſtu capitis Calvariam penetrante, nondum tamen cerebri ſubſtantiam dividente, (unde apoplexia potius ſequeretur) ſed cerebri meninges duntaxat vulnerate, quandoque accidit; effuſio tunc ſanguine reſtentque ſub calvaria, qui putreſcens maligna qualitate cerebri membranas inſicit; quorum conſenſum quod ſubdens nervorum principium è cerebri baſi prodromum occupet officiarque, convulſiones quoque capitis vulnera ſequuntur, paſſim *Platerus prax. lib. 1. cap. 2.*

*Viræque meningem penetrant, &c.* ] Signa læſionis panniculorum ſunt hæc, ſit dolor notabilis capitis fixus, & intra caput, & dolent oculi, & ſimul cum percuffione, vel parum poſt venit talis dolor, & narrata doloris eſt quod ſit pungitivus, & fixus, & accidit vomitus cholerae, quia illa eſt magis mobilis, & hoc accidit per compaſſionem ſtomachi ad cerebrum per illos notabiles nervos deſcendentes, teſte *Galeno 3. de locis capite ſextimo*. Et interdum ſit colica ob eandem cauſam, & univerſalis inteſtinoꝝ dolor, quia omnia inteſtina ſenſum habent à nervis prædictis, Et appetitus deſectio, & digeſtive & expulſive debilitas, & omniſium virtutum ſimul, ob eandem cauſam, & oculorum rubedo, tunica enim oculorum ortum habent à panniculis cerebri; Et venit febris ex dolore, quæ eſt ephemera ex agitatione ſpiritus animalium in cerebro, maxime ſi læſio eſt notabilis, & quod ſubito accidat febris; poteſt tamen evenire & putrida febris; ſed non ita ſubito, ex putrefactione alicujus materie, vel in venis vel extra veras, in capite & alibi: Et puſtula in facie accidunt ex humoribus ad eam elevatis, & ſanguis ab auribus à palato & à naſo fluir, & etiam interdum exit ſanguis à partibus ſub offe contentis, ab aliqua vena in panniculis læſa, & apparet nigrædo linguæ, & etiam ſingultus, quod peſſimum ſignum: Quæ accidentia ſunt nova, vel minora pro magnitudine vel parvitate læſionis, & etiam ſecundum panniculum, quia majora ſunt accidentia læſa pia matre quam dura, ad ſecundum locum læſionis, quia ſi lædatur iſti panniculi in loco in quo ſunt notabiles venæ in panniculis (quod difficile eſt aliter fieri, maxime in pia matre) à venis illis exit ſanguis qui putreſcit & facit ſeva accidentia: Et etiam raro læditur pia mater quin lædatur cerebri medulla, ideo ſequuntur apoplexia,

deſtructio vocis & rationis, quia læſa pia matre læditur totum cerebrum: Nam pia mater pro majori parte ſit ab arteriis & venis, per quas arterias deſcendunt ſpiritus vitales in ſeri mitabili præparati, ibi facti animales: Et hæc pia mater non ſolum tegit cerebrum extra & illud nutrit, ſed etiam intra ventres ejus ingreditur, & per officia arteriarum ejus ingreditur ſpiritus prædictus ventres cerebri: hæc de cauſa accidit deſtructio rationis & ſcietomia: Et accidit in iſtis vulneribus tremor & rigor, quia contrahitur in ſe cerebrum, fugiens & expellens nocivum: Et ex eadem cauſa ſit ſpalmitis non proportionatus ad materiam; & uterque ſpasmus poteſt in brevi tempore ſupervenire; & ita etiam ſit paralyſis & tortura, & ſtupor membrorum à materie tranſmiſſa ad illas partes: Apoplexia à materie oppulſante ventres cerebri, Et ſyncope ex compaſſione cordis, cor enim compatiatur cerebro, & è contra: Hæc omnia ſigna veniunt ſubito, vel quaſi, ſi panniculi ſunt læſi, ut ſupra: Si vero illi panniculi eſſent conuſi inter compaſſuras exeuntes, quia dura mater eſt ibi, talia accidentia ſunt debilia, & veniunt ad notabile tempus, tardius & citius pro magna vel parva læſione; pro corporum munditie vel immunditie, fortitudine vel debilitate, pro tempore ætatis, regione, ætate, regimine in ſe rebus non naturalibus, & modo curæ adhibite: Sed accidentia quæ ſequuntur ad prædictam conuſionem inter comuſuras, non ſunt per conuſionem tantum, ſed ſunt etiam per putrefactionem panniculi læſi, vel quod abinde tranſmiſſa eſt illuc materiam, quæ non regulari à natura putreſcit, & per modum continui ſe ipſam augmentat, quia quod tangitur à putrido, putreſcit, & cum venit ad certam quantitatem determinatam, incipit febris & alia accidentia, & tandem ſequitur mors hiſi cito ſuccurratur, & quamvis etiam tunc ſuccurrere ſit difficile, & dato etiam quod res à principio eſſet nota, & eſſet talis ut ſupra, ſed tanto plus eſt difficile quantum eſt occulta ſenſibus, & non cognoscitur hoc, niſi jam facta ſanie in loco; à principio enim eſt occulta, & neſcit Medicus quid agere, nec ubi agere debet quia ægritudinem & locum ignorat: & talis ſpecies læſionis eſt inter alias mala, & difficillima ad cognoscendum: Adſunt etiam vigilæ, & anguſtatur æger & eſt totus proſtratus: Interdum tanta eſt panniculorum læſio ut certificetur viſu & tactu. *Berengarius cap. 3.*

§. 5. Haſtæ 1658. novitiuſ Chirurgus gladio ſubtili per os frontis vulneratur, punctura per membranam duram & piam penetrante, vix cerebrum attingente, quod ex diſſecto cadavere comparuit: Quarto tamen die ſine ulla membranarum inflammatione è vivis exceſſit. *Th. Barboſinum hiſtor. 70. cent. 5.*

§. 6. Hoc anno 1671. menſe Aprili, Uratiſviz, ancilla quædam ſervi ejusdem nimiam jocandi licentiam ſuſtinens, cantharo parvo ligneo, quem forte ſordidum deridendo lavabat, circa Tempora percutit, qui ſcalas quidem deſcendit, in atrio tamen in terram conceidit & exſpirat.

Aperto capite, interius nulla certa veſtigia mortis cauſæ inventa fuerunt, niſi quod os Temporis ex iſta aliquatenus verſus anteriora incurvatum fuerit. *D. Philippus Jac. Sachs in miſcell. Cur. anni 1671. Obſerv. 123.*

*[Circa tempora percussit]* An musculus temporalis sit secandus multi dubitant? Negat *Marchetti* *Observ.* 15. quoties vulnus aut contusio fuerit, cum fractura ossis: 1. Quod plerique sic vulnerati moriantur, ex *Hipp.* sententia, accedente propria illius experientia, qui observavit musculo temporali à quibusdam baritonforibus perperam secto, quarta die patientes convulsos obisse. 2. Quod fracto osse sub ipso musculo, omnino lethale sit, ac proinde sectio huiusmodi sit supervacua: quod & idem sæpe vidit & publice demonstravit, in quibusdam solam rimam in osse subiecto musculo temporali repentinè mortis causam fuisse, cum falso Apoplectici haberentur, sola præsentè contusione, quæ nonnisi gravis, cum ossa subiecta frangit, & musculus ipsum, tum partes internas ipsius cerebri, unde certa mors: Quod si ex symptomatibus innoscerant hæc læsiones, extra musculum, parte ejusdem decliviori, sectionem faciendam, ibique terëbrationem administrandam vult, nec non lato postmodum specillo deprensam membranam ipsam, quo exitus puri pateat: atque si

aliqua depressio adfuerit, velle elevandam, & surgentem quandoque necessitate, totum musculum quandoque transversim secandum, quamvis periculosa sit operatio: Ob solam musculi temporalis contusionem, inoffenso osse subiecto, feliciter institutam esse sectionem narrat *Cattierus* in juvene femina, quæ caput inclinans ex improvviso in mentis argulum impigit, & contusionem in dicto musculo sine valentia experta est, quo ictu concidit in terram voce sensuque omnino destituta, succedente febri acuta, delirio, moribus convulsivis brachiorum & tibiarum, ad 4. diem perseverantibus, et si pluries missus sanguis: In consilium vocatus *D. de Large*, peritissimus Chirurgus, cum *Cattiero* censuit ejusmodi symptomata ex dicti musculi contusione ejusque fibrarum dilaceratione, & petricanis hunc musculum involventis compressione esse orta: Dubii tamen erant an fractura ossis subisset, quare incisio secundum fibrarum ductum parva facta est, & paulo post febris cæteraque symptomata sedata sunt, exudante scilicet sanie aciei quæ partem sensu exquisitissimo præditam vellicabat.

§. 7. Memini Lipsiæ aliquando Facultatem Medicam convocari ob vulneratum quandam punctum circa os temporis, ita ut dura membrana simul læsa esset, post aliquot *septimanas* extinctam convulsione partu læsa, & paralyti partis opposita, tanquam symptomatis consueris præsentibus: Imprimis gravitate quadam intolerabili circa oculum partis affectæ conjuncta.

Aperitur cranium, & punctura conciliata manifesto se prodit: Inter membranas autem & substantiam cerebri in gens copia puris, libræ civilis unius pondo, quæ & proculdubio causâ curationem male administratam arguebat, quod statim suppressa peris via vulnus intempesitive Chirurgus glutinaverat: absolvebatur itaque reus. *Ph. Salmuth cent. 1. Observ.* 17.

*[Post aliquot septimanas, &c.]* Flaccescit latus oppositum, vel circa plagæ initium, vel aliquot diebus post, Siquidem contingit procius ab inflicto vulnere, propelluntur humores à violentæ concussiois impetu ad loca quam remotissima, sive ad ventriculos cerebri, vel meatum spinali medullæ insculptum: quo delata penerrans hæc vis, adigit (ut cum *Cassio* loquar) fluidam hanc materiam potius ad partem oppositam quam plagæ vicinam: quo tamen, si quidem tenderet humor nervos resoluturus, retrocederet necessario ad motus sui principium, & ad terminum à quo primum fuerat depulsus, cum contra motus violentus sequatur motorem, tendatque potius ulterius quam subsistat in propinquo: quod apparet in clandestina ossis oppositi fissura: At si nervi resolvantur aliquandiu post inflictum vulnus, verisimile est ab illata vi humores quidem fuisse agitatores, sed non existisse ex parte affecta: verum illa paulatim incalescente, sive à putredine, sive à febre, credibile est eosdem illos humores denuo moveri, & ab exuscitato hoc calore tandem quoque propelli ad partem oppositam, seu locum maxime remotum à motus principio, & præcipue à latere dolente, unde hostem suum depellere satagit natura. *Nic. Tulpius observat.* 1.1. c.1.

*[Convulsione partis læsa & Paralyti partis opposita]* Capitis vulnus aliquando sequitur convulsio partis oppositæ, aliquando ejusdem paralytis: Quandoque convulsio in parte affecta & Paralytis in opposita: Posterioris hujus ratio hæc esse videtur, quod cum ad partem læsam fiat humorum & spirituum concursus, tum ratione doloris attrahentis, tum naturæ, præsidia sua eo ubertim transmittentis; si ex causis pars sana paralytin incurret, defectu spirituum qui toti ad partem: fissuram conflant. Hæc autem convellitur, ab iis spiritibus confestim ad eam irruentibus: Cum enim, docente *Placero* de sanct. læsion. cap. 2. Spiritus animalis in nervis quoque continetur æque ac in cerebro, cujus propagationes sunt, si præterea cerebri parte læsa, is turgida, amplior fiat & alius ad nervos eorum confluxus, partem læsam inde convelli verisimile est: accedente maxime, juxta *Excell. Willis*, copula elastica, sive vapore nitro sulphureo, qui spiritibus immittit eos in explosionem, potiusquam in fluxum aut irradiationem adigit, unde eorum contractio & motus anomalus partium in quas irrumpunt: Copulam autem eam elasticam suppeditat ichor & sanies ex parte vulnerata exsudans.

§. 8. Vinitor robusto & bene habito secundum naturam corpore, cum contentionem cum suis sortis homine habuisset, incalescenteque ira ligone hostem impeteret, alter jacto lapide incytilis contritum in capite vulnus, secundum os bregmaris, parte sinistra, accepto vulnere: concidit æger & sine sensu stupidus aliquandiu manens, exsuscitatus resurgit, in zedeque deductus, accessito Chirurgo, optime tractatur: Quum dies aliquot sine verendis symptomatis constaret æger, præter dolorem, quem tamen ingenrem ex vulnere percipere se aiebat, existimatum est vulnus lethale non esse, imo nec periculosum: Tandem quum post 7. angere febris dolorque cœpisset, & æger per noctem aliena loqui, contrahique manus digiti viderentur, Medicum accesseri voluit: Ego vocatus, vulnus intueor, vulnerati faciem, aspectum, verba attendo: video hominem balbutientem, & gravate atque aliena loquentem;

contractisque manuum digitis atque convulsis brachia attollere non posse certo, sed veluti resoluta jacere: Tum his spectatis lethalibus signis, in præcipiti rem laborantis esse denuntio, ac brevi ægrum moriturum; quumque interea audirem missum esse per initia sanguinem, purgationem aurem non adhibitam, quam in capitis vulneribus plurimum valere docent Hipp. & Gal. constarentque adhuc satis vires, purgans præseribo, quod feliciter, & sine molestia operatum est: perstant nihilo, secus symptomata illa gravia, resolutio convulsioni juncta, atque delirium, quibus pro ratione mederi studeo: Sed nihil proficientibus omnibus; æger in deterius lapsus obiit die xiv. ab accepto vulnere.

Dissecari cadaver sui iussere: E regione vulneris, inter cranium & duram meningem, sat multa poris copia inventa est, membrana ipsa prætumida & decolorata, qua parte vulnus infederat, etsi nulla tamen in cranio subesset fractura fissurave aliqua, sed sola ex ictu concussio: unde factum est ut ictus violentia & contusione venulæ pericranii, sanguinem fundentes & ruptæ, sanici genitæ materiam præbuerint. *Valleriola lib. 3. Observat. 8.*

**I**nter cranium & duram meningem, &c.] Quomodo ad meningas usque sanies penetravit, quum nulla esset in ossis fractura aut rima, mirum potest videri: Sed mirari desinemus si intellexerimus conspirabile esse universum corpus, & ab ictus violentia incusso in caput lapide gravi, non solum externas partes capitis, sed & internas quoque per consensum atque viciniam affici: Neque enim solum censendum venulas, quæ in pericranio sunt, ecchymosin facere

in huiusmodi capitis contusionibus, sed & eas quæ intra cranium duram meningem vestiunt: quod dura meninx pericranio alligata sit, & ab ea per suturas pericranii ortus sit: Itaque quum ab ictu concussæ & ruptæ duræ meningis venulæ fuerint, ab illis saniem prodixisse; quæ dissecto cadavere intra cranium reperta est verisimile est: ut verissimum sit quod ab Hipp. lib. de cap. vulner. dictum est, vulnera capitis etiam exigua non vacare periculo, &c. *Idem ibidem.*

§. 9. *Elfo Amsonius*, Frisius, studiosus, in seditione populari quatuor vulneribus saucius, uno in vertice, altero in musculo massetere sinistro, utroque calviam penetrante; tertio in dextra frontis parte: quarto in manu sinistra: Is sexto vulneris accepti die Epilepsiam ter patiebatur, die vero nono, gravem capitis dolorem, cum vigiliis, febris continua, delirio & siti questus (quamvis horum quædam largiori veteris cœcivisæ potui propter suum & febrem, alia deficiente causa, adscribi posse videbantur) tandem 15. morbi die expiravit.

Postridie mortis caput examinatum est, Inventumque vulnus temporis sinistri penetrasse & cranium & utramque meningem, in ipsâ cerebri substantiam, ad duorum pollicum altitudinem una divisione, & altera ipsi proxima, unico modo pollicem profunda: Os autem cranii fissuram, imo rupturam verius habebat, quæ ab ipso vulnere (quod latitudine pollicis in massetere supra aurem eminebat) & per transversum digito supra futuræ lambdoidis initium usque ad aurem sinistram ferebatur: Sub cute, passim in occipite, & in tempore dextro, & frontem versus, contusiones, cum sanguine coagulato interfuso: sicut etiam inter calviam, potissimum circa verticem, & lambdoidis initium ex sanguine grumoso macula ossi inhaerens, medizque palmæ latitudinem ædæquans viscebat. *H. Smetius miscell. l. 10. p. 560.*

§. 10. *Claudius Finalis* (de quo tit. de Soporosis afflicti) lapide ictus supra supercillium sinistrum, ubi excitatum vulnus confusum, tertio die extinguitur. Sublato cunctis fornice in conspectum venit dura meninx livida & nigricans: Pia semipurris & foetida, cum insigni sanguinis extravasari, & in grumos concrevi, tum anfractibus, tum in ventriculis copia &c.

§. 11. Si sclopetorum globuli, vel aliud quodcunque telorum genus profundiora cerebri perumpat, nullus mortalium evadere mortem poterit, Cujus rei fidem mihi fecit Illustr. ac Fortissimus Heros *Henr. Ludov. Maximilianus Comes in Pappenheim*, &c. Cui anno 1633. 27. Jun. in obsidione arcis Altz Stöffis, tempus dextrum sclopeti globulo, in parte clatiore transfixum fuit, globulo in sinistro latere profundiora cerebri petente, unde omni sensu & motu privatus concidit, ac paulo post anno ætatis 23. expiravit: Eo condituræ causa eviscerato, nihil fere sanguinis in cava descendente & arteria aorta reperi. *I. Iacobus Wepferus Dissertat. de Apopl. p. 228. & 345.*

**P**rofundiora cerebri perumpat, &c.] Mirabilis est capitis vulneratio quæ recenset *Valleriola* Observat. 10. de milite, qui ænei tormenti globulum excepit in tempore sinistro, eo paulo altius egrediente, ex opposito latere, distracto & dilacerato utrinque cranium, qui citra apoplecticæ symptomata miraculo integre curatus fuit, nisi quod surdaster & cæcus manserit: Existimat equidem *Valleriola* nec cerebri membranas nec cerebrum ipsam læsum fuisse, quod tamen nequaquam mihi probabile videtur, non enim duræ matris conditio similis est intestinorum constitutioni in abdomine, quæ non raro

illæsa inænti gladio vel sclopetorum globulis cavum abdominis penetrantibus lubrica namque sunt, liberioraque armorum impetui cedere possunt: dura vero meninx pertinacissime cranium, maxime autem circa suturam sagittalem validissimis fibris accreta est, adeo ut magnæ nixu cerebrum detegentibus avellenda sit: unde globulo perita, vel centies rupta fuisset, imprimis quia globulo à sinistro tempore ad oppositum transiendum fuit: Non minus à verosimili abest sanclitatis & cœcitate causa quam ibidem addit, scilicet ab ictu, concussio cerebro, sanguinem in opticos & auditorios nervos incidisse & obstru-

tionem peperisse, nam praeterquam quod nulla in his nervis cavitatis apparet, sanguis in profundioribus cerebri partibus, unde hi nervi exoriantur, citra gravissima symptomata, quorum tamen nulla mentio ab ipso fit. effusus nunquam fuisset, imo vix ulla arte curari potuisset: Non minus admirandum est vulnus Nob. Poloni juvenis & boni corporis habitus, qui telo iactis infra temporum ossa, versus prominentiam ossium jugularium utriusque lateris, rectè ad Regis tentorium perrexit, ubi ab equo profliciens se Regi ostendit, telum adhuc ita artificiosè quasi & aequaliter per mediam capitis infixum gerens, ut nulla pars illius magis aut minus ex uno aut altero latere promineret, ac prae: febrem symptomaticeam vix alia graviora, quam quae vulneratos communiter commitari solent, passus est symptomata, capropter solis Chirurgis cura commissa fuit, qui motum ab una statione ad alteram exercitum commodè sequi valuit: Ex his exemplis elucescit citra apoplexiam, aut aliam graviorum symptomatum colluviem, non solum intra cranium & duram matrem, sed & intra hanc & tennem, quin etiam in ipsam cerebri substantiam, modo non quoque in ventriculos anteriores, innoxie sanguinem effu-um fuisse: Verum metito hæc inter monstra recensenda sunt, Quotusquisque enim mortem, vulnere cerebrum penetrante evadet? si quid in re obscurum divinare licet, minutione tantum vasa tum à globulo tum à telo laesa, minusque sanguinis profusum fuisse existimo: Praeterea utrinque sanguini exitus patuit, qui alias gravius capite contuso, magno ægri commodo non raro trepano patendus est: Denique in ambobus his admirandis capitis vulneribus, nec telum nec globulus atque nobiliorem cerebri partem, medullas scilicet profundiores substantiam, ubi spiritus generantur, & unde in nervos derivantur, attingerunt: quæ si lacerata fuisset, proculdubio de utraque vita actum fuisset cum su-

pernarium cerebri partium vulnera haud adeo, experientia testè, incurabilia sint: Quæ laculentius confirmat V. Couter Miscell. Observ. Anatom. & Chirurg. p. 122. his verbis, Quod summa admiratione dignum existit, brutorum viventium cerebrum detecti, vulnera, & intus nervis eorumdemque principia, & ventriculis mediis illæsi, exemi; at nullum vel vocis, vel respirationis, vel sensus, vel motus offensionis signum in eis deprehendi: Aves absque cerebro à iugandis vivunt, ut quilibet in gallinis vel pullis gallinæis, si rastrum superius cum dimidia capitis parte absciderit, cerebrique majorem exemerit partem, experiri potest. Vultus autem & auditus in Nob. Polono illæsi manserunt, secus ac in milite apud Vallerolam factum est, quoniam telum Tartaricum, globulo acutius, duram meningem citius perfodit, minusque hanc membranam extendit vel concussit, unde etiam nervi optici & auditorii nec abrupti nec loco moti fuerunt, quorum alterutrum vel utrumque in milite factum suspicor: Quod si vero globuli vel telum quodcumque profundiora cerebri perumpat, nemo evadere potest. Idem ibidem.

Nihil fere sanguinis, &c. ] Illustri. Comitibus fidem facit non solum alibi saucio vase sanguifero insigniore, verum etiam intra cranium lacerato maximum sanguinis proventum petiti, quamvis mole quibusdam vas in medio & imo ventre atque artibus impares sint, si sinus & carotides juxta infundibulum excipiantur, atque totam cranii cavitatem oppleri possent, nisi vulneris amplitudo camularionem impediat: nam cava descendens ut aorta vacua, plurimum cruoris statim post idem emanasse docet: Ejus effluviū promovit quod rheda statim post illatum vulnus per loca aspera vehebatur; unde forte vasa majora magis sanguine exhausta visa sunt quam alias observatur, Idem p. 346.

§. 12. Vetula quædam Furiarum non postrema consuevit maritum sæpius egregie verbis dedolare, quod plerumque patienter pertulit: Mense Julio 1673. cum nescio quas scordes scopis abstergeret, indignabunda uxor accurrit ac verbera intentavit, verum patientia tandem aliquando in furem versa, à Marito scopis in tempore dextro fortiter percutitur, adeo ut dissolutis ac a volantibus scopis, acuminata seopisque infixa baculi pars tempus transiret: sanguine largissime ex vulnere emanante, à vicina amice monita ut illius curam gereret, verum tenuit, mire in virum convitiis debaucharia est, ac se jugulum propediem ipsi fracturam minabatur: In cena itarum plena cibos devoravit ac potu se ingurgitavit: mox tamen fofo assidens omnia assumpta evomuit, postea lectum petiit, surrectura nescio quam ob causam humi cecidit, & juxta lectum mane mortuus inventa fuit.

Ex Illustr. Supremi Dicastri Hassiaci mandato, Excell. D. Combachius cum Chirurgo vulgus contemplatus est, invenitque vulnus primo aspectu exiguum & quod regeretur apico minimi digiti, verum indito vulnere stylo deprehenderunt baculi acumen altius penetrasse: cujus rei maritus conscius factus, mox fuga sibi consulit: detracta cute circa musculum temporalem omnia sanguine suffusa erant: Remoto musculo temporali, in osse foramen rotundum, ac si sclopeti manuarii globulo pertusum & efformatum fuisset, occurrit: Ablato cranio, inter illud & duram meningem, item inter utramque meningem, imo in ipsa substantia cerebri plurimum cruoris inventum fuit, Ex substantia quoque cerebri duo fragmenta à baculo avulsa extraxerunt: Quibus rite expensis merito Vulnus lethale judicant. Observatio Excell. & Clar. Dom. D. Ludovici Combachii, Ludovici Filii, aula Hassiacæ Medici, communicata Excell. D. Wepfero; quæ est hist. 12. Exerc. de Apoplexia.

Vulnus veritè isti illatum gravissimum omnino reputandum, quo arteria temporalis ramuli sauciari fuerunt, ut ex larga hæmorrhagia statim eveniente patet; musculus item temporalis, os, meninges ambæ, cerebrum ipsum cum arteriarum ramis anfractibus intercurrentibus pertundebantur & lacerebantur, non tantum spirituum animalium deliquium peperit, quin diu post acceptum vulnus plures adiones

animales adhuc perficere potuerit, & ceu extra periculi aleam posita secare suis manibus indulerit; nam facinus mariti ante hunc diem insolitum phantasmæ obversans, adeo Irascibilem vim commoverat, ut sopiro omni rationis imperio propiam valentiam negligeret, in memoria convivorum & criminatissimæ ideas divite proventu fide reconditas concitaret, illas plenis faucibus emoveret, rabidæ instar ultrices manus

manus viro illatura, hinc inde oberraret, cibos iræ præcordius ferventibus voraret, potum intemperanter ingurgitaret, omninoque se verbis & gestibus ostenderet qualem se antehac ad iram concitâ sæpius furibunda præstitit.

*Omnia æstus evomit* ] Capitis contusionibus fortioribus, imprimis si vas aliquod sanguiferum intus rumpatur, aut cranium findatur, ejusque ut & cerebri vulneribus Vomitus accidere frequenter observatur, aliquando primo statim die & paulo post vim illatam, aliquando demum post diem unum vel alterum elapsum: *Hippocr. l. 6. aph. 50.* cerebri vulneratio necessario bilis vomitus supervenire tradit, quod tamen non omnibus nec statim primo die contingere commentatores tradunt, quosdam enim alias ad vomitum minime proclives non vomere, alios vel assumptæ solum, vel pituitæ vel bilem multo sero elutam, idque demum quarto, aut tardius vomitu rejicere scribunt. Anus ista, quæcumque irarum plena post inflictum vulnus devoravit & ingurgitavit, brevi rursus evomit: forte bilis vomitus non emanasset, nisi vitæ filum præpropere abruptum fuisset, quoniam illa abundasse restantur animi motus vehementiores, ad quos proclivior erat & à quibus propemodum continue agitabatur: Causa vomitus illius adscribitur consensus ventriculi cum cerebro per nervos insignes, non solum officia illius ambientes, sed etiam per universam ejus situm diffusos, tunicis imbricatos, ac cum eorum libris coalitos & pene coactos: Sed cur noxa quam cerebro ejusque meningibus in his capitis affectibus experitur, prius in ventriculum redundet quam in alias partes medii & imi ventris, quæ nervis æquè luculenter dotatur, & quædam eorum insuper nervorum principio propiores functiones sine causa ambiguntur. Apud anum istam cito ventriculi in versio vulnere superveniens adscribi

posset minime ejus oppletiohi, & cibo & potu & post idem factæ, à qua ventriculus ob hæmorrhagiam prægressam debilitatus magis aggravabatur, ejus nervi ad contentorum amplexum torrens coquebantur, & cerebrum in subsidium accercentes vehementius alias noxa: Et de m. amplius irritabantur veluti exardescens hanc excretionem imperavit: Venter, quoniam non raro vixit stomacho graviter capere læsi vomunt, nodus his minime solvitur, quæ omnino consensus cerebri cum ventriculo major quam cum aliis partibus ferendus erit, ob quam citius quam cum aliis comparatur, quævis noxa gravius sollicitante cerebrum, nec ceteris in membris permaneat, unde quoque singulorum, convulsiones aliæve lymphomata tandem superveniunt: Intra cranium vomitus illecebræ, cum sanguis extravasatus exortum parvi vagi attingens, tum potissimum signum crani in tempore percussu, tum baculi fragmenta cerebro ejusque meningibus infixæ apud anum istam reputari possunt. *Wesferus ibidem.*

Recte vero censet Vir Excell. noxam in ventriculo potius illucelcere ob proximam consensum, præsertim si cibo vel vitiosis humoribus tunc temporis targeat. At cum eo inani vomitus bilis accidit, præcordiorum quoque spasmas & convulsio incusanda venit, recedens, ejusque vesiculæ ac pororum choleodochorum, bilem primo in intestinum, hinc in ventriculum excurrentiam, ab æquali ramorum texti paris, per eas regiones diffusæ: *um, & de v. p.*

*Hæm. cecidit, &c.* ] Proculdubio apoplectica, quia obmutescens opem imploratæ nequit, atque invalescente sanguine intra cranium effusione, cerebro sanguinis pauperiem majorem experiente, magisque subsidente, compressione accedente fortis apoplexia exspiravit. *Idem ibidem.*

§. 13. Nuper Studiosus Jurium egregius, infra orbitam sinistri oculi, prope nasam, absque ulla læsione oculi à milite ense punctim vulneratus fuit Paulo post loquela & ratione privatus per horas 24. sed jam dignus, tandem revera cum stercore Apoplecticus mortuus est.

Aperto à me cranio, vidi vulnus per orbitam oculi & os cribri sum prope cristam galli factum, dextro quoque cerebri ventriculo inflictum fuisse: ex quo etiam magnam portioem sanguinis attri, grumosi & fibrosi, ad crassitiam & longitudinem modii digiti extraxi: Basis cerebri & regio cerebelli copioso sanguine extravasato refertæ erant, præterquam quod tota cerebri moles quasi ab inflammatione etiam rubicunda apparet. *Observatio Clar. D. D. Maximiliani Henrici Egermeieri Professoris Friburgensis, ad Exc. l. l. Weyferum transmissa; quæ est histor. xi. Exerc. de Apoplexia.*

**E**NIS apud Juvenem istum per os maxillæ superioris secundum tenernum, & os cribri forme, ambo imperui non magno facile cecidit adactus, juxta cristam galli transversam à sinistro latere ad dextrum ventriculum usque transiens, proculdubio fasciavit ramum anteriorem carotidis insignem. ad penæ gallinaceæ magnitudinem accedentem; item ramos anteriores, qui prope cristam galli junguntur, ac sursum reflexi pluribus anfractibus prospiciunt, nam ensis loca hæc attingit: præterea omnia usque ad co. cruore suffusa erant, ut non nisi insignia vasa sanguifera incisa fuisse necessum sit: denique præter meningem etiam substantiam ipsam cerebri arterias vulneravit, nam usque ad dextrum ventriculum penetravit.

*Per horas 24. se jectigans* ] Jectigatio an convulsus motus corporis fuerit, quo non raro alicubi nervoso genere gravior afflictio præ anxietate varie jectantur ægri, nulli-bique locum aut situm quieti apum rep-ire possunt, non mihi certo constet: quævisque fuerit, animalis omnino dicendus erit, qui xiv. horis quibus perduravit, à musculari spiri-

tuum animalium irradiatione consue gaudens, ac molitiam quandam declinans perficiebatur: quoniam namque cerebellum & postica pars cerebri adhuc sufficienter per ramos arteriarum vertebrales & carotidis posticæ, forte etiam per quosdam anteriores irrosebantur, spiritus animales ad hos motus tantillo temporis perficiendos abunde producerant & suppeditare valuerunt. *Wesferus l. 6. p. 361. & 364.*

*Dextro quoque cerebri ventriculo inflictum fuisse* ] Signalisationis cerebri sunt eadem quæ læsionis præ matris, addit hoc quod exit modiculus cerebri substantia, quævis sit possib. le quod cerebrum sit læsum, maxime à re subtiliter perforante, vel à re incidente superficialiter, & diminuire tamen, & non exeat aliqua pars medullæ cerebri, exit tamen in pluribus, & renes hoc esse cerebrum si exit aliqua substantia alba quæ appareat medulla, quia non potest esse nisi cerebrum, & maxime si exit in primis diebus ante tempus generationis sanici, quia interdum aliqui dicunt cerebrum exire à vulnere, & est forte sanies. Non negamus quin & post notabile tempus, & etiam

tempore quo adest multa sanies, possit exire substantia cerebri, quia circa xiii. diem vidi ego exire substantiam cerebri, & etiam supervixit ille: Dico præterea quod hæc signa à Doctoribus scripta habent veritatem in pluribus, tamen vidi ego læsionem in

panniculis & etiam in cerebro, & non fuit febris, neque aliquod malum accidens: Prædicta signa sunt quando cerebrum læsum est à re incidente, concutiente & perforante, cum manifesta cerebri & cranii læsione, & etiam cum occulta. *Berengarius cap. 14.*

## OBSERVATIO IV.

*Contusio capitis lethalis post trimestre, ob copiam puris supra meninges & cerebrum effusi. 1. Ob cranii fracturam & depressionem. 2. Sincipitis, ob sequutum serosum abscessum, tertium ventriculum prementem. 3. Temporis sinistri, ob sanguinem effusum in cavitatem ossis sphenoidis. 4. Ob genuum in substantia cerebri abscessum. 5. 6. Ob sequutum abscessum in opposito latere. 7. Ob copiam puris inter utramque meningem collecti. 8. Ob induram subdura cerebri parti patredinem, salvo cranio. 9. Ob sequutam cerebri substantia necrosin. 10.*

§. 1. **V**ulnera capitis non solum periculum minantur ad xl. usque diem, ut vulgo creditur, sed diutius quin etiam, cum sæpius observaverim quosdam vixisse ultra tres menses à vulnere inflicto. Quidam enim percussus solea equi ferrea mense Junio, cum maxima contusione capitis, atque tamen ullo horum symptomatum quæ in his vulneribus aliqui suboriuntur, Cuilicet secto loco contuso sanguis extra vasa effusus eductus sit, atque omnes partes contusæ expurgatæ medicamentis propriis, vulnere mensis spatio angustiori reddito, nunquam tamen id ad cicatricem deductum, aliqua portione puris continuo emanante, etsi læsio in osse nunquam apparuerit, nullumque symptoma; Mense tamen Octobri oborta est febris cum rigore & vomitu; atque quarto die ab his symptomatibus obiit æger.

Aperto cranio, maxima copia puris inventa fuit supra metubranam, & intra substantiam cerebri. *Marchetti Observ. 15.*

**Febris cum rigore** ] *Niculus* inquit quod Rigor in vulneribus capitis, sive cum sive sine fractura, & similiter in vulneribus nervorum nobilium eveniens, spasmodum futurum præmunit & mortem: Nam rigor in his casibus causatur ex materia quæ fluxit à cerebro ad nervos, ubi & spasmus faciet & tandem sequitur mors: Nota tamen quod possit esse Rigor, nec sit signum mortis, quod sit ab alia causa quam à solu-

tionem continui, nempe à sanie vel apostemate; possibile est enim ut sit febris continua vel interpolata in tali subiecto, & febris sit ægritudo, & non accidens ad prædicta & ab istis febribus cavabitur rigor. Sed Rigor factus à vulnere in capite, stante læsione cerebri vel panniculorum, & stante sanie contenta sub osse, arguit virtutis debilitatem & consequenter mortem si perleverat. *Berengarius cap. 13.*

§. 2. *Franciscus Helm.* bene potus æstuate cælo 23 Janu. 1655. lamina ferrea in osse sincipitis percussus, derepente quidem mutus factus, sensibus tamen & motu integris, adeo ut eo ipso, non minus ac postero & tertio die, in conclavi & atrio deambularer iracundus & missirans, sæpiusque manu elevata percussori quasi miniratus: Nocte diem iv. præcedente supervenere convulsiones & lipothymiz, quibus paulo post est extinctus.

Plaga post mortem demum, à Chirurgo incisa ante & pericranio, aperta est, craniumque depressum & fractum repertum. An meninges fuerint læsæ non liquet, cum etiam apertis Chirurgus neglexerit. *B. Thomas Respons. Med. 12.*

**Quæritur** an contusio hæc & fractura cranii ex se & simpliciter pro lethali habenda fuerit? &c. Contusiones & fracturas cranii periculosis quidem esse, sed non simpliciter & absolute lethales, nisi adeo vehementes sint ut vasa cerebri & circa cerebrum rumpantur, sanguisque ex eis ad principium nervorum effundatur: quod in præsentis casu non contigisse constat, quod neque per os, neque per nares aut aures sanguis effusus sit, nec sopor aut stupor sequutus: Aphonia quidem concussionem arguit, sed minus vehementem, cum sensus & motus integri permanerint. Insana ratio autem & convulsio, vera mortis causa, præcaveri potuissent ope congruorum remediiorum, præsertim V. S. & apertionis cranii ejusdemque elevationis. Quibus accessit ira vehemens, æris calidior constitutio & crapula, &c. *Idem ibidem.*

**An meninges fuerint læsæ non liquet** ] Dubitatur in judicando an accidentia talia sint per solutionem cothini in panniculis & cerebri, an per apostema, an per saniem contentam sub cranio, cum prædicta

signa sint communia omnibus prædictis dispositionibus: Ut ergo removeantur tales dubitationes Medicus sit pendens & diligens in judicando, quia talia accidentia si veniunt subito, sunt per læsionem panniculorum & cerebri, sit dicimus illa necessario esse ex illa causa, etiamsi veniant parci post. Erulna hoc Medicus oculata fide videt necesse fracturam, vel incisionem, vel perforationem, vel si non videt, certe considerata causa ledente, si foris fuerit, indicabit illa accidentia sequi solutionem cothini: Et quilibet est certus quod si talia accidentia veniant subito, vel parum post, quod ibi non sit sanies aggregata, vel apostema, ergo sunt per solutionem cothini: Erulna hoc veniunt accidentia foris prædicta, & sunt subito in suo statu, & sic non contingit in accidentibus apostemarum nec saniei contentæ, quia illis talia accidentia habent principium augmentum & sua tempora longiora. Sed quia accidentia saniei & apostemarum, maxime calidorum sunt similia, & etiam conveniunt in hoc quod non veniunt nisi ad tempus notabile, erit etiam dubium an sint per apostema

stema an per saniem? Pro quo dubio, noto distinctionem accidentium prædictorum, & dico quod accidentia postrematis sunt majora quam sanies contenta intra cranium, quia aposthema est majoris nocuenti cerebro, & paniculis quam sanies: Demum poscitur sanies, quia aliquid tenuis recludit à fissura cranij si qua sit, & cranium est male coloratum, maxime si sanies sit multa & male conditionis, Et si fissura sit angusta vel forte nulla, interdum enim est multa sanies supra panniculum, laudabilis tamen, & non facit mala accidentia, sicut contingit in vulneribus & fracturis, in quibus magna ossis pars est amota, & panniculus est defectus, à quo sanies libere exit, & bene mundificatur & expurgatur, Sed sanies faciens prædicta accidentia est mali odoris. Sanies etiam laborum est mali mod. & majoris copie quam in apostemate, quia in apostemate labia sunt sicca & mali

coloris, caput quoque est calidius in apostemate quam in sanie: Quando vero sanies est infra cranium, ipso non fracto, per venulam aliquam ruptam in panniculis, cranium est male coloratum, & æger sentit gravedinem in ea parte in qua est sanies, & interdum sanies exit per palatum, per nares & per aures: Præter alia signa considerentur cæsse apostematis & sanies, ut an corpus fuerit plethoricum, qualiter regularum, & cum quibus medicamentis inter omnia, si dubitat Medicus de sanie, debet aperire angustam fissuram, vel si non est fissura, debet cranium perforare & certificari an sit sanies, quia in omni re ægritudine sunt signa dubia, ideo Medici sine mora debent talia facere. In istis tamen signis distinguendis magna est difficultas, & non agnoscuntur nisi ab experto, qui conjectura aliqua hoc cognoscat. *Berengarius cap. 9.*

§. 3. Maria N post contusionem syncephitis, per integrum annum de Vertigine querelas habuit, tandem Apoplexia fortissima subito obiit. Inspecto cerebro, in sinistro latere tumorem, humore limpidissimo plenum, magnitudinis ovi Gallinæ, quicertium cerebri ventriculum ex parte compressit apeximus. *Tit. de vertigine.*

§. 4. M. P. Impacto in sinistra tempora palo, graviter ictus conceidit: Post obitum sinister 3ij coagulati & nigri invenimus, qui lateralem ossis sphæroidis sinistri cavitatem adimplerat, &c. *Vide lib. i. Tit. de Somnolus affectibus.*

§. 5. Fœminæ cujusdam caput graviter contusum fuit, delabente aßere quo officina claudabatur: A Chirurgò quodam divisa fuit cutis & caro ad os usque & pericranium abrasum, una cum ossis substantia aliqua: Vultus diu apertum relictum est, nec ulla ossis fracti indicia aderant: Cùmque ostendam abscederet, portio quedam ossis, quæ separabatur, vi quadam ablata fuit à Chirurgò, moxque sanguis ex osse reludans visus est: postea febris acuta, cujus antea expertus erat, ipsum invasit, tandemque interijt.

Post mortem aperto capite, inventus fuit Abscessus in cerebri substantia, & membranz ipsam involventes lividæ. *Isaacum Cattierum Observat. Medic. viii.*

§. 6. Procurator Nationis Germanicæ Patavij ex levi capitis Contusione, neglectis remedijs per imprudentiam, primo pedum brachiorumque paralyti, moxque maturo inde facto cessit.

In elevato vero cerebri systemate nullum alicujus momenti vitium, præter abscessum in opposito latere enatum apparuit. *Bartholinus Comm. in Paduanorum M. A. Severeni Exerc. I.*

§. 7. Quidam ex levi capitis contusione incidit in paralytim, post obiit. Illi repertus abscessus in opposito latere. *Vide lib. i. Tit. de Paralyti.*

§. 8. Quidam vidi ætate, parte media bregmatis leviter vulneratum, cute tantummodo & pericranio læsis, absque ulla offensa cranij: hic patiens nullum passus est symptoma, neque morbi principio, neque die quarta, quem tamen septima invasit rigor insignis, cum concussione totius corporis, quod remisso frigore incallescere cepit, prout contingere solet in Tertianis: Ego vero post intermissionem febris ipsum terebravi, licet nulla materia ex foramine efflueret: Cum vero membrana utraque humore diffunderet, in illam infudi sanguinem palmi, ex ala statim ductum, corroborando ipsius calori; qua tamen sequenti die nigrescente; applicui aquam vitæ ad xi. usque, tandem Balsamum nigrum occidentale, ægro tamen xiv. extincto.

Secundo stans, atque bene undique deterfso & abluto, ac diligentissime ad Solem quaquaversum inspecto, nunquam potui in eo rimam aut aliam aliquam noxam videre: Verum secunda membrana dura, sub vulnere, inter ipsam & piam, maximam puris copiam deprehendi, non sine admiratione, nullam fuisse rimam in osse, atque patientem nullum passum esse symptoma ad septimam usque, periade ac si non fuisset vulneratus: ut propterea septima illud symptoma contigisse liceat conjicere; contusione facta in membranis & cerebro, cujus causa concreverat & putrefecit, ideo copiosa materia purulenta supra cerebrum congesta fuit, ægro mortis causa. *Marchetti Obs. Medic. Chirurg. 14.*

**D**ubitare hic quis posset an secunda sit dura meninx, quo exitus pateat saniei supra piam & cerebrum colligere: quod scilicet puncta dura membrana convulsionum certum imminet periculum, ac proinde mortis? Id tamen nullum censemus, factis duabus terebrationibus ossis, & patefacto utraque adeo foramine ut longa sectio fieri possit supra duram membranam, & quidem hac ratione, quia



magna vulnera capitis, quæ non solum secant membranas, sed etiam cerebrum, sanantur: Quando igitur certo constat materiam inter utramque meningem collectam esse, tunc tuto possumus devenire ad hanc operationem, ut cunque periculi non expertem, cum aliqui nullo adhibito remedio certa mors imminet, atque ex Celfo, Præterinceps remedium expectari quam nullum, impiumque sit relinquere agrum remedijs destitutum, Quod *Glandorpio* feliciter cessit in *Bremensi* pngili.

*Nullum passus est symptoma* ] Quam infide sint ejusmodi capitis consusiones, & quam cantum deceat esse Medicum in præcavendo successu, ostendit *Pachyquetus* apud *Riverium* observat. commun. 38. Puella, ætatis annos nata 20. lapide percutitur paulo supra frontem, non deserit consueta munia, sed post dies tres de dolore capitis obtuso conqueritur, somnolenta fit, febris exigua admodum, 17. die morus convulsi apparent, 20. rupto abscessu & excreto è naribus viscescente pure moritur. D. *Viventius* in posteriora cecidit, dies aliquot negotijs invigilat, post de-

lirat, frigere se dicit, somnolentus fit, manum subito de capiti admovert, 11. die rupto abscessu ore excreta materiam purulentam & fluxim mortuus est. *Nipus* meus à contusione capitis statim tristis factus est, de levi capitis dolore conqueritur: post mensem incidit in febrem continuam cum somnolentia & capitis dolore, surgebat subinde & clamabat, 7. die mochi excreto pure per nares statim obiit. A. *Bastius* cap. 1. de affectibus omissis, censet ejusmodi abscessus genitos esse inter cranium & duram meningem, *Vide lib. 1. cap. 1.*

*Ipsam terebravi, &c.* ] Circa modiolus nsum observanda cautio quam affert *Marchetti* Observat. xv. scil. Eminentias rotundas undique circa vitream laminam, ossis terebratione educto, esse signum manifestum aciem modioli non pervenisse ad membranam ipsam, neque perforationem fuisse causam mortis ipsi patienti: prout vice versa ipsæ non apparentibus, indicium esse membranam læsæ, ac proinde lethale, plurimis enim locis cranio adhæret.

§. 9. Anno 1636. *Cæsar*ianus quidam miles à Suecico Equite cæstra duobus repetitis ictibus in capitis occipite ita multatus fuit, ut expugnatus humique prostratus semimortuus in xenodochium Ulmense fuerit deductus: Hic sine eruento vulnere, absque ulla cranij aut fissura, aut evidenti quapiam depressione, elapsis circiter novem septimanis, cum & expedire loqui & ingredi valeret, nullosque amplius ex contusione dolores sentiret, & recreandi animi gratia sæpiusculè obambulando genio suo indulgeret, de habitu cogitare cepit. Verum dum proxima quavis data occasione certo sibi navigio discessum decrevisset, noctu salvus, ut quidem omnibus videbatur, somnum atque quietem capiens, subito in ipso sopore extinctus & mortuus est.

Cruciformi instituta cutis capitis sectione, pericranij ab osse separatione, & cranij in orbem facta dissectione: partiumque omnium diligentissima inspectione, ne minima in cranio rimola; nec ullum etiam levissimæ depressionis vestigium animadversum, verum in percussæ partis subiecta cerebri substantia, non secus ac in putridis pomis usu venire solet, ad digid erassidiam enormis, & ad ventriculos fere anteriores penetrans putredo, & aliqualis piz matris corruptio inventa, reliqua cuncta illæsa apparuerunt. *Ioh. Georgius Greifselius in Miscell. curiosis anni 1670.*

**A**d mirationi fuit quod lædens illa vis, motbi & necis auctor, non proximas potius, sed inferiores magis partes percutiendo læserit, quamvis experientia plurima talia observant exempla. 1. Quomodo in cerebro temperati illi & pellacidi animales spiritus tam graviter turbari possint, ut & ipsi in momento quasi cerebri siderationem admittant, partibus exterioribus salvis, Et 3. quare putredo illa insignis in ipso cerebro suborta, & piz matris communita, nullos unquam partium interiorum sensuum

depravationem induxerint, sed ex improvviso omnem sensendi facultatem cum ipsa vita abstulerit: Hac igitur observatione Chirurghi nocent ut nullas capitis percussiones, etiam si partes cerebrum continentes illæsas invenerint, leves judicent: Nec percussus unquam indubitatam salutem promittant: nullisque ipsi, in dicta præsertim, errores concedant, sed eos potius atque, caute & prudenter diffidentia ita tractent, quo Sacre artis vera lumina existant. *Phil. Salmoth. Cent. 1. Observat. 12.*

§. 10. Alteri vulnus illatum in superiore capitis sinistra parte, cum instrumento retuso sed nonnulli ponderis, quod existimabatur periculi exors, utpote cranij osse illeso, ideirò etiam negligentius curatum: ex castris, ubi vulnus acceperat in vicinam urbem delatus fuit. Super-venit huic & Sopor: Decubitus quoque supinus fuit, pulsus parvus ac creberrimus, mens nonnihil læsa, ad interrogata enim haud rectè respondit, Huic ingravescente malo universum dextrum latus resolutum est, (cum tamen in sinistra capitis parte vulnus esset) inde pernitiosus sopor, à quo excitari non potuit: brevi viræ exitu subsequente.

Cranio hujus subulato, reperta est dura meninx sinistra parte livens, ac similiter sub hac cerebræ substantia, quæ apparebat, sphaçelò correpta: dextra cerebri parte cum sua membrana haud malo affecta, cranio etiam undequaque integro, nec tamen ullam rimam aut fissuram habente. *Dodonaus Observat. 2.*

**A**pparet & huic concussum fuisse cerebrum, nam dextræ partis resolutio vulneris occasione non videtur accessisse, sed aliam ac majorem causam ha-

buisse, ipsam videlicet cerebri ab ictu per instrumentum graviore ponderis concussionem. Reliqua Symptomata vulneri successisse potuerunt; capitis huiusmodi

dem osse tenus vulneribus, etiam osse cranij hand le-  
so, gravia quandoque symptomata accedunt, ac ren-  
dem ipsa mors. At frigida hisce vulneribus inimi-  
cus, à quo nisi vulneratus se non contineat, sepe in  
periculum adducitur complures possent qui ex levi  
vulnere capitis, pericranio tantum vulnerato, obie-  
runt, qui se aëri frigido exposuerant: Supervenit an-  
tem istis sensum stupor, ac tandem profundas ac  
noxios sopor, nonnullis etiam febris deinde mors, sed  
resolutionem alicujus partis non memini in quo-  
quam capite vulnerato, quàm in hoc, me observasse:  
quamobrem non vulnus modo, sed cerebri concussio  
morti occasionem præbuisse videtur. Cur autem alij  
ex levi capitis vulnere perierint, qui sui nullam aut  
exiguam rationem habentes, aëri frigido se exposue-  
runt, nulla alia apparet causa quam quod frigidum,

per denudati ossis cranij poros, ad cerebrum perve-  
niens, sphacelo inducto ipsum vitia verit, quo superac-  
cedent ægri hand diu vivere poterunt. Nam ut aph.  
51.7. Quibus cerebrum sphacellatum, id est, corrup-  
tum est, in tribus diebus pereunt, si vero hos effuge-  
rint, sani sunt. Ex in Coacis prænot. Cerebro cor-  
rupto, alij in tribus diebus, alij in septem pereunt: hos  
vero si effugerint, servantur: Cujus sententia posstre-  
ma verba veritatem de sphacelo confirmato habere  
non possunt, ut Galenus ait, sed de incipiente tantum,  
& levi ad sphacellum dispositione prævia accipi de-  
bent, à qua eger diligenter habita curatione restitui  
potest, ut & ait Hipp. 3. de morbis, Quod si morbus le-  
viter, inquit, corripitur, ubi sanguis discessit melius  
æger habet. Si vero vehementer correptus fuerit,  
cito perit.

## OBSERVATIO V.

*Fractura ossis Frontis lethalis ob sequentem cerebri suppurationem. 1. Vulnus Temporum, ob apostema in  
cerebro sequens. 2. In palpebra superiori, ob excitatum in cerebro apostema. 3. Frontis, ob fractu-  
ram cranij, Fissuram duntaxat matris, & Iecoris sequentem abscessum. 4. Frontis & bregmatis ob ossis  
fracturam & vomitum in contigua cerebri parte. 5. Vulnus lethale ob fracturam cranij & sequentem  
cerebri phlegmonem. 6. Ob fracta ossa bregmatis cum Introessione & Contusione musculi temporalis.  
7. Ob Cranij fracturam hinc cerebri ad corpus usque callosam consumptionem. 8. Ob Cranij fractu-  
ram, & fragmenta cerebro impacta, cum sanguinis diffusionem. 9. Ob Striatorum corporum lesionem. 10.*

§. 1. **P**er octo annorum ob effractum frontis os, hand procul à sutura coronali, adeo de-  
pressa fuit subjecta cerebri medulla, ut adempta libertate destitueretur quasi omni  
motu, qui tamen paulo post iterum redijt, ad aperta per exemptum fragmentum via per quam  
exitum ubi invenit lacerum cerebrum, extulit se ipsum longe lateque supra os fractum, exti-  
mamque calvarie superficiem, idque incremento tam uberi, ut Chirurgus necesse habuerit,  
(quod tamen sine præsentem vitæ interitu factum) tantum patti huic nobilissimæ, & ad vitam sum-  
me necessariæ adimere, quantum recipiendo fuisset vacua ovi gallinacei testa.

Ex qua cerebri præcisi dilaceratione protinus expullerunt ingens Fungus, primum qui-  
dem mollis ac albus at modiciore callo, ac cinerea crusta obductus, quo luxuriante tumore  
in dies, magis magisque crescente, ac in majorem molem elevato, neque spiritu vini, aut  
alijs remedijs usu comprobatis, vel tantulum imminuto, *resolvebantur* tandem die xi. *nervi la-*  
*teris oppositi*: manente adhuc firmo ac illibato tam animi quam corporis robore, licet biduo  
post vivendi finem fecerit, sub sudore frigido ac crebris nervorum distensionibus, *conversa*  
jam tum in *pus maximam laceri cerebri parte*. Cujus corruptio eo majorem admirationem excita-  
vit in Medicis, quo minorem viderant vii ium jacturam biduo ante mortem quæ proculdubio  
morbo diutius relebantur, cum ob uberem humidæ radicalis copiam, tum ob solida incre-  
scentis corporis fundamenta. *Tulpius Observ. lib. 4. cap. 1.*

**I**ngens Fungus.) Fractio vel contuso cranio Fungi  
nonnunquam, seu tumores laxi mollesque adnas-  
cuntur: *Ingressus* de Tumoribus p. n. t. i. cap. 1. fieri  
scribit non secus ac fungos in lucernis hyemali tem-  
pore in ellychnij vertice. Discooperita enim revelata-  
que cerebri membraosa, quædam prius substantia  
gossipinæ lanuginis imagoem representat: deinde  
veto per halitum discutiit vapores fumique, ob hæc  
frigida tatem iocam substantiam conglobati paulatim  
ab interiore calore decurrunt siccanturque, donec  
fungo similis substantia appareat, alteratam ab aëre  
esse membranam significans, *Lanugin* sicuti in stipi-  
tibus arborum humores temputridi per corticem extru-  
berantes in fungos coalescunt, sic vulnerato cranio  
humores cerebri affluere, qui ossis frigore condensati  
in speciem fungi concreverunt. Sunt Fungi qui sine  
noxa vitæ & emergunt & decurrantur. Vide exempla  
apud *Cornarium* ad lib. 1. *Discoz. Schenkium* lib. 1. *Ob-*  
*servat. 5. Paræm* lib. 9. *Chirurg. c. 19.* Quomodo sit tra-  
ctandus, *Hildanus* cenit. *Observ. 13.* Sed curationem  
reddidit difficilem si insigni cranij vulnere læsa sit mè-  
brana cerebri, vel ipsum cerebrum. Anno 1649. Puella  
4-annorum vulnerata, ingenti in capite vulnere pro-  
strata, cū insigni cranij contusione & fractura, patente

cerebro, curatur à Chirurgo perito, Exactis sex heb-  
domadis labia vulneris livida apparuerunt, fugi-  
que protuberabant nigricantes, cerebri in formam anfractu-  
osius: periculū abesse Chirurgus opinabatur. Ego ve-  
ro sphacellatā partē videns male ominabar: Fungorū  
frustula sine dolore rescissa, sed paucis interjectis die-  
bus vulnerata obiit, *Th. Bartholinus Hyster. c. 1. a. Obs. 57.*

*Conversa in pus cerebri parte* Apoplemat cerebri in-  
signe exemplū existit apud *G. Horstii* *Observ. 19. Obs.*  
*14.* Vere mihi credas, ait *L. Bilgerus* cerebrū aposte-  
matū magnitudine ovi asserini extra calvaria corruptū  
propendebat & fermē inftar fermētābatu retro  
specillo in cerebrū sinistri lateris apostematū intro-  
misi, & sēsum atque sensum cū specillo progredior us-  
que quo posticā capitis partē pertingo, ægro interim  
negante quicquam se sentire: Decē vero diebus elap-  
sis, supervenientibus ingentibus cōvulsionibus, jux-  
ta meam prognosin, vitam cū morte cōmixxit: præ-  
dictus tamen patiens, omnibus sensibus integris, quod  
mirum, ratiocinio, memoria, &c. utebatur.

*Vitium jacturam, &c.* J Confinere scilicet quandū  
corpus callosum & cerebrū medullarū intacta fue-  
re, vitio intra corticalem cerebri partem coëxi-  
cito.

§. 2. In Nofocomio Paravino 1645. caput aperuimus viri in osse temporum vulnere, qui x. die decessit; vulnus ad cerebrum penetraverat, ubi apostema excitatum pure copioso abundans *Th. Bartholinus cent. 2. hist. 34.*

§. 3. Rusticus phalange in palpebram superiorem oculi sinistri vulnere, & die 9. obijt: Interius orbita oculi in superiore parte punctum ita lesa conspiciebatur, ut una etiam ossiculum in duram meningem imprimeretur. In cerebro tantus abscessus purulentus larchat, ut superior cerebri substantia omnino in pus conversa videretur. *Vide tit. de Soporis effectibus l. 1.*

§. 4. Curatorem fuisse Polonum, cui cum instrumento isto bellico acuro, quod Poloni Schikan vocant, frontis ossi supra oculum sinistram, grave vulnus inflictum cum cranij fractura, ut ipsa cerebri substantia egrederetur.

Cum die 14. obijisset, aperto capite inveni non solum fracturam in cranio, sed & fissuram in dura matre, non aliter ac si tennis pilas fuisset superinductus, per quam substantia cerebri videtur fuisse egressa. Dum abdomen fuit incisum, in Hepate apostema insigne maximi fectoris inveni: Er hoc observandum quod octiduo ante obitum ex vulneribus nullum pus amplius egressum sit, sed plane evanuerit. Pariter Parvus & Pigra attestantur ex cap. vulneribus non solum in Hepar transire apostemata, sed & ventriculum, intestina & mesenterium, consentientibus Pecqueto, Barberte & alijs. *Ph. Jac. Sochs in miscell. cur. anni 1671. Observat. 119. Ex commun. Anton. Stalender. Chirurgi Thorunensis.*

§. 5. Sicuti inter cranium ac duram membranam nasci vomicam comperimus, ita quandoque inter duas meningis, duram ac tenuem, idem finit interdum vero intra ipsam quoque cerebri substantiam: Nob. in confilio duo periculosissima vulnera accepit: utrumque in sinistra capitis parte, unum in fronte, gladio caesum adactum: alterum in averfa capitis parte, in declivitate ossis bregmatis, globulo plumbeo illatum, non in directum emissio, sed qui inflexum leviter in dexteram caput in transitu destrinxerat, &c. Cum utrumque vulnus per se consolidatum esset, jamque zgor certo gressu ad sanitatem vadere videretur, praeter expectatum extinguitur est, exacta 4. septimana ex qua vulnera illa acceperat.

Dura meninx, quae terebrato cranio subjacebat, & aliquanto longius circumcirca, repente in sphacelo corrupta, nigricabat penitus, cum omni antea tempore, & paucis adhuc ante mortem horis colorem, omnemque constitutionem naturalem integram retinuisset: Apertum caput exhibuit illam ossis frontis fracturam, quae licet profunda, atque ad superficiem internam penetrans, & digitos aliquot transversos longa, toto illo quatuor septimanarum spatio nunquam ullo pravo symptomate molesta fuerat, aut vicini vulneris consolidationem praepediverat: Quam autem ablata in orbem superiore cranij parte usque ad aures, & detracta quoque dura meninge eximendo cerebro intenti essemus, profluxit subito per aurem dextram magna sanguinis vis, non minus unius octo aut decem, quantum conjectura aestimare licebat, à naturali statu penitus demorati, non crassi aut grumosi, sed liquidioris etiam quam par erat ac summe atrii: Attente indaganti unde is prodijisset, deprehensum est vomicam in contigua cerebri parte, intraque ejus substantiam lauisse, cujus tunica à Chirurgo disrupta fuerat, dum manum inter residuam cranij portionem ac cerebri corpus adigens digitos longius introsum usque ad latus impellit: Toto tempore quod vulneribus supervixerat zgor, conquestus fuerat de ingenti ac valde cruciabili dolore in isto capitis latere, non fixo una semper in sede, sed qui vicissim modo in fronte paulo super supercilium, modo in supercilio affigeret.

**A**pparet Vomica istam habuisse originem ex sanguine effuso è vena disrupta ex repercussu istius, quo diversum occipitis latus à globulo plumbeo lesum fuerat: Cujusmodi repercussiones in capitis ictibus ac vulneribus satis esse familiares notum est: Quod vero sanguis, eo quem diximus modo, corruptus nec in pus excoctus fuerat, ejus rei causa adscribenda est calor in capite debilitari, quod valde infractum fuisse ipsis primum vulneribus, jactuque sanguinis ex ijs profusi, deinde cranij terebatione ac cruciatibus istam curarionem comitantibus notum est *Arnoldus Boonius de effectibus Omiffa. 63.*

## APPENDIX.

*Qua via in vulneribus capitis sanguis in auditorium meum feratur & per aures erumpat.*

**P**rofluit subito per aurem dextram magna sanguinis, &c. Cum nuper in medicorum coetui hanc questionem moverem, Quare ossa quae musculis temporalibus subjacent, per cranio, uti alia ossa non sint testata atque investita, risu fui exceptus: Verum cum mihi sexto Januario 1656. ab Ampli. Senatu hujus urbis esset demandatum aperire cranium cadaveris Fabri murarii, tunc temporis mea opinio, qua hactenus fueram gravidus, satis superque confirmata est. Nam quamprimum insignem in superiori parte cranij depressionem observaveram, simul etiam magnam concreti sanguinis massam laveni, qui partim per aures effluxerat, & partim meum auditorium obsederat: Deinde vehementi desiderio viam cognoscendi tenebar per quam

quam sanguis in meatum auditorium descenderat; Hanc cum accuratè investigabam, simul etiam rationem & causam detexi, quare pericranium hoc loco musculos temporales tegat, minime vero os ipsi subiectum: Primo sententiam & responsionem quam *Clar. Tulpius* ad questionem proposuitam, Unde scilicet hic esset sanguis qui sæpissime in vulneribus capitis per aures effluit, veram & opportunam inveni, nam expertus sum sanguinem à superiori capitis parte inter cranium & pericranium descendisse, atque ita spatium quod est intra os parietale & petrosam intrasse, inde vero tanquam per cribrum in meatum auditorium ulterius transcoitum esse: Deinde in hac demonstratione os petrosam magna distantia ab offe parietali remotum inveni, adeo ut eo loco ubi ossa à se invicem recesserant, motus notaretur, incipiens ab offe petroso & in parietale deficiens, ubi tum in offe jugali dentata quædam symphysis ab interiori parte callo obstita (utiliquet in omni articulatione) illiusionem impediens conspicitur: Ex his concludi potest quod Pericranium, si os muscularibus temporalibus subiectum investigasset, sine ulla dubitatione tum etiam se inter os petrosam demisisset, verum ex ejus motu & illiusionem in masticando, loquendo, & alia quavis motione semper intolerabilem dolorem perceperisset. *Paulus Barbetæ Anat. Practica lib. 2. cap. 1. Ex communic. Jobi Mekerens Chirurgi Amstelodamensis.*

§. 6. XVI. April. 1676. in puero x. annorum, ex fractura cranij defuncto, ubi calvarie partem superiorem debite abstulimus, inveniebamus ad duram meningem, eo loco ubi fractura se exhibebat, & trepano apertio facta, purulentæ materię notabilem quantitatem: meningem hæc à cranio separaverat, arcte adeo eidem adhærens, ut nullo instrumento separari posset, imo ipsam meningem suppuratam hic reperiebamus, Nec flos meningis pus hic exhibebat, etiam sub ea cerebrum se offerebat magna satis parte purulentum, Imo & sinus longitudinalis non exiguam puris quantitatem continebat: In latere opposito, in quo integrum cranium, gravis notabatur cerebri inflammatio cum vasorum insigni amplitudine: Repleta hæc sanguine concreto summe nigricante; eodem etiam repletus sinus longus, à quo similiter ac ramis omnibus, per tenuem meningem cerebriq; anfractus distributis, materia quædam lenta alba, similis Polypo cordis dicto, continebatur: Ventriculi cerebri aqua in totum repleti tenui satialiæ nullo colore saporeve gaudens, Pectus repletum aqua purulenta, qualem jam per aliquot annos expectoraverat; Imo pulmo uterque ea parte quæ dorso vicina, fere consumptus. *Gerardus Blasius observ. Med. xvij.*

§. 7. Nobilis Virgo febre continua correpta est, cui successit delirium, media nocte custodibus obdormientibus è lecto surrexit, cubiculo exiit, aut è fenestra cecedit, aut ad mensam offendit: Attonita ex ictu casuque facta est, vomuit, nihil in cute apparebat, sex horis post interijt.

Ossa bregmatis effracta erant & intro derrosa, reliquum os ad suturam lambdoidem fissum erat: musculus temporalis plane contusus: Fundum ventriculi deprehendimus subrubrum & maculis rubris perspersum, ac si ictu aliquem vimque passus fuisset; Admirationi id fuit: At credo à casu id fuisse. *Ballonius Histor. 4. Tom. 2. consil.*

§. 8. Puero ex alto baculus in fissuram capitis partem perpendiculariter decidit, unde fractum cranium: Successit convulsio, paralyfis, mors die xv. exhausto ad corpus callosum usque cerebro *Vide lib. 1. tit. de Paralyfi.*

**A**D corpus callosum usque ] Cerebri duplex substantia est corticalis & medullaris; quarum illa, docente *Willis Anat.* cerebri cap. 10 spirituum animalium productioni: hæc eorumdem dispensationi inservit: atque hanc spirituum emporium potius quam officinam esse inde probat, quia animalia quæ memoria, imaginatione & appetitu excellunt, cerebri medulla ampliori instruntur, prout observare est in homine & quadrupedibus perfectionibus: at quæ facultatibus istis parum polleere videntur, ut quadrupedes minores, item volucres & pisces, his Cerebri cortex uberior, sed pars medullaris minima exilit: Experimentum inter pueros familiare est gallinæ ca-

put ac transfigere, interim illa, cujus cerebri moles transfigitur, aliquandiu vivat valeatque: cujus tactio est, quod ejusmodi animalibus fere tota cerebri compages sit mere corticalis, quare à tali noxa illata, (quandiu medulla immota persistit spiritus in minori copia generantur, aut eorum commercia ad vitam necessaria haud ideo statim interrumpuntur: Hinc vero simile miranda quædam vulnera capitis, cum evidenti cerebri læsione, cujus etiamnum particula vita superstitie deinceps sunt, non lethalia fuisset, quod cortice tenus offensum fuerit, illaesa medullari substantia; quam ubi vitium attingit, satis concedendum fuit.

§. 9. Anno 1663 Decembris 23. Nobilis quidam à rustico fuisse in vertice percussus fuit, ictu tam vehementi ut protinus in terram tanquam apoplecticus corruerit: ac cranij fragmenta quædam in terram discissa sint, quædam in cerebrum intrusa apparuerint: Statim obligarum vulnus, necessariaque medicamenta adhibita, sed neque loquela neque auditus restituta, nam imob' illis jacuit ad xxx. usque Decembris, qua die circa ix. noctis obiit.

Aperto eranio, reperta est fissura à sinu frontis ad occiput pertingens: fractura in offe frontis, cujus fragmenta quædam per duram & piam matrem cerebri substantiam subierant: Ejus ventriculi & substantia sanguine effuso fetidissimo repleta: *Tulpius responsion. Med. viij.*

§. 10. Insoliti enis rarum vulnus, pugnabant nempe armata manu strenui bini cives anno 1675. 12. Septembris, quorum unus in Orbita alterius nomine *Cynela* oculi internum contusit canthum: eutis, cuius palmaris extremitas Phlebotomum crassitie non excedebat: Instructo vulnere statim vertiginosus varios volvitur in gyros, tandemque concidit: hinc ducitur ad Chirurgum, qui artotitus haret, parvam dum adeo cernit continui solutionem, interea vuln. ratum audit semi delirantem: explorat hic, sed frustra, stylo penetrationem ingressum enim negabat vulnus ob parvitatem: inde exequitur, quæ prima vice exigunt vulnera, spectatorem se præbens, quid inde sequuturū foret. Interea cum miser omnino in Nosophonium transfertur, ibique diligenti cura phlebotomias varie iterat, dum immani fremebat delirio convulsivisque torquebatur motibus, tandem decimo quarto die horrida rigidus convulsione Morti succubuit.

Adaveris, dissectioni me invitavit Anatomicus noster *Dominicus le Roy*, presentibus pariter Chirurgis qui Curatori præfuit. *Dominico* scilicet *Paschiali* & *Ioanne Curro*: vulnus ergo i. observamus progressum, Phlebotomatum extrinsecè apparebat prope oculum: Interne verò oculis abrasus, & ob humoris affluxum in tumorem elevatus, perforata postmodum, interna Orbitæ parte sub processibus mammillaribus in corpus striatum itissime penetravit, & quod notandum, ne guttulam quidem sanguinis extravasati ibi vidimus, nihilque aliud præter naturale, sed ex simplici solutione continui perijsse fatendum.

Ex hac historia clarè patet, quidquid probabili conjectura docuerat Villissius in sua incomparabili Cerebri Anatomie profecto simplex continui solutio in cerebro, dummodo in callosum non pertingit corpus, necessario non interficit: docent hoc Historiæ à *Clarissimo Wepfero* Exercit. de loco. Afferit in Apop. p. 224. citato, de milite quem recenset *Valeriola*, affecto vulnere per utraque tempora penetrante ex globulo xnei tormenti integre sanato, nisi quod cæcus & surdaster evaserit cæcum crederem, quia sub rubro longitudinali, & supra nervos opticos falsæ cerebri ex necessitate vulnerata fuisset, qui in consolidatione debet abbreviari, & cum dura meninx cranio artè: alligetur, per consequens se abbreviando juxta latitudinem, falsæ nequit tecum duram materem trahere, sed potius corpus callosum cum anoeatur in aliqualem rapier ascensum, ex quo nervi optici fortasse loco dimoti fuerint, & hinc cæcitas: surdaster verò, quia ex fractura temporum ossis, sanguis per squamosam illius futuram descenderit, suaque mora interna auditus organa alteraverit: Sanus denique evasit, quia per cortices tantum cerebri ambages vulnus penetravit, nullamque callosi corporis, aut medullæ oblongatæ partem leserat: ita dicendum de strenuo Polono reum gerente per medium capitis ex utraque parte infixum.

Interea si anfractum cerebri simplex continui solutio, dummodo sine affluxu sit humoris, ex se non est lethalis, non ita tamen in Corpore calloso, medulla oblongata, aut cerebello, in quibus inevitabilis mors: pari non tamen modo, nam secto in vivo animali cerebro, cordis non tollitur motus, aut respiratio, si verò cerebellum attingeris, statim vitales cessant motus juxta *Willisii*. De Const. Anim. lib. 4. cap. 1. hypothesis, quod in Regia etiam Academia Gallie felicissimo experimento confirmatum vidit Eruditissimus *Du Hamel*: Nemo ramen ignorat vires, quas in striata retulit corpora *Willisii*: æquidem in illis olfactorij terminantur nervi, optici in thalamos in quibus fibras illic emittunt, medulla oblongata fibrillis pariter in illa desinet, unde impressiones omnes quæ a sensuum exteriorum Organis ad cerebrum perveniunt, necesse est striata corpora penetrare, & si de-

nique nervorum Origines eo definunt, centrum erit omnium impressionum, sensorium commune, in quo sensus viget interior & Regia animæ: Hinc est quod læso ex simplici vulnere striato Corpore, quamvis sine humoris affluxu, statim concidit corpus, hinc delirium, convulsio, & denique mors.

Primo itaque ex instructo vulnere sequuta statim fuit Vertigo, ex qua Corporis prolapsus, quocumque recessu nonnullis in striato corpore fibris, spiritus in illis contenti non ordinario influxu Medullam oblongatam irradiabat, sed dispersi per cerebrum undequaque circumvolvebantur, & hinc vertigo, spiritus autem ita circumvolventes influxum nervis suspendebant, unde corpus necessario concidit.

Secundo, delirium non tam à natura spiritum ducitur, sed etiam à motu, dum in confusionem agitari, huc & illuc sine lege tumultuose feratur, unde ex recisis nonnullis fibris in corpore striato, spiritus per cerebrum tumultuantur, Dextro striato corpori sano cogitationes varias, & putativas cient, ex quibus delirium: cum autem sine lege per cerebrum agitur spiritus, inordinatè pariter in nervos irruunt, & sic convulsivi oriuntur motus, & sic læso corpore striato per consequens etiam commune sensorium nec integras recipiet species, nec voluntarios efficit motus, commerciumque omne cum cerebello intercipietur.

At si ex instructo tantum striato Corpore sequitur hemiplegia, cur ergo ex recisis hæc sequuta non fuerit potius quam convulsio, & si convulsio, cur universalis, dum sanum dextrum erat striatum Corpus, & reliquæ partes? Ad hæc responderem quod paralysis contingit, cum spirituum per nervos deficit influxus, culpa viatum vel spirituum, æquidem recisis in sinistro corpore striato fibris, certe non omnibus: quia parvum erat vulnus, ordinariæ phlebotomiz similitudinem, per consequens spirituum non totalis intercipiebatur in nervos influxus in parte sinistra, nihil autem omnino in dextra: Vltimus nervorum in voluntario motu terminari, non omnes in striatis Corporibus æquidem in tota medulla oblongata radicantur, fibræque striatorum Corporum ad commercium interviunt, quatenus sensuum organis, medullæ oblongatæ, & per hanc cerebello se insinuant, unde læsis nonnullis in striato Corpore fibris continget tantum falsa objectorum representatio non verò intercipietur totalis spirituum influxus, influxus tamen spirituum à falsa imaginatione promotus, ob male representata objecta erit inordinatus, ideoque ex delirio convulsivi motus: dummodo autem aliqualis è corpore striato in medullam oblongatam permaneat influxus, ab illa postea in omnes continuabuntur nervos qua propter convulsivi potius moras, quam paralysis sequenti fuerit.

Cur verò motus convulsivi in parte tantum sinistra non contingerint, eo modo quo fit hemiplegia, ratio

ratio est, quia inordinatus spirituum in nervos influens non tam tumultuatur in parte sinistra, sed etiam in dextra, quatenus sana. Etenim spirituum agitatio per totum cerebrum delirium progignens, inordinare potest dextra striato Corpori sano & nihil efficiat cogitationes, quamobrem non mirum, si etiam ab illo

spiritus tumultuari & irregulariter nervos irradiant, unde convulsivi Motus.

*Observatio communicata ab Excellentiss. do. Baptista Fantano, Sereniss. Principis Pedemonti, &c. Medico.*

## OBSERVATIO VI.

*Valens Exiguum Frontis lethale, ob rimulam in osse & sequentem cerebri phlegmonem. 1. Ob pus inter cranium & duram meningem, Et os corruptum. 2. Leve, jam trimestri consolidatum, lethale ob pus supra membranas & cerebrum effusum. 3. Frontis exiguum leth. ob puncturam utriusque meningis & cerebri sequentem abscessum. 4. Ob vitium meningibus & cerebro communicatum, nigredine se prodens. 5. Ob sequentem abscessum infra substantiam cerebri. 6. Sinistri bregmatis, ob pus intra cranium & membranam subsistens, ac cerebri ea parte consumptionem. 7. Neglectum lethale ob sequentem meningum phlegmonem, illeso cranio 8.*

§. 1. **M**Emini olim dum Avenione Medicinam facitarem, casum accidisse huiusmodi, ut non satis perspecta Rima, mulieri cuidam secundum frontem vulneratæ, mortis causam attulerit: Ad cauponam cum multi insolentes impurique homines accederent, ubi semper implebant, nusus assidentium probe potus & hospitæ cum propinasset, illaque tenuisset, gestans manu vitreum poculum joco vitum in illam cum projicere vellet, una & poculum vino plenum projecit, vulneratque exiguo ac plane contemnendo vulnere mulieris frontem: Accitus Chirurgus linimenta admoveat, nullus capitis dolor, nulla verenda symptomata nec primo nec altero die insequuta sunt: tertio dolor gravis, febris, totius faciei ingens tumor, rubori & inflammationi conjunctus: mox delirium & convulsio quædam, interceptaque quasi vox: Apertum vulnus, adhibiti que multi Medici & Chirurghi, magnitudine casus Inopinati acciti, rimula vix conspicua apparebat, quinto die mors.

Dilectum cadaveris caput Patris urbane iussu, ingens phlegmone intra calvariam inventa; dura meningis tumens, dura, livore affecta, & ingenti puris copia suffusa: erat autem intra puris congesti copia, ut librarum fere duarum pondus æquaret: Hic eventus miserrimus fuit, illud ut verum esse fateamur quod notavit Paulus, Rimam in capite mortis nunquam causam extitisse. *Valleriola lib. v. append. locor. comm.*

**R**imula vix conspicua ] Cujus ratione abstractione uten ut fuit, quo ejus propterea animadvertent: Notat vero Marchetti Observat. Med. Chirurg. xv. Non solum totam abradendam rimam, aut eadem instrumenti ad fundum usque, verum si alterutrum descenderit usque ad medullam, non nullo deventum esse ad tetichationem, nullo licet alio presente

symptomate, hac ratione, quia materia purulenta ex labiis vulneris ad medullam delinens, per ejus vasa ad membranam etiam penetrat; inter quam & cratulum congesta, pariter in eam infert: quod in pleurisque observavit, qui propterea administrata perforatione omnes convalescunt.

§. 2. Adolescens fuisse lignea è salice, levi quidem illa sed ex alto demissa, accepto contempribili vulnere in capite, xi. die moritur: Quæ parte telum impactum fuerat, Os livens apparuit: E regione partis vulneratæ, inter cranium & duram meningem, pus inventum est &c. *Vide tit. de Paralyssi lib. I.*

§. 3. Alium vidi leviter vulneratum media capitis parte, non detecto osse, & nullo apparente symptomate, qui à Chirurgis sanatus, tribus post mensibus, quibus incolumis semper vixit, correptus fuit febre maligna, sine ullo symptomate vulneris capitis: Post septimam dolor capitis subortus loco vulneris insidit: rribus ante mensibus, in quo jam ad cicatricem deducto nihil apparuit, ægro xiv. mortuo.

Secunda calvaria modo jam dicto, pus supra membranas & cerebrum deprehendi: ut propterea vulgi opinionioni credendum non sit, post xi. diem capite vulneratos ratione vulneris mori non posse. *Marchetti Observat. p. 39.*

§. 4. Anno 1602. 13. Martij, Caroli Cornicij Studiosi caput aperuimus, qui punctum ense tenuissimo, in dextra frontis parte, qua capillitium attingit, ante xvi. dies notu ictus fuerat: Vulnus angustum erat admodum, ut communis pisci quantitatem non admitteret: Calvaria cum utraque meninge perforata in Cerebrum alre penetratar, abscessumque fecerat, in quo puris albi uncie fere tres latebant: Abscessus labia rubescebant, venæ in tenui membrana sanguinis ruborem nigricantem præ se ferebant: Undecimo vulneris die cum Epilepsia febricitabat, inde per duos dies naturalis totos cum quadrante mediocriter habebat: T. n. dem xiv. morbi die paroxysmo febrili (mitior tamen quam priori) reverso moritur. *H. Sennæ miscellaneor. lib. x. pag. 578.*

§. 5. Periculum maximopere in capitis vulneribus apparet, in quibus facillime & levissima negotio mors subsequitur, propter facilitatem inflammationis pericranij & pericranij, ex quibus oritur inflammatio membranarum ipsius cerebri, quo facto crebro mors imminet. Quare consulit Hippocr. l. de vulneribus imperans vulnera capitis, etiam levia, non esse contemnenda, experientia edoctus mortem facillime hujusmodi vulnera comitem habere, ut pluries expressi sumus, & praecipue in quodam Coquo, qui cum à puero vulnus levissimum & nullius fere momenti receperat, septima die convulsus obiit.

Referato capite, è directo vulneris paucam nigredinem, penetrantem duram & piam meningem vidimus usque ad corpus callosum. Dom. p. anarolus Pentec. iij. Obs. xxxvij. p. 39.

§. 6. Quendam vidi leviter sociatum summo vertice, in quo exiguum abscessum infra substantiam cerebri prope nervorum exortum reperi: Is avellanæ nucis molem vix æquabat: Semestre post infictum vulnus obiit, ægro valetudinem obtinere nusquam concessam. Hinc discit temerariam esse non debere vulnere cerebri prognosin. Pet. Pigray Chirurgia lib. 4. cap. 9.

**T**emerariam prognosin ] In capitis vulneribus admodum cautum esse docet Medicum, ob varietatem supervenientium symptomatum, quibus obviam eundem: Observatum quousdam temporibus omnia prope vulnera, parva æque ac magna, lethalia fuisse, ob æris peculiariter constitutionem, cognitioni nostræ imperviam: Annus quidam à me adnotatus, in quo capitis omnibus vulneribus prope superveiebat gan-

gitena, ea ambiens duorum aut trium digitorum latitudine, quibus accedebat exigua febris, quæquam pauci interirent: Plurima alia vidi nullis manifestis stipata symptomatis, quæ tamen mors fere sequebatur, quæquam levia essent, si præsertim febris tertio ab ictu die invaderet: In omnibus tamen quibus lethalia fuere, repertus in substantia Jecoris abscessus. Idem.

§. 7. A lolescens anaorum xvij. in sinistro bregmate parvo lapillo à puerulo vulnus recepit: Hic Chirurgus statim se concedidit, qui ineptissima gravique manu, ac linteis asperis sic crudeliter vulnus exiguum ac tantum cutaneum tractabat, ut in dies id magis excoresceret & carnem sanam consumeret, Puer autem in reliquis omnibus se bene gerebat & hero suo inserviebat: Circa 18. diem ab accepto vulnere, se ad me contulit pariens, ut iustrarem quomodo se resgeret, huic cutis circumquaque ad cranium usque sinuosa erat, & sinu quidem vasto, in quo pus multum contriebat, ex carne ipsa collinescente & humore qui eo ferebatur putrescente, quod pus tantum exire poterat cum manu premebatur: hoc ipse videas cavitatem hanc ad inferiorem partem aperiendam esse monui, quo putredo & ipse calor extraneus cerebrum suppositum non afficeret: Id se facturum pollicetur est vulnerarius, nullam enim eo tempore sedem habebamus permanentem, sed cum exereitu Regio ulro citroque ferebatur: Circa diem 24. accitus ad eum me contuli: febricabat hic jam à quattriduo febre assidua, graviter oculos aperiebat, soporofus, oculis tumidis & viribus propemodum dejectis, urinx sanæ: Sinus autem adhæc integer erat scitidoque pure refertus, quod ignarus ille nihil earum quæ jusseram præstitisset: Hæc omnia cum viderem, non dubitavi cerebrum affectionem jam conlasse ex vicina putredine, unde illico cutis & ossis perforationem adendum esse persuadebam: At stupidus ille cum audisset os perforandum esse, Nisi febris esset, inquit, vulnus facile curam susceperet: xxvj. expiravit.

Iussi Calvariam cadaveris aperiri, Annuit vulnerarius, fretus mortem contigisse febris injuria, non capitis affectu, cum sciret os à vulnere ne minimum fuisse offensum: Os quidem integrum omnique iaiuræ expertum movit, invenit tamen non parvam puris copiam inter cranium & membranam, quam ex supernis partibus stillasse non poterat non censere, vidit & cerebrum totum ea parte liquatum & in pus versum: quod nullam aliam ob causam factum fuisse putare debebat quam servicosa lethaliq; sua: Botallus de vulneribus scilicet. cap. 18. §. 29.

§. 8. Virgo Nob. cum in choreis inessuisset, & capite in postem incidisset, vulnusculum in vertice contrahit, ubi cutis vix læsa fuit: Illa quia neque dolorem neque inflammationem se attiebat, primo & secundo die vulnus, aut potius contusionem, plaae neglexit: Tertio die incepit parum dolere, quare Barbitonforem accersivit, qui rasis erigibus cutem vix læsam animadvertens, Virginem irridebat, quarto vero capitis gravitate & febricula correpta est: Ego sexto die morbi ad ipsam vocatus, comperi ipsam delirantem, faciem & oculos inflammatos, & linguam aridam, ita ut sequenti die de vira discesserit.

Aperito capite sanguinem sub cranio collectum, & cerebri membranas inflammatione correptas invenimus, craniem tamen nequaquam læsum fuit. Fabricius Hildanus cent. 1. Obs. servat. 21.

**V**ulnusculum in vertice, &c. ] Hinc perspicuum fit vulnera capitis quantumvis minima, præcipue quæ circa suturas occurrunt, non esse negligenda: Infinitum enim sanuli venarum & arteriarum, ex una & altera parte membranarum cerebri, circa suturas

concurrunt & futuris inseruntur quorum beneficio cerebrum crasio alligatur & suspenditur: Quapropter contusiones ea in parte facile ad cerebri membranas magno cum ægri periculo extenduntur. Hildanus ibidem.

*Barbierus* enim vix *lesam animadvertens*, &c. familiaris saepe error vulgaribus Chirurgis, qui si nec mori nec insignem lationem animadvertunt, secum esse agros jubent ac si nihil fuisse subsequi possit. Insigni exemplum vidi Genevæ anno 1667. mense Julio: Juvenis, nomine Varinus, & causam forentium promotor, dum in caupona combibentem blasphemis in Deum insurgentem incepat, ab eo poculo summo in sincipiti percussus: levis inde curis laetior Chirurgo se committit, qui sex dierum spatio cicatricem iniecit, inspicere tamen capitis gravitate quam nobilis æger neglexit; post trimesse insignes dolores ventris succedunt comite diarrhoea ab illa: postea febri intensa accidit cur delirio, intra verba subsistente, comate, vultu rubore, oculis flammeis: per octidies cruorem maculosum, aut pituita perfusum, copio-

ssimum ore & naribus effudit centesimo die ab ista accepto obijt: Judicium meum fuit & Clarissim. Medici Senioris Dom. le Clerc, hæc omnia ab intempestive occluso & negligentis tractato vulnere contingisse, quod capitis apertio demonstrasset si nobis ejus referendi copia facta fuisset.

*Febricula* Cur præsentè inflammatione membrarum cerebri febricula tantum orta est, quæ acuta fere esse solet. Die febrim hanc fuisse symptoma, cujus focus procul à corde distans erat ut sola fuligo ad cor permearet, putredine in venas non diffusa: Quando ejusmodi in calibus acuta succedit febris, tunc contingit cum essentialis jungitur putrida, humatis portione ad partem dolore affectam & debilem excussa.

## OBSERVATIO VII.

*Capitis vulnus lethale ob cranij particulam in ambas meninges defixam, hinc subortum Apoplema.*

1. *Bregmatis sinistri, cum Confusione dextræ partis cranij, cujus frægmentum membrana penetrabat.*

§. 1. **R**uricola quidam mediocriis stiracis annor. circiter 33. cum arborem altioreni cerasa decerpendi gratia ascendisset, ex improvviso de cæumine in lapidum acervum, ad radicem arboris collectum cecidit, atque calvariam, os nimium frontis & temporum ira perfregit, ut ab hac confusione & violenta confusione solutione, meninges, seu utrumque cerebri involucrium, non modo graviter disruptum atque divulsam, sed etiam mediocriis cerebri portiuncula simul elisa fuerit. His ita animadversis, statim vicini Balneatores vocati per tres septimanas fere vulnus obligarunt, donec vulneratus ob paupertatem in Nosodochium Ulmenfè receptus fuit, ubi postea vulneris hujus curatio G. Riedlin demandata fuit, qui summa per quinque septimanas adhibita diligentia effecit ut cerebrum, ea quidem parte qua propriis nudatum membranis Dei beneficio & naturæ bonitate, nova quadam cuticula membranosa, proveniente à perieratio interiori, non tantum contextum ac consolidatum fuerit, sed & toto illo tempore nullo omnino graviora symptomata animadvertere licuerit: Quia vero locis duobus distinctis atque latentibus, sectione demum patefactis, mediocriis cranij portiunculæ in ambas cerebri meninges adeo fortiter depresso fuere, iisdemque tam arte incubuere, ut ossicula hæc nulla propemodum arte, neque per ullum Chirurgicum instrumentum elevari, atque in pristinam suam stationem seu locum restitui potuerint, tandem sub finem canicularium accidit ut per latentem abscedentes particulas, ex utriusque involucri cerebri compressione dolores, ex doloribus humorum affluxus, & ex humorum putredine tandem apoplema subortum fuerit, quod postea convulsionibus ansam præbuit, quas paulatim mors subsequuta est. Non quidem ex vulnere cerebri per seita lethali, sed ex supervenienti accidente factum fuisse plane existimo, Quod ex dissecta & aperta calva innuitur. *Observatio. Mossi Heldi Medici Ulmenfis, quod Horstium Tom. 2. lib. 2. Observat. vj.*

§. 2. Nobil. Juvenis ætatis annot. 23. temperamento calidus & humidus 27. Julij 1618. nocturno tempore intumultu publico lædebat, ita ut vulnus appareret in regione bregmatis sinistri usque ad os ipsum, quod transversim rimam conspicuam exhibebat, propterea de substantia cerebri portiuncula nucis avellanæ minoris quantitate eximebatur: In altera parte versus posteriora confusio aderat, ossè bregmatis dextro versus interiori compresso: mox à vulnere & confusione, forte simul & semel à diversis adversariis factis, vomitus, ingens hæmorrhagia, diarrhoea & sopor p. n. adfuerunt: 28. Julij, Sopor hic continuabatur, ubi dextræ lateris convulsivus motus interdum, sinistri vero lateris totalis paralysis observabatur: Deligato vulnere sensus aliquis per elmorem apparebat, subinde rursus ingruent somno, quia ratione 29. & 30. Julij fere in eodem statu permansit: At 31. Julij paulo vegetior somno instantibus manus obtulit, & signa intellectus exhibuit, nondum auditu & lingua operante: hic elysere adhibito, ob obstructions à tempore lationis hucusque persistentes, alium laxam reddidimus, unde 1. Aug. loquela primum, absque tamen auditu, quodammodo sequebatur, sed non sine gravibus convulsionibus Epilepticiis interpolatis: At 2. Augusti tam intellectus quam sermonis & auditus operationes exactiores erant, pulsu febrili, quam ob causam mutationem intra 24. horas prædixi lethalem, qua ratione sequenti 3. Aug. ante meridiem, recurrentibus iterum animalis facultatis lationibus, vitam cum morte mutavit.

Demortuo 4. Aug. cranium apertum fuit, ubi vulnus dextræ partis tantum cutaneum usque ad os canij deprehendebatur: 5. Aug. vulnus sinistræ partis tanta erat, ut admiratione



omnino dignum; quod animalis facultatis operatio eoque sese colligere potuerit: tota enim regio bregmatis sinistri contusa deprehendebatur, ut cute remota, sua sponte ossa separarentur, de quibus unum acutius in ipsam substantiam cerebri, per utramque meningem impressum iuveniebatur: Ab hac contusione rima sub vulnere praedicto suam originem habebat, & ad aures usque os petrosum in latere sinistro progrediebatur. *Greg. Horst.*

*Tom. 2. lib. 2. Observat.*

**D**exteri lateris convulsus motus. Sinistri ipsius paralyticus. ] Quidam, ut *Cassius & Arctem*, ita traxerunt nervos in exorta suo ita implicari, ut dexteri sinistrorum, & contra sinistri dextrorum partes perirent, seque mutuo interficerent: Hinc ergo facile respondentur dextris quomodoque affectis, sinistri vel convulsionem vel paralyin patiuntur. (*Qua opinione quoque tunc Professor Marianus comm. in Hippocr.*) Sed optime hac ipsa *anymia* refutantur, quia reclamant observatio Anatomica: Alii non ad nervos, sed ad plexus arteriolarum respiciunt, quos ita quoad dextram & sinistram partem implicari ac divaricari volunt, ut facili negotio possit fieri materiae denegatio vel transmissio: hinc igitur dextra laborante sinistram solvi statunt, propterea quod illi spiritus jam non amplius transmittantur: Sed haec opinio suis tutoribus relinquitur, tum quod vasa arteriarum & venarum, quoad utramque partem non ita inter se implicentur quemadmodum praesupponant, tum etiam quod spiritus animalis, qui sensus & motus auctor est, non per arterias sed per nervos distribuitur. Relinquitur probabilis responsio *Laurentii* lib. 10. q. 6 ubi inquit. Potest et vulnerata parte dextra ischoris portio, & in superiore ventriculi dextrum decumbere; ab eo in sinum tertium, qui communis est cavitatis, eo sinu qui continetur humor vellet in centro est cerebrum, quare si formae elementaris morum sequatur, in declivior partem decumberet sine partis situs declivior esse solet; decumbit enim eger in sanum, non in latus, saucium, doloris meruens? Quid ergo impedit quo minus et tertio sinu in quartum, & ab eo in spinalem medullam, & diverso percussis partibus, interdum decumbere possit humor, unde paralyticus? Affecti potest & alia ratio, quod per vulnus natura excrementitium humorem excernere soleat, tum per fluxum sanguinis, tum per medicamenta, quae trahunt hauriuntque hu-

morem, ita ut bene expargatur pars affecta: at opposita pars quae non expurgatur, facile afficitur, vel per sympathiam, vel materia ad eandem transmissa ac decumbente. *Gul. Ballonius*, libello de convulsionibus, plures recenset causas: Quibusdam, autem, videtur fieri propter spiritus & sanguinis partis sine consumptionem, idque ob inflammationem saucis partibus credibile est partis sine naturam sedulam ac sui diligentem suas copias ac suppeditas ad partem laesam misisse, unde ea pars sine postea paupertate spiritus & sanguinis laborat. Huius rationis auctor aliam & rationem adducit: Aut enim convelli partem sanam, resoluta est, per translationem humoris morbifici a parte laesa in sanam: hic enim humor cum teter sit, in cerebro aut convulsionis aut furoris occasio existit: Si vi naturae in faciem effunditur, erysipelas promoveret, quod solutionis morbi & vitandi periculi causa observatur: Sin pars frustra nititur excutere illam sanam & vires, convulsione frustra tentata; motu convulsivo id excludere ac exigere nititur: Et cum in vanum id fiat, confirmatur natura: ac victa morboque superata procumbit. Aliis aequius esse videtur si ad simplicem sympathiam, quae sine materia sit, saltem analogam confugerint, cum consensus sit dextrarum partium cum sinistri: Verum omnibus diligenter subductis, rationi videtur affinis, ut convulsio partium sanarum ad extremum potius naturae conatum referatur. Est enim pars sine incolumi & a laesione tuar, vi & necessario occumbendum, id quod citra manifesta argumenta reluctantis naturae fieri nequit: Itaque cum capite saucius, particula tantum laesa sit, cetera vero sanus, mirum non est si moribus quibusdam inordinatis natura sese tueri velit adversus instantis mortis & dissolutionis impetum, & quoad ejus fieri potest obstitat. *Videatur d. Ballonii commentarius, ubi fusa ea rationes ad examen revocantur.*

#### Observatio VIII.

*Capitis vulnera sequuta cerebri substantiae & ventriculorum putredo. 1. Temporis dexteri lethale ob faenum Abcessum in cerebri penetralibus. 2. Occipitis, ob Fissuram in interna ossis parte, & sequentium Abcessum. 3. Casus lethalis ob sequentem cerebri suppurationem & ulcus. 4. Pulsus rotundum & angustum juxta suturam sagittalem lethale, ob sequentem putredinem dimidiae partis cerebri &c. 5. Cicatrice jam obductum lethale, ob cerebri partem putrefactam. 6. Lethale ob ingens in cerebro Apoplexia, speciebus curatum. 7. Faciei a sclopeto, insitum leth. ob Lesionem meningum & sinistri cerebelli principii necrosi affligi. 8. Occipitis & verticis illius lethales ob Abcessum in cerebri substantia genitos. 9. Occipitis a sclopeto, ob sanguinem circa basin cerebri effusum, ac cerebelli syderationem. 10.*

**S. 1.** **A** Perui quam plurimorum in capite vulneratorum cerebra, in quibus plusquam cerebri partem dimidiam undique putrefactam, Eiusdem lateris ventriculorum putredine foetido, viridi & crasso refertum, Atque in cerebri substantia apoplexiata putridissima deprehendi. *Coiter libello Observat. Anat. & Chirurgic.*

**S. 2.** Dom. de Villeneuve catapultae ictu circa Tempus dextrum laesus est insigniter: Effractum os partim Temporis dexteri, partim frontis: Oculum tandem pars longo tempore: Cum Londinum venisset, speciem quandam parestes in parte eadem, nimirum in brachio partem visus est: tandem venit Luteriam: sexagesimus aut septuagesimus dies exactus erat, ut plene restitutus & securus videretur: Cum visio Venerique paulum indulgere vellet, dolor in veteris vulneris loca obortus est: Intolerabilis erat, inquit, vigilae, dolor lancinans, seria deliria, intra verba solum: febris assidua, omnibus prolixum remediis, Denuo aperta cicatrix,

trix, nil profectum, dolor mox in parte antiqua se videbat, mox in alteram partem, velut defensorius redibat, comatosus factus, mors.

Aperto cranio, nescio quæ sanies, sed exigua, in parte, in qua dolor fixus videbatur, apparuit: sed in cerebri penetralibus abscessus erat, à quo credibile manasse saniem tam sævi doloris patientem. *Gul. Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. p. 251.*

**C**um veneri indulgere vellet,] Quam noxia sit venas in capitis vulneribus demonstrat *Fabritius Hildanus cent. 1. Observ. 19.* Exemplo Jovenis, qui vulnere afflictus capitis, & pene sanatus, ex venarum intemperantia in febrem lethalem incidit: Non minus periculosam esse vulneratis nervis ostendit idem ibidem observat. 22.

*Speciem quandam Pareseos.*] Hippoc. prognost. est in Coacis *Quibus Tempora secantur, his ex adversa sectionis parte convulsio contingit: facotus coem.* in Coacis duas causas reddit, unam quidem naturalem musculorum motum; alteram evapora-

tionem & saniei in pressione; quæ cerebrum preter spiritus animales dissipat torporemque inducit: principia vero nervorum afficiens: in parte quidem obiecta resolutionem, in ea quæ vero integra est, convulsivos motus excitat: Clariss. *Fabritius Hild. cent. 1. Observ. 3.* Dum oppositus muscular, seu partis sanæ, fungitur officio suo, maxillam ad se trahit, læsus vero, quia interim quiescit, sit ut maxilla versus partem suam non sine maximo dolore & vitæ discrimine trahatur: Interim tamen aliquid putridi vaporis communicari ex convulsione brachij apparet.

§. 3. Miles acinace fauciatus fuit in posteriore capitis parte, cum læsione ossis occipitis: Die xliij. oblit interna ossis fissi superficies corrupta apparuit, Et Abscessus magnus in sinistro cerebri latere latitans. *Vide lib. 1. tit. de Paralyti.*

§. 4. Anno annos xvj. puer Nobilis Herbrorum gentis decem annorum, hyberno tempore cum æqualibus pleno, ut solent, cursu glaciem transmittendo, in caput cecidit, unde paulo post ille *Febri* correptus est, Advocatis Medicis, omnem in curanda hac febre diligentiam, ac frustra impenderunt, xl. die puero satis concedente.

Demortui cranio aperto, ulcus cerebri ovi magnitudinis deprehensum, quo dissecto aqua fetida promanavit. *Observatio Tobie Cnenlini Medici Augstani.*

§. 5. Bononiæ quidam ab equo calce vehementer percussus in capite, juxta suturam sagittalem vulnus accepit rotundum & angustum, ad cranium vix penetrans, Ob percussione vehementiam *præstia*, Chirurgo felicissimo, ossificationis cerebri suspicio oriebatur, quare incisa capitis cute in formam cruci. vel x. literæ, os detexit, quod etiam terebra perforavit ad interiorē fere laminam usque, nam ob sanguinis effluviū profundius penetrare nequivit: 2. die rigor febrilis, quem lequebatur æstus, supervenit: A principio conquestus est de capitis, præcipue de colli intenso dolore lassitudineque brachiorum: Febri quartanæ, qua ante diu laborarat, rigor; brachiorum lassitudo, casui; colli dolor, contorsioni inter cubandum assignatus est: Paucis diebus post facta evacuatione & sanguinis missione, febris omnino remissit, mitiora sunt reudita omnia symptomata, *nonquam tamen vulnus mihi placuit*, erant enim vulneris labra tenuia, squalida, depressa, flaccida & mali coloris, minime (ut in non lethalibus vel non periculosis) subdura & tumida, mediocriter, absque inflammatione tamen, & vividis coloris: xix. die accessit rigor, & cum eo maxima atque violenta inferioris maxillæ concussio, *vomitibus biliosis*, singultus, capitis ingens dolor, inquietudo, delirium, vigiliæ, facultatis ventriculi retentis, imbecillitas & colli rigiditas: Rigor erat frequens, inordinatus, absque calore comitante, ut in quartanæ rigoribus contingit: sequenti die, excepta colli convulsione, inquietudine, maxillæ concussione, omnia symptomata multum remissere, & tandem mortuus est.

Apertum fuit caput, & invenimus putredinem dimidiam cerebri partem occupasse; in ventriculo laterali & medio, qui tertius dicitur, plurimum tum puris tum aquæ sub rubro colore tinctæ vidimus: dura membrana fuit integra, & e regione vulneris aliquo usque libera à cranio, accreverat in illo loco membranæ caro laudata, quæ etiam cranij foramen obturarat, *Coiter. in Observat. Anatom. & Chirurgicis.*

**H**oc idem in multis similibus vulneribus interemptis deprehendi; unde periculosa penes me sunt cranij vulnera, in quibus integræ tunc cerebrum læsum est, vel ubi sub dura membrana læsa vena vel arteria (quod levi de causa contingit) sanguinem effundit, quam si simul membrana sit vulnerata: Si quidem horum plures atque illorum videri curatos, nam membrana dum cerebri ob suam densitatem atque crassiciem, nec sanguinem effundit, nec pus sub ea genitum emittere potest: Hæc de causâ nâi reprehensionem & calamitatem memorem, in gravibus & periculosis capitis vulneribus, ubi vel convulsio capitis, vel rupti vasis sub membrana manifesta haberentur signa, auderem hanc duriâ ce-

rebri membranam percindere: tamen ut in omnium, sic in horum vulnerum curatione, præceptum est perficere ut vulnera optime expurgentur, am omne quod tangitur à putrido putrescit. *Idem ibidem.*

*Vomitibus.*] Vomitus in læsione capitis aliquando argumentum debet esse ad majorem cautionem quam ad concludendum de fracto cranio: Et hoc notandum est, quia multi hæc in se hallucinantur: Sic multis de causis post castum aut istum potest vomitus succedere, & tamen non erit fractura nulla: Servus N. cecidit in caput, vulnus factum, vomitus furis frequens, nil tamen cranium læsum erat, Recens erat cœtus: *Ballonius Epidem. lib. 2. pag. 215.* Contingit vero ejusmodi in casibus vomitus per sympathiam

affecta dura mēinge, quae quavis motu careat, cum plurimis in locis cranio firmetur alligetur, probabile tamen est eandem in partibus quibusdam aliquando saltem contrahi & corrugari: Certe in steruatione contrahi ipsam & remitti extra dubium est: Hinc ab hujus lesione vomitus aut motus convulsivi inviseribus aut membris succedunt, in causi est haec membrana, quae alicubi contracta aut diducta, eodem spatio molem intus contentam implicat: Singulis eidem cause assignandus: Quod & accidit compariēte cerebro ventriculi orificio per

nervos sextae conjugationis.

[*Nunquam vulnus mihi placuit.*] Inter signa quae mortem praesagiant, cum Medicus videt febrem, & aliquod malorum accidentium, cum depressione labiorum vulneris, & nullo colore sine sanie, arguit indubitam mortem: Et si videat denigrationem ossis, quae non remouetur ferro eam fricando, signum est quod non sit ex Medicina, sed arguit saniem malam & corruptam sub cranio, quae si corrupta erit, etiam corrumpit panniculum: Praesentibus ergo praedictis signis praedicetur mors. *Beregarium* 613.

§. 6. Miles hasta laesus in ipsa cerebri substantia, cicatrice obducto vulnere, & eductis quamplurimis ossium fragmentis, septem & ultra septimanas sanis aliis inferviebat ægris: In octava vero convulsus cum moriebarur, causam subitaneæ mortis insuecor, Unam cerebri partem corruptam, putridam (visu admirandum) imo consumptam & in putredinem conversam vidi. *Observatio Samuelis Cosleri Med. Amstelodamensis.*

§. 7. E N. Socio mio Patavino quidam ex vulnere capitis accepto curatus, ut quidem credebatur, cetera salutis fiducia eum exiret, xl. à vulnere die morre inopinata defungitur: Causi exitii cum varianrium opinionibus incerta esset, mox aperto cranio evidentius comparuit, ingenti viso in substantia cerebri Apostemate. *Th. Bartholinus comm. in Padanlouen A. Severini Exercit. 3.*

§. 8. *Claudius Ruban* Moduno Helvetius, ann. 24. habitus carnosus, pagi Regnans in Comitatu Montbelgardensi incola, Sabbathi vespere diei 18. Febr. 1671. statione peracta domum rediturus, itineris non mediocriter fore potum comitem, intra urbis novæ Montbelgardis portas, aliquot passus præcedebat: Expecta me, acclamat sequens, directa (forte jocando) in præeuntem bombardam portatili, vel dispendam: Dictum factum, & dispenda bombardam, quam plurimorum conatus tota die explodere non potuerat, vulneratus *Claudius*, super portæ medice limine consistens, tota mole concidit: Ab occurrentibus & ipso teo erigitur, è diversis in scilicet locis sanguine diffuens, ad Chirurgum ductus: Circa horam 1 pomeridianam à S. P. jussus illum adivi: Vocatus Chirurgus clavum dispendosorum, dimidiam digiti minoris partem longum ostendit, quem à posteriori temporalis musculi dextrilarete, immediete supra os jugale suo apice, (ut in vulnus intrusione ostendebatur) ad ossis maxillæ inferioris apophysin adactum extraxerat: Exponit insuper ferreæ minere globulos octo rotundos, quos è maxillæ sinistræ totidem vulneribus avulserrat: Horum unum infra os jugale penetrabat, alia paulo inferius perspersa erant, digitum transversum plus minusve profunda: Imperitia Chirurgi phlebotomia prætermissa fuerat: quare præmissio clystere e brachio sinistro vena tusa est: Successit brachii sinistra paralysis: circa horam 1. matutinam, quæ diei 5. initium erat, aphonus & vetrenosus factus est, crus sinistrum resolutum, accesserunt sudores copiosissimi, animi deliquia sine febre: hora 11. matutina mortuus est.

Triborio post mortem elapso, examinata octo faciei vulnera panniculum carnosum non perforasse, sed in eo subritisse inventum est: unicum ad os zygoma, aliud paulo inferius pervenerat: Aperto cranio, vulnerarum meninges, & sinistri cerebelli principium nigrum & corruptum apparuerunt, & ex ipsis substantiæ intimis, ossis ex conico aentum cranij forte frustulum extractum est: In profunditate vulneris, ab adacto clavo dispendosorio, aliud ossis fragmentum octava parte majus, ex contracta basi ossis temporum, in musculo massetere invenimus: Quum cranio reposito reductum pericranium & curis consuerentur, vivi lumbrici prægrandes in conspectu nostro naribus egressi sunt, e ventriculo illuc ascendentes, quorum forte insignis copia ibidem stabulabatur. *L. Nic. Binningerus cent. v. Observat. L.*

§. 9. Rusticus cælebs annorum 30. sanus & boni habitus, ebrius à compotatoribus sociis aliquot vulnera in occipite & vertice ad calvariam usque accepit, postquam prius verberibus iidem commilitones atrociter rotum ipsius caput, nucham & sinistram axillam exceperant: Vulneratus prima quidem vespere vulnera Chirurgo liganda commiserat, sequentibus vero diebus, ope nescio quarum herbarum consolidantium, spreto & valedicto Chirurgo, ad cicatricem fore ea perduxerat, cum nona à vulnere die febris & scotomia supervenit, & xiv. sinistri brachii ac cruris resolutio, quibus præsentibus Chirurgum denuo in auxilium & consilium vocat: Chirurgus necessariis adhibitis nihil proficiens, die xxi. rem ad me defert, quæ examinata, & cum Collegis communicata, *Trepantum adhibendum dixi*: Divino igitur auxilio implorato, & cure die eadem per chiasmum secta, die sequenti xxij. cranij perforationem, non obstante Plenilunio, modio *43. 1. 1. 1.* institui, præmissis prius clystere, capitisque convenienti inunctione: Exsecto osse festuæ meningi incumbentes sublatæ sunt, & membrana ipsi melle rosaceum impositum est: Os vero rectum fuit linamentis siccis molissimis cum pulvere cephalico, totoque curationis tempore, tam quoad externa quam interna, nil

intermissum fuit quod ipsa fractura cranij alias requirit: Septima die lethargico sopore captus, dextri oculi & oris oclusionem crebrasque vomitiones patiebatur, sequentibus vero melius habuit, emanante per foramen pure fetido, paulillo tamen ac nona quidem pedem movere cepit, recurrenre tamen die 14. sopore, emanantibus autem vomitibus, venis vero frontis arteriisque claris ac turgentibus: xv. nulla nec ad melius nec ad pejus mutatio sequuta: xvj. verò & sequentibus scotomia major facta, accedentibus oculorum convulsionibus & distortionibus, adeo ut 24. hora 4. pomeridiana, sine tamen accessione aliorum symptomatum, animam exhalavit.

Sectione post mortem instituta, sanies inventa est purulenta in ipsa cerebri substantia; In dextra occipitis parte, pellicula instar abscessus contenta, unciarum quatuor: Ipsum cranium plurimis contusionibus contortum, Matris vero duræ venulæ subfusco sanguine instar picis distentæ: hæcque ipsa & pia meninx discoloræ, illæque à contusionibus læsæ, erant: Sincl aurem supradictæ globulus alius purulentus, vasculo catneo inclusus, proxime adhærebat, ut mirum non sit quod mortuus fuerit: mirum autem sit quod tamdiu sine gravibus symptomatibus, delirio potissimum, supervixerit. *I. D. Horstius observat. Anatom. 1.*

**T** Repentem adhibendam dext.) De Trepano tantum dubitant multi an tunc adhibeatur, sed & sunt qui omnino id rejiciant, dum statuunt quamvis cranij fracturam sine Trepano, sine cranij aperture curari posse: non diffinitor abique cranij perforatione multas fracturas cranij, præsertim hybernæ tempore, & apud Germanos, quibus non ita lethales ut Neapolitanis, Florentinis &c. accidunt, curari posse: At non omnes nec semper, uti alias statuit antiqui Hebræi, *Ugo Lincanus*, *Theodoricus* alique, quorum alij internis vulneribus potionibus id fieri posse præsentur; alij vero extrinseca medicamenta commendant, ipseio & rejecto Trepano: At sepe in cranij fracturis non potest removeri materia exsiccanda ( loquitur verbis Galeni ) nisi fiat apertura, ob defectum scilicet ligaturarum, præsertim si *pyxis* occidat intertæ laminæ salva manente externa, aut *εὐρυπύξ*, quam obrem tunc Chirurgus adhibendus, ossisque particula circa fissuras eximenda, ut virus egrediatur per viam liberam, osse scilicet amoto. Multæ igitur fracturæ cranij curari possunt, & sepe sine apertura, si simplex *φάεσις* contingat, si *pyxis* tanta sit ut materia exire possit: Sed non omnes, ut notavi jam antea, nec semper, quemadmodum D. Juris apud nos nullis medicamentis externis aut internis menti & sanitati restitui potuit, qui tamen Trepano adhibito salvus ev. sit: uti etiam Nobilem ansextennium Giffæ feliciter à me curatum recorder. Quando vero adhibendum, quando rejiciendum? Si certò coexistat cranium non depressum, nec ita fractum esse ut cerebrum inde ledatur, sique sanies tam exigua quantitas sit, tantumque naturæ dobeat ut medicamentis absorbi & dissipari facile possit, & contrarij certa symptomata desint, Trepano non opus est: Sepe enim à contusione cranium ipsam non læditur, sed nervus, quem casum proponit Hippocr. 38. aph. 5.) aut vena, à qua effusus sanguis in ipsa cerebri substantia putrescit sepe & mortem inferit, uti nostro ægro accidit: Aliquando evenit (inquit Celsus) ut os quidem (scilicet integrum maneat, sicut vero ex ista aliqua vena rupta aliquid sanguinis mittat, qui concoctus dolores inferit oculis, quæ obsecrat: quo in casu summe conducit phlebotomia & clysterum usus: sepe etiam interna purgantia exhibentur si temperamentum frigidum sit & phlegmaticum, corpusque robustum sine febre. Si vero id non certo constat, & accedunt accidentia mala, incisionis instituentium etiam fracto crano facile fistula & frustula membranas ledant, ac in ipso fissuræ loco enata humiditas in sinum abeat & ad membranas distillet, unde communiter interire solent qui à capitis vulneribus moriuntur, mature cranium apertendum ut sanies exire possit, festuæ & alia res

c. n. removeantur. quarum præsentiam febris, vertigo tenebrosa, scotomia, dolores acuti, vomitiones, sopor, torpor, paralytis, delirium &c. nunc conjunctum nunc sigillatim, pro alia atque alia vulneris, subiecti, loci & ætæ constitutione, indicare solent: Febris si accidat post 7. eo scilicet tempore quo terminari debebat, concurrentibus simul his quibus *nyxter* verabatur, putredinis in cerebro, meningibus aut crano certum sit indicium, vel Hippocr. de cæto, 2. ob quam etiam potissimum & nos aperture moliri simus. Idem autem fere nobis evenit in nostro ægro quod *Glandorpis* in pigili Bremenſe, alio ramen successu. Cum pigili illi graviter in capite vulnerato 3. die gravis symptomata supervenirent, & *Glandorpis* suspicaretur materiam intra cranium collectam esse, cranium aperuit: Cum vero nihil efflueret per foramen, duram quoque meningem in tumorem alatum scalpello incurvato aperuit, quæ sanies intra duram & piam matrem contentæ maximam copiam emisit, quæ ipsa hoc modo evacuata, & adhibitis simul necessariis aliis, æger sanicarem pristinam recuperavit: Ita etiam in nostro ægro exigua portio sanies per foramen exivit, ut non poterimus non existimare intra tunica, aut ipsam cerebri substantiam anguem latitare: Ipsa quidem apertura in decliviori parte, uti par est, lateris dextri, juxta futuram lambdoideam facta est: In decliviori inquam, non in inferiori, cui loco os subtrahere maximum periculum pronuntiat *Nicolaus Berengarius* vero contrarium aliquoties se vidisse probat: Nec etiam magnum foramen factum est, uti alias in vertice fieri solet.

**Non obſtante plenilunio.** ] Cum *Celfo* plurimi intra quartum die Trepanum haud differendum putant, alij contra cum *Mercato* omnino differendum putant, quod sub initium materiam non sit fluida, ac meninges p. n. sint inflatæ, uti alias in plenilunio fieri esse solent: Nos vero die 12. adhibuimus Trepanum, ac Luna quidem turgida: Utilis est Astrologia medico, sed non necessaria semper; uti enim sub quovis cæli statu purgandum quandoque corpus venit, ita etiam vena sæpius secunda, cranium apertendum, ferrum & ignis adhibenda sub quovis cæli statu, si scilicet electidum tempus non detur, si morbus non ferat motus: Nostrum igitur erit potius, instar *Gundonis Bruensis*, brumali tempore, trium horarum spatio planas instrumento, loco solis operante producentis, obstantibus & maleficis syderibus, calori & frigori peccanti inde emananti, corporisque nostri advertitibus & insequentibus incommodis obviam iræquam ægro remedia subtrahere ad benigniores remotos & distantes Planetarum aspectus, frigidiores aut calidiores ætæ clementiam, Lu-

neque delirium, prae quibus saepe moriendum esset ipsi ægro.

*Quod tandem sine delirio supervixerit.* Admiratione dignum est quod omnis Hispani speciei expertus fuerit, & quod tam longissimum tempus vitae naturæ dederit, 26. scilicet dies: An quod substantia saltem lesa fuerit, non spiritus, non ipsi nervi? Et quod ægri quandoque ad aliquot menses supervivunt, etiam ipsis meningibus læsis, testatur *Pæp.* in lib. Hipp. de vulneribus, etiam sine delirio, referente *Pallesio* comm. in lib. 5. Equidem Antiqui non credebant Cerebrum inlammari posse, at hic casus eos refutat, ut & *Galen.* 2. de symptom. causis cap. ult. *Paulus* lib. 3. *Avicenna*, *Salvus* & alij, quorum tamen plerique delirium adfuisse testantur: Sed nec in membranis, nec in ipsis cerebri inflammatione,

§. 10. *Jacobus Bexius* ictus à scopeto in occipite, concidit protinus in terram, foris vix læsus, sed intus tam vehementer offensus ut inciderit illico in febrem ac graves convulsiones. Quibus permoti, perforavimus confestim calvariam, licet extrinsecus nullas egisset rimas: quo auxilio eliciimus quidem sanguinem supra cerebri membranas effusum, attamen, neque festina hæc acceleratio, neque remedia satis maturæ adhibita tantum potuere, in præcipiti hoc periculo, quin nihilominus sexto die perierit æger.

In ejus capite terebram dum circumageret Chirurgus, vidimus per integrum os erupisse innumeras sanguinis guttulas, cooperientes instar roris universam calvariam: quibus spongia aliquoties deterfis repullulare continuo & alias, monstraturas quasi digito nihil naturæ esse invium, sed omnia pervia, neque ossa ullibi tam solida quin per ea libere permeet tum sanguis tum pus.

At dissecto post obitum cadavere, licet apparuerit calvaria foris illæsa, ostendit tamen intus varias fissuras, docens suo exemplo quid per *Infortunium* suum vclit *Hippocr.* l. de vuln. cap. Vere enim infelices sunt illi ad quorum abditos morbos nec oculi nec mentis penetrat acies. Sed præter occultas hæc rimas, videre fuit prope plagæ locum, extimam cerebri membranam non minus lividam quam flacidam, & non uno loco cruore atro fæde obductam. At cerebellum erat plane syderatum, seu vero sphacelo, corruptum, Venæ utique passim laceræ, & circa b. sin cerebri ac *Rete mirabile*, tantum concreti sanguinis, ut nullus miraretur occubuisse hominem tot calamitatibus circumventum. *Tulpius Observ. 2. lib. 1.*

*Cerebrum Syderatum.* Vere naturæ genius aph. 11. 3. Coactum Prenor. Cerebro syderato alij quidem tertio alij vero septimo moriuntur die: illos autem si effugerint, servantur: At quibus ex his dissolutis invenitur os dissociatum illi pereunt: Qua circumlocutione designatur ptoeludibio principium corruptionis: licet sphacelæ vox latius sese extendat: qui enim servarentur alias aliquis post diem 7. etenim quod semel in integrum morituum, id reviviscit nunquam, quippe à privatione habitus denuo comparari nequit. Sed quid libi vult os dissociatum? dixerit tibi *scis*? Annon corruptionis labem vigilem calvarie communicam: cuius indicium si cit in hoc ægro dissoluta illa ossis laxitas, à qua promanarunt gonæ sanguineæ præter consuetudinem terebranti Chirurgo oblata, non secus & gangrenam præcedit aquosa cutis vesica, & sphacelum gangrenæ. Quasi diceret vir inclutus, Si quidem à cerebri visio eætenus immutetur os ipsi proximè impositum, ut dissoluta compage discedat evidenter à naturali sua soliditate (quod in hac calvaria evidenter factum) actum erit de vita, & necesse hominem mori à

tam desperata corrupti cerebri conditione. *Idem.*

*Rete mirabile* In hantis plerisque existere minime illud Rete, præsertim in quadrupedibus, plurimi concedunt Anatomici: An vero in homine tale reperitur quale describit *Galen.* lib. 9. cap. 4. de usu partium; ambigunt. Quidam enim manifestum afferunt, illud obscure actantum ejus indumenta credunt: alij novum, siquæ diversum à Galenico fingunt: nonnulli illi plexum choroideum substituant: Varias sententias qui sese desiderat, cunctat inter cæteros *Cl. Guérin. Rossignolum Differ. Anat. 1. 6. c. 34. & sequ.*

*Perforavimus confestim calvariam* Quamvis testamēta plerumque adhibeantur calvaria vel fissæ vel fissæ, convenienti nihilominus etiam integre, præsertim si metus sit dissipatum venarum: educitur quippe hoc ratione non tantum sanguis effusus, sed impediuntur simul inflammatio, putredo, delirium, febris aliæque simul cædalia symptomata: quamquam scopum hunc non semper attingat ars, ut ostendit alij cum exemplum.

#### OBSERVATIO IX.

*Vulnus capitis cum Dedolatione lethale, ob pus inter utramque meningem collectum. l.*

*Ob Fracturam cum Dedolatione, sequensque Apostema cerebri. 2.*

§. 1. *M*iles Hispanus in Capite vulnus acceperat cum ossis Dedolatione, primis 4. diebus sat bene habebat, statim tamen initio sanguis ex artetia impetuosè profluxit, ut vix triduo exacto sisti potuerit. Post terebrato cranio plurimus sanguis extravasatus eductus est, & usque ad vii. non male habuit, quæ tamen statim vomitus supervenit copiosus: obsequuta quoque est ossis denigratio usque ad x. quæ alius Chirurgus supervenientis Empiricus,

tollendæ nigredini aluminis parum ossi instravit, sed magno ægri nocumenco, subito enim partis affectus, quæ dextra erat, Paralysis, ægro etiam auram quandam à pollice pedis usque ad superiores partes elevans, sentiente, & resolutioni partium prædicanti, delictis frequentibus ad unctis: Die xiv. quæ novissimum incidit, insignis mutatio facta, & defluxio à capite ad partes inferiores ægri erectum & quod si strangulatum è vita sustulit.

Secundo cadavere, ex cerebro per o. biliosa multa prodibant, ex naribus purulenta cum impetu; nec non mucosa & sanguis plurimus intra meningem duram & calvariam collecta extra venas. Ipsa dura mening, quæ plaga erat, puris acrimonia erosa & plene imbecilla apparebat: Vena autem cerebri & cerebelli sanguine repleta, ita ut minutissimas quasque, cer. nigrities, facile conspiceret liquerit: hæc tamen omnia evidentiora in parte affecta se offerebant oculis quam altera. *Joh. Valerius Rumerus Observat. 17.*

**Vena nigrities** ] Aluminis vi adstrictoria repressis humoribus & sanguine.

**Empurum tollendæ nigredini** ] Si panniculus, & non est nigredo à Medicina, sed quia corruptus est panniculus, tunc medicus arguit mortem: Nota tamen quod possit contingere ut Os sit nigrum, & non à medicina, nec ob corruptionem factam à sanie inter os & panniculam, & non ita periculosum erit ut supra: Quia contingit ut contendantur cranium in aliqua parte venosa cranii, aque rumpantur venule illæ quæ sunt in porositatibus cranii, & fractura non penetrabit internam unicam cranii, & sanguis in medulla cranii, id est in porositatibus & spongiositatibus ipsius penetrat, & ita fiet nigredo in osse, quæ non removebitur l-vi ficatione cum ferro: Itaque cum Medicus videt talem nigredinem cum qua non sit sava accidentia, sic sollicitus in ap-

riendos, & in removendo omne quod denigratum est, ne illa corruptio descendat. potest enim sanari, si vero motus interveniat incedet malum. Sane potest forte sanguis ille à medicina exsiccare, & maxime in capite mundo & obediens, ostamen illud denigratum necessario cadit. i. c. natura expellet, & à facili & à medicinis: vel Medicus debet sentire ut usque ad partem sanam cum raspatore vel alio modo: Tutius tamen est aperire donec removeatur totum, os dubitatum & causa nigredinis tollatur, si possibile est: Nam si est à sanie vel panniculo corrupto, facta aperta potest expurgari sanie, & ita forte sanabitur, potest etiam mundificari panniculus. Quia plures ego vidi panniculum erectum in notabili quantitate, & alteratum in superficie, ubi cum mundificantibus processum est, & ægri sanati sunt. *Berengarius cap. 13.*

§. 2. Rusticus consistentis ætatis, robustus, in capite quoque accepit vulnera cum fractura & dedolatione ossis. In terebratione, quæ tamen necessaria erat, instituta non amplius convalescens, undecima obiit *continque fabricitans*, quod signum erat apostematæ in cerebri substantia enati, quod tamen in dissecto nondum suppuratum aut maturum reperitum est. *I. Valerius Rumerus Observ. 33.*

**Terebratione quæ necessaria erat** ] Terebrationem, ubi necessaria videretur, aliquando cum successu omitti ostendit Excell. *I. Jac. Wepferus Exercit. de Apoplexia p. 340.* exemplo Cammehalonis casusdam, cui ex casu cranium fissum cum collectione sanguinis sub costalibus, alique locum calidissimum incolat protinus Tepanum arripendum stansissent, idemque Exc. D. D. Burg. veritas fœderis erat, nisi æger & adstantes ab auxilio his in locis insolito abhorruissent: Itaque illis remediis sanguinis ulteriorem profusionem intra cranium prohibere & jam extravasatum absorbere annixus est. Venæ repetita sectione sanguinis copiam imminuit; ejus motum, à casu & à gravis, hinc inde in toto habito incensidum capientibus (artus enim mire erant conquassati) perturbationem & impetuosiorum factum coarctavit, venæque sanguinis quantitate aliqua detracta quasi fame icas reddidit, ut avidus effusum resorbuerint quousque etiam per rimas vicibus tenuis & refrigerans: Exhibita Tinctura traumatica, & fortis applicitis sacculis herbis cephalicis fardis & in viço codis, sanguinem extravasatum ingrossum absorbentem ac purissimum sua gravitate dampnam altissimum, ita disposuit ut vel vasa sanguifera, vel glandularum poros denique sublatrare potuerit. Idque fecit non sine felici successu nec sine exemplo, cum etiam ab aliis circa cranii perforationem idem non ita ex voto præstitum sit: Sanguinem extravasatum in aurantissimum oblivis & halitus instat evanissit: credet nequeque, obstitit enim cranii crassities & duræ meningis densitas, ob quam pertinacissime etiam æquam meram in hydrocephalis deinet, ut nullo ingenio circa incisionem, periculi plenissimam, auserti possit: Quotidie observamus in renellæ ætatis puellis

tumores in fronte ad dimidii ovi gallinæci magnitudinem ex forti alissione allurgentes atque ex livescens res à sanguine infuso, protinus admoto frigido ferro subsidere, aut tepetitione hac in pueritiam neg. est; applicito carnis calefacta frustulo, paucorum horum intervallo citra manifestam evacuationem evanescere. Alias quoque in praxi animadvertimus pulveribus contra casum, ungu. possibilibus, ex quorum numero Tinctura Traumatica est, decoctis Traumaticis grumosa sanguinem dissolvi, partemque intra vasa sanguifera resorberi, partem ejus excretionem faciliorem. Quidam prius tantum primum à cervice ad imas fures, postea à femore ad tibias percussus paulo post difficulter respiravit, citra præcordia summe angebatur, formina ventris patebatur, cum d. fore primum mingeat, & tandem aliquandiu in gurgulis subsistit. Cuiusmodi tussis, vomitus, cum facibus pluvialis & utina egressus; Tinctura traumatica aliquoties assumpta, & fortis grumos dissolvendibus & vicibus tenuis persuaso convalescit.

*Descriptio Tinctura Traumaticæ*

22. Butyr. majal. libii. liquefiant lento calore in vase terreo virescente ac desuperentur, adde flores, & folia herbar. rec. quævislibet perfectam maturationem adeptam ac minorem incassum, scilicet herb. h. esol. petroselin. ana man. li. plantag. utriusque, nasturtii aqu. anagall. beccabunga. solani, melissæ, virgæ aureæ, pentaphyll. veronica, bilioria, nicotiana, Salv. n. bilis, hyperic. centaurea min. ana man. jss. di. etantur in loco tepido, & quotieslibet terve bacillo agitentur, donec herbe omnes acellerint: postea coquantur lento calore, & fortiter exprimendo coeantur: colaturæ indantur lumbicorum ter. aqua plantag. & aceto, rabi. Ipsi lororum & minutim consiliorum leuconia: ite-

rum coquantur lento calore ad consumptionem succorum; percolato admisceatur mellis despumati libra una; servetur in vase terreo vitreato: datur diachyma una, vel etiam duæ scortum, vel in infusculo soluta, quoties suspensio grumosa & congelari sanguinis obvenit. Quinetiam in principio Pleuritidis commode datur.

*Quid sit apoplexia, & apoplexiæ signa.* Apoplexiæ signa, incipiendo à calidis, sunt hæc; continua febris, cujus calor non est multum fortis sub tactu, facies & caput reliquo corpore calidiora, mentis alienatio, vigilæ, nonnunquam somnus accidit à quo æger exsurgit cum clamore & saltu, lingue nigricio, asperitas, simbrarium collectio, oculi lacrymantes, quandoque ophthalmici quandoque sicci. Cui sanguineum accidit Apoplema, insunt prædicta accidentia cum visio, sopor, & oculorum dolore, garrulitate, ineptia, febris est intensior & faciei color rubens. Cum ex cholericò humore, faciei color ad croceum declinat, insania committitur, salus, caloris tactus est acutus & pungens. Si sit aliquid melancholicæ mixtum, sunt ineptiæ, garrulitas, timor & fletus: At si adnotabilis phlegmatis admixtio, sit obstupescitio non continua: In istis tamen omnibus pulsus est debilis, parvus & durus & varietas multa anhelitus spiritus quandoque angustia, stomachi subversio, & tument ad sensum panniculi, & exeunt per fissuram cranii colorati colore materię & efficiuntur immobiles: Apoplema vero frigidum capiti eveniens est à prædominio phlegmatis. Signa sunt febris modica debilis, stupefactio sopor: ægri vix ad interrogata respondent, frequens est oscitatio, mentis confusio, aptum claudere obliviscimur, aliquibus est ventris solutio phlegmatica, & interdum constipatio ventris: & eorum urina ut aliorum turbida est, tremor extremitatum & sudor, & facies livida & rumi-

da, magnus pulsus & fluctuosus, ut peripneumonicorum, & anhelitus tardus & varius.

Quod autem cerebrum possit apostemari probat Princeps contra *Serapionem*: Si Apoplema est in anteriori parte capitis, corrumpit imaginationem, & tunc incipiunt colligere viros & palcas & similia, & imaginantur quæ non reperiuntur. Si in medio, corrumpit cogitationem. Si in posteriori, obliviscimur, ita ut quandoque perant aliquid, quod si eis presentetur, non recordantur se quavisisse: Si autem Apoplema sit super omnes partes, apparent hæc omnia: Et si cum eo apostemetur cerebrum, rubet facies & oculi, & exeunt oculi multum, si materia est sanguis: Si vero est cholera, ad citrinum tendunt, & ita res apparent rubre & citrinæ secundum humorem prædominantem: Quod si sit à cholera adusta, est illud quod perimit. Signa autem sunt quod communitas accidentium ejus accedit cum demonio, odio & tixa, & oculi sunt contriti. Signa apoplexiæ frigidi in capite (licet raro contingat, tamen possibile est) sive à causa antecedente sive à primitiva (à qua primitiva rarius contingit) sunt hæc, 1. est sola lenis febris lenta. necessaria causa est febris ab humore putrefacto in cerebro, inquit *Avicenna*, & propter hoc separatur à Superbeth. Talia vero Apoplexiæ ego non credo fieri nisi per modum paulatinæ congestionis, quia per modum destinationis non possunt fieri: Si tamen fiant, hoc erit per choletam illi mixtam. Credo etiam quod si in cerebro, sive per fluxum sive per conjectionem fiat apoplema, quod possit esse tale ut non adsit febris, considerata qualitate & quantitate materię, & loco & tempore apoplexiæ, & considerato modo terminationis ejus. *Ex Berengario lib. 2. de Fractura cranij cap. 7.*

## OBSERVATIO X.

*ictus Capitis lethalis, ob fractam laminam secundam prima illa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. & c.*

§. 1. **N**Ob. quidam Eques turmæ Ducis Stempiani, dum in disiecta murorum castri Hildini parte propugnaret, glande tormento manuario missa ictus est in bregmate, alioqui casside armato. Cassidem quidem glans impulsæ depreffit, non fudit, imò nec cutem musculosam, nec cranium, quod saltem cerni posset, nihilominus 6. die apoplecticus interitit.

Ego vero sciendi avidus quæ ipsi iusta interitus causa extitisset, cranio diviso animadverti fractam laminam secundam, testâque ex se remittentem, quibus tanquam aculeis cerebri substantia assidue compungebatur, integra interim cranij lamina prima, *Parvus lib. 9. c. 8.*

**N**on absurdum est oppositam ei quæ ictum excepit, ossis ejusdem, ac non diversorum ossium partem foudi, in his hominibus quibus cranium est bene constructum, & futuris, ut natura fecit & solet, distinctum: fuitque: & est germana hæc *Hippocr.* mens & sententia. Idque ut magis intelligatur, notandum ictui oppositam ejusdem ossis partem intelligi

duobus modis: 1. cum fractura in eadem est ossis ipsi superficie, ut si parte alterius ossium bregmaticæ, quæ est ad suturam lambdoideam, icta, fissa altera sit quæ est ad coronalem: 2. cum non quæ ictum excepit superficies & lamina, sed quæ subjecta est, fissa erit, cujusmodi fractura genus fuit in memorato Equite. *Idem.*

§. 2. Anno 1651. Castrensis bajulus plumbeis globulis à bombarda emissis in capite percussus, cranio multis fracturis disrupto obiit.

Aperto cranio; portio tabulæ secundæ duræ matri incumbens, & omnino à prima separata reperta est, sine ulla fractura extra in hoc loco apparente: quod ab ictu percussione factum fuisse existimo: Si cataplasma infra dictum fuisset admodum, per ejus in eo notam id forsitan perceptum fuisset, & trepano extrahi, & sic curari æger potuisset; ceciderat autem hæc portio ex angulo à furura coronali & sagittali conflato. *P. Boerellus Centur. 2. Observat. xx.*

*In fractura apparente.* Fracturas occultas detegendi rationem aperit, *Idem ibidem.* Nob. Comes Brevensis casu sectorium ab alto, quasi omnino motus remansit, nullus tamen tumor nec cavitas apparuit: Quare *D. de Pimpinella*, & *D. le Bus*, certissimè Chiturgis, convoctis, cataplasma ex farina fabarum admotum fuit toti capiti, deorsum capillitio, & quousque

res negebat cum æger loquelam amisisset, ut citius cataplasma exsiccaretur, linthea calida admoveretur cataplasmatum curantur sex horarum spatio. Exsiccatum cataplasma, Chiturgi illud removerunt, & in illo figuratas fissuras cranii latentium optime delineatas perceperunt: cataplasma enim non exsiccat in locis fissurarum & fracturarum, sed quæ ante detecta fuerant

que vñ percipi nequibant: Fissura ergo magna in medio cr. t. phyi mēsa i apponit, in quo *de pnf.* (contra tamen d. Chriam auctorem) sectionem infiluit. nulla fibrarum ratione hybra, quod sepe feliciter se fecisse alleverat. ac si sectione, arretit sanguis non in altum va de emitebant, sed pulveribus adfringentibus & limetis capitis tandem necesse fuerunt,

Oste autem denudatis apparuit ossis squama satis magna f. ras prominens, quam D. *de pnf.* spiracula violenter extraxit, dicens non alio Trepano opus esse cum illud trepan: locum obtineret: inde sanguis copiosus pronus effluxit: à quo efflū cerebrium urgebatur, eo enim evacuato statim æger loquutus est, & tandem repositis mediis accommodatis penitus curatus.

§. 3. Anno 1632. Ulmæ quidam miles Sæcicus, ob depressionem cranij secundo decubitus die mortuus est. Ego sciendi cupidus quæ tam repentinæ mortis causa extiterit, cranium ferra divisi, & inveni ejus internam laminam non solum fissam, sed etiam ossiculum (quod absque dubio cerebri duram & piam matrem assue pupugit) aliquod de se remittentem, integra existente externa lamina. *Io. Scultetus Armament. Chirurg. p. i. Tab. 29. §. 16.*

Talis depressio in adultis rarissime in iis nimirum quibus natura minus durum dedit cranium vel certe nunquam sine rima reperitur: Si enim post diffusionem cutis ex instructo factam, nulla rima in externa cranij lamina apparet, rimendum erit ne interior tabula figuram patiat, per quam sanguis ex pumicosa cranij substantia ad crassam cerebri membranam descendere quidem, sed per eandem repurgari minime potest: Quoties igitur in auditorum caputibus talis apparet fovea aut depressio, certissimum illi signum est cavariam esse divisam, nisi enim fissum esset cranium, inq. it Hippocr. medium delidere nequit: Sed posito, non id tamen simpliciter concessio, dar. de depressione cranij scioris absque rimilla, tamen solius naturæ neg. tio (quod F. *Horvæus* præcipit committenda non est, sed cutis statim conveniens scalpello in triangulum vel crucem incidenda, posterum ut à cranio separandum, vulnusque globulis idoneis hians & apertum conservandum, ut Medicus non solum certior fieri in cranium sit fissum necne sed etiam ut si depressio nem committat rima: quod maxime timendum vetem necessarium adhibere possit. *Quid deinceps agendum vide l. c.*

Interiam laminam fissam & ossiculum de se remittentem? Inquirenda signa ossis gravantis seu pungentis cerebrium panniculos delatantur à multis, & à natura rei ludentis, quæ si fuerit res perforans, ut plurimum aliqua ossis fistula parum infra cranium descendunt, serrata à cranio vel etiam separata: sit autem eo modo quo contingit laminam æneam, & c. à filo plantis vel uno foramine perforatam, in parte emissa effici pungentem & alperam, ita ut pungat quicquid ei obviat, Tale est instrumentum commune quod Rasporium dicitur: Præterea patiens sentit dolorem pungentem continuum fixum in uno loco & fixum. Vel causa fuit contundens, rumpens cranium, & intra ipsum plicans, vel tumpens, taliter ut judicet cranium ingravare & pungere panniculos, cum relatuæ patientis, si loquitur, qui enim non loquitur tangit locum manu omni hora. Et interdum ita comprimentur panniculi & cerebrum ut incidat apoplexia ut testatur Rhafis. Interdum tamen contingit quod ex compressione sic comprimentis non accidit apoplexia, nec talis fœva accidentia: Quidam dicunt quod ossis plicam ad intra, absque rupturæ cutis & cranij, accidunt somnia mala, unde loquuntur & clamant ægri quasi habeant hostes super se, *Nicolas* etiam dicit quod hoc est infirmus est puer, & si compressio est magna, quæ apostemat ut dura mater & forte cerebrum, & sequantur accidentia mala. Ego tamen vidi compressionem

magnam & notabilem in alia ætate quam pueritia, absque fractura ossis manifestâ, & non erat rupta cutis, era tamen concavitas in capite notabilis, & per emplastrum sanati sunt, & non fuit mala accidentia aliqua: Et quod accidunt somnia mala in compressione interdum, ego sum testis, quia id vidi in quodam annorum 15. qui in somniis habebat talia accidentia: hinc aperta fuit cutis, quia sola erat confusio sine ulla fissura, & osse retracto inventum est os ruptum & plicatum, quo per elevatorium elevato ad situm naturalem, in media hora rediit ad intellectum, & paulo post ad sanitatem.

Contingit etiam os pungere & gravare panniculum, in notabili fractura cranij, non tantum à recontundente, verum etiam ab incidente (quia arma non semper subtilissime incidunt) Nam quia ossis ut plurimum sunt frangibilia & vitrea, fissura notabilis facta in cranio introsum penetrante, aliqua frustra ossium cadant deorsum supra panniculum, & notabilia sunt, quia sunt majora, id est cum majori fractura in inferiori tabula cranij quam in superiori, & pungunt si ve gravant panniculos. In similibus debet Medicus serrare cranium lateraliter, & filum amplicare, & illud os extrahere, quia aliter non curatur talis dispositio.

Nota etiam quod sepe sub osse sunt frustra ossium notabilia, & non pungunt neque gravant panniculos: Et hinc est quod non adfunt accidentia fœva, sed Medicus expertus aliquo iudicio cognoscet an ossa sint sub cranio, maxime quando viderit curam ultra debitum prolongari, & cum viderit sanum sub osse exitu, & non viderit accidentia fœva, tunc judicabit sanum illam esse ex frustra ossis cutem impediens, quia si sanus esset ex alia causa, adesset accidentia fœva. Et pluries ego à vulneribus capitis extraxi ossa de sub osse in simili casu: sed si firmamentum est apertum, natura ex se expellit talia ossa, tarde tamen, sed melius sit si ab arte joveretur.

Per alium modum etiam descendunt frustra ossium infra cranium, nam interdum dum trepanatur cranium, instrumenta non apta rumpunt cranium, & inq. eduntur inter panniculum & cranium ossis frustra & sic pungunt vel non pungunt, atque ita gravant secundum quantitatem ossis vel secundum modum per quem obviant panniculo, quia interdum secundum plantam ossis tangunt panniculum, & sic non pungunt, vel obviat panniculo cum acutis aliqua, & sic pungunt, vel gravant si sunt magna, sic trepanando tamen non possunt multum gravare quia frustra sunt parva & levia. *Berengarius cap. x.*

§. 4. *Ruderus* Studiosus, vulneratus circa os frontis, primis diebus non admodum periculose laborare videbatur, etiam si rima vulneris per ipsum cranium circa os frontis penetraret, nullis etiam symptomatibus periculosis apparentibus: at vero cum factu isto cranium non tantum perforatum, sed etiam (quod post mortem anatomia capitis monstravit) particula de lamina interiori omnino per meningos in cerebri substantiam translata esset, fieri



non potuit quin paucos post dies pars læsa inflammationem pateretur, quam ob causam non tantum ingens æstus, imprimisque capitis sublequebatur, sed simul etiam 1. spasmus cynicus in parte opposita, convulsa scilicet musculo temporali sinistro, cum læsio esset in dextra parte, ac dein convulsivi motus in partibus alijs se offerebant, sensim facultate animali primum, ac dein virali quoque resolutis. *Horsius ibidem.*

§. 5. Rinaldus Cortesius Chiurgus cranium ostendit, in quo inferior cranij lamina seu tabula, sine ulla in exteriori appa-ente rupturæ signo rupta erat. *Schenckius ex Petro Spheria.*

§. 6. Anno 1626. mense Julio Nobiliss. inclytæ Reipub. Ulménis Daumviris scripto retuli, quod Bartholomæus Schaffer, militem Cæsarianum, à rusticis in capite læsum visitare volens, invenit jam mortuum, & presentibus multis, in causam mortis, quam 22. læsioni. die oppetijt, diligentissime inquisierim, cujus solitaria fuit Vulus in Occipitijs, circa fururam lambdiformem, dextra parte, cum rima & depressione solius laminæ cranij internæ, quæ cerebrum continuo compressit, à Barbitonforibus simpliciter curatum: Cum autem in has cranij noxa, purulenta materia, (quæ per rimam laminæ internæ oculorum, exterior enim erat salva & integra, ad cerebrum delapsa est) absque Chirurgiæ negligentiæ auxilio non potuerit expurgari, multo minus interior lamina cranij, cerebrum continuo deprimens, idque idoneis instrumentis elevari, ortus est Abscessus sub calvaria, qui introducta prius fibre & phrenitide, ruptus dextrum cerebri ventriculum replevit, & subitaneis convulsionibus necem intulit ei, cujus vita in principio læsionis, debita cranij perforatione per Trepanum, & per vestes elevatione, proculdubio conservari potuisset. *Iob. Scultetus Armat. Chirurgici observ. 15.*

§. 7. I. Jac. Kenninguer, Studiosus, furca scenaria percussus in sincipite, paulo supra frontem, & ad initium musculi temporalis dextri vulneratus, ubi vivendi finem fecerat, apertò cranio inspicitur. In quo deprehendi fracturam triangulam, in cranij lamina interiore, sub sinistro vulneris initio, nulla in superficie exteriori fractura, imò ne fissura quidem apparente. Præterea in dura meninge, frontem versus, multa erat rubedo, ad palmi latitudinem, phlegmones signis. Sub dura vero membrana tumor laticabat multumque puris liquidi. Tenuis autem meninx erat & ipsa rubicunda, ac sub ipsa pus crassiusculum & subrufum: nequaquam tamen æger deliravit, neque convulsionibus passus est: solummodo fibræ vitæ continue, idque à 4. vulneris die usque ad finem, qui fuit 9. quo exspiravit. *Smetius Miscellan. lib. x. p. 570.*

§. 8. Vulneratur quidam supra nares pugiunculo, quem Itilem vocant: Vulus quantum fieri potest apertum servatur (tractatur enim à Chirurgo peritissimo) & secundum methodum curatur. Septimana nona (cum antea de dolore frontis gravativo conquestus fuisset) Epilepsia subiro corripitur & moritur.

Aperitur cranium, & in loco vulnerato reperitur lamina interior intrusa, quantitate grossi majoris, non aliter atque in ollis perforandis constringere solet; Cerebrum quoque totum ex una parte purulentum, ut ratione aliterius partis sanæ incedere adhuc potuerit, quemadmodum de phthisicis constat. *Philippus Salmon cent. I. obs. 52.*

**S** *Epitima nona, Cerebrum purulentum* ] In vulneribus capitis sæpius contingit ægrum venire usque ad 22. diem sive 33. sine aliquo malo accidenti, ac circa tale tempus superveniant pessima accidentia, & moritur æger, & hoc ut plurimum contingit à suppurata in capitis profundo. Et ego miror cur non ante superveniant talia accidentia. An forte quia sanies tunc, vel parum ante, incipit aggregari, à superioribus descendens per poros cranij vel ex male

regimine ægri in diatam: vel forte à Medico operante indebitè: vel forte à virtute illius diei inter alios dies criticos & à similibus: vel quod à principio materiam eacurrit in locum, quæ prius non est putrefacta, forte per medicinas applicitas, vel à virtute illam regulante, & tunc incipit putrescere, & febrem & prædicta accidentia inferre, à quib. causatur mors. *Berengar. 17.*

## OBSERVATIO V.

*Idem supra dextrum superciliu lethale, ob sanguinem in occipitio effusum, inter utramque meningem collectum, unde sequuta vicini cerebri corruptio.* Obitus Henrici II. Galliarum Regis 1. Vulus Frontis lethale ob Contrafissuram in Occipitijs esse, & effusionem sanguinis ac saniei in subditam meningem. 2. Percussio in una capitis parte lethale ob contusionem cerebri, & saniei collectionem in parte opposita. 3. 4. 6. Ossis frontis vulnus lethale, ob abscessum circa occiput excitatum. 5. Vulus in medio temporum lethale, ob fissuram in opposito latere. 7. Contrafissura duplex à casu in muscolum temporalem. 8. Casus in occipiti lethalis, ob sequutam fissuram ossis Frontis. 9.

§. 1. **H**enricus Rex felix memoriz, compositis Galliz rebus, & pace cum finitimis parata, dum Filiz & Sororis nuptias celebrari, & festivo hastiludiorum exercitio festiores reddere conaretur, procurrens & ipse in eademo, pyxidati lancea adeo gravem ictum pectore excepit, ut ictus vehementia lamina ductilis, quæ à galea propulsi-

furrigeretur, & d' illantis in frustra lanceæ truncus supra dextrum superciliū impingeretur, cauil que musculi ora frontis ad minorem usque oculi sinistri canthum sanaretur, multis ejusdem trunci frustulis in commemorati oculi substantiam depactis, penitus tamen intactis & illatis ossibus: Fuit vero inde commoti & concussi cerebri tanta vis, ut xi. ab icū die inierierit.

Post obitum dissecto cranio, in parte icū opposita, ad mediam occipitis suturam effusi inter crassam & tennem meningem sanguinis copia comperta est, & corruptæ cerebri substantiæ, quantum pollice regi posset, indicia ex coloris nativi in flavum mutatione apparuerunt: Quæ causæ Regi Christianissimo mortis consequutionem attulerunt, non sola vulnerati oculi læsio; plerisque enim alios vidimus, qui ex longe gravioribus oculorum vulneribus non interiere. *Amb. Paréus lib. 9. cap. 9.*

**[Læsis ossibus]** Aliquando evenit ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex icū aliqua vena in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis marcat, isque ibi concretus magnos dolores moveat oculis, quæ oboriet. *Celsus cap. de curatione calvae:* Firmat Corpus parte 1. de Fract. cranij. Repetio, aut, alias species læsionis in capite quæ caret peculiaris nomine: Una est quod interdum non fracto cranio rumpuntur aliqui nervi cerebri, vel aliqua vena in p. anterioris ejus ex motu forti, vel ex calu & percussione cum sic gravi, potente movere cerebrum, & maxime in corpore loco, ut sunt corpora senum, quibus magis aptum est moveri & rumpi cerebrum

propter medullam eorum exsiccantam & diminutam ut patet ex comm. *Galen. in aph. 88. 6.* Experientia hoc vidit in magnifico N. qui plures habuit contusiones à re ponderosa, & nullam habuit in cranio fracturam, & adhibita omni cura mortuus est. Et non dico tantum ex rupta nervorum cerebri (quia isti sine voce sunt, maxime si patiuntur nervi à reversis ossi, qui dicuntur nervi vocis) sed credo quod ipsi fuerit rupta venula aliqua cerebri, & forte aliquis nervus, à qua venula inducitur fuerit mors, propter sanguinem ibi in loco non cognito putrefactum. Et illa læsionis species est mala, & causa interitus, quia Medici nesciunt locum venæ.

§. 2. Vir sexagenario proximus, à caballo sternaci excussus, frontem pavimento, durissimis lapidibus contrito, allisit, acceptoque eo loci ex lapsu vulnere, aliorum subsidio elevatus, temi animis domum refertur, mox bilem eructat, & natos ei cruciat, certo, si *Hippocrati* fides, cerebri concussi & venulæ alicujus ruptæ indicio. Insistito diligenti serutatio, Vultus vix cutem penetrante ego & Chirurgus invenimus. Interim elota alvo enemate, sanguinis aliquid in corpore plethorico de cephalica detractum: Sequenti die omnia graviora & prorsus lethalia, corpus enim febre incaluit cum obstupescencia & despicientia, atque ad interrogata omnimoda obmutescencia, quæ ex *Hippocr. 7. aph. 14.* in capite læso mala pronuntiat: unde pessime de eo sperare cepimus. Nihilominus manum tanquam deplorato admovimus, & Chirurgus nequicquam eorum omisit quæ ars his in casibus præscribere solet, quo certius pateret si quæ noxa frontis ossi insidita esset, quod *Hippocratis* oraculo moniti verebamur. Vultus in frigore insiditum dilaravit, sed os integrum & noxæ expers inventum, neque sedula capitis contestatione, ægro plano stupido & muto, quicquam animadvertere potuimus, quanquam fracti cranij multa erat conjectura: itaque de aperienda per trepanum calvaria consilium initum, Sed quid fiet misellus iste senex, cum per totum fere diem quasi comare quodam correptus esset, sub vesperam horrendo spasmo convulsus paucarum horarum spatio mortalitatem exiit.

Aperro à morte cranio, in opposita fronti occipitis parte, Rima, seu Contrassura, quam Græci *σπινθη* vocant, reperta, & magna cruoris sanie permixti copia grassæ in meningi incumbens, unde mors. Ut vere dixerit *Celsus*, Evenire interdum solere ut altera parte ictus insederit, & altera fiderit. *Fridericus Lesius Observ. Medic. 1. Lib. 1.*

§. 3. *Nicolaus Florentinus* dicit se hoc vidisse in quodam artificē percusso in capite clava: facta fuit apertio in parte affecta ac nihil fuit repertum: tertia post die succellit febris, & facta fuit apertio in parte opposita, & reperta est sanies in magna copia; & Ego expertus sum in multis postquam mortui sunt, in quibus nihil aderat in parte affecta, & ubi feci apertionem in parte opposita, reperi copiosam saniem collectam & magnam contusionem. *Gab. Fallopius comm. in lib. Hipp. de cap. vulner. cap. 14.*

**[In parte opposita]** Quamvis hanc Fracturæ speciem. Ictus excipiat *Pantus*, nec in capite humano, duro semper & pleno ut in vitreis vasculis, Contrahitur dari posse putet, à me tamen aliquando vix & observata est. Nec valet eorum ratio qui ideo putant naturam ex multis ossibus, futurarum compage contextis, caput consiluisse, ne unus partis

fractura in oppositam protenderetur? locum enim, id forte pœset in his quibus suture sunt expresse & naturaliter suture ac constitutæ, at non in his quibus vel desunt, vel è natura suture non sunt, vel sunt admodum confusæ; atque ita obiter ut unum vel luti os ex multis coaluisse videntur: Id fiet sequentis historię commemoratione manifestum.

§. 4. M. ossi, dispositorum equorum custodis, seruo quidam gravis lapidis ictus in bregmate exuro ictu insidit, unde vulnus quidem exiguum sed grandis confusio tumorque exitit, quare quo certius pateret si quæ noxa ossi insidita esset, quoque facilius concretus sanguis exprimeretur, cere patefacta latius apertum vulnus est à Chirurgo; Divisione peracta os integrum animadversum est, quanquam ejus fracti multa erat conjectura, quod statim ab

istū æger in terram prociderat, vomnerat, & alia fracti cranii signa pertulerat, quo factum est ut xxi. morbi die interiret.

Ego vero advocatus, qui qua ex causa interisset edicerem, divisio ferra cranio, comperi in parte istui opposita ingentem saniei copiam, & in crassa meninge, ipsiusque etiam cerebri substantia abscessum, futuram verò nullam, præter duas squamosas: Ratum ergo illud est Hippocr. autoritate, ratione & experientia confirmatum, alia parte istum, & alia fracturam esse posse: In his præsertim quibus aut nullæ erunt, aut illæ admodum arctæ, & valido adhæsi adeo confertæ ut vix appareant. *Parvus lib. 9. cap. 8.*

§. 5. Observavi ego cum Turnonii medicinam facerem, anno 1599 puerum x. aut xij. annos natum, die xlv. ex vulnere in frontis sinistra parte accepto, in febrem & resolutionem altioris lateris, i. e. dextri incidisse, cum tamen à primo morbi die ad xl. usque bellissime se habuisset, nec ulla nobis in dilatato vulnere vel rimula quidem apparuisset.

Eo tertia die vita functo & dissecto, alienatum & cancro affectum cerebrum: *ix. 15. Son. x. puerus* in occipite inventum est; nam & ibi aliquot rimæ in osse conspicuæ erant: Et quod de *Henrico secundo* Rege diximus, ex vena eadem parte, i. e. in occipitis tenui omento rupta, sanguis erumpens, cerebro vitium fecerat, & inflammationem in eo excitarat, à qua abscessu facto, & xl. illa die, ut verisimile est, aperto, pus in spiralis medullæ nervos dextro decubuerat, atque resolutionem dextram creaverat. *Franciscus Vertunianus Comm. in lib. Hippocr. de cap. Veneribus.*

§. 6. Et quædam species læsionis à me ter visa in actu practico in capite, à qua decipiuntur Medici, scil. quod osse non fracto interdum à re gravi contundente, vel casu ab alto, pars cranii (qualicumque sit pars, an anterior, an posterior, an lateralis) percussa percutit partem sibi oppositam, ita quod commissura percutit commissuram propinquam, & etiam longinquam (dico longinquam, quia possibile est quod os frontis impellat ossa bregmatis, à quibus componitur in eorum medio sagittalis sutura in osse Laudæ) & quia à commissura quilibet exeunt villi nervorum, & ipsa dura mater conjungens se Almoati, & aliqua venula, nervi & venulæ, & panniculus ipse inter duo ossa contunduntur, deinde in successu alicujus temporis putrescunt (quia omne contusum necesse est putrefieri & in saniem converti) & supervenit febris, & alia mala accidentia, & inde mors: Et in hoc Medici hæsitant, & credunt aliqui quod stante confusione in una parte, etiam cum fractura illius partis, vel sine, quod fractura sit in opposita parte per apparitionem saniei in opposito loco, sine fractura cutis, quia nbi panniculus est coarctatus, & contusus à commissura, ibi sit à sanie genita tumor aliquis, & sanie aggregatio. Et ego ter vidi anatomisando capita, Et similes casus repeti absque fractura oppositis ossis. *Iac. Berengarius Carpenfis Tract. de fractura cranii.*

§. 7. Orphanus annorum xv. passerem dimittebat in aërem: passer in murum proximum convolabat, Puer aviculam ad se allicit, allecta non redit, conscendit ille murum, passer progreditur, insequitur puer, aberrat hic, & è muro in sinistram temporum partem cadit: Ipsi humi se tollit, interrogatus à commilitonibus nunquid cruciatum sentiat, arridet, murumque xv. pedes altum, è quo deciderat, aspicit, hinc ad scholam se confert, cernat quoque, ut solebat, largiter, & cubitum it: media nocte magna cum animi perturbatione è somno evigilat, sanguinem cum bile evomit, circa diluculum insanire incipit, accurrunt curatrices, cumque quantum fieri potest juvant: Ego orphanorum ordinarius accersor, causam mali inquiri, Chirurgos adesse jubeo: Illi omnia tentant, ac prope investigant singula, verum nullam inveniunt confusionem, aut cranij impressionem: Venam incidit curo, chylsterem injici, foveri caput ac tueti contra symptomata, quæ sæpius orta in simili casu vidimus: Postridie tuberculum circa musculum temporalem apparet, quod ad cranium usque aperimus, quo aperto cranium in multas fissuras contusum conspicimus, nullum tamen fragmentum, aut cranij particulam excipere, quapropter ad Trepanum, Verum sanguis per ipsum cranium, non vero per fissuras futurasque, tanta copia fluebat, ut cerebri nullus prorsus esset usus: paulo post, sanguine sese sistente, ad cerebrum redimus, nullo tamen successu, confestim enim puer incurabili casu oppressus periiit.

Sceto cranio, præter fracturam hanc & fissuras, adhuc vidimus in latere opposito duas alias Contrafracturas triangulares, quæ quomodo potuissent inveniri expertis considerandum relinquimus: Membrana crassa ac pia mater expansæ erant instar tympani, quarum venæ capillares adeo intumuerant, ita ut non cerebri, sed manuum potius venæ viderentur: Inter cranium meningasque cruor conerectus magna abundantia conspiciebatur, non secus pia mater & ventriculi, qui præter cruoris copiam, aquæ quantitatē continebant aliquam, ut & cerebellum. *Nic. Fontanus Annot. in caput 1. Epitomes Vesalii.*

§. 8. Puer è muro xv. pedes alto exciderat, in quo fractura cum multis fissuris, mox comprehensa fuit circa musculum temporalem, Sed post mortem sceto cranio, adhuc duæ alie Contrafracturæ in latere opposito repertæ sunt. *Idem Annot. in cap. 1. Epit. Vesalii.*

**Q**uerendum quomodo interdum fieri possit à plurimis decemata illa contrassilura, qua cranium dicitur fandi in parte oppulsi illi in qua ictus fit: Hanc Hippocrates creditur describere lib. de Vulu. cap. his verbis, *Or sub vulnere frangitur alia capitis parte quam qua ulcus est & es undatum est*: Hic locus Hippocr. Contrassiluræ certitudinem plerumque animus firmissime impressit: Has contrassiluras si tenet se negat Gab. Fallopius de cap. Vulu. cap. 13. & rem probat non tantum Galeni, & Pauli aliorumque auctoritatibus, verum etiam propria experientia, scribitque se centies & pluries capite percussos vidisse, nunquam tamen contrassiluras invenire potuisse: Experientia Fallopij etiam nostram adiungamus, qui in castris non centies, sed ducentes & pluries huiusmodi capite graviter percussos milites, præcipue equites tractavimus, nunquam tamen ullam contrassiluram observare potuimus: Inter-

dum quidem fissuras in utroque latere invenimus, sed in iis solummodo quibus caput utrinque percussum fuerat: & sic proculdubio etiam contigit in puero illo *Nicolas Fontani*, in quo licet manifestè ex casu læsio, cum fissura, mox deprehensa sit in uno latere, ignoratum tamen fuit an non etiam puer oppositum latus percussus fuisset, vel lapis aliquis ex muro, forte runoso, post illum descendens in illud latus descendisset, quod maxime verisimile est: Ita ut pos calculum nostrum iis adpiciamus qui contrassiluras fieri negant: Quantum ad citata Hippocr. verò: *Uille* non loquitur ibi de contrassiluris, sed docet incendium pus sub cranio alia parte colligi quam qua os factum est, idque etiam nos aliquoties videmus, sed hoc nihil probat pro contrassilura, De *Dissectioe Anat.* lib. 9 cap. 3.

§. 9. Rusticus annorum circiter xl. famulus Nobil. Domini *Deodato Deodati* hyeme rigidissima, & terra stricto gelu constricta, plaustrum lignis onustum ducens, male compositos fascies quosdam & casum minantes composurus id conscendit, sed male obfirmatis pedibus supinus cadit in dorsum; unde luxatio carpi, altero die sopor, delirium, quarto mors.

Dissecando caput, primum examen fuit occipitis, quod casum primo exceperat, in quo levis contusio, sed os integrum: Pergendo ad anteriora fractura maxima in initio bregmatici sinistri se exhibet, ad oculi usque orbitam exporrecta: Calum autem in posteriora fuisse innuebat insignis ecchymosis in parte postica pulmonum ad dorsum, eum sanguinis concretio copia ad ovi magnitudinem, Nec non in parte lecoris concava.

## OBSERVATIO XII.

*Vulnus Frontis lethale, ob hiantem suturam lambdoideam, & saniem supra meningem duram effusam.*

**Q**uendam parte anteriore frontis pugione satis graviter vulneratum mihi videre contigit, cuius vulnus penetrabat usque ad medullarium: In hoc aderant omnia symptomata vulneribus capiti communia, alienatio nempe mentis, vomitus, aurium tinnitus, & alia ab Hippocr. enumerata: Et licet de dolore alicujus partis non conquereretur, secunda tamen die ipsum terebravi, symptomatibus hoc præsidium postulantibus & membranam aliquantulum inflammatam deprehendi, cuius causa usus sum remediis spectantibus inflammationem: licet verò meningem deprimerem & patiens obstructis naribus ipsam propelleret, nec quicquam perforatione peracta effluxisset, obiit xiv.

Secta calvaria loco vulneris, nec membrana, nec cerebrum ullam noxam exhibuerunt, vitæ quinetiam illæsa, quanquam futura lambdoidea laxata fuerit, crassitie digiti auricularis, pauca mæteria saniosa intra fururas ipsas, & supra duram membranam delitescente: Cui similem casum me nunquam observasse memini, licet contrassiluras in multis calvariarum partibus viderim, non tamen in suturis, quanquam earum apud autores prostant exempla. *Mercenti Observat. Medic. Chirurg.* 15.

**A**lienatio mentis] Notandum quod si contingat ex aliquo ictu incidere patientem in mentis alienationem cum privatione sensus & motus, nisi alia symptomata ab Hippocr. enumerata accedant, nullum vitæ periculum imminere, ac proinde prætermittendam quascunque operationem, sectionem videlicet & perforationem ipsius calvarie: Vidi siquidem aliquos ex prolapsu, aut ictu, læso capite, apparere solo hoc symptoma, sequenti die omnino liberato. *Idem ibidem.*

*Aderant omnia symptomata*] Præter signa ab

Hippocr. proposita, observandum quod semper alvi fluxus vulneribus capitis accedens, ab eoribus licet aliis symptomatibus, cerebri læsi signum esse, propter scilicet ejus contumaciam cum nervis sexui parisi qui orificiis ventriculi adnectuntur, quorum ratione inferius laxatur & alvi fluxus statim succedit: Hi vero fere omnes moriuntur, ob læsum cerebrum parte internâ, qua in spinalem medullam exporrigitur, ubi nervorum ortus: Omnia tamen remedia in his casibus statim administranda quæ ad artis opera spectant, ab Hippocr. proposita: *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XIII.

*Vulnus Sincipitis lethale ob arctam duræ meningis cum cranio adhesionem, cuius ratione pus exire non potuit.*

**P**uerum quadrimum ex phibisi mortuum anno 1596. dissecai: Huic dura mater ubique, instar periostrij, vitreæ tabulæ adhærens neutiquam avelli potuit, nisi prius introducto in aqua cranio: Itaque venæ quæ alioqui per externam partem duræ matris, quæ

cranium respicit (duplicem enim duram matrem cum Columbo assero) expanduntur, illæ in parte interna versus cerebrum conspiciantur: Erat nihilominus vacuum aliquod inter duram & piam matrem, hæc enim cerebro adhaerebat, illa cranio, Plagas & contusiones in huiusmodi calvarijs maxime periculosas esse nemo dubitat, tum quod membranz cerebri facillime lacerantur, tum etiam quod earum ruptis venis sanguis inter cerebrum & duram matrem effunditur: Venæ enim, ut dictum est, in interna parte duræ matris sitæ sunt, ita ut nullo modo sanguis extravenatus evacuari possit, quamvis cranium terebello perforetur, ut ex sequenti historia liquet. Rusticus in pago Genevæ proximo, Chesne dicto, vulnus circa dextrum os bregmatis baculo accepit, mox in terram cecidit, vomuit & loquelam amisit, Neglecto primum morbo, tandem 8. post die vocatus sum: Inveni ipsum febricitantem & delirantem, lingua arida, oculis rubicundis, Quum autem nec rima nec fractura apparet, cranium perforavi: nihil inveni vacuum, sed dura mater ita adhaerebat cranio, ut styli acies inter cranium & duram matrem minimè possent imitari: Unde *quum nihil puris exsillaret*, perforari inutilis fuit, ipse xiv. post die e vivis excessit: Quamdiu dura mater retenta fuit, nempe ab 8. die usque ad supremum, motus cerebri, quantumvis continuus, minimè percipiebatur, verum ea fuit distantia inter cerebrum & duram matrem ut pulsus cerebri membranam non attingeret: Hinc perspicuum fit cerebrum moveri, non autem ipsius membranz tantum. *Fabritius Hild. Centur. I. Observat. 7.*

**D**ura mater calvariz connectitur futurarum ope, tum ut pensile & rectum teneat cerebrum, tum etiam ut per futuras egressi pericranij procreent Sparium verò inter futuras rectè natura reliquit liberum, ut vacuum quoddam esset inter duram matrem & calvariam, has nimirum ob causas 1. ne quicquam ipsius cerebri sytola & distola obstrueret 2. ne venæ & arteriæ per extremam duræ matris partem spatia levi aliquo ictu in cranio facto rumpe-

rentur 3. ut ruptis in dura matre venis, sanguis non inter duram & piam matrem, sed inter duram matrem & cranium effunderetur, & perforato cranio facilius extraheretur.

*Quum nihil puris exsillaret* Meningis duræ sectionem, ad puris sub ea conclusi educationem, tentare non est ausus *Hildanus* convulsionum metu, quas subsequuturas credidit, cum tamen inane esse patebit inferius.

## OBSERVATIO XIV.

*Capitis ictum, & ventris levem puncturam, mors sequitur, neutri imputata.*

**C**ornelius Bethlehemita ictus cantharo in fronte, ac ventris leviter gladio puncto, procedit tumultuosus in gradus, sissioque sinistro temporum osse, excessit tertio post die è vitæ comprehensus interim ac in custodiam traditus qui ipsum indignis exceperant modis, consistente altero ventrem à se vulceratum, alterato vero accusato de vi fronti illata.

Cujus inopinatæ mortis causam, iussu Iudicis, inquisituri Medici, invenere nec ventris vulnere, quod ad interiora neuriquam penetrabat: Nec frontis contusioni mortem hæc imputandam, Verum viram ademptam fuisse partim per inflammationem cerebri, ab eff. acto osse excitatam; partim vero, & quidem potissimum ob jecur, septum transversum ac intestina, ut summe inflammata à morbo rixam præcedente: Sic undiquaque foetidissimo pure perfusa ex inveterato abscessu, per turbas hæc id temporis disrupto: quo lumina Iudici prælato absolurus fuit uterque reus cædis intentatæ.

**P**urimi inque interest sententiam suam hand leviter ferre, hodie in re tam gravi amicitiæ aut hostilitati aliquid dare, quin potius soli veritati litare. Cavetis ergo Medice aliter loqui, aliter sentias, sit tibi religio nunquam Iudicem in fraudem illicere: Certus aliis vulnera, aliis curantis culpam; aliis propriam pertinaciam, lethalemve aliquem morbum clanculum alicubi in visceribus latitantem mor-

tem accelerasse: quorum abditorum morborum causa hand satis fuerit acquisivisse in naturam vulneris, nisi simul perferueris corpus universum, ne inconsiderate asseveres quenquam subissi: speciem ejus ut occisi quem fors tua peremit, Neque enim minores Deo pœnas dabit qui insontem damnat quam qui fontem absolvit. *N. Tulpius Observat. lib. 4. cap. 6.*

## OBSERVATIO XV.

*Vulnus capitis lethale ob ægri debilem constitutionem, & alium morbum accedentem.*

**A** Nao 1586. 5. Novemb. aperuimus caput Pandochæi ad Cygnum aureum cui vulnus cæsum die Octob. 11. factum fuerat digitis quatuor supra aurem sinistram: Exspiraverat hoc die circa 9. matutinam, Et quanquam vulnere mors imputabatur, deprehensum tamen est salvam non omnino penetrasse, imo ne rimulam quidem tenuissimam intulisse: Et licet puri quid simile intra cranium parit læsæ adhaereret, transudasse tamen id potius putandum: quia illic perquam tenue os cranij, propter vulnus in calvaria adeo adæquum existeret: Quin & squama pollicis latitudinem habens, necdum omnino se-

parata cranio intus adhærebat, infra quam earo novella, (quam separationem moliens, fuerat, vulnus jam cicatricem majori ex parte duxerat, adeoque æger ipse ante dies aliquot in calidam descenderat: Sed incidit in dolorem lateris, ut difficulter spiraret, & sanguinem mittere opus fuisset: Is vero cacoehymus ac decolor dicebatur fuisse: Sane ille qui circumflecto capite effluebat, valde nigrescebat, adeoque talis erroris aliquid coagulati, apertæ cranio, intus circa verticem latitudine Daleri hærebat. H. *Smetius Miscellan. lib. 10. p. 561.*

## APPENDIX.

*De difficultate curationis Vulnerum capitis apud Florentines, &c.*

**R**etulit mihi *Alexander Minchinus* se observasse longa experientia in capitis vulneribus cum fractura ossis, quorum hoc anno 1566. Florentiæ nullus evasit, quod ægri, quod mortui viderentur, eo melius semper se habere dicant: Sunt autem Florentiæ capitis vulnera fere semper lethalia, adscribunt id aëris subtilitati: Deussarim locum incidunt & terebra os perforant, robulque p. n. exemptis, vulnere pecias cum oleo rosaceo omphacino applicant; in circumferentia etiam eodem loco locum inungunt ad inflammationem prohibendam: huiusmodi vulneribus affecti aliquando usque ad 14. bene se habent, dein perniciose symptomata, tandem mors excipit: Primis diebus à vino & carnibus arceatur, sanguis à basilica dextra ad revulsionem mittitur, temperantia imperantur, corpora purgantur diacassia & diaphtenico: vulnere mel rosatum cum oleo rosato infunditur: Præferuntur syripi præparantes, fenestraz clauduntur & ignis in cubiculo accenditur. *Jeremias Martinus Observ. Medic. 18.*

Ipso eventu sæpius verissimum apprehendi, cum in N. scolio Florentino praxim assistentis titulo exercerem, ex xl. quos uno anno habuimus in capite, etiam leviter vulneratos, vix quinque evasisse: frequens enim hoc ibidem est ut levissimæ capitis plagæ mortem inferant, cuius rei certum indicium habetur si vulneratus statim in terram cadens vomere incipiat, hoc enim meningis & nervos compari ostendit: crediderim fortasse ex nimia & penè superstitiosa curandi diligentia hoc evenire, qua vulneratum statim ab hominum consorcio separant, venam faciunt, præparant humores, purgant, non spernenda quidem intentione: interrim tamen siti & fame ferè enocant, sola panatella exhibita, in vulnere perpetua putrefactione desudant lumenque penitus arcent, quibus vel solis naturam debilitare possunt: Ipsam aëris subtilitatem adscribunt: quod sane ut negari non debet, ita reliqua an tantopere convenientia cuiusvis iudicandum relinquo: Senibus in Erruria crurum vulnera & fracturæ eodem modo ferè semper sunt lethalia quæ capitis Florentiæ, eandem fortasse ob causas: ut enim sæpe multa sunt negligenter, ita interdum quædam etiam cum cura citra necessitatem. *Ioh. Valerius Rumlus Observ. Medic. 76.*

Vulneribus ac plagis recentibus singularis est cœlestis utilitas, neque istibus capitis exceptis: Utinam igitur in procurandis laucis hominum capitibus in medentium omnium usu esset hodierno die Neapoli; Non sic fortasse miserè præterque opinionem sæpe cederent levissimæ plagæ: Porro sentiunt rectius quam nos Medici Melitæ, qui quod audio, non meliorem volunt in his (capitis vulneribus) curandis esse, quam medicinam Christi & Samaritani: Evenitque res feliciter, ita ut ex vulneratis centenis vix deperat unus nobis, quemadmodum contra è centenis vis servatur unus nobis: Causentur cœlum, obijciant temeritatem, humiditatem, varietatemque aëris & venarum: Equidem medicamenti importunitatem perniciosi mortisque hominum causam maximam opinor: atque id eo maxime, quod quæ maxime adstruunt medecines corporum humiditatem atque languorem, in defaicientibus ad putredinem non oportet foveri conterique. *M. Aurelius Severinus Chirurgia Trimembris l. 5. c. 21.*

## OBSERVATIO XVI.

*Hepatis abscessus in capite vulneratis non raro repertus.*

**N**otandum sæpe vulnerato cranio excitari Apostema in capite, id quod à me, *Roberto Graume*, Parisiensis Facultatis Medicæ Rectore, & *Binosquio*, Chirurgo Iurato in tribus ægris nuper animadvertum. *A Pareus oper. lib. 10. cap. 9.*

**Q**uod Hepatis Apostema illis in quibus caput insigniter fuit vulneratum (id quod in speculo de vulneribus muscoli temporalis lethaliibus; ex plurimorum cadaverum apertione edoctus testatur *Joh. Valsingus*, cœa refert *Jo. Theod. Schenckius* Exerc. Anatom. pag. 177.) quandoque superveniens causam cum Parto in purulentæ vulnerum materiz in metastasi quam etiam *Samarg. Siegelus* apud Cl. Velschium Obs. med. Epil. 56. agnoscit, quatenus nempe ista sanguini mixta, & cum eo; vi circulationis ad

spiritibus, quorum ministerio ad subrogandum hostilem istum liquorem opus haberet, nullus est contra exiguis venis, facile a crasso sanguine obturui aptis prædium) delatum, illud exulcerare ingeniose tradit. Quamvis hæc sententia antiquorum, Parzi nempe, & qui cum eo faciunt, contrariari, prima fronte non videtur, cum ubique sanguinis a pure inquinatio proponatur, *Barbetteum* tamen de spirituale quasi inquinatioe & contagio, ex purulento vulneris humore in sanguinem derivato intelligendum esse credibile est; tunc est contra *Parum* ipsius purulenti humoris cum sanguine permiscionem & transpositionem proponit: mihi tamen posteriorem hanc opinionem hand esse improbandam verosimilem videretur, idque probare puro *avensio*, dum in his qui capite vulnerati abscessus hepatis incursant, ultimis ante obitum diebus vulnera licciota, purisque imminutio deprehenditur. Unde hoc sentim ad venas sibi viam parando, & penetrando, in eas recipi, inque hepar deponi credi possent: Quæ sane vulneris exsiccatio ut contingeret, nequaquam necesse foret, si spirituale saltem puris coctagum in sanguinem transfret: quia & hac ratione & in omnibus vulneratis & exulceratis apostemata hepatis, contradicente tamen experientia, observari deberent, cum sanguis quibuscunque in partibus infusa vulnera & ulcera circumfluat, atque sic cogatur semper puris subtiliores particulas admittre ac iisdem inquinari: Sed obistere forte hunc asserto posset fonticulorum in febribus sæpe observata exsiccatio, quam non tali puris metastasi, sed aliam ob causam accidere communiter docetur, siue quod a calore febrili humidiores corporis partes absumantur, siue

calor naturalis ob imbecillitatem contrariam, in expurgando & concoquendo humore purulento deficiat: unde etiam hanc ipsam ob rationem vitæ periculum denariari apud Practicos in consensu est: prout etiam ipse *Hippoc.* libro de vulneribus capitis signa inter lethalia febrem primo loco ponit, eaque dum supervenit vulnus saniem modicam effundere restat: Verum nervum hic locum habere potest, cum quidem tali affectu prehenso vitæ discrimen suble, certum sit, febres tamen istam puris diminutionem non semper præcedit, sed tantum insequitur; id quod clare satis ex *Meckerani* relatione habetur, qui vulneratum suum paucis ante obitum diebus de dolore dextri hypochondrii conquestum fuisse, & simul pus decessisse, febrem autem successisse memorat: Vixit etiam, quærum potius ratio in caloris nativi integritate consistit, decremendum cum febre demum intercessisse ibidem habetur; Non impossibilis est illa materiarum purulentarum transpositio, cum & in illis morbis eandem accidere apud omnes extra dubitationem positum sit: quod *empyricorum* puris per urinam non infrequens, evaca acio imprimis ostendit. Aliam transpositionis purulenti humoris modum ostendit *P. Marchandi* (vide *Schellæ ad §.*) viam tamen per quam diffusio iste coctus non clare exprimitur: quam sote intrinseca musculorum & reliquarum partium suppositum potuerit, ita ut pus sensim ipsis se insinuando, eaque penetrando, tandem pleuram, ut authoriconit, aliisque partes erodat, sicque in cavitatem pectoris & abdominis delabatur. *Lucas Scroverius junior, schellæ in observ. xxi. Johannis Helwigij.*

§ 2. Plurimos vidi capite vulneratos, nullo vehementi symptomate accedente, morte tamen sequuta, si præsertim febris tertio die invaderet: Sed in omnibus fere qui sic interierunt, abscessum reperi in substantia jecoris. *P. Pigray Chirurg. lib. 4. cap. 9.*

*Congestio ante obitum de dolore, &c.]* Observavi sæpius quod quando in vulneribus capitis cum fractura collum dolere incipit, parte posteriori postica & laterali, tunc materia purulenta delabatur ad thoracis & abdominis cavitatem: quæ longi remora, cum pulmones tum pleuram aliquas nempe ipsorum partes erodit, ex quibus multa sanies emanat, quæ postmodum ad abdomen delat, cum Jecoris & Lienis labe, in quibus varias pustulas excitat: quibus disrumpis, perinde ac ex pulmonibus & pleura, ita & ex his materiis purulentis effluit: Quin quam hujus observationis ignari existimant abscessus obortos in his partibus, quorum ratione patientes moriuntur, non ex capitis vulnere, quod ex capite copiosius pus posse ad inferna viscera delabi non sibi persuadent: Prout in plerisque observavi medum thoracis & abdominis cavitatem fuisse pure repletam. Quam observationem multis tum in theatro Anatomico, tum in valedictorio S. Francisci demonstravi. Petrus de Marchentis Observat. Medico-Chirurg. xv.

Dicunt quidam se observasse in plerisque eorum qui a vulnere capitis insigni interierunt, abscessum in concavo jecoris parte: Qui id fit questione dignum est: Primum istud est verum quod *Hipp.* & *Galen.* scribunt, præciso cerebro & febrem & bilis vomitum supervenire: bilis revomitur, ut *Gal.* aff. 2. §. ventriculo qui cerebro comparitur, ad os enim propago nervorum insignis pertingit: Imò, ut *Galenus*, in magnis doloribus, & vehementi motore, ad ven-

triculum biliosa superfluitas coarctat, maxime si ventriculus male affectus fuerit: unde ergo in concavo Hepatis abscessus fiet: Quidam dicunt a cerebro per continuitatem membranarum infernatum, inspersuam, sensim pus manare & progredi eo donec ad hepar pervenerit. Id non est probabilis: Affertam meam conjecturam, quando demonstrationem aut *dissectionem* vi huic adducere nequeo, desinam: quæ ex eo *Galen.* loco, supradicto: Vulnerato cerebro membranæ affectis, os ventriculi coarctatur, humoresque petturbaotur, unde bilis vomitur. Si multa si bilis excreta, ea ab abscessu videlicet potest: si pauci & frequens est nausea, ut quia æger vomere non consuevit, aut quia bilis crassior, motus difficilis & quodammodo incuncta: aut quia libertas metum non est, dum humor moveri & non excluditur, oppressionemque facit aliquam, potest in concavo hepatis colligi, & inflammari, & præter symptomaticam febrem, quæ excitatur, materia capitis essentiali febrem coarctat: hinc collectio hinc inflammatio, hinc abscessus: Accedit quod in vulneribus capitis negant dandum phlegma: si daretur, & vacuaretur bilis commota & non exclusa, ab abscessu liberaretur æger: Nonquid in febribus essentialibus abscessus in concavo hepatis fieret nisi Medicus daret operam purgationi? Et quia os comparitur ventriculi, natura sua superfluitas mittit ad eam partem, obstruas quia non excluditur materia; phlebotomia & purgatio esset vindex ejus abscessus: Et nuper in quodam qui pugnare vulnera-

ne erat, tamen in internam capacitatem vulnus intravit, et in thoracis costis, qua pertingit diaphragmatis extremitatem, non penetravit, tamen in Hepate repertus est

abscessus, unde idem forte eodem modo quo in vulneribus capitis. *Grul. Ballonius appendice libelli de Cerebrationibus.*

§. 3. Paulus Marquardus Slegelius observavit omnes illos qui ex vulneribus Hepatis mortui sunt, conquestos ante obitum de dolore lienis aut hepatis, atque in cadaveribus illorum semper invenit abscessum Hepatis, quem per transumptionem fieri arbitrabatur, quia tunc temporis vulnus plane siccum conspiciatur, & inter lethalia signa certissimum puretur. *Velschius Epigram. Observ. med. 56.*

§. 4. Dicunt quidam se observasse in plerisque eorum qui à vulnere capitis insigni interierunt abscessum in concava Jecinoris parte: atque id à plerisque Chirurgis observatum esse scio. *Ballonius loco supra citato.* Qua ratione id contingat questione dignum, Ac præter ea quæ ex *Ballonio & Marcheni* adducta sunt, in considerationem adduci merentur quæ affert *Vallesius* comm. in sect. 2. lib. 6. Epidem. p. m. 395. de vario humorum motu sursum aut deorsum, unde generatio Abscessuum. *Quum sunt vene temporum non subsidentes,* inquit Hippocr. *sed tumide, neque color splendidus, & difficulter reddunt spiritus, & adeo infus sicca non serena, expectare oportet abscessus ad articulos:* Dices hæc signa esse raptus humorum in suprema, igitur capiti timendum esse potius? certe ita est, significant hæc rapti sursum humores, quibus proinde si accedat aliquod aliud periculofum, eorum quæ convulsionibus aut demenciis solent præmonstrare, capiti timere oportet: Si vero nullum horum accedat, expectare oportebit parotidas, aut abscessus ad articulos, superiores quidem plerumque, nonnunquam tamen etiam inferiores: Non raro enim qui in caput ferri coeperunt humores, inde repereussi retrocedunt in partes humiliores; Neque mirum cum dictum sit sect. 5. lib. 2. Si caput doleat in pectus descendit, deinde in hypochondrium, deinde in coxam.

§. 5. Quidam in capite graviter vulneratus, cum non sine vitæ periculo evasisset, post menses aliquot interitit, daritit cum dolore in regione hepatis laboravit, &c. obiit vero ille eodem die.

Indissecto capite nullum vitium apparuit, Hepatis vero substantia fere tota absumpta, ipsiusque loco putrilago, &c. *Vide lib. 3 tit. de Hypoch. doloribus.*

§. 6. Abscessum fecurum partium internarum Cranii fracturam non uno confirmatur exemplo, Nosocomium hujus loci publicum exhibuit & nobis & alijs considerabile Otto Reyzersia, Oldenburgerensis: Vulnere hujus capiti infixerat triplicia socius, quorum præcipuum occipite occurrebat ad futuram lambdoideam, fractura cranijs quæ *Exphora Hippocrati* vocatur, ubi nempe fragmentum se dimittit ad inferiora, sic ut sub osse integro abscondatur stipatum: Ad remotionem fragmenti dicti Trepanificationem instruere consultum duximus, quod etiam successit, Ad diem usque xx. liber omnino æger à omni febre, convulsione, paralyti, sopore, vigiliis, vomitu, imo symptomatibus omnibus quæ fracturis cranijs supervenire solent, Ar paucis diebus antequam moreretur, de dolore gravi circa Hepatis ventriculi que regionem conquestus est: Querelas inter, purulencia in vulnere existens, quæ copiosa valde, imminuebatur admodum, labiorumque vulneris, similiter ac fandi ejus, insignis notabatur siccitas: accebat febris gravis cum delirio, &c. die xxvij. die obiit.

Eodem die ex mandato Magistratus caput defuncti aperuimus, in quo fractura occurrit ejus conditionem suo loco demonstraturus sum, Ast ad ventrem ipsum, ejus dolor valde fuerat molestus: Hepar invenimus valde tumidum, abscessu notabili correptum, ex eo enim aperto puris ea effluxit quantitas quam pinta dimidia vix continere poterat, Ex capite hanc materiam eo defluxisse probabile valde, ast per quam viam hoc factum ignotum nobis. *Ioh. Meckeren Observat. Chirurg. ij.*

Ad questionem, Tum ex veterum fundamentis respondere licet: Est hæc, Cum vulnus cerebri superius sequatur suppuratio Hepatis, quæritur per quas vias materia purulenta ex cerebro ad Hepar deferatur: Consensus qui totus est, partiumque omnium in specie spectatarum, magnus valde atque diversus, ob ipsarum, vasorum sanguiferorum novorum &c. multitudinem, atque diversitatem, quorum totum corpus pererrantur beneficio, quoribus vel abjectissima corporis pars male constituta, illi co fluxus præternaturalis communicatur cerebro, imo toti microcosmo: Constat tamen, nec inficiari posse, notabiliorum esse consensus qui est partium ipsius corporis ventre contentarum eo qui est partium

his inclusarum ipsorumque artuum; Ratio quæ proponitur confirmat, & experientia, imo & authoritas, perpende quæ magnus nosset *Cassius* hac de materia habet: *Constat, præter c. 4. §. 1. Capitis dolor vehementer cum febre acuta &c. alio signa maligna lethalis est: Ceterum siue signa mala, xx. diebus transmissis, sanguinis fluxum, aut puris exaribum, aut abscessum ad internas partes significat &c. ibidem §. 28. Et aphor. 6. 50. Quibus præceditur cerebrum, his febrem &c. biliosam omnium supervenire est necesse.* *Galenus, Erasistratus, Macrobius,* alique non solum confirmant ea quæ Antecessor allegatis locis docuerat, sed & rationes addunt varias, à distributione varia nervorum, sextæ imprimis conjugationis, quo-



quorum ingens in ventre medio & infimo datur copia, maxime in ventriculi officio superiori si sinistro desumptas; Haud displicuisset si meninges cerebri præteritis addere placuisset, eo quod præcordis sinque ventris interforatægant, mutique consensus eorum vel maxima causa sit, ut in stermentatione, rursi, vomitu &c. evidenter patet, Hic via fere doctæ, quæ manifestior foret si liquidum cum *Glistro* nutrimentum partium nervosarum per nervos adduci statuere liberet, nervorum par sextum, vagum dictum, facillime negotio purulentam materiam ex cerebro ad hepar deferret, & cum minus hæc curiosi placere sciamus alia nobis querenda via eaque comm. dicit. 1. Cerebri vulnere supervenire hepatis abscessum certum judicamus. Observationem noam, accurate satis notatam; testimonia variorum in arte exercitatorum Medicorum æque ac Chirurgorum, confirmant adeo ut de certitudine dubitare nec queamus, nec debeamus. 2. Pus idem numero & specie, à cerebro ad hepar deferri (contra ac te j. idicare scimus) minime admittimus, ac hic collectum pus aliam omnino agnoscere causam quam quæ est puris in cerebro. 3. Sollicitum me nunquam declaro qui inquiram in rationem cur veteres solliciti adeo fuerint ut quæ affectus hujus duplici causa constaret; eorum etenim eam exhibere neutiquam illi deram, doctina de circulatorio sanguinis fluxu, eaque sua lucis plurimam huic negotio conferret, nec crediderim rationem quæ satisfacere veritatis cultori queat dari posse quæ eidem haud insitit.

Sit ergo hæc ad questionem Tuam Responsio, cerebro vulnerato vasa sanguifera arteriosa similiter vasa, cerebri ipsius, sint live membranarum ejus, sanguis contento uberius perclusæ exitum concedant; hic calore spiritusque privatus sensum putrescere incipit, veramque in materiam purulentam converti: Accedit quod sanguis nutritius circa vulnus ex debito mutari nequeat, unde facile in pus convertitur, & hac ratione suppurationi datur incrementum, nisi natura vel ars inhibeat; Circulare suum motum interius absolvit sanguis, mutationis plurimam non solum in corde, sed & partibus principibus alis affirmans: Corporis sic partes omnes pertrans sanguinis, ipsumque adeo cerebrum male constitutum non potest non pravam contrahere dispositionem: Præve hic dispositio per arteriam carotidum ramulos cerebri substantiam percurrentem;

## OBSERVATIO XVII.

*Oculi dextri Vulnus lethale, ob læsionem cerebri, quod dextra parte purulentum, sinistra pituita serosa plenum* 1. Ob cerebellum simul læsionem. 2. Externi oculi, ob læsionem cerebri. 3. Palpebra inferioris, lethale citra ullam aliam noxam. 4. Orbita superioris ob sequentem meningis & cerebri corruptionem.

§. I. **V**idi juvenem annorum viginti, saucium oculo dextro, fracta orbita, à primo statim die æquans, convulsus dextro brachio & femore per xi. dies, tandem interisse:

Dissecto capite cerebrum dextrum totum fuit purulentum, sinistrum plenum serosa pituita.

12. *Balloeius libello de convulsionibus. p. 37.*

**G**alen. comm. in aph. 2. sect. 5. Convulsio ex vulnere lethalis, Ex vulneribus, aut sunt convulsiones ratione sequentis ipsa vulnera inflammationis, cum partes nervosæ attingit, & primum convelli videntur quæ è directo sunt partium inflammatione laborantium, deinde postquam cerebrum, quod principium est attingit inflammationis, ad totum exten-

§. 2. Famulus nob. de Montespau Gondrin, T. 10. f. 1. in orbita sinistra oculi cæso sauciatus fuit an. 1636. Existimans autem vulnus parvum penetrasse, emplastr. diapalmæ tantum admovit, quo ad-moto, non solum spatium duarum leucarum ambulavit, sed etiam cum socis genaliter vixit, ac si sanus fuisset, nullo enim dolore agitur, tamen crastina die mane mortuus repperit fuit.

Aperto crano, perceptum est manifestissime vulnus orbitæ ad cerebellum penetrasse. *Pe-trus Borellus Observat. 19. sept. 2.*

tes; meningis duto exhibetur sinibus, qui receptum deferant in venas jugulares, & per has in ipsum venam cavam, Atque in ventriculum cordis dextrum, ex quo postquam in sinistram deductus, facillime ad Hepar descendit: In hepate, nobili satis parte sanguinis ultior coctio. à bile itidem alitque excrementis separatio perficitur: Difficultatis adeoque quod subest quo minus sanguis, impetus adeo, hep. par accedat, suppurationi ejus ansam materiam, quæ præbere queat, via hæc parens adeo ut nullas dubitate queam, quin mecum eam intrare haud recuset.

Ac instabilis, cum sanguis corporis partes omnes periret, cor, Pulmones, lienum, Renes &c. quæ causæ subest cur solum hic afficiatur Hepar: 3. Cor substantia consistit solida, compacta caloreque infuso vegeto, hinc paucis subiectum esse morbis, hostem suum vi singulari expellens: Idem quoque lienum præstare, reticulari ex nervorum p. ex. co. positum, hacque sua cinctura non solum ab aliis partibus plurimum differt, sed & quod rariissime in cadaveribus male constitutum reperitur, efficit. Pulmonem, ob substantiæ paritatem vasculumque amplitudinem haud adeo facillime affici posse, Renes impuritates suas sero communicare, sique per urina evacuari permittit: Ar longe aliter cum Hepate constitutum esse, eo quod per venam portæ sanguis illi offeratur multo crassior, feculentiorque eo qui per cavam venam, quæ & color diversus, & consistens varia clare sitis indicant; Ductum lymphæ ad chyli glandulas receptaculæque ventum memens adit, insignis, in quibus ob samentam subtilitatem parvitatemque facillimum humorem subistere, sanguinis conditioni purificationique continuo intersit, præter vasorum biliariorum sanguiferorumque maximam copiam miramque complicationem, vix aliud, ut substantiam componentem agnoscens quam sanguinem concretum, unde & Parenchyma jam à longo tempore dictum; quæ quidem sollicitas aliquid habet, aut fibras possidet minus firmas illis quæ sunt cordis tenacique quibus accedit quod arteriis gaudeat paucis illique exiguis admodum, respectu nempe aliarum partium, hinc spiritum vitalium quantitate minore, unde est quod hostium impetui resistere minus queat, sique morborum plurimorum nutricula. *Paulus Barbetta.*

**F**elicio succellu palpebrae sinistrae offensam, quae ad membranas & cerebrum ipsam transiit, sanatum fuisse refert Idem Observat. & Trepiano, aet. frontis chilocephali, qui ictu passus erat prope palpebram si-

nistram, admozo à D. le Jauf Chirurgo Parisiensi non solum membranas cerebri, sed & ipsas substantias corruptae portio apparuit, quae ab eo ablata & separata fuit, & tamen aeger curatus remansit.

§. 3. *Iob. Beckler*, homo sanguineus, ad iram pronus, aliquando cum Nob. puero gladio obuso pugilum more contendebat, eumque puer Becklerum sub oculo sinistro leviter vulcerasset, vulnere solum palpebram inferiorem penetrante, oculique exteriorem tunica parum contundente: Ille sive ira percussus, sive dolore victus, abjecto gladio humi prostravit: in lectum delatus nihil loquitur, post aliquot vero horas fortissime *Epileptico paroxysmo* correptus obiit.

Post mortem ablato cranio, examinatoque diligentius vulnere, nulla laesio, praeterquam quae exterius videbatur, deprehensa fuit. *Iohannes Mathiam Observat. Med. casu viij.*

§. 4. Oculi lethale vulnus in cive quodam hic vidi, qui gladio acuto, ad extremum dextri oculi angulum vulnus, salvo oculo, per orbitam, qua nervus opticus oculum ingreditur, in cerebrum usque profunde penetrans accepit, unde vasis passim discissis, magna sanguinis copia in cerebrum effusa reperta est: E quo vulnere ipse apoplecticorum more statim attonitus concidit, & circiter horam novam postea mortuus est. *Sennertus praef. lib. 4. part. 3.*

**N**otandum de vulneribus ad cavitates quae sunt inter utramque calvariae laminam super oculos penetrantibus: haec sunt lethalia, quod cerebrum non attingunt, difficillime tamen ea sanari, & plenumque in fistulas & ulcera cicatricula transire: quia collegiarum his materia, nisi Chirurgus petius & dili-

gens sit, quae putredinem contrahens, ossa & cartilagineae corrumpit: cum oculis vero ea est affinitas, ut materia purulenta ex vulnere ad eas cavitates defluens, acrimonia acquisita in conjunctivam decumbat, & oculi *aplasia* efficiat.

§. 5. Quidam vulnus acceperat cum tridentis acuto radio in superiore dextri oculi palpebra, sub ipso supercilio, oculi bulbo haud laeso: exigui momenti vulnus habitum, cito quoque in palpebra coalescit: Interim vulneratus sopore correptus fuerit: Adhibita fuerunt multa capiti remedia, non etenim ex tam exiguo vulnere, sed alia ex causa putabantur talia supervenisse accidentia, cum vero nullis remediis affectus cederent, superveniens noxius *Sopor* vitae finem fecit.

De causa mortis cum dubitatio esset & concertatio primum, exemplum est oculus, atque tunc compertum radium non tantum palpebram vulnerasse, sed ulterius progressum os illud penetrasse, quod cavitate fura oculi bulbum continet: Exempto vero & frontis osse, apparuit durior membrana & vulnerata & sanguine multo perfusa, jam corrupta cerebri proxima vulnere substantia ac vitata, quae procul dubio exitii causa. *Des. Iacotius comment. ad aphor. 3. lib. 1. sect. Coacar. Hippocr.*

**H**ippocr. 1. *Proverb.* statim in initio, & in Coacis praenotat, quaerit an hic affectus phrenitidis sit? *Qui soporosi, inquit, inter omnia sunt cum capiti, lumborum, praecordii, collique dolore, vigiles non phreniticos sint?* Responder *Gal.* in comment phreniticos, non appellari (propterea scilicet) nisi feblicitate aeger, continuo deliret, ac contrivitate dementiae, quodque simul cum febre fiat phrenitis agnosci: Phreniticos tamen & hos esse, qui soporosi existerent sapient, sed &

delira quandoque loquantur, atque à praesentibus expurgati stupidi similis videntur, & tales quidem fuisse de quibus Hippocr. Epid. lib. 3. Sect. 3. sic scribit, *Itaque phreniticorum quique insensum, ut in aliis, sed alia quaedam in somnum delatione capite gravati moriebantur* ex quibus apparet hunc cui praedictum os laesum phrenitidis dici potuisse, cum ex ipsa excitatus mox in soporem relapsus, subinde ad interrogata rectè responderet, quandoque vero aliena. *Idem.*

## OBSERVATIO XVIII.

*Vulnus Nari & Genae inflatum lethale, ob relicta ferrum vulneris causam.*

**A**NNO 1606 quidam musquetum exoneravit, crepante tubo pars ejus sex longa pollices, sesqui digitum lata, per narem ultra auriculam sub pericranium ipsi adacta: quod cum Chirurgus, etsi senex, non animadvertisset, narem genamque consuit, ferro secante intus relicto: dum illi medetur, quoties faciem tangit, sanguinis plurimum, ferro acutissimo carnem scilicet scindeat, emanabat:

Nono die mortuum (nec enim vivum vidi) visens, secit à Chirurgo futuris, cum illum rasori apicem fragrantem viderem, ad motus digitis ferrum adduco: hunc educto ferro, vel potius ferro, curari potuisse certissimum est: Infans enim dolore & nimia haemorrhagia enatus est. *Idem. ab Idem Observ. viij.*

*Vulnus Brachij lethale ob sequentem gangrenam & subsistentem globulum plumbenum intra os humeri.*  
 1. Ob vitiosam viscerum constitutionem. 2. Punctura Brachij lethalis ob lesam cum vena certam.  
 3. Caspi vulnus lethale ob arteriam substratam per longitudinem divisam. 4. Vulnus interius brachij lethale, ob profusam hemorrhagiam, & ob acutissimam quæ stypticæ. 5.

§ 1. Cum obsidione premeretur Rothomagus anno 1562. Navarra Rex globulo plumbeo à sclopeto emisso in humero vulneratur: mox curæ commissus fuit, & Mag. Gilberti, ejus Chirurgi Mospeliensis, & aliorum: globulum, quanquam sedulo explorarem, reperire non licuit, unde conjectura assequutus sum eum per caput ossis, hujus cavitatem subingressum esse, unde imperferutabilis esset: Plurimi corporis cavitatem subisse, ubi delitesceret, affirmabant; Quævis à me Celsiss. Princeps *A Rupe Saryon* num vulnus esset lethale; quod affirmavi, eo quod vulnera quæcunque majoribus artibus inflicta sunt, maxime si contusa sint, ex omnium sententia, exitiosa sint: Cæteris Chirurgis, & ipso Gilberto, sanationem spondentibus, consultatio facta jussu Regis, Reginæ matris, Eminent. Cardinalis Borboni, Regi Fratris, & aliorum: nullus eorum à prognostico recessit, quæ causa fuit ut dictus Princeps, in cuius benevolentiam deveneram, perinaciam objecerit, quod solus exteris obluatur: Respondi, si forte sanationis signa deinceps illucescerent, me quoque cæteris assensurum: Plures dehinc institutæ consultationes, sed opinionis tenax fui, gangrenam semper prædicens brachij, quæ revera successit, ac tandem obitus xvij. à vulnere die.

Nuntiata Regis morte dictus Princeps *A Rupe Saryon* globulum inquiri iussit, ejusque mandato lubenter parens, asserui sine magno labore illum me reperturum; quod plurimis præsentibus factum: Ipsam cavitatem ossis, humeri parte superna, subintravit, quem dictus Princeps Regi & Reginæ exhibuit. *Partem Apologia p. m. 122.*

§ 2. Quidam vulnerati fuere in partibus ad vitam non necessarijs, qui tamen mortem obire, vel ratione constitutionis temporis, vel eacochymix redundantis, & ad partem lesam confluentis, vel aliarum causarum: Revera eadem tempestate, eodem anno, imo die, multis æque periculosa inflicta fuere vulnera, contingit tamen ut qui gravius fuere vulnerati, imo morti adjudicati, aliquando evaserint, sub lata admirationis causa post cadaveris apertionem, nam præter vulnus alia mortis causa manifesta se exhibuit. Id recens contigit Nob. de Boly, Baroni in Touarcé, Regi d'iveret, qui sclopeto in brachio sinistro ictus prope Rothomagum, fracto cubiti osse, quanquam vulnus rite fuit ad digestionem perductum & mundificatum, ac cito laudabilis, rubra & granulata gigneretur, nulla intemperie & caractere naturalibrachij, tam supra quam infra vulnus, contigisset mutatio, nulla accessisset phlegmone, pauca vel nulla febris, nihilominus xx. à vulnere die domum delatum febris maligna & ardens prehendit, tricesima die lethalis, industriam & cura doctissimorum Medicorum, inter quos eminor Dominus Ambrosinus Medicus Regius, nulla in parte vulnerata, vel in ipso vulnere superveniente, præterea vitiosa constitutione.

Aperto cadavere pulmones deprehensi sunt omnino purulenti ac scirrhosis tumoribus repleti, Ren dexter putris cum putis copia in vesica; à quibus non à vulnere mors pendebat. *Idem Guillemean operum p. m. 8. 2.*

§ 3. Ante annos aliquot Sattoris cujusdam Argentoratensis uxor venam sibi brachij dextri secari curans, puncturam nervi à Barbironfore passa est: subsequuti statim sunt dolores acerbissimi, qui nullis placari poterant remedijs: supervenit phlegmone ingens, deinde spasmus; tandem doloribus, vigilijs & inedijs enervata, incidit in convulsiones epilepticas, & sexta mortuo (erat enim gravidæ) excessu, diem suum obiit extrema septimana:

Ex brachio, quod erat abbreviatum, & in tumorem insignem, cumque laxum & mollem, & qui præmentibus digitis cedebat facile, foveasque admittit, bar profundas, aperto, maxima ferrosi humoris copia effluxit, grumi quoque sanguinis plurimi, iique putridi & fetidi, convulsio nem procul dubio causæ, à dissecatore extracti: *Bernardus Suevum de inspect. vuln. lethal. & sanabil. parte 1. §. 2.*

**P**uncturam nervi &c. Anno 1669 Clarissimæ conjugi Joh. à Spanheim. à venæ sectione totum incurrat brachium, subito prius timore ad magnitudinem ori columbini circa puncturæ locum: dolor erat ingens cum contractionis metu, extendere enim brachium non valebat: multa tentata sunt pericula,

sed hoc unum profuit, stillicidium scilicet sanguinis equi è vena petrusa, à quo statim explicare valuit brachium cum remissione doloris: Ad dissectionem tumoris, in loco ictu superstitis, admovi emplastrum ex gummi elemi, cujus ope intra octiduum penitus disparuit.

§ 3. Nob. Germanus anno 1645. in singulari certamine acutissimo gladio in carpo manus dextere vulneratur, ictu versus cubiti flexuram tendente: Diu prostratus jacuit, in pagosemihoræ spatio ab urbe diffuso: Interim multus profunditur sanguis, qui cum im-

petu

peru & salu exillebat, unde de latione arteriz constabat, urbem semianimis defertur, ob enormem sanguinis effluviu, cura tamen sedula trium Medicorum, totidemque chirurgorum vita ad xv. prerogatur diem.

Adaperto post fata brachio. inventa est arteria secundum longitudinem divisa, ad quinque digitorum longitudinem. hinc cum adhibita enzema osculum tantum arteriz apparens attingerent & obturarent, hiante reliqua fissura, non minus universum sanguinem hac via exitum affectasse & letho fores aperuisse.

§. 5. Notissimus hodie liquoris illius Styptici usus, quam Gallus ante triennium per Enropam circumtulit, ubere ob dividendum hinc inde seccetum marsupij proventu: Est sane cur inventum laudemus in vulneribus, ceterum inflatis, sed in punctum non perinde experimur utilem, Quia & in hamorrhagia narium compefcenda sepe inusilem deprehendi, scilicet quoties ora vulneris ubique attingere licet est suus ipsi honos, ceteroquin hebescere vel quod sequitur exemplum clare docuerit.

*Ioachimus Nichel*, civis noster, in duello saucius, ictum gladii excepit interna brachii dextri parte, paulo supra cubitum: penetraverat autem ferrum largo & profundo vulnere ad ipsam usque alam, fissa quoque, quemadmodum postea constitit, arteria, vocatus Chirurgus familiaris *C. Vrsedius*, ex arte vulnus tractavit ad xi. usque diem, ambiguus tamen futuri ob ichorem tenuem & sanguinolentum quotidie profluentem, nullo puris laudabilis indicio: Sed ecce xi. die improvise tanta vis arteriosi sanguinis subito prorupit, ut zger in deliquia ageretur, & in metum Chirurgus, scil. grumus sanguinis, qui jam ante hlatum arteriz malefido obice clauserat, nunc demum in pus conversus laxaverat januam exituro cruore: Accersitusego, tentatis jam frustra aliis, quæ ratio & consuetudo in simili casu suggererent, propono aperturam vulneris ad usque locum male affectæ arteriz, sed renitente zgroventum ad eam stypticam, quæ per aliquot dies subinde injecta licet bis reverterentur immensæ illius sanguinis profusiones, novissime tamen stetit rivus in articulos omnes artis excurrente, qui una adfuit *Pb. Haquardo*, cui artificium conficiendæ aquæ illius stypticæ iussu Regio crediderat Gallus, viis tibi tum defunctus periculo zger, me omnia alia suspicante, tum ob superventum ardentissimæ febris, tum ob respirandi iter angustius. Quid plura? succedant spasmi, tumores brachij, & in manu summi dolores, xvij. die obiit zger, laudatur nihilominus aqua styptica, quod egregie fecisset officium.

Aperitur iussu Magistratus cadaver, ut de causa mortis constet; mirum dictu, deprehenditur arteria adhuc quidem aperta, sed via quam gladius fecerat, circa arteriam grumis ab aqua styptica generatis oblidetur quo minus cruorem profundat: Interea postquam arteria per vulnus obstructum nihil posset effundere, memor ramen sui officij alio derivavit sanguinem, scil. vicinorum musculorum interstitia oppleverat omnia, nec eo contentus liquor proferperat ad usque medium pectoris: namque inter costas, iterum & pectoralem musculum dextrum, inventæ nobis vel tres librarum corrupti & ferentis jam sanguinis, unde asthma, febris, & denique mori ipsa pependunt. *D. Olav Borrichius in Actis Med. Exc. Th. Bartholini ann. 1674. 1675. & 1676. p. 78.*

## OBSERVATIO XX.

*Inguis vulnus intumescencia totius corporis sequuta.*

§. 1. **R**Obustus juvenis nocturnis horis à duobus ebris circumvenitur, punctumque gladio duobus locis transfigitur: Primum vulnus prope claviculam dextram antèius inflatam, an ad thymum, vel jugulum, vel pulmones penetraret, non facile iudicavimus, considerant enim labia vulneris, nec stilus profunde adigi poterat. Posterius vulnus alterum prope scapulam sinistram thoraci adactum, stilo persequentes, intercitantem deprehendimus: Sanguis expebatur, difficultas spirandi urgebat, tumorque non faciem solum invasit, sed universum corpus reliquum, quod velut sponsia vento plena, quocunque tangebatur, palpitantibus occurtebat. Postridie venæ sectionem suasi & inunctiones ex carminativis, quibus non nihil tumor remisit, sed cum profundo suspirio per vices rediit, sumperque de sinistri magis lateris dolore quam dextri conquectus, sicco vulnere & solidationem urgente, donec 14. die arhelus exspiraret.

In dissecto cadavere, cetera sano, nullum vulnus profundum invenimus, nec ullam partem internam hanc observare potuimus: Sed ingens copia materiz purulentæ candicantis, in sinistra cavitate thoracis, instat empyematis profulgit, sine insigni febre, quæ aliquot mensuras nostras facile implevit, & diaphragmati incumbens respirandi difficultatem & dolorem ejus partis auxit: sinistèr pulmo inusitate parvioris, sed cetera sine manifesto vitio: Ex pericardio crassissimo pus quoque emanavit: *Thom. Bartholinus cent. v. histor. xij.*

**H**inc dubium, an ex vulneribus homo perierit, an potius ex apostemate thoracis interno, quod forte in conflictu ruptum fuerat: Nullus alioqui sanguis extravasatus inventus, paucus in corde & pulmonibus, nisi hinc in thoracem defallavit & in pus postea sit conversum.

*Tumor universum corpus invasis* ] In huiusmodi vulneribus quomodo inflatio corporis sequi possit, inquit *Smerius* lib. 26. *Macellian.* p. 541. Juvenis quidam, ut *Lamberitanus* ex conflictu subter axilla dextra, ad muscoli brachium abducentis insertionem, vulnus acceperat, quod punctum ense angusto illatum, inter tertiam quartamque costam in pectoris cavum usque penetravit: Post die vulneris accepti, mane toto corpore rurgidus & tumefactus apparebat, toto nimirum thorace, dorso, ventre, scroto, nec minus collo, humeris, brachijs, amo vultu & vertice ipso, adeo ut ne palpebras quidem aperire posset: Tumor eratensus & cum dolore non parvo, distensus semper nervosis fibris, quae cutem carnem alligant sensumque praebeant: Huius insolentis monstruosique symptomatis causam deprehendi efflationem pectoris, per vulnus axillare obstructam, iudicem cutem accedentem, quomodo videmus vesicam recen-

tem flaccidamque inserto calamo per flatum intumescere: & sicut laniones pellem ovillam, antequam & quo facilius deglubant, flatu distendere alicubi soleant: Linimentis discurrentibus intra 4. aut 5. dies evanuit tumor. Similem historiam narrat *P. Ephorus* apud *Riverrum* communicatarum observationum primae & *Sennertus* Pract. lib. 3. p. 6. sect. 2. cap. 4. rationem à Smetio allatam clarius explicat, pulmo aë, respirationis organum est, per quem fulgines e corde expelluntur & aër attrahitur, quae actio pulmonis substantia integra & vas omnibus suis recte perficitur, & aëris ille commensus est ad cor & fuliginum à corde: si vero pulmo vulneretur, & simul inter musculos duos, vel musculos & eorum aëris via pateat, quod in utroque vulnere factum fuit, ut debebat, non recta per os & pulmones ad cor transit, neque rursum fulgines recta è corde ad os, sed aër è vulnere, quasi è folle, in spatium inter eam & musculos insinuat, & hinc porro in vicinam penetrat: Esti catarrhi ac serosi humores à capite sub cutem totam musculosam genus pervadere, & per collum ac dorsum ad crura usque & pedes penetrare possunt, cur non & aër ac spiritus flatulentius idem facere possit?

§. 2. *Simon ibsen* in platea urbis nostrae 1660. punctum per pulmones vulneratur, primo die insequenti pectus intumuit, altero abdomen quoque: tertio die, qui vitæ ultimus, universum corpus.

Vulnus in cadavere deprehensum fuit tale, gladius punctum inter quartam & sextam costam lateris sinistri penetraverat per diaphragma: quo vulnere ventriculus & pars aliorum viscerum, & lienis portio in thoracis cavitatem pervenerant, ventriculus ipse vulnerantis gladii injurias sentit: Sinistri pulmonis lobus perforatus, vulnere supra cor ad rectum pulmonem perttansente & 3. costam perfodiente. *Idem cent. 6. hist. 89.*

**N**empe flatibus abundat corpus, quibus etiam sanguis impletur & tumet, hic vero per pulmones eructat suos flatus, quibus in respiratione instatur, ac si vulnerati pulmones non apti sint excipiendis flatibus & separandis, hi resistunt in corpore & in tumorem elevant: hinc n. lésionis die, quia

robustiores adhuc pulmones, plerumque pars tantum corporis superior intumescit. Foras tamen tumor corpus, quia pulmonibus laesio circulatio sanguinis tardatur, unde friget corpus, flatibusque gemitus intumescit. *Idem.*

## OBSERVATIO XXI.

*Thoracis vulnus lethale ob copiam sanguinis in cavitatem illapsi, illasti pulmonibus* 1. 2. *Ob Diaphragma per scellam, per cuius hiatus intestina thoracem subierant* 3. 4. *Ob peritum Diaphragma & Pulmones* 6. *Lateris dextri, ob laesum Diaphragma & Hepar* 6. *Ob Diaphragma peritum, per quod ventriculus in thoracem viam sibi fecit.* 7. *Ob partem Diaphragmatis carnem per cuius hiatus Coli pars irrepsit* 8. *Ob peritum Diaphragma, per quod ventriculi & coli pars thoracem ingressa.* 9. *Ob peritum Diaphragma, Hepar & Ventriculum juxta pylorum.* 10. *Peritum Thoracis mors sequuta ob laesum pericardium.* 11. *Vulnus lethale ob leviter laesum Diaphragma parte carnosa.* 12.

§. 1. **D**om. de Montgeron inter 4. & 5. costam vulneratus fuit, & pugio quidem rectè adactus erat, & mediastinum penetraverat, dein paulum insistenti oppositam pene partem attingerat, & minima etiam sectione sedes ipsius pugionis indagari poterat, & fluenti sanguini, deinde suppresso exitus perari, ac si contraria & opposita fuisset apertio: Sed ut saepe summorum virorum, & fiduciam rerum magnarum habentium, caecitas est maxima, etiam in rebus minimis, quod ratio, quod tactus, quod tumor quidem eminens principio dictabat, nimirum fieri debere eo loco apertionem, id dissectur, negligitur, tandem necis occasionem allaturum: ingens fuit haemorrhagia, insignis alicujus tami venae caeli argumentum: Jussus omnino quiescere, nulla tussis pene toto morbi tempore, difficultas spirandi exigua, poterat in utrumque latus dormire: Quidam ex Medicis volebat experiri num alacer esset in scitigendo, jubebar ut æget paulum se erigeret, maxime ut detegeretur num aliquid in capacitatem esset, quo motu ipso deprehenderetur: Sed ut inter pares invidia facile se jactat, aliis id non placuit, maxime verò quod ejus opinionis auctoritas primi non essent, & tamen id ad explorandum maxime fuerat opportunum: Post 4. diem inirum consilium (quoniam vulnus ad cicatricem tendebat) super his quae ad vulnus attinent, num tuto sineretur claudi, an verò dilatandum foret, an

an omnino claudendum, divisæ fuerunt sententiæ: Alii omnino debere claudî censuerunt, quod multum sanguinis & spiritus effluxisset, quod nil alienum videretur in capacitate contentum; quod *Galenus* & *Gnidius* consilio vulnere thoracis primo quoque tempore ad cicatricem essent ducenda, aliqui fistulæ metum esse & sphaceli alieuius, aut syderationis in pulmone, qui alioqui alieno aëri & externo assueto facile affici alteratque posset: Naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad urinas aut intestina: Pleuritides beneficio naturæ transumpta exustaque materia curari: Alii contra nitebantur, suspecta esse egræ bonæ & præter rationem allevationem: Insigne vas incisum, sic non esse probabile ut intra quatuordecim clauderetur, *Formidabilem esse cicatricem externam*, quod cum pars interna sit membranosa, proptereaque amplius vulnere diducatur quam carnosæ, & tardius coalescat quàm ipsa carnosæ, metus sit ne falsa opinione internæ membranæ ad cicatricem perdudæ, præter opinionem vulnus refricetur & refringatur: actum forte non amplius locus erit pyulco, aut evacuationi suppressæ saniei: Dicebant nihil referre si bene babere videretur primis diebus, sed expectandos alios dies criticos, & quid serus vesper traberet: In his vulneribus tura omnia timenda esse, Non metum esse debere fistulæ nisi vulnus consenuisset. Non ita metuendum esse ab externo aëre, quod plus detrimenti esset, assuturum à suppressa sanie aut pute quam ab externo ambiente: Et quod dictum est naturæ opus committi debere, & alias tutiores vias confinxisse naturam contra dictum noveream & brutam esse naturam, & aliquando veluti consulto pus sanie ad tempus servare, quod cum commode externi non potest, repentina mors obtingit: Sic satius esse eam vulnus hiet & pateat, si quid alienum sit, illac expurgare, quam aut novas vias comminisci, aut occlusum obseratumque vulnus denuo aperire: magna enim esset ignorantie suspicio, & iuncta crudelitatis opinio, Imò & tutissime fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant, & locum esse idoneum sectioni in purulentis: Qui præerat, omnia sic moderari voluit, ut utrique parti abblanderetur, at istæ blanditiæ & temperamenta ægrum perdidit, desitum est vulnus cicatricem contrahere, triumphus ante victoriam canebatur: Porro supprimitur sanies in thorace multa, febris perseverat, alvi profluvium, macies, tandem derepente difficultas spirandi, *plague* & inde mors: hæc contigit circa 33. diem à vulnere.

Apertum cadaver, 3. aut 4. libræ sanguinis saniosi in capacitate thoracis inventæ sunt; Corpus ipsius Pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagione erat velut tabo infectum: & membrana suceingens erat sedita: mirum quod toto morbi tempore nulla pene tussis fuit: Si tantula pars humoris pleuritici facientis tussiculis infert, cur non tanta saniei pars in thorace & circum mediastinum suppressa? Nullus dolor lateris, nullum sputum cruentum. *Gal. Ballonius Paradig. m. 1. & Consil. xxxij. lib. 11.*

[*Formidabilem esse cicatricem externam*] Qui thorace vulneratur, exteriori parte sanescunt, interiore vero non, suppurati sunt: & si interiore parte cicatrix infirma est, vulnus facile refricatur rupta cicatrice *Ballonius*.

*Vulnus refricetur & refringatur*] In thorace, & frequentius in pulmone atrescit sanies, & calore in

crustam versa cicatricis falso creditæ imagine nobis imponit, donec ob thoracis motum & partis mollietatem, levissima occasione excussa crusta vulnus re-  
crudefeat: Si interna & externa pars simul sanescat, evadunt; si simul interna & externa, & cicatrix debilis fuerit, vulnus iterum aperitur. *Ballonius*.

§. 12. Idem contingit alteri ægto Andegavensi, licet enim ingens copia materiei in capacitate thoracis contineretur, nil ore rejectabatur, nulla molesta tenebat tussis, quod mirum est, & forte ejus rei ratio difficilis ad agnoscendum. Licet quotidie per vulnus fluere fere sanguis saniosus, tantum quantum continere poterant decem vascula quibus Tonfores in phlebotomiis uri solent: Incredibile dictu quantum intra dies novem sanguinis impuri per vulnus emanaverit: Insigne enim vas erat vulneratum &c. *Gal. Ballonius consilior. lib. ij. consil. xxxij.*

[*Suppuræ exitus parari &c.*] Suppuratos incidimus sive urimus inter 5. & 6. costam, non procul à transversis vertebrarum processibus, eo enim in loco facilius colligitur materia: Ultio autem fieri debet ferro ad cultri formam facto, excepta cuspidē: Itaque instituenda est ut exteriorum intercostalium musculorum fibræ transversim incidantur, & interiorum fibræ maneant illæse: Facilius enim curatur

vulnus externum quam internum: Hoc olim Legendi fieri vidimus: Inde pus per syringam extrahendum est, nam propter crassitatem sponte sua non efflueret: Sub costis secundum longitudinem parvi canales existunt: qui venas, arterias & nervos recipiunt, quæ vasa ne ledantur dum suppuratos incidimus vel urimus cavendum est. *Johann. Posselius Observ. in Columbi Anat. p. 521.*

§. 3. Anno 1617. cuidam cultellus & longus & acutissimus inter 4. & 5. costam adigitur: curatur toto otiduo, à tussi, respiratione impedita aliisque symptomatis liberrimus, ita ut ambularet muniaque domestica probe obiret: Die 9. cum Chirurgus & sibi sanus videretur, subito animo linquitur, & post apnoeam anhelationemque maximam, viginti quarta hora moritur.

Sectio cadavere, inventa fuit costa nudiſſime ſecta & diaphragma omnino perfectum, quæ cauſa fuit cur ſanguine thoracis cavitatem non occupante, de reſpiratione non conquereretur: & quia diaphragmatis ſolutio continui erat ſtriſtiſſima, etiam ab illa parum incommodi ſentiebat: inflammatione ſuperveniente tenuia inteſtina in thoracis cavum irrepſerunt, pulmonemque & eor ſuffocantur: etiam thorax, quæ parte vulnus acceperat, gangrænam contraxerat; in abdomine puriſſimum. *H. ab Heer Obſerv. xxv.*

**S**ine dubio huic moriendum erat, quæ enim ſectio- ſæm in abdomine, per quam inteſtina deorſum traheret, etiamſi rei, quæ omnes latebat, gnarus eſſet, moliri uſus fuſſet? Quæ via pur in abdomine collectum eduxiſſet: inflammatione ſortia quæque ecceprotica, quibus ſolis pur, ut hydropicorum a- quæ, in inteſtina trahi poterat, contra indicaretur *Idem.*

**§. 4. Alter erat Capitaneus:** Huic glans manuario tormento emiſſa per ſterni ſines, juxta cartilaginem Xiphoidem ſubiens, diaphragmatis partem carneam tranſſit; atque per interſtitium, quod quintæ & ſextæ coſtæ nothiſ interjacet, exceſſit, vulnere externa parte cicatrice obducto: reſtabat ipſi nihilominus ventriculi debilitas, ex quo inteſtina orum dolor, colico ſimilis, ſub veſperam, & de nocte præſertim exurgebat; quæ de cauſa cœnare ipſe, niſi ad modum parce, non audebat: ſed 8. demum menſe, acrius ſolito ſæviente per immum ventrem dolore, è vivis exceſſit, etſi ad minuendam doloris acerbicatem nullum remediî genus eſſet prætermiſſum.

Morui cad. vere diſſecto, animadverſum magnam coli inteſtini partem ſtatu multo turgidam, ipſi per diaphragmatis vulnus in thoracem irrepſiſſe, vinctis tamen amplitudo vix miniſi digiti capax erat: *Idem ibidem.*

**§. 5. Henricus N.** proprio gladio ſe conſecit infra coſtam quartam: vulnus pulmones & diaphragma penetrarat, quod tranſſum in nervo circulo: Pulmonis nihil fere repertum in ſiniſtro latere conſoſſo, quod eum pure exierit: ventriculus totus aſcendebar in ſiniſtram thoracis lateris, *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

**§. 6. Miles quidam** diè 2. Martii, anni 1678. ex inſiſſo penetranti vulnere in octava coſta dextri lateris: periſit hiſce ſymptomatibus: toto morbi decurſu vix febricbat, calore miſiſſimo; non valde anxie ſpirandi difficultas; diè ſexta vermes vomuit, inde pulſus formicæns, ſeptima denique obiit: quæ de re cum mecum verba faceret Eximicus Anatomicus, Chirurghiſ Doctor Dominicus de Roy, firmirer aſſeruit palpabilem diaphragmatis & hepatis leſionem, quod ex ſitu vulneris neceſſariò inferbat: Cum reverà ex reliquis ſignis internoſcere nequirit; quapropter una etſum Clariff. Medicis Emanuele, Oſelia, Revelio & aliis, cadaveris aggredimur diſſectionem, & dem epigaſtrij ſcrutamur viſcera, primo hepar levi affectum intemperie ob vulnus ſatis profundum notavimus, ſimulque vulneratum diaphragma, 2. Veficulam fellis bile omnino vacuam. 3. enormem ſed incorrupti ſanguinis per abdomen extravafationem, à qua tamen nec minima contentarum partium alteratio.

**P**enetrantis vulneris ſignis, inſalibilem de tegebat hepatis & diaphragmatis leſionem; parum tamen varia congerit Galenus ſigna in Arte medicinali, quæ etſi hic darum aut nihil conferant, non attingo: primò itaque

*Febris aderat levis, calore miſiſſimo*] Ratio eſt, quia valida Febris è ſer- enativa procedit commotione obſtrictum fermentum, quod vel intimè ſanguineis inteſtinarum particulis, illas ad invicem coagulat: vel adeo diſſolvitur in acres & malignos degenerent ichores, idæoque fortes febres ut plurimum ſunt eſſentiales, & ſi aliquando ſymptomati- cæ, ardentiores tantùm ſunt quæ à magnis gignuntur inflammationibus, cum ſanguineæ ſi & bili- res particulæ, in ſtammate partu congeſte nonnullæ recirculanti ſanguini miſceantur, quæ fermentativa exagitatione inſolentes ſuſcitant efferveſcentias: cum autem nullæ in illo aderant inflammationes, ſanguis quæ extravafatus per abdomen ſtatuaret, & reſiſto ſanguini miſceri nequirit, hinc eſt quod, valida non inſaſerit febris, ſed tantum levis ex ſolutione continui: Rurſus extravafatus ſupra viſcera ſanguis, dummodo defixus alicubi non congeratur, ſi illa leſerit, rigoriſſicè excitantur febres, ex fibrarum leſione, non veto eximius calor, uti in ardentibus. Hinc eſt quod quândo de ſanguine extravafa-

ſato ambigitur, præcipue in abdomine, ſi levis in febre rigor identidem invadat, inſalibile iudicium quod alterantur partes.

*Secundò, extravafatus ſanguis ſeptem dièbus incorruptus ſervatus*] Proſectò nil communis, quod ſanguis extra venas ſit veluti piſcis extra aquas, quæ de re facultatem quamdam ſanguinis perſervantem venis aſſignavit nimis credula Antiquitas: extravafatum non ſemel vidi poſt ſeptimum diem ſanguinem degenerantem tantum in colore, ex florido in artum: Inferitur hoc ex eo quod ut ſanguis pur ſit, neceſſariò aliquo includi debet loco, idæoque ſuppurationis viſcida fore docet Avicenna cap. 28. lib. 4. ſen. 3. tract. 1. non tam ut cutim conſpiciat, ſed ut humorem in loco magis coarceſcent, & coarceſcentos firmiter retineant. Hinc cum extravafatus ſanguis per abdomen undequaque diſſuſus, ita citò non corrumpitur: Ulterius, conſentient Anatomici bilem ratione ſue amaritiei ſanguinem à cor- rumpela defendere, quapropter cum bilis hoc in cadavere in cyſtam felleam non fuerit ſegregata, per conſeq. bile imprægnatus ſanguis non ita citò ſubdit corruptioni: Cor verò aſſum ex ſanguine extravafato inſigne ſymptoma: idæo quia nullam ex illo contraxere labem viſcera, quæ alterantur in alteratione ſanguinis, qui ſeptem dièbus incorruptus per- manet

manus: Unde symptomata ex sanguine extravasato non nisi post septimam apparent, cum antea non contumpeantur & partes non laedat; si vero citius aliquando se producat in vulneribus signa, uti in abdomine vomitus, diarrhoea, mictio sanguinea, id ratione lesarum partium contingit, non vero ex sanguine extravasato.

*Tertio, vesicula fellea bile vacua:* ] Hoc rarum, cum communis observatio, ex Clarissimo Glissonio mediocriter semper reperitur plena: arguitur nullatenus ex laeso hepate, quia cum sit ad segregandum bilis à sanguine, ex solutione autem continui, & interperie, merito lesam sequi debeuerat actionem, tanto magis, tum ramificationes quasdam cysticas dissectas ex situ vulneris posset dubitari: Vacua ergo repleta est cystis, non quia omnis in intestina descenderit bilis, alioquin inanem ferè semper in dysenteria, & aliis alvi fluxibus inveniremus. Verum quia ab hepate non segregante, recipere nequibat per ramificationes cysticas, vel juxta nonnullos, per meum cysticum, Nullatenus ex suppressa bilioli humoris sequestratione ulla apparuit ictericia nota, quæ adesse necessario debeuerat, Quod contigisse suspicor, quia ictericia provenit ex regurgitatione potius bilis in sanguinem, quam ex impedita illius segregatione; cum sit valde probabile, quod bilis ita flavescens & amara evadat potius in cystide, & non sit hujusmodi in sanguine, qui alioquin etiam amaresceret, unde obstructions in ictericis esse possunt in meatu potius cystico, quam in ramificationibus propriis, per quas ab hepate bilem assumit, quæ nondum amara, dum in residua aliquandiu in cysti contenta miscetur, flavescit & amarescit, sicuti ex miscella vini in

aceto fit acetum, & chyli in sanguine fit sanguis: turgida itaque bile cystis, dum evacuari tentat, descensumque in meum cholidocum promover, cysticum repens obstruendum, cogitur bilem vomere, & diminere per easdem vias per quas admitterat, cum hæcenus obstacula per valvas non reperiantur.

*Quarto, Vermes evomuit sexta die, pulsus formicans, septima obiit:* ] Vermes evomuit, non mirum, quoniam extravasatus supra intestina sanguis, superfluo calore corruptivum inducebat in intestinis fermentationem, ex qua vermes, tanto magis cum bilis amara à cysti fellea in intestina non descenderet, si in vesica non colligebatur vitio hepatis; Hinc defectu amaritiei in intestinis, facilius oriebantur vermes, credendum nullatenus aliquod per porum biliarium evacuaturn fuisse in intestina: ntrum autem bilis fuerit, an diversus humor, certe per porum biliarium non tam bilis, sed omnia sanguinis recrementa expurgantur, hepatisque organum est depuratorium non tantum bilis, sed excrementorum omnium sanguinis, quæ variis in partibus secerni statuerat antiquitus.

*Pulsus semper parvus, inde formicans:* ] Hoc ex paucitate contenti sanguinis intra vasa circulatoria, cum, major quantitas fuerit extravasata & non circularet; Unde cum parum sanguinis expellebat cot qualibet systole, parva per consequentiam arteriarum dilataio, & pulsus parvus: continuè autem disfluebat sanguis sensim in abdomen, hinc de die in diem minor reddebatur sanguinis quantitas in venis, ex qua pauci spiritus, denique pulsus formicans & mors. *Observatio communicata ab Excell. & Clariss. D. Dom. Joh. Baptista Fantono, Medico Taurinensi.*

§. 7. Cum Diaphragma vulneratum est, ponderis sensus eo loci molestus est, delirium invadit, per nervorum qui à sexra conjugatione in diaphragma effunduntur sympathiam: dyspnœa, tussis & dolor acutus ægrum male habent, sursum illa convelluntur, adeo ut inspirationis vehementia contingat aliquando ventriculum & intestina per vulnus in thoracis cavitate pertrahi, quod ego in duobus observavi: Horum unus Latomus, medium Diaphragma, qua parte nervosum est, transfixus, triduo post interit.

Dissecto ventre inferiorem ventriculum cum non reperirem, rem monstro similem arbitrabar; sed tandem anxie perquirens, reprim ipsum in thoracem animadverti, etsi vulnus pollicem vix esset latum: Erat verò ventriculus flatu multo, paucio admodum humore distentus.

*Pareus lib. 9. cap. 30.*

§. 3. Studiose quidam melancholia vexatus proprio gladio se confodit, vulnere intra 4. coctam in thorace adacto, & sub nona cocta in tergo gladio penetrante &c.

Mortui corpore aperto, deprehensum est vulnus per diaphragma & pulmones penetrasse; & quidem diaphragma transossium fuit in ipso nervo circulo: Ventriculus verò totus ascenderat in sinistram thoracis latus &c. *Vide historiam integram lib. 3. cap. de vomitu §. ex Sennerti præf. lib. 2. part. 2. cap. 15.*

§. 8. Francisco Dalen, Capiteo ad Rupellam, glans manuali tormento emissa, per sterni fines juxta xiphoidem cartilagine subiens, diaphragmatis partem carnèa transfodit, atque per interstitium, quod quintæ & sextæ costæ nothis interjacet, excessit: Vulnere parte externa cicatrice obducto, restabat ipsi nihilominus ventriculi debilitas: Ex quo intestinum dolor, colico similis, sub vesperam & de nocte præsertim exurgebat, qua de causa cœnare ipse nisi admodum parce non audebat: Sed octavo demum mense, acrius solito sævientem per imum ventrem dolore, è vitis excessit, etsi ad minuendam doloris accerbitatem nullum remedii genus prætermisum.

Mortui cadaver dissectum, animadvertumque magnam coli intestini partem, flatu multo turgidam, ipsi per vulnus diaphragmatis in thoracem irrupisse, vulneris tamen amplitudo vix minimi digiti capax erat. *Pareus lib. 9. cap. 30.*

§. 9. Militi cuidam gladius anceps paululum infra cartilagineam Xiphoidem intruditur, dolor exoritur, ut & hæmorrhagia, maxima syncope obruit, respiratio intercipitur, singultus supervenit, inferior venter circa pubem plane gracilescit, supra umbilicum & circa thoracem intumescunt partes, loquelam amittit, ac in ipsa syncope moritur.



Aperitur corpus, invenitur ventriculi orificium, & pars sinistra ejus; cum portione duodeni & coli intestini ad thoracem per vulnus (quod in ipso erat foramine, stomacho viam pro descensione ad abdomen largiente) delatum, ac inferior abdominis capacitas circa pubem sanguine abundabat grumoso. *Matthias Glandorpium speculi Chirurgorum Observ. 28.*

§. 10. Generosi juvenes, post enata jurgia, singulari certamine decertabant, factumque est ut al. et alterum sub inam sterni sedem, trium digitorum latitudine à cartilagine ensiformi, versus dextrum latus gladio perfoderet: Nempe cum ille inclinato paulum antroisum pectore, dextrum latus aliquantulum obverteret, mucro pectus ipsum hand aliè penetrans, mox deorsum in abdomen & sinistrum versus ad spinam usque adactus est: Idem ictus duas sterni cartilagine in dextro latere discidit, & deorsum vergens diaphragmatis ambitum perforavit: indeque recta tendens, gibbum cavumque hepatis, & ventriculolum juxta pylorum iterum atque iterum perforavit, tandemque ensis mucro spinæ dorsii paulo subiecti diaphragma, illisus est: *Invenis* quidem primum animo defectus, mox quæ in ventriculo erant, sed eruenti nihil, evomuit: & quod miseris magis, licet diebus septem superviveret, & interea quotidie vomeret, nihil tamen sanguinis toto eo tempore per os eiecit; per sedem verò nodu atque interdum ingentem coagulati sanguinis copiam, una cum alvi fecibus profudit, quin etiam enemata, quæ in eum finem crebro indita erant, eodem semper plurimum tangebantur: Mirari itaque vehementer sumus *undenam sanguis iste profueret*;

Dissecto autem post obitum corpore, omnia, ut jam dictum est, invenimus, *nihil vero sanguinis in ventriculo ejus repertum est. Glisson. Anatom. Hepatis cap. IX.*

**I**nvenis animo defectus est] Vulnere hepatis, si majora vasa dissecuerint, mortis causa habebitur, idque vel eo magis verisimile videtur, quod sanguis illa vasa rapide percurtat; quapropter (preterquam quod fibræ transversum ictu redintegrationi ineptæ sunt) tria magna mala necessario eveniunt, 1. fit totius corporis debilitas, ob jacturam sanguinis, 2. vasorum fines aperti servantur, impeditaque eorum coalescentia ob jugem sanguinis effluxum, 3. Sanguis in abdomen effusus putredinem induit & gravia symptomata apportat, animi deliquia &c. acceditque huic malo quod sanguis ibidem stagnans ægre educi queat.

*Per sedem ingentem coagulati sanguinis copiam*] Fit sæpe in vulneribus hepatis ut sanguis plurimum per alvum deiciatur: Merito itaque querat aliquis, quoniam ductu sanguis ille ad intestina pertingat? Crediderim sane in ejusmodi vulneribus, non solum venarum, sed & pori bilarii ramos discidi: Imo vero fieri vix potest, ut ramos aliquos venæ portæ abscindatur, quin simul etiam pori bilarii pars proportionalis amputetur, siquidem in eadem communis capsula continentur: Præciso igitur poro bilarii aliquo ramulo (cui id officii à natura datum est ut bilem in ductum communem, indeque in intestina deferat), sanguis in eum decumbens, facile eodem curriculo in jejunum penetraverit: Natura profecto laessita,

nova sæpe ac mitta conatur, ut verisimile omnino sit eandem in hoc casu per oscula pori bilarii à vulnere hiantia, extravasatum sanguinem effere.

*Nihil sanguinis in ventriculo repertum est*] Hic rei hanc quædam fuisse arbitror, quod vulnere ventriculo inflata sanguinem omnem in abdomen effunderent, nullum autem in ventriculi cavitatem deponent: Idque equidem credo libentius, quod aliter causa fontica affecti nequeat, cur nihil sanguinis in ventriculo repertum, aut per vomitionem ejectum sit: tum etiam quod ventriculi venæ inter externas, non autem inter internas illius ramos protepani, unde talem constare fieri posse, ut vasa illa foras, non autem in cavitatem ventriculi sanguinem suum effundant: Denique quod in hoc cadavere, teri sanguinisque plurimæ libræ in abdomine repertæ fuerint, quorum pars aliqua è vulneribus ventriculi (foras non intro stillantibus) promanare potuit;

*Enemata sanguine tangebantur*] Quod autem de intestinis dicendum est quæ sanguis grumosis impleverat, præsertim cum de aditu nullo constaret per quem illos pertingeret? Ego censeo (si quis nunc meam sententiam requirat) sanguinem illum à vulnere hepatis, per vasa poro bilarii transversum ictu profluxisse arbitror, eo nempe modo quo jam diximus. *Idem.*

§. 11. Vidi qui thoracis muscolum inter 4. & 5. costas secturus (quamquam ego semper maluerim, longa experientia edoctus, intra 5. & 6. fieri, vel potius infra membranam quæ 6. infernè vestit) ipsum pericardium omnino persecuit (quod cadavere dissecto innovis) unde leiposthymia correptus, redeunte postridie Chirurgo, mortuus inventus est. *H. Heers Observ. Medic. xxj.*

§. 12. Vulneratus quidam Delphis, à Chirurgo imperitior, aut negligentior, saltem non adeo bene tractatus, etiam duobus vulneribus externe oclusis, sanie collecta in ventre & paulo supra diaphragma, rabe tandem consumptus obiit.

Facta incisione, viscera interna læsa non videbantur, nisi quod levis cicatrix, nondum tamen curata, in parte carnea diaphragmatis apparere videretur: Dubium erat indicium, utrum ex vulnere per se lethali, aut potius Chirurgi imperitia obierit. *Forssius observ. Chirurg. lib. 6. Scholio ad observ. iij.*

**S**epi transversa vulnera, parti nervosæ inflata, non ea solum de causa lethalis sunt, quod id continuo est in motu, quierem autem desiderant quæ sapientia sunt, sed etiam quia nervosum est, nervosa autem corpora semel divisa, vix coeunt; ipsa etiam pars carnea vulnerata sæpissime lethum induit. *Idem.*

saltem difficilis gravisque est curatio, praesentim si defluat, quae impedimento est ne labra solutae unitae phlegmon occupavit, quod in ea vulnera sanies rursus invicem coalescant.

## OBSERVATIO XXII

*Vulnera duo pectoris levissima mors sequuta. 1. Pulmonis, cui praecisus lobus, cum parte thoracis proxima coalescentia. 2. Vulnera Thoracis sequentis Abscessus hepatis.*

§. 1. **E**X mandato Praetoris Urbani iussi Chirurgi infra scripti examinare eadaver Fabri illustr. N. qui non ita pridem vespere gladio est vulneratus: Ubi primo inventa exigua punctura supra claviculam in dextro latere prope collum, & aperto corpore nihil prius ex interioribus lasum, quanquam & cor & pulmones extraxerint, inventum: Sed cor valde tenne & exile, nec pulmones ea magnitudine aut robore naturali in sinistro latere, sed ac in dextro: Praeterea puncturam habuit sub sinistra scapula postica versus alas brachii, sed non penetravit: Alioqui reperta magna quantitas materiae semiocta in pericardio, & sinistra pectoris cavitas ea materia fuit repleta: unde fluxerit ista materia certo sciri non potuit, neque dicere licuit hominem hunc ex duabus hisce puncturis mortuum &c.

## Censura Medicorum.

**N**os omnibus circumstantiis perspectis, duas istas puncturas lethales neminiquam fuisse pronunciamus, sed quod collecta in pericardio & sinistro pectore materia potuerit ex his pulmonis interioribus affectionibus & morbis originem suam traxisse, sine ulla externa causa, sive punctura, caesura, aliisque infelicibus casibus, &c. *Bartholinus Cysta medica libro 6o.*

*Nihil prius ex interioribus lasum*] Circa penetrantia Thoracis vulnera accuratim requiritur Chirurgi iudicium, ac notandum quod habet *Columbus*

lib. xv. Anatomiz, Pulmonem, *ait*, in pluribus pleurae connexum vidi, nunc in altero latere, nunc in utroque: atque haec pulmonem in nonnullis cum pleurae connexio in causa pleuritumque est ut Medici decipiantur, penetrantia thoracis vulnera nequaquam agnoscant: quippe qui hoc Chirurgorum axioma putent, omne thoracis vulnus penetrans extra spirare: At in his quibus haec pulmonum connexio cum membrana succingente contingit, possunt vulnere thoracem perforante laborare, neque tamen respirare vulnus cernitur.

§. 2. **P**etro Antonio infligebatur prope urbem Briellam ingens vulnus sub rapilla sinistra, sed eo ob tumultum floccifacito, neque implorata alicujus ope, erupit postredie ex hiant vulnere non exigua pulmonis pars, adaequans magnitudine sua tres transversos digitos: quod grave infortunium non promovit tamen hominem temerarium plagam hanc cum cura habere; Sed contulit nihilominus se faris inconsiderate Amstelredamum, bidui itinere inde distans, nec coercens pendulam pulmonis partem fasciis, nec implens vulnus linamentis, usque dum resciceretur in nostro Valerudinario, in quo illico imperatum emortuam pulmonis partem, filo prius contractam, forscite excidere, coalescente residuo lobo in ipso vulnere; cujus orae coalescant firmiter intra diem xiv. ut vix quicquam impedimenti manserit praeter levem tussiculam, interpolatis vicibus duntaxat molestam: Partem autem hanc lanciimpositam vidimus pendere circiter tres uncias, grande moe Hercules pondus in viscere tam raro ac levi.

Huic homini (velut ostendit sectio post sexennium ipsi adhibita) accreverat duntaxat pulmo in ipsa plaga, quocirca etiam nihil inde pereceperat incommodi praeter levem tussiculam, sed non ita molestam, quin potuerit cum illa non tantum quocunque locorum navigare, verum etiam continenter popinis ac comellationibus interesse, homo dissolutissimae vitae.

**N**on exigua pulmonis pars] Creditum habentes, ut non servatur cui pulmo medius vulneratur, ita utique vix restitui qualemcumque ipsius plagam, sed usus qui omnium praecipuorum superat praecipit, docet evidenter nihil hic trepidandum, sed caute decutendam semitam, quam nobis praevire veteres Praeide (inquit Celsus) quicquid ex jetinore, liehe, aut pulmone extremo dependet; l. 5. c. 26.

*Filo prius contractam*] Sed quorsum retentus praecisus pulmo in coalescente vulnere? Ne ex laceris retractae partis venis flueret frequens sanguis versus septum transversum, eoque in pus converso sequeretur inde misera illa mors, quam suo more recte innuit Hippocr. in Coacis praenot. asserens vulneris thoraci inflati, si quidem extrema pars sanetur, interna vero nequaquam, suppurationis periculum esse.

*Cujus orae coalescant firmiter*] At dicat quis, an non vulneris orae, amplexu pulmonis extremum, impedire evidenter liberum ipsius motum, excitarentque propterea gravem spirituum difficultatem? Sed respondeo pulmonem paucis corporibus esse omnino liberum, sed plerumque agglutinari vel huic vel illi costae; neque tamen propterea evidenter laedi respirationem, nisi accreverit ubique locorum, quod incommodum non semel videre theatra Anatomica *N. Tulpius Observ. lib. 2. cap. 17.*

In quodam qui pugione vulneratus erat, tamen in internam capacitatem vulnus circa nothas costas, qua pettingit diaphragmatis extremum, non penetrarat, tamen in hepate repertus est abscessus, unde id? Forte eodem modo quo in vulneribus capitis. *Balonus lib. de convulsionibus.*

Pectoris vulnus lethale ob Cordis simul & Aorta lesionem. 1. Ob sinistram cordis ventricularem lesam. 2. Ob disscissam arteriam venosam, paulo supra auriculam cordis sinistram. Obitus Henrici Magni IV. Galliarum Regis. 3. Ob transsoffos Pulmones & vasa cordis majora in basi lesa. 4. Ob cor disscissum. 5. Ob cordis ventriculi dextri lesionem, illas Pulmonibus. 6. Ob cor trajectum, quinto die lethale. 7. Ob cor ad dextrum usque finem lesum. Xv. demum die lethale. 8. Biduo post lethale ob cor lesum ad ventricularem usque dextrum, & aliud vulnus diaphragma, ventricularem & hepatis penetrans. 9. Ob basin cordis, ejusque conum globulis duobus transverberatum, & brachy vulnus. 10. Ob lesam pericardium ad cordis usque substantiam, & pulmonum lobum. 11. Ob vulnere cor & pus in pericardio diu contentum. 12. Vulneri Thoracis fistula succedit, e qua pus egressum pericardium & ipsum cor, corrodit. 13. Nono demum die vulnus lethale quod ad cordis cavitatem penetrat. 14. Vulnus cordis 5. die lethale. 15. Ob utrumque cordis ventricularem pertusum. 16. Ob cordis substantiam lesam. 17. Ob lesam sinistram ventricularem. 18. Ob vulnus dextram ventricularem attingens. 19. A Thoracis vulnere, pulmo ad denudationem usque cordis consumptus. 20. 21. 22.

§. 1. Superioribus annis pectus cujusdam bene poti ferro trajiciebatur, ut cor & aorta mortificare fauciarentur. In sequenti die, Judicis togatu, corpus defuncti incidebatur, cumque Chirurgus in duas partes pectus diduceret, de eo humor non limpidus, sed crassior urinx & coeleptæ materiz assimilis ubertim profluebat: Prope credidissem ea sectione stomachum fuisse fauciatum: ac detracto sterni osse, introspexi in cavam pectoris, ac continuo deprehendi intus magnam vim cruoris gelati, qui septa diaphragma continebatur: hunc vero multa crassior aqua innatabat, de qua etiam ille humor, patente jam thorace, erumpebat. Schneiderus de catarr. l. 3. c. 3.

**M**ulta aqua crassior innatabat. Qualis fuerit ille humor apertum faciam, si sanguis ex brachio exsurgit, & pelvi excipitur, ille jam gelatus subside, utrum autem humor quidam equatior fluat: Inter hic in imo pectoris eruo exibat, & circa eum fluebat aqua, ac ea tam multa reperiebatur, ut nemo non intelligeret eam de potu tam largo increvisse: Aliquando etiam cujusdam juvenis vulnere sanguis fuit non poterat: ebrius erat fauciatus, ac ipsi vulnus die noctuque fluxerat, is vehementer fluebat, quantum is cerevisiz hauserit vix dici potest; tandem adhibitis remediis stetit sanguis, ac patiens post diebus vulnus recrudescere, quia arteria a Chirurgo minus clementer tractata fuerat: quare sanguis iterum profluebat: Ego sedato profluvio, maxime consolidavi sanguinem illum, quo pavimentum, lintea, mensæ & scamna maderant: guttae hujus sanguinis maxima ex parte erant aquosæ, quarum in medio exibat oppido quam exiguum sanguinis verecundi vestigium; Qui hoc contempla-

bantur, omnes summa admiratione afficiebantur. Nuper etiam quidam, cum epulatus noctu tenderet quo saturi eant, de alto ceciderat: sanguis extemplo mittebatur, Chirurgus subito exclamavit. O vinolentum sanguinem! adeo illius odor nates percutiebat: postero die hunc sanguinem contemplantur, incredibilem vim aquæ fluitantis notari; Ex his igitur, & similibus, satis intelligi licet chyli, & imprimis porum, sanguini illico misceri, & hunc ad singula membra ferri: Sanguis itaque non apertus est ad corpus alendum, nisi is multo chylo sit imbruiatus; & hoc est quod Gal. confitetur, sanguinem etiam post mortem inveniri in corporibus eorum qui fame sitique interiere; ac talis semper est crassior. Sanguis, inquit Harvey, est post cibum & post tenuior & serosior: post sudorem & urinam, crassior: addo hic; & multo crassior longinqua inedia: A cena & a prandio, & maxime a largiore compositione dilutissimus: fidem faciunt allata exempla. Idem.

§. 2. Vide quondam Noviomagi virum cum alio pugnante, cui, me ad stare, medius thorax ab adversario suo percussus fuit gladio, ictu sinistram cordis ventricularem (quod postea in aperto cadavere vidimus) penetrante: Ille eo ipso momento quo vulnus accepit, quasi fulmine ictus concidit, moxque extinctus est: eum autem concideret, statim accessi, & eius pulsum in corpore ac temporibus exploravi, sed nusquam arteriarum ullam pulsationem percipi: crepori, propterea scilicet, quod sanguis per vulnus cordis in thoracis cavitatem effluens, non impellebatur in arteriam magnam, sique sanguis arteriarum immobilis substitit; nec ulla arteria pulsavit. De Diemerbroeck. Anat. lib. 6. cap. 2.

**H**inc deducit vir eruditiss. arterias nullam propriam pulscicam facultatem habere, sed earum motum solummodo procedere a motu cordis: qui motus in depressione arteriarum adjuvatur quidem

nonnihil ab earum febris transversis, sed hec tamch fibræ per se omnino non moveantur, nisi prius distensus fiat a sanguine e corde impulsio: Wille illis motum adscribit. Vide lib. 2. de pulsatione cordis.

§. 3. Anno 1610. Maj. 16. Henricus Magnus Galliarum Rex, rheda vectus a parricidio. Ravallac percussus, cultro bis in pectus adacto, statim interit, præmissis aliquot vocabulis & ejectione per os sanguine.

Postridie aperto corpore, notatum vulnus in latere sinistro, inter axillam & mammillam, transversæ digiti latitudine, tendens supra musculum pectoralem ad dictam mammillam, quatuor digitis profundam, cavitatem thoracis non attingens.

Alterum vulnus inferiore fuit loco, inter quintam & sextam costam, in medio ejusdem lateris, pectus penetrans, latitudine duorum transversorum digitorum, & lobum unum sinistri pulmonis perforans, inde truncum arterie venosae discindens, ita ut minimum digitum admisteret, paulo supra cordis auriculam sinistram: inde pulmo uterque hausit sanguinem, qui per os rejectus est: quo iterum adeo infarcti fuere, ut omnino nigri quasi ab ecchymoli apparuerit: Insignis quoque sanguinis concreta copia in cavo thoracis reperta est, necnon tantillam in ventriculo cordis dextro, qui, necnon insignia vasa inde prodeuntia, prae vacuatione subsidebant: Ae vena cava, qua ictum respiciebat, juxta cor, prae contusione ab ictu eulmi inducta, nigricans apparuit: Ideoque ab omnibus sancitum id vulnus unicam & necessariam lethi causam existisse: Ceterae corporis partes, integerrimae & sanae vix sunt, corpus enim optima temperie donatum erat ac rita conformatione. Actum Parisijs anno & die dictis. (*Medici Regij subsignati A. Petit, A. Milo, Plinius, Regnardus*) Magister, *Falsinus, Mayerinus, Harpertus, Mirrheus, Carreus, Auverius, Tvelinus, Plinius junior, Alchimus, Pena, Lussaninus, Sequinus.*

§. 4. Per lufum & jocum Auriga Fratris D. Erasmi Bartholini & famulus peregrinus, stridis gladijs in foenilli congregientes 9. Sept. 1673. tragicum exemplum praebuerunt: Ex improvviso enim latus gladius sub dextra brachij ala immergitur corpori famuli inter costam secundam & tertiam, penetratioque pulmone dextro vasa cordis majora in basi cordis laedit, & in sinistro demum pulmone se sistit: Dictum factum, sed sine dolore, concidit famulus, *Torchillus Petri*, annorum 18. nescius se vulneratum, antequam conspecto gladio cruento in leipothymiam incideret, Chirurgus statim advocato, quia ex vulnere altiori nihil sanguinis stillabat, vena in brachio dextro aperta nihil quoque cruoris profudit, sinistra parum, unde ad se rediens æger reum amicum absolvens, se dormire velle ait: & quamquam à somno retardaretur, tamen paulo post placide obdormivit, sine ullo doloris sensu & signo:

In aperto per Chirurgos Urbis, *Bojum & Affachium* corpore defuncti, invenimus pulmonem dextrum costis adnatum, totumque pulmonem quoque atidiorem ad phthisin vergentem, quippe artem figulinam didicerat, & æger diu inde recesserat. Cavitatem thoracis grumosus sanguis copiose implebat, à quo, impeditis pulmonibus, eordeque liquore suo destitutus suffocatus,

C Ut sine doloris sensu insigni tam altum vulnus pertulit: Triumphat *Arist.* in cordis victoria: Nervis in basi cordis disseminatis hicque dissectis adscribendum istud beneficium, qui ad sensum magis, quam motum in corde promovendum ab Anatomis

plurisque destinantur.

Unde ad somnum propensio? Quia cessante sanguinis alio derivari ex corde in fluxu, cerebri ventriculi conciderunt. *Thomas Bartholinus in Actis Medicis anni 1673. Observat. xxi.*

§. 5. Juvenis quidam in vicinia strenuus, sed desperatè audaciz, anno 1656. adit inimici ædes earapula armatus, foretque pulsar, Egreditur ille scelopoto quoque instructus, atque prae foribus stat: Aggressor ictu irritato scelopom expulso, alter sine mora tam apposite pectus ferit illius, ut illico conciderit exanimis: *Aperto pectore cor per medium transversim verberatum repertum est.*

§. 6. Non memini me unquam legisse exemplum vulnerari Cordis adeo rarum, atque ego meis vidi oculis, Anno 1660. 4. Aprilis Culenburgum vocatus fui, ut inviserem cadaver Georgij Jacobi Weyman, juvenis xxij annorum, dum viveret robusti, gladio vulnerati & mortui, atque una cum alijs judicarem vulnusne an alius casus mortis causa fuisset: Cadaveris visitatio, sectio & apertio à me peracta fuit: Primo intelleximus, ex relatu sarcapæ, hunc juvenem post inflicta vulnus per quinquaginta aut sexaginta passus processisse, tuncque concidisse, & syncope correptum ab alijs domum delatum fuisse, sed tunc cum paulo post ad se rediisse: Medici & Chirurgi, qui illum tractaverant, dicebant prima & secunda die vix sanguinem effatu dignum è vulnere angusto, (tenui enim gladio inflictum erat) effluxisse, sed postea vulnere aliquantillum dilatato, tantam profluxisse copiam, ut singulis religionibus eoadi fuissent, obstruere vulnere, hæmorrhagiam cohibere: addebant ægrum semper mente sanum, nec de interno aliquo dolore unquam conquestum fuisse, & corpus satis commovisse, & liberaliter tussisse ad sanguinis effluxum promovendum, quotidie etiam aliquid edisse ac bibisse, usque dum tandem deficientibus viribus moreretur, postquam ab inflicto vulnere vixisset dies novem & horas vij.

His auditis ad cadaveris visitationem accessi, omnibusque demonstravi vulnus inflictum fuisse inter quintam & sextam costam dextri lateris, latitudine circiter pollicis antequam costæ in cartilaginem abeant: Sublato osse sterno, inventi thoracis cavitatem in latere vulnerato, usque ad mediastinum, sanguine omnino repletam, eoque inde spongijs evacuato, vidi ictum gladij, illaeso pulmone, transversim sub sterno transivisse in superiorem partem dextri ventriculi cordis, supra valvulas trievspides, prope ingressum venæ, nec ulterius processisse: Pericardium sanguine coagulato prorsus repletum ac distentum erat.

**M**irum certè omnibus videbitur quomodo hic homo, cum tali vulnere tot diebus & horis supervivisse potuerit: Rationem tamè fuisse puro, quod vulnus admodum angustum fuerit, & supra valvas inflectum, ita ut in constrictione cordis, totus, qui in dextrum ventriculum è cava conflueret, sanguis propter valvularum trispidium impedimenta, per vulnus expelli non poterit, id maxima ejus pars per venam pulmonarem, quæ vulnere multo latior est, in pulmonem fuerit propulsa, atque inde porro ad sinistram ventriculum & arteriam aortam, ita ut nonnisi pusillum singulis pulsibus à vulnere in pericardium & thoracis cavitatem expelli potuerit, unde etiam vires rarius collapsæ sunt.

*Vulnerati cordis* Cor princeps & tegium viscus, est, è quo vitalis liquor, cum peccenti calore, vitæ hujus sustentaculo, quaquaversum ad totum corpus continè diffunditur, quo reliquæ omnes partes auxilium destituitæ concidunt & moriuntur. Esi propter graves ejus morbos maxime periculosus, & imprimis vulnera omnino lethalia esse prouuntavit Hip-

ocratès, cum quibus licet nonnullos per exiguum tempus vixerint, nunquam tamen sanari poterunt; imò plerique eo fere momento quo vulnus in ventriculos penetrat tanquam fulmine isti concidunt, quod meīs oculis bis terve factum vidi, ita ut mirarer quomodo tam subito posset homo omni sensu, motu & vita privari: Ratio tamen manifesta, quia sanguis qui ex corde in arteriam magnam, per eamque ad omnes partes, atque etiam ad cerebrum propelli debet, per vulnus expellitur in thoracis cavitatem: nullo autem sanguine ad cerebrum propulso, etiam illico nulli spiritus animales in cerebro moventur (motus enim cerebri, & hinc spirituum animalium rotas dependet à cordis motu sanguinem impellente) hinc illico deficient facultates principes, & sensus, oñi quæ motus omnium musculorum, etiam respiratorum statim desinit, sicque homo repente moritur: Si tamen vulnus admodum exile in ventriculos penetrat, tunc interdum, etsi raro, contigit hominem jam subito non corruisse, sed per paucas horas adhuc vixisse. *De Dierbroeck Anat. lib. 2. cap. 2.*

§ 6. Vidi alium cui quaternos bombardæ globulos quidam medium Cor trajecerat, ad quintum diem supervivisse.

**C**um ante 29. annos Monspelij aliquandiu hærentem, Medicinæ quidam candidatus arteriarum motus curiose noscendo additus, cani vivo thoracem aperuit, & videmus, inquit, quousque cor vulnerati vivo amante possit, moxque ratio decussatam cordis eorum findit, ad duorum & amplius digitorum altitudinem, deinde canem scalæ adligatum vinculis expedit, qui cum italiano latrati manus nostras fugiens ad herilem domum recurrat tanquam nihil passus. Quod ei acciderit nunquam reticere possumus: deceyegamus enim experiri curamne admitteret. Vidi enim Felicem Platerum Basileæ Cor porci domi-

sux mactati in anatomicum theatrum afferentem, ostendisse bacillum acutum, puerilem digitem minorem longitudine æquantem in cordis parti adactum: Examiniatus scrospisæcus, quod id terei bacillo quo porcos agebat, etiam hunc resistisset? pulvis semestris esse respondit: vixit hic tandem punctis, non diu post, si lanium evasisset, victurus: Totum enim epas velicus aqua flava plethi refert, illumque eodem tempore ostendit Platerus, sicque brevem, et hydrope interiturum perdidit. *Henricus ab Heers obs. med. II.*

§ 7. Ephippiarius Leodienfis è Lupanari domum rediens, uxoti gravidæ pomum offert; illa conscia unde veniret, da inquit pomum illud meretrici cui affectus mihi debitos dedisti: Iratus ille per dextram papillam pugionem miserè in cor adigit: Accersit hora secunda post merinoctium: viso vulnere & symptomatibus, jubeo illam omnibus Sacramentis muniri, vicinamque mortem prædicens, ordinato tantum limonum succo, sibi levandæ, qua valde premebarur, cum cerevisia miscendo, ad lectum redeo: Sub meridiem diei sequentis eum expirasset, amici ephippiarii, ut affinem pœnæ subducerent, spargunt validum à me datum læzæ pharmacum, inde illam abortivisse & expirasse.

Scabini re audita me accersunt, iussu vocari inimicissimis mihi Medicis & Chirurgis, in eum ventrem primum aperio, embryonem masculum omnibus stupore attonitis ostendo in matrice sua hærentem: Dein thorace aperto, ex vulnere cordis omnibus mortuam asseverantibus, embryone sudario meo clanculum involutum famulo domum ferendum trado, ex quo sceleron confeci &c. *H. ab Heers ibidem.*

§ 8. Creditum hætenus fuit corde vulnerato non posse quemquam, vel ad unius horulæ momentum vitam producere: quam sententiam ratio firmat & experientia: cum enim vita nostra à spiritu incommutabile dependeat, quarum officina fabricaque in ipso corde sita est, corde vulnerato spirituum generationem impediti ac prorsus cessare necesse est, verum historiam valde memorabilem hoc loco proponere visum fuit, Historiam inquam milleis, qui in corde saucius vitam ultra 15. dies sustentavit, qualis nec in veterum nec in recentiorum Medicorum Observationibus ulla nobis hætenus occurrit, Andreas Hæfsevasger &c. Vulnus in pectore à committione accepit anno: 1607. die 22. Augusti, sub vesperam obiit die 8. Septembris hora una post exortum solis, qui erat dies 16. à vulnere inflicto.

De sancti cadaver apertum examinatum fuit, ecce aperta pectoris cavitæ, evacuatæque haud parva materiz purulentæ minime ferentis copia, deprehendimus admirandi vulnus in cordis usque finem dextrum penetrasse istamque fere cordis partem totam contabuisse, sinistra parte manente incolumi, in qua continetur primatia spirituum vitalium officina.

Hujus igitur unius beneficio vita Andreæ ad 16. diem conservata fuit: *Gorhofredus Hegentium in Itinerario Frisæ Hollandico p. 26. inscripsit Tabula pensili in Bibliotheca Academia Groningani, quam appendit Nic. Mulerius.*

§. 9. Prodeat exemplum cujusdam occisi, qui biduum vixit post evidens vulnus in sistum Cordis, Diaphragmati, ventriculo ac Jecinori. Extra portam Antosianam ivere nobiscum plurimi Medici spectaturi cadaver ejusdem hominis interempti à duobus vulnerebus, penetrante altero per Epas ac ventriculum in seprum transversum: Altero veto per membranas mediastinas & involutem Cordis, in profundissimum dexteri ventriculi recessum, cum tam effusa sanguinis copia, ut illi undique e lanata et nobilissimum hoc viscus, quod tam fuit ades validum, ut extenderit huic homini vitam usque in finem diei secundi. *Tulpus observ.* lib. II. cap. 18.

§. 10. Fratres duo inimico obviam facti, uterque sclopeti ictu eum ledit, minor natu Thoracem duobus globis transverberat, Alti pila in brachium sinistrum adacta totum os comminuit, sinus musculi deltoidis, tota carne ita lacerata, ut non nisi extrema cute, vix duos digitos lata, brachium reliquo corpori adhereret: Die post vulnera quinto, duo Medici tandemque Chirurgi vocati, ut de ictu brachij sententiam ferrent, lethalem censerent necne: Omnibus qui Gangraena jam humero tenus omnia occuparent, mortalem esse brachij lésionem alii manibus, ac septimo postictam die mortuo aegro, ex officio Dom. Scabinorum, decem advocatis Medicis, multisque Chirurgis.

Horace aperto, basim cordis ejusque conum, cum insigni laceratione transverberatum globis duobus offendimus: Itaque unanimis, reclamantibus aliquandiu qui primæ visitationi interfuerunt, conclusimus ictus cordis primario & per se, brachij autem secundario tantum & per accidens mortis causam attulisse: Mirantibus quomodo ad septimæ diæ finem, corde tam graviter læso vitam produxisset, ostendi comment. in aphor. 18. sect. 6. qui ait sola cordis substantia læsa, si ad ventriculos vulnus non penetret, aliquos dies posse agrum vivere, dum phlegmone superveniente abimplantur. *H. ab Heer Observ.* 11.

§. 11. Captivus nescio qua mentis perturbatione se ipsum vulnerat cultro proprio sub mammilla sinistra, recta versus Cordis regionem ultra manubrium usque adacto, qui per octiduum vivens absque gravioribus symptomatibus nona tamen moritur.

Hoc post mortem aperto, vulnus per lobum pulmonum in capsulam Cordis, ipsiusque cordis substantiam penetrans, observabatur, ita tamen ut non aliquem ex ventriculis læderet, sed profunditate satis aperta, in intermedium utriusque ventriculi septum introeunte deprehenderetur. *Greg. Hospitius, lib. 13 Observations* 18.

§. 12. Transactis proximè annis Sabaudici tempore belli in Genuenses, expugnato armorum impetu Gex oppido, Marris inter Victimas, quæ occubuerunt, respirarunt aliquandiu nonnullæ; & ex relictis sanigati, venerand. *Hospitalis S. S. Lazari, & Maurij* suæ subsidio consignatur; cuius, & charitate Peritissimi Chirurgiæ Doctoris *Dominici de Roy*: Hic erudeles Maritimum fulminum lusus dum perlustrat, insiditum supra cor cujusdam nomine *Lucij Corsici* incurrit in vulnus; exploratâque fidi styli penetratione, vulneratum cor affirmare non formidavit: Hinc cum post tres supra viginti dies importuna quernus lipothymia, continuæque cordis tumoribus vicinaret; obijt denique dubia relinquens juicela, utrum nempe cor ita diu vulnus perferre queat: quapropter eorum cadaveris dissectionem aggrediens supra laudatus *De Roy* coram Medicis Regijs nonnullis, Clarissimisque Professoribus. Hæc vidimus.

Primo pericardium in parte superiori vulneratum, quo dissecto insignis disfluxit albicantis puris copia, quam intra; ita diu innatus cor, intensam conceperat intemperiem; ex qua exteras cordis fibræ putrescebant: Cordis verò vulnus supra dextrum ventriculum levius penetrans apparuit.

**E**x hisce elucescit primo inter præcipua vulnera cordis symptomata, frequentem extitisse cordis tremorem, & lipothymiam: tremulos itaque primo præteritur cordis motus, & merito. Nam si ab aucta in pericardio aqua hos observaverit motus in simia Galenus §. de locis Aff. cap. 1. tanto magis a copioso putre, in quo innatabat cor: sed neque per hoc tantum, verum quia ob corruptas extrinsecè cordis fibræ, ab intensa intemperie puris vitiò contractas, illius motus imminui, variari necesse erat: eum reverà motus non tam cordis, quam reliquorum musculorum à carneis procedat fibræ, nervi autem spirituum affluxum suppedient, sique vigoratione motus inter affectus spiritum medicos placuit nonnullis recensere: Interca ex tremulis cordis moribus, sanguis vario & perturbato impulsu, in pulmones & cordis sinus ferebatur;

ex quo pulsus inæqualitas & lipothymia. Pulsus primo inæqualitas, cum hic procedat à cordis motu, qui si tremulus & inæqualis, inæqualis & pulsus: lipothymia verò ab inordinato & molesto sanguinis motu vel quiete in cordis sinibus, ut pulmonibus: dam enim cor vario & tremulo afficitur motu, sanguis mox nimia copia sinus infestat, vel pulmones opprimit, & hinc imminens præfocatio: mox inefficienti non influens quantitate, sinus dum integrè non replet cor inani conatu fatigatur, & paulatim languore se deficere monet æger: quapropter cordis oblitio continui quamvis levis, intensa illius intemperies, ex qua extrinsecum fibrarum putredo, & insignis retenti puris in pericardio copia, si cordis tremores & lipothymias inducerent mirum non erit. Mirum quid verò, trium supra viginti dierum spatio, cor tot mor-

horum generibus laborans adhuc palpitasse; Cor illud, quod delicate aded constitutionis, ne apud Antiquos simplex uteri, vel hypochondriorum vapor, necessaria inducebat deliquia; nunc vero humorum vitia & corruptelam tolerabit? Quas retentum pus non excitat tragœdias? Si inrer muscularum ocietur interstitia, quos non efficit finis; quæ cæto non corrumpitur, & quas non progignit caries? in hoc ergo ita diu immutabitur Cor vivum; ideo, dicetne quod ipsam, quod pus ratione caloris cordis, adeo fuisse digestum, ut propriam amilifier naturam, omneque corruptendi vitium: verum si sita, cur extinguitur cor univertum purulentam albedinem, inensamque adeo conceperat intemperiem, ut externæ fibræ putrescerent? equidem patiebatur cor puris damna æquè bene ac ceteræ partes, ut observamus cor nobilem esse partem ratione effici, non autem substantia, Læo enim corde læditur sanguinis motus; ex quo pervertitur corporis œconomia, non quia uti fons caloris, spirituum opifex, & hæmatoseus auctor, vita per consequens ab illo principaliter dependeat; quiescit quidem illa in illius motu, non vero in qualitate suæ substantiæ: caloris, spirituum & sanguinis fons sanguis est, non cor; quomodo venæ delecta qualitate cor primario non efficiunt, sed sanguinem; enecantque non quia cor corrumpunt, sed quia sanguinem inficiunt cum revera cor venenorum

malificijs non magis subiacet quam reliquæ partes: nunc dum viperæ morsu digitum ferit, cor non auri vulnerat, sed insinuatæ recirculanti sanguini veneno, spiritus extinguuntur, quorum jacturam perferens cor languet, secumque reliquæ partes deficiunt. Hinc est quod remedia cardiaca immediate, specifice & primario cor non respiciunt, sed immediate sanguinem, cum quo dum misceantur spiritus vitæ excitant, efficitur, sanguinis promovendo accensionem, & naturalem fermentationem, ideoque à spiritibus & sanguine vegetiori firmitus pulsat cor.

Concludendum quæto cor morbos tolerare, & reliquæ partes, suumque principatum non consistere ex eo quod substantiam habeat selectiorem paribus nobilitatem, nec tanti esse scrupulosa consiliorum argumenta conclusentia, cor non posse putridam febricitantem sanguinem per ventriculos sustinere tolerare, dum simplex aura, quæ à minera putrescentium humorum inter alia & inguina exhalat, illud alterat & corrumpit. Hicce nugis ipse 6. de loc. affect. cap. 7. respondet Galenus, probans per Pulmonis vomica sæpe cordis ventriculos permeare, inde in arteriam magnam, tandem per arterias egredientes lege circulationis in renibus per urinas expurgari, *Observatio communicata ab Excellentiss. Dom. D. Iohann. Baptista Fanfano Medico Taurinensi.*

§. 13. Ex vulnere sterni, ad quartam costam, sinistra in parte, suborta fistula in quodam Veronensi, cum per aliquot menses eadem laborasset, ad ejus curationem me vocavit: cuius corpore primo expurgato, nulla licet spe salutis, ratione macidi quæ confectus erat, nec non febris virium imbecillitatis, immissa turunda copiosum pus eduxi, à quo aliquot diebus post syncope correptus æger vitam cum morte commutavit.

Dissecto cadavere, inveni capsulam, & fere totam cordis substantiam ad fibras usque ab ulcere exesam, *Marchetti observ. Med. Chirurg. 47.*

Videat an constare possit sententia Aristotelis li. 3. de partibus animal. c. 4. quod Cor nullum vitium grave diu patiatur: si quidem hic patiens diu

vixit, quamdiu scilicet ulcus & fistula penetravit ad cavitatem aut ventriculum sinistram ipsius cordis.

§. 14. Anno 1624. miles quidam Murinensis, vulnere in cavitatem Cordis penetrante ex cadaveris dissectione patuit, cum in signi inflammatione dies novem superstes fuit, *Iob. Rhodius cent. 11. Observ. 39.*

§. 15. Jævenis petulans Hafniz Naclerum, alioquin amicum, eultro transfixit, inter testam & quartam costam sinistram: Vulnus sub sterno ad cordis penetravit ventriculum dextrum, ut aperto post mortem cadavere patuit, foramine angusto & obliquo: læsus tamen non solum ex suburbio domum pedibus ivit, sed per quinque dies supervixit: Quantum conjectura assequor, propter angustum obliquumque cordis vulnus, concidentibus labijs, circumlatio per tot dies persistit non interrupta, *T. Bartholinus Histor. 77. cent. 1.*

§. 16. Ingolstadtij quidam studiosus à Typographo punctum læsus in sinistra parte thoracis, vulnus ipsam cordis substantiam, utrumque ipsius ventriculum transversim penetrans, accipit, plateæ tamen bene longæ spatium vulneratus cursus confecit, mente porro & sensibus integerrimis ferme per hotam integram ita consistit, ut loqui & Deo se commendare potuerit.

Vulnus, ad aperto post mortem corpore Medici, Professores omnes & alij spectatores, non pauci viderunt, atque armorum genus ex vulneris forma dignoscere & in judicio explorare poterunt: *Ex Observationibus Cyriaci Lucij Medici Ingolstadiensis.*

§. 17. Vidi, dum apud Taurinos ægerem, Nobilem quendam, qui singulari cermine cum alio decertans, accepto sub sinistra mamma vulnere, in cordis substantiam penetrante, libris in adversarium aliquot ense ictibus, ipsum fugitantem ad ducentos passus est prosequi, donec in terram caderet.

Dissecto cadavere, vulnus comperi in Cordis substantia, amplitudine quæ digitum capere posset, ingentem præterea sanguinis in diaphragma effusi copiam, *Pareus lib. 9. cap. 30.*

§. 18. I. Hasselroth Vespahus, cum quodam Nobili duello decertans, vulnus, in medio Thoracæ, paulo supra sternum accepit, subitoque concidens illico mortuus est.

Aperta explorandi gratia pectoris cavitate, magnum profundumque in Cordis usque sinum finistrum penetrans vulnus deprehendimus, unde effuso sanguine arterioso, & dissipatis spiritibus vitalibus vulnere tanto necessario & quidem subito mori oportuit. *B. Timans lib. 6. Observ. 38.*

§. 19. Visa sunt cordis vulnera ad tempus: comprobatur hoc *Galienus Riva* Romani Chirurgi observatio, qui in *Francisca* quadam à *Tulpha*, viginti circiter annorum, septem vulneribus fauciat, observavit, in qua mors usque ad quartum diem protracta est: secto cadavere duo vulnera in dextrum usque cordis sinum penetrantia visa fuere. *Dom. Pinarolus Pentecoste p. Observ. 45.*

§. 20. In vulnere decumbente in Nosocomio, & in altero vulnere antea in eodem Nosocomio, qui ultra annum dum dimidio ibidem decubuerat, infectione ipsa tota substantia pulmonis adeo cum pure longo tempore excructa videbatur, ut Cor denudatum sine pulmone, (dictum mirum) spectaretur. *Petr. Forestus schol. ad Observ. 37. lib. 2.*

§. 21. Quidam longo tempore decumbens ob vulnus in pulmone tandem contabuit, Nam media pars pulmonis consumpta ac pure soluta conspiciebatur. *Petrus Forestus lib. 2. Observ. 37.*

§. 22. Vidimus quendam pugionis ictu interemptum dissecto pectore, rursusque per vulnus pugione adacto mucronem neque cordis neque pulmonis vulnere respondisse: Tanta est in cadaveribus cum vulneribus posituræ differentia. *Alex. Benedictus Antom. lib. 3. cap. 12.*

## OBSERVATIO XXIV.

*Vulnus Thoracis lethale ob Arteriam venosam dissectam 1. Ob laceratos ramos vasorum subclavium. 2. Ob Pulmonem dextrum vulneratum, effusumque sanguinem. 3. Ob Pulmonis parenchyma pertusum. 4. Ob conceptam in Pulmonibus putredinem, & Ductus chyli feri lesionem. 5. Ob lesionem pulmonum & Oesophagi. 6. Ob pus intra cavitatem Thoracis subsistens. 7.*

§. 1. **A**Nno 1638. Nobilis quidam inter epulas pugione longo sub ala lateris detri, inter tertiam & quartam costam vulneratur: profusa ingenti sanguinis floridi & spumosi copia, subsequenteque omnimoda virium prostratione, & frequentibus animi deliquijs, diei, est vita discessit.

Aperto thorace quævis cavitas sanguine grumoso undique videbatur repleta: Inveni lobum dextrum pugione perfoctum, Arteriamque venosam vulneratam, unde insequi sanguinis profluvium, & exinde spirituum vitalium dissipationem, syncopen mortemque oportuit. *Balth. Timans Respons. medic. XVI.*

**I**Nveni lobum dextrum pugione perfoctum &c. ] Pulmonis vulnera penetrantia non omnia esse lethalia, modo vasa insignia intacta maneat, multa testantur exempla; sed inter cetera hoc illustre, Anno 1669. Nobilis Sabaudus, nomine D. de Seissel, in singulari certamine pectus habuit, parte dextra, ab acuto gladio omnino transossium, evasit tamen incolumis intra XV. dies: Ac post aliquot menses utramque cicatricem, tam in pectore quam dorso, viscendam mihi exhibuit.

§. 2. Illustriss. Comes Solmens, post mortem annuam Geneva discedit xx. Aprilis anno 1674. Comite Nobilium cohorte, inter quos Serenissimi Principes Saxo Gothanus & Churlandiz: Insidias veriti itinere terrestri instituto, laei se committunt: In redita naumachia festiva committitur, dispositisque utrinque sclopetis, Sereniss. Principis Churlandiz famulus catapultæ præter pyrium pulverem plumbæas quoque glandes immittit, quàm explodere in aquam credens, vacillante cymba, elevatoque sclopeto, tres uno ictu feriuntur Nobiles, unus in brachio, secundus in femore, tertius, Nobiliss. *Raban Henricus Vffelius* Saxo, in pectore: Hoc in Chirurgi periti, *Lamont*, ædes delato, tres convocantur Medici cum Chirurgo: à quibus in disquisitionem adducitur rentandane esset thoracis paracentesis, ad exhaustiendum cruorem in cavum thoracis effusum, quæ missa facta est, ob virium summam imbecillitatem, dolore vultus se proidentem, respiratione deficiente, pulsu exili, per leipothymias, ephidroses, quodcunque remedij generosioris usum respicientem, ira ut Deo & Naturæ committendus videretur: Revera 48. ab ictu hora mors obrepit.

Sexta post hora pectus aperrum est, deprehensaque globuli via, nam is transverberato humeri musculo, parte sinistra, simulque pectorali; extractis tertia & quarta supremis costis, obiectum in sternum nactus, cavum pectoris sublevar, pulmonumque summis lobis leviter fauciat, ramis vasorum subclavium dilaceratis, mediastinum per vaserat, costas item tertiam & quartam oppositi lateris perfrigerat, demum ad axillam, inter os & carnem viam vi sibi faciens, sublevar: Cordis sinus sinister sanguine vacuus repertus, qui totus in cavitatem thoracis confluerat; qui inde pondere librarum 12. civilium pondo eductus: Ex



*Oratione funebri à Nobiliss. & Excell. Dom. Stoffelio, Sereniss. Principum Wittebergenfium Gubernatore, in funeris redditu habita.*

§. 3. Jacobus N. Sicca ictus, vulnus inter 4. & 5. costam, juxta mammillam dextram, versus os sternum, deorsum adactum acceperat, per quod multum cruoris contento spiritu extrudebat: A quo x. vulneris die mortuum aperui, lobumque pulmonis arterialem, in longum latus: duorum pollicum latitudinem, altitudinem vero pennae scriptoriae animadverti: Posterior vero lobus aciem sic exceperat vulnere angusto, aequae ut alterum profundo: Totus pulmo subdurus, tunica ejusdem, sicut & membrana thoracis, rubicunda, aspera, tanquam inflammata: Cavitas thoracis sanguine aquoso, purulenta thoracis, cordis tunica similiter aspera, subdura, ac si phlegmone tentata fuisset: Pulmones autem sinistri lateris integri & incolumes inventi: *H. Smetius miscell. lib. 10. p. 558.*

§. 4. Generosus vir nocturno tempore gladio per latus dextrum transfixo occubuit. Sequenti luce vulneris profunditatem investigaturi Medici & Chirergi conveniunt: Quartam costam a se gladii transversim divisam, & pulmonis parenchyma pertusum observant, vulnere supra eor transiente: Inter pleuram autem & sinistri lateris Pulmones dependebat ab axillis magna pinguedinis copia, ordine longo secundum rectum thoracis sitam disposita, pulmonibusque imposita: In adverso latere pulmones fibris thoraci alligabantur. *Bartholinus cent. 2. hyst. 15.*

**G**ladio transfixo ] Pectore vulneratos non eadem ioris maneri, si vasa maiora icta maneat, etsi transversim gladius penetrarit, evadere possunt, exemplum suppeditavit annus 1668. Nobili Sabaud. Dom. de Seissel, annos xx. circiter nato, in singulari certamine gladio acutissimo pectus confodit: infra mammillam dextram, adeo ut cuspis semper extra dorsum prominere: convulsi tamen intra breve tempus, mihi quae utramque cicatricem post trimesse licuit videre & contrectare.

§. 5. Illustr. Baro de Heinden &c. in pugna Fionensi circa mediam dorsi vertebrae scopero laesus, globulo subter sinistram scapulam exeunte, initio equidem non adeo male habuit, consueti tantum vulnere symptomata passus: Post 14. dies observatus in linctis copiosus albicans humor & coarctans per intervalla, nescins tamen unde aut qualis esset; neque Medico aut Chirurgo, quorum opera utebatur, quicquam de eo monentibus: haezr verò per integram hyemem Ottenfoniz: mense Aprilli in horas delatus statim me vocandum iussit: Inveni Illustr. Dom. Patientem debilem valde, magis confectum, atque singulis circa vespere diebus leviter inalefcentem: Quae sibi statim de Pulmone laeso, etsi sibi de eo nihil constare haecenus dicebat: vulneris os superius consolidatum erat, inferius still. bar contactum sanie: sperabam optima quaeque, verum biduo elapso, adverti supra notarum liquorem albicantem, paululum tamen flavescens, tanta in copia effluxisse, ut non solum linctea quintuplicata, indusium lodiaceumque imbuerit, sed quoque limbos inundaverit: miratus insolentem materiam, statim cogitare coepi, cum diversa plane esset à sanie & ichoribus, annum liquor, Chylosus, tori ad nutritionem destinatus, inordinata hac via profuere, quandoque Dom. Patiens bene appeteret, cibisque eucharis & delicatissimis uteretur; corpus tamen in dies magis magisque contabesceret: Cogitavi serio de eo, neque quicquam aliud reperire potui: Conclusi igitur nihil magis è re Illustr. Patientis fore quam si vulneris os superius aperiretur rursus, quo debita laeso Pulmoni remedia applicari possent, sed Dom. Baro renuit plane, libereque profitebatur se tantum super eo horrorem animo concepisse suo, ut mallet mortem potius quam sectionem experiri: Exclusus ergo saluberrimo consilio, quicquid alias remedium superasset, conquisivi sedulo, institutaque acutata Dieta, & adhibitis quoque interius & exterius selectissimis Balsamicis, imprimis è tenerrimis corn. cervinis petitis, Deo benedicente in tantum profeci, ut non solum febricula, sed & fluxus 14. dies remitteret, habitus quoque corporis usque quaque floridior appareret, magno eum Dom. Patientis gaudio, qui omni se defunctum periculo putans, paulo largius absente me se invitaret. usus quibus delectabatur, imprimis calidioribus, quae tamen noxia sibi fore praedixeram: Recurrit itaque fluxus, atque continuavit ad vitæ usque finem, quem ex nimia animi corporisque commotione sibi acceleravit: namque cum digladiantes non potui à eonelavi suo ministros vellet compescere, neque si dicto morem statim gererent, adeo commovit se, ut primum Epileptis convulsionibus, postea hemiplegia lateris sinistri contriperetur, quae eis paucos dies corpus exsiccum viribusque destitutum è medio sustulit.

Cadaver praesente Dom. Holstio Poliatro Tonningensi apertum, in inferioribus nihil notari dignum praebuit, tantum Pulmones ea, quae vulnus inflictum parre, insignem putredinem conceperant: id vero leve primis fuisse, omnisque periculi experti autopsia monstravit: Quam ergo conducibile fuisset, quamprimum liquor albicans confect. s. vulneris interiora inagasse, aut saltem orificium superius apertum servasse. *Joel Langelos ad Thomam Bartholinum in hujus Epistolâ centur. 3. Ep. 37.*

**C**opiosus albicans humor? Si quid conjectura affequetur, Lactens thoracicus lactus quoque fuit, unde larga illa materiz chylofe copia fluxit, atrophia subsequente: Hinc etiam selectissimis ballamicis plus præstitum quam quavis sectione, quippe coaluisse istis tenellis ductus membranas inde suspicamur, quod repetito chyli curia naturali, habitus corporis floridior appareret: Vulneris tamen apertio utilis fuisset pulmonis in gratiam, in quo perfectiorem notatam refers. Non valde tamen repugno ruz conjecturæ eruditissimæ, nempe liquorem chylosum, toti ad nutritionem destinatum, inordinata ista via profluxisse: Est quippe liquor ille nutritivus ubique sanguini mixtus, & pro partium indigentia ad nutritionem elicitur, quod olim de rose & cambio medici tradiderunt, nesci chylum in sanguine delitescere, facileque separari sine putredine, quod in venæ sectione nonnullorum observavimus, lac nempe seu chylum, à sanguine separatim in pelvi produsse: Hoc succo nutriti partes nostras, non sanguine, sunt qui sibi per-

suadeant, quibus nescio quid opponi possit quod stringat: Si enim sanguis in partium alimentum cederet, continua chyli confectione, seu ciborum ingestione opus non esset, si quidem ea est in corpore sanguinis copia, ut ad menses plures sufficeret pro partium nutritione: At quia chylum nutritur chyli quoque continua fit generatio, nec inediat ferre possumus: Et tali sane nutrimento in utroque assuevimus, non sanguinis, si recentiorum observationibus & suspitionibus credimus: Eadem ratione Lac, seu candidum succum ex sanguine artierum thoracicarum per glandulas mammae marum fecerunt verosimili conjectura suspicantur alii, donec sui generis vasa lactea, ad membras chylum ex mesenterio deferentia detecta fuerint dubitandum enim vix est hujusmodi ductus in corpore latere: Quidquid sit, lactis ubertate diffundunt papillæ tam feminarum quam virginum imo nuper natorum, ut ex hoc principio nuper acculatam virginem absolverimus, &c. *Thomas Bartholinus Epist. 38. cent. 3.*

§. 6. Civis Batavus 16. Septembris 1629. in pectore punctim vulneratus est, ictu transeunte os sterni, seu scutiforme, per pulmones in Oesophagum, superveniente febre ac singulis: Quiduo post vulnus illatum mortuus est.

Aperimus cadaver, invenimus secundum conjecturam nostram partes ante dictas læsas: Thorax plenus erat sanguine seroso cum potu, qui ex gula effluerat. *Jacobus Bontius Medicin. Indorum observ. 12.*

§. 7. Vagus Chirurgus, nomine Edelphus, Nobil. juvenem, gladio sub brachio sinistro læsum, ictu in thoracem penetrante curans, quicquid quinque præsentis clamarem Medici, Chirurgis aliis multis suffragantibus, nunquam eoque apertionem admittere voleit, certam salutem potione ex oculis canceri præparatis pollicens, vulneri autem, quocunque loco esset, nec turundam imponebat, nec ullis utebatur balsamis, emplastris, &c. Cum eam potionem sedecim dies bis quotidie bibisset nullo profectu, jamque pure thoracem distendente, respiratione pene ablata, morti esset proximus, Pater anxius Medicos revocat, quibus, reclamante Edelpho, latus apertientibus, maxima puris copia per intervalla educta copia, zger melius habere se dixit: Nihilominus miser Nobil. quicquid peritissimi artis tentarent, in hora: marescens, tandem quinto post anno phthisicus obijt. Polinones enim puri innatantes, illius tantum imbibebant quantum tussis perpetua inducendæ sufficeret: Illæ autem mature sectione thoracis facta servari poterat. *H. ab Heers Observ. Med. 12.*

## OBSERVATIO XXV.

*Vulnera Pectoris & Hypochondrii dextri lethalia ab Pulmone perfoſſo, Hepatis & Spinalis medullæ lesionem.* 1. Pectoris & Abdominis ob læsum alierum pulmonum lobum, Diaphragma, Ventriculum & Lienem. 2. Hypochondrii dextri ob vulneratam infimam leoris foram. 3. Ob ventriculi fundum læsum. 4. Ob substantia Hepatis lesionem & truncum vene cava. 5. Ob Colon per transversum penitus dissectum. 6. 13. Ob vulnus Hepatis. 7. Portiuncula Hepatis abscissa regenerata. 8. Vulnus Abdominis lethale ob peritissimum Ileum intestinum, Copiam sanguinis in abdomen effusam, Mesenterium perforatum. Mors Henrici tertii Galliarum Regis & Poloniz. 9. Ob dissectum ileum intestinum. 10. Ob lesionem interiorum viscerum. Intestinarum corruptionem & Abscessum parentum. 11. Ob Intestina crassa & tenuia confossa. 12. Ob Colon transversum sectum. 13. Ob Ileum intestinum duobus in locis læsum. 14. Ob Ileum transversum, Vulneratas venas & arterias mesaricas. 15. Ob umbilicalem venam abscissam. 16. Vulnus intestini Coli firma cicatrice coaluisse deprehensum. 1. Vulnus abdominis lethale ob venam cavam dissectam 18. 19.

§. 1. Interfectus fuit 8. Julii anni 1602. Gallus quidam, *Samuel de Bonnan*, duobus ictibus, quorum alter Hepar transibat, & ad spinam dorsi finiebat: Alter vero supra mammillam sinistram ad latus Pulmonem perforabat. *Joh. Rud. Salzmannus Observ. Anatom. pag. 14.*

§. 2. Caupo ab Equite explosione globuli à sclopo brevior ita 17. Junij vulneratus; ut die 23. ejusdem obierit: In cadavere externe hoc animadvertum, quod ictus globuli supra sinistram thoracis partem per musculum pectoralem intraverit, & circa Lienis regio: *Boneti Anatom. Tom. III. H h nem*

nem per costas spurias egressus rursus fuerit; Abdomine aperto, separatis cutē, muscularis & peritonæo cum omento, portio Lienis, quæ antrosum in parte summa promuberat, globulo prorsus perforata, duæque costæ spuria fractæ ac contusæ apparuerint; pariter à globulo transeunte, ventriculus in parte inferiore ejusdem lateris, diaphragma in superiore parte, sinister pulmonum lobus in extremitate, ut & una costa sub musculo pectorali penitus fuerit vulnerata atque violata, *Paulus Aemilianus Medic. critica casu 48.*

**L**ethalitas vulneris non solum ex læsione unius partis principalis, verum etiam ex læsione plurium & minus principalium estimari debet; jam in hoc vulnere pulmones, diaphragma, lien, ventriculus, costæ læsæ sunt: Etiam vulnera, quæ secundum Celsum, ut plurimum lethalia sunt, per se, non per accidens, lethalia sunt, & ideo reus ordinariam

declinare non potest. Curandi impossibilitas arguit lethaltatem vulneris, exemplo illorum vulnorum quæ in summo femore sunt, ubi deligatio detensio fieri non potest: Hic multo magis lethalitas erit per se, quandoquidem tot internæ læsiones & fracturæ concurrunt. *Idem.*

### *Responsum Facultatis Medica Lipsiensis.*

Licet interdum contigerit quod læsiones in ejusmodi partibus fuerint cutæ, & patiens (exempla prostant in observationibus Medicorum & Chirurgorum) fuerit servatus, tamen raro contingit, centum enim moriuntur prius quam unus restituitur. Jure itaque cum Galeno & Cælio hæc vulnera hæc classis adscribuntur, quod nimirum sæpe, & ut plurimum intermiant, & curacionem difficilem habeant: Et quoniam in hoc individuo non una saltem, sed

duæ vel tres partes principales variis modis læsæ fuerunt, simulque accessit curandi impossibilitas, dani labi vulneris statim post ictum aut vulneracionem coiverunt, adeoque sic nullis medicamentis idoneis tractari potuit, ob hanc, & alias, in annotationibus fundatas rationes, pronuntiamus quod vulnus istud merito pro lethali per se habeatur, quo etiam patiens necessario obiit.

§. 3. Lictor ictus fuit bipenni in infima Jecinori: fibra, unde marcore confectus obiit ante diem 40. inveni sub vulnerata fibra plurimum graveolentis puris collectum. *Vide lib. 2. tit. de phthisi.*

§. 4. Villieus quidem in hypochondrio dextro sub costis spuriis per æt. gladio valde læto, qualis carnificum esse solet, vulneratus, multa cruenta vomuit & per alvum deiecit, supervenere sudores, syncope extremorum, rigus & convulsiones, tertio die mortuus est.

Aperto abdomine, vulnus in ventriculi fundo adeo magnum deprehendi, ut totam ejus substantiam à parte dextra per sinistram penetraret, venis & arteriis, quarum larga ibi seges est, penitus discissis, unde ingens sanguinis copia partim supra partim infra rejecta, partim in spatio abdominis collecta, dolores vehementes, cordis anxietates, leipothymias frequentes, vigilias, deliria, convulsiones, tandemque mortem intulit, & quidem necessario, quatenus nec sanguis ex venis & arteriis, confertim erumpens sisti, nec remedia convenientia demoveri, nec alimenta retineri, coqui & distribui, nec vires ex insigni sanguinis profusione & dolore vehementi collapsæ instaurari, nec ipsum vulnus adeo profundum & penetrans solidari potuit. *B. Timæus Responsorum Medicinalium, 19.*

**E**t si ea tantum ventriculi vulnera pro lethali bus habeantur quæ orificio ejus superiori insunguntur, atramentum & illa quæ ventriculi fundum, venasque & arterias gusticæ majores penetrant, & valde magna sunt, quale hoc fuit, mortem necessario inferunt, nec obstant exempla profundorum vulnerum ventriculi sanatorum, quale est Bohemi rustici vena-

bulo lato vulnere in ventriculo percussus, de quo *Julius Alexandrinus, lib. 6. Therap. Galeni*; et plures annos superstitis; & alterius Bohemi, qui cultrem novem digitos transversos longum deglutivit, qui per sectionem ventriculi exemptus est, de quo *Scennerius Pract. lib. 3. p. 1. sect. 1. c. 15.* Rara ea sunt, singulari naturæ robori adscribenda.

§. 5. Andreas Ferber Lœwentenens, &c. In dextro hypochondrio gladio acuto punctum vulneris multum sanguinis profudit; de dolore ad jugulum usque ascendente querulus, supervenit vomitus biliosus, defectiones eructus, oculorum scotomia, deliquium animi & paulo post mors.

Aperi abdomen, detergoque sanguine, Epar scrutatus deprehendi non tantum substantiam ejus, sed & venæ cavæ truncum vulneratum, unde vulnus pro simpliciter lethali pronuntiandum judicavi. *B. Timæus Respons. medic. 20.*

§. 6. Tympanista quidam in Castris Suecorum à milite in hypochondrio dextro, paulo supra regionem umbilicæ gladio acuto vulneratus, de vehementi abdominis dolore conquectus multum sanguinis per alvum deiecit: supervenere & ventriculi subversiones, & singultus, frequensque animi deliquium, hora quarta mortuus est.

Aperto abdomine, abstersisque, quibus referrum erat, excrementis & sanguine, intestinum Cœcum tunc, undiquaque per transversum dissectum sphacelatumque repertum est, *Balthazar Timæus Respons. Med. 17.*

§. 7. Nos duos in chira habuimus quibus Iecur vulneratum fuerat (ut post eorum mortem videre licuit) hi quotidie bilem vomebant & intensissima febre ardebant, tussique continua afflictabantur. Alteram & nuper curavimus qui *gibbam Iecoris partem contusam* ex equi calce habebat; perlit cum maxima siti & aestu, bilem continuo vomebat, nec ullo pacto ex cernere poterat uno verbo expediā, Iecoris *ulcera* atque *vulnera* lethalia *Brassavolus* *commun.* ad aph. 18. lib. 6.

*Gibbam Iecoris partem contusam*] Contusiones in parenchymate hepatis sunt valde periculose, præsertim si magnæ fuerint. Sanguinis enim transitus per partes contusas difficulter peragitur, simulque etiam separatio humoris fellei plurimum impeditur: Deinde sanguis resistens tumorem efficit, tandemque forsitan inflammationem, morbum scilicet hepatis periculosissimum: quippe si eadem in suppurationem disinas, spes omnis conclamationis videtur: sin indurecat, cachexia, icterus, atrophia, hydrops per foribus sunt: conandum quidem enixè ut tumor ejusmodi discutiatur, verum hic labor, hoc opus est; forte discutientium ope sanguinis effusio, & ubi confusio facta erat, restagnans pars aliqua à reficæ felleæ ramusculis capillaribus, ad ea loca pergingentibus (naud aliter sane quam alix ejusdem sanguinis partes à venæ cavæ oculis) absorberi queat, possintque adeo tria ad hujusmodi discussionem concurrere, nempe transpiratio insensibilis, & materiæ extravasatæ partim in cavam rednctio partimque illius excretio in porum biliarium. Licet enim ex communi naturæ instituto, porus biliaris, præter humorem felleum, nihil ex hepate efferat, si quid tamen hoc pacto præter naturæ ordinem evenierit, haud videtur ratio commodæ assignari posse, ob quam extima illius capillamenta oriri debeant, præsertim materia illuc decumbente & quasi in oscula eorum sponte incumbente. *Glosson Anat. Hepat. c. 9.*

*Iecoris vulnera lethalia esse*] Vulnera si casum infligantur, vix fieri potest quin vasa ladanentur. Sin punctum fiant, poterunt vasa fortuito evadere. Sunt

quidem necessario vulnera illa mortifera, maxime quæ vasa pariter & parenchyma discindant. Illa tamen periculo quoque haud carent à quibus parenchyma solum leditur, sanguinem ad ea loca fluens impuratus est & bili commixtus, nec facile evacuari potest: vel si id contingat, partes tamen ab invicem dissonde, friabiles cum sint, glutineque illo careant quo alix partes facile denno coalescunt) ægre admodum consolidantur. *Idem.*

*Iecoris ulcera*] Solvitur etiam parenchymatis Epatis continuïtas ab erosione, quemadmodum in ulceribus. Jus videre est, quippe ulcera non solum vulneribus, contusionibus, suppuracionibus, aliisque antecedentis continuïtatis solutionibus adveniunt, sed & erosionem aliquando immediate consequuntur, nullo alio dissolutionis genere præcedente. Imo vero fieri non potest ut solutio à continuïtatis in ulcus abeat, prorsquam partium ab invicem separatæ tum erosio aliqua accesserit: ulcus enim tria in se complectitur, solutionem nempe continuïtatis partis substantiæ jacturam, &que erosionem: Si quid horum absit, ulceris absentiæ haud perfecte obtinuerit: enimvero solutionem continuïtatis, una cum defectu in numero partium, facile sine ulcere reperias, quemadmodum in vulnere recenti cum particula alicujus abscissione videre est: Si autem eorum alterutri erosio supervenerit, vulnus statim in ulceris naturam degenerat, adeo ut ulcera à vulneribus, aliisque continuïtatis solutionibus, erosionem potissimum distinguantur. *Idem ibidem.*

§. 8. Helvetius 30. ann. in confictu gladio Helvetico è regione hepatis percussus fuit, maximumque vulnus recepit: Sanguis copiose effluxit, ita ut in animi deliquium incidere: Advocato Chirurgo, cum vulnus explorare, & medicamenta ad sanguinem sistendum imponere vellet, frustum Epatis ad ostium vulneris sese offerebat, quod cum forcipibus apprehendisset, integre extraxit: ac quamvis sævissima supervenirent symptomata, nihilominus optime corvaluit: Post annos tres febre continua correptus intra paucos dies obiit.

Cadaver ejus incidimus, latusque prius exhibuit cicatricem longitudinis spithamæ è regione Hepatis: portiunculam vero quandam infimi ejus lobi abscissam fuisse, vulnusque cicatricis eleganter obductum reipsa comperimus: Reliquæ vero partes corporis, imo & ipsam heparem nihilominus secundum naturam se habebant. *Fabritius Hildanus, centur. Observ. 54.*

§. 9. Nos subsignati Consiliarii, Medici & Chirurgi ordinarii Regiarum facimus hesternæ die Mercurii, secunda præsentis mensis Augusti anni 1589. ex mandato Domini Præfecti Familix & annonæ Regiæ, visitasse & diligenter examinasse cadaver defuncti felicissimæ memoriæ & Christianissimæ Henrici III. dum viveret Gallicæ & Poloniæ Regis, qui eadem die è vivis decesserat, circiter hora tertia post mediam noctem, ob vulnus, adacto eultri cuspede, in ventrem inferiorem pridie inditum, juxta umbilicum parte dextra, circa horam octavam vel nonam, & ratione symptomatum supervenientium suæ Majestati Christianissimæ statim & ab æcepto prædicto vulnere: Cujus vulneris causa & accidentium subsequenitum ampliorum relationem Senatui exhibuimus.

Quo autem amplissima cognitio haberetur profunditatis illius vulneris, ac simul partium interiorum lesarum, dissectionem ventris illius inferioris instituimus, necnon pectoris & capitis: post sedulum examen partium omnium imo ventre contentarum, invenimus portionem intestini tenuis, ille dicti, penetranti vulnere affectam, ad latitudinem eultri pedalis longitudinis, qui cruentus nobis exhibitus est ad latitudinem quatuor digitorum in reditu ad locum vulneris exterioris: Interiora ventris rimantibus, & ejecta sanguinis per dictam capacitatem effusi maxima copia, cum insignibus sanguinis concreti grumis, apparuit quoque mesenterium duobus in locis perforatum, dissecatè etiamnum venæ & arteriæ.

Partes omnes nobiles, tam naturales quam animales, pectore, imo ventre & capite contentae, rite & secundum naturam constitutae erant, ac pro aetate probe temperatae, citra lesionem aut vitium; id solum arguendum erat; quod praedictae partes omnes (ut & vena & arteriae, tum majores tum minores) exangues erant & sanguine destitutae, qui ubertim effluerat per vulnera illa interiora, praesertim è mesenterio, ac cohibitus fuit in cavitate illa, tanquam loco extraneo & contra naturam: Quomobrem necessario, ac intra circiter octodecim horas, mors Christianissimi Regis subsequuta est, quam praecesserunt crebra animi deliquia, ingentes dolores, suffocationis sensus, nausea, febris continua, & sitis intolerabilis cum maximis anxietudinibus: Quae symptomata parvo temporis spatio ab inflicto vulnere contigerunt, ac sine ulla intermissione ad integram usque & ultimam mortis syncopen perstiterunt, quae ob rationes dictas, ac symptomata, quantumvis accurata accessisset diligentia, inevitabilis erat: Sic subsignavimus proprijs manibus in Castris sancti Clodovei prope Lutetiam, die Jovis horis maturinis, Angusti tertia 1589.

Medici assistentes

Faber, Dortmannus, Regnardus, Herwardus.

§. 10. Quid officij nostri ratio requiratur, circa vulnere judicia, collegialiter fuimus recitati, Ergo consideratis omnibus, tandem pronuntiamus, Si in vulnere inspectione observatum, quod Uris vulnus punctum inflictum, quatuor transversis digitis sub umbilico in abdomen penetravit, quo intestinum tenue, ileum alias vocatum, *laesum digiti laesum & perforatum*: quod utique juxta relationem Medici & Chirurgorum vulnus istud non solum insanabile, periculosissimum, sed etiam pro simpliciter & absolute, & per se lethali habendum sit, quoniam impossibile fuit hoc modo laesum intestinum, tanquam unum ex gracilibus & plane membranosis, ullo modo consolidare.

Nec attendenda hic curationum aut exemplorum monstra, licet enim tum vulnerati quidam patientes propter vegetam naturam, & alias causas, adhuc per aliquot dies vivere interdum potuerint, tamen necessario demum moriuntur, quoniam praeter curandi impossibilitatem, etiam retentio chyli, & ejusdem distributio pro sanguificatione & nutritione amplius fieri nequit, imo propter hanc vulnerationem dum substantia intestinorum maxime nervosa & fibrosa est, gravissima & funesta symptomata subsequi solent, hinc lethality ratio manifeste apparet.

Ubi monendum patitur, quod & in intestinis tenuibus faeculentae impuritates continentur, quae à puritate chyli pro confectione sanguinis, ad hepar transmittendi, in dictis intestinis tenuibus à natura separatae, & postea successive ad intestina crassa ablegantur: hinc non absurdum si & faeces aut excrementa ex intestinis vulneratis tenuibus, in abdominis cavo reperiuntur, & inibi, ut omnes extravasati humores, praesertim in cadaveribus vel defunctis statim foetere ac putrescere incipiant.

Reperimus itaque ex praemeditato consilio, vulnus istud utique per se & simpliciter, ex adductis rationibus lethale fuisse, *Judicium est Facultatis Medicae Lipsiensis.*

§. 11. Vir ille qui Delphis in abdomine anno 1574. vulneratus est, ita leviter primum vulneratus esse videbatur, & omnes Chirurghi qui illud vulnus conspexerunt, illud prima fronte prorsus non lethale esse judicarunt, & ob id plurima remedia ad ejus curationem frustra tentarunt: Sed postea corpore defuncti inciso & vulnere latius aperto, inventum est vulnus illud penetrasse viscera interiora, adeo ut intestina nigra & corrupta spectarentur, & animadverterimus abscessum purulentum intus latuisse, cum tanta corruptione & virulentia, ut ob patorem in cubiculo, in quo cadaveris incisio fiebat, morati non potuerimus: Notandum etiam in morte ipsa totum colore viridi ad citrinitatem declinante infectum fuisse, magnam in corpore arguens corruptionem, ut isti Chirurghi imperite judicarent hominem icterica affectum. *P. Forestus lib. 6. Observ. Chirurgic. ij.*

§. 12. Iacobo ab Aqueria Arelarensi quum acutissimo ense venter esset perforatus, transmissio perire non, ingens in intestinis tum tenuibus tum crassis vulnus accepit, exeunte utique per vulnus stercore: Ad quem vocati, magna angustia hominem conflictatum invenimus, sese praedolore jacentem nec uno consistentem loco: Tertio mox die vulnus lividum fieri, pus manare foeculentum, sordidum, nigrum, foetens apparere, stercore per vulnus continuo prodire, crassorum intestinorum vulneratorum indicium, tum vero extrema friguscere, praecordia vero immensè calere (intro conceptae phlegmones testimonium) capere: sitis ingens, aestus maximus, sudor frigidus secundum frontem & faciem totam atque cervicem apparere, lethalis prorsus morbi indicium: Quarto die pulsus deficere, mox delirium, dein vox deficere coepit, luminis tenebris offundi, inde die quinto mors.

Dissecto cadavere, intestina tum crassa tum tenuia multis vulneribus confossa reperta sunt, ingensque circa umbilicum tumor phlegmonosus, thrombi ingentes sanguinis congesti multo pluri: lacerata interanea omnia. *Fr. Vallieria observat. 9. lib. 11.*

§. 13. Ictu obliquo vulnerabatur quidam Monspeffuli, in abdomine, duobus digitis transversis à linea alba curatur quam diligentissimè, verum ex altera parte abdominis dolor vehemens, rubedo & alia signa inflammationis: præterea symptomata queque vulneratis intestinis consueta oboriuntur. Chirurgi igitur ampliationem vulneris urgent, Medici vero propter lineam albam denegant, ne potius novo, eoque periculoso fiore vulnere quam primo extingui rei cognati forsan prætereire possent, moritur 4. die.

Aperitur cadaver, & colon per transversum spatium abdominis vulnere dimidiæ spithamæ, sæcū invenitur: Reus condemnatur. *Ph. Salmuth cent. 1. observ. xvij.*

*Colon per transversum*] Insignia intestinorum vulnera non semper lethalia esse restat. *Petrus Russe Zediaci Med. Gall. ann. 2. p. 127.* imo nec cum totaliter abscissa sunt, quin curam suscipiendam jubet. ad imitationem naturæ quæ simili in casu miranda perficit. Tentandamque curationem & conjunctionem per suturam extremitatum incisæ intestini. cum eunt, sed solum confusa membrana illius exteriorè, confirmat l. c. *Obs. 4.* exemplo militis qui vulneratus est in parte dextra & inferiori regionis hypogastricæ paulo supra annulos, quò icu transversum & omnino dissectum fuit corpus intestinorum non procul à loco ubi desinit ileon, quod vulnus lethale absolute pronuntiatum fuit, attamen ea fuit vulneratis felicitas, ut intra menses ille dissecta cum extra vulnus prodiret ad longitudinem sextæ partis ulnæ, paulatim vero & sensim ambiens alluefacta, recti intestini munere functa fuerit, nec insigni relicto incommodo, eo quod crassiores faeces, cum exigua moram in abdomine traherent, nec cohiberentur in anfractibus coli, fecotem non conciperent, sæcū alvina: um congreget. In ea condicione (addit) cum per aliquot menses perstitisset, membrana exterior positionis

ilei egressa abdomen, paulatim intro se condidit, adeo tamen ut circumferentia extremitatis illius, cum attigisset vulneris ambitum, à Natura sensim fuerit conjuncta & conglutinata media utraque quadam naturali, ac membrana interiori exteriori adhaeserit, eadem servata longitudine, eaque ratione deinceps opem tulerit excrementorum expulsionem; Quod crassiora intestina, à cæterorum consortio divisa paulatim læciniam excusserunt: toto octiduo ab indico vulnere, à quo tempore nullo amplius munere functa sunt: Ea enim illorum sequuta est subsidencia, ut æget ne minimam enematis partem admittere valuerit semestri à vulnere spatio; ac semel quidem ad statum expulsionem dehiscence ano. *Videatur Figura vulneris Lc.* Veteratis historiam firmat *Petr. Boirellus ibidem pag. 136.* Præterea asserit sibi notum militem, adhuc stipendia merentem sub Comite à Blino, qui singulo quoque biennio feces imi ventris per vulnus male cicatrice obductum excernebat, ante aliquot annos regioni hypogastricæ inflictum, quam dejectionem semper præcederent intensi imi ventris dolores.

§. 14. Aperui militem quendam in Nosodochio nostro, qui triduo ante gladio transfossus erat, ad latus infra umbilicum, in quo icu ileon intestinum duobus in locis insigniter læsum fuit: apertoque abdomine lumbrici tres vel quatuor in abdominis cavitate inventi fuerunt quos per vulnus illud ilei una cum stercore exiisse conjeti. *I. R. Saltzmännus, Observ. Anatom. pag. 10.*

§. 15. Vulneratur quidam ad lætera umbilici punctim, reposito intestino & omento, quod parum prominebat, de dolore imi ventris, angustia præcordiorum, motu convulsivo cervicis, vomitibus, tertio die accedentibus, moriebatur placide: mirari subibat hunc subitum è vita discessum:

Aperito cadavere, à vulneratis venis & arteriis mæsarais sanguinem copiosum, cujus tamen ne gutta quidem toto decubitus tempore apparuerat, sub omento delitescere, totumque abdomen replere. Post & intestinum ileum muctone transfossus animadversum. *Guern. Rodinckius Dissertat. Anatom. lib. 1. cap. xiii.*

§. 16. Adolescens quidam post vulnus exiguum inter umbilicum & costas mendosus, mox humo proeumbens quaprimo expiravit; Vocatus, miratus sum eum tam levi vulnere accepto, & circa locum, (mea quidem sententia) *haud ita periculosum*, tam subite decessisse.

Sequenti die cadavere dissecto, causam pervestigans, inveni interiora omnia illæsa, præter umbilicalem venam, in adultis ligamentum potius, quæ quidem vena plane abscissa fuit. *Fabritius Hildanus centur. 5. Observ. 53.*

*In* finis quandiu gestatur in utero per vehem. umbilicalem ad se trahit alimentum: nato puero, vena illa (ne penitus sit inutilis) sensim indurascit in ligamentum, cujus beneficio hep. umbilico aligatur: ligamento autem abscisso, hep. sursum retrahitur, & diaphragma adeo comprimitur ut homo neque respirare neque expirare possit, uno suffocetur illico.

*Locum haud ita periculosum*) An umbilicus abscissus vel ruptus subito mortem inferat, quod Ægyptiorum supplicio perimit, *Laurentius*, & alii crediderint, disquirat *Thom. Bartholinus, Anatom. Re-*

*form. lib. 1. cap. 37.* Contraria, inquit, exempla vidit *Rislaus* experientissimus, & quivis ex Omphalocèle judicare potest, Si mors sequatur, ex accidenti evenit, læsis quoque interioribus & paulo ad rerum noxiarum penetrationem otio: suffocari credit *Sperlinger*, quia resecto umbilico collabatur Epar, à quo trahitur Diaphragma respirationis organum, sed non subito mortem inferit hæc spirandi difficultas. 2. alio ligamento valido suspenditur Epar à peritoneo. Ancillam tribus vulneribus circa umbilicum impetitam narrat idem centur. vid. histor. lxx. *Idem.*

§. 17. Orta forte interebrios rixa, vulnerabatur graviter cum in pectore tum in ventre insignis doctor I. Schrom, penetrante cultri acie in latius lateris dextri intestinum, quod licet ultra 30. horas pependit extra corpus, jam abunde refrigeratum, reductum tandem in suum locum, rediit nihilominus ad pristinam temperiem, sine ullo corruptionis metu, sicut inculcat *Galenus* satis appositè lib. 6. aph. 58. profluentibus interim quotidie per vulneris hiatus, partim fecibus alvinis, partim crudis ac indigestis cibariis: quibus quantumvis pro innotata ingluvie nimis quam frequenter se obrueret hic helluo, glutinabatur tamen non minus prospere intestini vulnus, ac si habuisset exactissimam vitæ suæ rationem: At vero sanato quidem intestino, sed disunctis interim discessi peritonæi oris, incidit tandem in plagæ loco, in insignem prolabentium intestinorum herniam; quæ negligentius habita, degeneravit sexto anno, post inflictam plagam, in tam vehementem gangrænam, ut brevi hominem occiderit sive sanitatis vere socordem: Chirurgus autem qui vulnere præerat, satagens id invenire in ipsis intestinis, & deinceps fibula, vel potius sutura connectere disjunctas ipsius oras, ampliavit non modo plagam, sed eduxit satis confidenter intestina, qua licuit, ex abdomine, quæ inconsiderata ipsius temeritas, tantum æst ut invenerit plagæ locum, & asseruerit ægrum ab hernia, ut induxerit potius in intestinis cum dolore intolerabilem, tum frigus propemodum insuperabile.

Venerunt enim verò dissecto post mortem hoc cadavere; vidimus evidenter veram obitus causam fuisse fidetaram herniam; Sed vulnus ante annos sex inflictum, coaluerat tam densa ac firma cicatrice, ut vix guttula liquoris per illud amplius transsudasset: Infidebat autem id in suprema intestini coli regione; prope membranam illud ligamentum quod per longitudinem ipsius excurrens, quasi robur ac stabilimentum concedit anfractuossæ ipsius fistulæ. *Tulpius Observ. lib. 1. cap. 20.*

§. 18. Juvenis Sabaudus in conflictu vulnus paulo infra umbilicum acie gladii recepit, ex quo intra paucas horas obiit: ego cum ventrem dissecuissem, ipsum sanguine plenum reperi, vena enim cava, è regione renum, acie gladii vulnerata fuerat. *Fabritius Hildanus, cent. 3. Observ. 57.*

§. 19. Anno 1594. Vitum secui qui sibi ipsi eulero violentas intulerat manus, in abdominis regione dextra, statim sub costis, quo vena cava, tam magna sanguinis copia in capacitatem effluerat abdominis. *P. Parvus, Observ. Anat. 11.*

**U**tinvenit plagæ locum] Cur tam difficilis inventu læsus intestinorum locus? an quia perperim moventur, & vix momentum servant illum situm quem invenit ingrediens cultri acies? sive ob naturam motus persistitæ, sive ob assumptum alimentum, vel spiritum ipsa inæqualiter intendentem: Quibus accedit quod in obitus corporibus reperitur interdum tantum carnis ac pinguedinis in abdomine, ut Chirurgus nec oculis nec digitis hæc ad intestina penetrare, nedum acum eo perducere, vel filum ita circumagere ut requirit tuendi illa ratio: quam speciose in intestinorum vulnere læsus deiecit *Ambr. Parvus lib. 9. cap. 34. Idem.*

## OBSERVATIO XXVI.

*Dorsi & laterum vulnera lethalia ob puris copiam in thoracem effusam. 1. Lumborum ob læsum spinalem medullam. 2. Natis ob læsum spinalem medullam ad os sacrum. 3. Natis ob incongruam vitium rationem lethale. 4. Femoris circa ramos Isaac, ob horum dissectionem. 5. Cruris ad dorsi regionem ob læsum intestinum rectum, mesenterium & dextrum ventriculi latus. 6. Natis, ob vitium viscerum naturalium. 7. Cruris ob arterie lesionem. 8. Digitorum, ob nervos ad ossa adjacentes, sequentisque convulsiones. 9.*

§. I. **N**obilis juvenis à famulo domus suæ, quatuor acceptis secundum dorsum & latera vulneribus sicca mucronata & bene acuta inflictis; spatio medio inter sextam & septimam costas sinistræ partis, descendit in ima telum, peritonæo perforato duobus locis: Reliqua duo vulnera peritonæum minime attigerunt, quod secundum musculos externos oblique telum adactum fassor, brevique hæc duo vulnera, quod in cavitatem pectoris non descendissent, curata fuere, læsis utique externis tantum musculis; At vero quæ reliqua duo graviora penitus essent, peritonæo utique perforato, majus nobis negotium fecere, Nam post quatuor ab acceptis vulneribus dies, horror gravis, acuta febris, anxietas, insomnia, gravitas in parte percipi, ut decumbere in dextrum latus minime posset, dolorque oriri coeperunt; inflammationis utique indicia in suppurationem tendentis: Eventus autem rei rem plena fide confirmavit, nam mox post xx. diem purulentus æger factus est, quem effectum indicabant afflicta febris, quæ interdum remissior noctu vehementior, sudor frequens, tussicula sicca sine notabili spugo, oculorum cavitas, pallidus faciei & labiorum color, rubentibus tamen sepe maxillis, præsertim hora una post acceptum cibum, quo tempore intendi febris videbatur,

& calere magis summæ circa arterias partes reliquo corpore apparebant : Ad extremum vero & curvari ungues & tumere pedes ceperunt ; quum jam morti proximus esset, quæ misero juveni post duos ab acceptis vulneribus menses tabido occidit.

Ingens inventa in thoracem & pulmones copia puris, ut nisi spectator ipse fuisset, vix certe crediturus eram tam ingentem puris copiam intro contineri posse, ut quæ mensuram xx. sextariorum æquaret. *Franc. Valleriola Observat. vij. lib. ix.*

**[Ingens copia puris]** Undenam tantæ puris copia ingigni potuit ? Neque enim verisimile habet, ex effuso sanguine tantam copiam genitam fuisse, cum vix æ vulneribus duobus penetrantibus & punctim factis libra una effundi intra cavum pectoris potuerit, tametsi ex sanguine qui malam habeat transmutationem pus ingigni dicat Galenus. Censendum vero pus intra thoracem contentum à sanguine quidem putrefacto ortum habuisse, neque enim aliter fieri potest. Tantam vero copiam non à sanguine solum putrefacto, sed & ab ichoribus qui quotidie à vulnere inter internæ effluebant, genitam fuisse : corruptio etiam nimirum quod ad partem destinabatur alimentum, & in pravam qualitatem à calore putredinali par-

tis demutato, pus fiebat. Unde magna tandem aggregata puris copia, quum quotidie aliquid jam genito parti adjungere-ret, effectum est ut post diuturnum tempus serim congestione facta, nec ullo pacto evacuatæ, ingens puris copia creverit, quæ respirationem mole sua impediens, ægrum misere tandem in mortem deduxerit. *Hæc Valleriola.* Vel dicendum ab acceptis vulneribus hiantia vasa languisera, sanguinem ad nutritionem partis illuc deductum, in capacitate thoracis effudisse, qui contagio puris promptè illius naturam induerit, hinc fraudatis cæteris partibus alimentum, quod totum illud præsumebat, atrophiam & marcor inducitur, &c.

§. 2. Die 17. Dec. 1643. Famulus Eminent. Cardinalis Columna vulneratus fuit se lo peto in ventre inferiore, vulnus autem erat hujusmodi, A dextra parte prope spinalem medullam, quatuor digitis sub regione renum ingressus erat, & transibat per medium spinalem medullæ, usque ad partem sinistram exitus erat, ita ut necessario colligatur in dicto instrumento adfuisse saltem duos globulos, quia unus inventus intus fuit, figura vitæ super residenti in ossium, & alter ratione orificii sinistri exitum petierat, & hoc totum vidimus ex ipsius dissectione post mortem, vixit tantum horas xxx. citat : Qua occasione statim observatum fuit hepar in sinistra parte & Lien in dextra, nec non etiam observavimus ventriculos cordis situm & venam æzygos omnia mutatas *Marcellus Lucius Medicus Romanus ad Panarolum in hujus observat. penultimæ. v. §. vij.*

§. 3. Anno 1633. 28. Junij Illustr. Comes. D. Ioannes de Merode Generalis, tribus globis sauciabatur, duobus sub humero dextro ad cubitum summum transcantibus ; tertio vero per os sinistram os sacrum perforante ; adeoque intra vesicam atque intestinum rectum ad os pubis in femore dextro usque penetrante, ibidemque subsistente : Vir erat annorum xl. stature exælsæ, corporis robusti, elegantis & solidi, barbe tenuis & rufæ, capilli nigri & subrispi. Primo ingressu, vulnus in natum sinistra lethale esse conjiciebam, quod per alium cruenta aliquoties exeereretur, unde intestini recti læsionem præmetuebam : Dolores præsto adequant ingentes, atque ex equitatione citata ab accepto vulnere aucti, ut ventri pronus sup. culi incombere-t. Sermo & animus viribus cum robustissimis constabant, vercundia tantum exule, unde male ominatus, Sacerdotibus curam animæ commendavi. &c. Die 4. Julij (qui erat septimus & criticus) supervenit à meridie singultus, nentius iste pessimus : Die 7. Julij Chirurgis vulnera religantibus, nulla prout antea materia reddebatur, letho in foribus præsolante, vespere intra 7. & 8. singultu magna cum violentia jugalante, placide expiravit ratione, sermone & sensibus integris, viribusque parum labefactis.

Sed multa patuere ex conditura cadaveris, nobis incognita, ejusmodi juxta læsionem ossis sacri, inevitabilem istie mortis necessitatem, consione teste, inferebant.

Ista autem ex anatomica sectione omnibus innouere : 1. Intestina inflata, magna putredine, livore & fœtore infecta, pariterque partes ad pubem circumstantes eadem labe notatæ. 2. Vesica quidem læsa & immunis, sed 3. Renum alter totus corruptus & marcidus, alter itidem infectus, sed paulo minus : 4. Hepar intus & extra totum infectum, putridum lividumque, ut ad contactum etiam dehisceret. 5. Lien eadem sanie extoto corruptus & putridus. 6. Aperto medio ventre, Pulmones magnam partem putridi, lividique. 7. Imo cor ipsum æruleo citrinoque colore ac tabo conspicuum. 8. Cerebrum tandem fore illatum & naturale, extra quod venæ hinc ipse livore sparso videbantur. 9. Atque ita viscera trium cavitatum, exceptis cerebro, ventriculo & vesica, omnia singula eatenus infecta & corrupta, ab antecedente forsan chronico & contagioso morbo, reperta fuere ; unde alias vel levi incidente febrienda naturæ debitum solvisset. *I. P. Lotichius lib. vi. cap. viij. Observat. ix.*

§. 4. Confinedinem alteram esse naturam tradunt Philosophi & Medici, ejus proinde summam haberi rationem ; ne vis naturæ inferatur, æquum est : Nobilis Silesius anno 1672. Parisiis case in una nato vulneratur, vulnere mediocriter profundo, nulla superveniente insigni-



hemorrhagia, nec ullo metuendo symptomate : Medici Aëgrum vino pro regionis more as-  
fuctum, interdunt; solisque iusculis iustentant, quibus Natio Germanica paucissimis uti-  
tur : Languor virium hanc insolite diutæ succedit, & paulo post mors.

Aperto vulnerati cadavere, viscera omnia integerrima reperiuntur : Vulnus citra notas  
phlegmones nullum vas insigne læsum aut nervus : Solus ventriculus iusculorum copia tur-  
gidus & distentus, quæ vino sustentatus concòquere non potuerat, mortis causa fuisse depre-  
henditur.

§. 5. Cadaver. I. Caspari dum inspiciebatur judicialiter, observata duo vulnera punctim  
facta in sinistram femur penetrantia, palmo distantia ab inguinibus, prius profunde femur  
læsit : Alterum, quod duobus digitis transversis à priori distabat, pedem penetravit totum  
lædendo tres musculos, perforando arteriam & venam. *quæ hiati transversis digitis dissecta*, quo  
facto sanguis una cum spiritibus vitalibus copiose effluxit, & mors ipsa necessario subsequens,  
*Paulus Aumanus Med. crit. casu xli.*

**C**ontroversia fuit, an vulnus istud per se lethale  
fuerit, vel an ex accidenti lethale factum ? Item  
an incurabili fuerit : vel annon magis mors exinde  
consecuta, quod vulneratus non d. i. g. i. t. u. s, & sa-  
guinis fluxus cohibita fuerit : Ideo pronuntiamus,  
quod quidem arteriarum & venarum vulnera, per se  
& absolute nullam intrent lethalem, nisi forsitan  
ipsi in locis, ubi nulla ope humana sanguinis fluxus  
sisti potest : Hinc, quia vulnus hoc femori insitum,  
a. b. i. e. r. a. m. u. s. unanimiter quod etiam si arteria & vena  
dissecta, & aliquot muscoli læsi, nihilominus sanguis  
in hac parte affecta per convenientia præsidia chirur-  
gica sisti, Patiensque curari potuisset, si modo cu-  
tam ipsius sedulam gessissent adstantes. *Indicium Me-  
dicorum & Chirurgorum Witebergensium*

Sequitur Responsum Facultatis & Censura Lipsiensis.  
Consultum medicatores n. o. s. t. r. o. s. cum Responso  
Witebergensium in concilio nostro, & explicatio-  
nis ergo hæc subijungere placuit, quod *per se lethale*, &  
vulnera lethalia ab Hipp. Galen. Cels. & aliis Medi-  
cis duplici modo sumuntur, 1. occurrunt æpe vulne-  
ra quæ sunt *per se lethalia ex necessitate*, i. e. quæ mors sub-  
sequitur, etiam si Chirurgus de diligentia sua nihil  
regittur, v. g. quando cor, majora pulmonum vasa  
perforantur, (Hippoc. 18. 6. Deinde dantur vulne-  
ra, *quæ mors non plurimum excipit*, vel t. o. t. o. i. d. i. u. m. u. l. e. r. u. m.,  
quoniam Chirurgus officio suo fungatur. Obser-  
vamus tamen ea aliquando fuisse curata, v. g. vulnera  
ventriculi cerebri penetrantia, substantiam pulmo-  
num, Diaphragma lædentes. Præterea, existunt etiam  
vulnera, quæ quidem in se non lethalia, v. g. quando  
musculi, venæ & arteriæ minores læduntur, sed ex in-  
curia Chirurgi, aut parentis mortem causantur.

Hæc ad præsens vulnus applicantes, deprehendi-

§. 6. Lustrant 3. Febr. 1662. Chirurghi Nostri Urbani cadaver servi cujusdam cæmentarii  
violenta morte extincti, & sequentia notarunt : Caput intumuerat & facies nigricabat, circa-  
que collum papulæ fuscæ : Scrotum cum reliquis partibus vicinis intumuerat, nigricans, gan-  
græna oblitum : crus dextrum nigricans cum hydatidibus, sinistram non nil sanioris erat  
coloris, sed hydatides ovi gallinacei magnitudinem superabant : Vulnus ex crure sinistro ad  
dorsi regionem penetrarat :

Aperto abdomine visum est vulnus penetrasse intestinum rectum & mesenterium, cujus  
vasa læserat, unde ingens illa sanguinis profusio, & ex residuo cruore stagnante gangræna,  
quæ mesenterium occuparat, maximamque intestinorum partem dextri lateris, & dextrum  
ventriculi latus infecerat. Non igitur dextræ partes sinistris fortiores, ut vulgo creditum, id-  
eoque affectis partibus sinistris, dextri lateris quoque habenda ratio. *Thomas Bartholinus centu-  
rio, Epist. 29.*

§. 7. Generos. Militiæ Dux Generalis I. Ramsay Scotus, accepit 13. Febr. 1638. inclinatio pa-  
ram antrosum, corpore in sinistræ natis partem superiorem & externam, introsum, & de-  
orsum leviter tendens vulnus, ex quo statim concidit, cum insistendi illi erui impotentia, nec-  
dum remittente, effluxit ex hoc vulnere, & quidem statim in principio satis copiose sanguis,  
nullo notabili ex unctione (quæ utpote levis admodum 5. die remisit) labiorum vulneris adia-  
centiumve partium tumore aut inflammatione suborta, sed generato paulo post laudabili, si-  
cer

cet paucopure: unde confestim ad cicatricem properavit vulnus, quod 25. Martij plane occlusum, quamvis etiamnum lividum sit & doloris particeps. Primis diebus obortus est, adhuc durans, etiam auctus, circa lumborum inferiorem & sacri, imo totius ischij ossis sinistri regionem, dolor vehemens, per intervalla, maxime ad aeris mutationem, nunc remissior, nunc intensior, cum tensione & sursum per totum spinæ dors. ductum ad cervicem, deorsum vero ad extremos articulos itque tractione convulsiva, eaque valde molesta, ad oleorum tamen nephriticorumunctionem aliquomodo emendata, licet sæpius recurrente. Huic comes factus est sinistri cruris, dimidiam & externam partem infestans, & contactum pati nescius, atque cum stupore aliquo formicans dolor, ad articulum extremitatem protensus. Die Martij 12. obortus est circa sinistram pedum, & in metapodio, in parte exteriori maxime, tumor expansus, enim dolore mediocri, ad contactum tamen ingravescente, qui applicari à Chirurgo ad utrumque malleolum vesicatorijs, & effusa aqua clarina, intra triduum subsedit & evanuit, relicto ad hoc tempus ibidem dolore: His accessit circa Martij. 22. sinistri testiculi cum dolore inflammatio: circa idem tempus emisit urinam albicantem cum simili sedimento, eoque crasso, tenaci & paucopure: Percepit præterea ad internam sinistri femoris inflexionem, prope illam locum quo fertur in scrotum, spermaticis vas. dicata peritonæi productio, dolorem satis molestum, nullo adhuc nec alibi apparente tæqui, multo minus visui tumore aut stabili saltem rubore: Quibus tandem adde miram quandam, quamque exprime nequit, in abdomine temporibus incertis divexantem molestim, & talem quidem quæ nec proprium ferat contactum. Re itaque deliberata cum Excell. D. Fausto Fr. Sylvio & G. Moltheto, omnia tentata pro salute recuperanda: Tumor vero in scroto cum in dies augeretur, atque Ecchymomata insuper partes non tantum externas, sed & fauces, linguam & palatum occuparent, doloresque dors. magis magisque urgerent meum quoque consilium expetijt, Vocatus deprehendo Herniam &c. (*Vide lib. 3. sit. de Hernijs*) Præter quam noto quoque Ecchymomata supra jam tacta, quæ verebar non critica esse (ut fuerunt in puella epileptico & sexagenario arthritico, de quibus *Greg. Hørsius lib. ix. Observat. xi.*) Suspicabar à debilitare viscerum sanguinem a ductum ex venis, per subsultum quasi, effundi in musculos: Suasor fui, ut materia adulta tartarica in hypochondrijs incuneata, præpararetur, & evacuetur: ut 1. Rens sinister maxime ab heterogeneis viscidis quæ, puri non ab similibus humoribus excrementitijs liberaretur ut 2. Viscera singula concoctionis firmarentur: Atque 3. quoque Herniæ, & 4. Ecchymomatis prospiceretur: ast omnia incassum, sequenti enim mense moritur.

Corpus Defuncti 19. Julij, à me apertum sequentia notanda dedit: in musculis observabantur *Emphysemata* & ecchymomata tot & tanta, ut majores muscoli plerique putridi fuerint, maxime oblique ascendentes & transversu in sinistro latere: Peritonæum in eodem latere nigricans & putridum conspiciebatur: Vasa mesenterica crassa materia biliosa turgebant: Ventriculus cum intestinis modicum aquæ continebat: Heparis vero color, quoad concavam partem, nigricans & cinereus: quod externam flavescens, substantia aurem scirrhusa erat: Renum loco portionem pinguem quasi, Lienis vero loco ovi gallinæ quantitate nigrum fructum, sanguinis coagulati facie inveniebamus: Cavitas, circa vesicam, abdominis aqua repleta erat, ut & scrotum circa sinistram testiculum, potissimum dextro longe minorem: Vasa testiculorum varicum modo consistebant: Dextri testiculi substantia spongiosa & putrida, tuniceque adnata erat in dextra scrofi parte caro adiposa: Pulmones copiose pus dabat: In cerebro nil poteramus p. n. aut notabile invenire, præterquam magnitudinem ingentem omnino: omnes vero venæ destitute fere erant sanguine, refertæ sero. 1. *Dan. Hørsius Observat. Anatom. v.*

**I**n musculis Ecchymomata ] A causa interna non sunt valde familiaria, uti nota sunt quæ à causis externis, corruptione aut casu fiunt: Ecchymomata, transfusiones, melasmata, denigrationes schirris affines pu-

tar *Gal.* Fiunt enim illi affectus sanguine ex ipsis venis effuso, nunc tunice earum compulso, nunc ipsarum finibus reteratis: Hinc in Rampei venis fere nullus sanguis fuit repertus, nuda aqua & serum. *Idem.*

§. 8. Malo fero Illustr. G. Rosencranzj Filius ab alio Nobili in crure sinistro vulneratus, ingenti hæmorrhagia pene statim occubuisse, nisi sedula Chirurgorum opera vulnus fuisset obligatum: Tanta tamen sanguinis copia ex vulnere profluxit, ut convulsionibus imminentibus extrema videretur pari: Dilata vero mors fuit ad xiv. diem, quo superveniente febre; virium defectu & crebrioribus convulsionibus, expiravit placide.

Sectioni cruris à Chirurgo institutæ, præsentis observavimus vulnus cruris penetrasse musculum fascialem, seu sartorium, & arteriæ cruralis divaricationem primam, quam amplo foramine lacerat, unde ingens illa hæmorrhagia, sursum quæ ad regionem perinæ descendit: Observata in vicinia muscularum tricipitis & lividi cavitas ampla, ovi magnitudine gangrenam minitans, sanguine purulento conspersa: Ipsum vero hiatum arteriæ cruralis, quem

quem in divaricatione gladius infelix effecerat, grumofus fanguis obturarat, quæ caufa fuit, quod univerfi fanguinis effluxus inhibitus fuerit, ne, ficut plerumque fieri folet, mors repentina fequeretur : magna dexteritate Chirurgorum tarundas longiusculas & filios immittentium cautum fuit ne abrafo grumofa fanguine exitus superficiei fanguini aperiretur : *Thomas Bartholinus in Miscellan. curiof. anni. 1671. Obferuat. 161.*

§. 9. Periculo non carent digiti inflicta vulnera, ob tendinum nervorumque contextum, quibus etiam leviter punctis convulfio fuccedit, fi per tranfverfum refcindantur, minus periculi. Juvenis triplici in digiti manus dextræ vulnere fauciatur : dextre curatur, fed poftmodum orta convulfio, quæ in dies exacerbata xi. die cum extinxit. Cum præfici nervi tendines que convulfiones excitare non poffint, fufpicabar nervum tendinemque femifectum has turbas creaffe, neque inflammatio partes læfas corrumperat, quia ex fanguine, fed tam fana vulnera, etiam poft mortem vifebantur, quafi nuper inflicta.

Cadaver luftratam, & tria deprehenfa vulnera, quorum primum fatis amplum confpicebatur in flexoribus fecundi internodij pollicis manus dextræ, nervifque amputatis ad ipsum os primum pollicis, & metacarpo proximum penetrabat, paulo infra flexuram fecundam : Alterum erat ejusdem manus medij digiti, qui in 2. internodio amputatus erat prominente offe : Tertium, in ejusdem manus anularis junctura fecunda, & præter ea in toto cadavere nullum obfervatum, lorærogatis ijs qui ægro adfueraut, adeoque exquisitis ijs omnibus, quæ decumbenti acciderant, æftimataque vulnerum constitutione, pronuntiandum vulnus pollicis, ut non fua natura lethale, periculofiffimum tamen, & ob fequuta fymptomata graviffima, veluti convulfiones vehementes totius, ægro lethale exitiffe. *Bartholinus cent. 4. hift. 50.*

## OBSERVATIO XXVII.

Epigaftrij *Vulnus lethale, ob fundum ftomachi perfoffum.* 1. 2.

§. 1. **M**ercator anno 1624. 13. Octobris culrello foditur in abdomine, in regione Epigaftrij, multo cibo potuque fartus, Alio in thorace ictu foßus fuit inter IV. & V. costas, fine ullo tamen vomitu, nec abdominis plaga quicquam ingeftorum egerebat : Pulsas, cum nafo algebant, abdominis dolor & durities magna : vixit horas xxx. à læfione.

Seçto cadavere, invenimus fundum ftomachi perfoßum, & cum inde manifefta & neceffaria mortis caufa adfereretur, ad fuperioris vulneris investigationem itum non eß, & Ogeri judicio meoque, male, notabile enim erat & patticularem difquifitionem merebatur. *H. Heers Obfervat. Med. xxv.*

**M**irabantur quidam nihil fanguinis per vomitum aut feces ejedum, nihilque cruoris in iple ventriculi fubftantia apparuiffe, fed qui notabant ventriculum cibo potuque reñiffimum, ftomachuque

fubftantiam carnis & venarum minimum, membrarum exanguium plurimum poffidere, inter peritoneum autem & inteftina multum defluxiffe fanguinis, mirari, vel morari potius definebant. *Idem.*

§. 2. Arch'iepus *Pauli III. Summi Pontificis*, cum apud Anconam ageret, enfe perfoßus fuit inter umbilicum & os ventriculi tranfverfaliter, hoc eß, ab uno latere ad aliud, adeo ut ab utroque latere vulneris ofcula magna apparerent, Ad quem cû Chirurgi accefferunt, intus inteftina reducerent, quæ illaße eße dicebant, quia nullum intus ftercus exierat, ac fic cutis vulnera confueverunt, ab utraque parte orificium dimittentes, in fingulo quorum linamentum immittent : Sequenti vero die obiit, cujus cadaver diffecare fecimus, & ftomachi infirmam partem incifam confpeximus. *Amatus Lufitanus cent. 1. curat. 67.*

**I**n teftina illaße eße dicebant] Cæntiebant hic Chirurgi in hoc quod dicebant inteftina læfa non eße, quia inde ftercus non exierat : quum fi inteftina gracilia læfa fuiffent, non inde per ea ftercus emitti neceffarium eßet, quia in inteftinis gracilibus ftercus nullum reperitur, fane enim viz deductionis chyli, ex quibus mefenteria hiantes ad jecur alimentum trahunt, unde *Avicennam* in hac re hallucinari, qui ftercus formam fubftantialem in ftomacho recipere concedit, ætenui eß. *Idem ibi.*

Cutis vulnera confueverunt.] Dubium an ventris vulnera ex toto debeant fui, vel potius in illis orificium

aliquid firi dimittendum : Cui refpondet P. ab *Argelata*, non infelix Chirurgus, quod ex toto debeant fui vulnera ventris, quia aliter inteftina multum shærentur : Dicit forte aliquis ? imo oppofitum agendum potius videtur, quia fi non aliquid orificium ibi maneret, fanguis concretus abieffum faceret : Refpondet *Argelata* ventris partes eße exangues, & quod pauculum illum fanguinem natura ad emundioria emittere poterit, & eo magis fi à Medico cum medicamentis fanguinem diffolventibus adjuv fuerit, inter quæ coagulatum leporis palmam obtinet. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XXVIII.

Cafus in Dorsum lethalis ob quinque vertebras vitiatas. 1. In Latum ob læfum Lienem 2. Ob læfum Hepar & ruptam Veficam fellis 3. In Pectus ob contufionem auriculæ cordis & Inflammationem lo.

*labi Pulmonis 4. Ex casu Colon peritoneo adnatum. 5. Lethalis ob rupturam vena cava. 6. Verbera morte sequuta ob sanguinem per habitum corporis & viscera effusum, Inter cranium & duram matrem. 7. Concussio corporis à rheda lethalis ob vim Pericardio illatam & Pulmonibus. 8. Ob abscessum genium inter musculos abdominis & peritoneum. 9. Ictus lateri inflicti lethalis ob contusum diaphragma venasque vicinas disruptas. 10.*

§. 1. **B**ajulus quidam dum calcem ædibus extruendis in altum deportat, de scalis quatuordecim pedes altis in trabem subiectam supinus decedit, ita ut vertebrae dorſi dislocatz, ac proinde dissolutæ fuerint: Hic nihil relinquit intentarum ad pristinam recuperandam valetudinem, verum frustra, quando quidem corpore incurvato, & facie terram vetus vitam suam misere sinijt.

Dorso mortui aperto, quinque vertebrae conglobatas conspiciamur, cui adhærescebat collectio quidam viscosa ac bituminosa, cujus collectionis causam esse puto humiditatem spinalis medullæ, renascentemque illam vertebrarum materiam sjs inhzrentem, ipsumque adeo humorem, qui ipse sedem suam in ossibus habet, vi casus expressum, quæ cum natura expellere acquireret, in gypsum quasi calore naturali omnia illa inspissante, conversa sunt. *Nic. Fontanus annot. in cap. 1. Epitomes Vesalij.*

§. 2. Faber lignarius ex loco superiore deciduus, læsum habuit latus sinistrum: Inde læsus Lien qui præter modum induruit. *Vide lib. 3. tit. de Hypoch. tumore.*

§. 3. Puera præceptor in seammum violenter protruditur, hinc queritur de hypochondrio dextro: Hepar evaserat dutum, & vesicula fellea disrupta fuerat. *Lib. 3. de Hypochond. dolore.*

Christianus Sudi Gallus, annorum octo, dum pueriliter scabellæ & menias vitulatur, cesserat inopinato casu pectus, quod alissum capiti sedibus ictum excipit gravissimum: Ille tamen ne in offensam Parentis incurreret, dissimulari factum, sed ex eo tempore ad ludendum segnior, paucibus post mensibus pallefcere incipit & de ventris doloribus conqueri: Advocatus ego, lapsusque illius ignarus, præscribo quæ lumbricos excleant, quod ex pallore, ex nubilis sub oculo utroque deatibus, frictione narum, tenso abdomine conjicerem verminare puellum: & quidem eo successu propinata illa pharmaca, ut prodirent tandem lumbrici longi tum per os tum per secessum: Nihil tamen confirmator sanitatis puer, non ita multos post dies ex ætitudine decedit, me non parum sollicito, cur ejecto hoste perijisset. Nata mox suspicio non exclusos lumbricos omnes, sed residere adhuc ferocissimum, eumque foras intestinum allicubi perforavisse, hinc labem & mortem consequutam: Illud ipsum mihi remen ambiguum, quod notassem ante eos, quibus erosa à lumbricis intestina, clamosa plerumque morte obire, hunc autem nil tale passum. Quid multis? convenit inter me & curiosum parentem, ut Chirurghi manu aperiretur, hæc enim via duntaxat tolli dubium.

Aperitur ergo novacula Georgij Urstedij: Nulla in intestinis erosio observata, sed plures adhuc vivi lumbrici in colo norati: Renes fere quam in adulto majores: Dextera cordis auricula sexuplo major sinistra, sed livida sanguine coagulato resecta; scil. illa parte ante quatuor menses ictum receperat: In dextro cordis ventriculo frustum carneum oblongum, sed nequam annexum, in sinistro pinguedo item libera & vermiculo cætera non dissimilis, Pulmo dexter, qua lividam illam cordis auriculam spectabat, flavus & pene putridus, sinister autem costis adnatus. *Oleus Borrichius in ad. med. Thom. Bartholini ann. 1674. 75. & 76.*

§. 5. Colon intestinum in dextro latere ad exortum suum pertinaciter adhærebat, & adnatum erat peritonæo, ut & in sinistro latere, non tamen tantopere: Utrobique autem apparebat quasi sanguis pæcus suffusus, unde conjeci hominem aliquando ab alto defiliisse & læsas fuisse has partes, & postmodum coaluerint. *Ioh. Rudolphus Saltzmannus Observat. p. 53.*

§. 6. Quendam secui lapsum ex alto: aperto ventre inferiore mox effluxit sanguis multus in sparium, fracta vena cava effusus: Hepar habuit magnum, pallens, quale est coctum & cocti modo tenerum & fragile. *Jacobus Sylvius observatorum in varijs corporibus secandis &c.*

§. 7. Anno 1601 aperui corpus mulieris in Nosodochio nostro, quæ se gravidam esse putabat, ar falsos: Aperta fuit iussu Consulis, ut an ictus & verbera, quibus misere tractata fuit, mortis causa fuerint, pateret, quod ita esse deprehensum fuit: præterquam enim quod per univerſum corpus sanguis inter cutem & carnem effusus fuerit, etiam ipsa viscera non parum læsa fuerint: Et iarra cranium & duram matrem magna sanguinis copia continebatur, *Ioh. Rudolphus Saltzmannus Observat. Anat. p. 7.*

**V**erberibus ad necem usque, sed quæ quarta demum die accidat, eadē à nefarijs quibusdam in Italia, quos placida morte, & cujus nullæ exterior notæ eluceſcant, summa est: Uruntur sæculis, in tucetorum aut pilorum fornam effictis, arena reſertis, quibus in humerum, artus & truncum repetitis ictibus feriunt, certo dimenso, eo modo exceptus vix dolorem aliquem percipit, liberatus lassitudinis tantum

sensum percipit, eaque die & postera epidemicus est, tertia sic clinicus, accedente levi febre, quarta extinguitur? Ab ictum scil. frequentia venæ capillares habitis, imo & viscerum disrumpuntur, fibræ musculorum dissociantur, hinc putredo sanguini & carnis inducitur, quæ mediante sanguinis circulatione ad cor traducitur.

§ 8. Agricola plantiffructu onusti eversionem & ruinam in se sustinens, de punctorio ac gravativo simul dolore in pectore conqueritur, & de quadam cordis compressione, ac spirandi difficultate: Pericardium defuncti scatebat pure copioso, cui velut immersum cor: Pulmo ejusdem labis particeps &c. *Videtur de pectoris dolore. lib. 2.*

§ 9. Quidam à rotis rhedæ fuit conquestratus, sine costarum notarum fractura: ereditum jecur læsum ratione situm: In laeis musculis abdominis, ex dextro latere materia purulenta copiose effluxit: integro jecore, apertissima enim intra musculos abdominis & peritoneum continebatur. *Vide sit. de hypochond dolore. lib. 3.*

\*. 10. Cum anno 1654. pugiles nonnulli in palæstra publice digladiarentur, Tympanista quidam interveniens, accepta clava lignea athletarum non neminem ad pugnam provocavit, primoque statim congressu vehementi ictu in latu: finistrum percussit, unde subito concidit sine sensu & motu: In vicinam cellam vinariam à sodalibus deportatus, infusoque in os vino generoso, paululum respirare visus est, brevi tamen post è vita discessit.

De tecti in spe toque cadavere, latus finistrum circa costas mendosas & dorsum sanguine multo undique diffusum deprehendi: Aperui corpus, ipsumque diaphragma, in utraque fissioie, tam qua cor, quam qua Lienem spectat, valde contusum, venasque à vicinis vena cavæ & arteriæ magnæ truncis prodeuntes, disruptas inveni, ex quibus ingens sanguinis copia profuserat: Hinc dissipatis spiritibus & impedito diaphragmatis ad respirationem & vitam summe necessario motu, aliter fieri non potuit quin ictu tam vehementi percussus moreretur. *Salvazar Timanus Respons. Medicin. xv.*

## OBSERVATIO XXIX.

*Alapam mors subita sequitur nullo læsionis in cerebro apparente signo. 1. Ictus ad nucham lethalis ob effusum sub cranio cruorem & meningis phlegmonem. 2. Ictus pectoris lethalis ob Pericardium alijum & extremam costam fractam. 3. Lateris versus dorsum percussio lethalis ob excitatam in mediastini intercostales vomitum. 4. Pectoris ob contusionem intus excitatam. 5. Lethalis percussio recti ob vitiosam viscerum constitutionem. 6. Casus in Dorsum lethalis exinde læso hepate, renibus 7. Hypochondrij sinistri percussio lethalis ob fissuram in Liene excitatam. 8. Hypochondrij dextri ob læsionem intestinorum, diaphragmatis, vasorum mesenterij. 9. Hypogastri, ob puris copiam in tegumen devolutam. 10. Hypochondrij sinistri, ob jaiciatum Lienem. 1.*

§ 1. **A**Nte paucos annos uxor accepta à marito alapam tepente concidit & expiravit Medicus aperta calvaria & cerebro inspecto, ejusque membranis reliquisque vas, maritum infontem judicavit: *lob. Rudolphus Camerarius memorab. medic. cent. x. §. 43.*

**B**ENIGNINI Obser. 110. de Abditis narrat juvenem accepta alapam inter lites, in apoplexiam incidisse quæ paucis horis egrum strangulaverit: Quibusdam abiectione materiam commotam fuisse opinantibus, alijs in humiliorem locum, quo diutius obdormierat cau am rejectionibus, nonnullis in leniorem victum quo juvenis usus fuerat, pundo indiscussum apud Præsidentem mansisse iudicium. Parentis mei b. m. *Andrea Boneti*, Medici celeberrimi sagacitate, quidam ab insecta alapam in vitæ discrimen adductus è carceribus liberatus est, Hic hominem callumijis læscentem stridissimæ alapæ percussit, qui injuriam ad: o egre fertur: jejuniu se modeste deesse verit, quo mors superveniens percussori imputaretur: Cum nullo molimine ad cibum fundum incitaretur, pinqne quantiduum exactum esset, quo tempore famines amplius molesta non est, accedens Pater, qui curam illius susceperat, hoc commento obstinatam ad obitum vique jejuniij deliberationem excitavit: Fingit à Magistratu judicium de re petiti esse, Se inimicum culpa liberasse, quod ad solam alapam mors sequi non possit: non idè esse de jejuniu, quod mors se primo die necessario sequatur: Quo testimonio audi-

to, protinus reum absolutum esse, ac è carceribus educitum, ipsum vero, quod propterea necis author esset, ex Senatus consilio, post fatam, tunc impostum, promovere ad paribularium ex Urbe vehendum Quibus auditis nullo alapæ percussus jejuniu solvit, cibumque possit: Percussori vero carceribus eximptus, gratiaque vero parenti agens pro restituta libertate, ab eo quartis, num alapæ ea vis esse poterit ut in mortis periculum adducere valeat? Cui Pater respondit, percussum cacochymum fuisse, biliosum, in quo vitiosi humores congesti, accedente causa provocantia, contrahi fuerint, latentemque morbum, atque crumpere paratum excitaverint: Eundem si amerizum cacochymum biliosum purgat ore exclusisset, morbum evasurum fuisse: Tum percussor gratias, inquit, ago pro salutari monito, nunquam enim decemiceps cum quopiam alterabor quin enim dem prius se adoriet, Cura tibi corpus expurgari & vasa sanguine depleri, demum te proinde promeritis es mulcatur. An vero colaphus genuina mortis causa sit egegit disquirat *Panili Zaccagni Quæst. Med. Legal. lib. 3. tit. 2. q. 10. §. 3.*

§ 2. Calpar N. in Caupina bene potus, cum Jacobo N. domum tendens, lapide Nucham Jacobi petijt, tam vehementer ut quatrduo post obiret.

Inspectione cadaveris habita, observatum quod Jacobo venasque disrumpere molitæ quæ sanguinis crassi & coagulati sub cranio collecti, ac dolore intolerabili per hoc rridui fuerit correptus: Quæritur an dictus Jacobus ex jactu lapidis in Nucham, Vel magis ex malo regimine bictis?

**R**ESPONSUM Facultatis Medicæ Lipsiensis. ] Ad Jacobum N. lapide tactus paulo supra collum, quo calvaria latitudine imperialis, citra tamen illam le-

golem, fuit dehinc data, ipse quoque statim in terram cecidit, alterato oculo totum (subinde videns, omnibus sensibus destitutus, loquela privatus, quæ symptomata 4. die mors excepit, apertoque crano mater dura retruncta latitudine livida, sanguine suffusa, sub qua cochleare sanguinis coagulati repertum, hinc quoque nulla Trepanatio, quia cruro sub meningibus cerebri collectus. multo minus emplastra, clysteres vel venæ sectio, pro revulsione prodesset ponerent. Ideo unanimiter concludimus, ex fundamentis artis nostræ, quod rebus sic se habentibus, Jacobus N. à jactu lapidis, in Nacham factò, necessario obierit, minime vero ex malo regimine.

*Nacha*] Anaromicis est medulla spinalis initium, & omnium nervorum: Nec dubium quin jactu isto læta fuerint vertebrae cervicis, & potissimum *Atlas* & *Epistropheus*, & præ cæteris ejus *Dens*, utpote à cujus luxatione insaniibilis Angina oritur.

*Sub crano collectum*] Trepanatio an prodest quando sanguis conglutatus est sub meningibus? Dico si non totaliter, tamen in tantum parat: Et quis hanc circumstantiam semper potest hæcolari vel præsupponere? aut est-ne propterea trepanatio in tali casu dubio procul intermitteunda? *Paulus Ammannus Medicina critica casu xxiij.*

§. 3. *Claudius Bonvet* ex pago *Longeville* in comitatu *Montbelgarden*si, anno 1668. 23. Sept. à *D. de Commun*, Tirione in pectus ulnistrum projecto ictus subito concidit exanimis & mortuus: Chiturgus in absentia mea aurographo deposuit Tempora sinistra absque vulnere livida fuisse; quibus apertis sanguinem extravasatum musculo crotaphitæ superjacentem invenisse, interioribus cerebri, ipsoque crano sese naturaliter habentibus: In exterioribus thoracis nihil apparuisse quidem vel contusum vel laceratum: hujus vero apertura facta, quoniam sinistro lateris venarum costam fractam occurrisse: cujus dentate extremitates Pleuram & Pulmonem perforassent, ipsique Pericardio, circa cordis apicem, rubram striam, pro fracturæ latitudine sine vulnere impigissent: Quod eo manifestius constabat quoniam thoracis latera compressi erant, tunc enim fractæ eorum extremitatem alteram directè ad Pericardij sibi commisitisse: Nullam in toto illo latere fuisse sanguinis expansionem vel præter dictam realem conformationem asserere: In dextro vero Pectore Pulmonem integrum lividum, tumidum, & membranam pleuræ strictè ab ipso diaphragmatis & verarum costarum, à mediastino ad dorsi vertebrae & calciculas coalitum, ita ut nonnisi laceratus separari à membrana & costis poterit: In ventre inferiore expansa erat bilis in jecur, vacua ejus vesicula.

Super his ut sententiam ferrem meam, & an illa percussio lethalis nominari debeat, à Senatu die 27. Octobris, jussus, citra meliores informationes & veritatis præjudicium ita sensi: Livorem sinistrorum temporum ab ejusdem tisionis reverberatione sortitum, quoniam unicuique accipisse pulsum comitaret, & tunc ipso à pectore ad tempora spatio longior non esset: Talem vero contusionem sua natura lethalem dici non posse, quoniam fuerit superficialis, non vulnerato manio temporali, cujus vulnera ne quidem lethalia esse pluribus Observationibus *P. de Marchetti* & aliorum certum est: Costæ fracturam, Pulmonis

vulnusculum, & pericardij percussione, separatim vel etiam conjunctim tam repentiū mortem sua ipsa natura necessario non potuisse excitare, ut illa omnia pluribus & rationibus & auctoritatibus stabilivi ex *Fabrizio Hild. Paras*, *Fallopio*, *Th. Bartholæo* lib. 2. de Thor. &c. Siquè Pulmones dextri non ita costis adhæsisent, & respirationis usum in valde adirato non denegassent, talem forte incussum non exitiosum fuisse: Quorum tamen decisionem, quæ fori non esset nisi ex parte mei, Juridico & sapientiori committebam. *J. Nic. Buntingerus cent. ix. Obsequio. lxxv.*

§. 4. *J. Hænius* graviter percutitur in latere dextro versus dorsum: In mediastini intercapedine vomica reperiata, Et similis sterno sub Pleura laesa est. *Vide tit. de Febribus.*

§. 5. Rusticum eques in thorace sclopeto percussit, qui post septimanas aliquot expiravit. Post apertionem pectoris, intrinsecus contusionis signa eo in loco apparuerunt. *Vide tit. de Hamoptysi lib. 2.*

§. 6. Anni 1662. Martij 26. ante meridiem hora nona rusticus ebrius, ætatis consistens, ex pugno pectori inflicto supinus sterneritur: Exemplo conqueritur de frigore, dolore tumore, ita ut ægre deambularer, attramen ejus diei vespere extra urbem ad suam familiam confert, quæ sesquihora distat, decubuit, sanguinem spuit, punctioibus gravissimis in utroque latere excrucietur, sitis ingens, & tandem mentis vacillatio adfuit, quam excepit convulsio & mors, 30. Martij, hora ipsa meridiana.

Jussu Illustr. Magistratus Bernensis cadaver inspeximus, & quid exterius, quid interior apparet, hoc modo notavimus. Dorsum à scapulis ad lumbos lividis lenticulisque maculis, quasi vibices verberum essent notamus, quæ novaculis insita nulla suffusa sanguinis vestigia, & ideo coagulati præbebant: Pudenda livida etiam gangrenam quandam innuebant: In sinistro cubito, circa olcrani protuberantiam, ex ecchymomate sanguinis, quod ex baculo ferebatur adesse, livor, sine tamen ossis fractura, luxatione articuli & carnis discissione, fætor tantus, qui nec suffitu odorifero, nec igne inflammante poterat emendari: Aperto abdomine, hepatis, lien, stomachus, renes & intestina omnia salva lustravimus, in figura, colore & situ, nisi quod intestina flaribus turgabant: In thorace externe sub mamilla dextra, uncialis nummi macula livida, ex memorato pugno aderat, sine effusione sanguinis itidem, vulnere, fractura, sine luxatione costæ, sine totius compagis; quæ sternum dicitur, læsione: Dum

interium thoracis claustrum inspicimus, omnia contenta quasi fumo fusca forent, visa sunt, & utriusque lateris pleurae Pulmonis lobi firmissime haerebant: Pulmo siccus & lividus notis interstructis in superficie: Latus putridu: & quasi pus siccatum apparebat: Cor vix princeps & moderator, illis Pericardio & ejus aqua, omnino flaccidum: Cum dextrum ventriculū ferimus, apparet materia subalbicans, pancreati omnino similis: dū istam trahimus, seminalem, vel quinque digitorum longitudinem aequat, & duos transversos latitudinis, sanguini coagulato qui ex vena pertusa in facis & pelvi exceptus concrevisit similis: Cū tamen simile quid veræ pinguedinis interspersum esset, cum tenacitate, quod nec unguibus cedebat, diversum quid judicavimus: Ventriculus iste præterea sanguine putrido, i. e. sine fibris scatebat: Dum sinistram cordis foveam scutamus, siquidem dextro thalamo ipsa nobilior audit, etiam parem in ea materiam & longitudine & visciditate reperimus, Ex his Cordis Polypum dicimus, & uterque ponderabat ad minimum uncias quatuor, Caput etiam apertum, sed nulla offensionis nota vel in cute, vel in pericranio, vel ipso cranio & meningibus apparuit. *Martinus Bogdanus apud Bartholinum Epist. xi. cent. iv.*

**S**ætas, temperamentum siccum, vita laboribus crustis assueta & dedita, calidior veris præsentis constitutio, & in hoc casu dispositio nobilioram viscerum & ebrietas expendantur, sine ullo vulneris lethalis indicio, & circumstantis incognitis, incusare morbum malignum prætoris posuimus, qui Pleuropneumonia dici potest ob *emphysa* symptomatum: Esi supinus ex percussione cecidit, & exemplo dolorem utroque in latere pungentem cum lassitudine spontanea petcepit, cum tamen nec consilio nec auxilio Medici usus sit, sed fr. goris molestiam symptomata harrata cumularunt in ebrio irato, indignabundo, vindictæ cupido, difficulter proxima mortis causa à nobis potest designari, vel ex his certa nota quæ vel ream vel mortuum ipsum inculparet: Viscera pectoris omnimode læsa, etiam à majore tempore cautam indicant: Sic causa concomitans lapsus, ebrietas, iracundia, vindictæ cupido, quæ omnia facile abditas & latentes causas irritant & explicant: attamen intolerabilem ferorem; vibices in dorso sine sanguinis coagulationi præsentia, & pendula livore circumfusa, neutiquam nudus tertius ponuerunt causari: Equidem ulcerani regio insulsa quidem sanguine erat, & istam majorem quam ulibi monstrabat, est tamen sine laceratione, fractura & vulnere, nec cum his tanti habenda esset præsentibus, quod hujusmodi plagas non sufferunt sine discrimine vite: Itaque dictus puer ex maligna putredine pullulavit, ejusque characteres macula livida, quæ etsi in nullo ægrotantium adhuc à nobis observatae sunt, Forsitan summo cum infortunio se primum in hoc mortuo explicaverunt: Hujusmodi Pleuropneumonia Medicis maxima eo-

ghim est, quæ neutiquam præsupponit ejusmodi procacitatis causas, sed contagium, aut vicium, aut cœlum hac hyeme huic regioni diversum, & pro synedecia habet peculiarem malignitatem & sanguinis corruptionem. Optime hæc memorandam *Valerius Maximus lib. 9. caput. reliquit, Fina namque vita nostra variis & occultis causis exposta, imprimis quadam immerentia suprema fasti insulam occupant, cum magis in tempore mortis incidant quam ipsam mortem accersant.* Itaque petimus quod verba & lapsus dici possunt mortis causa, sed remota, aut primaria & proxima: neutiquam: Nulla observata est fractura, contusio, vulnus, nec sanguinis aliqua profusio in cavitatethoracis: materia (seu purulentam seu polypodeam vocamus) in corde à nobis animadversa, alicujus venæ diutius testari possit, sed omnes venas cordis salvas vidimus, tum etiam eas que in modum coronæ cor ambiunt: Itaque coagulatio ista à caloris p. n. violentia provenit, seu, ut clarius ex neotericis dicamus, absumptio sulphureo cor tantum febris ætati, non tantum feror & putredo excitat, verum etiam sal coagulandi virtutem exercuit: hæc de causa sanguis reliquas sine fibris lychnum vite alere non potuit, quod cum sal omnis ad cor conflueret, quo reliquæ partes destituta hujusmodi ferorem conciperunt & exhalarent: Pulmonum lobi utriusque lateri affixi non per fibras, sed per gluten, intus purulenti exsiccique eandem pleuropneumoniæ confirmant, & ex eadem deliria seu paraphrenin, convulsionem & suffocationem: Hoc modo ipsi casum ex nostræ Medicinæ fundamentis exponimus & subscribimus. *Ioh. Christ. Waltheri, M. D. Martinus Bogdanus D. Med.*

§. 7. Anno 1587. quidam ex casu ab alto septima die interit: Casus autem hic erat, cecidit è trabe, & corporis partes insensibiles reddit, sine dolore tamen, sensu solo abolito, & felis abdominis musculis ad motum diaphragmatis mobilibus, unde de sextidua recrementorum & urinae retentione conquerebatur, sed absque dolore ullo: Ego clysteres fortiores injeci curavi, sine fructu, iisdem ob retentricem & expultricem emortuam, statim reiectis seu potius resistentibus: Syringa & cerco explorata vesica, urinam non continebat, æger ipse catheterem immissum non sentiebat, molestiam tantum circa renes in lumbis peticiens.

Sexto post obitum cadavere, hepar ejusque rota regio quasi inundata reperta est, quemadmodum & ventriculus: Renes muco repleti & adeo obstructi ut nihil potuerit præterlabi: vesica tota exsiccata quasi, una cum ureteribus, Lien autem tumido, & ventriculo cordis utroque tenui, sanguine distento, unde proculdubio suffocatus interierat: Respiratio viventi magna erat & crebra, sudore gelido semper mædebat corpus. *Ioh. Valerius Rummelshaus Obs. xij.*

**S**olis abdominis musculis ad motum diaphragmatis mobilibus] Omnes enim tam oblique ascendentes quam descendentes & transversales dicti, exceptis solis pyramidalibus, ad costas pertingunt: unde gravissima læsio colligitur, si ad illarum tantum septique motum, non propriis viribus moveantur, quibus utique & perficiendis validissimas fibras & aposturotes exaroquin accipere.

*Secundata* Elegans satie observatio *Riverij* de *se-*  
no urinario ab obstractione emulgentium & renum  
vicio restagnante, v.l. praesertim curato, cent. 1. obs.

i. quae hic quoque admittituri poterat, imprimis  
quod à casu orta. *Valschius.*

§. 9. Ictus fuit scipione in regione Lienis, Juvenis 14. annorum, qui postredie obiit licet  
fuit nullum inspiceteretur vulnus: quo etiam caruit Textor à simili ictu Oudekerck occisus.  
Vidimus in utroque cadavere Lienem ut mollem, sic in gibba parte; in qua tamen ictum  
exceperat, illisum, ut in cava contra evidenter fissum: vel potius ampla rima tantum di-  
laceratum, ut in illa facile duos occultasset digitos: mirum erat quod rimas egerit & non  
potius cesserit ictui molle & pendulum viscus, sed quid non lederet penetrans baculi vis &c.  
*Tulpus lib. 2. Obs. 19.*

**E**xinde patet quam verum sit illud tralaticium  
Curtioribus Lienem excindi posse, quod à pla-  
nitis traditum *Plinio* lib. 11. c. 37. *Georgio Bertino* lib.  
8. Med. cap. 1. *Robb. Fins.* qui canis lienem à petro  
Chirurgo superstiti adhuc cane exemplum fuisse  
tradit: *Leonardi Fioravanti*, qui Nob. feminam  
spleneticam lethali ter decumbentem liene extracto  
convalescere ait: *Franc. Rosseto* qui 4. de partu  
c. 5. totum lienem à Chirurgo quoque exem-  
tum fuisse refert: Imo quibusdam defuisse observa-  
tum, testibus *Aristotele*, *Sebenkio* de *Otelio*, *Holle-*  
*rio*, *Laurentio*: *Zacutus* abesse, vel eximi posse ad-  
mittere videtur. Non hoc mirum, si, videri de-  
bet, quum Lien sit per accidens necessarius, sicuti  
terrima tam alvi tum vesicae: At hanc Lienis ex-  
cisionem omnino impossibilem judicamus, cum ar-  
teria splenica, & rami venae portae splenem ingre-  
dientes, exsecto splene nullo modo consolidari, &

homo ab interitu praesentissimo liberari queat.  
Non inficias quidem imas in quibusdam Lienem de-  
fuisse, non secus ac interdum alia viscera, errore na-  
turae, sed defectum tamen resarciens: consequen-  
tiam tamen negamus, quod quia quidam sine Liene  
vivere potuerunt, ideo omnes eo carete queant, Vi-  
vant pecudes Cretenses sine liene, quod scolopen-  
dio vescantur, ut tradit *Vitruvius* l. 1. c. 4. nemo ta-  
men exinde evincere quod is omnibus vita superstiti  
eximi queat: Auctoritates allatas in dubium vocant,  
& jure quidam *Vesalini*, *Conringius*, *Higheornus* & alii  
Caelius Aurelianus l. 3. c. 4. Quidam etiam, dicit, de-  
cidendum vel auferendum Lienem ordinare ausi  
sunt, quod quidem voce dictum, non autem officio  
completum accepimus: Hinc *Knobdloctius* instit.  
Anatomic. dispnt. 7. Lienem ob praecipuam cum  
praecipuis partibus connexionem excindi posse ne-  
gat.

§. 9. Quidam ictus in hypochondrii dexteri lateris infima sede, post extinctus est: Intestina  
in lacere ictu maculosa erant: Diaphragma ibi idem lividum: Mesenterij vasa circa originem  
penitus cruenta & velut confusa. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolori.*

§. 10. Renum mirandam formam *Leonardus Voldius*, Noribergensis Medicus, repetit in  
cadavere Andreæ Helren; qui anno 1602. 17. Octobr. anno ætatis xvi. mortuus est, postquam  
ex ictu in ventrem supra pubem accepto, diuturno morbo laborasset, & post mortem apertus  
poris copia circa utrumque inguen tanta reperta, ut mensuras duas Noribergenses æquaret.  
*Cassparus Barbinus in Theatro Anatom.*

§. 11. Quod nonnulli de extirpatione Lienis nugantur, non tam rationibus quam risu refu-  
tari debet, quandoquidem membrum est venis arteriisque plenissimum & ad extirpandum  
periculosissimum: sic vidimus aliquem de repente extinctum, cujus Lien ictu baculi sauciatus  
fuerat. *Nic. Fontanus Epitom. Vesalii pag. 22.*

## \* ADDITAMENTA.

### OBSERVATIO I.

*Vulnus Pectoris lethale, ob cordis lationem, illeso Pericardio.*

**D**ominus A. Streuil, &c. ab accepta in pectore glande plumbea, è sclopeto manuatio cui  
tres immisae erant; emissa interit tribus aut quatuor horis à vulnere, et si globulus citra  
pericardium substitisset; cui ne minimam solutionem continui intulit; prout observatum à  
Dom. Boirello, cadaver dissecant; Nec tamen ipsi obscura fuit tam subitæ mortis causa, a-  
perto enim pericardio, hoc comperit cruore omnino infarctum, effuso è vulnere inscripto parti  
inferiori ventriculi dexteri cordis. *D. Boirellus Zodiac. med. Gall. anno 9. pag. 156.*

### OBSERVATIO II.

*Tibia leve vulnus lethale ob sequutam hemorrhagiam nullis medicamentis cohibitam  
hinc cordis consumptionem.*

**P**Roma conda Nobilis cujusdam multis retro annis in sinistra tibia fonticulum, non arte  
sed natura factum, perpetuo madore scatentem gestabat: anno 1669. à prædicto Nobilita-  
to altero die bipalio percussa nihil inde damni percepit, altero vero die ob inflatam ab eo alapa  
excanduit, & sic in fervore abiens inter abeundum arcæ allisit, & recensitum locum affectum  
*Boneti Anatom. Tom. III.*



faciavit, ex quo sanguinis tanta effluxit copia, ut medicamentis sanguinem sistentibus destituta, elapsis paucis horis vitam cum morte commutaret: Postero die corpus terræ fuit traditum.

Elapsis à die sepulture integris septem septimanis, iussu Serenissimi Electoris Saxonie (ut in causam mortis melius inquiri posset) tempore messis sepulta effodiebatur; nullam autem à læsione externa manifestam causam per bipalium aut alapam inflictam factam invenire valui: Quare ad interiora perlustranda ventrem inferiorem ad apertum, & deprehendi hepar *magnum & adhuc incorruptum*, bovis quatuor annorum hepatis simillimum; Lienem venterium; Erat effusa bene carnosa, in vita vino dedita, unde effatum Bartholini Anat. lib. 1. cap. 14. verum offendi, majus esse hepar in frigidioris temperiei corporibus, & in timidis & gulosi &c. In aperto thorace occurrebat cor, non flaccidum, quod & multi autotes se vidisse adnotarunt, sed quoad ipsius substantiam plane consumptum, instar loculi vaeui & corrugati &c. *Melchior Tribe in miscell. curiosis anni 3. Observ. 65.*

**Hepar adhuc incorruptum &c.** ] Riolanus Anthropog. lib. 2. cap. 19. observasse se ait Jecur hominis elixatum ab anno, quod sub scamis ichole medicæ asservatum fuerat, nullo modo corruptum & rancidum, sed cum odorem servasse qui est in recentè elixato: Plinius lib. 11. cap. 7. Jecur,

ait in demortuis verustatis patiens, centum durare annos obfidionum exempla prodidere. Alias ex Hippocr. 1. de vet. Medic. hepar ob tenebrositatem & sanguinitatem absque doloribus esse non potest, suppuracionibus ac tuberculis obnoxium.

## OBSERVATIO III.

*Vulnus Pericardii, cum alio cordis vulnere unico ictu inflictum, quinto solum die lethale.*

**Ob. Biretus** Parisiensis annos xxiv. circiter natus impetum sustinuit septem sibi ignotorum, quibus generose obstitit, sed tandem gladio percussus, duobus transversis digitis infra mammam dextram, penetrante vulnere concidit.

Cadaver aperui jubente magistratu: at vero solidum judicium de vulnere natura latueris, Pectoris accuratum examen institui: Integumentis dissectis, remotoque sternio illico obviis factus est ictus introitus, inter tertiam & quartam verarum costarum, enumerationis initio ducto ab inferioribus, Progressum vero vulnere sequutus, notavi in margine, vel in extremo inferiori lobi anterioris Pulmonis, duo vulneta superficialia ab unico illo ictu inflicta, quo ulterius pergente læsum fuerat Pericardium, tandem immediate infra cordis auriculam dextram ventriculi subditi fundum attingisse gladii mucronem, ubi substitit: Admiratione vero dignum quod æger sub fine demum quintæ diei obierit: *M. Balle Chirurgus Int. Paris. in Zodiaco med. 6. Obs. x. Aprilis.*

**Admiratione dignum &c.** ] Verosimile est ditionis tempore Biretum ita percitum fuisse, eo præsertim momento quo ictus fuit, quapropter spiritus animales, (quorum Cor origo) sufficienti copia confluerint ad fibrarum omnium intumescitionem, ut ab his omnino occupatum fuerit solutionis spatium, ac proinde ideo impeditus sanguinis insignis effluxus, alias vulnere, intra paucas horas mortem oppetere non potuisset, quando quidem

peritum non fuit mediastinum, cum alter pulmonis lobis respiracioni sufficere possit, ad aliquod temporis spatium: Ac reverà conjecturam hanc confirmavit assertio Mag. à Billy, qui à se repertum ait grumum sanguinis concenteri vulnus cordis obturanti ac observatum sanguinem effusum solum pectoris cavitatem dextram occupasse, imo nec hanc omnino missæ oppletam. *Nic. de Bligny ibid. Junii Ob. serv. vi.*

## OBSERVATIO IV.

*Vulnus à globulo ex bombarda emisso, inflictum lethale, ob globum subsistentem circa medulla spinali exteriora, &c.*

**Vulgare militum dictum est, Projiciatur globus quocunque modo vulneris, locum certum invenit:** Verum hoc experti sumus in *Job. Cornelio Dünigerdamsen*, viro sano, annorum xxxvi. nauta, qui in prælio navali Anglico vulneratus erat globo ex bombarda explosio in latere sinistro ad duarum manuum distantiam à spina dorsi, ad marginem ossis ilium: ab accepto vulnere, referente chirurgo ordinatio qui navi præerat, & sanguinis multum deiecit per alvum, & stercoris per vulnus: Obvenit nobis vulneratus hic quarto ab accepto vulnere die. Varie eo tempore movebantur quæstiones, varie dabantur responsiones, inter omnes præcipue considerationis 1. Quæ causa exhiberi posset quod fœces alvine in hoc subiecto exitum suum, nanciscerentur per vulnus, neutiquam ad loca ea quæ sub peritonæo supra intestina dantur? 2. Annon in intestino colo duplex foramen in demortuo cadavere per anastomum invenirentur? 3. An globulus qui vulneraverat in corpore ægri adhuc inveniri posset, cum tamen symptomata nulla alia, quæ alienius momenti sese manifestarent? Ad quæstionem primam respondit *Job Meckren*, ejus responsio convenit autopsiæ

autopsia anatomica post mortem insinuat, observare enim licuit fœces ad exteriora intestinorum deferri non potuisse, ideo quod oblatret intestini coli arcta connexio cum latere sinistro beneficiis meloculis, sic ut nec ad inferiora, nec ad superiora excrementa deduci queant.

At longe alia occurrerunt omnibus iis qui dissectioni cadaveris interfuerunt quam exspectaverant, Peritonæo enim dissecto Omecum se obtulit integrum, coloris flavi, (corpus licet emaciatum) crassitie moderatæ; Intestina sana, Spina sive appendix ossium illi à globo in varias partes diffracta: Hisce sic observatis ratum fuit annotare viam quandam sub intestino colo procedentem, cultrum nostrum stylumve ad interstitium quod est inter vertebram lumborum tertiam & quartam deducentem: Hic circa medullæ spinæ exteriora globulus hærebat, cujus præsentia debebatur collectio ea purulente foetidissime materiæ, quæ ad quantitatem eam, quæ pinta vix contineri poterat in dextro latere circa musculum psoas fere consumptum derinebatur; In musculo hoc nervorum lumbalium vestigia quædam occurrebant, plerimi enim eorum puris vi etiam perierant: Musculus Psoas, sen lumborum flexor, si finister, parte inferiore bene habebat, arsepe: iore truncatus, forsan vi globuli. *Observatio Joh. van Horn, in Observ. Chirurg. Joh. Meckeren cap. xliij.*

Circa hæc quæsitum est. Qui fieri poterit, quod fractis dicto morbo, vertebriis, globuloque spinalem medullam premente convulsiones graviores haud accesserint; imo natibus insidere æger poterit sine ulla molestia corpus varie agitantij consumptis fere musculis lumborum flexoribus, quomodo poterit æger pedes movere, extendere, flectere & quidem sine dolore aut stupore? iij. Quid causæ subesse possit quod de dolore dextri lateris, ubi pus collectum, cui etiam continuo incumbere nunquam conquiescit fuerit æger? Imo unde purulenta ea materia devenit cum globus non transierit vertebra, sed in iis detentus fuerit? iv. Qui æget graviter adeo fœciatus, non solum per xij. septimanas vivere poterit, sed & qua ratione intra septimanam octavam & nonam vires ejus insigniter adeo fuerint auctæ, ut omnibus sanantis reparationem certam brevemque promittere videretur, quam tamen subito superveniens animi effœtus, ex alteratione gravi, inhibuit, cui mori inexpectata adscribenda? *Joh. Meckeren.* Quibus quæsitis satisfacit *Joh. Van Horn, Ad 1.* Certe nervi lacerati convulsivæ instrumentum ablatum est. Dici possit globum ad integumentum medullæ spinæ hæsisse, ac convulsiones hæc causæ nequit esse, eo quod vestimentum hoc externum sensu haud gaudet acuto, naturam ligamentorum obtinens, vertebrarum connexioni in externis ac internis inserviens, imo usum nullum nervis adferat, nisi quod comiserit eos, utique dum pars carnositas intrent: Alia foret questio, Cur pressione spinæ medullæ, ab incumbente globo paralytici partium inferiorum sequantur non sit? At sciendum globum dictam spinalem medullam attingere non potuisse, tum quod inter medullam hanc, ejusque involucri membraneum notabilis distantia: tum quod velamen hoc multo crassius in vertebriis inferioribus quam superioribus, quo vertebrarum foramina, quæ in omnibus ejusdem amplitudinis sunt ubique replentur, Accedit quod Natura, quo periculum tale averteret, quantum possibile, forsan excrecentiam quandam callosam eo loco produxerit, quale quid notare licet observat. cent. 2. *Hildani.*

Onod addis: *Ægrotantem sepius natibus insedisse, corpusq; suum variis modis commovisse;* ex eo colligere licet, quod etiam delineatio mihi transmissa indicat, totum corpus vertebræ haud fuisse tractum, sed solum ejus partem sinistram, unde fulcimeorum tumficentia spinæ dorsæ. Imo in sedente homine pondus corporis vertebriis lumborum præcipue non incombit, nec etiam in trunci incurvatione, in tali cum corporis motu corpus totum insidit tuberculis duobus ossis ischij, ex parte etiam parti ossis sacri, vertebriæ

etiam lumborū non moventur sen flectuntur à musculo lumborum quadrato, sed in suo situ conservantur; vero truncus corporis totus anteriorum incurvatur per musculum abdominis rectum & obliquæ ascendentem, retrosum vero præcipue per sacrolumbum.

*Secunda questio est: Consumptis fere musculis lumborum flexoribus quomodo poterit æger per se suos flectere & extendere, & quidem sine dolore, aut stupore?* Ad hæc respondeo, cum non solum musculi finister à globo contusus, dextere à pure consumptus, sed etiam simul nervus iis concessus, facile etiam patet doloris causam simul esse sublatam.

Femoris extensio à musculis perficitur glutæis, qui non omnes, etiam in latere sinistro læsi fuerunt.

Ad contractionem & elevationem femoris musculo Psoas succurrit iliacus internus, qui insertionem suam cum precedente habet in trochantere minore; hic autem in uno latere nullo modo, in altero leviter admodum vulneratus. Adde, ex sententia *Cl. Plempej, quæ cap. 34. libelli de musculis habetur*, etiam Trociter m. musculum femoris elevationi inservire.

*Tertia questio est: Quid causæ subesse possit, quod de dolore dextri lateris, ubi pus collectum, cui etiam continuo incumbere nunquam conquiescit fuerit æger?* Ad hæc respondeo, haud adeo molestum ægrotanti fuisse decubitum in latere dextrum, quod finistram à globo fœcit vulneratam, hinc, quo à dolore effectus liber, dextrum se latas elegisse.

Quod quærit, *numquam hæsit materia purulenta, & unde devenit, cum globus non transierit vertebra, sed in iis detentus fuerit.* Nihil est. Nuoquid enim numerus sit ingens hic partium carnosarum, quæ contuse purulente materiæ materiam præbere possunt, sanguine cum scatent nutritio, qui in pus converti facile potest. Imo cui Chirurgorum Medicorumve ignotum est, ossa, quorum cortex exterior exelus, aut alio modo læsus, pus fatidum exhibere, quod si hæc ab aliis ossibus expēdemus, quidni à vertebriis lumborum, quæ fungosæ naturæ sunt, sanguineæque medulla scatent? Ad hujus materiæ illustrationem faciunt, quæ capite 28. libri tertij proponit *Magnus Tulpius.*

At mentionem facis quantitatis considerabilis materiæ fœcidæ, quæ etiam consumptioni musculi psoas dextri occasionem dedit, informarique desideras unde ea, & quid causæ subesse possit, quod nunquam de dolore prædicto conquiescit? Dico collectionem hanc non fuisse nisi materiæ ichorose, quæ sensim ex læso membro exstillavit, qualem ichorosum humorem sepius exstillare noemus, quæ articulus aliquis nervosus læsus, quæ de re singulari observatio

agitur Fabr. Hildanus, qui tamen insuper notificat humorem hunc acrem esse, ac propterea dolorem stuporemque articulis adferre, quorum nihil in nostro egrotante observatum. Hujus rei meo iudicio ratio alia dari nequit, quam quod consumptio musculi dexteri ab hoc Ichoroso liquore sensim fuerit producta, primo enim ex ejus afflatu maceratus hinc ob copiam & moram corruptus.

Ad quaestionem quartam, quae ultima, haud adeo facile est respondere. Verum equidem vulnerata haud fuisse partes, quarum vulnera absolute lethalia, quod enim colon intestinum in spectat, vulnera ejus saepius sine gravi incommodo ad longum tempus servantur, imo ob substantiae conditionem, crassum enim, carnosumque, non raro ex seipso curantur, quod constat exemplo à Nicolao Tulpio cap. 20. lib. 3. proposito.

At qua natura beneficium factum fuerit, & quomodo,

quod vixit agrotans intra septimanam nonam & decimam adeo increverint, ut perfectam curacionem Chirurgi praescriberet, miraculis, imo monstris annuerandum, quorum numerum Medicina, aequae ac Chirurgia quotidie exhibet.

Quamvis affectus inordinati, ira imprimis, quid in vulneratis, imo abscessu aliquo interno externove laborantibus, ulceratisve, valeant, experientia quotidiana satis declarat, sanguis etenim spiritusque vitales impetuosius juxta per arterias propulsi, adeoque effervescentes, non solum febres producunt, quarum vi nutritio partium imminuitur, viresque deficiunt, sed etiam in partes debiliores illidens, ut aqua in recenter extractas aggeres, referat jam consolidata, unde & labores Chirurgorum irri & spes omnis vana. Huc faciunt quae Hildanus habet Cent. I. obs. 17. 18.

Johannes Van Horne,

### OBSERVATIO X

*Vulnus lethale ob cordis substantiam lesam & sanguinis in diaphragma effusionem.*

§. I. **V**Idi dum apud Taurinos agerem, Nobilem quendam qui singulari certamine cum alio decertans, accepto sub sinistra mamma vulnere in cordis substantiam penetrante, vibratis in adversarium aliquot esse ictibus, ipsum fugitantem adducens passus est prosequutus, donec in terram mortuus caderet.

Dissecto cadavere vulnus compendi in cordis substantia amplitudine quae digitum capere posset: Ingenium praeterea sanguinis in diaphragma effusi copiam, Ambr. Paracelsi 1.9. c. 30.

**D**onec in terram mortuus caderet ] Cordis omnia vulnera absolute & necessario lethalia, inquit Hollerius Seboliis ad aphor. 186. idque vel repente vel non ita multo post: Reperente quidem si magna sunt & profunda, Non ita multo post si exigua: Lethalia vero sunt, non solum ob assiduum cordis motum sed & carnis durtiorem, sanguinis profluvium, spirituum subitam resolutionem, meatuum & ventriculorum à sanguinis collectione obstructionem, & necessario supervenientem inflammationem: Ete-

nim si ad ventrem cordis vulnus penetraverit: statim exhalat anima nimia sanguinis profusione necessario consequente, idque praecipue sapienti sinistro ventriculo, qui vitalem multoque puriorem sanguinem continet: Quod si ictus in corde consistit, nec ad ventriculos usque pervenerit, tum ad unum aut alterum diem superstes esse poterit, mox vero inflammatione suborta extinguitur.

§. 2. **Ambrosius Coenradi**, bajulus vir dissolutae vitae, ebrius, praemissa altercatione gravi, vulneratur à Nura quodam sub musculo pectorali sinistro, cum cartilaginum costarum quartae & quintae dissectione vulnere in Thoracis cavitatem penetrante: Die sequenti, qui octavo Novemb. anni 1654 jussu Magistratus cum Abrah. Slutter Chirurgo, accessimus decumbentem, in quo pulsus notabamus tardum, debilem sudorem frigidum, difficillimam respirationem, Et in hoc desperato statu permansit ad diem hujus mensis 15. qui lethalis ipsi fuit.

Thorace post mortem aperto firmissime undique pleurae pulmonem, imprimis vero pericardio fibrillarum ligamentorumque ope connexum reperimus: Pericardio nulla cohaerebat aqua, aëta tamen ipsi cum corde, beneficio filamentorum latorum planorumque coherencia, sic ut à corde id separare difficillimum nobis: Soluta corde undique vulnus se exhibuit profunditatem digiti transversi, latitudinem pollicis habens, circa septum, ad mucronem: Job Meckeren Obs. Chir. 35.

**P**ermansit ad diem mensis xii. ] Ut causa, quod diutius aliis vulneratus hic in vivis fuerit, constare queat, operatio cordis legitime, consideranda, quae triplex Systole, Diastole & Perisystole seu quies: In Systole cordis mucro accedit ad basin, latere vero extenditur, causa expellente longitudinem in latitudinem mutante: Mucro autem liber, nulli corpori nexus: In Diastole latera flaccescunt, ventriculi ampliuntur: recipitur sanguis ex vasis venosis, utroque latere cor intrahitur. In Quiesce mucro recedit à basi: & in quibusdam basi à mucrone, hinc etiam partes internae externaeque ad costas accedunt. Systole perficitur

quoties auriculae cordis sanguine repletae cum sui constrictione in ventriculum cordis expulerunt. In diastole sanguinis peragitur receptio ex vena cava, & vena arteriosa: Operationibus hisce rite consideratis, facile nostro iudicio, cognoscere cum cordis & pericardii in vulnerato nostro aëta fuerit connexio, etiam Systolen atque diastolen rite perfici haud potuisse, unde spiritus & sanguis in hac officina diutius juxta haerere coacti, imo ne quidem per vulnus ejeti: Et hanc causam suspicamur cur diutius noster vixerit aliis similiter vulneratis. Idem.

## OBSERVATIO VI.

*Vulnus Pectoris lethale ob vasorum Pulmonum & cordis lisionem.*

**S**acrificulus quidam pagi in Normannia, vulneratus ab exploso sclopeto manuário, è quo semissi tres globuli minores, quorum duo *venam arteriosam & arteriam venosam* intra ipsam pulmonum substantiam dilaceraverant: tertius vero apicem cordis satis profundam & magnitudini suae respondentem continui solutionem induxerat: Nihilominus tamen ad septimam usque diem vita fuit producta, etiam si ipsa tertia die paracentesis thoracis fuerit instituta, *M. Caranissus Zodiaco. med. Gall. Annij anni ij Obs. 13.*

**A**picem cordis ] Id vulnus parti inflictum fuit quæ citam mortem inferre non valuit, cum vulnera apicis cordis ne quidem absolute sint lethalia, sicuti præstant exempla. *Idem.*

*Dilaceraverant &c.* Cuius ejusmodi dilacerationem notandum 1. cum vasa prædicta intra pulmones ipsos dilacerata tantum fuerint, truncos intactos fuisse non aures befurcationes. 2. Sclopetorum vulnera, cum semper eischaram inducant, simul cistissimum & securissimum hæmorrhagiæ remedium

afferte. *Idem.*

*Ad 7. usque diem, &c.* ] Ideo inferendum vitam ad hanc usque diem protrahi potuisse, quo tempore ut plurimum eischara exidere solent: ac prius effusio sanguinis insignis suffocationem inducere non potuit, quod materia, quæ instituendæ paracentesis causa fuit, verisimiliter tantum fuerit serosus humor è vasis lymphaticis egressus quo pectoris cavitas fere scateat. *Idem.*

## OBSERVATIO VII.

*Vulnus Pectoris lethale, etsi cavitatem non attingeret.*

**D**on, *Gervasius*, Chirurgus Satellitum Regiorum asserit sibi quendam cognitum fuisse qui percussus gladio intertertiam & quartam verarum costarum, numeri initio ducto ab inferioribus, vulnere capacitatem non attingente, ac proinde illæis partibus omnibus interioribus sitim tamen à latione aphonus factus, ac paulo post mortuus.

**E**re foret ad legitimam questionis decisionem notitiam habuisse & temperamenti & morum vulnerati, quæ in statu foret ante vulnus inflictum, affectuum & aggritudinem quibus obnoxius erat, ac præsertim num forte pectus antea male affectum esset, imo num post ictum conciderit fugiens aut retrocedens: Prædicta. um circumstantiarum cognitio confertet procul dubio causæ morbi subitanæ notitiæ, me iudice non adscribendæ vulnere à gladio factio, pro occasione tantum infortunij habendo, ac potius, imo verisimiliter, morui violento à timore inducto, quem consuevit esse repentinus fluxus sanguinis in cor, suffocatum à subitanea illa irapnooe & concentratone humorum, à quibus extinctus fuit calor natus illi principio infusus, ac tandem inducta syncopæ cardiaca plurimis simili in casu lethalis. Constat hominum alios alius timidiores, ac vim esse maximam conspectus gladii evaginati in animum timidum, ex periculi umbra, in vitæ discrimen venientem, certum quoque Naturæ maximam vim inferri si animi pathemata vehementissima

fuerint, cum sanguis & spiritus à corde in habitum irrumpent, aut vicissim. Quin & lætitiæ excessus quibuldam extialis fuit: Ex plurimis autem observationibus decemur violentos ejusmodi motus periculi plenos esse, nec minus verenda animi quam corporis vulnera: Inferit ergo gladii ictum pectore acceptum, capacitatem illius nequaquam attingentem; non fuisse causam obitus vulnerati, quandoquidem ibi loci non occurrebant venæ aut arteriæ, vel aliæ partes alicujus momenti, quæ mortem adeo subitam inferre valuerint: quotidie enim dictus in locis Empyematis causa apertio fit illius partis: Iosinus autem illorum numerus qui vel gladio, vel globalis è catapultis emissis icti fuere, vulnere corporis traocum penetrante, qui tamen omnimodam valetudinem adepti sunt: Quare, si beoe scotio, obitus solum causa fuit syncopæ cardiaca, cui vulnus & gladius aniam præbuerunt. Timor autem vera fuit causa. *D. Panthotus Zodiaco. med. Gall. annos ii. p. vi.*

## OBSERVATIO VIII.

*Vulnus lethale, ob cerebri substantiam lalam, globulo ad occipus usque propulso, cerebro autem ad minimam molem redactum.*

**A**N 10 1676. 3. Janu. *D. Billotius* primum remedium apparatus admovit filio Atomaropolæ Burdegalensis, cui nomen *Salame* annos sex nato, ob vulnus inflictum à sclopeto manuário, inter duos sinus, ac rejecta omnino medullosa cerebri substantia, ad occiput subsistit: artamen puer vulnere ad 18. usque diem supervixit, integris omnino rationis munis non secus ac si illæius fuisset, eadem hilaritate gaudens qua per integram valetudinem, etsi quoties inaus vulnere curandi gratia admoveveretur, portio ipsius cerebri substantiæ, ad nucis myristicæ magnitudinem erumperet; Incerim aliquot ante obitum horis læthargus obrepfit, mentis compo etiam quodammodo permaneret, ad interrogata quævis respondens.

Capite post mortem aperto, ecce rem admiratione dignam cerebri substantiæ portio vix exiguum ovum male æquans superstes reperta est.

Ex prædicta observatione liquet cerebrum non tantie esse momenti ac hactenus credidum est, unde etiam inferre licet Animam, quæ sensus principium est, in parte solidiori, minusque ejusmodi alterationibus obnoxia &c. sedem habere. *D. Billotius in Zodiaco med. Gall. p. 181.*

## OBSERVATIO IX.

*Vulnus oculi repente lethale, ob processum falciformem lésam & ventricululum tertium.*

**R**usticus 55. circiter ætatis agens annum à quodam qui ipsi obvius fiebat ut cederet sollicitatus, ipse ob oneris ponderosioris gravitatem non potens, modis omnibus & precibus se excusans, denegat, alter laceffitus & ira commotus icutica rustici scapulas imperiose ferit, qua fracta partem baculi quam in manu adhuc tenebat, satis acuminatam in faciem vi forti protudit, Rusticus ex verberibus nihil mali metuens currum ligno, quod venale advehere volebat, onustum passu lento sequitur, pene per miliaris quadranctem, cum in forum nobis dictam lignarium appulisset, derepente exanimis corruit.

Delata res ad iudicium nostrum, quod ut in tam repentina mortis causam ex officio inquirerem jubet, adsum, & extremam faciem examino, invenio extremitatem baculi acuminatam in canthum oculi dextri maiorem intrusam fuisse: exile exterius apparebat, & vix notari dignum vulnus: explorabatur stylo num profunde in cerebrum desineret, sed cognosci id ob vulneris exilitatem & angustiam non poterat: aperiebatur itaque cranium, meninges cum cerebro primo inuiri bene se habere conspiciebantur, cum autem in parte antica cerebrum tolleretur, circa radicem naris processus falciformis in extremitate lésus conspiciebatur, vulnus aurem ad tertium usque cerebri ventricululum intraverat in quo grumi sanguinis satis copiosi apparebant, Exhaustis ita spiribus non potuit non mors subsequi: mirum autem quod pedes currum sublevari potuerit, & non statim à lésione animam exalarit. *Iohannes Schmidius in miscell. cum anni 1677. observ. 83.*

## OBSERVATIO X.

*Vulnus Frontis lethale ob utramque diploen effractam.*

**P**uella biennis, filia Dom. I. Petri Galinei Gemmanij Genevensis manu getens typum quò formatur globuli plumbei prona cecidit, altero ramo fronti imæ, supra supercilium sinistram impaeto manente: Advocatus Chirurgus extrahere adlaborat, sed tenetur ferrum, quia in extremo hamatum erat, quare magna concussione adhibita & ad læta agitatione educendum ab illo fuit; nihilominus nullum sinistram symptoma accidit præter fluxionem in oculum subditum: At undecimo die circa merinoctium advocatus sui ob convulsiones quæ supervenerunt, vulnus, quod vix aciculam admittebat, nullum amplius pus emittebat, quare credidi subditam membranam à cohibito vellitari sicque spasmus excitatum fuisse. Author sui urferrum curis divideretur quo vitium ussi si quod subesset, se proderet, Abnuunt parentes, imò ne iniectiones per siphonem admittunt, urgere remedia nolui, quia oculus subditus depressus erat & demersus: Decima quarta die à vulnere inflicta puella interiit; Cadaverum visitator iuratus stylum profunde immisit atque ossa subdita undique vacillare animadvertit, id quod proculdubio à vehementi in extrahendo ferro concussione accidit quod satis fuisse tenacalis incisorij abrumpere, remque naturæ committere: Casus contigit designare Februario anni 1682.

## OBSERVATIO XI.

*Cultro in latus immisso inter secundam & tertiam costam, diaphragma illesum permansit: unde colligitur Empyematicos ibi secandos aut urendos esse.*

**H**ippocr. lib. de internis aff. & postquam morbum (Hydrops pectoris) recensuit, inquit *Costam tertiam ab ultima usque ad os secato; deinde cum cerebra cava ultra perforata, & ibi perforata fuerit, aqua parum emittito &c.* Tertiam igitur costam Hippocr. secare jubet à nothis computando, Sed an tertiam versus quartam, vel potius versus secundam Ipi dubium quandoque traxi, quia Hippocr. ipse jubet puncturam, vel sectionem faciendam quam proxime ad septum, modo tamen caveamus ne ipsum lædamus: ut certior tandem de hac re fierem quum Ferrariæ frater A. Vesalij, anatomici insignis coram me corpus humanum dissecaret, atrepto cultro rem experiri volens, in latere sinistro, intra 2. & 3. costam puncturam feci, ac cultro ipso intramisso nihil noxij ex eo septum transversum trahere posseprehendi: Nascitur autem septum transversum prope primam costam mendozam, & ita ab intersticio 2. & 3. costæ distat, ut probe & securissime sectio inibi fieri possit Eo tamen hucusque Medicorum mania pervenit, ut non intra 2. & 3. secant, sed potius inter 4. & 5. aut si Dissplicet, intra 5. & 6. non sine tamen ægrotantium iactura, quem pus quod veluti in sacco continetur, facillime extrahere non poterant, nisi erubus elevatis & prono capite, unde multa sequi necesse est: Quum igitur hæc ita esse novimus, ac mulierem Nob. empyematam

laborantem haberemus à pure in media thoracis & pulmonis regione contento, pro hujus salute in consorcio doctorum hominum, consultum fuit ut inter 3 & 4. costam sectio fieret à qua malier bene habuit & sanitati fuit restituta. *Amatus Lusitanus cent. 1. curat. 61.*

## OBSERVATIO XII.

*Vulnus Thoracis lethale ob costæ lationem, Tabem & Empyema accersentem.*

**V**ulneratus quidam in Thorace, vulnere autem exterius bene habente febresumma & angustissimo spiritu est, ut spiritum attrahens vel ipsas claviculas sursum trahat: Jam xxv. dies agitur cum vulnus in dorsum ad quatuordecimam costam accepit cultro deorsum infixo, & exterius costas fere duas præterlapso, ut cutem inferius altero fere foramine affecerit, seu muctone exiens, non tamen penitus aperuit, nisi qua parte ingressus est; interna enim pars ab artifice aperta est, quo melius vulnus expurgaretur: Ab ipsa vulneratione cepit paulatim per angustius spirare, & secundum dorsum magis ac magis dolere, nunc vel usque ad hypochondria dolor ita pertingit, ut ardiagentem tantum nullomodo patiatur & moveri vix ferat. Tussis sequuta est, nunquam humida, nisi postremis diebus, post eclegmaticis exhibitionem, angustia vero spiritus tanta est ut vix animam trahere dicat, & exiguum omnino spiritum se posse accipere affirmer, is altero die corpi in lateris affectum decumbere posse, & in nullam aliam partem posse, sique erat inde spuens in dies magis sed pituitosa, ad extremos autem vitæ dies duos etiam purulenta.

Dissecto eo inventa est costa læsa, cum pure & aqua multa in thorace, quæ solet ad inflammationes thoracis confluere, ut in plerisque cadaveribus pleuriticorum & peripneumonico- rum vidi. *Christoph. Guarinonius consult. 140.*

**Q**uæritur est à Medico Num vulnus intra pleuram penetravit, & vel interim abscessus conglutinus causam præbeat, vel ab eo intra thoracem sanguine resiliente ibi factus sit quædam repletio marasiz, quæ putrefacta horum symptomatum in causa fuerit: Doctor primus non penetrasse vulnus contendebat, quia nec sputa cruenta, nec spiritus visus è vulnere erumpere, ac exterius secundum externam costarum faciem ductum est, totiusque difficultatis spiritus causam ad destillationem referebat, cui ipse obnoxius esset & plurimam occasionem præstisset. Alter Doctor contendebat non esse destillationem, quia febris nimia erat, nimisque spiritus angustia, jam repente facta destillatione minime idonea tam cito putrescere, minus tanta est sub tenuissimo victu præscripto & vini abstinencia, imo causam manifestam à vulnere esse, quod penetravit, & sanguine thoracem repletis, etiam indicia spiritus erumpentis per se non dederit: Nam magnum esse vulnus, ac cultrum potuisse non penitus ingressum hoc fecisse, qui non solum punctum, sed casum etiam illud agere potuerit, neque impediri hoc iudicium, quod spiritus non exierit per vulnus, quia alias sæpe hoc evenit, recurrente nimirum cute, mutato corporis gestu & internum vulnus contingente: *Mibi* vero videtur Destillationem non esse satis probatam, tunc ex febre tum ex tam celeriter facta spiritus angustia, pulsus crebritate & spurorum paucitate: Non esse etiam humorem ex vulnere in cavum thoracis prolapsum febrius vehementia primum indicat, quæ si à putredine ejus humoris proficeretur, & maxima esset, & malum odorem proferret, quoniam in aliis quidem empyematis febres magnas vidimus, sed jam fædo odore erant ut accedere ad cubiculum non pateremur, ita quæ si exigua putredo est, unde tanta febris. incerta est: Si magna, cur odorem sibi familiarè non effert? Præterea nunquam durum pulsus, aut sensum empyema facit, nec dolores parit, minus eos quæ ad partes vicinas pertineant, ut hypochondria, quomodo enim libera materia intra thoracem, loco sibi amplo versans dolorem partibus vicinis faciat? quomodo urgeat adeo & tendat ut attingi non possint hypochondria, immo quod si cunctatione humoris non percipi cum convertitur, immo quod in utrumq. latus cu-

bet æque premitur, humor vero à vulnere in altero tantum latere abundaret, & cubanti in oppositum molestior esset, propterea ego ex febris vehementia, & dolore in omnes thoracis partes pertinente, & multis aliis notis, non possum non persuaderi Tumorem ingens in thorace, & illius quidem parte maxime membranæ subesse, qui ad tantam magnitudinem pervenerit, ut per corpora membranarum ad longiores partes etiam suam molestiam & tensionem valeat proferre, & cordi plurimam vaporum copiam ad vehementem febrem faciendam, & arteriis tensionem, & membranarum communionem præbere. At cur ea parte qua morbus est, dolorem præcipuum non facit? quoniam jam gangrenosa est, laxiorque & corruptior pars facta, & integræ magis contentæ dolorem majorem sentiant, quæ sapissime causa est cur in cerebri apostematibus homines eadem parte debilitentur & resolvantur, opposita autem convelli consueverint, ea convulsione naturam valentem requirente, quanquam etiam sæpe opposita inflammetur, ut vidi in vulnere colli, sub quo opposita pars intumuit, unde is neque in oppositam, heque in eandem partem cubatum profert, quoniam omnes membranæ consensu eodem dolent: Pulsus quoque ejusdem lateris melior est, quoniam mala putredo suis recrementis partes illas humidiores reddit, & ita major etiam videtur & oppositæ partis minor & durior, ob duritiem namque & tensionem minor esse cogitur, durior vero ob membranarum tensionem: Ubique illud animadverti quod Pulmonibus & arteriis repletis exiguo spiritui adjutus est & ideo crebrior respiratio, quæ etiam brevis sit, cum dolor adest, sic minus magna facta, minus videtur etiam laboriosa esse: At cum vel tumebat thoracis partibus angustior cavitas est, & sine dolore est, vel cavitas repleta est, rumpit & arteriæ idoneæ ipsæ perse sunt pluri spiritui accipiendo, & ideo ad plures spiritum hauriendum thorax ad majorem amplitudinem majori opera tenditur, scilicet tum dolor nullus vel tacitus etiam subest, unde ad claviculas videmus illum quoque distendi, velut etiam in his quibus infirmior morendi vis facta est quare moribundis hoc idem fieri videmus.

At quæ causa tanni Apostematis fuit, præterea quod in materialibus dictis morbis non semper idoneæ, & partes evidentes causæ requiruntur, ut neque in putridis febribus eisdem morbos sequentibus hic satis causæ ab ipso vulnere fuisse credo, quoniam in vulneribus inflammationes solent oriri, & vicinas vulnere partes occupare; Et præterea in iis quæ non expurgatæ conglutinantur occidunturque, apostemata fere succedunt *Idem ibidem.*

*Invensa est colla lesa* Costæ læsionem occultam vulnere à sclopeto inflicti sanationem in diuturnum tempus protraxisse vidi ante triginta annos in Dom. Marco Antonio Lombardo Genevensis dum ficedulas venatur, & sepe obstantem superare in-

tendit, cæcæ pulve innixus ab occurrente spina ligula laxatur, ipsam excipiente thoracis latere dextræ. Quod proxime catapulta id congereret, vulnere circumscripto admodum parva fuit, tubo pene æqualis; minor tamen impetus quam ut interiora thoracis læderentur, quod paucissimas esset inditus pulvis pyrus, globuli vero plumbei, minimi, arenulis non majores, cinerei ideo dicti, & ob interpositas vestes: Vulnere curatio initio rite succedebat, et cicatrice, etiam trimestri exacto, non occubebatur; supergenita caro fungosa erat & multa hypercæcæ, unde costæ læsionis tandem suspicio; Reclusum ideo vulnus & vitium costæ, caries scilicet deprehensa, qua deleta curatio ad votum successit.

## OBSERVATIO XIII.

*Vulnus Epigastrii lethale, ob silicem parvum ex sclopeto emissum, vesicam subeuntem, absque ullis venerationis indicia.*

§. Puellâ quandam anno 1665. quodam die in agro versantem petulans quidam puer, qui scloperum secum ferebat, adortus, silicem parvum rotundum, forte in terra confectum, coram illa sclopeto injectit (hoc pulvere narrato instructum esse nil minus suspicans) ac jocando, saltem ad terrorem incutiendum, stricto eatulo sclopetum in ipsam intendit, eodem que momento præter voluntatem disposita bombarda, ejaculato, hujus ventris interiora petiit, lapillo.

Hujus corpus, morte mox altero die subsequente, 5. Maji. jussu magistratus, præsentibus Chirurgorum præfectis primariis, aperuimus; quod prope umbilicum paulo supra, una cum intestino jejuno, perterebratum fuit, ex cujus foramine lumbrici prodierunt, in superficie intestinorum tunc temporis repentes: Lapillus autem, quem asservo, vesicam ingressus ibidem reperiebatur, pertusionis vestigiis, nec in parte ejus membranosa, nec carnosa ne minime quidem conspicuis: Quod maxime mirabamur, quo ducto aut modo huc proprie perventus fuerit (cum nec per ureretur, atpote cui plus quadruplo majori omnis hac transitus præclusus fuerat, nec ulli dolores lancinantes nephritici prægressi fuerint hoc fieri poruerit) tam brevi temporis spatio, scrutinio licet accuratissimo haud assurgentes. *Mantissa Obser. plateri. p. 70.*

## OBSERVATIO XIV.

*Casus ab alto lethalis ob sanguinem in mesenterium effusum 1. In abdominis cavitate. 2.*

§. 1. Antonium quidam Mantuanus cognomento, de superiori loco lapsus mortuus est: Eo dissecto mesenterium dextra parte totum sanguine concreto contactum inventum, qui dolore alvi repente correptus est, ex quo subito sine pulsu, cum sudore frigido, cadaveroso colore, labio superiori tumente, spiritu angusto esset & vomeret mulam pituitam, & reddecim horis moreretur, qui si erigeretur ab adstantibus, se mori diceret.

§. 2. Eadem morte interit comes Antonius Turrianus, cum tertiana febre exquisita laborare cœpisset, ejus abdomen sanguine plenum inventum est *Christ. Guarinonius Consult. 193.*

Comes Lazilius jam fere xxiv. horæ sunt cum cecidit ex tabulato superiori, nec contusionis ullum vestigium est: Doler toto ventre, maxime sub præcordiis si prematur; pulsus privatus videtur, & totis artibus frigidus est: Tangas vel ipsum pectus, cordis pulsus non sentis, nisi attentissime ipsum observes, ita exiguus est: Si dextrum brachium apprehendas, vix venam pulsare summas quidem attentione adhibita percipis: Hæsterna die inflans decumbere præ dolore non poterat, nunc sine dolore id facit; Spiritus difficultas sed non multa, urina non procedit, meendi cupiditas nulla, quod certe ad renes spectare videtur: Arteriola hæc in brachijs, temporibus & thorace ipso, maximam cordis aut imbecillitatem aut refrigerationem significat, quæ usus pulsus tollitur. Respiratione superflua, non omnino subtili pectus non necessitas indicatur, in corde saltem, cui respiratio primum intervenire creditur, quæ in hysteriis vix aliqua esse solet. Tanta ergo

refrigeratio non est quæ usum pulsuum profus non egeat: Insimilitudinem contra primam statere non possum quoniam illa suspensus tantum digitis pulsus sentire permitteret, prementibus enim omnino cedit. Ergo pariter cum calore vires quoque sunt diminutæ, causa videnda ea, quæ aut in corde ipso est, aut ex alio viscere cor afficit: Viscera sub hypochondriis quidem affecta sunt, quia quassata, & spiritum destituta per quassationem, ut cerebro per collisionem capitis sæpe contingit, qui duobus, aut etiam tribus rotis diebus ex ista memoria privatur: Sed cor quoque pariter tanto casu quassatum in sua capsula fuisse, & illuc ichorum plurimum liquidorum & frigidiorum confluisse, quod spiritibus consumptis exhaustum sit, & sanguine repletum, refrigerentem quidem propter spirituum deficitum, vix innatis & inhaerentibus ipsam interea servantibus: Ea ergo cum decessione spirituum, cum confluxione sanguinis postea refriger-

ti, maximè si in capfulam extra venas forte sanguis elatus sit, correptuissè, & copia illa frigidi sanguinis occupatum fuisse, quæ tanquam frigidum venenum est, & toti arteriolo generi id malum necessario communicasse, unde non solum vitæ, sed alacritatis naturæ actiones soporæ sunt, & periculum sit

ne omnino virietur marcescereque cor, quod spiritus concoctionem moliri non possit dissolutione in:erea corporis à calore facta, facile etiam fiet ut sanguis alieno loco confidens putrescat febreque faciat &c. *Idem vide plura ibidem.*

## OBSERVATIO XV.

*Vulnus scincipitis, & frontis lethale ob fracturam lamina interna, hinc perforatam duram matrem.*

**A** Verbis litigantes quidam venerunt ad verbera, quibus Andreas Schreiber, jactu vellicti Aurice facto in capite ita læsus ut die 17. post ictum vivus esse desierit, In inspectione judiciali vulneris notata sunt sequentia à Chirurgis.

1. In sinistro scincipite contusio latitudinis dimidij digiti. 2. In fronte, versus dextrum oculum contusio latitudine dimidij digiti. 3. Sublato cranio, sub contusione erat in lamina interna fractum decussatum facta. 4. hinc tres testæ separatæ in calvaria reperiebantur. 5. Perforata mater dura testa quadam magna pondere trium granorum, quæ extracta ex meninge relictis quinque parvis fragmentis. 6. sub cranio & dura matre purulenta materia: Queritur an hæc læsiones sint lethales? *Paulus Ammannus in Medic. Criticæ.*

*Responsum Facultatis Medicæ Lipsiensis.*

Licet ab Hippocrate cerebri vulnera absolute & simpliciter lethalibus annumerentur, atamen ex contextu, & commentariis Galeni, tantummodo de profundis & magnis vulneribus hoc intelligendum esse liquet: Iam in hac relatione tantum adducitur læsio partium capitis extrinsecarum: In substantiam; ut & profunda cerebri non inquisiverunt Chirurghi nec funestorum symptomatum mentionem fecerunt proinde etiam pronuntiamus, *Quod rebus sic stantibus vulnus præsens pro simpliciter & absolute lethali non habendum sit.*

**I**n Fronte contuso) Cum indagaturus arteriarum per cerebrum distributionem aliquot horum capitula aperirem, animadverti ex percussione frontis, quæ bovis velut apoplectici concidunt, non solum superficialis cerebri partes, & ventriculos cruore infar-

ctos, sed & in basi omnia cruore suffusa fuisse, proculdubio, ob ætus vehementiam, filamentis arteriosis abrupis: quoniam etiam ob eandem causam os cuneiforme in basi fractum semel contplexi; id quod se vidisse ait Tulpus, *vide Observat.*

## OBSERVATIO XVI.

*Epigastrij, vulnus lethale ob læsum ventriculum.*

**N**Ovacula à Balneario aperto Defuncti cadavere decussatim i. intestina, ad quæ ictus sceloperi tendit, inspecta, ubi potissimum ventriculus in planitie à globulo perforatus, cibusque indigesti copia non exigua in abdominis cavitate reperta: Notandum tamen quod vulneratus per aliquod tempus in via publica, & frigore maximo sine deligatione relictus. *Ammannus medic. crit. casu 58.*

*Judicium Fac. Medicæ Lipsiensis*

Omnia præsupponendo dicimus collegialiter, quod in relatione Balnearioris desideremus perspicuitatem majorem, in quo latere, & per quam viam globulus ingressus non solum sed & egressus fuerit; An, & quæ viscera in transitu tetigerit, quam amplum ventriculi vulnus extiterit; & quæ sunt aliæ hujus commatis circumstantiæ ad nostrum decusum necessariæ: nihilominus quia hoc non factum, & solum vulneris ventriculo in planitie insit. Et in genere facta mentio, cū tamen non omnia ventriculi vulnera, sive punctum, sive à globulorum explosione insit, sunt ejusdem qualitaris, & illa tantum lethalia per se & ex sua natura quæ in orificijs ventriculi existunt, pro ut hoc rationibus fundatissimis à D. Sennerto & Suevo probatum, ut raceamus experientias, quibus hæc & aliæ ventriculi vulnera, summa tamen cautela & industria fuisse curata, testari possemus; ideo etiam rebus sic sese habentibus, & relatione imperfecta Balnearioris existente *Nec hoc vulnus pro lethali per se judicare valeamus. sed magis ex accidenti, quia frigori citra deligationem & exactum regimen patiens. commissus.*

**N**Ovacula) Cadavera inepte aperiantur novæ illa, præsertim ab his qui non sunt versati in sectionibus: ita etiam farcæ, loco elevatorij, vel hamulorum anatomicorum, male substituantur. *Ammannus.*

*Ventriculus in planitie] Vulnera ventriculi tam in sinistro quam dextro orificio lethalia sunt. Hippocr. enim aphor. 16. 6. restringendus ad ea orifica læsa, & ad profunda ventriculi vulnera: In lateribus system lethalia non esse probat cultrovorus Præfixus.*



## OBSERVATIO XVII.

*Vulnus Occipitis lethale ab erroribus variis ab agro commissis.*

**Q**uidam in symposio fauciatus in capite x. die post mortuus est: se post fauciationem statim quidem deligatus, sed 1. aliquem invasit ulturus contusiones acceptas, nisi a tertio interveniente fuisset retractus: 2. saltavit per aliquot horas, usque dum sanguis ex vulnere rursus profuisset, ita ut secunda deligatione opus haberet. 3. mane sequente in mastra circa curiam se portari curavit. 4. a meridie per quadrantem miliaris domum pedibus se contulit, 5. curatus a Balneatore, cui experientia & apparatus instrumentorum defuit.

In mortuo prehensum Vulnus occipitis sinistri, longitudine digiti ab aure sinistra versus dextram, eodem etiam spatio à prima vertebra distans; cranium erat magnitudine dimidij rhaleri depressam & incurvatum ab extremitate a seors, qua contusio hæc peracta, ita ut ab hac incurvatura vel depressione cranij, fragmenta aliquot per duram & piam matrem, profunditate dimidij digiti in substantiam cerebri penetraverint, circumferentia unius grossi: In medio vulneris cerebrum conspicebatur putridum, fetidum, calore flavum instar vitelli corrupti, profunditate unguis in digito, videbaturque hæc putredo totum occupare cerebrum; dura mater livida erat, & ab effuso cruore sugillata. *Paulus Ammannus med. crit. p. 197.*

*Responsum Facultatis Medica Lipsiensis.*

**S**icre desideratis utrum Titius in capite inter componendum fauciatus, inevitabiliter mori exinde debuerit? Hoc ut eo promptius expediremus accuratorem relationem speras, semus, dicimus tamen illa stante, Quod licet omnia cerebri vulnera tum ob partis nobilitatem, tum consensum nervorum, & consolidationis difficultatem admodum periculosa sint, præprimis illa quæ cum contusione sunt, minime tamen concludendum omnia vulnera cerebri, sed tantum illa quæ ventriculos ejusdem penetrant & quæ lethalia symptomata statim subsequuntur absolute & simpliciter lethalia sint; Experientia siquidem constat quod non solum ejusmodi vulnera, sed profundiora quoque, & cum deperditione substantiæ, à peritis Chirurgis, idoneis instrumentis, legitima observata dicta, & remedijs convenientibus adhibitis, fuerint cutata: Quoniam vero Titij vulnus 1. tantum unguis profunditate cerebrum penetravit. 2. nulla lethalia symptomata mox subsequuta. 3. nec ipse perito & instrumentis idoneis instructo chirurgus commissus, 4. neque dictam observavit, sed 5. post deligationem per aliquot horas saltavit. 6. aëri semet exposuit. 7. quadrantem miliaris eundo emensus, qua commotione sanguinis massa facile potuit inflamari. 8. 10. quoque die post vulnerationem demum mortuus, hinc ex adductis rationibus aliter concludere non possumus quam ita. *Quæ Titij quidem periculosa vulnera, non tamen per se lethalia fuerint, sed potuisse eundem Deo juvante, idoneis instrumentis ac medicamenti, feliciter curari: Itaque postea mortuum esse Titium ex malo dictæ regimine, & defectu periti Chirurgi quam vulneris lethaliitate absoluta.*

**D**e *pressionem cranij* Periculosum fuit ob fissuram interioris diploes, vel laminæ quæ pupugit duram & piam matrem, ob dolores itidem ingentes: hæc punctura. *Ammannus.*

*Decima die mortuus est* Per accidens factum est lethale vulnus 1. ob modum patientis dietam, dum

aëri externo se exposuit, cum tamen nihil gravius aëri externo, statim enim alteratur, quod Hippocr. in aphorismis vocabulo *περὶ ἀέρος* expressit: 2. ob defectum medicamentorum & periti Chirurgi, sic enim putredo & sphacelus cerebri necessario subsequetur, quod ex fœtore est colligere. *Idem.*

## OBSERVATIO XVIII.

*Vulnus Pectoris lethale ab utrumque cordis ventriculum perforatum.*

**C**olonellus quidam anno, 1653. Ratibonæ tam violentiæ quam itacundiæ æstro percutus, hospiti suo innocenti occurrenti, gladiumque stringens, ictu unico pectus illius transverberavit, ex quo in momento cecidit & mortuus est, cum per paucos sanguinis & vulnere profusione.

Vulnere stylo perrenato, atque cadavere aperto videbatur gladius intra costas (scutis lateris dextri sursum, sine pulmonum læsione, per ambo cordis ventriculos ac musculum transiisse, vel cucullarem in humero sinistro usque transiisse, nec in ambobus cordis ventriculis ullus sanguinis grumus, auc gutta inventa fuit. *Johannes Helwigius Observat. med. 63.*

## OBSERVATIO XIX.

*Capitis Vulnus leve, lethale tamen, in quo cerebrum sphacelatum & alia reperta.*

**V**ir 40. annorum capite leviter vulneratus, circa 35. morbi diem fere sanus erat, cum ex improvviso 36. morbi die rigore totius corporis maximo præhensus est, convulsionibus, & doloribus abdominis, concussionibus totius corporis: pallidus evasit, pulsus parvi & cæci sunt deliravit: Er inde emaciari incipiens 40. die mortuus.

Aperto eadavere cerebrum leniter sphacelatum invenimus in loco ubi fuit vulnus externum. Ex circa hepar ac mesenterium inflammationem ac purulentiam deprehendimus. Pluries observavi, quod elapsis aliquot diebus ab inflicto vulnere in capite, superveniant dolores ventris aut alicujus ex visceribus, donec crescente morbo superveniant rigores, febres, & demum abscessus in visceribus, tandem mors. *Ex communicatione Clariss. Georgii Baglivi Medici Pontificii, ac Anatomies Professoris.*

## OBSERVATIO XX.

*Arteria crurali lassa mors ad 14. dies dilata.*

**M**ALO fato ejusdem Illustris viri *Georgii Rosencrantzii* filius, *Ovvenus Rosencrantz*, ab alio Nob. in crure sinistro vulneratus supercrure, ingenti hæmorrhagia pene statim occupavit, nisi sedula Chirurgorum opera vulnus obligatum fuisset. Tanta tamen sanguinis copia ex vulnere profluxit, ut convulsionibus imminuentibus extrema videretur pati. Dilata verò mors fuit ad quartum decimum diem, quo superveniente febre, virium defectu & crebrioribus convulsionibus expiravit placidissime. Sectioni cruris à Chirurgo regio Philippo instituta, præsenes observavimus, vulnus etatis penetrasse musculum fascialem seu sartorium, ad arteriæ cruralis divaricationem primam, quam amplo foramine lacerat, inde ingens illa hæmorrhagia, sursumque ad regionem Perinei defuisse. Observata in vicinia musculorum triepitis & lividi cavitas ampla, ovi magnitudine, gangrænam minitans, sanguine purulento confersa. Ipsum vero hiatus atreticæ cruralis, quem in divaricatione gladius infelix effecerat, grumosis sanguis obturarat, quæ causa fuit, quod universi sanguinis effluxus inhibitus fuisset, ac, sicut plerumque fieri solet, mors repentina sequeretur. Magna dexteritate Chirurgorum profundas longissimas & stilos immittebantur cautum fuit, ne abrafo grumoso sanguine, exitus superstiti sanguini apertiretur. Occurrunt in praxi alia, quæ annotare singula non vacat. *D. Thoma Bartholini.*

## OBSERVATIO XXI.

*Apertio Vulnerati.*

**P**ER Iosum & jocum suriga fratris amantissimi *D. Erasmi Bartholini* & famulus peregrinus itridis gladiis in scenili coegredientes 9. Sept. 1673. tragicum exemplum præbuerunt. Ex improviso enim letus gladius sub dextra brachij ala immergitur corpori famuli inter costam secundam & tertiam, penetratoque pulmone dextro vasa cordis majora in basi cordis lacerat, & in sinistro demum pulmone se sistit. Dictum factum, sed sine dolore, conceidit famulus *Torchillus Petri*, annorum 18. nescius se vulneratum, antequam conspecto gladio cruento in lipothymiam incideret. Chirurgo statim advocato, quia ex vulnere altiori nihil sanguinis stillabat, vena in brachio dextro aperta nihil quoque cruoris profudit, sinistra parum; unde ad se rediens æger reum amicum absolvens, se dormire velle ait, & quamquam à somno retardaretur, tamen post paulo placide obdormivit, sine ulla doloris sensu & signo. In aperto per Chirurgos Urbis *Bojam* & *Aspachium* corpore defuncti, invenimus pulmonem dextrum costis adactum, totumque pulmonem quoque aridiorem ad phthisin vergentem, quæpe artem singulinam didicerat, & æger diu inde recesserat. Cavitationem thoracis grumosis sanguis copiose implebat, à quo, impeditis pulmonibus, cordeque liquore suo destituto, suffocatus. Sed cur sine doloris sensu insigni tam altum vulnus per tulit? Triumphat *Aristoteles* in cordis victoria. Nervis in basi cordis disseminatis, hisque dissectis ascribendum istud beneficium, qui ad sensum magis, quam motum in corde promovendum ab Anatomicis plerisque destinantur. Unde ad somnum propensio? Quia cessante sanguinis alio derivati ex corde influxu, cerebri ventriculi conciderunt.

Quamquam autem casu ludentium inter se amicum, sine ulla lædendi, nedum occidendi voluntate, homicidium hoc perpetratum sit, vulneratusque præsentibus testibus reum à crimine absoluerit, nec auctores ulli de facto conquesti fuerint, non mater inest, non sorores fratresque, nec Magistratus proinde Lege sicaria condemnaverit nocentem; exemplo tamen erit cunctis, cautius tractanda arma nuda. Seria secum trahunt. Nec rarè enim, etiam inter inermes, fata sunt negotium agunt. Vitanda igitur omnis occasio periculorum, ne lusum nobis in lusu fortuna faciat. *D. Thoma Bartholini.*

## OBSERVATIO XXII.

*Culter costa medium tran. fodiens, vulnere Lethali.*

**A**MICUS amicum ob verba jocosa, ipsis alias frequentissima, male intellecta tixis primò invadit, dein iræ furere percitus cultrum non acuminatum, sed rotundum, (quales *Boneti Anatom.* Tom. III.

Anglia præprimis transmittit) improvise arripit, eoque hypochondrium ejus sinistrum vulnerat. Succedunt statim hypothyriæ fortes, corpus frigide sudans, imminutio inò plenaria per 2. horas pulsus absentia, & alia morituris consueta. Post statim exhibitum cordiale & astringens cum Chirurgo accuratissime, cum decebat, inquirebam in vulnus, quod costæ sextæ Veræ medium tetigerat; Strylis cautissime inquirebamus, ubinam vulnus ad interiora penetraverit, sed nec minimum indicium reperire licebat; proinde cum singulis adstantibus eò magis stupefebamus causam symptomatum lesaliū, eamque licet inviti, obtundere cogebarum subitanæ spirituum dissipationi ac resolutioni à violenta incandescencia, ac dein terrore vulnerationem succedente in semibrio excitatæ? vulnus enim nec visu, nec instrumentis, inquirentibus cognoscibile & subtilissimum per osseam Costæ substantiam transisse, nemo unquam divinasset: transiitque hunc vulneris eò minus metuere poteramus, cùm rixarum socij facebantur, vulnerantem post triste facinus, fuga sibi consulturum, dictum cultrum vaginæ suæ intra- disse, ut ita summa dignum sit admiratione, possibilem fuisse cultri integri, nec fracti immissionem & emissionem, quod extra dubium ira, brevis ille furor, præstir. Post adhibita varia internò externa confortantia, vulneraria; &c. elapsis 8. horis quodammodo ad se redire videbatur, dictis symptomatibus remittentibus, nihilominus tamen paulo post succedebat denuò subitanea, eaque integra caloris innati suffocatio, ob sanguinem & spiritus cordi circulanti substractos. Abdomine aperto reperiebamus ejus cavitationem sanguine extravasato planè repletam. Causam tantæ hæmorrhagiæ inquirentibus apparebat dissecta diaphragmatis portio, non procul, ubi hoc cum costarum extremitatibus connectitur; conspiciebatur itidem defectus subjacens Lien usque ad mediam substantiam, unà cum contentis vasis parvo magnis, lésione duos digitos transversos lata; diffudit non minus omentum cum suis canalibus sanguineis, usque ad ventriculi fundum penetrando. Oculis itaque se offerebant dicto modo tot vulnera cuidam euitro secanti proportionata; Cum autem introitus singulos stupefcentes eludebat, invita minerva in huncce inquirentes tandem inveniebamus, cultrum transisse per medium costæ sextæ veræ lateris sinistri, binos digitos transversos vulnere à Cartilagine distante; de qua via nec per somnium cogitasset quidam. Apparet inde, quàm dubij ac inopinaticas sæpius artem nostram turbare soleant. *D. Gabriel Clanderus in Miscellan. Curiosis Dec. ij. Ann. 6.*

## OBSERVATIO XXIII.

*Vulnus Capitis cum fractura cranij & fungo.*

**N**obilissimi Domini Michaelis Rietmanni Mercatoris famigeratissimi Filius, die 18. Februarij 1683. in hanc lucem editus, animi & corporis supra ætatem vegetioris ingenij felicitas, habitus teneri & gracilis in sudores levi ex motu diu noctuque exolubilis, die 31. Julij 1690. Circa quintam vespertinam de equo ad velociorem cursum inëitatio in terram decidit, caput vel lapidi allisit, vel uti prius existimatum fuit, ab equi solea calcatus, vulnus prægrande in capitis dextro bregmate versus suturam sagittalem accepit. Puer utpote natura alacrior, sponte in pedes sese erexit, cùm verò copiosum sanguinis profluvium animadverteret, animo pederelictus, & ab æccurrente plebe ad chirurgum peritissimum Dominum Sebastianum Mullerum deductus, mox animum recollegit, & vel explorationem vel deligationem vulneris non nisi durioribus verbis tandem exceptus, concedere voluit. Capillis derasis, sanguinis fluxu cœcitate & vulnere debite deligato propinabatur à chirurgo potiuncula contrà casum ex decoctione specierum traumaticarum parata, quam pariens vomitu mox reddidit. Circa octavam ego vocatus, puerum à vomitu continuo delassatum & omnibus viribus fractum, qui levem corporis commotionem vel verbi prolationem iterato vomitu luebat, eum pulsu debili offendi: quietem summam imperavi & mixturam coehleatim exhibendam præscripsi ex stomachicis & Archæi ferrosiam compescientibus, aqu. sc. menrh. Flor. aurant. confect. de Hyacinth. Theriac. cælest. & syrupo anodyno. Tota nocte singula assumpta revomuit, mane stomacho applicatum emplastrum diachaleit cum Theriaca, olco n. m. & balsamo de peru. de mixtura stomachica non nisi terra pars cochlearis, & tantum quæque de iustulis vino acidularis subinde exhibitum cum præsentī levamine. Secundo die vulnus deligatum non fuit, ob metum hæmorrhagiæ. Stomachus sub vespem omnia minori dosi ingesta toleravit. Patiens nonnisi de frontis intenso dolore & Scotomia post quamvis capitis commotionem conquestus est. Tercio die remoris applicatis, vulnus figura sua ovali longitudinem sesquiuncie, unius latitudinem uncie habuit, & erantium medium pollicem depressum, apparuit. Dolor in fronte medio inter utramque oculi orbitam loco vehemens adfuit, vires deficiebant, somnus fuit inquietus & brevissimus, vomitus quandoque rediit. Cui eum subjacente panniculo carnoso ex contritione sphacelatis, suppuratione digestivis promota ablatis, cranium nudum visui se obtulit.

hians per ejus medium oblonga & stylo exacte perceptibili rima seu fissura conspicuum. Quarto die ex pertuso cranio fungus pullulavit digitum crassus, pollicem longus, pede graciliore suffusus; à medio vulneris prominens, ad latera facile mobilis, à cujus utraque parte ossibus cranij denudatis cum filamentis carptis pulveres ad ossa speciei, fungo verò impostum unguentum suppurativum, reliqua vulneris cavitas impleta filamentis siccis, obrecta singula emplastro de betonica cum stictico commixto, & caput cum vertice junctum ol. à floribus stotani, & lumbri corum, fronti quinetiam anodyna varia applicata fuerunt. Interea patiens plus nimium sensibilis, nentiquam necessariam vulneris explorationem tulit. Parentibus proposita fuit indaginis accuratioris & forsitan cranij depreffi elevationis necessitas ad id nonnunquam in privatis discursibus ab Excell. Archiatro nostro Domino Doct. Baumgartnero impulsu sollicitatum sæpius fuit, ut & ipse chirurgicarum *excelesis* peritissimas, vocaretur, horruit verò & contremuit patiens, si vel fortuita ejus mentio incederet: parentes, Filij Tenerrimo amore dignissimi, malis profundius affecti, violente quavis seponere, & mitissimam quæ quidem inveniri possit viam procedere iusserunt id constanter inculcantes. Filij vires acriori medendi generi sufferendo impares esse, & vel solo ex metu convulsionibus ac discrimine vitæ expostum iri; malle proin cum ab usu remediorum mitiorum succubuisse quam tantis tædijs, tantisque inferendis doloribus eventui incipiti exposuisse. Itaque cum nulla symptomatum deteriorum præsentia, omnem de schedijs & inæqualitate irritativa interioris cranij partis suspicionem excuteret, seposita ejusdem elevatione qua ceptum via per rectum ad trigessimam usque diem. Interea temporis cum ossa nigredine inficerentur, dolor in fronte & à parte vulneris postica ad usque auris basin intenderetur, fungus neminum decreveret; quin potius omnes vulneris oras expletet, solis exsiccantibus hunc tractare constituimus, ac proin pulverē Parzi ex partibus duabus sabinz & una ochræ confectum, mane & vesperti imposuimus: alteri ad ossa destinato euphorbium addidimus, ossiculum aliquod quod exterijs cranij tabulatum credidimus, magis magisque e profundo in dies elevatum tandem 13. Sept. & 45. vulneris die, à fungo ex officuli loco natali fuerefcente omniaque ejusdem vestigia obturante non sine dolore (frontis præcipue) extrusum fuit. Pulvis Parzi ad finem usque mensis sept. 14. sc. diebus usurpatus nihil effectui acutus proin alumine uto, notabilem quantitatem absorpsit, instar pellis quotidie separabilem. Symptomata dolorifica cum exinde increscerent, vomitus omnium assumentorum rediret, & æger ex defectu appetitus & somni, lenta febre extebersceret, acriora omnia, utpote communi chirurgorum peritissimorum suffragio damnata & infelicitis hujusmodi sobolis genuina genetrix nuncupata, exulare jussi. Compertissimum quamvis habuerimus ossiculum quod interea abscedebat, labia vulneris mordicando atque fricando, dolores egregie adauxisse. Iam verò vestigijs insistere Fabricij Hildani conclusum, qui genuinam fungotum curandi methodum Cent. Lob. 15. prolixius tradit, effectui datum non sine successu, dolor scilicet capitis ab eo tempore (præsertim postquam subsequente septim. die 6. Oct. aliud adhuc ossiculum priori modo, sine notabili alteratione prodijisset) cum omnibus symptomatibus mitescebat, & propemodum sublatum fuit, appetijt, comedit, somnum habuit, actiones omnes animales, vitales & naturales ritè obijt, corpore insigniter adauctus ex testimonio parentum tota sua vita habitior non fuit; vestibus ordinarijs indurus hinc inde obambulavit, cecinit, salijt, & pro more lætissimis ludis puerilibus tempus fallebat: mansit ita ad usque duodecimam septimanam, finem incitica octob., quo temporis spatio fungus faciem minime mutavit. Sub quarti verò mensis initium, cum puer tempestate pluviosa licentiosus è fenestra prospexisset, & horrore subitaneo cum subsequentijs ardoribus, dolore frontis &c. correptus esset, fungusque manifeste increvisset, me in seio pulvis euphorbij cum Alumine uto inpersus, & paucos intra dies penitus absumptus fuit. Ast verò alius intra 24. horas, ovi gallinacci magnitudine extra vulnus prominens suecrevit: Symptomata pristina invaluere, insuper accesserunt dolor in vertice exquisitus, anorexia, sudores, sitis, terrores, agrypnia. Superficie fungi absorbentibus detracta, pulsario ingens arteriarum in eo conspiciebatur, paulò durius instrumentis serreis tractatus, sanguinem copiosissime fudit. Retulit aliquando Chirurgus, stylum per medium fungi ad insignem longitudinem versus latus lævum intrudi posse, alium meatum rectè deorsum versus substantiam cerebri stylo patere; unde qui rarius tum temporis ægrum visitavi *tuoties* esse, & studiosius inquirere volebam, num intra vel extra cranij parietes, sinus hic lateat? insistita exploratione tam profunde penetrabat stylus sine ulla quidem resistantia & nullo patientis dolore, ut ipsissima cerebri substantia perforata mihi videretur, idcirco omnem impostum explorationem uti Temerariam ita in affectibus capitis periculi plenissimam serio prohibui: pus album & probe coctum nonnunquam ex dicto sinu profluxit, aliquando vero quod post principiam Novemb. contigit, aliquot diebus penitus obstructus, nil præter tenue serum emisit. Dolor exinde capitis & verticis immaniter increverunt, vomitus & cætera symptomata augebantur, quæstus idcirco meatus cujus ab aliquo tempore vestigia reliquimus denovo fuit, inventus etiam, & puri copiosissimo exitus paratus, ex quo in instanti, incantamēti

adipiscitar symptomata dicta evanuerunt. Tërata rursus à chirurgo fungi per absumptentia exstipatio, qua impetrata compressione prepedire novam propullulationem animus fuit: at symptomatum in dies incrementum vehementia, & æger magis magisque corpore viribusque deficiens, omnem operati successus spem præcisura videbantur. Decimo Novemb. die cū hæcenus omnis industriz fructus perditus & Penelopes tela roties retexta fuerit, corpori fungoso filum sericum duplicatum artius quotidie constringendum, injicere statutum, quod peractū tanto facilius visū, nobisque majores addidit stimulos quo basis reliqua corporis mole gracilior fuerat, at pulsatio arteriarum enormis concitata, qua integer fungus commoveri ac subsultare videbatur. peractum nihilominus quo ceptum pede erat, donec cum maximo & intolerabili serore maxima ejus pars putredine consumpta unā cum filo excidisset. Vultus ichorē ferotus copiosissime fudit, quo lincreamina quævis capiti imposita velut aquæ intincta madebant. Dolor frontis & occipitis permanebat convulsionū indicia adparebant: sudores colliquativi augebantur, & habitus corporis reliquus lenta continua febre sensim conficiebatur. die 17. dicti mensis eum Celeberr. & Excell. Dom. Doct. Brunneri, Fautoris mei Colendissimi in patrias oras reditus, (perstinae sanitatis felicissime restituto Seren. Principe Hassio Casselano) ex proprijs quibus me altero post sui adventum die dignatus est literis innotuerit, non desui quin statim assensu à parentibus de filii calamitate mestissimis impetraro, in responsorijs exposito obiret ægri statu roga-rem, ut quantocius liceret, Sangallum se conferre prudenti consilio suam nobis navare opem & auxilio succurrere laboranti haud respiceret. Interea fungus gangræna corruptus, nigricans, sordidissimus & velut à canibus dilaniatus horrendus, aspectui obveniens, Spir. vini Theriacalimyrrhato lavatus, unguento digestivo putredinem arcente munitus, & emplastro confueto coopertus fuit. Febris lenta quæ hæcenus æqualis diu noctuque aderat nunc sub vespere suas exacerbationes pati videbatur, ex pulsu fortiore capitis dolore adaucto, inquietudine &c. Symptomata autem cum fuerit ex capitis vulnere, à miasmate quodam purulento massam humorosam & spiritus inquinante, motumque sanguinis fermentativum ac varias, ferociori ejusdem in partes impulsu, membranarum irritationes producente, profectajuxta sedulam externorum mundificantium & partis corruptelam removementum applicationem absorbentia & alkali divitia febrifuga ex ocul. caner. pulv. conchar. diaph. jovial. quantum ab ægro etiam gratiora revomente impetrare licuit, exhibuimus. Die 18. cum patiens totam diem satis commode reterer, circa vespere in extremis perfrigit, soliti dolores redierunt, & tandem convulsionibus lateris dextri singulos artus cum capite, motu tremulo per integræ spatium horæ, integris sensibus concutientes successerunt, addita proin cæteris medicaminibus antispasmodica cianabarina, nucha & spina dorsi, inuncta fuerunt ol. floribus Slotan. Lumbric. & castorei. die 21. ea qua nudius tertius hora convulsionibus superius recensitis symptomatibus stipati redierunt, concusso violentius latere per medium horæ, hemiplegia illud resolutum & non tam evidens quàm antea factum, tandem frictionibus & lotionibus cum spiritibus restitutum fuit, sola debilitate & virium impotentia remanente. Febris abhinc Typum quotidianæ continuæ exacte observabat. Patiens rotam diem bene transegit, moderate comedit, non sinit, nec doluit ex capite, nō vomuit, Mulrò minus deliravit aut convulsus fuit: Vespere autē circa noctem perfrigit natus, iade dolor capitis initium sumit, & sensum usque ad duodecimam erevit; hinc caluit & sitiit æger, deliravit & subinde convulsus fuit, postea successive remisit & mane mitiora omnia fuerunt. Uti vero internus ægri status deteriora quævis minaturus, ita, extremis letiora omnia & felicia promisit. Corruptæ fungi partes sensim decedebant, & hujus loco caro quidē alia fungosa, at coloris instar substantiæ cerebri cineritij, emergebat; certo nobis indicio, gangrænā profundius nō serpsisse, nec meninges vel cerebrum ipsum corruptisse. Die 25. Nov. Celeb. & Exc. Dom. Doct. Brunnerus exoptatissimo suo adventu, utinā mensem maturioris nos beavit, atque præsentia per triduum exhilaravit, quæ deinceps acciderūt patienti, continuo præsens sedulo observavit, singula exacte consignavit, & remedia, quantum tulit ægri deplorata conditio amice nobiscum communicato consilio, applicuit. Cujus proin ipsissima verba apponam.

Circa sextam vespertinam vultus deligatus fuit: est in osse bregmatis dextri supra commissuram cum osse parietali versus suturā sagittalem tendens. 3 l. Longum 3 l. latū, versus os parietale caro firma est; versus partem superiorem orē vulnens carne luxuriante tument, ex medio vulnere fungus propullular nucis juglandis crassitie, multiplex instar cristæ galli, totum opplet vulnus, indolens est, pulsatione arteriarum commoveri, interdum mitius, interdum impensius, facile eveneratur; per medium fungum meatus ducit ad profundum cerebri, quod vix explorare ausus fui, dum chirurgus perhibuit nuper ad digiti longitudinem stylum sub cranio versus partem levam capitis admisisse, eum ramen sinus longitudinalis arctissime cranio cohærens, & corpus falciforme sub dura matre stylum impedire debuisset. Sero statuit potius quàm putres illud nuper ex profundo pulsu arteriarum falsisse copiose ajunt, die 26. noctem habuit inquietam, doluit ex capite, fronte, & occipite impense, vomuit abhinc cum insigni coaratu & deliravit: circa quintam matutinam melius habuit & obdormivit. Fungus manet idem: oras vulnris obregit chirurgus filamentis siccis, fungo ob purulentiam imponit Theriac. cum Camph. Spir.

vini aqu. lactuæ & solani, laudat effectum hujus. Imposui stomacho cataplasma ex mica panis,  
 fermento, pulv. Menthae, juniperi, nec moschat. & mastiche cum aceto cocta; toto die belle sese  
 habuit: comedit in prandio juseulum & de pulle panca, quod diu non contigit loco cenæ, hor-  
 deati cochlearia tria & pomi cocti non nihil: idem bene habuit, dormivit subinde, nullum do-  
 lorem capitis sensit: circa nonam nasus perfrigit, postea dolor capitis sensim in cepit & crevit:  
 bibit decoctum C. C. pulsus circa decimam in cretior fuit, non tamen caluit nisi naturaliter. Cir-  
 ca duodecimam sevit dolor in fronte & occipite; caluit & siquid sevit circa tertiam & ob-  
 dormivit; postea rer vomuit; nunquam deliravit nisi præcedentibus noctibus, nec vomitus tam  
 vehemens fuit, nec dolor tam diuturnus. D. 27. mane querulus fuit; doluit parum ex capite in  
 fronte; pulsus exaltior adhuc: urina crassa & tincta cum sedimento farinaceo: vulnus multum  
 seri limpidi fudit: fungus non crescit, potius decrevit & pulsatio leniori: imposuit chirurgus lin-  
 teamina sicca oris, & fungo mixturam ex camphora & Theriaca; obrexit emplastro angustio-  
 ri diapalmæ, abhinc emplastro alio de betonica, imposuit splenia calida, & obligavit fasciis  
 congrue. Post deligationem tussivit & vomuit mucosa, spumea; debilis abhinc & capite tremu-  
 lo, nec erecto esse potuit corpore; dedimus pulverem. 3. cc. phil. præpar. Antim. diaph. aa gr. v.  
 lapid. Lapid. Bezoar. or. gr. iij. cinnab. Antim. rectif. gr. ij. doluit ex capite; ex vulnere multum seri  
 effluxit: loco prandij sumsit bina cochlearia juris: conquestus est de dolore capitis in fronte  
 & occipite, caluit & scitit Sernin eopiose fluxit ex vulnere & linteam ina permauerunt inde ac  
 feruerunt. Vespere vulnus deligatum fuit, mirum visu. Subdidit vulnus & fungus: per ingens  
 chasma cerebri substantia profundius visa fuit; serum rutbidum regurgitavit ex profundo cere-  
 bri inter tussendum. Vulnus sicce deligavimus & emplastro obteximus: debilis fuit, caput tre-  
 mulum: constabat tamen mente & integris fuit sensibus, etiam cerebrum magnam partem desue-  
 rit. D. 28. usque ad medium noctis inquietus fuit, siquid, bibit decoctum. C. C. cum ocul. cancr. vo-  
 miturij; oculorum bulbi movebantur epileptice; conquestus est de pede sinistro; dolor capitis  
 non intensus fuit; D. 29. Vir excellentissimus à negotiorum practico cumulo avocatus, mo-  
 tas rupit & discessum à nobis paravit: absentiam vero tanto tulimus ægrius, quo propius vitæ fi-  
 nem instare ex subsecutorum symptomatum pessimorum eaterna subodorari facillime licuit:  
 primæ ejusdem diei deligationi adhuc interfuit. Vulnus quod hesternæ vespere monstroso ac  
 portentoso chasmate paruit, hodie veluti vestigia non habuit, upote germine novo fungoso  
 latus noctis pene oblitteratum. quadrihorio post Celeberr. Dom. Doct. Brunneri discessum, mi-  
 sellus sexta vespertina Tetano correptus omnia membra æqualiter extendebat. Successit Opi-  
 stotonos, quo caput versus dorsum reclinatum, pedes autem versus nates retracti ad usque se-  
 quentis 30. Nov. diei vespeream, nullam situs mutationem admiserunt, leviter enim vel his vel  
 aliis corporis partibus commotis, aut extensione tentatis, tota ægrius horrendis motibus con-  
 vulsivis concutiebatur, ita etiam ori ingesta, spasmus fibris gulæ pertinacius constrictis per œ-  
 sophagum neutiquam descenderunt, quin potius ad caput laryngis delitescens, irritationem,  
 tussim, vomendi conatum, tandemque convulsiones universales excitant. Sensus, mens & lo-  
 quela ad usque vitæ finem perstiterunt. D. 31. Vulnus ob debilitatem ægri ac tanta commotione  
 corporis excipientia incommoda, deligatum non fuit, sub vespere hordeati cochlearia tria  
 belle deglutij; caput tota die quasi dorso retro ligatum gessavit. Circa sextam perfrigerant  
 extrema, dolores consueti redierunt, frons diu noctuque in matris manu teneri ac foveri de-  
 buit, à quo sibi quidquam levaminis accedere putavit: mox convulsionibus singula membra tre-  
 muerunt, mox tetano extensa riguerunt; Tandem cum stercore & sonitu, inter respirandum  
 ingente, inter pias adstantium preces & stetus amarus, ex luctuosa hæc miseriarum valle erep-  
 tis, fato concessit. Celeb. Dom. Doct. Brunnerus egregium usum, qui ex Anatomie Cadaveris &  
 indagine loci affecti accuratior in Rempubliam medicam redundare posset ante discessum  
 serio inculcans, calear addidit hoc gratiæ & licentiæ à parentibus (alioquin ad hujusmodi ex-  
 ercitia satis difficilibus) expectandi: non fuit qui majoris & authoritatis & persuasionis vi hanc  
 apud familiam pelleret, aut qui nostras partes prudentius & felicius ageret, vel hoc officij  
 æquiore animo præstaret, ac frater genitum Excell. & Consult. Dom. Christoph. Hochreute-  
 nerus. V. I. D. Reip. nostræ Secretarius; nec spem fecellit eventus; desiderio satis fecit; assensum  
 obtinuit: & ipse Anatomæ spectatorem testemque se præbere dignatus est. Millè votis expe-  
 dita fuit peritissima ac dexterrima secandi manus Excell. nostri Dom. Doct. Brunneri, at quod  
 hæc vice impetratum non erat, nos pro viribus suscipere & exequi conati sumus. Vulnus externa  
 facie, deleta fungosi germinis pridie subnati obthuramento, in foveam ingentem collapsam,  
 ex qua substantia cerebri sordido scatens ex flavo viridescens puse conspicienda, apparuit:  
 characteres tamen & stigmata fungi non penitus extincta, sed circa cranij pertusi, locum ubi  
 ossicula abcesserant, ciculum formarunt, superius pennæ anserine, inferius digiti minoris cras-  
 sitie, quo cranij diffracti extremitates velut annulo & munimine circumcincta fuerunt. Cutis  
 decussatim dissecta & separata, à parte vulneris postica ad usque auris basin (quo loco ab ini-  
 tio adfectus vehemens dolor sentiebatur) duorum digitorum latitudine cum peticranio flave-

bar, cetera vero per totum Calvariz ambitum naturalis coloris conspiciebatur. integra omnia (excepto loco affecto) nullibi contusa, fracta vel fissa fuerunt. Cranium per orbem placido ser-  
 re ductu apertum, forti nexu cum meninge ubique cohaesit, & spualis validis resoluaturque at-  
 tolli debuit, nullibi autem validius concrevit quam circumcirca locum affectum. Ubi meningis  
 cum cranij diffracti orbe coalitus, nulla vi avellendus, cultro abscindi debuit, hoc insuper no-  
 taro dignissimum erat, fungosam extremitatibus cranij diffractis obductam substantiam, corpus  
 singulare non constituisse sed ipsissimæ meningis continuationem & vasorum ejusdem pro-  
 longationem fuisse, ex quo luce clarius patet, stylum sæpius vulnere sub calvaria intrusum, intra  
 meningis ambitum ipsam cerebri substantiam perreptasse, & proinde tales explorationes peri-  
 culo non vacasse. Abcissa à cranij pertusi extremitatibus coalescentia meningis subtumida, du-  
 ra mater, à parte sui inferiore ad usque cerebri basin sphacelata, ad latus vero anterius & supe-  
 riore sui parte qua *in partem inferiorem* investitur, nulla infecta comparuit. Cranij olla, dextra & examini  
 subjecta, seu fissuræ aut contra-fissuræ notas, de quibus nonnulli per morbi decursum somnia-  
 runt, non habuit in loco autem affecto egregie conspicuam introcessionem in orbem sublon-  
 garum efformatam nobis exhibuit; hacque omnem de calcatione ab equi solea factam suspi-  
 cionem delevit, quinimò lapidi acuminato allisum fuisse, figura depressionis ovalis clarissime  
 ostendit. Cranij lamina, tenuis admodum & circa locum affectum, ossiculis extrusis erassior vix  
 fuit. Ex parte vulneris superiore, quæ carne luxuriante tumuit & semper aliquid puris erusa-  
 vit, ossiculum nigricans à cranio penitus separatum, & extrusioni proximum intra triduum ab-  
 cessisset. Os laterale quod nova item & firma carne obduci videbatur, unciam longum, se-  
 munciam latum, profunde depressum, denticulata sui circumferentia fracturam evidenter de-  
 monstrante, tam fortiter cranio rursus accretum & connexum inhaerebat, ut elevari digitis  
 non sine vi potueris. Ossiculi primi separati interna superficies asperior fuit à puris acrimonia  
 ita corrosa. Schedia in vulneris gremio nulla sedulo explorantibus obvenit, licet major &  
 amplior pertusionis cavitas apparuerit, quam quæ ossiculis extrusis obregi potuisset. In vulne-  
 ris pervestigatione omnium lerna malorum statim se prodidit, dum pars meningis, cum infi-  
 gni de cerebri substantia quantitate, absumpta cerneretur, & meatus prægrandis tres digitos ad-  
 mittens, ab interna vulneris parte paulò supra basin cerebri incipiens, & pure scatens copioso  
 perejus hemisphærium in usque interiora patebat, ventriculi cum omnibus encephali internis  
 meatibus pure flavente & insigniter fetente inundati, pro capitis situ mutato, pus fluctuans  
 hinc inde modo in dextros, modo sinistros cerebri sinus effusum admitterent: quod ipsum  
 conjecturæ nostræ indubiam fidem fecit, cur se latus oppositum convulsionibus agitarum & re-  
 solutum fueris, quandoquidem patiens, continuo in latere sano decubitu, puris in eadem cere-  
 bri parte confluum, partium extensionem atque iritationem majorem causatus, necessario po-  
 jora ex vulneris opposito latere symptomata expertus est. Protuberantia omnes internæ sa-  
 niei medullæ in undis fluctuabant. Plexus chorioidæ binæ alæ super medullæ oblongatæ crura  
 cum Ventriculos exporrectæ, sub putridæ, nigricantes & corruptæ fuerunt. Superior & cortica-  
 lis cerebri substantia cum suis anfractibus & corpore calloso omni labe carebat. Anteriore ce-  
 rebri limbo elevato, & versus posteriora reclinato, juxta nervorum opticorum crura pus co-  
 piosum prorupit, ex quo manifestissime doloris à principio affectus ad ultimum usque vitæ ha-  
 litum perpeffi, causa patebat. Basis anterioris cerebri partis una cum binis mēbranis, nihil cor-  
 rupti monstravit, posterius autem meninges subputridas & lividas habuit. In vulneris loco, ubi  
 cerebri cortex ad usque basin absumpta fuit, & in penetralia cerebri sanies perrexit, nobilissi-  
 mum hoc viscosi puri copioso innatabat, & partium inferius (instituta methodo Varoliana ana-  
 tome) observandarum, glandulæ se. pituitaræ vasorum ex carotidibus &c. utpote pure exesa-  
 farum, vix vestigia habuit. Cerebelli superficies optimæ notæ, fundamentum vero, dextri præ-  
 fertim hemisphærij, magnam partem & multo profundius sinistro, purulentum ac sanie fetida  
 consumptum videbatur. Specus ossea seu cavitas vertebrarum, medullam spinalem excipiens,  
 pure copiosissimo exundabat. Hæc sunt quæ positi à parentibus exigui temporis cancelli la-  
 strare permiserunt, à cæterarum pectoris & abdominis partium perlustratione non tam tem-  
 pore, quam serio parentum interdicto exclusis. *D. Sylvesteris Samuelis Anhornij Miscellan. Cu-  
 rios. Dec. ij. Ann. ix.*

## OBSERVATIO XXIV.

*Capitis vulnus cum fractura & fissura lethale.*

**V**ulnera capitis quævis vel ipsa levia, vel talia ab initio apparentia non negligenda monuit  
 Paul. Zacchias, Fortunatus Fidelis, alij, & ultimum Excell. Johannes Bohn. de Renunc.  
 vuln. Sect. 2. c. 1. possum exemplum nuperrimum afferre primo inspectu leve visum, sed quod  
 eventus docuit gravissimum fuisse.

Præfectus siquidem vigiliam aliquis ebrius post lites leves circa quintam vespertinam 22.  
 Oct. 1691. gladij unico ictu ita vulneratus fuit in dextro capitis latere, ut statim prostratus &  
 cruentatus valde decubuerit per horas aliquot. In proximo dein pago deligatus obiter, alte-  
 ro

ro autem die accuratius à Chirurgo Sturgardiano postquam huc transportatus, nulla amplius sequente hæmorrhagia, sed observata illico hemiplexia seu motus impotentia, superstitè tamen sensu in brachio magis quàm in pede sinistro, ut & vomitu qui primo quoque die adfuit.

25. Vocatus ego unà cum Chirurgo jurato observavimus in dextro bregmate capitis supra autem vulnus in cute digitorum sex longum, in cranio ipso leve & sine fragmentis aliquot aut laceratione usque ad meningem quidem penetrans, sed rimula tam tenui hians, ut non potuerimus scrutari aut judicare an meninx sit perfecta. Cæterum non solum sinistri lateris impotentiam, sed & in superioris labij dextra parte aliqualem elevationem spasmodicam seu paralyticam, cum linguæ quadam & loquendi ineptitudinè seu imbecillitate. Nullum tamen dolorem nisi in vulnere ipsius angulo inferiore, & aliquantum versus tempus accusavit æger, lésionem autem in cerebro aut nervis à commotione aut latente fractura, aut contrasutura factam fuisse ex hemiplexia judicavimus. Ubi verò illud malum hæserit, conicere nequivimus, unde nec locus nec ratio fuit trepani applicandi: cum extravasari sanguinis indicia quoque nullibi apparerent; hinc impositis filis lineis discerptis, applicatis emplastris, & super imposito sacculo cephalico, propinato quoque pulvere cephalico quieti datus est vulneratus.

27. Cervicis sinistrum latus doluit; & ultimo mensis die torum caput.

2. Novembris taciturnus est, incipit delirare clausis oculis, quos vena manifesta brachij à meridie aperit, loquitur sine aberratione & sedet in sella extra lectum. Hinc melius habet, ita ut quinto qui decimus quintus vulnerationis dies fuit, sedens scripserit literas suæ uxori, adeoque nos nullius facile periculi metum habuerimus. Sed sexto præter opinionem Chirurgus invenit ipsum ita debilem, ut locus non fuerit deligandi vulnere: An ob victus errorem, cum lac acidum & coagulatum ipsi datum fuerit & forte etiam vinum, quod tamen constanter ipso ægrotus & adstantes negabant, accesserit ista imbecillitas, dubitatum fuit. Septimo circa novam invenio ipsum vulnus rubente & madido, stertentem & difficillime, sed cum ratione, quantum porui ex linguæ hæsitacione dijudicare, loquentem, eum pulsu debili, intermittente & inordinato: ideo prædixi mortem quæ circa undecimam secuta est, decimo septimo vulnerationis die.

Sequenti ergo die separata cute juxta vulnus cranij in bregmate dextro retro suturam coronalem, quæ cum aliis quasi oblitterata & firmiter coaluit, apparuit utrinque fractura, per ossicula Tabulæ superioris oblonga facillime separata, cum fragmento parvo circa angulum inferiorem vulnere statim eximi potuerunt, unde vulnus valde ampliatum fuit superius, sed rima tantum restitit inferius, quam initio in cranij cæsurâ & profunditate notavimus. Præterea ab utroque angulo vulnere fissura tenuis adfuit, nullibi autem vel sugillatio vel contusio aliqua.

Resecto dein cranio, ex quo inter refecandum plures guttæ sanguinis per poros solito majores & pervios exstillarunt, in interiori facie rima illa cæsum facta apparuit, unà cum fractura ad utrumque latus æqualiter distante & in acumen definente, quæ tanta vi à gladij ictu adaptata fuit, ut ossicula hæc in medio seu rima dicta depressiora essent versus cerebrum, sed ad latera usque ad fracturam parum declinarent, inventis quoque in utroque angulo aliquibus parvis festucis, & adhuc pericranio suo adhærentibus.

In denudati cerebri dextra parte non solum meninx utraque lacerata adspiciebatur, venæque valde tumidæ, imprimis versus frontem, sed & sanies purulenta effluebat, ipsumque cerebrum putridum, flaccidum & pallidioris coloris, quàm sinistrum latus, quod sanum adhuc, duriusculum, vividi & quasi lucidi coloris erat, nullo extravasato sanguine reperro, nisi parum circa falcis sinuum congressum supra cerebellum, qui inter occipitis refecctionem effluxit, an à lésione nova sinuum dictorum, an quia collectus ibi fuerit sanguis.

In reliquo corpore nihil quæsisimus, quia sufficientem mortis causam vidimus. Testiculum tamen utrumque invenimus & præsertim dextrum excoarctum, & lividum quasi gangrenosum; atque circa coccygis regionem à decubitu aliquam excoarctationem, cum tamen nunquam ibi se dolere quæsit fuerit. *Dom. Salomonis Reifelsii Miscellaneor. Curiosor. Dec. 3. An. x.*

## OBSERVATIO XXV.

*Intestini jejuni laceratio, integra abdomine lethalis.*

**S**ebastianus Ruttruff Neostadiensis ad Tiliam, juvenis 18. annorum, staturæ justæ, robustus, carnosus, benecoloratus. Anno 1691. d. 20. Sept. post medium noctis inter compositionem & lusum chartis lusoriis, obortis litibus ob rem nihili, magna vi humi prostratus, pedibus contectus, supplantatus & calcatus fuit ab Auriga Rhedario Joh. Georg. Studtens vivo quoque robusto & ebrio. Quando nocte domum redierit, ignoravit pater ipsius Bern. Eman. Ruttruff Læcio Neost. nam in stabulo pernoctabat ad vñ. num mane d. 21. Sept. mane post quartam imploravit operam matris expectatq; fomentum ipsi in colica consecutū: querebatur de magno dolore abdominis prædixitq; sibi aliquid ab hac violentissima calcatione in illo ruptum fuisse: imposuit ipsi Epithema ex mentha & lagana mellita in aceto & aqua confectum: quia verò nullū levamen attulit, brevi illud removit. Conquerebatur magis magisq; de doloris vehementis incremento cir-



ca præcordia & umbilicum, vocavit nrentē & calenti instar gravantem: dimidia hora ante obitum dicebat se tantos dolores pati, quos non cani imprecaturus esset: assimilavit dolores erga R. D. M. Joh. Alb. Magdolf. Diaconum loci, serræ quaquaversum tractæ circa præcordia. Impense sitiit: concedebatur aqua & vinum, sed parce, unde aliquando adstantibus non adveniens erupit, culinam adijt & ex vase cupreo capaci multam aquæ exhaustit: plus bibisset, nisi balnearioris famulus vas è manibus excussisset; subinde iusculum assumisit, an aliquid panis simul deglutierit, non observatum accurate fuit: verum omnia brevi rursus evomuit, prope ad extremum usq; vitæ terminū. Die 21. Sept. mane post octavam balneator unc. tres sanguinis emisit: post ven. sect. urinam, quam primo cruentem cum ardore eminxit, claram sine dolore excrevit: idem dedit tum sperma ceti cum aqua chæresolij: abdomē inunxit unguento de Alth. populol. verbasci, sine juvamine: toto die sæpius ad alvi solutionem stimulabatur ipsem etq; sellam adijt, nihil tamen egressit: vesp̄i hora quarta dedit potiunculam laxantem ex infus. sen. &c. ultra horæ quadrantem retinuit, postea evomuit: versis noctem parum fecum ex alvo emisit. Toto die à summo mane ad seram vesp̄eram hinc inde nunc in, nunc extra hypocaustum obambulavit, nunc hinc, nunc alteri lecto, nunc scamno incubuit: verum nullibi, ob magnam anxietatē & dolores, diu permanere potuit: multum semper querebatur de Tensione abdominis: toto die facies palluit & sudore frigido maduit. Mente semper constitit, apud patrem culpā sæpius deprecatus est, ante 10. noctis exp̄ijt R. D. Diaconum; adveniens solatium anxie imploravit, exprobratos errores Confessus est: confessionem clara voce edidit, sed interrupta & anhelosa respiratione absolutionem avido & fideli animo acceptavit. Sacra Cœnæ reficiebatur: dū lecto incubuit manum nunc dextram nunc sinistram occipiti supposuit, varie inquietus corpus iactavit: manus gelidæ, glaciæ instar, erant; dum erigebat caput & pectus animam efflaturus videbatur, nihilominus R. D. Diacono & devota mente respondit & cum ipsi exprobrata fuisset impetrabilitas ab armis, ejus particeps vulgo credebarur, sancte testatus se ab hoc crimine alienissimum esse. Paulo post daram absolutionem ante 11. noctis vivere desit. Post obitum malum humoris subflavi turbidi viscidiusculi ex ore emanavit.

D. 22. Sept. ex jussu Seren. Princ. & Dom. Frid. Aug. Duc. Wirtembergici Cadaver Sectū fuit: ante Sectionem cum Exe. Dom. Doct. Balth. Feyerabendt Physico Halensi Sueviæ & tribus Chirurgis, præsentibus Nob. Dom. Frid. Andr. Præf. Prim. Gothzheimsi, R. D. M. Christ. Wilh. mo Stein, loci Superintendente speciali, aliquot Senator. alijsq; oppidi civibus, conspeximus antèrius axillam dextram ad medium sternum & latus dextrum pectoris atro livescentem, magis vero totum prope dorsum atro lividum; circa spinam Ilij duo vestigia clavorum, quales calceis alijs insigere solent; similia quoque apparuerunt circa regionem renis dextri & duos scapula sinistra: magnus livor apparuit circa regionem renis dextri: Abdomen tensum quidem erat, non tamen usq; adeo lividum: deessatim euti abdominis secta & à musculis abdominis separata, inter spinam ossis Ilij sinistram & costas nothas dorsum versus lancetta peritonæum caute secando, potius quam pungendo, perfodi, mox flatus fœdissimus, stercus & cadaver redolens, cum impetu erupit, simulq; aliquid liquoris cum lacinijs paucis pinguibus membranosis ac si frustula omenti laceri essent, extrudebatur; mox totum peritonæum quoque decussatim dissectum fuit: in visum venerunt intestina tenuia omnia flatibus distenta, antèrius rubentia, veluti inflammata seu sanguine suffusa: Ventriculus & colon flaccida erant minusque flatibus turgebant, hepar totum pallidum, molle ramē & glabrum & lien lividus apparuit. Vesicula biliaria illæsa, non valde distenta, intora dextra abdominis parte & in pelvi occurrit humor turbidus, pallidus, quem dum spongijs exhaustimus, reperimus folliculos seu pelliculas Ulvarum harumque arillas & frustula ciborum nondum in ventriculo subacta, imprimis radicem pastinacæ luteæ: in recto & portione coli sinistra plurima scybala crassa & compacta detinebantur. Dū intestina dextrorsum sinistrorsumque inclinavimus blanda manu, tandem occurrit dorsum versus porrio intestini tenuis lætera & foramine amplo prædita, ex quo pressis intestinis tenuibus supernis & infernis vicinis, prodierunt chylosa, pallida & biliosa & quædam in ventriculo non subacta: hanc portionem supra & infra foramen filo constrinximus: hinc portionem recti colon cum cæco, leon & maximam partem jejuni, sc. usque ad portionem ligatam, eximimus postea remoto sterno ventriculum cum liene, pancreate, duodono cum portione jejuni legavi ex abdomine substulimus & mox nobis constitit intestinum jejunum duarum Spithamarum distantia à pyloro, ob violentissimos insultus pedibus in dorsum factos disruptum fuisse ac foramen tantæ amplitudinis contraxisse: hæc portio jejuni aliquotusque atro rebescentes erat: regio renis dextri, mesenterij, dorsum versus & sub pancreate omnia sanguine grumoso admodum suffusa erant: Duodenum amplius apparuit jejunum: per inflationē constitit ventriculum, duodenum & jejunum ad foramen usque integra fuisse: hæc jejuni ruptura facile tres pollices admiserat: usque aliquo usque quoque atro livescens erat. Chirurgo rum famuli aquam superne tenuibus infusam per coli portionem & rectum demittere nequiverunt, donec Scybala digitis expresserunt; ab illorum inflatione apparuit nullum illorum ullibi laceratum fuisse. Ren dexteri multum passus ab insultu, non tamen lacerus fuit, uti nec sinister. Vesica integra erat. In pectore nihil cruoris extravasati occurrit: pulmones erant sani, molles

pallidi, inflati. Cor admodum firmum erat: auricula ejus dextra & ventriculus continebant sanguinem partim fluidum partim in grumum concretum, cujus portio inflat polypi recenter concretioni apparuit. Sinister quoque ventriculus multum cruoris continuit, reperi causa mortis violentæ sufficienti in abdomine caput non aperimus, quia foris ejus læsi nulla indicia occurrerunt, nec quicquam de capite querebatur.

I. **C**itra valvulæ Cæcæ, masculos abdominis aut dorsi, & peritonæum penetrans, intestinum Jejunum ab insultu pedibus violento, potissimum in dorsum circa interstitium Spinæ Ilei & costarum notharum facto, rumpi potuisse, hic casus docet, nam interne ibi omnia sanguine suffusa erant, ibique Jejunii portio dorso propior, disrupta manifeste conspiciebatur: procul dubio citius hæc Laceratio evenit ideo, quia hæc portio, ob computationes in Longam noctem factas, præter solum distentior erat, nam post mortem ex lacero intestino isto pelliculæ acinorum uvarum cum arillis, & aliquot frustula pestinacè non bene sabacta exprimi poterant, cujusmodi quoque humori turbido in cavo abdominis stagnanti immiscebantur.

II. Abdomen intumuit & tendebatur & flatibus extra intestina, pulsus & ab aliis adhuc tenuibus imprimis Ileo inclusis, & a liquore seu ab humore turbido veluti Chyloso vel maximam partem potulentæ ante & post conculcationem largissime ingesto ex foramine Jejunii elapso: Flatibus enim Ilei non demum abortos fuisse ex fermentatione quadam post obitum facta, testabantur flacciditas ventriculi, coli & recti & gracilitas cæci. Flatibus in Ileo detinebantur, magnaque parte Jejunii, quia horum motus peristalticus sublatu fuit ob plexus nervosos mesentericos graviter affectos prope octum mesenterij à sanguine extravasato: forte hanc ob causam quoque Scybala crassa dura, quibus plena erant, ad excretionem promovere nequiverunt, licet sæpius toto die ad alvum egerendum stimularetur.

III. Dolores varij generis passus est, quos verbis satis exprimere nequit, vehementissimos tamen fuisse ex multis patet, nam dixit, non diu ante obitum se nec canibus tales imprecaturus, videri iustus ferram trahi circa præcordia velle urentes, gravantes, tendentes:angebatur summè, ut nullo in loco peristere poverit, in lecto se quaquaversum jactavit, manum nunc dextram nunc sinistram occipiti supposit, inflationes tenuium intestinorum forte Colicis similes dolores effecerunt: ichor seu liquor in cavo abdominis contentus pondus talento simile effecit: ardor præcordiorum & anxietas attribuenda Jejunii inflammationi & lacerationi, sanguini extravasato sub membranæ mesenterij circa iuvum exortum; quia ibi plurimæ membranæ nervæ & plexus nervini; quamvis causa ardoris & anxietatis dorsum versus detineretur, tamen vel hinc patet, harum partium afflictiones illudere posse ac si causa circa pylorum hæreret vel non procul ab umbilico.

IV. Vomitus assumporum omnium post ingestionem statim fieri posse ille so ventriculo ejusque pyloro & duodeno, hic casus abunde testatur, nam nullum his in partibus vitium apparuit, sed in intestino prope duarum spirharum distantia inde fito non secus ac in Ileo quædoq; fieri solet talis vomitus.

## OBSERVATIO XXVI.

*Intestini ilei ruptura integro Abdomine.*

**B**M. Nauta ann. 29. staturæ mediocris, carnosus, robustus, bene coloratus, capillis nigris & crispis præditus, industrius: duos & magnos labores sæpe subijce navigando ad ultimos fines lacus Bodamici utraque; & piscando quovis celo, etiam noctes sub dio transiegit; navigans non raro largiter bibere, semper multum panis sicci comedere consuevit, quamvis, cum lautioris fortunæ, etiam aliis salubribus cibis gaudere posset. Anno 1691. M. Martio febril tertiana correptus à D. D. Alex. Pfistero curatus fuit. Mense Julio Virginii honestè desponsatus fuit: Jam tum subinde de quodam præcordiorum dolore cum ventris murmure conquerabatur, accedente cephalalgia, ut præter morè ipsi decumbendum fuerit, Circa medium Sept. mane domo sanus

V. Pallor faciei statim post conculcationem eveniens duransque cum sudore frigido & extremorum geliditate, dum interna aerebantur, non proveniebant à largâ aliqua sanguinis profusione in cavitatem abdominis aut pectoris facta; nam nullus cruor in cavo pectoris, aut abdominis apparuit, ille verò qui membranæ dorsum versus suffusus erat, non tantus reputari poterat, ut illi hic effectus ascribi potuisset, cum sæpe plus in mediocri V. S. profundatur: attribuenda, hæc symptomata videntur potius C. S. imminutæ ob gravissimè afflictos nervos mesentericos, gravissimos cruciatus, gangrenam Jejunii &c. ob quam causam eor ignavius sanguinem primum promovit unde cordis ventriculis magis sublevis, in grumos concrevit, imprimis in dextro ventriculo, unde etiam respiratio tandem anhelosa facta fuit: tandem cor succubuit mortuæque omni privabatur & mors sequebatur, idque eo citius, quia nulla re rescificari potuit, nam omnia assumpta vomitu rejecit, externa vero nihil efficere valuerunt ut vires instaurarentur. Epur quoque pallidus apparuit non tam propter sanguinis aliquam profusionem prope ejus portam subras membranæ circa mesenterij exortum, quam propter C. S. elanguescentem, nam hæc tanta non erat, ut ab illa pallor deservendus esset: Lien vero Colorem suum atrolivescentem retinuit, quia sanguis ob lentum & imminutum motum in illius rebus perveis caverat: nullique sublevis gromosusque factus fuit.

VI. Sitis intensissima statim mane eveniens ascribenda tum omnis prope potulentæ effusioni in cavum abdominis ex foramine, seu vulnere Jejunii, tum inflammationi Jejunii & partium vicinarum quam magis accendit ista potulentorum rejeccio per vomitum.

VII. Admiratione non caret Juvencem hunc tam graviter affectum in Hypochondriis semper mente constitisse, nunquam delirasse, nec convulsus fuisse, imo hora ante obitum incedere valuisse, quod ascribendum videtur juvenili vigori validoque cerebro, in quo spirituum animalium tantum in cerebro superaret quantum ad sensum interiorum exteriorumque actiones peragendas motusque animales, scilicet incessum, motum brachiorum loquelam respirationem &c. perficiendos aliquandiu sufficerent: tandem tamen ob denegatum influxum & ipsum cerebrum succubuit omnesque animales actiones paucis momentis auferebantur, non deliravit, nec convellebatur, quia ob imminutum sanguinis motum & brevem morbi durationem, etiam jam & gangrena affecto jejunio, aut à corrupto sanguine sub membranæ mesenterij, non tantum particularum depravatum vel cerebrum delatum fuit, ut Spiritus animales turbare aut ad Convulsiones totius systematis nervini proritare potuerint. Dom. Joh. Jacob Wepferi *Miscellaneor. Curios. Dec. ij. Ann. x.*

egressus subito vertigine gyrofa, leipothymiam minitante, corripitur, subsequente & stitidine spontanea: cessantur citra remedij usum. Non die post hæc, rursus ad Laeum Bodamicum superiorum navigavit: In itinere, æstuante corpore in loco quodam exhibit, prope unæ tractu, ad hæc duas vini albi austeri, seu minus maturi, quale anno prægresso in illis locis venundabatur; mox male habuit, cum molestia tussis & præcordia dolebant; nihileminus iter prosecutus est; verum in reditu, ipse scamno ad bihorium ineumbendum fuit: Ab illo tempore nunquam bene valuit: nam dum 22. Sept., verbi Divini Ministro, ritu nostrate, in suis cædibus, ratione fidei æque nuprias redditurus erat, insultu quodam febrili correptus fuit cum virium prostratione, antecedentibus cephalalgia & consuetâ cardialgia: morbum neglexit, nunc obambulat, nunc præter morem etiam in interdium lecto incubuit. Die 28. Sept. mane hora sexta concioni interfuit: hora septima, dum ad altare eum Sponsa in genua provolutus copulationem & benedictionem expectat, & accipit à V.D. Ministro, rigore succutitur, subsequente calore non magno, domum perveniens iusculum comedit mulierculam suam; potissimum de præcordijs querebatur: hoc primo nupiarum die obambulavit; cibum fere averfatus est, de Tragæta tamen quadam grossa non parum comedit; non valde sitis; bibit aquam cui frustulum panis immerfum erat; nocturnum debitum conjugale persolvit. Die 29. Sept. scilicet secundum nupiarum die melius habuit; in publicum prodijt; in convivio postea socios ad hilaritatem extimulavit. Die 30. Sept. rursus horrore prægresso æstuavit: vomiturijt, vomitum frustra digitis ad fauces trusus provocare tentavit. Diebus 1. & 2. Oct. utrunque mane valuit; vesperi vero horrores subsequente æstu affligebant. Deum die 3. Oct. mane D.D. Pfisterus vocavit: pulsus erat prope naturalis, urina pallida, crassa, turbidiuscula, appetitus non valde prostratus, & sitis exigua linguaque humida erant, respiratio æqualis; os amaricavit; tussis in primis nocturnis: Dedit pulverem digestivum: speravit sudorem, at nullus sequebatur: tussis ad medium noctis permolesta fuit: propter oris amaritatem, die 4. dedit pulv. æ. crem. tart. ʒʒ. diagr. sulph. gr. iij. lap. prun. olei N.M. expr. ʒʒ. gr. j. M. Unde alvum ter movit: inde vesperi horror & calor prope emaserunt, Ausis que minus afflixit. Die 5. Oct. uti cepit mixtura aquarum diaphoretica: sumpsit illam cochleatim, imprimis paulo ante paroxysmum; ægrè sudavit & quidem solum circa caput: Urina pallida crassa cum sedimento crasso farinaceo: hodie sæpius iuscula sumpsit, edit poma & pruna cocta: Vesperi horrorem non animadvertit: pulvis tamen erat frequens æcelo: nocturnum multum tussit sine sputi ejectione. Die 6. bene se habebat, ut diebus prægressis. Vesperi utebantur mixtura ex diacodio Mont. Syr. Jujub. pulv. Anthe. & Poter. Aq. fl. acuc. &c. unde multum levaminis, ratione tussis, nocturno expertus est. Cardialgia de qua his 14. diebus multum querebatur imprimis tempore paroxysmi & Vesperi: hæc autem fuit pæcipue dolor quidam compressus & gravans in præcordijs. Sese exporrigens per transversum à dextro hypocondrio ad sinistrum; item à regione epigastrica ultra umbilicum. Appetitus magis magisque imminuebatur, cibi non alij erant quam iuscula poma & pruna damase, cocta, similesque sitis crevit, in una nocte bibir præter consuetudinem ultra ʒvj. decocti C. C. alvum hucusque semel vel bis exoneravit absque diarrhæa, quamvis d. 5. Oct. tormina passus sit, quæ sustulerunt sæculi flor. Chamæmel. in farct. Die 7. Oct. mane hora 8. Asthma vehemens ipsum invasit & ad horam 2. pomeridianam continuavit: suadebantur diaph. quibus add. Liq. C. C. succ. & sp. Sal. Armon. urin. à 2. pom. ab Asthmate liber erat ad 4. Vesp. tunc redijt æ tota nocte duravit: Die 8. Oct. magno nixu & cū sibilo spir. duxit: prope sudore propter anxietatem diffusebat: circa merid. valde exacerbabatur citra ullam causam externam: dum ab illo exercebatur, dicebat aliquid per transversum jacere sub costis nothiis, aëris plenum ingressum impediens: Ibi attactum fortiusculum plane non pertulit; videbatur in inspiratione epigastrium intorsum trahi: humili sive in utrumque latus decumbere valeit, melius tamen sibi extra lectum esse aiebat; tussit multum sine ulla sputi excretionem; præ anxietate sudavit: Vesperi aliquantum melius evasit: appetitus penitus prostratus fuit, sitis, pulsus frequens, celer, debilis, lingua humida, habitus ad tactum non valde caluit. Urina pallida, pauca, crassa statim turbabatur: nocte asthma rursus graviter affixit: Die 9. Octobr. summo mane voc. batur D. D. Melchior Hæter; addidit liquori diaphoretico plus Liq. C. C. succin. & Sp. Sal. Armon. unde circa horam 9. mat. remittebat; pulsus robustior fuit, quam heri, sudavit largè: æstuavit, sitis, parum edit, semel exoneravit fæces naturales: querebatur subinde de obstaculo transverso sub hypocondriis liberiori respirationem impediens: nox quietior fuit: D. 10. Oct. Asthma magis remisit & D. 11. Oct. Sputum tussim cum levamine excrevit, Diebus 12. 13. & 14. Oct. ad horam 4. Vespertinam non molestum erat. His verò & progressis diebus prope nihil appetit: sitis magna, Urina crassa, turbida, ultionis diebus tinctor, pulsus frequens, erat: sudavit sæpe enormiter, maxime circa caput, sudor subinde færuit: Vigiliæ erant sæpe continuæ: si somnus obrepebat præ lassitudine, statim rursus ab in somniis turbabatur nunquā deliravit. Tormina ventris circume circa umbilicum & versus præcordia multum ipsum d. 13. & 14. Oct. afflixerunt: hisce diebus excrevit per alvum fæces, liquidas, quandoque granularum, flavas, pallidas, tandem fæces, subnigras, omnes fetidissimas, quandoque sub finem excretionis succedebat muco renacissimus similis spermatis ranarum: pluries quoque Nychthemeri inter-

vallo alvum soluturus plerumque surrexit, Die 14. Oct. cum Vespere asthma recruduisset, ventrisque tormina ingravescerent hora 4. ad vomitum stimulabatur, mox largissime humorum turbidum, gryseum similemque puri hor. 8. n. evomuit: Die 15. Octob. summo mane hor. 2. Vomitus rediit & rursus hora 6. mat. omnia erant liquida. hor. 2. mat. simul vermem eiecit: nondum ferebant. Post sextam quoties se erexit ad Vomitum urgebatur; humor quem evomuit erat postea fuscus, subniger, ac si sanguis corruptus ipsi permixtus fuisset, semper copiosus. Post Vomitum multum se à sua Cardialgia levatum dixit, quamobrem, licet vires satiscerent, purgans expetiit, à quo se penitus à Cardialgia liberatum in sperabat. Statim post primum vomitum abdomen intumuit valde & tendebatur: attactum in præcordiis recusavit, etiam leviculum, quia sensit se protinus ad vomitum inde irritari. Mortuus est hor. 2. pomerid. Post mortem ex ore mulctum humoris turbidi subflavi, item subnigri & erenti imprimis pressio aliquantulum ventre effluxit: facies primò expalluit, postea livida evasit. Cadaver duabus horis à morte intolerabilem fetorem emisit. Cadaveris apertionem ursumus propter tot symptomatum congeriem & tandem precibus obtinuimus. Itaque in rempessa nocte cum D. D. Melchior Hartero, D. D. Alex. Püfsero & filio Joh. Conrado icidem Med. Doct. ejus Anatomen aggressi sumus & primo remotis prope umbilicum integumentis abdomen ad peritonæum incidimus usque, cauteque illud ob tensionem renitentem perforavimus: statim flatus foetidissimus cum impetu & sibilu erupit, mox portio intestini renuis foramen obruvit; itaque digito & super digito forfice in apice globulo prædita intrusa decussarim omnia integumenta discidimus: sic omnia viscera in apertum citra ullius intestini læsionem venerunt. Ileon, jejunum, Colon ab exortu suo transversum sub hypochondriis & in flexura sua, ventriculus, & duodenum omnia flatibus distentissima erant & cum gracile erat, & vel in hoc cadavere, se non statuum diverticulum fuisse monstravit; intestinorum renuis superficies peritonæum respiciens splendide rubebat longè lætiusque ac si sanguinis suffusio non ita pridem evenisset. In cavo abdominis, maxime in sinistro latere, à concava hepatis parte ad pelvim usque turbidus & suppalidus, redundavit humor citra aliorum contentorum intestinalium, aut lumbricorum admixtione. Humore hoc exhausto in pelvis parte sinistra adhæsit mucus turbidus, lentus copiose, ac si abscessus autculus sordidum exstiteret, verum illo citra vim deterfendi & in vicinia omnia glabra & integra apparuerunt. Ileo ex pelvi extracto occurrit statim hiatus in cavitatem ejus pervius, tribus digitis supra valvulam coli, facile apicem parvi mei digiti admisit; pressio superne Ileo ex hoc hiatus prodierunt flatus & humor similis illi; qui in cavitatem abdominis stagnavit; nihilominus reliquum intestinorum renuium omnium & Colon distentissima, petissimum à flatibus manserunt: in super circa hunc hiatus & alibi pluribus in locis cumulus lumbricorum intricatorum tangebatur, sicum verò nihil nec in colo nec in recto supererat, at multum adhuc humoris turbidi. Ex pelvi cum hac portione perforata Ilei ejus frustum circiter ulnas duas longum exeraximus: in eo vidimus foris maculas aliquot; numeravimus insigniorum quarundam sex, quasdam quadrantis, alias dimidij floriæ Imperiali æmplitudine, attonubescentes & in medio fuscas, lividas & nigras. In hoc fuisse, superne & inferne ligatis intestinis, exciso, mundato & per orium perlustrato, ubi foris maculas conspeximus, intus reperimus ulcera rotunda quorundam labra in toto ambitu elata, prominula, altitudine dorsi cultri mediocri, inæqualia & quasi canctosa; in illorum medio, seu centro compages membranosa intestini erat flaccida, livida, attonubescens, veluti gangrænosa & rupture proxima, quæ evenit ei parti, ubi hiatus exstiterat. Præterea intus in conspectum in hac excisa Ilei portione videri: ut tubercula rubra duriuscula, quorum basis dimidij bazij ampla erat, altitudo dimidij æmini vix mediocri: in cacumine cum sinulo osculo capaci sem. lentis, etiam lupini, prædita, non ulcerum instar sordida: erant solitaria & multum à se invicem distantia. Tum maculæ, tum tubercula erant præcipue in illa parte, ubi glandulæ alias conspiciuntur quas primò Nob. D. Peiserus noster publico scripto plene illustravit. An alibi quoque in reliquis portionibus Ilei & jejuni exstiterint, propterea nescimus, quia ulterius inquirendi spatium non dabatur, nec ut verum fatear, antequam domi hæc accuratius perscrutati sumus, nobis in mentem venit, talis deplorata intestinum dispositio. Intestinum duodenum & portio Jejuni ex atro rubescebant, fracida erant & veluti gangrænosa, aut prope sphacelata, facile rumpebantur; contenta illorum erant glomer insignis lumbricorum multorum, quorum aliquot adhuc vivebant & humor flavus, fuscus, subniger, cadaverosus, quem ante obitum quoque evomuit. A duodeno & portione jejuni externa membrana, peritonæi soboles facile abscedebat, ac si in aqua fervida aliquandiu macerata fuisset. Omentum crassum lurida pinguedine præditum aliquot in locis convexa parti intestinorum tenuium præter naruram tenaciter accretum erat. Ventriculus cum portione gulæ toto duodeno ex cadavere sustulimus. Illo ab uno ad alterum orificium discisso invenimus reliquias humorum, quales in duodeno invenimus & cujus generis ante obitum evomuit, frustula quoque nigra, quæ progeules erant corrupti sanguinis, nullum autem lumbricum: Sordibus detectis intus à stomacho circumcirca ad palmi latitudi-

tytudinem rubuit; gula alba erat & foris eo loci nullum ruborem animadvertimus: pylorus ejusque antrum quoque rubuerunt, sed non tam saturatè: In duodeno, levicule deterfa ejus-  
nica crassa coea, seu mucosa, pulchre in conspectum venerunt ejus glandulæ, de quibus Exerci-  
tationem Anatomico-Medicam publici Juris fecit Gêner meus D. D. Brunner Med. Prof. 1687.  
Heidelbergæ. Pancreas fuit durius debiro, aliquot glandulæ, ex quibus conglomeratur, nigre  
erant, magnitudine pisi prominentes: intus fuit rubicundius, prope insertionem ductus aliquo-  
usque fuscum. Epatis superficies fuit quidem æqualis, at in parte convexa & concava atro ru-  
bescens. Vesicula biliaria vix æquavit nucem juglandem, foris atro virefcens: Continuit bilem  
viscidam obseuro flavam. Lien foris lividus, intus niger fuit. Circa crura diaphragmatis appa-  
ruit inflammatio atro rubescens ad gangrænam tendens. Renes sani erant. Ablato sterno peri-  
cardium plenum erat aqua limpida pellucida: multum quoque ejus redundavit utraque in ca-  
vitate pectoris, sed non tanta copia: qualis alias in pectoris hydrope & quæ sola Asthmatis cau-  
sa reputari potuisset. Pulmones inflati erant ac si inspiratio ultimæ vitæ actio fuisset, molles ta-  
men erant & colore sub albo & cineritio præditi: in dextro latere accreverunt mediastinum, pe-  
ricardium & diaphragmatis: in sinistro latere, pleuræ mediantibus fibris albis oblongis, tenacibus,  
crassitie duplicis fili: In postica parte ad latera gulæ rubebant, molles tamen erant. Cor amplum  
& magnum fuit; nam dextra auricula & ventriculus à sanguine admodum distende-  
bantur, nec paucis in sinistra auricula & Ventriculo supererat: in nullo horum locorum aderat polypus  
consterios: sub laro ex his sanguine cor flaccidum plane erat ac si enervatum sanguinem non  
amplius propelleret valuisse: Caput non aperuimus tum, ne patientia domesticorum abuteremur,  
tum, quia toto morbi decursu nullum symptoma occurrit, quod nos ad cranij ablatio-  
nem stimularit, nam vertigo semel ipsum adorta est postremis morbi diebus non multum am-  
pliùs: de cephalalgia conquestus est, & exonerationis alvinæ causa ad ultimum prope halitum  
surrexit, ut magis syncope, quàm apoplexia sublatu fuerit.

1. **Q**Uamvis Nauta noster Medicos demum die  
18. ab invasione circiter accesserit, suspicor  
tamen morbum statim ab initio sebilem fuisse, nam  
post vinum non bene maturum assatim haustum  
æstuante corpore, non amplius sanus fuit, id est,  
non amplius erat ob languorem consuetis laboribus  
D. 12. Sept. febris magis se prodidit cephalalgia, car-  
dialgia quadam decubitu in solito interdiu frequen-  
ti 18. & 30. Septemb. Tertianam intermittentem si-  
mulavit: d. 1. 2. 3. Octobr. duplicem tertianam men-  
tebatur, & quamvis post laxans 4. Oct. sumptum  
vesperi vix animadverterit, & 5. Oct. nullum paroxys-  
mum notabilem habuerit, atamen hodie pulsus  
habuit frequentem & celerem & postea ad finem  
vitæ nunquam febrim ad intermittentem pervenisse  
dici potest, prout pulsus, sitis, impotentia, & aliæ  
symptomata testabantur, ut audacter hanc febrim  
Hemitriticeum appellare ausim Febrim hanc jam ali-  
quot annis grassatam fuisse necum plures observa-  
runt: imprimis hoc anno 1691. in Exercitu confede-  
ratorum admodum sævit, ut ex ore aliquot Ducum  
Copiarum audiverim, unquam se tantum nume-  
rum Ægrotorum primipilorum, medioxumorum, &  
infimæ foris militum observasse, quamvis plurimis  
annis militiam sequuti fuerint, & frequentissimè in  
Castris quovis cælo, etiam in Hungaria moraren-  
tur: Numerum ægrotantium aliquot millenorum  
fuisse testatur Magn. Dominus D. Franciscus, Celsissimi  
Elect. Saxon. Archiatr. Argus noster, Amicus sin-  
gularis Heilbronnæ d. 18. Sept. cum de hoc morbo  
castrensi cum aliis excellentissimis amicis dissetuisse-  
mus. Erat affectus Febris, sed vere Protheus, nam va-  
rias induit formas: quosdam subito prætravit, alii  
hostem in sinu gerentes diu adhuc obambulabant,  
sua officia præstabant: erant nunc continuæ, tunc  
intermittentes & hæc quandoque in continuas; apud  
plurimos Hemitriticeum observabatur, ut quoque nunc  
Stuttgartiz Mens. Augusto & Sept. Nostro adii ani-  
madverti. Nemini pepercit æque maghates quàm  
gregarios, equites & pedites, commodè in palatis,  
aut domibus, in tugurijs aut tentorijs malè viven-  
tes. Verum non solum grassata est in castris & inter  
milites, sed etiam in Helvetia nostra & Rhetia, quor-  
um nullus unquam militum pervenit. Comitaban-  
tur variis symptomatibus nunc minoribus, nunc

severioribus: Cephalalgia, motibus convulsivis, so-  
poribus, delirijs, vigilijs, aggravatione pectoris,  
tussi ferina, palpitatione cordis, leipsothymis fre-  
quentibus ex levi causa dyspnæa; quidam spæum  
copiosum viscidum crassum, alii tuberculorum cum  
& sine dolore lateris panctio ejiciebant; quidam  
omnem cibum avertabantur, non pauci erant fa-  
melici; plerique impense sitiebant cum lingua ari-  
dissima; quidam evomebant assumpta, alii biliosissi-  
ma: paucis alvus constipata, multi diarrhæis, qui-  
dam dysenteriam patiebantur: quidam colicam ex-  
periebantur febrî adhuc durante, alii jam illa de-  
victa multis utina similis sanorum, non paucis fla-  
vissima cum ictero omnes lassiti in quibusdam pete-  
chiaz eruperunt. Observari abscessus etiam in artibus  
& habitis. Cuidam per d. 14. acutè febricitanti cum  
vigilijs, anxietatibus, delirio, lingua siccissima, sui  
inexplebili, summa aversione ciborum & medica-  
mentorum, prope inscio obortus est abscessus in na-  
te prope anum: illo tandem à Chirurgo animad-  
verso, cum fluctuationem putis petechiasem statim  
aperiendum curavi, effluxit pus foetidissimum ad  
plures uncias, unde cum febrî omnia symptomata  
remiserunt; ulcere bene deterfo & diligenter pure  
expresso brevi convalevit. Multi lienes magnos con-  
traxerunt, in primis gregarii milites aquam minis  
salubrem ingurgitantes, tunc præcipuè cum Exercitijs  
trans Rhenum circa Frankenhæi & cis Rhenum  
in Campis Manheimensibus castra metatus esset.  
Quamvis horrendis symptomatibus febricitantes  
isti assigerentur, plurimi tamen convalescerunt: tum  
men multi quoque ad hunc usque diem recidivi fie-  
bant, febres tamen recrudescentes plerumque quæ-  
tante erant, eoque pertinaces, atque illæ etiam post-  
quam per aliquot septimæ harn decursum celsi-  
runt, ex leviori errore redeunt. Universum genus  
humanum magno beneficio misæretur, si accurata  
historia hujus febris concineretur, quod tamen fieri  
non posset, sine communicatione observationum  
multivariarum tum à Medicis Castrensibus, tum à  
Physicis urbium in quibus hæc admodum grassa-  
batur, additis juvenibus & lædentibus; non ne-  
glecta cadaverum hæc febrî defunctorum anatome,  
quam non tam periculosam meo damno didici, si  
fiat in loco aprico & peribili. Verum jam prævi-  
deo

deo hunc laborem non fore vnius hominis prudentia & consilio Perillustri Collegii Curioforum Germaniz Procerum membra animari possent, ut mentem operam ad illum perficiendum conferrent quàm re iam illos præcesserant Rulandus de Febri Ungarica, Heobstætenus in suis observationibus, Spigelius de Hemitritæ, Neutanzus de purpura, & Heint. Scretæ de febrî Castrensi & plures alii. Huc pertinent Observationes Gifeleri & Diembergii de Peste, non infidi viz duces.

II. Cl. Spigelius, Vir optime de remedia meritis & diligens observator in anteo scripto de Hemitritæ l. 1. c. 14. in cadaveribus hac febrî defunctorum fomitem semitertiam in visis, sed ut plurimum in minoribusprehendit, aderant enim inflammationes circa jecoris cavam partem in ventriculo, in intestinistam crassis, quàm tenuibus, in mesenterio, omento & lienē; sæpius in una partium memoratarum, aut pluribus, aliquando etiam in omnibus, quæ superveniente gangrena, aut phlegelo, celeris mortis causâ erunt. hac c. 15. aliquod exemplis confirmat, ut & c. 16. ubi mentionem fecit febrium circa vesperam aut statim post meridiem se exacerbantium; putredinem autem se non invenisse in venis majoribus, quæ inter alas & inguinâ excurrunt, sed in viscere aliquo primæ regionis inflammato, vel alia aliqua recondita parte, inflammatione paulo minore, quàm ut tactu hypochondriorum ab ægro, vel Medico ex dolore nosceretur; id duabus historiis ibidem illustrat: Eadem repetit l. 2. c. 11. Itaque conspecta insigni inflammatione duodeni & portionis jejuni ac crurum diaphragmatis stabilis magis fuit in msa sententia, nimirum Nautam nostrum Hemitritæ passum fuisse, si non à principio morbi, saltem à principio Octobris. licet non dubitem aliqua primordia facta fuisse post medium Septembrem, nam post confectam navigationem è lacu Bodanico in dies pejor habuit, quod aliis Hemitritæ affectis evenit, qui diu pæterito autumno obambulabant, antequam victus manus darent & decumberent penitus, idque plerumque magno suo malo. Inflammationem duodeni & jejuni vehementem fuisse præter colorem atrocidentem probant facili abscessus membrarum externarum à fibrosa & crurum diaphragmatis vicinorum gangrena: necessum quoque inflammationem in superficie ilei & jejuni adfuisse, quia omentum illis accrevit, quod evenisse quoque novi intestinis ab inflammatione musculorum abdominis aliarumve ejus partium circa umbilicem & in inguinibus. Non carent malignæ & prope venenatæ inflammationis suspitione maculæ intus ulcerosæ, foris atrocescentes & lividæ. Inflammationes superficialis in antro pylori & circa stomachum forte vomitus effectus fuerunt & pulmonum in pollica parte, satifcentis cordis, non amplius valentis sanguinem per pulmones pellere. In parte inflammare sanguinem magis incallescere existimo, quia sanguini alias actu è lido, in quolibet pulsu semper novus accedit & percolatione ex arteriis in sacculos venarum & vasorum lymphaticorum impedita, ejus copia augetur indeque magis, citra putredinem, aut pœnam aliquam alkali & acidi effervescent & quasi flammam concipit, unde omnes partes inflammatae calidiores tanguntur, & ab ægris ipsi sentiuntur, nam omnium hominum & quadrupedum sanguis, sero & bili non parum partium inflammabilium inesse facile comperitur, si totus sanguis aut scœrum pars grumosa aut serosa, ipsæve bilis exsiccentur, nam conspicitur citissimè flammam concipere, ac instat rede piceæ ardere admodum cereola incensæ. Particulæ à loco inflammato reliquo sanguini confusæ, massam

prout nunc magis hunc minus totam incendunt, febris nunc fortior, nunc minor evadet, & quandoque etiam exacerbabitur. prout particularum plus, vel minus immiscebuntur ac reliquum sanguinem magis vel minus accendunt.

III. Inflammationi non parum ansam dedisse apud Nautam haustum vini austri non bene maturi, æstuantem corpore, admodum verisimile est, nam tale in loco, ubi illud affatum hauserat, ibi vendibile erat. Tali quoque vino Cl. Spigelius l. 2. c. 1. culpam imputat, ibidem quoque memorat se observasse bibentes æstatis tempore in cellis vinariis aut cavernis in hanc febrem incidisse: Item in Pannonia & Moravia, ubi frequens est morbus, ex illis plurimum ad suos morbi generationem facere potuit, nive aut aqua putrealvalde frigidissima. Dum Paravi erant Medicinæ Candidatus. J. juvenis robustus & plethoricus 1646. à pilularum lusu æstans, in taberna sub vallo viam gelatam ingurgitans prociens simili febre, quam malignam dicebant, brevi vitam cum morte commutavit. Non paucos Magnatum & Primum Mensis Augusti, casu summe æstuantem, gelido potu hanc febrem quoque contraxisse novi. Non negum tamen plures hac correptos fuisse ob solam ætis incompertam, qui alias commodè & sobrie vivebant in castris, citra contagium, cum alii proci à castris in locis ad quæ nullus militum unquam venit, etiam in mense Septembri 1691. adhuc similiter ea oborti fuerint. Vinum autem æstuantem corpore avidè ingestum in duodeno & jejuni portione nautæ occasio inflammationis factum fuit, dum procul dubio, arteriarum capillamenta. magis promiscua erant quàm in ventriculo, aut alibi, atque ita magis tali offensioni expolita. Novi nobilem Maronem degustato aceto, aut comesto fructu cado sive dulci sive acido prociens sæva cardialgia & torminibus correptam fuisse. Notamenta citius eveniunt talia, si vasa à prægesto excutito, aut aliam ob causam turgidiora sint: sic novi quendam post usum Læconici, frigidum ætatem haurientes pleuriticos, aut frigidam haurientes hæmopticos prociens factos fuisse. Inflammationem vinum fortè acceleravit, quia ceu potulentum citò ex ventriculo eliminatum fuit.

IV. Lumbricos inflammationi occasionem dedisse, illamque pro ovivisse veritati admodum consonum est, nam copia in luteis redundabant & præcipue in duodeno & jejuno vicino glomeramen invenimus, convolorum ex vivis adhuc & mortuis insignis magnitudinis, teretibus, longis crassis, exilientibus prope omnibus. Quod faciunt, dum semer affligunt membrarum potè de nervæ quàm soli crustaceæ indeque summa nutrimentum exiliunt & id quidem negat Cl. Placetus Prax. Tr. 3. l. 2. c. 13. dum scribit, haud verisimile esse lumbricos diu detentos. adeo intestina rodere posse, ut non solam ea perforaret, sed & venam, atque per eam juxta inguinâ, aut umbilicem erumpant, quia nec rostro acuto, aut aperto, nec dentibus præditi conspiciantur, ut legendum hæc minime pœssare possint. Verum si sanguis omnino quoque corpori se adsigunt, & osculo alimentum haurient, unde nutriuntur & augentur, & intra corpus suum alios producant ut alios majores minoribus testatè ipsemet videtur l. 3. observ. p. m. 639 quibus tribuit morum inæqualem ad omnibus sepulturam, antequam invenerat, Pueri 7. ann. in Hospitali dubium facientem. Anno 1662. Civis quidam noster pro tibus domesticis suam maculam curavit: Lenio observat tenuia intestina lumbricis repleta, abscedit fustum, duas circiter alas longum ut pridem p. illius erat mihi. cum multa hac intestinotum verminola constitutione narrasset, ac propterea ad fuscissima parva inepta dixisset. In hac intestini tenuis portione vidi

lunbricos quosdam per forationem moliri, quosdam ad dimidium corpus foras transisse: inveni non paucos foraminibus pennam medicocris crassitie admittentia jam paraffes, inverso intestino quàm plurimos conspexi ab interna ejus membrana pendulos & pertinaciter adherentes, non secus ac huiusmodi humanis persimiles, longos & teretes, ægre successione & tractu abscedebant. Huiusmodi quæstioni auctum dabit Anatomæ Puella nono circiter anno, quæ post multos cruciatus abdominis rubida obit, aperto abdomine in cavo abdominis feces cum lunbricis magnis continebantur, intestina aliquot in locis perforata, alicubi foris signo hiant, alicubi portio intestini minus alteri similes accreverat, ibique ex uno intestino in alterum amplum foramen patebat forsan à lunbricis sibi factum. Lunbricos laos in fele & aliquoties in Lacis pertinaciter adhesisse suis caprellis minoris vidi, de qua re alibi & de lunbricis ex ulceribus in inguine, aut circa umbilicum cum aliis prodeuntibus. Foris à lunbricis in Nauta ulcera illa producta fuerant in illo, ubi foris mascula apparebant: Lubenter tamen concedo lunbricos non semper inflammationes & huiusmodi ulcera efficiere, cum multi non solum ætatis tenerioris, sed etiam adultiores diu tales intra intestina citra talem noxam destineant; verum quoque largiendum videtur lunbricos non sibi semper similes, sed quandoque maligniores, unde in quibusdam anni constitutionibus plus negotii facessant & grassante peste, aut febribus malignis deteriora pariant symptomata: & ipse Huiusmodi multum differunt inter se unde in illorum usu selectum habendum scribunt Rhases 18. Continent & clarus Sennertus Instit. Lj p. r. f. c. 7. Et cum Galen. Class. 6. ita tamen à principio, antequam admoveantur alii quoque præparandos monent.

V. Lunbricos in Nauta non supernarios esse, illorum numerus & magnitudo docent, & forte symptomata quædam probarent, nisi homo blimer alias durior, illa Medicos celsaret. Hoc quoque ex sui generis femine cum Sennerto, Helmont. Redi aliique produci credo: argumenta horum adducite, nec hæc vice lubet; videantur Aphores, aut ipsa natura consulantur. Illos in & ex excrementis exaltant omnes, qui Lunbricos producti tradunt ex cibis non bene coctis aut pot. e fideis. Venerandus Senex Caspar. Hoffman. æquè in ventriculo atque in intestinis nasci asserit contra Recentiores Apolog. pro Galen. l. j. c. 13. ubi eludit rationem illorum qui in ventriculo non resistere posse putant, quia ibi coctio fiat, quam quoque reddit Helmont. de Sexupl. Coct. §. 81. putans illos per modum cibi coactum huiusmodi si in ventriculo subsistant cibi non penitus cocti aut si ibi putrescant non fecus ac in intestinis eos inde productos ex hac materia iudicat Hoffman. in l. c. suamque sententiam etiam ibi confirmat experimento Casalpini alias cum Aristotele consentiens, vermes in ventriculo non gigni, sed converti, postquam vidit in lactentibus per vomitum vermium globulos veluti acicularum, excretos, quos ex inferioribus ascendisse verisimile non erat. In margine addit ibidem ex Fons. l. 1. cons. 99 in puella in ortu repetitos fuisse lunbricos 36. vivos pertinaciter ventriculo adherentes. Nam lunbrici apud Naturam in ventriculo aut intestinum excrementis, aut ex illis aliisve contentis nutri fuerint valde hæsi; quia ad animalium generationem non aliqua requiritur se. ut ovula maturecant, germinant & ut in loco habitaculi adoleant & aliquandiu persistant: quam vix concessam existimo, quia dum jam egrotavit, quotidie adhuc alvi beneficiis fruebant, lunbrici terrestres quæ gaudent in cavernosis subterraneis indeque pro soil & fimento. rum pinguedine bonitateque minora illorum corpora ad magnitudinem humanorum excreverant: si faeces 10. aut 20. diebus, imo tribus mensibus persi-

sistent in intestinis, ut in senie Romano citra sanitati damnum apud Panatolum Med. obs. 1. aut per se sequi annum scybalis indurata in femina quadam apud Salmuthum l. 1. observ. 14. sine scrupulo in ipsis fecibus productos fuisse admittentem. Novi pueros puellisque etiam adultiores verminosos fuisse & marisse, quamvis quotidie alvum solverent & quandoque diarrheam patenterunt citra excretionem vermium unde credibile est suos tidos sæpe lunbricos habere, ubi adolescentem eoque donec robur acquiritur, sequi stenter intestinis affligere valeant, ut merito alligendum sit Esc. D. Pechlino obs. Physico-Med. l. 1. obs. 64. animadvertent in verminibus ut symptomatum. Ita sanationis variam esse fortunam; nec proculdubio ob perniciem adhesionem, facile cedere quibusvis medicamentis, quo nomine tam hæc, tum seq. obs. 65. diffingentem in legendo considerationem merentur. Fone non vane consilio tubercula illa extraxit rubra dodecim in portione Uei abscessi horum lunbricorum vidos fuisse, ubi illorum semina eoque blando intestinum elore foras, donec in lunbricos mutata fuerunt & apicem pertransire poterunt, ut apud canem in ventriculo Dec. a Eph. N. C. Ann. 7. obs. 16. factum fuisse memini, nam in à pice illorum conspersum osculum, deprehendimus sinulum capicem lentis aut sem. Lupini, mundum, nec instar tutumolone superat. orum sordidum: non dubito tamen carcinulam illorum ampliore fuisse, contractionem veto evasisse, quia pedem ex hoc suo nido egressi etiam juris facti, aut adhaerent interius tunicis indeque suum alimentum facta hærerent, aut alia ratione contra motus excretorios intestinum se defenderrunt, nam Nauta totius morbi de casu nullum verum per alvum emisit, nec ultimis vitæ diebus in quibus diarrheam passus est & tandem mucum spermatum ranarum similem non sine nisu aliquo egressum paucis horis ante obitum vermem quidem evomissit, sed forte pediculorum more in moribundum hiele perdisit, quod Salmuth. l. 1. observ. 1. vermes quoque hoc fieri annotavit. Præsuppono lunbricos quoque hos, ut quoque alia infecta, ex sui generis ovulis productos fuisse & non nisi per arterias ad hos folliculos pervenisse ovula, quæ de re videtur Schol. 2. obs. 16. memorare. Forte nemini absurdum videbitur semina, seu ovula animata, per vasa succum nutritium ad quasvis partes defectentia transportari posse, qui perpendit primo per os ingesta per tot meatus & anfractus, angustissimos ad vesicam delatū fuisse, sc. sem. anis. & grana Alxex. sc. ex ventriculo & intestinis, per vasa chylosa ad cor, inde per pulmones ad renes ac vesicam pulsā & excreta fuisse; ræpe aciculas, aliaque absurda cum utina emissā fuisse, postico duns clavos ferreos tæperros cordi infixos in iomato S. Blasii mactaro, quibus hæc vix emittenda fuerant. Deinde qui consideraverit, nullam partem corporis humani esse, in qua non repetiri & generari vermes fuerit, licet reconditissimæ fuerint, quæ de re videatur Esc. D. Paulin. Cynograph. curios. l. 4. c. 6. quamvis tamen plerique non nisi per arterias leminum verminosos suscepisse inde constet, quia in folliculis quibus inclusi erant, nullibi foramen apparuit, per quod fortissecus intrare poterit: prout vidi sæpius in hepate murium Schol. 2. Obs. 1. frequentissime vero in hepate piscium quos nostri vocant, sunt specles mollæz piscis, sed minores, varietissimi, quo copiose ad nos è lacu Bodanico circa Autumnum defecuntur, relictis in nave semet devorant quædam Piscatorum. Dum hæc scribo, offerrebat mihi cor cum pulmonibus & portione gula suis grandinosis creditis; verum neque in pulmonibus, neque in mediastino, neque foris in pericardio, neque citra gulam ullum vestigium Chalazii invenit, verum difficilio pericardio plures conspexi in ipso corde

de hydatides, non uno in loco apparentes, quasdam videbantur in basi, quasdam in apice, quasdam in superficie cordis inter apicem & basin intermedia, ante & retro, quasdam pendulae quasi, quasdam profundius immerse, quasdam cordis superficiei zquales, neque solum foris occurrebant, sed etiam intus in utroque ventriculo. In dextro insigniores circa staminalia nerva valvularum; in sinistro ventriculo cum valvulis sigmoideas in interstitio aortae & arteriae venosae, seu palmarum; imo diffusio parenchymate aliquot ejus carni profundius inclusae invenit: magnitudine erant variae, quaedam enim aequabant magnitudinem pisum, aliae fabam, non paucae acinum medio-rem tunc; omnes prope rotundae; folliculus illorum erat membrana tenuis, pellucida, omnes continebant liquorem pellucidum solum, multae simul corpus concretum, album, oblongum, vermiforme, consistens casci recentis, magnitudine varium, majora prope ad sem. fecales accesserunt. Eodem tempore ex macello obtinui vesiculam billatam bubalam planè monstrosam: duabus palmis cum portione ductus cystici longioris latitudine inaequalis; versus ductum uncinatus lateri, in medio angustior aliquotque; posita sursum laetior, ad latum habuit nodos aliquot; quoniam quidem erat magnitudine avellanae, aliae quoque majores & in extremitate laterali corpus quasi turbulatum apparuit; juglandem majus, hepatis insculptum, aliud in ipso apice paulo minus: ductus cysticus amplius latine induratus fuit, facile admisit penam asinerum; effluxit adhuc bilis viscidissima pallide flavescens; quamvis maximam partem vesica depleta esset; illa post istummodum pressa egrediebatur humor turbidus & viscidus quoque ductu & vesica diffusa ad corpus turbulatum tunica undique crassior decolpo naturali & alibi crassitie parvi digiti; densa, ligamenti instar scisso difficilis, magis membranosa & tenuior in corpore rubinato & ultimo apice: trans istummodum duo corpora fungosa inaequalia, mollia, siccibus majora parti hepatis respicienti lateri basi adnata, similia carni luxuriant ex parte nervae exulceratae extremitate, albuma, molle, albicans in apice occurrunt magnitudine avellanae dimidiatae, etiam versus hepatis intus folliculo accretum noduli laterales erant folliculi bilis viscida pleni. Contenta sua alia breviora, alia longiora via in vesicam fundentia ostentis satis parvis, non procul a vesicula billata media tumorem in portione hepatis cum illa abscessum inveni, majorem nuce moschata, carus erat, in crustatissimus intus substantia tenui seu ossa, seu calculeosa, pro ut ductu bilioso hepatis copius huiusmodi abundantes reperi. Ex hoc tumore nullus exitus vel ad vesicam, vel aliorum patebat; continebat amaram obscure rubentem viscidam; in quam vermes illi tandem abeunt, si unum alterumve diem reponantur. Denique cum in sanguine reperi faceret vermes, ut loco citato Exc. Paulinus memorat, quidni etiam illorum ovula in eo occurrat possent certe horum progenies videntur esse Sytones, vermes sub cuti in cervis nascentes, ubi diu latitant, antequam illam perforent; Item detraculi Incolis Guineae famulantes, de quibus existit curiosum & eruditissimum aeternaque memoria dignissimum scriptum Exc. D. Georgii Hieronymi Welckii p. m. de Vena Medin. Non possum non his subnectere quae de his vermibus vidi & a sise digno audivi: Anno 1652. d. 29. Dec. Viatorum convegit D. Antonium Crommum Chirurgum peritissimum, receniet ex India Orientali & Guineae rediens, qui loca his adiit & in illis diu morabatur, uno sexenni, altero quinquenni steterat: admodum cicatricibus, facies inflata ex flavo prope pallida videns, pedes subnamidi, totus languidus: duos adhuc lupos generis denculicos sub cute eunivertit, unum in ubi sinistra parte externa juxta popliteum, alterum sub

mallicolo externo in pede dextro, in utroque loco cutim vermibus perforavit ac penetrauit fides instat: pro- pendit postea illorum uncias circiter duas longitudo: quae bilandissime tractavit, nam cum non ita pedem tardioris extensionis penetrauit in cute dextro frustulum violenter attraxisset & avulsisset à reliquo vermibus corpore sexvismos dolores peperit superites postea, ut quatuor Septimanis ipsi decumbendum fuisse cum vigilis continuis & siti intensissima, quam non nisi aqua fontana compescere licuit: monstravit frustulum extractum siccum duas speichmas longum, figura & colore simile fidi tenusior chelis, sed admodum fragile. Retulit sepiissime per aliquot menses, aliquando etiam annos sub cute delitescere absque magna molestia & solummodo sensu separantis animalis sub illa detenti, prodeire & dolorem nullum excitare vel exiguum, nisi mom aut tactu fortiore, aut percussione irritentur, tunc enim crudelissimos cruciatus, arthriticos superantes, efficere: aliquando tumorem concolorem conspici: addidit postquam diu delinere, sponte fere exitum illos moliri, quandoque progressa inflammatione dolorifica, in ejus medio vesicula obortitur, quae tunc sensum ac sensum emergat, donec torus quilibet elabatur, protuberantes statim emori & sensum exiccat, portione sub cute superstitie viva manente, unde sepi dolores protinus excitantur, si tractu irritentur. Exitum promovit vesicula marantibus impositis. Ratissime sub cuti emori observavit: sustinens quoque inunctionibus mercurialibus. Aliquot seculis cadaveribus vidi vermes istos aliquot vicibus tendines & nervos circumdare: obtinuit quosdam unas duas longos fuisse. Persuasi erant vermes hos produci ab aëre insaluberrimo. Angolae imprimis, quia Generalis quidam Bravus se ab hac peste immunitem praestare nequit, quamvis nullo alio cibo aut potu usus fuerit, quam illo quem ex Belgio secum sumperat. Quomodo cumque se res habeat necessum tamen est horum quoque vermium ovula, prius massae sanguinea permixta fuisse, quia non nisi per vasa sanguifera ad partes tendinosas & nervas sub cute deportari poterant nam perforasse illam fortis histotilis tum horum, tum aliorum vermium subcutaneorum penitus repugnat. Et, qui negaret tales sub cute cervorum nasci merito se habebat venatorum exponeret. Et quidni ovula & semina vermium ad ventriculam & intestina penetrauit vasorum osula chylum seu imbibentia, seu admittentia subissent, cum per vias plurimum angustiores in plantis, sc. in herbis, fructibus & arboribus per fibrillas radicum caudicum cauliumque & pediculos ad folia & fructus penetrant? nam in gallis quercum, in tuberculis veluti verrucosis follicum, in avellanis, prunis damascenis, cerasis, imprimis nigris, aliisque fructibus saepe reperiuntur vermiculi, licet foris nullum fortamen conspiciatur, nisi quod ipsi rodendo ab interioribus ad exteriora, adustiores & robustiores facti partitint. Illos ab e'ementorum, aut aromorum quomodocumque figurarum seu dubio, seu remanentia concutit non magis mecum natos credet quam mores ex sentina navium aut in vase ligneo indolis sudore humano imbutis impleto, si modo alias nimis credulus murem culto anatomico vel fenum subjecerit unquam: propriis oculis usurpare licet in utroque sexu affabrem fabricam omnium organorum inservientium chylicationi, sanguificationi, sensibus & moribus non minus stupendam quam in bove etiamque in abjectissimo animali, Creatoris O M. omnipotentiam, sapientiam & bonitatem admirabunt. Vermium in gallis & fructibus generationem nullo modo equivocam, sed vere univocam esse evincunt constans illorum similitudo singularis anelis conspicua: Illos generat ab illa ipsa anima, aut virtute naturali quae fructus & plantae producantur,



si dicatur, Nob. D. Redi exiguum in Philosophia peccatum reputat & seculo ridet axioma Scholasticum à consuetudine nobili posse negantium produci effectum nobilitatem; malo tamen sentire cum Exc. D. Philipp Jacob, Hartmanno in Exercitat. de generat. Mineralium vegetabilium & Animalium in aere c. 4. in Append. ad Dec. II. Ann. 7. atque etiam nostrae sententiae favere videntur experientia ipsius D. Redi circa generationem Insector. annotata: nam saepius periculo facto observavit nullos vermes in carnibus & piscibus genitos, si accessum muscatum, & alas ovula sua huc deponentium, si studiosè cavit. Taceo minutissimum acutorum genus vermium & aliorum Jaspideum atrodentium, de quibus videatur lepidam epigramma Memor. Sachsan. c. 34. insertum ab Exc. D. Joh. Dan. Majore: Item ceram deapacentium; Hi licet minutissimi sint & propè visum effugiant, adolescent tamen & se, procul dubio per ovula multiplicant, perque microscopia animalia verè esse conspiciuntur, ut Nyssus, sensamina, quas Hippoc. l. 3. aph. 21. inter morbos æstivos numerat, non secus ac pulicem, pedicellum, & pedicellotum, ut vocat Nic. Perott. in Comm. Cop. ovula ad maturitatem perducta verè animalia fieri cum molestia multi experientur; ab acaris forte derivandi tædines, rines, cimices, blattæ similesque librorum & lignorum pestes.

VI. Quoniam Nauta esset, præ reliquis cibis quamvis laurioris fortunæ noster, alisque pro lubitu potiri posset, pane delectabatur illumque sicum copiosè avide ingessit, nostri hanc in victu errori verminationis tantæ culpam imputassent. Hanc opinionem suffragari videtur proverbium, quod etiam in multorum Medicorum ore est, omnis repletio mala est panis autem pessima: quod Curio in exegezi ad 24. cap. scholæ Salemit. derivare conatur ex Avicenna. Lib. I. Fen. 3. Tr. 2. cap. 5. Venet. Edit. 1553. scire debes, quod impedimentum panis; cum non digeritur, est multum, sed carnis nutrimentum, cum non digeritur, est minus hoc; quem locum Plemp. Canon. Med. l. 3. c. 7. transfudit: Panis dum non concoquitur, magis offendit & nocet, quam caro non cocta, ibique in Scholio ad hoc caput idem proverbium recenset. Dioscorid. l. 2. c. 107. Tritica cruda comesta Venies teretes gignere tradit Galen. 7. in 6. Epidem. 7. etiam à pane, impuro præcipue & qui legumina admista habet, quoque verminationem derivat, Celeb. Hoffmann. Apolog. pro Galen. l. 3. p. 2. l. 7. cap. 113. Revera materiam proximam verminibus dare ἀποπαις seu voracitatem panis, etiam paucissimi Beverovic. in Penu Infirmit. l. 3. cap. 11. Vidit prægnantes ex pica solo pane tritico vefcentes, verminuosas factas fuisse: Hanc proverbio Claud. Deodar. Panth. Hygiæ l. 2. cap. 4. indignatur, illudque invertit atque omnem repletionem malam, panis autem minime esse profuturum; aliter sentientes Attomastiges appellat; multa ibi de præstantia coacervat, illam esse regem omnium ciborum; illum ab omnibus ubique locorum experti, sine illo lautissimas dapes & Regum mensas pro nihilo reputari; in ciborum penuria annonæ caritatem imprimis ægrè ferre; esse medium & temperatum inter alimenta; alia citius putrescere, quibus plura alia adjungit. Clar. Buxorog. in synagog. Judaic. l. 2. p. 332. ex Thalmud. refert Panis est Medicina: Fel trihus & sexaginta morbis infestatur, quibus omnibus medetur: bucella panis & cythus vini, aut in illorum defectu Zythi aut aquæ. Quam opinionem quidem ex Judæis in vicinia nostra se fovere super affirmavit nulla ratione tamen tabilivir, ideo credidimus, quod in Thalmude existeret, licet Latio fuerit & ad extirpanda superstitione destinatus. Nob.

Schiz. de Alimentorum Fac. l. 2. cap. 1. merito quoque panem præcipuum hominis alimentum statuit: nam solum panis & per se & cum omnibus ferè alimentis comeditur: sine pane nulla esca placet: additi multi à caeco, vino, lacte, ovis, piscibus & c. abhorrent à pane, quod sciamus, nemo hominum, dummodo secunda naturæ valentiam Est enim panis ventriculo gratus, omni ætati, omnique temporis convenientis; alimenti plurimi ejusque saluberrimi & firmissimi maximeque durabilis ferax; cætera ferula, etiam lautissima & lipidissima, assiduitate & diuturnitate usus sui fastidium pariant tandem, panis nullum tamen quocidie ingeratur: Reliqua ad panis commendationem pertinentia videantur, in l. c. Meminit quidem puellæ 16. annorum ex Bruyerit depe Lib. l. 6. cap. 1. quæ neque panem neque alios cibos degustavit unquam, præter serum lactis, quod ipsum tamen vel momento panis injecto averſata est. Verum hanc puellam non magis bene valuisse, quàm juvenem, quia à primis unguliculis ad vitæ hunc non solum panem averſatus est, sed nec pulicula toleravit: veritati admodum consonum est quod apud Puellam vitium vel in gula, vel in ventriculo fuerit indigare neque, quia tristitia sine circumstantiis aliis à Bruyerino recensetur; in Juvene conieci fuisse vitium in ventriculo, quia ingesto lacte cui parum micrum panis albi intritum fuit, valde angebatur. Videatur integra historia Decad. II. Observ. 68. & scholæ. Epbeimer. Curios. German. Exc. D. Hærtod. Dec. I. Ann. 2. Observ. 144. Ephem. Cur. suppeditavit Historiam Civis Nicolspurgensis, qui per totum vitæ spatium non degustavit panem etiam famelicus, donec quarta à correptis fuerat: tunc in morbo hoc Chronico fame quidam caninâ stimulatus ante paroxysmum copiosè quidem panem devoravit, unde febris proſtrata fuit, attamen post superatam febrem postea rursus panem averſatus est: Apud hunc Civem inde magis phantasiam ineulpandam esse conficio, quæ Ventriculum, quæ forte quoque in puellâ illâ Bruyerit labe non-caruit, nam & illa quoque serum lactis averſata est postquam conspexit momentum panis ei injectum fuisse. In Juvene schol. 9. l. cap. quoque aberrationem phantasie concurrisset, Ideo quoque arbitratus, quia variorum lignorum segmenta intra os admisit, masticavit, illorum succum exfluxit & deglutivit. Sed missis panem ob morbum aliquem averſantibus: Itineraria variorum in Judicem orientalem & Americam fidem vobis faciant integra etiam gentes nullo pane vefei ex frumentis & leguminibus in farinam redactis, cum aqua depſitis & ad consistentiam formam coctis Cl. Joh. Schæfferum in Lappoon. cap. 18. ubi incolarum vitæ rationem describit, Laponibus plerisque panis & salis usum incognitum esse, ejus loco ipsi esse pollinem piscium & pini arboris cutimynem exsiccatorem: Ex medio verò pini cortice panis pulverem suavissimi saporis, qui loco condimenti fit. Novi plurimos Alpium Helveticarum & Rhoeticarum incolas intra mensem non raro ne micam quidem panis deglutire: Anno 1639. mense julio Athoroso Uraniorum Coriam Rhoeticorum vocatus, viam maximam partem à nive denudatâ, primum inde Urselam ad radicem montis Sancti Goethardi stram conrendi, ibi ostendi Meierum annorum prope 80. senem Vögerum adhuc in bello quod Suevicum appellavit, huc confugit, & quia pistor erat, inquilinam esse concesserunt, quod aliis etiam inagat pecuniarum summâ solutâ raro concedunt, idque propterea quia prope ad miliaria tria helvetica & amplius nullus talis ardux habitat & præcipue ob hospites

tes, panes è longinquo sæpe non sine sumptibus & periculo viis à nave oculis petendi erant : Industria sua opes acquisivit & incolarum propè ditissimus ex pistrina evasit filiusque ejus civis factus summi magistratus honores gessit Land. Ammannus remuneratus, seu pater patriæ. Dum ibi pernoctavi, quoque in victus rationem incolarum inquisivi, attestati sunt plurimis rarò contingere, ut pane possint, imprimis quia tum à milite nobis vicino commearum impediatur, quòd multi aliis cibis affecti, non agrè tulerunt in æstare Die seq. sc. 19. Jul. Comitæ Land Ammanno Eques ad montem Crispalum per viam asperam, saxosam & ad larum præcipitem propè ad milliari altam ascendi atque ad planitiem amplam perveni, ibique pastores plurimos cum armentis scilicet vaccarum, boum, equorum, caprarum, porcorum offendi, quamprimum planities hæc obherbescunt hac cum jumentis properant, quòd nunc citius, nunc tardius sit, plerumque tamen circa medium Maii, manenteque ad autumnum usque : interea vitam sustinent lacticiuiis, scilicet coagulo lactis, butyro, caseo, sero lactis, pultribus farinaceis, rarissimè pane, quorot eorum videntur Viri & adulescentes robusti, benè colorati, sine labore loca acclivia scandentes. Quamvis planities hæc jam herbida esset, multa tamen ejus jugera adhuc nive operiebantur à vastis glomeribus nivosis hæc ex altissimis jugis montium in fine veris & principio æstatis devolutis : in hac quoque erat lacus aliquot millia passuum longus, larus ad quadrantes milliaris, cuius pars retram versùs glacie tecta, per quam prævio comite ultra quadringentos passus equitavi : ex hoc lacu emerit altera pars Urse versùs meridiem properans & versùs Septentrionem effluxit rivus se jungens scaturigini Rheni anteriori, propè illam mihi dubiam reddens, nam major erat illo, qui ex scaturigine prodit : transiit aliquot pedes rivulum scaturiginis & paulò inferius tum alicubi glacie tectum, tum rapidè jam fluentem equo perneavi, brevi tamen in descensu montis, accedentibus plurimis rivis ex vicinis convallibus ad illum properantibus in flumen excrevit. Urcunque frigus vespere noctu & mane sit satis intensum, nihilominus Pastores isti cum victu suo, secus ac quispiam opinabitur, sine Valerudinis detrimento tolerant, quod idè quoque mihi magis admirandum videbatur, quia ligna ipsis deficiant & non aliis potiri possint, quam ex Rhododendris, quibus parcissimè utuntur, ceteras alias necessarias ad opera lactaria. Frigus hoc non impedit, quominus in Urse lætis abundarent præta Rhabarbaro Monachorum amplissimis foliis, ostrutio, pimpinella, sanguisorba aliisque plantis Vernalibus & æstivis : in planitie conspexi Menn, calendulam plantaginis folio, præstans traumaticum Helieborum album flore adhuc herbaceo, albo progressu temporis futuro, conyzam foliis latis & glabris præditam : auriculam urti minimam purpuream, gentianellam pulcherrimam flore ceruleam, caryophyllatam flore rozenso, silipendulam, Nappell caules & folia, sine floribus adhuc & plurimas alias plantas in transitu. Non solum autem in Alpibus Helveticis & Rheticis, sed quoque altissimorum montium incolas pane si non destitui, saltem non abundare credo, ut illorum usus quoque non quotidianus esse possit. Anno 1645. Mense Julio cum aliquot Medicis cultoribus ad montem Baldam Parvius profectus sū. Inter quos erat Dominus Christian. Bürger Dreſſidenſis, Contubernalis & amicus meus singularis, qui jam secundà vice hæc loca adiit : inter alia & præcipue à Cl. Bona quoque

notata in viculo Ferrata prope Coronam, tunc aliæ quorè diebus commorabamur apud Senem humanissimum observavi in aheno amplissimo & capacissimo ex farina frumentorum, item milio, Eumenio Saraceno, & leguminibus, effusis aqua parasse pultem densissimam & crassissimam, Polenrum vocant : quam ad linitum coctam indebant vasis ligneis amplis ad latitudinem circiter palmæ tempore pastus frustula oblonga ad uncia circiter crassiciem cultro exscindebant & lacti aut alijs iusticulo calefacto indebant ac pro pane illis vescabantur. Audivi aliquos in Sylva Martia à lignorum puratoribus pro furnis vitariis & ferrariis, imprimis à Tyrolensibus se ex farina cum butyro & panxillo æque, aut lactis pultem quoque densum & firmam coquere : bis vescuntur mane antequam ad labores se accingant & postea in medio operis sic fe gravissimis laboribus pares fieri nec se lædi à multa aqua ingesta, imò se quasi sudore dissolvere dicebant sive virium depletionem. Hæc licet affinitatem cum pane aliquam habeant, panis tamen sive fermentatus sive fermenti expertus plerumque non sunt : qui ad siccitatem usque quasi assendus est. Hæc nos sanctissimi Salvatoris nostri effatum Math. 4. v. 4. venerari jubent : Οὐκ ἐστὶν ἀντὶ τῆς σαρκὸς ἀρτοποιεῖν, ἀλλ' ἐν τῷ πνεύματι καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ. Utcunque Alpicolæ veluti credantur cibis minus ad vitam conservandam congruis, nihilominus tamen præterquam quod robustissimi & ad duos labores perferendos aptissimi deprehendantur, pridem etiam longevi reddebantur & non pauci centum annos superabant, ut legi in Vita Thomæ Plateri Vallesij, Patris Felicis Celeberrimi illius Medici : in qua scriptor memorat multorum vitam decurram fuisse in Patria nostra postquam per Confederationem quidam divites facti levius vivere ceperant. Aliquot Alpicolarum sedes patrias relinquunt, panis esui non assuetos novi, quando pluvium ingesserunt sævam Cardialgiam & ardorem stomachi passos fuisse, imò in morbos prope lethales incidisse, quod ante aliquot annos Colono prope Donelsingham cum liberis pluitibus robustissimis contigit. Utcunque verò Patriis sit : Rex alimentorum, non tamen immunitas erit à semine verminoso, à quo prope nihil sublanarium tarum est. Si corporis humani vel poros vel minutissimorum vasorum oscula fenestras, seu alij minutissimi vermiculi, aut illorum ovula subire possint, quidni penetrant quoque frumenta & legumina ? Et revera frumenta, legumina & ex his parata semine verminoso inquinata fuisse experientia nimium quàm clare testatur. Circa radices frumenti, cujus ariste nigrescunt minutissimos vermiculos rubicundos reperi : inventiuntur quandoque in ariste, in zea stigillis decussis adhuc palea tecta, unde grana atrofa prodeunt, in nudo grano maxime cælo pluvio collecto & reposito, quæ vividè facta è granariis monopolarum & feneratorum avolsisse multos testis audivi, certè curculiones hæc sæpè miserè depascunt : reperiuntur non rarò à matribus familias in farina aliquandiu decenter in loco humidiorè & minus persiliabi : in hac primùm in globulos minores ejus particule coguntur & non diu post vermiculi deprehendantur. In pane vestres reperi : fuisse non pauci milites conquestebantur jam à biennio, sive imputus fuerit, sive strum contraxerit, in pultribus Bibliopegorum imprimis ætate recondi seminum tale indeque blattas & tincas resultare in bibliothecis non sine indignatione expèrimur. In siliquis pisorum foris

integris, intus in ipsis pilis vermes repertos fuisse 1690. & 1697. à militibus in castris prope Mannheim & Frankenthal, fide dignissimi Medici apud nos confirmantur, qui thecà ablatis avolarint. Quae Voracitati nimix panis etiam purissimi adscribit, id Plater. Prae. Tr. 1. l. 2. c. 13. Carnibus Practicus celeberrimus & felicissimus attribuit. In enim ille: Infantes si carnis nimis manere videri assuecant, nec in lactis usu ipsis conveniendi diutius perseverent, facile à vermibus infestantur. Existimat namque lumbricos gigni è chylò præcipue in jejunio, ubi abundat, si portio illius vel crassior, aut veluti carnosior & pinguior, colore intestinorum din elaborata, sic formam & vitam assumens, in lumbricum unum vel plures convertantur. Consentit tamen in eo quod cum Cl. Hoffmanno credit è chylò vitioso lumbricos à calore intestinorum produci per generationem æquivocam, ille ex chylò viscido è pane copiosius ingesto, hic ex carne non bene in ventriculo subactò & in jejunia diutius subsistente.

VII. Sedes doloris præcordiorum, seu cardiacæ quoque vulgo dictæ ejusque causæ non fuit ventriculi pylorum ejusque antrum nam non erat tam vehemens, ut illa parte nervosissima afflicta & validdè constringente plerumque fieri soler: erat potius gravis & comprimens, unde quamvis illum jam circa medium Julij pateretur, neglexit, nec remediis à Medico petitis usus est, nisi fuisse Tragea grossa, quæ quoque ejus præsidium die primo nuptiarum fuit. Deinde termini hujus doloris gravantis & comprimentis ampliores erant, quam angustum spatium pylori ejusque antri, nam se extendebat ad utrumque Hypochondrium & ad Epigastrium, imò ultra regionem umbilicalem, denique præsentem etiam dolore à medio Julij ad ultimum medium Septembris suo munere fungi potuit. Causæ doloris hujus fuerunt plures, scilicet primò Vermes quibus intestinas scatebat & plures in duodeno vicinoque jejunio, qui in glomerem convoluti post mortem adhuc testabantur, hos non super genitos illorum magnitudo testabatur, deinde fluxus, nam in mense Julio cum dolore præcordiorum marmura Ventris jaogebantur, quod confirmat doloris extensio inde ad utrumque hypochondrium ad epigastrium & ultra umbilicalem regionem; fluxus autem præcipue colo inclusi videntur, quia dolor secundum coli ductum exortigebatur; D. 5. Oct. à sacculo carminativo levamen obtinuit; denique post obitum imprimis Color flatibus distensissimum apparuit. Fluxus tamen diu nulla tormina pepererunt, quia alvus quotidie aperta & adhuc 9. Oct. feces naturales excrevit, unde 5. Oct. gliscenria citò à sacculo tollebantur: recruduerunt tormina D. 12. 13. & 14. Oct. sed horum fluxus auctores non erant, verum humores acerrimi, corrupti, facibus permixti, confluentes ex ductibus pancreatis biliaribus & glandulis intestinalibus, depravatis ab inflammatione duodeni, jejuni, pancreatis aliarumque partium vicinarum, faeces enim erant granulæ, pallidæ, flavæ, nigrae, fetidissimæ, quarum accumulationem prodidit mucus tenacissimus spermali, id est cum similis cum facibus excreta, inde etiam intestina post obitum à facibus planè manda erant. Procul dubio cruciatu majores quoque erant, & gravius affligerunt, dum aluerunt necera cancris similia in illo eaque amplius roserunt. Tertiò inflammatio duodeni, jejuni & partium vicinarum, nam Incipiente febrili D. 12. & imprimis magis 18. & 30. sept. postea mense Oct. de hoc dolore querebatur, inaximè quando paroxysmi seu exacerbationes febriles Vesperti contingebant hanc ob causam 8. Oct. attactum præcordiorum non pertulit, & licet post vo-

mitum putavit se ab hoc onere liberatum vel levatum esse, nihilominus attactum recusat, præcedens vomitum inde commotum iri. Inflammationem intestinorum tenuium peritonæum respicientium, quia rutila & superficialia recentia, non diu ante obitum, ut & internam circa Pylorum & stomachum obortam existimo: causa forte harum inflammationum erat acrimonia humorum ultimis vitæ diebus sursum deorsumque rejectorum, Denique omnes accretio quoque ad dolorem hunc symptomata consiluisse patet, quia intestinis inflatis ventriculus deorsum trahebatur. Post vomitum quidem putavit se minus gravari, quin à pondere humorum intestina & ventriculus sublevari erant, unde ut penitus liberaretur Vomitorium expetiit: forsitan minus premi se videbatur, quia partes inflammatae ad sphacelum tendebant, quod factum fuisse berniosis novi ob neglectam, aut malè administratam resolutionem, intestinis jam sphacelatis, qui planè nihil amplius de torminibus conquerebantur, alvo sponte rursus aperta, uno atque altero die ante obitum. Certe duodeni & jejuni inflammationem insignem & jam ad sphacelum tendentem fuisse apparuit post obitum ex colore illorum atro rubescens flacciditate & secessu à levi tactu membranae exterioris à peritonæo oriundæ, quod non fit, nisi fortiter elixio intestino.

VIII. Tussis quæ statim post hantum Vini immaturum, æstuante corpore, incepit & postea prope semper molesta fuit, quia sicca erat, & post validos impulsus nullum spurum sequebatur, procul dubio ab aqua in cavo pectoris excitata fuit, unde à pulvere laxante serum educere 4. Oct. remisit, rediit tamen sequente die: semel quoque mitigabatur à diacodio spiculis irritantibus inde obtusis & spuro aliquantulum inspissato, attamen quoque recruduit statim. In pulmonum bronchiis nihil detinebatur, quod ad validam & inæm tussim stimulas, nam pulmones erant molles. Colore sub albo & quasi cinericio perditum: in postica tamen parte tuebant, rubor tanta iste non erat index notabilis inflammationis, nam ibi molles permanserunt & forte accessio ultimis diebus à vomitu: inflammantur semper simul indurati deprehenduntur; deinde vox semper clara mansit: nec unquam stridor inter respirandum audiebatur; denique vix fieri potuisset, quia post tot impulsus, si quicquam in bronchiis hæsisset, quin expulsum fuisset. Ex hac anastome patuit in hydrope pectoris ab aqua tussis sicca excitari posse licet nihil vel parum expiraretur, si foris aquam extima pulmonum vellicet, si ve aliquid aque fuscæ subest oscula illa, per quæ potiones valentur, aut turundæ ingressæ per tussim rejectæ fuerunt.

IX. Asthma ex improvviso ipsum D. 7. Oct. mense bora 8. invasit, nam qualis respiratio esset nemo àvertere potuit, quia post 18. Sept. nunquam amplius domo exiit aut acclivia ascendit. Ad illius tamen productionem non unam causam concurrisse anastome & in vasio ejusque duratio monent: aqua in cavitate pectoris & pericardio contenta, pulmonum concretio cum mediastino & diaphragmate ejusque adhaesio pleurae mediastinibus fibris nervis solum asthma producendum non sufficerent, etiam aqua in pericardium & cavum pectoris effusa, hac copia, quam invenimus, nam pro lubitu etiam humili sinu decumbere valuit, cum alias Hydrope pectoris affecti non possint nisi erecti spirare, imò tandem vix per momenta ipsis in lecto permanere concedatur quin id progressi temporis, antea evenisset aqua nullus dubito, quia jam scabatur sibi melius foris, quam in lecto esse. Aliquid convulsi concurrebat prope palpabile est, nam Asthma non antea provi-

sum invasit mane hora 8. & 9. Oct. duravit primus paroxysmus sex horis, cessavit duabus horis citra evacuationem, secundus duravit 24. horis atque hic fuit vehementissimus continuans per totam noctem & diem sequentem ad vespertam usque cum magna anxietate, sudore longissimo & sibilo quodam inter respirandum videbatur tunc inter inspirandum diaphragma non expendi, sed interosum quasi trahi ægerque conquererebatur sub hypochondriis aliquid transversum situm esse, quod liberum ingressum aëris ad intrinsecum pulmonum impediret & tunc attractum illius loci non tolleravit: Post breve intervallum tertius paroxysmus rediit totaque nocte ad diem 9. oct. affixit. Mitius evasit exhibita mixtura cui sp. CC. faccin. & sp. sal. Armon. n. n. additi, nox quietior & d. 10. & 11. Octobr. minus excruciat, die vero 12. 13. & 14. Oct. ad Vesperam usque plane non molestum erat, quamvis concurrentes asthmatis causæ persisterint, nullaque notabilis excretio hucusque observata fuerit, sudavit quidem largè d. 8. Oct. sed absque ullo javaminenti. Oct. aliquid sputi eiecit, verum tantillum causa tanti asthmatis reputari nequit, evenit procul dubio relaxata fibrarum pulmonicarum coarctatione, ob quam quoque sibilus sponte cessavit. Javerunt discruciantia & acrimoniam abundentia sc. sp. CC. &c. & diacodium magis quam alia expectorantia, aut evacuantia. Convulsio harum partium procul dubio nata fuit à vellicatione nervorum intercostalium & vagorum atque etiam phrenicorum, unde in inspiratione diaphragma expendi nequiebat. Irritamen forte fuerunt aqua in pectore stagnans & sanguis ad corruptionem tendens in cruribus diaphragmatis inflammatis & jam ad gangrenam vergentibus. Forte etiam tussis convulsiva fuit, quia vehementis & simul inanis fuerat ac preludium fuit gravioris pulmonum convulsioni.

X. Vomitus tandem supervenit corruptis humoribus ad ventriculum à motu inverso intestino- rum pulsus, qui primum ad vomitum stimulabantur, nec irritate desierunt, donec plenis faucibus magnam copiam humorum evomit: humores ab intestinis provenisse inde consistit: quia similes erant illis, qui per secessum eliciebantur & post obitum in cavo abdominis & intestinis adhuc redundarunt. Noto autem similes potulentis ingestis; insuper tanta copia quantum vix plures ventriculi amplissimi capere possent, eiecit partibus vicibus, multis modis quantitatem potulentorum superavit humor re-

jectus aliquot diebus assumptorum. Ex toto corpore ad intestina pravos humores conflavisse fidem fecerant humores largissimi per secessum vomitumque excreti & in cavum abdominis effusi. A violenta vomitus, Ileon ruptum fuisse ambigi nequit, quia statim post primum Vomitum totum abdomen intravit atque in cavum abdominis profusa similia erant in vicino Ileo resistantibus.

XI. Mors calamitatum finem fecit; postquam scilicet Cor non amplius sanguinem propellere valuit, non propter apoplexiam, aut influxum spirituum animalium circa nervorum exitum prohibitum, nam paulò ante obitum ipse erat, nec sitate compulsus à lecto surrexit; nec ob coagulationem sanguinis in auriculis & Ventriculis cordis, nihil enim polyposi aut concreti in his locis apparuit, imò sanguis adhuc fluxilis erat: sed ob fibrarum motum cordis efficiendum enervationem quandam, nam sublato sanguine à ventriculis & auriculis plane flaccidum erat. Ad cordis robur infringendum plures causæ concurrerunt, febris à partium internarum inflammatione suscitata quæ multum quoque de sanguinis parte magis spirituosam consumpsit, inflammationi accedente gangrena & prope sphacelo, sanguis magis depravatus fuit, quam pessime notæ fuisse non obcurè indicant ulcera rotunda Ileii prope cancroso, mali moris & jam ad sphacelum tendentia; unde nobis primo intuitu Venerei clanculum suggesti suspicionem præbuerunt & persuasissent, si alia signa ab altissimi examine nobis innotuissent. Acceleravit mortem ruptura Ileii, quæ etiam 22. hora post concussationem, Sebastiano Kutruff. int huic post 22. horam à Vomitu funesta fuit, quamvis ille ante intestini lacerationem sanus & robustus esset. Matheus Schmidt demum post 36. horam rupto intestino mortuus est prægressis convulsionibus & Vomitu sanguinis. Vigilæ, inappetentia, ingurgitatio aquæ, flagratio ejus intra pericardium, tussis vehemens & ipsa asthma enervationem cordis procul dubio multum promoverunt, ut tandem propulsando sanguinem non amplius par esset, eoque in Ventriculis stagnante penitus succubuerit. Intestina & Ventriculus post obitum à flacibus distenta permanserunt, quia forte fibræ à nimia distensione tandem omnem vim contrahendi amiserunt, ut vesicæ urina diutius retenta evenit, D. Joh. Jac. Wepferus, Miscellan. Curiosor. Ann. X. Decur. 10. 11.

## OBSERVATIO XXVII.

*Intestini Laceratio sine abdominis vulnere.*

Martinus Schmidt, famulus in Monasterio V. S. C. annorum circiter 30. Staturæ juxta, gracilis, attamen robustus, Anno 1657. d. 5. Januar. Vespertim hora circiter quinta Ebrius ex equo in terram decidit, eique laxatis habenis rectore destituti, ipso supino jacente quadrigæ vaezæ duas rotas laterales super ventrem rapiunt Transierunt illæ paulo supra pubem in hypogastrium transversum: statim assumpta evomuit. Erectus à seclis inces- sit: domum ægre delatus fuit: Creberrime vomuit & tandem stercorea; impenfessit; Verum ventriculus omnem potum, eibum & medicamenta protinus per os eiecit: inquietus admodum fuit: alvus oclusa & urina substitit. D. 6. Januar. post meridiem vocatus depre- hendi hypogastrium valde tumidum: injecto clystere parum fecum eiecit: pubi imposito sacculo ex parum pelliculis infarcto & in aqua cum paulillo aceti cocto, urinam guttatim emisit eamque subcruentam: nox inquieta & nec per momentum dormire valuit; perseve- ravit continua stimulo ad vomitum: subinde artus succutiebantur: impenfessit, frigidam expetiit. Summo mane cruribus magnam vim evomuit: subsequēbatur convulsio univer- salis & paulo post mors. Adeo ut vix tringinta sex horis post illam hanc calamitatem super- vixerit. Cadaver vespertim d. 7. Januarij aperui: ablata cuti muscutorum portio in hypoga-

strij, instar spongiæ, ichore eructo turgebat: dissecto peritoneo aqua suberuenta, non admodum copiosa occurrit: intestinum ileon in parte dextra rubebat ejusque portio ibi uncie longitudine & latitudine prope ab externa membrana denudata erat., ac si illa quasi abrafa fuisset: ibi quoque foramea inveni, vix primo intuitu pisum admissurum, ex quo prodierunt flatus, chylus & tenuiora excrementa, presso intestino, aliquot in locis ilei portiones sanguine suffusæ erant, quas scilicet rotarum impetus assecutus est: verum rubor iste superficialius fuit. Vesica integra quidem erat, sed contracta, erassa, rugosa, atrorubescens, continerebat urinam suberuentam, Ureteres ambo integri quoque in ventriculo illiusque cœli nullus labes observabatur.

**I.** Exemplum hic quoque præbet integra cute cæterisque integumentis abdominis non laceratis, intestinis à vi forissecus illara rumpi posse, quod eò citius fit, si intestina flatibus aliisque contentis distenta sint: & quidem citius à tali corpore obtuso & gravi, quàm quandoque à gladio, creditur enim convexam & lubricam intestinorum superficiem non raro declinare ejus cupidem.

**II.** Vulnere exiguo ilei, antequam inflammatio accessit, motus intestinorum inversus isque vehementissimus supervenit, nam statim vomuit continuavitque ferè ad ultimum haliem ut tandem magnam copiam sanguinis evomerit; succussio artuum convulsiva eidem vulnere partis nervosæ attribuenda est & forte etiam convulsio universalis, cum observatum fuerit, plures utriusque sexus aliquot libras, citra tale symptom. superveniens evomuisse.

**III.** Rubor aliquarum partium & contusio nequiquam talia symptomata peperisset. Ante aliquot annos Fenestarius quidam homo statura brevis & macilentus Telonarium quendam in vicinia nostra multivariis injuriis affectus; ultra bienniam hic alto corde dolorem pressum, cum vero hoc elapso tempo-

re Fenestarium in sylva offendisset nihil tale metuentem amplius, Telonarius jussit ut sponte facinam vitriariam deponeret atque priapo tauro, quem vindictæ causa in promptis habuit, comprehensum brachio primum à nucha ad Talam, hinc à jugulo ad malleolos usque fortiter percussit, ut vix inter ullam atque alteram vibicem spatium digiti latitudine superesset, ab hujus confictus loco domum ivit quæ circiter dimidium milliare inde distabat: altero die à Magistratu loci vocatus in lecto decubuum inveni conquerentem imprimis de Abdominis & pectoris doloribus; cruenta manxit, per alvum egressit, & rufi rejecti, paucis remediis usque negligenter sumptis convaleuit. Non contentus hac paterna castigatione, ut illam appellavit Telonarius, in jus vocatus, nequitias suis perrexit effectique ut carnificis castigationem infamem Fenestarius experiri debuerit; hoc pernicioso bello sæviente frequentissime audiuntur minæ de plagis non triginta novem inferendis, ut consueverat in populo Dei ferri, sed centumjimo ducentis impingendis idque non loris, sed fustibus, Turcico more, quas æque infames ac fontes perpetiuntur: novi aliquot has plagas citra vitæ jacturam sustinuisse. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XXVIII.

*Abdominis vulnus penetrans sine læsione ventriculi & intestinorum.*

**I.** De M. Juvenis sanus & robustus, annorum circiter 20. Faber Lignarius, dum per rimam januz bifidæ non bene clausæ corpore incurvo aliquantulum prospectat à W.B. in parte sinistra epigastrii sub cartilagine ensiformi nudo gladio vulneratur, ejus cuspidem ad interiora penetrante d. 10. Oct. 1555. citra profusionem notabilem cruoris ex vulnere, statim assumta evomuit, vehementer angebatur, subinde singultit, doluerunt hypochondria: quando singultiebat in toto corpore succutiebatur & diaphragma convelli videbatur. Nullo remedio vires labantes rescipi poterant. Die 11. Oct. Vesperti hora 5. sc. hora 17. post illatum vulnus mortuus est. Cadavere aperto reperi præsentibus aliquot Chirurgis lobum sinistram hepatis perfossum, renis dextri superficiem secundum longitudinem fauciâ, & ac si ictum, gladio jam in abdomen adacto, homicida iterasset, cuspidem sub Epate in dextro latere super cava diaphragma transisse & dextri Lobi partem imam fauciâsse atque inter costam 7. & 8. pulmonum substituisse nec cutim penetrasse, in abdomine multum sanguinis turbidi & quasi lutulenti extravasati occurrit; in cavo pectoris redundavit sanguis splendide rubescens. Post diligentem inquisitionem cum Chirurgis nullum vel in intestinis vel ventriculo vulnus deprehendere potui: unde aperto abdomine nullus factor percipiebatur, qualis alias eminus stantium quoque nares ferire solet.

**I.** Ex hoc casu non obscure patet ventriculum & intestina quandoque declinare cuspidem ensium seu ob lubricitatem seu consistentiam molliorem: nam à vulnere epigastrii sinistro inflicto vix fieri potuit, quia in progressu inde ad renem dextrum ventriculum & unam alteramve intestinorum portionem cuspidem attigerit; eoque magis quia post compositionem ventriculus & intestina procul dubio turgentiora quoque fuerunt.

**II.** Sanguis abdominis turbidus, luculentus & aliquomodo cineritius quasi particulis permixtus apparuit ob chylum ei confusum, non ex dissolis venis mesentericis, quæ sanguinem cum aliis venis similem, quantum hactenus observavi continent, nec ex receptaculo chyli, quia cuspidem illud non attingit, sed ob vasa chylosa majora & plura facia.

**III.** Vulnus simpliciter & per se ab amplissimo nostro

polstro magistrum iussus, lechiferum pronunciari. *Ibidem.* ob hæmorrhagiam nulla arte medicabilem. *Iam*

## OBSERVATIO XXIX.

*De gravissimo capitis vulnere per cranium, meninges ad ipsum cerebrum usque penetrante.*

**M**irum est ipsam palladis sedem, arcem animi, & nobilissimarum functionum domicilium, caput, sat validis, licet integumentis galeaque robustissima in adultis probe sit munitum, ab externis tamen injuriis sæpe peti, quotidiana docent exempla, Tantis enim quandoque ferientis impetus instrumentique violentia est, ut capitis haud raro periculum subeat ractus infelicititer homo. Hujus rei notabile mihi sub ætatis principium currentis anni dedit exemplum in puero sexenni Bistricij, pago urbi Witembergenfi admodum vicino, qui cum baculum humo attolleret, ab equo graviter feriebatur in anteriori capitis parte, jumentorum eura in pascuis à patentibus habere jussus, ut statim in terram concideret animo deficiens biliosaque vomens. Alij, qui præsentem aderant pueri, socium in terrâ prostratum & insignem hæmorrhagiam videntes deserunt, matricque dicunt, ut exemplo filio subveniret semivivo. Nuntio hoc ex sinistro perterrita mater advolat, lechaliter sacrum domum ducit, & sanguinis grumos vulnere & capillatæ parti insidentes lotura vini calidi emollire tentat, sed inter lavandum experitur aliquam cerebri particulam eandem rem vasque fundo adhærentem abscidisse, & hiatus illum prægrandem in cranio, de quo divuli sanguinis denuo spargi experant. Vocabatur Chirurgus, ut operam suam perquam necessariam hoc in casu commodaret, qui mox adveniens caput à pilis liberat, & hæmorrhagiam tanquam Symptoma maximè urgens capitis lintæis balsamo peruviano & syrupo rosato perfusus compescit, capitiq; fomentis calidis ulterius prospicit; post deligationem puer mox ad se rediit, & melius se habere visus est, cibum à matre petens. Tercio die post ipse cum Chirurgo accedo, & dextrum bregmaticum os cum ossis frontis parte, indicis digiti longitudo & latitudine fissum & fractum animadverto, ut laceram subius duram matrem cerebrique corticem anteriorem probe cerneremus. Hanc fissuram necessario futuram coronalem traxisse & in frontis osse terminatam autopsia discit. In altera contusionis extremitate pulsus (quem meningi potius quam cerebro adscribendum puto) manifestè conspici poterat digitoque explorari celer admodum, & symptomaticis febribus omnibus familiaris, comitem habens sitim valde molestantem, hæcenus non amplius vomuit, verum ab illo tempore ex quo animum iterum collegit, admodum propensus ad somnum fuit. Omnes quoque totum temporis eramus præsentem, oculis rite discernere potuit & cum ratione loqui dextrum oculum, in qua parte quoque vulnus, vix ac ne vix quidem apertum servare valuit. A vulnere usque ad ossa temporum & incisuram temporalem tumida cernebatur cutis, ac inflammata, ita ut non absque molestia tactum digiti sustineret. Semper serum quoddam extravasatum, dilate rubicundum, eo ex loco, ubi arterias vehementer pulsare diximus, ob vasorum scilicet arteriorum aperturas immediate propelli oculis libavimus, quando operas Chirurgus ministrabat suas idem ille quando hiantia Cranii ossa ad se invicem adducere volebat, majorem dolorem ægro causabatur, & serum magis stillabat. Plura circa vulnus & partes subjacentes utpote cranium, meninges & cerebrum rimari non permittebat doloris vehementia, & sanguinis stillicidium majus indemetuendum, ut ut statim ossis cranij defectum aut ejus ad interiora cerebri violenter adacti partem observaremus, quam etiam tollere dum temporis maxime studebamus.

Vulnere dicto balsamo de peru cum syrupo rosato adhuc prospicit, & diffracta ossa opem emplastri glutinatorij quodammodo continere laborat Chirurgus; vulnere tandem superimponit Emplastrum de betonica, & huic nodulum herbis cephalicis variis instructum vino quo incoctum tepide superinducit. Bis de die spirit. Bezoard. Buffii aliquot guttulas in potu calido propinat, & pro præservando à peiori incommodo (quod subsequi haut raro solet) pulverem Marchionis, specifice cephalico Michaël. & C. C. philos. præparato junctum ipse exhibet, quoniam sumus verebantur parentes egeni.

Puer hic octavo demum die ab inflicto vulnere satis concessit, ad ultimam fere horam usque mente constans. A Chirurgo ob meam t. t. absentiam sequentia habeo, proclivior ad somnum quotidie fuit, donec tandem motus convulsivi somno obrepentes solum vix abrupterunt filiole vigiliam exhausto. Depressum bregmaticum os elevatorio attollere & ad pristinum statum reducere conatus fuit Chirurgus, sed nullo instrumento commode & absque insigni patientis dolore fieri potuit. Post mortem videbantur ossa hæc capitis fracta ex altera parte ita depressa & in cerebri corticem reclinata, ut cerebrum in se quasi absconderet, ejus particu-

tiulam quoque defuisse excell. Dn. D. Varterus, sectioni praesens mihi asseruerat. Multum feri rubicundi fluctuaret in opposita vulnere parte scilicet qua somnum ducere semper cogebatur. Dura mater jam tum nigricans apparuit & lacera per totum fracturæ cranij tractum. In ventriculis cerebri ichor quidam flavescens occurrat. Plura quæ historiam nostram magis dilucidare possent ab aliis non habeo, ex dictis tamen æquus observationis mex censor, ut confido, vulnere gravitatem ejus lethaliatē tantum non inferentem satis clarè perspicia.

*Dom. Georg. Frider. Franci de Frankenu, Miscellaneor. Curiosor. Dec. iij. A. j.*

## OBSERVATIO XXX.

## De Liene rupto.

**N**unquam satis mirari possum, quoties mihi occurrit absurda illa & plena periculi Chirurgia in Scirrho lienis, vitia cuius nominis, cui multi fidebant Patavij, quam nominabat splenem excindere, aut splenis excisionem, ejus meminit Fab. ab Aquapend. de curat. Chirurg. p. 248. ponebat chartam supra Lienem induratum, & supra chartam aciem securis, tum malleo securim percussit validè, & dimisit patientes velut sanatos; post plurimos ita tractatos, tandem malè cessit cura, nam uno ictu & abdomen & Lienem & vitæ filum præcidit. Mirum sæpius factum non fuisse, valdè enim tenella est membrana Lienis, ita ut levi bacilli ictu ruptam referat Tulpus lib. 11. obs. 29. accidit anno 1684. circa initium Decembris ut uxor eum marito aliquot saccos in inferiorem domus forniciem portando, impar ponderi una cum sacco in gradibus caderet, omneque frumentum effunderet, fuscus maritus graviter ipsam objurgavit, à verberibus tamen, quibus aliàs non insequens erat, abstinuit. Ascendens vicinis suis conquesta uxor se graviter impigisse in sinistram latus, ac dolorem ibi sentire, hoc tamē non obstante incipit ad pinsendum panem farinam subigere, maritus interim rixas & jurgia continuat, quæ etiam vicinæ mulieres audivere. D repente maritus aperit januam elamar ipsis, ut intrent, videant quid sit isti bestiz forte temulentæ. Accurrunt illæ, deprehendunt feminam agonizantem sine loquela, & post aliquot suspiria expirantem. Perterritus maritus eum potuisset fugere, nec pedem movit, in eo perseverans, tantum intta verba mansisse liem, ad verbera non fuisse devēntum. Altera die cadaver apertum me præsentē, perlustratum extrinse totum corpus, utrum aliquod signum plagæ appareret, sed cutis naturaliter sine vibice aut livore deprehensa, venter verò horrendum in modum tumeat. Tegumentis remotis, tota capacitas abdominis plena inventa sanguine grumoso & ichoroso, quo evacuatō, & intestinis ad latus repositis, Lien fat magnus (laborabat enim ut adstantes referebant Scirrhus Lienis) aspectui se obtulit, in gibba parte secundum longitudinem disruptum unde ista effusio sanguinis & mors. Examinatus maritus constanter negavit se ipsam vel baculo vel manibus percussisse. Hinc conclusum ex lapsu forte aliquam læsionem aut rimam parvam acquisivisse quæ valida farinæ subactione aucta & dilata sanguinis profusionem & consequenter mortem intulit. Ita autem suit omnis extravasatus sanguis per istam Lienis fissuram, ut in trunco venæ cavæ cruralibus &c. negutula remanserit. *D. Caroli Raygeri, Miscellan. Curiosorum Dec. iij. Ann. ii.*

**L**ienem excindi posse frequens satis in animalibus experimentum comprobavit, illudque nosmet ipsi non semel perfecimus in canibus. Ac sanè aliud est corpus ipsum lienis lacerare, idē quo Auctor noster Clariss. aliud integrum viscus constricis prius aptè vasis, rescare; hic quippe hæmorrhagia omnis præcavetur, illic verò aliis cohiberi non potest quàm per extirpationem. Itaque si quid remedium, in ictu lienem findente, qualis ab Autore descri-

buit, haberi potest, illud omne in prompta & certa hypochondrij sinistri apertione, lienis rupi extractione, vasorum colligatione, ac juxta ligaturam sectione positum erit. Verum præterquam quod, de affectione visceris in tali casu non ita facillè constat, operatio etiam ipsa in hominibus non rectè modo peragitur ac in animalibus, quantumcumque de ea formidè perfecta, aliquid enarrent Ephemerides Anglicæ ac aliæ.

## OBSERVATIO XXXI.

*De insudita mortis Causa: Scilicet à disruptione Lienis & vasorum quorundam præcipuorum ex baculi ictu.*

**N**obilis quidam simulō suo, viginti annos, bene pasto & potō, succensens, remoberulino effero, duos circiter digitos crasso, ejus sinistram hypochondrium binis periculis; qui furorē domini effugiens, domum se confert, statimque circa cor validas constrictiones sentit, deque immensa siti conqueritur, cum je digarione & inquietudine totius corporis, brevique expirat. Convocatu sego, ut inquirerem in mortis cau-

inopinata causam omnibus apoplexiâ extinctum credentibus; inventio totum abdomen insigniter tumefactum, livoreque sinistrum latus à thorace ad plantam usque pedis tinctum, nullo, ne minimo quidem vulnere conspicuo, postquam diligentissimè inquisiveram, an fractura quædam costarum vel spinæ ipsius adesset, nihilque observare poteram, abdomen apertum, ubi pleno impetu magna vis sanguinis coagulati effluebat, statimque Lien, tam in convexâ quàm ad hanc concavâ parte laceratus, apparuit, senioris autem intestinis, vena cava rupta, arteria verò magna q. tribus unguibus discerpta fuisset, conspiciebantur. Obstupui internam læsionem, mirarique non satis potui, serum tam diu vivere potuisse, cum uno q. momento eum omnem sanguinem effudisse in cavitatem abdominalis mihi persuadeam. Stupeada eò magis hæc vasorum laceratio est, cum eadem spinâ dorsi obvallata sit. Antemidis plenisque intestinis oper istum concussis, (ceu sit in resonitu crantij) discepta fuerint hæc vasa, alijs dijudicandum relinquo. Credo tamen subesse aliquid & Divi, nemineque divinam, Ancillæ cuiusdam sanguinem ultimam esse, quam famulus hic ante quadrantes anni istu Sclopeti manualis profoderat, nec debitas ob id luerat pœnas. Cæterum abstinui ab apertione Thoracis & capitis cum nil magis lethale me inventurum crederem: *Dum. Samuelis Grassij, Miscellaneor. Curiosorum Dec. iij. Ann. ij.*

## OBSERVATIO XXXII.

Capitis Vulnus ingens.

Subjungitur historia.

De Musculorum dorsi ex globulo sclopeti ictu, lethali.

**M**emoratu digna est historia, quam Excellentiss. Baumgarterus Archiater & Senator Sangallensis, gloria meritisque inclyrus, IX. Cal. Jun. 1676. nobis impetivit. Ante aliquot (inquit) menses, in vicinia nostrâ, quidam ex illo hominum genere, quorum civilitatem expertus Amplissimus vester Consul, à conterraneo teimulento, ancipiti gladio pluribus in locis vulneratus, brachium amputatum, aliquot in capite vulnera infecta: cum spes salutis affulgere jam videretur, vigesima tamen die obiit: pridie ejus die ego vocatus, vulnera satis bene sepurgantia inveni, brachij ironæus pus reddebat opimum, in sinistro tempore ingens etat vulnus, temporalis musculus dissecus: ossis tanta rima, ut trypano non opus fuerit, videbatur cerebri sive meningis motus: Vulnus minimè aridum, ut in mox morituris esse solet: convulsio aderat oppositæ pattis, quæ hic ænquam abest, dissecto enim musculo temporalium, congener solus trahit ad se maxillam inferiorem: convulsiões tamen horrendæ in ejusdem lateris artubus erant, in quarum causam, cum omnia circa vulnera bene habere viderentur, tunc penetrare non potui. Post obitum caput apertienti mihi curiâ factâ, meninx minimè erat læsa, nec corrupta, nec inflammatione correpta, nihil peris sub cranio; cerebrum adeò elegans, ut ejus Anatomiam in gratiam adstantium Medicorum & Chirurgorum exacte facere potuerim, in basi tantum ~~an~~ vas invenî, nempe sanguinis aliquot grumos à venula rupta & multum ibi flavi ichoris, ut & circa principium spinalis medullæ, usque ad quintam colli vertebam.

Anno 1678, die 10. Julii accessit nos Chirurgus quidam nostras, ut consilium & auxilium stremus Commissario cuidam Gallo robusto & carnosio, qui pone nates sclopeti globulo superiora versus ictus fuerat: foramen erat parvulum, sed profundum, quod etiam styli longioris apicem elusit. Imperata diæta, cui pro genio, exactissimè intentus fuit, primis diebus trunda, nunc ex linteo, nunc rad. gentianæ conflatâ, intra ipsos dorsi musculos inferius immissa, vulnus dilatare, materięque delitescenti patentem viam struere studuimus; ast locassum, materia inter intersticia partium & loci profunditatem firmissè impacta: incisione ulteriore, rem aggredi periculosum videbatur, ob tendinum eo loci copiam: tandem verò urgente ægroto, alea jacta fuit circumspicte, & lancetta sinus ille apertus, unde pus copiosum profluxit: quinque circiter vel sex diebus post, dum detergentibus & vulnerarijs Chirurgus strene desudat, atque ægroti res in melius vergere videbantur, stranguriâ corripitur, cui denud vocari medicamentis convenientibus vulnerarijs ac antepilepticis occurrimus, veris statim ne quid spasmodici superveniat. Postero die sub vespere deglutire cupiens non potest: loquela vicissim impedita: inde malo progrediente artus paulatim convelluntur, tandemque per intervalla totum corpus obrigescit, usque dum viribus attritis (siquidem miser nec liquida ferè nec solida assumere potuerit amplius), vigesimo die satis cessit.



Verissimum esse quod Hippocrates Sect. 5. aphorism. 2. effatur: *ἐν τῷ κρανίῳ πᾶσι τοῖς ὁστέοις* *ἡ δὲ σκληρὰ μενίσγχις*, presentibus etiam historiis evincitur, in quarum utraque mirari subit nervorum tendinumque, qui horum quasi compigmentum sunt, mutam conspersionem, equidem de musculis temporalibus constat, ipsa tamen ratio contrariæ actionis in hoc possumum consistere videtur, quod ob fibrarum parili officio destinatarum ex una parte læsionem graviolem, indeque in actione subsequenrem quietem, quæ sunt ex parte opposita se se vehementius stringere videantur: nec verò hic subsistit spasmodicus motus, quin continuata fibrarum nervearum tendinosarumque vehementi contractione, partes aliz sensumprehenduntur, ejus quidem causa ibi sanguinis grumuli potuerunt esse, cum ichoris flavi idonea quantitate fibræ ductus nervos circa basin tandem lacescentes, heic verò hand dubie membranarum tendinumque ductus nervei incisi, suum sorte calculeum adieciente impet puris aerioris in profundo stagnantis copia, & si ulterius pergere liceat, verisimile sit, quemadmodum ex levi punctura fibræ nervæ cujuscunque animalculi, fortem corrugationem subvenire animadvertimus, in ejuscemodi partium læsione, sive jam casum sive punctum illa fiat, fibrillas musculares violenter adeo contorqueri, ut non raro obtingeant, & milique motu continuato, totum corpus in damnum conjiciant, quibus sustentandis haud parum conducit, concitata spiritus animalis *ἀνὰ*, quam hinc subsistentem, virium attritio, tandemque mors necessario subsequitur. Cerebri motus olim pluribus suspectus fuit, ideo enim cranio membranisque obvallatum credebatur, ut in quiete suo munere fungeretur, at pauciores sunt hodie, qui ipsum insciantur: Dolor pulsans qui atrocis sæpe cephalalgie comes est, arteriis equidem adscribitur, talis vero existeret nunquam, nisi succussus membranarum fibrillis, id spirituum ope subsequeretur, quod menti ejusmodi dolorem concipiendiansam suppeditat, persuasumque habemus, fibrillarum harum constrictionem quæ in doloribus capitis variis, aliisque affectibus ceu grave dino, evidens est, non raro magis spasmodicam fieri posse, ut hinc cerebrum membranarum istarum & pia præcisè ratione, motum obscuriorem ineat, unde prorsus excusari non posse arbitramur, qui eodem mentium superstruunt, dum somni & vigiliarum causas alij, alij spiritus animalis commodiorem generationem insuper inde deducunt: Clariss. Majovius lib. de spiritu Nitro-aëreo: Ad spiritus, inquit, nitro-aëreos in cerebrum copia satis ampla deducendos, sanguinis arteriosi affluxus per se ipse sufficere non videtur, quapropter probabile arbitror, Meningem crassiorem cerebro circumdatam, pulsationem quandam obire, à qua se contrahente, sanguis ad cerebrum appulsus comprimitur, unde fit, quod particule nitro-aëreæ ex massa cruoris exprimantur, inque cerebrum impellantur, haud multum ab simili titu ac particule motivæ alteræ musculorum constrictione, in partes motrices coguntur: At præterquam quod pia meningis motu, ceu quæ vasa arteriosa potissimum, horumque propaggines ad cerebrum quod undiquaque investit, transmittit, ista expressio præcipue fieri deberet, arteriolarum pulsus, earumque in glandulas corticales inosculatio, pro cruoris necessarij suppeditatione sufficere posse videtur, nec parum obstat tenera corticis structura, cui ejusmodi compressio, motui cordis respondens, facile officeret: quin imo fibrillarum à spiritus nitro-aërei copiosa expansione, turgescencia, quæ lisdem pareiore numero presentibus aqualiter deficit, motum istum referte potis est. *Ioh. Jacob. Harderus in Observationibus Anatomico Practicis.*

## OBSERVATIO XXXIII

*Ex ictu, casu, capitis contusio, cerebri abscessus, apoplexia &c.*

**A**NNO 1674. Mens. Januar. Molitor quidam transhenanus, ubi prius Baccho aliquantum indulserat, de scalis ex alto decidit, domumque vectus, mox instar statuz sine sensu & motu jacuit, vomuit enormiter & sanguinis per aures eruptionem passus est, vulnere in cranio nullo apparente, die postero hinc emigravit. Cranio ex artis præscripto remoto, sanguis inter ipsum & duram matrem copiose in occipite extravasatus deprehendebatur, & tota sui mole cerebellum versus & spinalem medullam procumbere.

An. 1682. Mens. Novembr. è vivis excessit Artocreatarius quidam, qui aliquot septimanis ante, sclopeto in verso à mæferiato homine ictus, vulnus fanestum incurrit, in anteriore & superiore cranij parte, quod ad tabulam secundam usque & ultra pergebat: Biennio circiter ante obitum, dextri lateris, quod vulnere oppositum erat, paralyti affectus fuit, quam dein mors ipsa excepit: Quùm cranium removerent, hujus frustulum duræ matri infixum reperiunt, verùm intra superiores in cortice noxas: ad ventriculos autem progredientibus materia viridis, glutinosa multa, formati abscessus soboles, obviam ilicò venit, ceu isthoc benevolè nobiscum communicavit Excellenss. D. D. *Burcardus A. Vindob.*

**A**pprofitur Hippocrit. l. 2. apophlegm. paragr. XXII.  
τὰς δὲ ἐκπαλαιὰς τοῖς αἵματι, διασπιδόμενα μὴ  
καὶ τὰς ἐκταλάσαν. καὶ ὁ ἀποφλέγοντας, διὰ δὲ τοῦ  
τοῦ αἵματος πύσσας οὐκ ἐστὶν μέγαν ὅστις ἐκπαλαιό-  
μενος, ὅστις καὶ παλαιός. ταυτὸς δὲ παλιν λέγουσιν γέ-  
νηται δὲ καὶ παλιν περ ἐστίν, καὶ ἐκ τῶν χυμῶν αὐτῶν  
ἐν τούτοις ἀναίεται τῆς ἐκπαλαιᾶς συνειδήσεως δὲ τοῦ  
αὐτοῦ πύσσας αἵματος διὰ τὴν ταύτην, καὶ ἐν τούτοις αὐ-  
τῇ γένεσι, καὶ ἀλλομολία ἐκ κατεστάτων ἀποφλέγονται,  
καὶ ἐκ παλαιότητος αἵματος μὴ καὶ ἀποφλέγονται τὸ τοῦ  
ἐκταλάσαν ἐκ τῶν παλαιῶν, καὶ αὐτὸς ἐκπαλαιόχρηστος  
αὐτῷ μὴ φλογγγυμῶν καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἀποφλέγονται ἐκταλάσαν  
ἐκταλάσαν. Ex capitis vniuersibus lethaliſſima sunt,  
quæ ad cerebrum pertingunt, velut etiam antea scri-  
ptum est. Gravia sunt & huiusmodi omnia, oris nudum  
magnum, oris fractum, oris fractura &c. Ceterum  
in omnibus memorabilibus vniuersibus interrogare o-  
portet, an adhuc recentes sint plaga, an ceciderit ho-  
mo, an sopore attiore prebensus fuerit. Optimum qui-  
dem est, neque febricitare eum qui ultus habet in ca-  
pite, neque sanguinem ipsi eripisse, neque inflammatio-  
nem, aut ululum aliquem dolorem accessisse. Non  
opus est prolixius in causis horum inquirere, cerebri  
teneram structuram, vasorumque per illud di-  
spersorum multitudinem perspicuum habenti; cum  
dentatum nervorum cohorte quibus laesis, ab in-  
ferentis humoris impetu, cohibitis spiritus ratione-  
ni influxu; damnum ingens utique suboritur, quale  
sensit uterque supra memoratorum, alter quidem  
drepente, alter verò plausulis diebus post, addo,  
ut aliquando bene habere & ad pristinum incolumi-  
tatem chirurgis vediturus videretur: atque ap-  
oplecticus tandem decessit, à sanguine extravasato,  
cujus impetum in illo promovit casus terribilis &  
in altoctenis scopeti ope inflatus: Enim verò in  
confessio est sanguinem è vasīs suis gravius profu-  
lentem, cerebri substantiam sine noxâ inde perme-  
are, cum & medullares ductus facile inde comprimi-  
mantur, unde nabecula mox indicitur, & ab ejus-  
dem acrimoniâ, quæ ubi moram necit, gravior e-  
vadit. fibrille nerveæ facillime irritantur; atque  
hinc motibus epilepticis via sternatur. Meminit  
equidem Celeberr. Wesperus Exercit. d. loc. affect.  
in apoplex. Nobilis cujusdam Poloni, in quo ci-  
tra apoplexiam aut aliam graviorum symptomatum  
colluvium, non solum intra cranium & duram ma-  
trem, sed & intra hanc & duram meningem, quin  
etiam in ipsam cerebri substantiam, innoxie effusus  
fuit, ast merito inter rarissima talia ipso cum referen-  
tis, in molitore sanè vasa ita successi fuisse, ut  
oculis ipsorum protenus deficientem, si non ru-  
ptis, sanguis impetuose interiora occipitis petierit,  
ibidemque copiâ sua cerebellum & spinalem me-  
dullam compreslerit; nec enim apoplexiam immi-  
nentem casum prodixisse arbitramur, cum sanus  
isne viveret, nihilque incommodi in capite peipef-  
sus fuerit? Vini verò ingurgitationem, hinc pro-  
fus non removemus, utpote quo sanguis primùm  
exultat, & vasa velociter cum aliqua distensionē  
percurrit. unde erupturo viz faciliùs aperian-  
tur & parule manent: in ebriosis autem haic ipsi  
fluxilariter viosissimè, non raro cum acredine inducit:  
Ocellorum deficientiam vehementem, comprobat  
sanguinis ex auribus profluvium, non ex  
cavitate cranii per vis sive manifestas (quas ta-  
men pauci hæctenus tñrunt) sive occultas, illuc  
delati, quoniam si tali exitu sanguis extra vasa  
profiliens potiri potuisset, omnibus actionibus a-  
nimalibus confestim ager non fuisset defraudatus,  
utpote cum alias cranio perforato trypano, post  
cautum vel scitum, levamen sanguine emanante  
percipere soleant, sed quod vascula intra aure

conque canales, ex vehementi capitis, eiqné iteratâ allisione disrupta fuerunt: Vomitus autem irritationi meningum, quæ sanguis vel morâ ætior redditus; peperit, jure ascribimus; ventriculi membranâ nervi illis intus compatiētes: in artocreatatio malum paulatim serpsit, quod sanguis icu profluit quidem ex vasculo, sed vel minori, vel quod ilico ruptum non est, unde graviora symptomata primum tubora, cessante posteriore sanguinis impetu; aliquando mitigabantur, dum gramescens & fere omni suo numero collectus intra medullas interiores corticis subsistere, sensim putrescere & in abcessum transire cepit; tandemque copiâ & gravitate sui, fibrillas interiores scilicet medullares funiculos occupando, dextrâ præprimis lateris, eclipsim gravem induxit, ut moveri non pogerit, ulque dum versus basin sese effundendo, seu materia purulenta in ventriculis horumque confusio reperta docuit, vitâ pariter ac moru miserum omnino orbavit: utrum vomerit nec ne, probe non recordamur, quamvis videri possit, durâ meningē à crêbris infixi frustulo tictillâ, vomitum abesse non posse; nunquam tamen pertinaciter, vomuit; quod interitum fibrillâ à spasmodicâ sui constrictione; in meningibus alijsve his similibus quiescunt: ita biennium circiter est, à quo puerulus 6. circ. annor. cum circumcursitando per ædes hagaretur, ex improvviso in cellam satis profundam, de primo statim calâ tramite cecidit, nullum ferè horum ampliùs attingens: accersiti Parentes cum misello attonitos offendimus, sanguine à naribus effluente & vomitu quacunque urgente; in capite gravioris contusionis nulla indicia, dolor verò per intervalla circa ventriculum infestabat, pulsus concitator naturalis sed æqualis fuit, sis nulla, venim illico tundere animus erat, sed reluctabantur Parentes; quod juvenis esset maximè: quid periculi ex casu subsequi possit mox prædiximus, simulque ut ad sanguinis sive ex naribus, sive aures eruptionem ut & vomitum attenderent: justinus: interè: quia ægrotus soporosi instar decumbebat, præscriptis decoctis vulnerat. & pulver. ex volutilibus, cum mixturâ cochlear. propiandâ, balsamo item scrobiculo cordis siliendo, capillos abradi curavimus & præmissâ embrocatione ex ol. rosar. hyperic. & liqq. C. C. succin. sacculo ex herbis nervinis in vino rubr. decoctis caput fovere: sub noctem autem pone aures vesicatoria applicuimus: Diebus inseqq. prima symptomata remiserant, puerque ad se rediit, conquestus tum de dolore circa perinaum, & mingendi difficultate: urinas cum inspiceremus, sanguinis grumosi tanillum in fundo notavimus; cui malo cum tam externis ol. præcipuè amygd. dulc. & rosar. rum intern. emulsion. ex semin. card. benedict. hyperic. alijsve cum aq. veron. & malv. parat. addit. ocul. cancr. succurrissemus, singula in laudabili statu versari Parentes arbitrabantur, unde nec ad medicamenta cespēda, licet sedulò hortaremur, impulerant filiolum: ast paucis hunc elapsis diebus, in deterius labi, febrique quæ hæcenus aberat, prehenda cepit, cum deliratis noctu præmum, inde & interdiu magis magisque inguēntibus: Præscriptis medicamentis ex lege aptis, quid fœnelis fortis fuisse suspicemur speravimus, nec fœselis prognosis nostra, ingraverunt enim vomitus & nantes, tandemque convulsivis motibus, tristis etu adstantium spectaculo vitam finit: In o-

sanguinis ex vehementissimo casu è vasè in cerebrum proturbationem contigisse (sectione enim ob muliercularum perfidiam prohiberi fuimus) cum sopor qualiscunque, tum sanguinis è naribus profluvium, imprimis autem vomitus cruentus testari poterunt, imò & grumuli urinis innantes, quamvis enim masculinorum abdominis tum suis tendinibus compressionem (urpote cum super abdomen ceciderit) non inficiemur vomitum, & praecipuis urinandi difficultatem fovere ac parere potuisse: hæc ipsa tamen excreta de succulatione vasorum & vi illis illarum testimonium perhibent, nec valdopere refragaremur, si quis vasis stomachico labem accidisse diceret, quæ sanguinis tantillum diutius exstillaret, qui deinceps ibi putrescens motibus spasmodicis in ventriculo antam præbuerit, modò sub finem cruenta ritum evomi vidissemus vel nigricantia: substitimus ergo in fomite, quem cerebrum paulatim exceperit, nervoso generi & inde toti corpusculo extrinsum, idque artis nostræ Callosibus inculcatum cupimus, nullam in capitis vulneribus secutos nimium. Medicos Chirurgo-um esse debere, etiam si appareant alcyonia, cum interea hostis ut plurimum exitum intus adaptent, quem ubi vires semel sumpserit, eliminare difficultum est. Felicior hæc, Juvenis maturius, robustus; annorum circiter viginti, qui Anno 1676. cum Parisiis versaremur, de lecto satis alto delapsus & hinc in nosodochium *la Charité* dictum, vectus fuit, loquelà aliquandiu destitutus, & neminem adstantium cognoscens, nihil comedens nec multum bibens, multum verò dormitans: V. S. celebrata ilicò in brachio dextro, eademque iterata, tandemque arteria pene aurem dextram rufa fuit feliciter, applicatis juxta capiti, cujus capillos ilicò abradebant, remediis necessariis, nulla contusione procius conspicuâ: in statu tali per quateriduum serè subsistit, & quemvis primùm adstantes intueri, oculisque circumvagari inciperet, nihil tamen loquebatur, sed instar trunci jacebat, cum pulsu valido & æquali, nullisque sanguinis extravasati indicis usquam accedentibus: ut ele-

gantur omnino Hippocrates factus sit libr. 6. aphor. *ἐκείνους αἱ ἐνδοὶ εἰς ἵγνα φάσιν, τοὺς ἀνὰ γὰρ ἀφ᾽ αὐτῶν γὰρ οὐκ ἔστιν ἰσχυρὰ*: Mirari tamen subit, muros ejusmodi & attonitos fieri posse, citra gravius damnum, quod cerebrum accipiat: an dicendum tali in casu sanguinis nihil protrudere? solumque cerebrum succuri: at unde dormitant, loqui desistunt, & in sensibus motuque inertes sunt? idque non per unam alteramve horam, sed bideum, triduum, quateriduum: quid ni ergo ex arterioliis paniciosis vel levius debilitantibus, noxa quidem cerebro à sanguine suffundi dici possit, sed percipere copii qui hinc, imprimis ubi medicamentis suppetere tempestive seruntur, ductus medullares, vel basin cerebri, pariter obruere & opprimere non valeat, sed cum aliqua vel parte discutiatur tum per oscula ductuum venosorum potissimum resorbentur: Memoratu dignum est, quod ex. Excellentissimi Thomæ Bartholini ceht. 3. observat. Anatom. refert laudatissimus Scausensium Archiater Wepferus, de juvene viginti circiter annorum, qui ab exploso sclopeto, velut fulmine ictus corruit, domumque sensu & motu privatus, delatus fuit, taliterque decubuit quinque dierum spacio: suspicio erat per huciam penetrasse pulverem urentem ad nervorum principium ob vocem interceptant & sensus omnes sublatos, & propecta à Chirurgo perito vulnere convenientia remedia applicata fuere: exactis, quinque diebus motus aliqua rediere indicia; ægerque os pro medicamento assumendo aperire, inde se erigere, sari, contrariasque actiones obire, paulatim cepit: quod autem cum Clariss. Observat. Authore non sentimus, à nudâ spirituum perturbatione gravia hæc symptomata pullulasse, vel hoc unum efficit: quod cum naturâ suâ spiritus agilis est, nec facile subsistit, nisi causa intus hæreat, undulationem & influxum impediens: tum seeretio ejus cum sanguine arterioso accedentis, isthuc dierum spatio impedita non fuerit, unde licet primi attoniti subsistissent, recens tamen secreti influere in organa sensus motusque debuissent. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XXXIV.

*Ex casu ab alto cerebrum vulneratum putrescit, sine paralyssi, convulsione, &c.*

**V**ir quadragenario major in viciniâ nostrâ, die 24. Januarij anni 1692. è sublimiori loco procidebat, & caput in saxa quibus strata erat in quam decidebat platea, tam vehementer allidebat, ut inde non parvum vulnus effectum sit. Chirurgi adstantes eum grandem contusionem observarent incisionem per illius longitudinis majorem partem ex arte deducunt, venæ sectione etiam priùs celebrata; sed nihil amplius in diem usque 27. prædicti mensis tentare ausi sunt; hoc autem tempore cum Chirurgo dexterrimo J. J. Coudougnant advocatus, febrî satis intensâ & phrenetica quasi affectione vulnerarum laborantem reperimus; tum explorato vulnere, cum de effracto cranio nobis constitisset, dilatata quantum necessarium fuit incisione, trepanum sequenti die applicandum decrevimus, quod etiam factum cum tanta sanguinis per foramen à trepano confectum evacuatione, ut ad libras assurgeret, merumque nobis incurreret subitæ mortis tam larga hæmorrhagia, res tamen in melius abire visæ sunt postea, ita ut æger noster & cum ratione loqui, & alimenta assumere, imò febrîs remittere jam non parum inciperet, cum omnia in pectus recto die prima Februarij subitò occiperunt, eaque ipsâ die æger Caroticus obiit. Cranio eleva-

to, vidimus fracturam non tantum per totam longitudinem ossis bregmaris dextri, sed etiam ultra suturam lambdoideam ad ipsum os occipitale extendi; duram præterea & piaam meningem in toto illo cerebri hæmispherio quasi putridam, imò cerebrum ipsum infra usque ventriculos sphacelo prope affectum & prorsus diffusens observavimus. Unde mirari subit quomodo vulneratus hic in tanta cerebri, & commotione & contusione, quam corruptio prædicta subsequuta est, etiam si trepano exitum sanguini effuso pro viribus parassemus, nec paralyticum, nec convulsivum quid passus fuerit, imò à trepano applicito ad interrogata sine delirio responderit, donec parum ante fatalem horam Cerebro lethali affectus fuerit.

## OBSERVATIO XXXV.

*Grande vulnus ense lato inflictum duas costas spurias viciniores excindens, pericardium diaphragma, aliæque viscera transiciens.*

**D**ie Lunæ 23. Novembr. Anno 1691. horâ nonâ matutinâ, corpus aperiebamus juvenis robusti 23. annos nati, qui ex gravi vulnere circa undecimam vespertinam diei proxime præcedentis ipsi illaro, circa quintam matutinam occubuerat. Vulnus extus juxta sterni inferiora reperiebatur, nec ultra unciam unam longum apparebat, cum tamen tegumentis musculisque elevatis observaremus eò duas ultimas costas veras transversim in parte cartilaginea steruo vicina excindi, illudque postquam in Thoracis cavum penetrasset, pericardium eo loci quo cordis apicem cingit, transfigere, unde diaphragma petens atque in illius prope medio, non longè scilicet à parte tendineâ, perforans, hepar ad sinistras, loco duos pollices ab ipsius limbo distanti, ventriculumque illi subiectum paulò infra orificium superius, trajiciebat, atque in ipso pancreatis corpore terminabatur. Hic mirari sanè subit, quomodo ex tanto vulnere, unde hæmorrhagia ingens in thoracis & abdominis cavum, illudque præterea replens enascebatur, vita ad sex, imò septem circiter horas prorogari potuit, quomodoque vulneratus ad extremum usque balitum loqui, & ad interrogata per quam aptè respondere valuerit.

## OBSERVATIO XXXVI.

*Pulmonis vulnus lethale à sclopeto solo pulvere pyrio instructo, illatum.*

**A**dolefcentulus annos 14. natus, 30. Aprilis anni 1689. sclopeto pulvere pyrio tantum, cum charta superadjecta, instructo in thorace, à sinistris, secundum sternum vulneratur. Ipsum cum postea inviseremus, reperiebamus vulnus admodum contusum, cum multâ laceratione, obliquè ad usque pectoris cavum inter secundam ac tertiam costam penetrans. In ipso vulnere præter pulveris pyrii reliquias, farsur, imò aliquid ligni quo instruuntur globuli sagum constringentes, adveniebat. Etiam si autem primis diebus lacerum esset vulnus, non tamen multum parebat, verum postquam deciderat eschara ab ignito pulvere pyrio confecta, facile tres digitorum apices ad usque pectoris cavum admittebat. Ab læteli aër vehementius per aperturam statim ac superius posita medicamenta movebantur, cum multa suffocatione exsuffilabatur; imò per totos sex ultimos vitæ dies cum aëre serum fetidius copiose, ad libras scilicet unaquæque vice, crumpebat. Febris continuè aderat, inquietudo, spirandi difficultas, & frequentia animi deliquia. Præter ea quæ extus applicuimus, non pauca intus adhibuimus, traumatica scilicet pectoralia, ac alia quæ maxime ad rem in casu verè difficulti facere videbantur; ast in cassum omnia, siquidem postquam non uno symptomatum genere per integros decem dies variè conflictatus fuisset æger, nova tandem Maji vespertinis horis animam efflavit. Subsequenti aurorâ cum cadaver aperiremus, sinistrum pulmonis lobum in superioribus vulnere pollicem præfundo; multo livore ad duos circum se prope pollices cincto, apicemque mediæ digiti facile admittente, affectum vidimus. Unde satis superque constitit vim pulveris pyrii in carnibus aut costarum interstitiis non subsistisse, sed ad ipsum instrumentum usque respiratorium pergens, illud profundius ac lethaliter inuisse; nihil scilicet extranei cui pulmonum vulnus imputaremus in tota thoracis cavitate, nobis diligentius ac curiosius omnia rimantibus, ad vertere licuit.

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

## SECTIO IV.

## De VULNERIBVS, SPHACELO.

## OBSERVATIO I.

*Ulcera capitis manantia in infante lethalia, ob serum sub cranio suppressum. 1. In muliere, ob cervice partem exinde putrefactam. 2. Pluss occipitis nativum in infante, obstetricis erroris adscriptum. 3.*

§. I. **B**imulus Princeps Serenissimæ caesarsæ in Germania Familiæ, diarrhoea, atrophica, aliisque symptomatibus defunctus 26. ulij, 1676. exenteratus: Magnum illi, elegans candidumque cerebrum, sub quo inter cranium octo & plura cochleæria aquæ cruentæ inventa: Externa capitis ulcascula prorsus evanuerant. *In actis Med. Th. Bartholini, annor. 1674-75. & 76.*

**I**nter affectus Infantibus præsertim molestos sunt Tinea, & Scabies fera: Tinea caput, imprimis parte ipsius capillata vexare solet; in qua cutis partes variae perforantæ apparent quasi à vermibus exiguis; ex quibus foraminibus humor tenuis erumpit & effunditur instar rotis, crustas coloris varii producens: aliquando in specie capillis nocet, adeo ut scipius excidat, & lægnius vel nunquam iterum excrescant, relictis plagis in capite undosis pilis carentibus: Cum non multum differant horum affectuum causæ & curatio, simul ipsos tractabimus: In *Scabie fera*, (quæ omnes corporis partes occupare potest, quamvis frequentius faciem ac pectus, & quandoque brachia) erumpere solent primum parvæ pustulæ, hanc aut illam cutis partem obsidentes cum summo pruritu, ob quem infantes, quoties possunt unguibus partem affectam scalpunt & lacerant, & si non possint, cuius rei occurrenti faciem affricant, hinc succedente rubedine, mox & cutis extrinseque apertione, ac liquoris acris mordicique tum sanguinis effusione; quibus omnibus non minuitur sed augetur potius malum, latius nimirum serpsendos humor autem promanens varius est, aqueus, flavescens, vel magis etiam obcurus: acer, ac si gustetur aciditatis admixta notus præbens, quin ad salcedinem mariticam tendens: Idem humor tenax est ac glutinosus, partibus adherens, tandemque iterum concrevens atque crustam excitans, quæ, nisi nuda sit pars, ut facies, necesse sit quoque indulsis, quocirca sine crustæ abruptione, ac plerumque sanguinis quoque atque humoris vitiosi novæ eruptione removeri nequeunt, nisi admodum caute humectentur prius ita lintea ut crustam relinquunt sub, & curi adnatam id quod faciendum quo citius faciliusque curetur hæc scabies; sub his enim tum sponte quam arte facilius corrigitur humor noxus & acer: Præter pruritum *Ardes* deprehenditur in parte affecta summus, quem arbitror excitat à vitiosa quæ ibi coningit effervescencia & quidem calida: Expertentia enim duce compertum habeo quod tantum reperitur & dari internum naturæ acriæ, & quidem sibi subcontraria,

*Salsum, Lixivum & Acidum*, atque ab illis vel prioribus, vel minus parvis confluentibus, aut junctis excitari effervescencia & pugnam, sæpius cum calore, rarius cum frigore junctam, unde facile quis conjiciet in tali affectu alterutrum vel utrumque ponendum concludendumque Acere in corpore infan-  
tium peccans, quod ad corporis superficiem cum circulante sanguine propulsam ibidem sistat, atque hunc affectum molestum pariat: Cum igitur ex memoratis feræ istius scabiei symptomatibus, concluderem causam ipsius esse humorem acrem simulque glutinosum, iudicavi *acrimoniam* ibi peccantem probabilius putandam *acidam*, qui humor glutinosus & pituitosus se facile adjungit Acidum, & cum ipso fertur quæquaversum; cui si jungatur *salsum* lixivum, facile in statum abit: Hoc fundamento posito censeo, tum ratione acrimoniæ acide, tum ratione pituitosi glutinosi posse conducere *salia* lixiva, & imprimis blandiora vel fixa, quale in calce fixa reperitur, vel volatilia, ex omnibus animalium partibus parabilia, nec spes fessellit, nam atrox & modici genere plures curavi: Cæterum hærent illi humores Acidi acresque in corporis superficie aliquando ob pituitam glutinosam ipsis admixtam, aliquando ob aliquod in dicta vitium patratum: Videtur namque illa humorum acrum ad superficiem corporis deductio deberi imperfectæ crisi, quæ enim illi læcernantur quidem à sanguinis reliqua massa, impediuntur tamen in sua per cutis poros excretioni; aliquando ob admixtos humores glutinosos, quorum causa adherent facile circa cutem, aliquando ob ærem frigidum admissum duræ hære sudore: Hi quocunque modo in superficie hærentes amplius vitantur, quia sanguinis allabentis partem facile corrumpunt, & pruritus doloremque in partibus visis excitant, qui ab externo afflicto acrior, quatenus ex ipso alliciat, magnetis instar, partes sibi ex parte similes, quæ noxam illi foveat ac diuturnam reddunt: Rarius talia in corporis superficie mala ortu habet ab humoribus diversimode acribus, & in sanguinis massa redudantibus continue ad cutem suam effusæ propulsis,

aff. plerumque ab iisdem, licet paucis, una cum dolore delatis eo, ac ibidem subfluentibus, ampliusque mora corruptis, quin a pellentis sanguinis partem itidem corruptentibus, atque sic ad tempus longius affectum foventibus: quod confirmatur eo quod scabies illa sit contagiosa, adherente scilicet humoris acris, & plus vel minus glutinosi parte alterius tui

quam penetrat, & allabentis sanguinis lani partem corrumpit. Hoc confirmat curatio plerumque solis externis absolvenda absque ulla medicamentis internis &c. Quod de scabie hac fere dixi, de Tinea quoque capillis maxime infecta similiter dicta sunt, cum iisdem salibus volatilibus cedat sensim. De le. Boë Sylvius Append. Tr. 1. cap. 8.

§. 2. Mulieri Tinea alias tenrata, ac spiritibus lotionibus sanata, in capitis dolorem ac febrem continuum incidit, 30. post die morte succedente.

Sublato cranio media pars totius cerebri, cum membranis, (etate autem dextra) putrida laventa est, ichore citrino referta. Saxonia Præf. præf. p. 1. cap. 1.

**C**apitis lesionibus sanata] Cavendum sedulo in ejus affectus curatione ne adhibita medicamenta nullo modo cutis poros occludant, humoremque peccantem ad interiora repellant, unde plurima gravia solent excitari mala, febris, epilepsia, mors: quare in curatione dogmatica a urgenda quæ cutis poros servant apertos, quin eisdem aperiunt, quæque humorem acidum temperent, glutinosumque incendant & abstergant &c. Sylvius de le Boë L. c. Ad id vero

præsertim attendendum nam malam sit cutaneam tantum, an vero apparatus adsit morbosus: Intra quadriduum anno 1679. enecatos vidi duos pueros in Nobili familia Genevensi ab insuptione capitis ex buryro sulfo, in sartagine ad unguentum consistentiã fricti; utrique enim supervenit leucophlegmaria, dyspnoea & mors; Alias egregium est remedium & cito sanans, si præsertim cum buryro fricti sint piceculi.

§. 3. Nuper accita fui ad amicam quandam meam parturientem, cui obstetricari non licuit, eo quod extra urbem pernoctandum mihi fuisset, & injuria sic illata aliis puerperis quæ mea opera urebantur: Ideo ad alteram obstetricem eundem fuit: Postridie rogat me maritus visitare natum infantem, qui eo judice ab obstetricæ necatus credebatur; Foetus septem mensium, rursus conformatus mihi offertur, cujus caput angustum, occiput planum, depressum & lacerum, simile capiti lepotino excoriato; capilli posteriora capitis cingebant, instar coronæ cœnobitæ, capitis posterior pars scapulis annectebatur, quod aperiri jussi: Id à perito Chirurgo præstitum, qui posticam illam capitis partem, quæ excoriata videbatur, reperit tenui membrana amictum, sub qua recondebatur os occipitis inversum, superna parte deorsum spectante: Aberat omnino substantia cerebri, cujus spatium occupabant ossa solidissima & dura: Aliquot post septimanis narratum mihi puerperam illam, sex ante partum hebdomadis, fuisse à marito in regione lumborum terictum fuisse, unde deformitatis causam in fetu repetebar: Nisi dissectus fuisset, mortis causa adscripta obstetrici fuisset: Lodoica Borgheisa, alias Boursier, obstetrix Gallica. Observ. lib. 2. p. 70.

## OBSERVATIO II.

*Vlcus in pectore tumorem caustico apertum sequutum, sanguinem fundens, originem ducens à vomica in pulmonibus, ad cor usque pertingente.*

**M**ulier quædam XXIX. annorum, uxor aurifabri, quarta quarti puerperij hebdomade, 1631. paulo infra dextram claviculam, per octiduum, ingentem dolorem sensit, qui adhibito oleo anodyno cessit, descenditque in latus modo dictum infra mammam, ibique dolorem fixum, immensum, cum febre, angustia pectoris, cephalalgia, leipothimiis, aliisque pævis symptomatibus ad XIV. fere dies causavit, qui neque linimentis nec emplastris leniri potuit, donec latitudinis palmæ, infra mammam, tumor quidam exiguus absque inflammatione se manifestaret, qui caraplastmate sensim emollitus aectevit, ita ut puris latitare copiam dubium nullum fuerit; cumque dolores intensissimi dies noctesque urgerent, consilium duximus caustico potentiali naturæ imbecilliori succurrere, hostique lancinanti exitum parare, qui tanto erupit impetu, ut prima vice ad libram semis tenuis subruenti puris, ne minus singulis plage aperturis emanat: atque zgra melius statim exinde habere cœperit, haud exiguum de convalescentia spem hauriens, tertia vero die hæmorrhagia copiosa media nocte per vulnus inflictum sponte subsequuta est, quæ vix cohiberi potuit, sæpiusque eam invasit, concomitante semper dyspnœa: quæ nonnisi sanguine profuso desit; cumque vires in dies consumerentur, tandem reverteente gravissima respirandi difficultate XLVII. die morbi expiravit.

Post mortem corpus cum a periretur, ac ulcers sedes & cruentationis causa investigaretur, mira viscerum quorundam reperta fuit conformatio; Ac dissecto quidem thorace, inventus ingentem vomicam; sinistrum lobum pulmonum magna ex parte corrodentem, atque ad cordis usque substantiam perringentem, adeoque non tam dyspnœæ aliorumque symptomatum, quam hæmorrhagiæ iteratæ ipsiusque mortis causam infallibilem: Reliqua Pulmonis substantia jaspidis colorem viridicilum referebat; Cor magnum adipe copioso oblitum: In abdomine naturaliter Lienis Renumque parenchymata, ut & ventriculus, mesenterium,

uterus, conformata erant, excepto hepate, cujus moles horrenda, atque in tantum excrevit ut quatuor libras cum semisse pondere responderet, substantia scirrhusa, cui felica vesicula bile repleta appendebat: Dorsalis spina incurvata fuit, ex qua gibbus in teigo non contemnendae magnitudinis.

**L**icet ex asthma, quo sana molestabatur continuo, jecur obstructum & durius semper fuisset suspicatus, quod pondere suo diaphragma deprimeret, & liberum ejusdem motum impediret, necnon hydropem tandem sequenturum prognostico dixerim, aramen de tanta excrecentia & mole nunquam cogitare licuit, atque mors ex vomica vel haemorrh-

gia hunc praevenerit morbum. De qua sanguinis profusione quaeritur, an ex vena in pulmonibus per abscessum exesa, an vero è lochiis per venas mammarias regurgitatione ortum duxerit: mihi opinio probabilior videtur: *Observat. D. Jeremie Erhardi apud Hackstetterum Decade. x. casu x.*

## OBSERVATIO III.

*Vlcus in Ano lethale ob intestini recti exulcerationem in gangranam desinentem.*

§. 1. **H**elmstadii nuper mortuus est D. Cellarius Abbas Marienthalensis &c. Hic laboraverat antehac haemorrhoidibus, modo coecis, modo apertis, sed per aliquot menses nihil inde mali senserat: Tandem appetitus illi plane prosternebatur, & pituitosae materiae magna copia rejiciebatur, uti deinde quoque medicamentis incredibilis plane viscidæ & vitreae piruræ copia, in globulos ovi gallinaei magnitudine compacta, per alvum educabatur; Hinc quidem non parum debilitabatur, jam tamen sublatum erat malum, & appetitus viresque redire incipiebant, cum præter opinionem de acutissimo dolore circa intestinum rectum conqueri coepit: Ano aperto, speculoque non nihil dilatato, nihil videre licebat, nec anodyna injecta & ad anum apposita quicquam juvabant: Tandem nono die in clunibus, prope anum, tumor se manifestavit, qui cataplasmatibus maturantibus apposis mox emollitur & dein aperitur, exeunte materia foetidissima, maxima in copia, quæ stercore plane resecebat, uti dein etiam quoties alvus excrenenda erat, per vulnus exibat: Adhibita ulceri fuerunt mundificantia remedia, sed frustra; semper enim id nigrum foetidumque mansit, & sursum in carnem clunium latè se se propagavit, unde tandem doloribus & gangræna confectus obiit.

Post mortem inspectum vulnus, apparuitque in intestino recto apertione esse magnitudinis monetæ currentis, quæ sex grossos marianos valet: Intestinum hoc totum nigrum fuit usque ad flexionem quam supra os sacrum facit: Vesica quoque illi adhærens collo suo gangrænz principia contraxerat, unde etiam urina cum difficultate emittebatur. Ex clunibus vero utriusque lateris, magna frustra carnis nigerrimè detrahi poterant: tanta fuit ibi corruptio, ut nimirum ramdiu virum hunc vivere potuisse. *Julius Georgius Behrens in Miscell. cur. anni 1672. Observ. 181.*

De affectu huic finitimo vide *Sylvaticum* centur. liij. consil. xv. & xvj.

## OBSERVATIO IV.

*In puero Tuberculū & Vlcus cum ossium carie per triennium scatente, & Sinu ad lumbum sinistram deprehensum est jecur magnum costis agglutinatum, Abscessus juxta vertebrae dorsales superiores, citra lucem veneream.*

**P**uer annor. 10. temperiei cal. siccz, & adultæ, jam per duos annos tuberculis quibusdam laborat in diversis partibus corporis, quæ non nisi longo tempore suppurantur, & ubi rumpuntur, ulcera fiunt cum ossis corruptione: Factus est abscessus ad musculum lumbarem sinistram, quo rupto, sinus permanens deorsum vergens, in cujus extremo videtur os costæ corruptum, Habet præterea ulcera alia in digito dextræ manus, in cubito prope manum, in quibus apparent ossa corrupta: habet tuberculum ad cubitum sinistri brachij, quod & ipsum videtur continere materiam purulentam, licet parum dolorosa sit, denique sæpe hinc inde emergunt tubercula, ut uno rupto alterum succedat: Sinus vero ille qui est ad lumbum sinistram, dum stylus transmittitur, penetrat ad costam & sentitur os asperum, ita ut videatur adesse aliqua corruptio, quæ tamen videtur esse parva, quia sordes paucæ sunt & boni odoris, & caro etiam proba conspiciatur.

Hic puer nullis medicamentis potuit sanari, sed transacto triennio ab initio morbi, febre continua consumptus, orta prius convulsione ex ulcere cum ossis corruptione in calcaneo: Eo dissecto, invenimus Jecur magnum valde, costis agglutinatum validissime; quod ex natura illi contigisse paravimus, unde malus humor ossificus in Jecore genitus corrumpebat ossa in abscessibus: Præterea invenimus non magnum abscessum juxta vertebrae dorsales superiores, membranis ipsius spinæ obvolutum, in quo pus continebatur eodem non magna quantitate. Par-

**P**artes affectæ sunt externæ, quæ ad sensum apparerent, ubi sunt tubercula & ulcera: sunt etiam partes internæ, cerebrum, jecur & lien, quæ videntur laborare per essentialiam ob morbi diuturnitatem. Affectus multi sunt, interni & externi. Interni, in cerebro intemperies humida & imputris, quia non fuit expurgatum nec in utero nec extra, nam dum lactabatur, nec per ulcera capitis managantia, nec per aures nec per vomitum expurgatus est: Jecur & Lien laborabant obstructionibus, nam tumida sunt, præsertim Lien. In partibus externis affectus sunt, Tubercula oedematosa, sed participantia de phlegmone: aliqua fuerunt de natura furunculorum in facie & in collo: Præterea laborat ulceribus malignis, in quibus omnibus apparet corruptum, ut magna suspicio fuerit infectionis à Gallico morbo, sed nec pater nec

marer pueri eo laborarunt, & dum lactaretur à pluribus nutriticibus, nihil apparuit per septem annos, quod illius morbi suspicionem fecerit. Causa tantorum malorum in visceribus constituenda est, nam capitis intemperies & viscerum, excrementa multa gignunt, & pravos humores, pituitosos, melancholicos, qui transmittuntur ad partes, præsertim à capite ad glandulas & loca imbecilla, & fluxio est externa per sururas calvariae, & sensum colliguntur humores in parte, qui hounisi longo tempore ad suppurationem veniunt, unde humor pravitatem acquirit, & ossa corrodit & quasi in pulverem reducit: nam natura hujus humoris videtur à tota substantia ossibus contraria, quia illa magis afficit quam carnes & alias partes, quod etiam solet accidere in morbo Gallito, &c. *Rodericus à Fonseca Consult. Med. lib. 1. conf. 42.*

## OBSERVATIO V.

*Vlcus Tibiæ sinuosum ob subditorum ossium vitium. Spina ventosa. 1. 2. 3. Vlcera Tibiarum & Femorum à Iecoris & Lienis vitio pendencia. 4.*

§. 1. **I**nfari & inflammari ossis exemplum nuper in nostro Xenodochio habuimus in juveno 18. annorum, Daniele Cheva: Hic à sex annis gravissimum dolorem in tibia dextra habuit, multis remedijs frustra adhibitis, nos tandem levaminis & curæ gratia accessit. Cum hinc & inde ulcus sinuosum perquirimus, seabritiem ossis & teredinem ex acedine materiz & subesse animadvertimus, & ipsum os prætermodum distentum: Multa remedia quoque nostri Chirurgi frustra applicarunt, tandem consensus ut inutile membrum gladio rescinderetur.

Crure ablato & denuato, fibula integra fuit, sed connata tibiz circa malleolum tarso: Tibia p. n. crassior, à tarso ad genu magnitudine improporionare aucta erat, & veluti ex inflammatione inflata, hinc & inde carie vitata: Cum *Tarsi ossibus*, uti astragalo, calcaneo, cymbiformi connata tenaciter & immobiliter per symphysem, quasi unita à natura coaluissent, sine vestigio aliquo quod antea divisa fuissent. Cum ante hunc morbum motus constaret, & nihil obesset quin in quacumque partem permobilis esset: Periostium ubi os à pure non arrosus erat, integrum apparebat: Quatuor septimanarum spatio vulnere sanato, & forniculo in femore inuito, quo materia acris, si quæ ex internarum partium virio transmitteretur, locum & exitum haberet, ad suos ipsum dimisimus: *Martinus Bogdanns Observ. 12.*

**C**um *Tarsi ossibus* Affectus ab Arabum interpretibus ventosa Spina dictus, omnibus quidem ossibus est communis, præcipue tamen in ossibus tarsi & carpi occurrat, caries à causis externis, ita hæc corruptio ab internis: Observavimus talem in sterno, ossibus humeri, cubiti prope epiphyses, circa dorsum spinam, sæpius in carpi & tarsi ossibus, fluente ex internodijs pure, & ossa erodente. *Guerri. Rossicium. Dissert. Anat. lib. 2. cap. 47.*

*Quo materia acris, &c.* Curationem difficilem idem statuit, fomitem visceribus suppeditantibus perennem: Puella annorum xv. mendibus apparentibus ordinatæque fluentibus periodo, restituta: Aliam mendibus licet apparentibus, non habentem melius per *πυκνάλισμα*, salivationem mercuriali inunctione excitatam, & duodecim dierum spatio continuatam, feliciter restituit.

§. 2. *Ventum seu flatum spinæ*, ad mentem Arabum appellamus, affectum quem vulgus, voces invertendo, *Spinam ventosam*, & *Severinus*, nova nomenclatura, *Padaribrocæen*: Hujus cum tanravis sit ut acutissimo dolore ossa corrumpat & carie exedar, vix alia ratione perfecte sanari potest quam membri affecti amputatione: Qua 1646. 18. Aprilis Patavij, viro & puellæ pedes ablatis vidimus, & feminae cuidam digitum: E quibus unum dissectum inspeximus, ossa calcanei & metatarsi tam carie corrosa exhibentem, ut nullo negotio eutelli manubrio contereri & quasi scitari poruerint: Nec alius affectus est quem *Rondeletius* de dignor. morb. cap. 10. Tumores ossium putrescentium in pueris à morbo Italico, ob caeochæiam quandam sanguinis dispositionem, parum peritè ad eberradas referendos existimabat. *G. H. Velschius Observ. Medic. St.*

§. 3. Ante xv. præter propter menses hunc casum accidisse memini in illust. Dom. *Baronissa de Merode*, de quo varia fuerunt Medicorum judicia: Ego autem eodem conspecto protinus judicavi eundem esse, quem alias videram Neapoli apud Cl. *Severinum*: Quare, cum juxta consilium *Argelata* non posset os morbosum removeri, necesse fuit ad ultimam anechoræam, amputationem scil, tibiz nos procedere.

Qualis autem ossis ipsius constitutio postea per Anatomen innotuerit, addere non gravabor. Remota eute, quæ admodum erat propter extensionem attenuata, invenimus tendines musculorum peroneorum, ut maximum tendinem qui calcaneo est affixus, & crassiciem natu-



raliter insignem obtinet, instar chartæ alienius tenuem; solum calcis os erat affectum, atque in magnitudinem insignem adauctam, ut libræ unius cum dimidia pondas æquaret: non solum autem porosum redditum erat, sed pori illi erant repleti materia cartilaginea, qualis quoque cartilago extrinsecus os ambiabat, & cartilagini callosa materia desuper erat adnata. *I. Van. Horne microscop. §. 85.*

**I**nvenimus tendines muscularum. &c.] Hinc pertinent Gangrenodes abscissus, de quibus Severinus lib. 4. de recond. Abcessuum doct. cap. 8. A me, inquit, frequentissime in nosodochio Incurabilium, observatum gangrenas & cum necrosi abscissus lente

accessisse, atque extrinsece vitiatos infra tendines ac nervos, qui antipathia quadam, & occulta humore proprietate potius & prius quam carnes aut muscoli fuerint obfessi: *Vide ejusdem Medic. Efficacem, part. ij. cap. 22.*

§ 4. Aperui corpus ejusdem Nob. Galli hydrope mortui, in quo omnia præter hepar sana erant. quod in duratum admodum & quasi callosum, plurimisque tuberculis eeu glandulis undiqueque refertum erat: Lien quidem sanus, triplo tamen major quam alias esse solet.

In hoc corpore verum esse reperi quod Hippocrates lib. 2. Proreth. dicit, Quicumque habent splenes magnos & neque sanguinis eruptiones ipsi contingunt, neque oris graveolentiam, horum Tibia ulcera præva habent, atque ex his cicatrices nigra: Habuit enim Nobilis ille ulcera præva & cancerosa, non quidem in tibij: tantum, præsertim dextra, unum prope genus maxum spinosum & asfectuosum, sed & in utroque femore, unum similiter anfractuosum & sinuosum. *I. Rudolphus Saltzmanus Observat. Anat. pag. 37.*

**U**lcera tibiæ & varices Lienis vitio suppullulare multi attestantur: *Culpius lib. 2. observ. 30. putat signa à Hipp. & veteribus commemorata, indicare magis humoris melancholici putredinem quam Lienis magnitudinem auctam: Alia quippe bile vitia, circa lienem putrescente, vitiantur non tantum os, sed erumpunt inque varices, & caduntur sanguis præva, mihi meminere vidisse in una quartanaria, & putrida hac bile ultra*

*viginti ulcera, non mixta profunde crucibus impressa, ut si cadens ea inisset ferrum: Verum, quod istud sanguinis vitium à Lienis vitio proveniit plus satis notum: Got. Meib. in Fundam. Physiol. cap. 17. §. 27. Aclatam exemplum in culpa esse posse quoque Hepar manifestum facit, quod ut ab officio multum aberrat potest, ita. multiplicem læsionem invadere: Sic quicquid delirant Reges plebunt: Achivi.*

## OBSERVATIO VI.

*Vlcus sordidum Genu, à ligamentis, cartilaginibus, ipsisque ossibus putrilagine infectis.*

**N**obilis quidam Juvenis, robustus, optimo corporis habitu præditus, contra hostem in B lgio strenuè dimicans, ictu sclopeti ad sinistram rotulam vulnus recepit: In proximam urbem quidem deductus, ibique à Medicis & Chirurgis curatus fuit: Interim tamen ob doloris vehementiam & diurnitatem hydrarthros sequutus est, quare in patriam deportatus est: ubi per multos annos ingentes dolores & cruciatu perpeffus est: lehor enim aeris cum ad tempus fluxisset, in sordidissimum ulcus degeneravit, cum tanto dolore ut vix suffulcris incedere posset: Tandem anno 1582. D. Cosmus Slotanus præstantissimus Med. Chirurgus ad eum vocatus fuit mecum, ad quem cum pervenissemus, genu mirum in modum intumefactum, reliquum vero crus extenuatum invenimus: Genu varijs locis ulceribus sordidis scatebat, cum ossibus cariis & doloribus maximis, quidies noctesque ipsum exercebant: Hinc viscera omnia interna mirum in modum labefacta & obstrueta fuerunt: Mansit D. Slotanus apud ægrum per menses aliquot, atque eam adhibuit diligentiam ut æger non parum sublevarius fuerit, omniaque ad optatum scopum tendere videbantur, nunquam tamen integrè sanatus fuit: ob maximam enim obstructionem labefactionemque internarum partium. in vigilijs D. Michaelis obiit.

Sequenti die cum cadaver aperissem, interiora viscera omnia, præsertim Hepar, mirum in modum à naturali statu discessisse vidimus, & in vesica fellea lapidem sordidis molitæ magnitudine & figura invenimus: Genu cum inspexissemus, ligamenta, cartilagine ipsæque ossa putrilagine infecta & consumpta erant: *Fabritius Hildanus li. de Ichore & Melicria cap. 27.*

**H**ydrrarthros] Observaverat credo mecum plurimi qui magnam curandis vulneribus solent adhibere artifices, si quando fistula super fistulosum ulcus cras occupaverit, & vinculo quopiam infra vulnus caro adstringatur, cessare quidem fluxum illum humorem per vulnus perpetuo stillantis, sed quicquid infra ligaturam sit continuo intumescente: ac contra si plura vinculo sit inferior, perseverare humorum affluxum, & medicamentorum vim assiduam ista emanatione eludi, Quo sola experientia jam satis constat, humorum per vasa lymphatica eandem esse, quæ sanguinis per venas est, à circumferentia ad centrum circumgyrationem. Ac jam notum per admodum nonnullas vasis lymphaticis ines-

te valvulas recursum à centro ad extrema impeditur: Ex observatione autem h.c. advertamus Fistulositatem illam vulnere externorum, & oedematosis hydropticæque plurimas interius constitutiones, à vitio quodam lymphæ, Lymphaticorumque vasculi originem ducere *Theod. Kerkringius Obs. Anat. 9.*

*Ossa putrilagine infecta*] Ossium caries cum varijs signatur modis, quosdam nostra animadversio imprimis dignos describere institui: Humores præternaturales quavis de causa sive generali sive speciali, os penetrantes aliquando Hyperartricosi ulcerum cum ossis humiditate, aliquando Ossis cancerum, seu spinam venosam producent, affectus necessario distinguendos *Hyperartricosi ulcerosa cum ossis humidi-*

car, causa phlegma præternaturale ossis temperiem, atque duriciem auferens: Molliori huic fundamento caro insistere nequit, unde naturalem suam essentiam etiam amittit nutrimentum ipsius ex sanguine constans, in sarcoma molle spongiosumque transit: hoc sensim incrementum sumit, tandemque ulcerationem secum affert, qua tendines, ligamenta & nervi corrumpuntur, membrumque totum periculo subijcitur. Medicamentis non est quod hic aliquid laude dignum effici possit tibi persuadeas, antequam fundum, h. e. ipsam os attingeris: osse enim curato, illico & ulcus curabitur & caro naturalem induet. Incisione itaque hic opus, profunda adeo ut os ipsum in conspectum veniat: Quod si excrescentia magna concomite-

tur nimis, fiat exirpatio ejusdem vero repullulare observetur, cauterium actuale planum applicetur, habita semper ossis consideratione. *Ossis Cancris* causa humor acris, primo os corrumpens, mox periosium perforans: hic ulcus statim accedit & carnis & cutis, quod etiam curari non potest nisi prius ipsum os curaveris: Ulceris foramen valde exiguum est, la bia pallida, materia effluit tenuis, caro mollis & aliquomodo tumefacta, at minime ut in hyperfarciosi ulcerosa fieri diximus, sua sponte incre/cit. Et hic quoque sectione, sed per ossis longitudinem, usque ad ipsum os, est molienda, & mox corrigentia corruptionem applicanda. *P. Barbette Anat. Pract. l. i. c. 3.*

## OBSERVATIO VII.

*Fungosa caro ex ulcere tibia pullulans, ob foramen in osse ad medullam usque penetrans.*

**V**irgo ulcere in tibia dextra longo temporis spatio laborabat: Ex hoc autem ulcere fungosa caro adeo copiose erumpebat, ut Chirurghi aliquando illam pondere duarum librarum abscinderent: quamvis autem funditus abscissa esse videbatur, mox tamen cum impetu denuo proveniebat.

Tandem Tibia ex consilio Medicorum ad poplitem abscissa fuit: post operationem abrasa carne, & osse denudato foramen rotundum, ad medullam usque penetrans. In ipso repertum fuit: Operatio ad votum successit, sed cum cuncti ipsam evasisse sibi persuaderent, ecce fungosa caro, quæ denuo ex trunco ipso propullabat, eademque fore ut antea molestias parit: ad annos tamen circiter duos post operationem factam supervixit. *Fabritius Hildanus cent. ij. observat. 36.*

**Fungosa caro, &c.]** Fungorum in vulneribus capitulis solum mentionem faciunt Medici, Sed in alijs quoque partibus eos nasci posse ostendit *Sennertus apud Hildanum observ. 35. & 36. cent. ij.*

## OBSERVATIO VIII.

*In ijs quos Carcinoma Viceratum sustulit, sanguis adustus intravasa repertus, cum labe lecoris, illa quoque Liene.*

**L**ien non potest esse humoris melancholici sedes & vasculum, quia sanguini permixtus in nutritionem partium solidarum impenditur: Dum autem à sua natura degenerat, ut in quibusdam *Carcinomatæ ulcerato* sublati vidimus, sanguis adustus exsiccat, & in capillamenta conversus intra venas spectatur, cum insigni labe Jecoris, sed exiguo aut nullo Lienis vitio: quod certissimum est indicium Lienem humoris melancholici, sive naturalis sive contra naturam affecti non esse conceptaculum. *Riolanus Anthropogr. lib. 2. cap. 21.*

## OBSERVATIO IX.

*Fistularum pertinacia & curationis difficultas inde est, quod earum principium altissime excurrat, & fundamentum in ossibus habeant. 1. 2. Fistula in Inguine sanient imi ventris eructans. 3. In Femore orta à Lumbis. 4.*

**§. I.** **F**ilia Pictoris, Nicola! Eliæ infestata aliquandiu a cerbo lumborum dolore, incidit tandem in molestam Inguinis fistulam, quæ perenni suo cursu usque eo consumpsit tennelli corpusculi vires, ut brevi excederet è vita.

Cujus mortis causam inquisitione Anatomie, invenit evidentem cariem in costa spuria, emittentem continenter in subiectas partes tantum acrioris ichoris, ut illis erosus prodierit inde Fistula, ut longa & anfractuosa, sic eludens quameumque opem Medicam.

**§. 2.** Quam artis impotentiam non raro quoque videre est Fistulis prope anum exortis: Quarum principium excurrit nonnunquam altissime sive ad Lumbos, sive Thoracis vertebra, imo interdum ad ipsas scapulas, quas seoptula aperta vocat *Corn. Celsus*: Quibus in locis equidem non semel offendi fontem remotissimarum & immedicabilium Fistularum.

**E**Arum inaccessible caries, quo minus exploretur specillo impedit tortuosas ipsarum flexus: qui etiam remotatur clysteres eluendo ulcera dicatos: Excluditque manum exemuram os intus vitiatum: quo tamen minus mature sublato, colligitur immatura mor-

re homo, & obstat obnixe ne à Medico sanetur Fistula à remotiore carie originem trahens: Cujus oras licet fornice deducas & amplices (quod tamen ad curaneas fistulas summe utile) operam nihilominus ludes, nec pervenies unquam ad remotissimum sinuesorum

fi. num principium, à quo descendunt tot ramuli, & tam in- quentes rivuli per profundiores musculos ac tendunt, ut licet specillum vel dextrissime immittatur in tortuosam ejusmodi Fistulam, neutiquam ta-

men attingas, nedum immutet, vel tollas cariem genitum perennis ulceris causam. *N. Talsius lib. 3. Observat. 28.*

§. 3. Februar. x. 1673. in juvene viro, ex phrenitide defuncto, præsente D. Dormont, Lien inveniebamus consumptum, adeo ut nonnisi globuli, magnitudinis diversæ sese exhiberent, vasis omnibus splenicis ad dictos globulos debite excurrentibus, variè licet divisus: Globuli ipsi separati tunica tegebantur separata: Exterius omnes nigricantes, interioribus rubicundioris coloris: Ventre ipso puris saniosi foetidissimi insignis copia continebatur: Effluxerat hujus notabilis quantitas per foramen naturæ ipsius opera in inguine factum ad plures dies: Jam vero ab aliquo tempore fluxio hæc suppressa. *Gr. Blasius Observat. Med. 24. part. 1.*

§. 4. Pueri Dom. N. filio oborta est fistula in dorso, qua sponte oclusa, alia emerfit in femore: In lumbis, ad psoades musculos ulceris vestigia, unde initium ducebat Fistula. *Vide li. 3. tit. de Ventris tumore.*

**F**istularum pertinaciæ causa unde repetenda ostendunt allata exempla: Peritacissimæ & tandem tabem inferentis, exhausto totius cruore, exemplum mihi occurrit anno 1651. cum eo tempore incumberet cura Medica pauperum Gallosum advenarum, vel urbis incolarum, inter illos commissum habui quendam nomine *Bouygerie*, Prætoris Urbani Apparitorem, Virum raræ texturæ, annos circiter xxx. natum, Malæ illi, bene se habent, leviter rubebant, vino modice utebatur, in vitam temperant: Morbo prehensus utitur calcæolari ægyptiæ opera, qui antimonio exhibitio ipsum ad hypercatharsin deducit, unde vir natura debilis ad Ouci fauces compellitur: Vix recreatum, pravoque victu deinceps sustentatum, pleuropneumonia vehemens adoritur; E qua mea ope emerfit, sed supersit in pectore, sub mamma dextra,

fistula, quam præcesserat abscessus mihi excitus, quanquam universam materiam pectore contentam exhaustisse videretur libera & libè salis purulenti anacatharsis: Adeo copiosam eructabat Fistula saniem, ut ilius ocludende omne concideret consilium: Indato tenui stylo & longo, origo ejus superior esse deprehendebatur & inter musculos pectoris decessit, qua de causa alio cum aliis consilio, difficilis est fornice (quantum in eo progredi licuit) secundum longitudinem Fistulæ; ita cum ad clavículas usque factus esset progressus, nec exortus pateretur, gressus præterea ob tortuositatem non pateret amplius stylo, res naturæ committenda fuit, & usus decocti tranmarici pectoralis, hydromelitis forma præseripi, à cujus usu vitam per triennium produxit, Apparitoris officio ad ultimos utique dies functus æger.

#### OBSERVATIO X.

*Sphacelus totius corporis sequutus cordis ejusque vasa intumescationem. 1. Viriusque Tibiæ ob tumorem scirrhusum vicinam cavam descendenti. 2. Ob obstructam venam cavam. 3. Pedis dextri, ob viscerum omnium corruptelam. 4. Cruris, ob vitiatam arteriam quæ fibulam petit. 5. Crurum & Tibiarum, ob vitium Iecoris & Pancreatis. 6. Cruris, ob sinistram cordis ventriculam carne glandulosa insertam, & impeditum arteria motum. 7. Crurum & Tibiarum, ob vitium Iecoris, Pancreatis & Lienis. 8. Digitorum Pedis ob vitium Pulmonum, Cordis. 9. Humeri dextri, ob consumptionem lobii dextri Pulmonis, Cordis vitium. 10. Manus, ob sanguine cor exhaustum & Pulmones. 11. Scroli & vicinarum partium, ob vitium Mesenterii, Intestini recti. 12. Digitorum pedis, ob Pulmones sanguine tumentes, Cor exangue, sanguinem putridum in Intestinis. 13.*

§. 1. **C**ulidam febre acuta prehensio livere cœpit supercilium, & elapsis 22. horis totum corpus sphacelo prehenditur: Cor inventum duplo majus, ejusque venæ inflatæ. *Vide tit. de Febris.*

§. 2. Quidam, aliquibeno temperamento præditus & ætate integra, incidit in gangrænam utriusque tibis latente causa, nisi quod antea tibis & pedes assidue frigebant, i. gravescabant & quasi stupore tenebantur, ut usque supervenit Gangræna, nulla præcedente febre aut causa externa; ita paulo post obiit, oborto ad usque genua sphacelo.

Aperto cadavere invenimus tumorem scirrhusum circa venam cavam descendentem; nempe iatta renes, ubi hæc vena ad utramque tibiam bifurcatur: Scirrhus in magnitudinem auctus ita constricterat venam cavam & arteriam descendentes, ut nullus sanguis ad crura nutrienda & vivificanda permeare posset. *Fabritius Hildanus Tract. de Gangræna cap. 4.*

**M**ajorum articulationum luxationes sequitur atrophia, cum quia mucosæ copie obstructio nem parit atque nutritivæ distributionem impedit, tum quod caput ossis suo loco motum comprimit, vasa, prohibetque quo minus sanguis & spiritus ad partes subjectas deferantur: Quod si hujusmodi ægri ad senilem ætatem pervenerint, aut longioris morbo consistant, tandem in Gangræne discrimen veniunt, (ut & si magna sit causæ efficacia, qualis in prædicto ægro) Idem accidit obstructa vena cava, ut

ante aliquot annos observavi. *Idem ibidem.*

*Tibiæ & pedes assidue frigebant &c.* Operæ pretium erit inquirendi in rationem quomodo frigus, in malignis, venenis sphacelo &c. in extremis producat. Nemo negabit Extrema cum partibus internis æquali calore præditum, ita quædam sanguis calidæ & spiritibus illustris inoffense per arterias quæque venas dispergitur ac superfluis in venas recipitur, ad cor currit atque ad extrema recurrit, non enim aliunde quam à sanguine calent, quamprimum vero ejus af-

nam defraudantur, nec saturari neque sufficere morantur, necessario frigebunt: At verò non eadem ratione extremis partibus sanguis denegatur, culpa enim nunc deferenda est sanguini nunc. His per quas ad extrema propèstat, nunc cordi, cum primo motori, quod, dum homo vivit, indefesso labore continuo mixto sanguinem longe lateoque propellit: Deinde certum est sanguinem à corde citra ullum seclum ad extrema protendi nec calidiorem inretiri destinari, frigidior enim artibus aliisve ultimis & remotioribus impetiri: Denique attendendum esse ad illud quod per se aut per accidens sit existimo: Sanguinem primum quod attinet, cum mobile, ineptus ac datur ad minima capillamenta arteriarum & venarum transsundenda, si coaguletur intra vasa, quod in febribus malignis & peccialibus contemdit fieri *S. Pauli*: Extrema quoque frigeant si penus sanguinis nimis exhauriatur in febribus ardentibus quod fieri in causa, allave maligna si nihil comedant, neque phrenitici bibant, aut si his febribus huiusmodi & enormes superveniant, quod non raro evenire quotidie observatur, quibus accensende dejectiones pice nigiores, quæ nihil nisi cruent extravalant, diu in cavo intestinorum detentus & corruptus existunt: Nonnunquam in cordis ventriculis corpora alba, densissime compacta, & profunde ventriculorum cavernis radicibus plurimis infixæ & quasi implantata non ineptè Polypi vocata, teperiuntur, quæ tumores per cavam iussam dorsumque, & utroque ventriculo in pulmones, ac per aortam, eosque in plures furculos subdivisos emittunt, sanguinisque liberaliorem distributionem impediunt; unde illi qui huiusmodi Polypus in corde gestant, facie livefcant aut admodum pallent, in extremis levi ex causa frigeant. Extrema denique frigebunt utcumque sanguis naturaliter caleat, aut p. n. ferveat si non valida & indefessa cordis contractione propellatur, nam licet sæpe extrinsece partes sanguine abundent, nisi singulis momentis novus accedat effususque ad cor retrahatur, brevi calor sanguinis perit, & nisi protinus suppetitæ fiat, cum parte exstinguitur ac veluti emittitur. Ob varias autem causas Cordis motus vel immittitur & elanguescit, vel pene succumbit, vel inhibetur quominus contenta solita ratione propulsare valeat: Immutatur languisque evadit cordis motus potissimum ob spiritus ad astu in causa similibusque febribus dissipatos nec resstantur, propter nimiam à cibis, etiam potus in phreneticis abstinentiam, aut quia pectus ob sudores diaphoreticos, aut diarrhoeas colliquativas, febribus malignis quam familiares: Ignavior redditur cordis motus spiritibus animalibus vim hanc cordi largientibus, ut constat ex *Willis Anat. cerebri*, & *Loeweri de corde experimentis*, à narcotico suspensus, ut posito à spiritu vini event, & aliis qui opio abusi sunt: Vidi aliquot *Gangrenas*, nam cum pleno *Spachelo*, nunc incipientem intestinum, tenum iterum pedum correptos, Extremorum frigus non per horas, sed dies aliquot sustinuisse (*exemplum habui Neocoms Helvetio rum anno 1660. in viro Nobiliss. Damiano Bonlengierio, à Secretis Serenissim. Principi Henrici ab Anrelia, viro exaginario, qui ab equitatione durioris & per saltibrosa loca Enterocelen, sibi familiarem passus est, quando cum oculum esse vellet, etiam Medicis suppressis egredientes paulo post pennis luit, nam cithara à decubitu de interit: integro quatuordecim diebus fuit toto corpore marmoreo frigidus, quatuor ante obitum diebus resurgente calore*:] Quidam colica male tractata, alii enterocelen neglecta, etiam post intestinum repulsionem i præterita astare quidam post nequidum calefacientibus internis, & externis

unctionibus & infusibus fervidissimis exasperata, jam sopitis omnibus doloribus bona quæque sperantes, extrema propè gelu frigidiora tangenda præbuerunt: In pedum extremorum & tibie partē vero spachelo correpta, sed superfluo, nec ultra curam penetrante, integris musculis eorum tendinibus frigus hoc non fuit experti, inter quos erant, Rever. quidam Abbas 76. annorum, & Sereniss. quidam Princeps 78. annor. & Illustr. Comes 50. ann. qui omnes hæc ante biennium perpessi in hanc usque diem satis commode vivunt, At si profundius serpat, etiam ultimos tendinum apices in pedum digitis solum corripuisse videbatur, à frigore & vitæ decumine, maxime senes & in principio neglecto. spachelo immunes non erant: A partium fere, vel etiam penitus intermoriuarum musculis & tendonibus, non fibrille aliæve portiones solidiores in venas, sed ichores rectorpi fuerunt: Hos ut, cumque calore prope actuali privatos, non frigidus per se censendos arbitror quia febres ad ultimum habitum perdurantes, & deliria excitarunt cum fit intensissima, & quamvis deliria tandem cessant, sana loquuti sint ac composita mente adstantibus ultimum vale dixerint, non tamen perfergerit in massa sanguinea plenum signum erat, cum hæc quoque casu aut phrenitide affectis ante obitum contingant, minus tuerimur scilicet particulis igneis in profunda cæcitate per arterias carotides & vertebrales irrudentibus: Cor licet muscularum olim ab *Hippocr.* vocatum fuerit & à recentioribus quibusdam non sine ratione huius annumeretur, præter necessitatem perpetuo semovendi impositum, hoc peculiariter insuper habet, ut à quibusvis animi pathematis, & aliarum partium etiam remotissimarum doloribus ejus motus perversatur, nunc acceleretur, nunc tardetur, nunc vehementius concitetur, aliquando nunc brevis nunc longius suspendatur & plene subsistat, sc. pro ratione animi pathematum & dolorum: magis tamen à doloribus afficitur, & non raro mirre comparitur, si partes illæ affligantur quæ eorundem partium nervorum cum corde participes sunt, sc. ventriculos, intestina renes, uterus &c. cardialgiam vehementiorem non solum extremorum frigus & omnino syncope consequi in vulgus notum est: vomitus tamen præcedunt, anxietates idemque frigus: Et omnino rectus à corde compatiens, ac in motu tardante, aut illum aliquomodo suspendente Extremorum frigus derivatur, quam à dolore aut calore, instar cucurbitulæ sanguinem & calorem ab extremis ad se rapiente cum explosa attractione, postquam verus sanguinis motus innovatur, certo constat sanguinem ad quamvis partes pulsu pertingere: Nec credibile est in harum partium inflammatione tanta copia sanguinem stagnare ut extrema inde eo detraherentur, cum sæpe non multum sit sanguinis hic eundantis, & *Simurtus* erysipelas in his locis ad frigus extremorum efficiendum sufficere inquit. Nisi forte quispiam putet fibrillas nervæ, vas sanguiferis circumpectas, ob dolorem convelli, vasa angustiora reddi, ac per cavam magnam sanguinis copiam ad cor refluam intercepti: verum si hoc fieret vix partium inferiorum quæque summopere intumescerent, in primis si constructio ista convulsiva ramis perseveraret, quamdum dolor & inflammatio continuare solent; quod tamen accidere nec ipsi memorant, nec forte ab ullo animadvertum fuit, *J. Jac. Wepferus Traité de Cécité aqua. cap. 5.*

§. 3. Gangrænam accidisse obstructa vena cava, ante aliquot annos observavi. *Idem ibidem.*

§. 4. Quidam multo tempore pallidus admodum fuit, cibum potumque averfabatur, pituitam erudam cum pure vomebat, &c. Supervenit pedis unius digiti sphacelus, mox dextrum pedem gangræna occupavit, &c. Hujus omnia viscera corruptissima fuere, multo pone consistente pure, &c. *Vide lib. 3. tit. de Inappetentia.*

§. 5. In cujusdam cordis sinistro ventriculo glandulosa, sed nigrescentis carnis librz duæ reperiæ: Huic sinistri cruris gangræna obvenit, non tam ex cordis vitio, quam ex ea gangræna impedito arteriæ pulsui, ante enim aliquot annos ex sclopeti ictu vitata fuerat arteria quæ fibulam petit. *Vesalium lib. 1. cap. 5. Anatom.*

§. 6. *Thuanus* diu conqueustus de dolore colico, tandem repentina Gangræna correptus est, à pede dextro ad superiora celeriter reptante, ex decubitu serosi humoris cruræ & tibia infestantis, cum diris cruciatibus intra sex horas expiravit. In eo deprehensum Jecur induratum, & Pancreas ipsum Hepar mole adæquans. *Vide historiam lib. 3. tit. de Ventris doloribus.*

**C**eleriter reptante ] Notat *M. Amy. Severinus* lib. de Abscessibus p. m. 181. Gangrænas & cum necrosi abscessus, lente accessisse, ob vitiatos infra tendines ac nervos, qui antipathia quadam, & occultis humoris proprietate, potius & priusquam carnes aut muscoli faciant obiculi: Quæ autem ex inflamm humorum ortum habet, celerioris esse morus, ac incrementa evidentiora esse, ut patet ex exemplo alio.

§. Jacobus N. interijt ac si sphacelatum corpus esset: Ventriculi facies externa erat vermiculata; Pylorus talis & pene restrictus, facies interna corrupta & putris; gangræna erat & syderatio ventriculi. *Vide lib. 3. sect. 7. observ. 11.*

§. 8 III. *Thuanus* conquerebatur de dolore circa regionem coli & stomachalem; tandem inopina gangrænosus correptus est, à pede dextro ad superiora celeriter reptante: Jecur erat induratum, factum pituita vitrea; Pancreas maximum, scirrhum, glandulis differtum; Lien valde exilis. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

**A**d superiora celeriter reptante ] Quod de Gangræna vidit *Athanasius Kircherus* Operum lib. 9. observatione dignum: Eam nihil aliud esse stultit præter congeriem venenarum vermiculorum, qui corrodingo carnem ejus corruptionem inducant: quamobrem autem tam celeri gressu partem depouletur, id ideo esse quod ii vermiculi adeo numerosa prole pullulent, ut deprehensum sit unicum charæ albæ impositum, unius *Miserere* spatio quinquaginta alios peperisse.

§. 9. Nob. laborabat febre, dyspnœa, pectoris angustia, hæmoptysi, &c. tandem unus atque alter pedum digiti livescunt: Pulmones sanguine crassiore scatebant, indurati in extremis partibus, Cor flaccidum & exangue: Intestina sanguine putrido replebantur. *Videtis de Febribus.*

§. 10 Uxor N. à pleuritide gangræna correpta interijt: Tunica lobi dextri pulmonis superstes erat, parenchymate consumpto, Cor paucum sanguinem, atrum & exustum continebat, Pericardium pustulis exasperatum, &c. *Videtis de Exspuitione purulenta.*

§. 11 Uxor N. paulatim morbo intricato correpta est: Tandem extremitates digitorum, & tota manus paulatim sphacelo corripuntur. Cor sanguine plane exhaustum: Arteria venosa summe distenta & sero referta est; Scirrhi, pus, serum in pulmonibus, steatomata in mesenterio, &c. *Vide lib. 2. tit. de Phibisi.*

§. 12. Lustratum cadaver cæmentarij, cujus scrotum cum partibus vicinis intumuerat, nigricans, &c. Vulnus penetraverat intestinum rectum & mesenterium, cujus vasa lacerata, unde ex cruore stignante gangræna, quæ mesenterium occuparat & intestinorum partem. *Vide tit. de Vulneribus.*

§. 13. Nob. laborabat febre, dyspnœa, hæmoptysi, pectoris angustia, tandem viribus oppressis & digito uno atque altero pedum livescente obiit, &c. In pectoris cavitate serum sanguinolentum aderat; Pulmones sanguine crassiore scatebant, extremis eorum partibus nigricantibus: Cor flaccidum & pene exangue, intestina sanguine putrido plena, &c. *Vide lib. 4. tit. de Febribus.*

#### OBSERVATIO XI.

**B**rachii Gangræna ab illius epiphyssa, ubi cubitus ipsi jungitur, contusione superficiali affectam. Accidit abhinc aliquot annis ut illustris cujusdam hujus Regni Senatoris Barbitonforem domesticum remeraria lubido incessest moderandi cursum equorum: at verd ille de lapsus de curru humerum, citra luxationem ullam vehementer offendit: Applicat ipse sibi cataplasmata, & mitigata quidem symptomata fuere, sed quæ per intervalla recrudescabant, quibus cum non commodum posset reperire medicamen, Gangræna brachium occupabat tam latè, inferne sursum versus serpens, ut flectentibus cubitum infestatis musculis, ad humerum attollentem seu delioidem pergeret: Ager advertens summo se versari in periculo, exoritur Dominum sibi ut liceret Haslinum curricula abire, consilio Mediceo ac Chirurgico: Vocor ego, & popularis ejus Regius Chirurgus Dom. le Sage, ad hunc ægrum instantissime membri amputationem urgentem, quam illi d'Haslinus penitus, auctoresque contra etiam

toleranter potius malum ferret quam ut presentissimo vite periculo sese obiceret, spe vel omnino nulla vel dubia recuperandæ valetudinis reliqua, imo si brachium amputaretur: Qui mortem & vitam juxta æstimans, durissima quæque experiri se malle aiebat quam ita torqueri diutius: ceu in quæstionem datus: Convenit ergo inter nos omnes est ut amputaretur methodice os humeri, & enchiresis per P. *Hachvard* ex sententia perficitur: Quam vero brachium graveolens, quam secundum aspectu, tactu moruque carens nondum recitum à synœcristis partibus, pustulis hinc inde excitatis, ichoroso sanguine, aut sanie ichorosa potius manantibus haud facile credita est: Admirandum vero quod nulla sui parte læso; aut nullo sphacelo corrupto osse humeri, brachium universum immedicabilis hæc gangrena obsederit.

Obsedit autem ideo, quod solum illius epiphysis, ubi per ginglymum cubitus ipsi jungitur, & quidem ad illius tuberculum externum, tantam contusionem superficialiorem, aut certe non profundiorē & capaciorem quam quæ capere ipsum quodvis vulgare posset, esset passa, ne minimo quidem in epiphysi illa apparente signo syderationis aut sphaceli, sanæ omnino simili, ita ut ea videri poterat eodem die contusa qua amputabatur brachium. Sed quis unquam ultra ratione tale quid vel indagare vel assequi potuisset, nisi casu fundus hujus eslamitatis solertia fuisse detectus. Atqui æger ille brachio truncatus octiduum quidem adhuc superavit, sed horrendis totius corporis convulsionibus correptus. Arque puto me hoc exemplo ad oculum veluti demonstrasse, qui fiat ut ob leviculam ossis humeri epiphysicos contusionem, citra ulla illius sphacelum gangræna universum membrum obideat: *Simon Pauli Tract. de Febribus malignis* p. 69.

**E**piphyes ossium sanguinolentæ, ac peculiari & proprio modo medulloſæ cum sint ac præpingues (os præsertim sacrum unicuique nostrum præ aliquam multis aliis ossibus, imo omnibus totius corporis sanguinolentissimum sit) Gangræne & sphacelo maxime obnoxie sunt; accidit ut ubi in extremis ossibus, v. g. ad malleolum tibiæ aut fibulæ fracturam quis patitur, aut cui dicto loco os fractum est, is longè sævioribus symptomatis, vel statim gangrænam minantibus, vel ipso biduo aut triduo ipsam gangrænam inducentibus infestetur quam si media ubi frangatur: Sane ita ratiocinetur, maxime cum notum pinguia & unctiosa naturaliter ligamentis ac tendonibus bellum indixisse, quæ epiphysibus annexantur aut firmiter adhærescunt, probabiliter ergo defendi posse arbitror, ideo tanto facilius gangrænam infestare epiphyses, & iis similia ossa, v. g. os sacrum, quanto pinguiora & medulloſiora aliis ossibus sunt, licet alia excavata, v. g. femoris aut tibiæ, longè majorem copiam medullæ continere appareant, quæ tamen minime, ceu epiphyses effractæ, ea stillare quasi guttatio quæunt, solida quippe ea, non porosa instar pumicis aut spongiæ sunt: Contusis enim epiphysibus, aut iis effractis, (ossis calcis, aut calcanei, itemque carpi, metacarpi, necnon pedis ac metapedii ossium eadem est ratio) aliter fieri non potest in vivo corpore quin medulloſa eorum substantia & effluat & corrumperetur, quam corruptam imbibere ligamenta, tendones, venæ, arteriæ (ob cir-

culationem sanguinis) coguntur, cujus beneficio inficitur ipsa totus corporis sanguinea massa, qua corrupta & gangrenosa existente, mors necessario tandem insequitur. *Idem ibidem.*

*Citra ossis sphacelum, &c.* Severinus lib. de Abscessibus pag. 182. duplicem Gangræne generationem ac modum ponit, 1. ex influxu, i. e. ex humoribus quibusdā venenosis ad partem aliquam allapsis, qui calidum ejusdem nativum ex inguant & membrum in mortem præcipitant, (id quod in febre continua, maligna & pestilenti fit) & cum dolore gravissimo, & pustula quadam, sub qua est macula nigra, extremis ut plurimum partibus, præpote pedis pollice ad usque tibiam & totam coxam brevi transcurrit, 2. Ex Abscessu & corruptione subjectorum quarumlibet partium solidarum, puta ossis, cartilaginum, chordarum, Faver *Paravi* lib. 11. c. 12. qui in gangrænos humorum influxibus interdum ossa primum imbui, atque ab his inflammationis initium habere statuit. Ex osse quidem male habito exemplum ponit ibidem Severinus, cuiusdam Illustris gangræna secundum totam tibiam sinistram ex talo progressam, affecto: ab osse, inquam, progressam opinatur, tum quod perperis podagræ insultibus subditis fuit, tum quod confestim & à principio se prodidit alienatum os utrinque, quare non multo post tempore necessum fuit totam excelsam serra tibiam; ex quo affectu evasisse septuagenarium mirum fuit.

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

### SECTIO V.

#### De FRACTVRIS.

##### OBSERVATIO I.

*Fracturam ossis Humeri sequutus tumor cum ossis carie. 1. Brachii non coalescens ob cariem subditam, 2. Fracturam Vinea & Radii sphacelus lethalis sequitur. 3. Ossis Femoris, lethalis ob fragmenta Eoseti Anatom. Tom. III.*

ossum relicta. 4. Femoris sua magnitudine levisalis. 5. Occulta ossis Femoris Fractura, cui successu ejusdem ossis ad ischium luctatio. 6. Fractura spontanea ossis Femoris. 7. Fracturam ossis Femoris sequutus insignis tumor ob callum extuberantem nec coherentem. 8. Tibia Fracta non coalescens ob ossiculum ab osse tibia separatum, & sphaceli missum in inferiore ejus parte. 9. Humeri dextri & Femoris Fractura spontanea. 10.

§. 1. **V**icentius Balduinus, Vir infractae ætatis, vixit aliquandiu miserandum in modum, ob humeros intra annos quindecim quater effractum, quod paulatim incretenscens, sive ex viscido conrui ossis sacco, sive sanguine eo uberius affluente, in eam tandem devenit molem, ut nec pectus nec scapula immodicum ipsius pondus fuerit amplius ferendo, excitatis non solum maximis nervorum doloribus, verum etiam summa spiritus difficultate, ob luxurians pondus thoracis motum continenter impediens, cum indefatigabili vigilia. Quibus à salebris quo evaderet, usus fuit consilio variorum Chirurgorum, quorum alij tumorem emollire atque in pus convertere: alij contra luxuriam ipsius auctiore fascia coërcere: ac nonnulli vitium os serrula præcidere adauxi fuere, sed omnes successu infelici: Venæ enim ac arteriæ hujus tunc nobis latiores erant quam ut pollice humano potuissent obturari, ac proinde magis impedimento quam auxilio fuerit fasciæ: mortemque adeo non distulisset, quam marmasset amputatio improvide instituta.

Facto autem vivendi fine, docuit anatomicæ omnia sub cute visci crassitiam ac steatomatis induisse naturam, parumque discrepasse à materia veri cancri, cujus nomen fortassis propterea hæc ossis vitio haud male impositum ab industrio Celfo. Ipsa vero ossa erant non modo à se invicem sejuncta, verum quasi malleo minutim confracta, ac præ irriguo madore adeo tenera, flaccida ac mollia, ut instar ceræ scalpello facillime conciderentur. *Tulpius Observat. lib. 4. cap. 12.*

**A** Materia veri Canceri ] Cornelius Celsus lib. 8. cap. 2. asserit fracturæ ossium, præter inflammationem, ac distensionem nervorum, interdum quoque Cancrum intervenire. Equid vero per cancrum ibidem loci intelligat, varis variorum sunt conjecturæ, neque minores sententiarum conflictus, verisimile tamen non est verum hic d. signari cancrum, sedum sphacelum perpetam excogitatum. At si quis conjecturæ locus, videtur hæc vox adumbrare callosam illud tumoris genis, quod plerumque sequitur calamitosas ossium fracturas, vel immedicabiles illam eorum mollietiem quam imprimis ossi accidit pituita, solidam ipsius substantiam plane corremptam, cujus perniciosissimi tumoris natura, quantumvis haud parum discrepet à genuino cancro, in eo tamen cum ipso convenit, quod uterque nullis remediis cedat, conspiciatque perinde in perniciem ægrotum. *Idem ibidem.*

*Sive ex viscido succo, &c.* ] Eiusdem alienationem ossibus imprimit acida ac maligna quædam pituita per habitum corporis effusa, quam interdum quinquaginta vidimus occupasse loca, ac depascere rathum non solida ossa, verum etiam carnem, membranas, nervos, ligamenta, aut quicquid illi obvium, parum interim, aut nihil proficiencibus remediis, quibus insensissimum hunc hostem satagemus donare, sive sponte ex larebris suis prodeuntem, sive à variolis in arenam hanc productum. *Fabr. Hildani centuria 4. Observ. 69.*

*Cujus nomen fortassis, &c.* ] Canceri ossis generationem & curationem asserit P. Barthele in sua Anatomia Practica cap. 3. quem eandem facit cum Spina

ventosa, de qua proxima sect. quanquam discrete addit, quod hic ulcus iuponat, cujus non meminit *Tulpius*. Causa ejus est, *air*, humor acris, primo os corrumptens, mox per osium perforans: Hic ulcus statim accedit & carnis & cutis, quod curari non potest nisi prius ipsum os curaveris: Ulceris foramen valde exiguum est, labia pallent, materia effluit tenuis, caro mollis & aliquomodo tumescit, at minime ut in hyperfarcosili ulcerosa, de qua mox, sed sponte increfcit. Ibi sectione utitur per ossis longitudinem usque ad ipsum os, mox corruptionem corrigentia applicat. Alterius speciei Ossis corruptionis ibidem meminit, quam à supercrefcente carne, & ulcere adjuncto. *Hyperfarcosili ulcerosa* vocat; Cujus causam, *air*, est phlegma præter naturæ ossis temperiem atque duritiem auferens: Molliori huic fundamento caro insistere nequit, unde naturalem suam essentiam etiam amittit: nutrimentum ipsius et sanguine constans in sarcoma molle spongiosumque transit, quod sensim incrementum sumit, tandemque ulcerationem secum asfert, quo tendines, ligamenta & nervi corrumuntur, membranaeque eorum periculo subducuntur. Medicamentis inutilia esse statuit, atque ultimum ipsum, hoc est in ipsum aringi vult, osse enim curato illico & ulcus carni dicit, & carnem naturalem constitutionem adipisci: Incisione itaque esse opus, profunda adeo ut os ipsum in conspectum veniat: Quod si excrefcencia magna nimis concomiter, exstirpationem consulit: quod si repullulare observetur, ad Causticam æquale planum transit, habita semper ossis consideratione.

§. 2. Vir quidam Lugdunensis, sexagenarius, ex arthritide pituitosa in articulis humeri & cubiti dextri, jam fore bimestre spatium obtuso dolore torquebatur: nullis utitur remediis, solam sibi partis illius quicrem imperat, dum brachium affectum fascia obvolutum & pectori innixum continuo haberet: Is alioquin sanus & valens, in publicum hora diei circiter 8. progressus, dum chirothecam in manum affectæ partis inducere levissimo conatu adnitens, brachii os, quatuor aut quinque digitis infra humerum, transversim effregit: Vocatus ego confestim, rem non sine admiratione conspicio, exploro, & per Chirurgum ipsum restituo, quæ convenientia remedia jubeo admoveri. Elapso triduo, ægrum reviso, num apposire restituta essent omnia exploraturus; remotis fasciis & assalis, naturalem ossis suam rediisse vidimus, & ap.

& appressis digitis percussimus: Sed ecce, paulo inferius circa cubiti articulum nova se & nondum inspecta obtulit ossis ejusdem fractura, dolores urgent elamosi, restitutioni itidem sedulo incumbimus: Inde placata omnia, nunc belle quiescit, nondum tamen ab eo tempore fasciæ explicatæ, nec visum uti se habeat pars ea: Miratus sum diu tantam ossium fragilitatem in eo homine quise illis ossium affectibus, vel à lue venerea vel aliunde contractis pernegavit.

Ceterum, quod ad eum virum attiner de quo ad re scripsi, Restitutis bis tēve, ut ex arte erat, ossibus, admotis fasciis expectabatur à nobis debita & conveniens agglutinatione per callem, uti natura facere consuevit, sed frustrata est spes nostra, nam agglutinationem ne aggressa est quidem natura, quamvis quiete diurna, sotiis ad partem & aliis admotis adiuta sedulo fuerit. Hoc unum obrinuit ægrotans quod indolenter (quantam ad eam partem) ab eo bime; stre spatium vixit; Brachii motum liberiorē experiri se credebat: Is paulo post ex inveterato renis ulcere diem postremum oblit.

Vidimus demortui sectum brachii os, illud eare omnino computruerat: Unde conjectimus eum ægrotum, quamvis id pernegasset contumaciter, lue venerea medicallitus ea in parte exesum fuisse: Ita nobis exemptus scrupulis qui diu animos nostros exagitaverat. *Philibertus Saracenus ad G. Fabricium Hildanum in hujus cent. 2. Observ. 66.*

§. 3. Strenuo militis duci globulus plumbeus à bombarda hostili emissus utrumque os brachii sinistri prope carpum perfregit, & vulnere penetrante sauciavit brachium: Antequam pugna excederet, statim intolerabiles sentit dolores, qui frigore byberno exaucti sunt, cum quatuor horas equitando in via impenderet, antequam in proximam civitatem delatus Chirurgi manui subiceretur. Sedula opera in hujusmodi casu difficili adhiberi solita, non impedit gangrenam parti læsæ imminente, quæ in externa manu & brachio se non prodit sanorum similis, Sed cum intolerabili cruciatus interno interiora pervagabatur, & dolores sensim ad totum brachium & scapulam sinistram diffundebar, cum tumore, sed striis quibusdam lividis sanguinis secundum brachii longitudinem ascendentibus: Ampliato demum vulnere, immisissæque manu Chirurgus observavit interiora t. igida & sphacellatam manum assistentes vidimus: cumque nihil in medicamentis spei amplius superesset, de manuum operatione cogitatum mature fuit, ipso etiam viro generoso urgente, ne serperet ulterius malum, quod interne latius protensum videbatur: Quamquam vero parum profuturam membri læsi amputationem judicarem, anceps tamen remedium cum prognostico dubio experiri statui.

Brachium medium serra resectum prognosticon ominosum confirmavit: Primo quippe copiosus ichor flavus effluxit ex muscutorum interstitiis, qui tandem sanguis successit ex vasculis suis, qui facile aqua styptica constitit; Septimo hæc die peragebantur, & eodem circa vesperam exspiravit æger.

In amputato brachio vulneris conditionem interioris rimati, vidimus ulnam fractam, & legum quoque radium, fragmenta ossium tendinibus muscutorum manus incumbencia & velli-cantia, amplum biatum fortentem, sphacelata omnia.

**D**olorum magnitudo ex tendinum punctura ab osse fracto & caleatis ejus frustulis, necnon plis in vulnere latentibus, à tunica pellicea sine dubio abrasis, reperenda est: Sphacelus vero à venenati globuli icu ortus, sive venesicam qualitatem nature sive debeat globulus à nitrato pulvere protusus, sicut plurimis persuasum: sive globulus iste fatalis veneno per artem fuerit imbutus. Hisce sane vulneribus, præsertim in nervosis partibus, malignitas fere semper conjungitur, quod ex partium affectuum decoloratione, mortificatione, leipochymii, & celeri fato colligimus: imo febris in nostro ægro vel nulla vel exigua, mære sibi semper ad extremum spiritum constante: Ex observatione *Placciani l. de Vulner. sclop. cap. 30.* Vultus à sclopeto una cum ossis fractura illatum, si minutum sit, certissimum ac lethalissimum genus fracture existit: Nam carnosa & nervosa substantia non solum à qualitate venesica, utiuse, confusione & attritione læditur, sed etiam propter ossis fracturam partes magnopere alterantur, hinc & vehementes inflammationes, dolores, convulsiones & gangrena oriuntur, quæ omnia ut plurimum mortem ipsam inducunt: à convulsione tamen noster æger immunis fuit. Ceterum de globulo veneno imbuto magna nobis oborta suspicio, quia statim ab icu accepto de immodico dolore conquestus fuerat, strenuus Dux & miles, & cito ad cor pertinebat mali vis: Vanis tingi solet, etiam succo al-

lii, ne vulnera admittant curationem. Globulus nobis visus, infortunii causa, aliquid monstri videbatur alere: Incisuris enim multis distinguebatur, arte factis, quo siue nescio, certe non bono: uni incisuræ adhaerebat frustulum ossis, ab ulna fracta fragmentum. Ichor vero ille flavus copiose ex brachii amputati trunco stillans insectarum partium argumentum erat & putredini vicinarum: digito compescere voluit Chirurgus, sed eo remoto fontis instar prorupit seram: Et tale quoque ex vulnere sclopeti, puris loco, stillabat: Quicquid sit, ex levi, ut videbatur vulnere, sed lethali, magna tragedia excitata: Lethalissima verò hæc vulnera globulorum prouunciant artis periti, quod non solum nervosæ partes solvantur, sed & lacerentur, & affectio non tantum cerebro communicetur ratione vulneris, sed quod magis est, ratione nervorum venesica qualitas immediate cerebro communicari potest & ægrum subito interficere: Non vero per nervos solos cerebrum inficitur, sed per vasa sanguinea, hic quoque affecta, cor ipsum insectatur. Hinc in nostro ægro leipochymia anxietasque frequentes, & ad ultimum halitum recurrentes observantur, nec cerebrum læsum ex actionibus apparuit. Foran nisi statim præcipitasset cor affectum, etiam ad cerebrum serpendo penetrasset venenatus vapor. *Th. Bartholinus in Actis Medicis æggr. 1674-75. & 76.*



§. 4. Anno 1629. sub finem Martij, visitavimus mortuum ex vulnere femoris cum omni  
moda ossis fractura. Invenimus os esse pessime repositum, ex parte tamen coaluisse: Maxima  
& acutissima ossium fragmina in vulnere relicta, ad minimum corporis motum dolores latio-  
rimum concitabant, novamque movebant hæmorrhagiam, unde post longam atrophiam,  
gangræna totum crur occupante, septimo à vulnere mense mortuus est. *H. ab Heeri Observa-  
t. Med. xxix.*

Ite sequuntur ingentes. Chirurghi enim ex vulnere  
mortuum testabantur: Negabant Medici di-  
centes à periculo artem curati potuisse, nec ullum vitæ,  
sed claudicationis periculum adire potuisse: Ego  
arbitrari à Dñm. Scabimus adhibitis, nisi ex tempore  
qui Hippocr. meum domo assereret, statimque exhibui  
textum qui est L. i. de morb. lect. 5. *Hæc autem cum  
fuit ex necessitate contingens, in vulneribus quidem  
si crassi nervi, & musculorum capita in femoris præ-*

*sertum vulnus acceperint, necessaria est claudicans.  
Mortuus enim si qui vulnere quem habet cerebrum,  
aut spinalem medullam, aut jecur, aut septum trans-  
versum, aut vesicam, aut Venam multam sanguinem  
effluentem, aut Cor, Ex vulneribus autem minime  
mors contingit, si his partibus vulnus acceptum non fue-  
rit. Hæc verba omni luce clariora quoniam Leguli  
literarum aucupes tortari sunt, tempus nos docuit  
idem.*

§. 5. N. Lerantius, natione Xanto, habitatione Genevensis, annos natus circiter 35. pedibus  
agilis, hinc victum quæsitans, multorum in gratiam varia peragrans loca, Anno 1677. mense  
Octobri deficiente in reditu è Bugundiz Comitatu Genevam repetens per Montem Jurati-  
sum, nivibus jam oblitum, iclopeto manuario instructus, hoc insulse exploso, glans de semur  
parte domestica trajicitur, spiritumque distantia ab inguine sex digitis supra genu parte sylvo-  
stri, id egrediente, unde protinus in terram concedit ob fractum os femoris. Integro triho-  
rio humi prostratus jacet, & nivl incumbens, antequam tellus viator occurreret vel qui auxi-  
liares porrigeret manus. Hinc læticæ impositus post tridui iter Genevam pervenit: Postridie  
ad curam advocor cum perito Chirurgo Joh. Lamont: pridie sanguis è brachio opposito missus  
fuerat: quomobrem cum semur insigniter intumisset, atque qua parte glans exitum habue-  
rat foramen impar esset transmittendis ossium fragmentis, per crepitationem se manifestan-  
tibus, ideoque vulnus ampliandum esset, metu novi humorum affluxus, venam xxi. 15. in  
brachio sinistro aperiendam volui, parcam tamen fieri sanguinis missionem, tum quia febris  
miris erat; nec de hæmorrhagia insigni à vulnere mihi constabat: sanguis omnino putris e-  
ductus est, unde adstantibus desperatæ ægrum esse sanitatis prædixi: Paucis post horis am-  
pliatum est vulnus, per quod eductum est primo ossis fragmentum pollicaris latitudinis, dua-  
bus acutissimis eminentiis præditum, parte interna nigrum & cariosum. Post intrusus iterum  
digitis aliud, sed musculis vicinis coherens deprehensum, cui extrahendo vossellis & forei-  
pibus opus fuit magnæque vi adhibita; quinque id digitorum transversorum latitudinem lon-  
gitudine æquavit, pollice circa medium multo latius; in extremis etiamnum acutissimum,  
ut Chirurghi pollex inde violatus sit ad aliquot dies, minora aliquot quoque prodierunt cum  
paucio sanguine: Dehinc occisum est vulnus, superiore, quod in introitu fecerat glans, lau-  
dabile pus jam fundente: Nox succedens implacida fuit, nec non dies subsequens cum insi-  
gnibus doloribus, præsertim circa locum ampliati vulneris: paulo post pulsus vacillare incipie-  
bat, dolor omnino desierat, imo sine seniu id contræctatum, viribus ulterius turbantibus;  
Ideoque mox Pastorem qui animæ consuleret advocari jussi, cujus discessum statim excepit  
mors.

Ob indicia imminenti gangræne exterioris, intra eam majorem latitare ratus, præsepi  
Chirurgo ut novaculam admoveret, glandis viz insistendo: Caro ossi fracto superstrata sana  
erat, quanquam juxta vulnus amplificatum, livere inciperet (abscedente epidermide,) sed  
non profunde: Os vero femoris, sex digitis supra genu, cujus patella obvia erat, omnino ef-  
fractum apparuit, superstitibus duobus fragmentis prioribus duplo majoribus, cum aliis mi-  
nimis. Cruor niger mediocri copia occupabat ossis effracti & exempti locum. Ut hinc con-  
jicere licuerit soli fracturæ magnitudini mortem fuisse imputandam, quanquam concurrere  
potuerit, sanguinis viriumque cuius massam inquinaram esse & corruptam ostendit iterata venæ  
sectio: Insanabilem autem fuisse fracturam manifestum est, ob insignem ossis partis fracturam.

§. 6. Obijt puer annorum 12. in Xenodochio Basileensi 20. Aug. 1673. qui saltando fregerat  
femur, in quo fissura facta, Per bidduum magno tamen dolore, scalas descendit & ascendit:  
Non observata fractura, à quodam Mago male curatus: Tandem Chirurgo accersito, omni-  
nia semper in pejùs ivere, ut pure collecto febris accesserit lenta; hinc caecochymia, deflu-  
xiones ad partem debilem, os ischij & caput femoris, non sine magno dolore: Tandem  
luxato osse femoris ex acerabulo, & facto ulcere paulo infra trochanterem majorem, dolor  
mitigatus est: febre autem non cessante, & materia purulenta in femore multiplicata, tan-  
dem obiit.

Sectus fuit à D. D. Glaser, qui ulcus sordidum deprehendit, & secundum ductum vasorum, &  
interstitia musculorum cavitatem magnam, & musculos ab osse femoris omnino separatos, in  
hac cavitare ingens puris copia visa est, quæ à genu, ubi primo tumorem fecit, premendo,  
ad

ad ileus ascendit, nec substitit prope genu, sed protraxit se secundum ductum nervorum, & musculorum interstitia ad talum usque, ubi etiam humor & pus observabatur: Separatis à femoris ossis cute & musculis, fissuram ossis deprehendimus, secundum longitudinem simul & transversum, ut in margine patet: musculi omnes laxi ex humoribus madefacti erant, imprimis nates constituentes: in acetabulo erat mucosa substantia indurascens: prope genu sub petella similis muscus erat: In imo ventre nullum ingens malum inventum est, nisi quod à cacochymia viscera essent debilitata & pallidiora, alias in statu naturali plane consistebant. Ex communicatione D. D. Io. Georgii Mangoldt Medici Basiliensis.

**H**inc ratio datur totius morbi, hic pner hinc inde perulantes saltans fregit os, unde de repente ingens dolor oborietur, domum redux intolerabilem dolorem sentit, reticens saltum, per biduum tamem adhuc quoniam erat fissura, sed dimidia pars ossis consistebat per scelas ascendit & descendit, sed tantum extremis digitis pedis (qui dexter fuit) inhiinx, Modo decumbebat, modo oon, dolore iorem continuate, tertioque die adeo intensus est, ut fere amplius consistere non posset, propter solutam unitatem periostii & tendinum puoctorum ab osse fracto: Ob istum mortuum autem fissura se magis dilatavit, & musculos pressit punxitque, unde morus lesio & geoco iocurvario, quod musculi genu flectentes affecti essent ab osse fracto. Quoniam autem fractura non esset nota, & parentes potassent puero à siga mali quid accidisset, accesserunt sagum, qui talia sanare proficerebat, sed hic nil profecit cum malum ignoraret: adhibuit sue fortis remedia & malum auxit, si quidem intumuit genu & totum femur usque ad ca-

puit femoris, nec dolor mitigatus est. Tandem frustra accersito Chirurgo perito, nomine *Schvartz*, poro jam presente, dolore aliquatenus mitigato, nam pure facta omnia miora sunt) & præsente febre lenta, à materia purulenta excitata, ileus factum est à natura paulo infra trochanterem majorem, unde puris copia quotidie evacuebatur hinc tumor prope genu, & dolor plane incepit evanescere, sed diuturnitate temporis, & imbecillitate corporis secundum musculos & vasa, per infra geou ad talum usque intumescere cepit, propter copiam puris ileus toto reliquo tempore apertum fervebatur, à pure musculi ab ossis separabantur & semiputidæ erant, quod femur esset fractum, ideo exterius tangendo apparuit duplex os esse, aut instar ossis quidam materia iuxta tendines musculorum orta, Interim cacochymia orta fluxiones ad partem debilem fiebant, hinc musculi laxi, & tandem luxatum est caput femoris ex acetabulo; Interim febre omnino consumptus & emaciatus tandem obiit. *Idem.*

§. 7. Dominus *Marchandus*, Jurisconsultus Parisiensis, passus est de flexione in genu articulum toto octimestri ipsi molestim, quæ de causa usus est opera plurimorum tum Medicorum tum Chirurgorum, at sine fructu, quod malum ab osse duceret originem: Dum quadam die in lecto de latere in latus se convolveret, effractum illi est os tibiae juxta genu, morte paulo post subsequuta.

Apertum fuit Femur, repertaque fuit fractura & separatio apophysis ossis illius; quod cario & putredine infectum erat, quanquam lue nunquam laborasset. Ideoque recte ab antiquis tractatum ossa tripliei morborum genere affici posse, Intemperiei, compositionis & solutæ unitatis.

**N**otent Tyrotes ossium epiphyfes sæpe divelli, quod luxationis quoddam genus est vix sanabile, teste *Colemo* Anat. c. 2. quod ejusmodi ossium conjunctio & *epiphyses* non fiat ossis unico capite acetabulum subeunre, sed pluribus tuberculis totidem sinas subintranantibus, cuiusmodi reductio difficilima est, à causa interna vel externa: externa, quandoque Chirurgi errore; interna, humoribus quibus-

dam illapsis in quempiam articulum, inibique retentis; quod in lue Venerea & Variolis sæpenumero: accidere videmus, vel ob alium aliquem humorem lue non inquiratum, quod accidit predicto Jurisconsulto, *Paræus Operum lib. xv. cap. xxi.*

*Malum ab osse duceret originem* Arabes Spinum venereum vocant; Pædathroca; eam M. Aurel. Severinus, cujus debentur exempla hoc libro.

§. 8. In Fracturis ut aliorum ossium, ita & femoris curandis sæpe vitia advertuntur, primo in figura, deinde in callo: In figura, dum non rite extenditur, conformatur, deligatur, deponitur. In Callo, dum ille sit nodosus, ubi conjungitur, & monstroso callo, qui insigni eminentia nodis in arborum ramis subinde comparentibus respondet; similis est. Talis monstrosus callos apparebat in utroque femore Pilæ magistri aulici lusoriae.

Bo forte suffocato, & post anatomen cocto ad scelere structuram, uterque ab invicem abscedebat callus. *Rolfinckius Dissertat. Anat. lib. 2. cap. 49.*

§. 9. Scriba rusticanus cum Norvegiæ, sylvis asperitimis collibus & montibus horridam, equo circumiret, procul Bergis lapsu graviore Fracturam tibiae sinistrae passus dolores sentit gravissimos: Vicini rustici hominem miserum hospitio exceperunt, & pedem fractum sine extensione instrumento ligneo excavato firmiter incluserunt, summæque cum diligentia oleo ex sineribus inunxerunt; Hunc in modum lecto affixus inter rusticos annum complevit, & tandem magna cum difficultate ex Septentrione Bergas delatus fuit, Ad consilium vocatus Medicus, deprehendit os tibiae cum fibula esse fractum, quinque digitorum latitudine supra malleolum, ita ut pars tibiae inferior fractæ, cum parte superiori callo ad latus firmissime connexa fuisset, latitudine trium digitorum, fibula autem fracta inferior nusquam firmata in muscularibus oberraret, ut morte pede exacte sentiri posset; ob callum firmiorem extensionem nullam fieri prædixit, ar rogatu amicorum instrumentum efformavit, quo utrumque os in diversa trahebatur, sed frustraneo conatu, cum cutis sola, eo usque extenderetur,

ut jam discump<sup>3</sup> videretur, illa præsertim in parte, cui extuberantia ossis superioris fracti adnectebatur. Ideoque & hoc in loco, & alibi, vulnus metuendum esse adstantibus monstravit, iussitque ut Chirurgi instrumentum remitterent, quia nec æger amplius perferre posset: Inflammatio statim oborta, cui sedandæ externa applicabantur, & ad doloris mitigationem interno propinabantur: Igitur abscissionem pedis suavit Medici, ut ad officium è lecto rediret: Sed æger acerbius credens mutilari quam extingui, maluit, persuasus quorundam aggritarum blanditiis, ut instat ossis fracti, iamque in suum locum repositi, pars diligeretur fortioribus à stringentibus, atque emplastro catagmarico, quod abique ulla ratione, aut consensu Medici, approbarunt Chirurgi, unde dolores fere intolerabiles cum timore novo surrexere: Quibus nihil proficientibus, fero æger à doloris acerbitate & longo decubitu fere insanus, tibiz magis amissionem optabat quam cruciatus diuturniores: Die itaque 5. Martij 1655. operatio commissa est Chirurgo peritissimo, qui, carne prius ad os incisa, nudatum os seciliter abscidit.

Peractis deinde peragendis, Dissecti membri curam cum musculis aperuit Medicus, calli formam lustraturus: Ossa tibiz fractæ tanta firmitudine connexa erant, ut parvo cultello dissolvere non quiverit: Os scilicet autem acutissimum cuticula adhærebat tenuissima ossi inferiori: Fibulæ ossa fracta nullo modo conjungebantur, id quod ex commotione perfectiebatur antequam essent rescissa: Inferior pars ossis tibiz, ubi quædam cavitas conspiciebatur, nigricabat & sphacelum minabatur: Optime inde convaluit æger & artificioso pedo amissionem compensat. *Th. Baribolus cent. 3. Hyfler. 85.*

§. 10. Nob. quidam Pomeranus annos 44. natus, circa solstitium hybetnum anni 1593 gravissimis in dextro humero, nullo vel tumore vel qualitate p. n. affecto, doloribus, nocturno potissimum tempore torquebatur: Quorum leniendorum causa primum Tonoris ejusdem opera usus est, qui neglecta morbi causa, parti affectæ multis septimanis medicamenta calida arrahentia & exulcerantia applicavit: Sed magis subinde auctis doloribus & succedente insuper femoris dextri dolore, à me consilium petiit: Urinæ tum erant aquosæ & crudæ, appetitus mediocris, mens integra, vires tantæ ut interdum cum dolores remitterent, in area domus obambulare posset, Eisi vero ipsi convenientia quædam remedia adhibebam, tamen parum aut nihil profecit: Cum post me aliorum quoque Medicorum auxilium frustra expertus esset, omnem deinceps recuperandæ valetudinis spem abiecit: Porro Dominica Extendi anni 1594. matutino tempore è lecto in fellam sublatu, maximo tremore & concussionem totius corporis oppressus, eo quod simulac lectum repereret iterum relevatus est: Eadem die circa vespeream doloribus Femoris ingravescens, contenta voce exclamare cepit hait! hait! hait! Uxor itaque ipsius ad eum in lecto decumbentem accurrens, femur affectum utraq; manu comprehendit, idque media parte introrsum, versus sinistram pedem subito inlecti arque incurvari sensit, sic ut genu dextri pedis inguen sinistram respiceret: Visa tum est ægro arbor in pedem decidere, ejusque casu, in quo se manifestum fragorem percepisse sjebat, confringi. Cùmque uxor & alii eadem cum ægro opinione essent, ac femur plane confectum esse arbitrantur, sequenti die Chirurgum pro curatione accersiverunt, qui affectum locum diligentissime inspiciens atque contectans, præter inflexionem, quæ postmodum in dies magis magisque aucta est, nullum vel fracturæ vel tumoris p. n. indicium in eo deprehendere potuit. Hanc femoris inflexionem octo diebus antecesserunt, & totidem etiam consequuntur, ut urinæ cruentæ, quæ tamen postea ad naturalem statum redierunt: Ratio quoque circa illud tempus ut plurimum turbata fuit, vires prostratæ, dejectio appetitus: Facta inflexione, æger cruciatus in femora sensit intolerabiles ut se loco dimoveri non pateretur, sed quinque septimanis continuè in loco immotus jaceret, donec tandem ipsa solstitii æstivi die vitam cum morte commutaret.

Mortuo ægro femur incurvatum nullo negotio extendi atque in pristinum statum reduci potuit, ac tum demum fractura, media ipsius regione, se conspiciendam exhibuit, commissura partium fracti ossis adeo æquali ac si ferra esset incisum: Similis fractura mortuo jam ægro, in me sio quoque ossis humeri dextri deprehensa est, cujus ramen nullum ipso adhuc vivo vestigium animadverti potuit, & semihora ante obitum amici adstantes utrumque brachium citra omnem difficultatem ab ægro elevari atque extendi videbant. *Jacobus Scidellus Observat. Med. iv.*

**P** Ræter causas fracturarum ossium à Galeno 2. de Fractu lib. 9. enumeratis, facit & ipsorum fragilis constitutio, cujus causa parvum inopertum non sustinent: A carie imprimis, quæ lucem sequitur, fragilitas ea inducitur, maxime si inundatio mercurialis accessit: Mirandæ fragilitatis exemplum affert *Ad. Donatus Hist. mirab. l. 4. c. 5.* de quodam, qui arrepta mali aurantis parte, in focum antecurrentem projicienda, os humeri dexteri sibi perfregit: quo vix ferru-

minato, cum noctu, lectulo cubans, brachium alteri demitteret, maculam arrepturus, brachii os sinistram perfregit: Laboraverat autem is per plures annos lue Venereæ sevisima: Fuit & à Capivaccio commemoratum quod quidam nucleum amygdalinum pavimento illidere volens brachium frægerit: *Fabritius Hildanus cent. 2. observ. 66.* historiam affert Lugdunensis cujusdam, qui sanus & valens dum cheirothecam inducere levissimo conatu admittitur, brachii os, 4.

ant. 5. digitis infra humerum transversum effregit: Qui tamen vel ullis se ossium affectibus, vel à lue veneta vel aliunde contractis laborasse pernegavit: Idem observat. 63. narrat historiam mulieris 59. annorum, quæ mane recentem subuculam induens, manibus sursum exportectis, brachii os magno dolore rumpi & conteri sensit, Quæ quoque ab ea lue semper immunis vixit: Causam autem esse putat venenâ ali- quod oculum ab insigni humorum corruptela pro-

fectum, quod totam ossium substantiam quoquoque- rum permeans, inenarrabili modo corruerit: In exemplo vero à *Seidelio* allato, causa frædunt, non in osse femoris querenda videtur, Sed in valida convulsione musculorum id movendum, quæ os Femoris non obsequens, nec incurvari aptum disruperit: Fidem faciunt comitantia & prægressa symptomata, tremor & concussio totius corporis, urinx cruentæ, rationis perturbatio, &c.

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

### SECTIO VI.

#### De Luxationibus & Ambulatione læsa, aut Motu impedito ob Ossium vitia.

##### •OBSERVATIO I.

*Luxatio vertebra secunda cervicis non semper illico lethalis. 1. Manuum & Pedum Eluxationes ob ligamentorum putredinem.*

- §. 1. **R**USTICUS quidam ex arbore decidit, cervicisque vertebra secundam, prope atlantem (ut ex mortui sectione observavimus) luxatam habens, hoc modo per quam plurimos dies vixit: Ubi alios brevi temporis spatio mortuos vidimus, quamquam admodum magna esset luxatio. *Dem. Panarolus Pentec. 2. Obs. 26.*
- §. 2. In pueris gulosis frequentissime, si constitutio aëris præcedens fuerit valde humida, membra aliqua putrescant: quod vidi in filio mei vicini, in quo factæ fuerunt omnium articulorum pedis & manus eluxationes: atque ob ligamentorum putredinem, ossa juncturarum ab obitu putrefacta apparuerunt. *Rondeletius Tract. de Dignoscenda morbis.*

##### OBSERVATIO II.

*Clandicatio pendens à cervice femoris fracta citra Luxationem.*

- §. 1. **F**ELIS, cum juvenis admodum dejecta fuisset per scalas, atque inde altero crure semper claudicaret, putabatur in lapsu illo luxationem esse passâ.
- Ar vero eum illam secuissem, inveni cervice femoris fractam, capite ipso femoris non luxato, in suo acetabulo etiam num hærente: Hujus skeleton etiam servavi vel propter hanc causam. *G. Hofmannus comment. in Galenum de usu part. lib. xv. cap. ult.*
- §. 2. Rarissimi habendum loco exempli adnotavit *Parent*, in viro ætatis constantis, quadragesima annorum, se epiphyân hanc à reliquo osse avulsam vidisse: Valida quidem est connexio, sed affluentibus humoribus ita laxari vincula horum ossium posse, ut quod materialiter unitum, divellatur vero admodum simile est.

**I**Nfantes licet multis aliis innumeris periculis sint exposti, illorum tamen in eo præcipue misera est conditio, quod capita ossium, imprimis autem ossis femoris, à reliquo osse recedant & divellantur, levi interdum de causa: Laxam hanc esse conjunctionem infantium tenellorû agnoscit, &c. si coquantur, res ipsa docet: solis primis digitis leviter impressis, & pressus à hæc os sua liberari quantum curitas parentum si accedat, & nutrices nimis mature pedibus incedere & intrin jubeant infantes, iam huic malo aperta porta: Impletis & adulescentibus sepe eadem separatio ossis femoris ab ossis cervice occurrit, & communiter habetur pro luxatione, magno cum ægrorum detrimento: *Symphoricus* error felicem impedit curationem: In utroque quidem casu extensio necessaria est, sed tamen conducibilis est rem exacte tenere & judicio

comprehendere *Rosinccium Dissertat. Anatom. lib. 2. c. 49.*

Hic *Rosinccii* locus mihi in memoriam reduxit quod hujusmodi recessum hujus epiphysis antehac in uno aut altero viderim, qui à Chirurgis & aliis præsentibus Medicis pro Luxatione habebatur, licet caput ossis femoris extrâ elapsum nusquam sentiri posset: interim tamen os femoris versus posteriora ressedebatur, ejusque superior pars sine capite nonnihil sursum versus ascendere sentiebatur; sicque crus illud brevius evadebat altero: quæ tunc temporis, etsi de modo hujus luxationis dubitarem, omnes, nemo tamen nostrum de hujus epiphysis recessu ab osse cogitavit, quem tamen in istis ægris factum fuisse jam satis percipio. *De Diemerbroeck Anat. lib. 10.*

*Ambulatio laesa ob cerebri medullae spinalis, articularum omnium mollescentiam. 1. Ob os Femoris acetabulo accretum. Femur altero brevius. 2. Ob Rotulam, ope calligenae annexam, Femur ossi Tibiae. 3. Ob topbos in Genu dextro, Serum in sinistro Talo, Tendines contractos, aridos. 4. Ob pus collectum circa articulationem coxae & femoris. 6. Ob acetabulum ossis innominati amplius. caput insertum iussu minus. 6.*

§. 1. ] Anna Pfeiffer à morbis complicatis extincta est: Illi cranium à teneris à eopia humorum extensum fuit, hinc caput proportionem corporis excedebat: Excedens illa cerebri humiditas spinam dorsii & procedentes nervos adeo irroravit, ut à quatuor annis ne suffulcris quidem incedere potuerit, & vix sedere: Articuli omnes & ossa instar ceræ flexilia, *vide lib. 2. tit. de Phibisi.*

§. 2. ] Habeo in Musco meo os Ilii, hominis ætate provecti: In hoc osse caput femoris suo acetabulo tam firmiter simul & eleganter innatum est, ac si cum osse coxendicis unum & quidem continuum esset os, ita ut an unquam ibi fuerit junctura, non nisi artis peritis notum sit. Ex oculari autem inspectione etiam nunc manifestum fit, femur à majore sive exteriori processu, usque ad interiorem sive minorem olim glande plumbea trajectum, mirumque in modum contractum, & quamplurima ossicula extracta fuisse, hinc femur altero brevius evasisit: Glubulum autem plumbeum prædicto modo os perforasse, inde conicere licet quod foramen in osse circa processum majorem, parvum, ex adversa vero parte magnum existat, experientia enim docet globulum in suo ingressu parvum, in egressu vero magnum relinquere foramea: Porro cum femur tam prope juncturam perforatum, mirumque in modum fractum comminutumque fuisset, dolores ingentes & affluxus humorum supervenissent, crosta fuerunt ligamenta & cartilagines, ita ut caput femoris cum suo acetabulo mirando quodam modo in unum coaluerint. *Fabritius Hild. lib. de Ichore & melic. cap. xxv.*

§. 3. ] Habeo in Musco meo crus integrum hominis consistentis ætatis, in quo femur cum osse ibi in genu ipsa, tam eleganter connexum est ut ne vestigium quidem juncturae appareat, imo & totula ipsa mediante callo tam arcte annexa est genu, ut nullomodo separari possit, sed ita incurvatum genu ut certum sit hominem gralla incessisse. *Fabritius Hild. lib. de Ich. & melicer. cap. xxv.*

Requenter post curationem ichoris & meliceris juncturam adeo rigidam & induratum remanere videmus, ut neque in hanc neque in alteram partem deflecti possit. Hic plerumque in longum tempus Chirurgos diu multumque laborare vidi, quo juncturarum nervos & ligamenta emollire possint, sed oleum atque operam perdididerunt: Ichor enim ille qui extoto corpore ad articulum vulneratum fuit, &

acrimoniam contrahit, primo ligamenta & vincula quæ articulum cingunt, deinde etiam cartilagines, quibus junctura incrustata est, erodit & absumit, hæc fit ut ossa à suis cartilaginibus & vinculis derudata, inter se per callum (quod ante me nullus, quod sciam, observavit) tam firmiter coalescant ac si nunquam ea in parte fuisset articulus, quod allata exempla probant. *Idem.*

§. 4. ] *Ferdinandus* iij Romanorum Imper. ( *Vide lib. 3. tit. de Ponitu* ) infirmam est nactus pedum constitutionem, plerisque Austræ Diebus familiarem, qua quidem factum est ut crebris artuum doloribus. h. e. Chiragra & Podagra à quinquenaio adeo enervatus, ac tandem usu pedum omnino privatus, vitam sedentariam ducere cogeretur: Et quidem tendines utrumque genu investientes penitus contracti fuerint, nec illos ullomodo in rectum extendere, vel ipsi insistere potuerit.

Dextro, mortui, discisso genu, calcis topi reperti, Siuister talis aere serum in se continebat, utriusque pedis motum impediens: Tendines adeo contracti, rigidi & aridi, ut in rectum extendi non possent: *W. Hæferus Herenl. Med. lib. iij. cap. iij.*

§. 5. ] Puer 16. annor. ante menses 10. poritus est setaseo in ventrem anteriorem: relaxum ipsi alvum & vesicam involuntarie excrevisse, cum providentia paulo post istum, nihilominus perhibetur aliquot septimanis post, sublevatione oneris, in hoc vel alia mala ineurrisse: Uter sit, discissam addomen, post claudicationem & varios affectus, repertum pus copiosum utrinque circa inguen & adenes, quod non solum capacitatem illam glandularum, sed omnem circum circa articulationem coxae & femoris replevit, atque sub eute peculiari membrana, intus infusus ab adenibus ascendens, quidam tumor ad illum usque, ex utraque parte conspiciabatur, ut mirum fuerit videre tamdiu pus retentum esse, neque ramen ad visum aliquid ruptum apparuit. In dextro autem latere pus crassius & albidius & quasi sebaceum videbatur. *Leonardus Goidius in cista Med. Hornungi Epist. 243.*

Mea conjacta erat, ex ista sanguinem concretum hærentem circa alvum & vesicam urinariam, has partes comprimendo, exitum quævisse: eundem a glandulis receptum, & in pus mutatum, ac n. fluxisse etiam ad alterius inguinis glandulas hinc infra supraque replevisse, ut certe palmi latitudine utrumque ( utrinque ) simile tacto in luvum pus tundi-

ca laterit, excepto illo quod in articulatione & femorum interstitio musculorum continebatur. Alii tamen omnem hanc collectionem tribuebant rupturæ internarum partium, ex onere sublevato, cum tamen nihil foris appareret, neque hernia aut simile quid aliud: Et quia venter tandem intrumuerat, alii viscerum vitium & hydropem vocabant. *Idem Epist. 243.*

§. 6. Neptis quidam mica sex præter propter annos nata, quod pes alter altero contractior esset, claudicabat: primum ad Operatorem quendam deducta, facili operatione manuum corripiebatur vitium, levi tantum tractione, quod brevius erat, eras reddebatur alteri æqualis: sed vix erat è manibus dimissa Magistri, ecce tibi malum integrasset, & quam leviter correpta erat, tam subito redibat claudicatio: Convertentur ergo parentes ad hos membrorum distortorum Correctores: tum est ad varios qui varie suam probebant imperitiam: Alius Os innominatum suique deque moveri dicebat, alius incurabilem esse morbum severe pronuntiabat, cur tamen ita esset, non addebat: Non nego me diu admirandum fuisse in perquirendo causam hujus incurabilitatis, donec oblata est puella mortua, quæ eodem morbi genere viva laboraverat.

Perscrutanti regiones illas, occurrit ossis innominati acetabulum debito largius multo & profundius: caput autem, quod ei inferebatur, non tantum ei non proportionatum, sed etiam præter morem exiguum, laxatis igitur nonnihil ligamenti sursum ac deorsum ferebatur caput ossis femoris: Adhibita autem manu extrahebatur ad acetabuli anteriorem partem: Unde apparebat qualis spes perfectæ aliquando sanationis: Sed quid attingat medicamentis hæc relaxata vincula? aut quid juvent hic adhibita ferramenta? quibus nonnulli ita misere eos quos curandos suscipimus, cruciant, ut se præter in squaleo distendi quam in manus eorum incidere? Th. Kerckringius Observat. Anatom. 61.

## OBSERVATIO IV.

*Cervicis immobilitas ob vertebraarum ligamenta indurata, & stophos innatos. 1. Totius ob ossium omnium unionem. 2. Brachium inflexile ob ossium in cubito agglutinationem 3. Inflexio Lumborum impedita ob symphysin nativam vertebraarum lumbiarum 4. Inflexio in anteriora impedita ob appendicem acutam in osse sterno. 5.*

§. 1. **I**N senibus siccata humiditate, & Intermediis ligamenti induratis, vertebrae in unum coalescere notat *PAUVINUS*: In Principibus personis, arthriticis & podagricis, non solum brachiorum & digitorum *salvitas* seu flexus, calce intenerata, sed & cervicis vertebrae rigidas observavit non semel, ita ut neque manum ori admoveere, neque caput ad latera, nisi cervice & thorace super iumbis moto, flectere potuerint.

§. 2. Ioan. Bertoniæ Medicus Sceleron mihi dedit, quem ego domi asservo, in quo ossa omnia, i. e. omnes totius corporis articuli, à capite ad extremos usque pedis digitos uniti conspiciuntur: Romæ in Xenodochio incurabilium diu vitam traxit: vivens autem quem senem vidit dictus Medicus, nihil aliud movebat quam oculos, linguam, penem, abdomen, thoracem: nam cartilaginee quidem costis articulatæ erant, sed nondum coaluerant, reliquæ corporis partes omnis motus experte relinquebantur. *Columbus Anatom. lib. 15.*

§. 3. Habeo in museo ossa sinistri brachij, hominis consistentis ætatis: In eis ossibus cubitus non flectitur, sed mediante callo omnino & undique, veluti si continuum esset os, agglutinatus atque conjunctus est: Quæ vero hujus affectus fuerit causa me læret, in exenterio enim reperta fuere: Arbitror tamen fracturam & ulcera circa cubitum adfuisse, idque inde conicio quod etiam nunc callus extruberans in ipso humeri seu brachij osse appareat: fracturam hanc sequutam fuisse inflammationem & affluxum humorum maximum, nec non circa cubitum abscessum verisimile mihi videtur: hinc ab humore acri, qui ob doloris vehementiam ad articulos sauciatos cum impetu solet fluere, ligamenti erosio ac putrefactis humor ille lentus qui articulis inest effluxit: postea quoque à prædicto humore isto acri *crustula* illæ cartilagineæ, quæ appendicis ossium tegunt similiter erose fuerunt, ita quidem ut partes spongiosæ apophysium, tam ossis humeri, quam etiam radii minoris & facilis majoris, sese ad invicem attigerint, inde nutrimento ad utrumque os delato, callum productum fuisse censeo: Ab ipso porro callo articulus, uti vinculo ferreo colligatus fuit. *Fabritius Hild. Observat. lxxvij. cent. iij.*

**C**rustula cartilagineæ erosa Ipsa etiam ossa pueri *L. Rhodius* cent. 3. obs. 92. ut in costis tamquam stillicidij acri destillatione tartarea sic erosa memorat diu vestigia in ossa coxendici desinere.

§. 4. Anno 1673. Gen. Capitaneo Fabritio Genevensi, milites conscribenti in urbis vicinia ad reparandam cohortem, obtulit se juvenis Friburgensis Helvetius, proceræ staturæ, peregrinantis amictu, ex iis qui D. Jacobi sanum adeunt: Hinc paucos post dies cum cæteris commilitonibus in pago semihoræ spatio ab Urbe distito, lacui vicino, Vangeron dicto, jurgium intercedit. Solus octo ex illis oppugnat, duos prostermit, sex vulnerat, tandem pluribus vulneribus confossus occumbit. Observatum est illum in dimicando nunquam corpus inflexisse, sed erectum semper stadium evibrasse: Tunc rigida hyems erat, ac fossa superficialia cadaver eonditum: Moniti altique Chirurgi, cadaver cymbæ impositum trans lacum evehunt, ac sceleti gratia, quod perito Chirurgus L. Bailly constructum à Anatomico cultro expositum fuit atque ab eo annotatum vertebrae lumbares lineis quidem distinctas omnino tamen nativa symphysi coaluisse, ut ideo islectendi corporis negata esset potestas.

§.5. Observavimus in senē appendicem in osse sterni, indicis digiti latitudinem adaequantem in fine acuminatam. Ille se flectere haud poterat in anteriorem partem, terram versus, sine molestæ puncturæ sensu. *Boissacius Disquis. Anatom. lib. 2. cap. 4.*

## OBSERVATIO V.

*Statura recta impedita ob magnam arteriam duram infra & supra Renes ac omentum ventri adnatam.*

**E** piscopus de Werta non potuit recte stare, sed semper coactus erat aliquot annos incumbere alicui pulpito: Post mortem in dissecto corpore arteria magna, infra & supra renes quatuor digitos, dura erat & vitri in modum frangibilis: Omentum præterea adnatum erat ventri, umbilico excepto. *R. Solenander cons. Med. sect. v. cons. 16.*

**A** rteria magna dura. *Cruer lib. Observat. Anat. & Falloppio dissectum fuisse cadaver cujus arteria Chirurg. ant. à fide dignis sibi narratum Patavii aorta nota erat ossa.*



## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QUARTI

## SECTIO VII.

## De Decubitu supino aut in Latera impedito.

## OBSERVATIO I.

*Supinus Decubitus impeditus ob ventriculos cerebri aqua distentos, unde insomniorum, tremoris cordis &c. Origo. 1. Ob seri descensum in quartum Ventriculum.*

§.1. **A**CADEMICUS Oxon'ensis, hydrope pectoris extinctus, postremo morbi decursu, somnum nisi prostratus facie & inclinato capite capessere non potuit: si enim capere in pulvinar reclinato somno se componeret, intra tertiam horæ partem horrendis insomnijs & terroribus tristis semper evigilavit: quia & tremore cordis & ejusdem oppressioe maxima diu postea afflictus fuit.

In cerebro autem post mortem aperto Ventriculi aqua summe distenti reperiebantur, nulla autem præterea notabilis culpa in toto capite apparuit. *Richardus Lovver Tractatu de corde p. m. 158.*

**Q**uæ incommoda ex Supino decubitu obveniant, & quæ sanis conveniant juxta leges circulationis sanguinis, ostendit eo loco *Clar. Lovver*: Cum motus cordis debilis intermitrens est, hos capitis affectus scilicet vertiginem, scotomiam, caliginem oculorum & leiporhythmiam inducit: Quorum symptomatum ratio in hoc sita est, quia cum spiritus animales vitæque ipsa à continuo sanguinis appulsu dependent, si curius ejus sistatur paululum, aut sufficienti copia non suppedietur, tum propter ejus defectum caput statim vacillat, oculi caligine obducuntur, & rota corporis compages in pronam ruere apta est, atque ideo syncope affectus in dorium & humum sternimus ut citius ad vitam restarentur, quoniam ut cor debile fuerit, poterit tamen in eo sita sanguinem, quasi ductu horizontali in caput prolicere, quamquam in erecto corporis situ sanguinem eo suffundere non poterit, ex cuius influxu sensus & vita redit, & imago ista noctis statim evanescit: Ex adverso autem, ubi cordis motus corripitur, & sanguis impetuosè nimis in caput traiecit, membranas vellicando & succutendo capitis dolore infert, & spiritus animales per somnum in cerebro concentratos, & quasi ab opere feriantes, rapidiore suo motu exagitans & loco pellens vigilijs inducit, non ab simili fortan ritu

ac juxta lenem & placide murmurantem rivulum somnus nos cito occupat: at juxta vortices & cataractas terrore potius excitamur & expergiscimus: Atque hi sunt effectus præcipui qui motus cordis varios velut umbra corpus sequantur, Ostendendum vero quomodo fluxus sanguinis, per diverso corporis situ & figura alteretur, & quid alterationem istam consequatur.

Quemadmodum (ut prius dictum) pro animalium diversitate influxus spirituum in Cor diversus quoque est, Ita pro vario corporis situ & figura sanguis per partes fluxus discrimen subit: Cum enim certissimum sit sanguinis venosi refluxum non ab attractione cordis ulla, sed à propulsu arterioli sanguinis provenire, facile est concipere quantum partium quoque situs ad facilitandum motum conferat: Velut enim in homine, cum in pedes erigitur, sanguis à venis jugularibus, & vena cava descendente citius & facilius suo quasi pondere in cordis sinus delabitur (simili modo atque ventri in manu elevata mox vacuat, in demissa vero turgide & plene cernitur) qui vero est in partibus inferioribus, vena cava ascendente, difficilior & contra naturam suam, solum ab arterioso sanguine versus cor propellitur, & vi quadam urgetur, in planum autem

jacente corpore sanguis æque facile ab utroque redit. Opere pretium erit advertere in quo membri sui sanguis citius partem eam pervadat, & quid citius & tardius ejus cursum producat. Prout itaque nox & dies, somnus & vigilia, mutatio se excipiunt & vices mutant, ita situs corporis humani, pro naturæ indigentia, erectus aut proclivis est. Itaque in homine erecto quoniam sanguis à superiore corpore nullo fere alterius adminiculo satis facile in cor defluit, & sanguis ab inferiore parte corporis non nisi sanguinis arteriosi impulsu, & quandoque muscularum contractione in exercitio æque usque fursum urgeatur. Ideo circuitu ejus in partibus superioribus celerior est quoque fieri necesse est, quod & postea magis patebit. 2. In proclivi autem corporis situ, cum corpus à motu quoque quiescit, prout partes extremæ magis reliquo corpore elevatur, ita circuitus sanguinis citius aut tardius per illas expeditur. Effectus autem & incommoda quæ celerior aut tardior sanguinis transitus in partibus possit relinquitur, præcipue sunt, 1. Humor serosus cumbulatur. 2. Caloris vitæ diminutio. Quæ & in extremas corporis partes (pedes & caput) maxime redolant. 3. In pedibus, præsertim morbidiorum, & eorum qui exercitio commode uti non possunt cum sanguis ægtius (dum erecti sunt) versus cor ascendat, ideo stagnatione sua & transitus mora vasa capillaria minora sua copia distendit, & in habitu corporis aggeritur, unde pedum tumores & lematosi & hydrofici. Rem ita se habere constat, quoniam cum lecto se tradunt, & pedibus cum reliquo corpore in situ æquali collocatis recumbunt, serum illud cum venoso sanguine per circuitus reorbetur, unde partibus iterum insensitis humor ante proximum diem prorsus evanescit. Præter autem humorum congregationem, & tardiores in partibus inferioribus circulationem, etiam caloris diminutio supervenit, nam ut de die minus frigoris sentimus, quia exercitio & ambulatione sanguis usque propellitur, & proinde novo sanguine, & à cordis quasi incude adhuc recenti via aperitur. In lecto autem repositi, si pedibus reliquo corpore declivioribus quieti nos tradamus, non ante iocalescent quam pedibus magis elevandis lectus componitur. Cujus hæc ratio esse videtur, quia ex elevatione ista sanguis venosus citius à pedibus recedit, & proinde liberius & copiosius sanguis arteriosus infuit, & cum illo calor in partem restituitur. Atque adeo hoc familiare est pleuritis frigidiore temperatæ hominibus, quorum sanguis seroso latere magis abundat, ut propter frigoris sensum somnus non ante obrepit, quam lectus ad pedes altius exigendus de novo iteretur. Ut autem pedes propter tardiores sanguinis venosi recursionem intumescunt & infrigidantur, ita cerebrum, si caput in somno nimis demissum fuerit, licet calvarie integumentum inclusum, frigus minus sentiat, quia tamen ex isto situ sanguis non ita facile redit, inundationem & irrigationem nimiam conficitur. Quis enim ex illis est qui ita cubat, quin proximo mane de capitis torpore, somnolentia, gravitate, aurium tinnitu, faciei intumescencia conqueritur? qui omnes affectus postquam experrectus est, & sanguis denuo humoris istos in transitu reorbens secum in cor detulerit, paulatim evanescunt.

Hic vero paucis ostendendum quis capitis situs inter dormiendum maxime saluti conferat. In quantum igitur cerebrum humanum Rete mirabili quod feri foveit partem à sanguine excipiat & à cerebro præterea omnino destituitur, atque vasa sanguifera, tortuoso licet ductu ad frangendum sanguinis imperii formata fuerint, eum tamen illibatum in cerebrum deponunt. Ideo fieri non potest quin serosior & aquosior sanguis, præsertim super planum jacente

corpore & capite pariter reclinato in cerebrum insinat. Cumque præterea in ejusmodi situ sanguis in caput suffusus, non tam prompte & subito quam cum erecti sumus à capite recurat, necesse omnino est ut ipsum, & præterea, totam systema nervosum à nimio sero irrigetur. Id quod malo suo experiantur quotique affectibus spasmodicis, hydropi cerebri, vertigini, paralyti, sensum torpori & hujusmodi capitis morbis obnoxii sunt. Si enim capite demisso, & cum reliquo corpore æquali, somno se tradant, propter cerebrum & nervos sero nimis irrigatos, proximo mane de vertigine, scotome, capitis gravitate, membrorum tremore, linguæ habitudine, totius faciei tumore passim queruntur & prout se fecerint quin septennero inter dormiendum, aut turbulentis insomniis aut incubo tentantur, & toto mane insequente torpidi & graves sibi videntur, somnumque vix aut ne vix diu postea excutiant. E contra qui capite altiore decumbant, quis ex situ isto sanguis, ejusque serum, superponere à cerebro facile delabitur, ideo dulces & quietos, licet breviores somnos capiunt, & proximo mane multo alacriores & vegetiores evigilant, & ad omne opus & studium magis prompti atque expediti sunt. Atque hic obiter notandum pessimus aliquorum mos, qui nocturnis & seris potationibus indulgent, quo cerebro nihil magis injurium potest esse, Cum enim ob situm corporis proclivem urina, à renibus secreta non ita facile & prompte, uti cum erecti sumus, in vesicam per ureteres delabatur, Cumque vesicæ cervix ex proclivi situ, urina pondere non adeo gravetur, atque spiritibus per somnum in cerebrum aggregatis & quiescentibus vesica ejus oneris sensum non ita percipiat, sed officit quasi obliata, ea copia urina aliquando distenditur, ut majori recipiendæ spatium vix detur, inde fit ut ob impedimentum perrenes & ureteres urina decursum, in totum corpus regurgitet, hinc in cerebrum affluxus, unde paralyti, tremor, hydrops cerebri, lethargus aut apoplexia.

Quia autem supinus corporis situs ad planum proxime accedit, ostendendum etiam quid incommodi ex ista corporis positione in somnis evenit. Quod ut clarius fiat, præterea oportet animalium cerebrum pro diversâ corporis figura varie quoque constituta esse, nulli vero magis, quam quoad sinus & ventriculos cerebri discrimen occurrit. In quadapedibus enim, quæ prout in terram capite feruntur, uti cerebellum supra cerebrum aliquantulum incumbit, ita & sinus laterales inter utrumque descendentes, superiores quoque sunt, & ventriculos pariter quartus cerebello subiectus supra reliquos cerebri ventriculos collocatur. In homine autem, cui caput supra reliquum corpus eminet, cerebrum atque cerebello incumbit, intercedente tamen dura matre, & ad utrumque calvarie latius satis firmiter attentæ, ne cerebellum pondere suo comprimat) pariter quoque & sinus laterales magis in demisso siti sunt, & ex latere inferiore occipitis utriusque oblique feruntur antequam in venas jugulares terminantur, unde situr prostrato in lectum corpore, ex supino ejusdem siti, ubi collum occipite magis attollitur, sanguis in venas jugulares ascendere potius quam influere necesse habet, atque hinc est quod ob retardatum ejus motum & circuitum, continuo aggestus, nec facile exitum nactus, profundas istas foveas urinae in occipite imprimat, atque prout homo in hoc aut illud latere quiescere solet, ita sinus illi plus in uno latere quam in alio semper excavantur, prout cuilibet internam occipitis partem, in quo cerebellum recumbit, contemplanti facile patet. Ob sanguinis autem refluxum impeditum, & vasorum exinde intumescencia, foveas istas in occipite imprimi, ex hoc



hoc constat, quia supra sinum longitudinalem, & quo sanguis facis libere decurrit, ne minimum ejus in calvaria vestigium extat, nisi in inferiore parte, ubi in finis istos laterales sese exonerat: Si vero refluxus ista cohibitio in tam diuturnos temporis tractus adeo valeat, ut sinuosos & profundos tractus in eo sibi excavet, quanto magis sanguis ipse ejusque serum in cerebrum rediundet ipsumque aggravescent, & licet venae omnes sanguinem quaquaversum à cerebro excipientes, in sinus non directe aperiantur, sed velut ductus communis in duodenum aut ureteres in vesicâ, scilicet duplicaturam duræ matris aliquanto spatio incedant: Ex quod maxime observari dignum est, non osculis verius occiput (qui rectior exeunt sanguis) in sinus laterales via foret, sed versus frontem, retro quam curvus ejus est, apertis hiant, quo fit ut inus, spasmus, &c. in venas cerebri à sinibus retundi aut urgeri non possit: sed quo magis sinus

ejus copia turgescunt, eo magis duplicaturam istam comprimendo, regurgitationem ejus in venâ prohibet: At vero quocunque modo, siue in sinibus siue in venis sistitur, malum tandem in cerebrum regit, atque inibi futuris morbis & materiam congerit, & fomitem abunde subministrat: quippe Serum ob hujusmodi causas inter anfractus cerebri accumulatur, piam materiem eoque distendit, donec tandem vel acrimonia sua eam erodit, vel copia perumpit, unde in basin cerebri desinens, medullam oblongatam atque nervos ex ea ortos stagnatione sua corrumpit, aut acridine sua continue lacessit, unde hydrops cerebri, convulsiones & dirus morbi apparatus in capite accumulatur: Si vero illud serum à substantia cerebri imbibatur, paralyses, senium torpores, lethargum, somnolentiam, alioque graves affectus capiti inducit.

§. 2. Adolescens phthisicus per plures hebdomadas non potuit supinus in lecto decumbere, quippe ab illo situ convulsiones patiebatur: Post obitum ingens feri flavi & fassi copia intra omnes feri ventriculos fluitabat, qui capite reclinato in quartum ventricul. in supra medullæ oblongatæ caudicem prolaberetur, convulsiones ciebat. *Villis Pathol. cerebri cap. v.*

## OBSERVATIO II.

*Decubitus in sinistram latam molestum ob tumorem inflammatorium in parte sinistra Pulmonis. 1. Ob tumorem in parte dextra pulmonis. 2. Ob Pulmonem sinistro latere consumptum. 4. Decubitus supinus & ad latera impeditus ob arctam pulmonum cum thoracis costis omnibus anterioribus cohesionem. 5. In sinistram impeditus ob dextrum pulmonem costis affixum. 6. Omnino impeditus ob pulmonum coherentiam cum costis, vertebra & diaphragmate. 7. In laevum latum impeditus ob Pulmonem utrinque costis & diaphragmati adnatum. 8. Ob pulmonem costis & diaphragmati adnatum, cum cordis erosione. 9.*

§. 1. **V**ir ill. febre continente prehensus cum spirandi difficultate & tussi, &c. Non poterat in sinistram latam nisi cum difficultate decumbere: Secto illius cadavere, inventus fuit tumor in parte sinistra Pulmonis. *Latius à Fonte. Consult. 32.*

**C**ompressa parte sinistra afflata ab occurfu costarum & à superincumbente onere partis dextræ Pulmonum: Alias familiatè est Peripneumonicis, quibus utraque pars phlegmone obsideretur, quo aëri intro-undi facultas concedatur, ut ad erectum corporis firm cogantur, quod sic thorax facilis dilatetur, nec ut in decumbentibus in se concidat, ob quod pectoris partes in spinam declinant, quæ erecta

thorax etiam simul fertur, non amplius seipsum gravans, ut ait *Galenus* 4. de loc. cap. i. Bronchus præterea eo in situ apertiora manent, nec à parenchymatis mole comprimuntur: At in dicto *Ægro* salva fuit & incolumis pars dextra pulmonis, ut resurgere coactus non fuerit, sed supino in decubitu permanere, vitium debilitari conveniētiore.

§. 2. Quidam decumbere neque in supinis neque in latera poterat, cum dyspnoea, &c. Thorax universus aqua erat plenus, in dextro Pulmone tres lobi digiti crassitie & longitudine, *lib. 2. sect. 20. Obs. 12.*

§. 3. Vir Nobilis multis annis phthisicus, Pulmones habebat dextri lateris duplo majores solito, Unde forsitan Causa quod æger semper in latum dextrum, etiam invitatus decubaverit. *Vide lib. 1. tit. de capitis dolore.*

§. 4. Obiit quidam vera phthisi: In cadavere dextrum pulmonem plane consumptum invenio: Pulmonem autem illi consumi prælagiatam ex copioso pure, & dextrum quidem ex denegato in sinistram latam decubitu, &c. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

§. 5. Novi Nobilem quia diuturna capitis distillatione in spirandi difficultatem sine stertore inciderat, atque malo progrediente eo devenerat, ut in alterutrum latum dextrum videlicet & sinistram non sine labore & anxietate quadam cubare posset, in dorsum nequaquam, ob ingentissimos dolores & cruciatus, quos in spinam jacendo, juxta anteriorem thoracis partem experiebatur: In ventrem autem commodior minusque molestus huic erat Decubitus: Vitam hanc miseram hisce tormentis mensibus & annis duxit.

Dissecto cadavere, observatum fuit Pulmones thoracis costis omnibus anterioribus ita pertinaciter hære, ut non nisi cultello sejungi possent. *Zecchini consultat. 1.*

**I**dem c. disquirens causas difficilis in latum sinum Decubitus, cujus causa difficilis reddebatur respiratio, An id contingit, ait, quia cum pulmones lateris sinistri, qui à dextris separantur, multis excrementis

mentis pituitosis repleti, Ideoque egre sequentes, cubanteegro in sinistram latus, à dextris pulmonibus concidentibus pressi, ægrios etiam atque difficilius ita sequuntur, ut pama alacritate spiritus edantur. Quod apertum hoc tempore oppositum doleat latus, id in morbum quendam à veteribus dissimulatum sciendum puto, nimirum in quodam p.n. pulmonum ejusdem lateris, cum membrana costis in semas vellicente pertinacem adhesionem, unde in Decubitu ad sinistram latus eo tendentes dextri lateris pulmones & membranam cui hærent, quasi secum trahentes & distendentes, doloris in parte sunt in causa: Hippocr. quidem lib. de Loc. meminit thoracis quendam affectus pleuriticæ, in quo pulmones pituitosis humoris interveni costis agglutinantur. Sed morbus hic brevi diuturno spatio, videlicet in

7. die solvitur: At vero ille de quo nunc, si inter initia non cutesur, mensibus & annis progreditur, nec nisi cum ægri vita finitur.

In ventrem autem commodior ] Hippocrates tamen in Coacis lib. 3. tract. 1. §. 13. Egrotum jacere in ventrem, si est infirmum, malum esse docet, quia delirium indicat & circa ventrem labores: Ad quem locum *Doretus*, In omni habitu decumbendi, nullius est majore natura egressio, nec magis æctio indecora, quam ejus qui sit in ventrem: itaque si nulla excusatio est consuetudinis nec partis assuetæ, certum est egrotum regi demerita &c. Excusatio autem hic est partis assuetæ, Ex supino enim decubitu aut ad latera, avulsio fiebat violenta & distractio pulmonum gravium à pleura cui cohærebant,

§. 6. Observavi in Nobili juvene phthisico dextram pulmonum partem magis affectam, adeo costis inviscatam, ut potius lacerata fuerit substantia ejus in aperto cadavere, quam à costis evelleretur. Ille dum viveret decubitu in partem sinistram non ferebat.

**A**ccidit cum pulmones afficiant gravis Decubitus, modo in partem affectam, modo in oppositam, juxta affectus variationem: Fit primo gravis in partem oppositam, t. cum Pulmones costis adhærent, & cum illis inviscati sunt, ita ut ex decubitu convelli videatur pars affecta; ut in dicto Juvene. Cum Pulmo tumore aliquo apostemoso afficitur, vel repletionem pituitæ, ratione cujus multum graviter in oppositam partem non fertur decubitus, ob compactionem alterius partis non affectæ: In parte vero

affecta Decubitus non fertur, cum ipse inflammatorie laborat, Et maxime si minus affecta pars pluita repleta sit: Cum vero omnes partes Pulmonum, vel saltem internæ afficiuntur, & magna sit respiracionis angustia undequaque comprimentur Ideo Decubitus secundum ullam fesse possunt, festinare coguntur, ut accidit in asthma: Si tamen affectus non sit interior, nec in omni pulmonum substantia, non solum decumbunt in quodlibet latus vel positionem *Sebastianus Nasus meth. med. Parte 2. pag. 298.*

§. 7. D. *Marcus N. (lib. 2 Tit. de difficili respirat.)* decumbere toto morbi decursu non potuit, dies noctesque in sedili transigens: Pulmones costis, verberibus & septo tam arcte cohærebant, ut violenter ab iis partibus divellendi fuerint.

§. 8. Puella annos quatuordecim nata pariebatur dolorem in summa scapula sinistra cum febre, à cujus invasione notavimus quod eum dolor prædictus in eadem parte fixus permaneret, neque ad thoracem ulla modo pertingeret, ramen non poterat in illud latus decumbere quin statim tussi corripeteretur &c. Dissecto ejus cadavere inventus est pulmo costis utrinque & diaphragmati undique adhærens, tum etiam pericardio &c. *Riverius observat. 77. centur. 1.*

§. 9. Filia D. N. febre correpta cum cardialgia &c. non poterat in sinistram latus decumbere quin statim cardialgia & tussi corripeteretur, ita ut perpetuo super latus dextrum decumbere cogeretur: Aderat etiam per intervalla dolor lateris pungens, qui magis urgebat cum ægra in latus sanum decumberet; Er contra gravior erat difficultas spirandi quando supra latus dolens decumbebat: Pulmo costis undique & diaphragmati adhærebat: Cor media sui parte fere, quæ diaphragma respicit, exesum atque ulceratum &c. *Vide Tit. de Hemoptysi.*

## OBSERVATIO III.

*Decubitus impeditus ob cavitatem thoracis sero repletam. 1. Decubitus in dextrum latus impeditus ob puris copiam in sinistro latere, Abscessus in eodem. 2. In sinistram, ob cavitatem dextram aqua plenam, Pulmonem ibidem consumptum. 3. Ob aqua libras vii. in cavitare dextra. 4. Supinus & in latera ob aquam totam repletiem. 5. 7. Supinus impeditus ob mediastini inflammationem. 6. Decubitus dexter impeditus ob copiam puris inter costas & pulmones. 8. In latera impeditus ob aquam in cavitare dextra, Pulmonem cum pleura ibi corrupta, Ventriculus tumidus. 9. Sinister ob cystis humore plenam in sinistro pectoris latere. 10. Dexter, ob propendentiam saciformem in diaphragmate. 11.*

§. 1. **H**enricus N. orthopnea laboravit, cujus occasione omnium capessere non poterat, sed semper erectus ambulare cogebatur: Capacitas thoracis sero, erat repleta, *Vide lib. 2. tit. de Dyspnoea.*

**S**ero erat repleta. ] Apud *Ballonium* lib. 1. Epid. pag. 17. Joh. Placantii vidua hydropo pulmonis laborabat, quo interit. Difficultatem spirandi per annos xxx. habebat: In dextrum latus facile decli-

nabat, in sinistram non poterat citra syncopen: Et capacitate thoracis aque libris sex putentis eductur. Hic & illic difficultas occurrit: In *Henrico* quidem, cur erectus facilius somno fenebatur, cum pon-

dere aquarum diaphragmatis motus fitti debuisset, contra decumbenti facilius esse respiratio, eo sarcina & pondere liberato: An quia ob decubitus, pulmones ejusque bronchia, sero sursum remeante, aerem facilius admiscerunt? Cui item *Placcarij* vidua (è cuius capacitate thoracis aquæ libræ sex educæ sunt, facilius in dextrum latus declinare potuit, si æqualiter aquis obrutus thorax? An forte unum tantum latus. Idque dextrum, obfessum, lasso autem forte inter disseccandum mediastino, in utrumque serum confluxit unde totum thorax occupatus credidit. An ex decubitu in sinistram latus, tota aquarum moles illuc conuult, quæ cordi molestiam peperit, eoque majorem quod aquæ illæ erant putrentes & foetida, unde *syncopei* Nuperis diebus exiit scilicet Novembri anni carentis 1673. obiit D. *Enemund*, Forensis Scriba, vir sexagenarius, qui universam Indiam Occidentalem peragraverat: Vox erat illi fusca & humilis: Laboravit ille simul phthisi, hydropæ abdominalis & thoracis: priorem duo-

§. 2. Puellus decemlevis tabidus interiit: Ante obitum citra insignem ejulatum dextro lateri incumbere non poterat: In sinistro thorace insignis puris copia deprehensa, In summa parte, eodem latere, juxta claviculam abscessus aderat ingens, tertiam cavitatis partem implens. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

**I**nsignis puris copia] Inter signa Empyematis pectoris, ejusque hydropis, recensetur *Decubitus* in sanum latus difficilis, quia materia peccans in tali patientis seu pulmones adeo comprimit, ut liberare moveri nequeat: His adijunge *Respirationem*, in inspiratione tantum difficilem, ob pulmones propter materiam collectam libere se expandere non valentes. Facilem vero in expiratione, cum materia suo

rum affectum clara erant indicia: posterioris apud me suspicio vel conjectura: Somnium, nonnulli credunt, sicut *Henricus* capessere poterat, metu imminenti suffocationis: facillime excrebat materiam purulentam, ut hinc oppressionis Pulmonum, & difficultis inspirationis causa arcessenda non videretur: Neque à mole aequatum abdomen obfidentum, mea enim opera ab illi liberatus fuit, moris illi scilicet de mechoscanna, facillime enim erat solutionis: diureticorum usum, & hepatis roborantium, adeo ut intra mensuram spatium & abdomen & tibie omnia detamuerint: De superfluo autem Hydropæ pectoris conjectura fuit, quod nihilominus stomachi oppressio acque pertinax faciebat, quæ à paucissimo cibo sustentebatur: Firmior vero accessit conjectura ex suspicio ingruente somno; & manus, aliquot ante obitum diebus, tumore oedematoso: Patente tamen in thorace demortui, nedum cada veris apertionem à vidua consequi licuit, quo res aliis dubia intellesset.

Ante obitum citra insignem ejulatum dextro lateri incumbere non poterat: In sinistro thorace insignis puris copia deprehensa, In summa parte, eodem latere, juxta claviculam abscessus aderat ingens, tertiam cavitatis partem implens. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

pondere Pulmones comprimat: Pulsus celeres, vehementes, frequentes, parvos, inæquales, inordinatos. *Febrem* prægressam cum accidentibus vehementioribus: *Insudationem* quæ interdum in thorace cavo percipitur. *Tussim*, tunc sarem empyemati conjunctam, ubi materia in bronchiis pulmonum continetur, interiori asperæ arteriæ tunicam vellicans.

§. 3. Sartor asthmace diu laboraverat: In sinistram latus cubare non poterat: In thorace cavitata dextra aquæ ad lbxv. reperio, Pulmone ex ea parte prorsus consumptio. *Vide Tit. de phthisi lib. 2.*

§. 4. N. Vidua in dextrum latus facile declinabat, in sinistram non poterat citra syncope, E capacitate thoracis aquæ libræ sex putrentis educuntur. *Ballonius Epid. lib. I. pag. 17.*

§. 5. Cachecticus difficulter spirabat, neque supinus neque in latera decumbere poterat: Thorax universus aqua cruenta repletus erat. *Vide lib. 3. tit. de Cachexia.*

§. 6. Quidam quoties quiescere supinus cupiebat, statim animo deliquit corripiebatur: Membranz in eo intersepientes maxime erant inflammatae. *Vide lib. 2. tit. de Syncope.*

§. 7. Rever. N. febre præhensus, sedens tantum & erectus spiritum ducebat: Universus illius thorax aqua pura plenus inventus & in stupenda copia. *Lib. 2. tit. de Dyspnæa.*

§. 8. Juvenis inter 6 & 7. costas vulneratur, sinistro latere: Quatuor ab acceptis vulneribus diebus, gravitas in parte percipitur, ut decumbere in dextrum latus minime posset: Ingens inventa copia puris inter thoracem & Pulmones. *Vide tit. de vulneribus.*

§. 9. Virgo febre maligna præhensa, dolores sentiebat in regione Hepatis, nulli lateri incumbere potuit: Hepar erat durum, tuberosum: Thoracis cavitata dextra aqua putrida plena: Pulmo dexter cum pleura corruptus: Ventriculus fecibus & flatibus distentus. *Vide tit. de Febribus.*

§. 10. Puella quædam ægre admodum & lente ambulabat, magna cum difficultate ascendebar, nec unquam sinistro latere prostrata jacere poterat: Aperto thorace, comperi tantum ejus dextrum latus integrum: In tertia circiter sinistri parte continebatur cystis plena liquore ctemori simili, ad quantitatem circiter trium pintarum &c. *Vide Tit. de Pectoris dolore lib. 2.*

§. 11. Puellus trinus cum dyspnæa & tussi sicca dextro lateri plurimis septimanis incumbere non potuit. In sinistra parte abdominalis obviabat magno diaphragmatis propendentia instar sacci, purulentia, è totali suppuratione sinistri lobi Pulmonis, infarcta. *Vide tit. de Febribus.*

## OBSERVATIO IV.

*Decubitus in latera impeditus ob mesenterij incrementum.* 1. Ob Jecur tumidum, hydropem pectoris. 2. Ob vomitum hepatis. 3. Ob Abscessum regioni hepatis adnatum. 4. Ob adhesum Hepatis cum diaphragmate. 5. Decubitus omnis impeditus ob hepar infarctum. Pancreas maximum. 6. Ob vitium Pancreatis. 7. In latus dextrum ob Lienem jussu majorem. 8. In latera ob Lienis magnitudinem, Pulmonis sinistri adhesionem. 9. In dextrum latus impeditus ob gradem calculum in rene dextro. 10. 11. S. Coto dolor erat in hypochondriis, lumbis &c. Supervenit tumor circa costas thoracis, post late diffusus, adeo ut dorso semper miser incumbere cogeretur: Cum pyloro indur-

duruerant pancreas & mesenterium, inque molem supra modum latam, longam & crassam exereverant, multumque ponderantem &c. *Vide lib. 3. tit. de ventris dolore.*

§. 2. Seren. Venetorum Dux febre affectus typum duplicis Tertianæ servante, inter alia symptomata difficillem habuit ad latera decubitus. Aperto cadavere Jecur fumidum repperit &c. Cavitas pectoris lb. v. circiter aquosæ materiæ continebat. xx. *Georgius Hieronym. Velschius Epigram. Observat. vij.*

§. 3. Civis Noribergensis de molesto quodam hypochondrij dextri dolore &c. conqueri cepit, neutrique lateri incurrere potuit, tamen facilius dextro atque sinistro ad quod quid ponderosi in corporis commotione perlabi sensit. &c. Aperto cadavere inventa vomica sinæ parti Hepatis connata &c. *Vide lib. 3. de Hypochond. dolore.*

§. 4. Matronæ in dextra parte, ad Hepatis regionem membranæ adnatus erat abscessus, unde in illud latus decumbere non potuit. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 5. D. N. de stomacho querebatur cum pondere, nec in latus alterutrum decumbere poterat: Hepar, quod putre, superiore parte adhærebat diaphragmati: Pulmones fere putres. *Vide tit. de ventricul. dolore lib. 3.*

§. 6. Vir Nob. dolore hypochondrij dextri per plures annos conflictus, cum ventriculi & diaphragmatis compressione: Sub morbi finem dyspnœa, dolores ejus lateris & abdominis irat vexatus, ut neque in dorsum nec in latus posset recumbere, sed cogeretur tessere in lecto. Hepar repperit magnum, multis abscessibus resectum, & materia quadam indurata: Pancreas erat admodum magnum. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnœa.*

§. 7. Juvenis à febre quartana in eas redactus angustias ut nequiverit unquam in cubili quiescere, sed vel pronus confidebat in sedili, vel caput in lecto habebat sublime, interdita ipsi quasi omni decumbendi copia &c. Huic post mortem invenit Anatome inter alia, Pancreas supra infraque ut extuberans acturgidum, sic intus sordido pure ac sordida pituita infarctum &c. *Tulpus lib. iv. Observat. cap. 32.*

§. 8. Cuidam Lien quadruplo auctor, durior repperit: Incumbebat vivus dextro hypochondrio ægerime, sinistro facilius, pondere enim lienis sentiebat intestina gravari. *Vide lib. 2. tit. de Dyspnœa.*

§. 9. Joh. N. de doloribus hypochondriorum conquestus, in neutrum latus decumbere poterat: Lien putris in magnam molem exereverat: Lobi pulmonis sinistri adhæserant costis, &c. *Vide tit. de Febris.*

§. 10. Hydropici & phthistici ren dexter in orificio ureterum grandem calculum condebant, acutum &c. alioque alibi minores & arenulas infinitas, quæ causa est quod in dextro latere æger fuerit decubitus. *Bartholinus cent. 2. hist. 37.*

§. 11. Matrona de dextri præsertim lateris dolore, ita ut nec conestum aut decubitus in illam partem ferre posset, conquerebatur &c. Mortuam cum secarem, dextrum renem tumidum in immensum increvisse deprehendi, in quo per medium dissecto calculus justæ magnitudinis exereverat, suam secundum omnino adimplens &c. *Ex Observat. Fel. Plateri.*

## OBSERVATIO V.

*Supinus Decubitus impeditur, & Status celsus molestus ob Jecur induratum, Pancreas maximum.*

§. 1. Illustri Thuanus conquerebatur de sensus ponderis ad regionem stomachalem dum stare vel ambularet: At incurvus sedens, vel in lecto recumbens, nullum aut exiguum tumorem percipiebat: Jecur illi erat induratum, rotundum, Pancreas mole & pondere Jecur æquabat. *lib. 3. tit. de ventris dolore.*

**I**Jecur erat induratum] Agnoscebat scirrhos tactu, nisi cum venter fluctibus innumere, tunc enim hepar infra testides, musculi ventris sursum elevantur à fluctibus, quæ occasione decipiunt Medici cum venter demittit, quia duritiam vel tunicam viscera involunt: Memini me vidisse quendam, qui tales tumores datos à paucis diebus ficto esse assereret, quod tunc primum apparet: Egrotantes sunt interrogandi, num gravitatem & pondus sentiant in hypochondriis, vel si dolorem sentiant circa homoplatas, aut calviculas, si in utrumque latus Decumbere possint. Nam qui tumores illos habent, non nisi super partem affectam demitti possunt aut quiescere: non in latus contrarium, vel supra dorsum. *Reed. de Jecur Practica cap. 35.*

*Pancreas mole & pondere &c.]* Cum Pancreas à ventriculo regatur, tumores, illius difficillime tactu deprehendi possunt: Non exigua tamen eorum conjectura haberi potest ex iis quæ in *Torano Realiensi* annotavit, si nempe ponderis & gravitatis sensus in regione ventriculi percipiatur, & nullus tumor ullaque densitas in hypochondriis appareant: alia tamen obstructionum latentium indicia adsint, qualia in hepatis, lienis ac mesenterii obstructionibus propolis sunt: Quibus addi possunt dolor & alia symptomata ventriculi propter viciniam partem respicientis: difficilis obsepti compressio. Quibus signis alias conjicimus nos Dom. N. scirrhum habere in Pancreate, eumque etiam tactu deprehendere potuisse.

manu ad latera ventriculi versus medium profundius adactis, cum esset valde macilentus, & duriciem in ea parte animadvertimus, quæ digitis compressa dolorem ipsi non mediocrem inferebat: Et in scrobiculi

diagnosi hoc annotavimus, in omnibus prope scrobiculis tumores hujusmodi pancreatis generati, cum in illa angustia, oppressio & gravitas in regione ventriculi præcipiatur, *Roxerius Practica lib. 13, cap. 4.*

## OBSERVATIO VI.

*Decubitus in latera & supinus impeditus ob calculum in vesica. 1. Supinus impeditus ob molem uteri. 2. 4. Ob constitutionem varicosam iliacarum venarum. 3. ob uteri molem immensam. 4. aquam in abdomine. 4.*

§. 1. Uterus exarnificatus à duobus calculis in vesica urinaria, clanculum latitantibus, coactus fuit integrum annum sedendo transigere, & continenter caput ita sublime habere, ut nunquam id lenerit ipsi in pulvinar inclinare, quin Tetano corripereetur: &c. *Tulpius lib. 3, c. 2.*

§. 2. Vidua N. venter intumuit sicut prægnanti; si antrosum propensa ventrem scarno imponens suffulciret, majorem quam ex cubatione, aut alio situ levationem sentiebat; Uterus ad libras lxxxvij. mercatorias ponderavit. *Lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 3. Mulieri venæ dux ab Iliacis ad umbilicumque ascendebant, pollicis crassitie: Secundum mulieris motum maximus fiebat fluxus & refluxus: Si supina decumberet statim syncope corripiebatur: Venæ illæ dextra & sinistra, in unum coeuntes globum, in umbilici regione terminabantur: Umbilicus ipse, aperta vena umbilicali, Jecur, continuo impulsu sanguinis percutiebat. *Vide tit. de Tumoribus.*

§. 4. Mulier querebatur de dolore ventris, lumborum & anxietatibus circa præcordia, quæ augebantur dum capite demissiore decumberet, ut semierecta continuo quiescere teneretur: Ingens aderat tumor rotundus in abdomine cum copiosa aqua; quem uterum esse cognovi ex adhærentibus illis testiculis, tubis &c. *Vide tit. de ventris dolore lib. 3.*

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QUARTI

## SECTIO VIII.

## De Arthritide, Podagra, Isehiadico dolore.

## OBSERVATIO I.

*Arthritide diu afflictorum membra affecta exesa reperia sunt.*

**I**N Arthriticis, Podagricis maxime, membra intrinsecus diuturnitate adeo perforati ductibus sinubusque oblongis angustis, atque si tincis vel xylocampis exesa essent, sectio ostendit, præsertim carnosus in locis musculorum, quorum spatia nervi, citra omnem annexum pervadant; per quæ & defluxiones, nervi ductum comitata, feruntur, à quibus & continua destillatione humoris ampliata spatia, veluti attrita, vel levi ex causa humores commotos suscipiunt; unde præcipue accidit, ut diuturna Podagra laborantes facile in hunc affectum incidant, malumque sit propter organi hoc vitium immedicabile: Impedita tamen potest ad tempus si corpus non admodum exagitetur, atque adstringentium usu, quibus membra laxata nonnihil coactantur: *Platerus Observat. lib. ij. pag. m. 510.*

**I**N Arthriticis membra intrinsecus, Locum affectionem, fluxionem Arthritidis patentem, ex capitis interioribus manantem, Articulum esse censent qui illam suscipit, illiusque inactionem sedem assequi plerique credunt; ideo quod dolor juxta articulos, eosque mobiles, potissimum sentiat, vel potius quod per motum articuli dolor augeatur: Verum cum Articulus

mobilis intrinsecus ex duorum ossium extremorum mutuo arxu comp. natur, nulloque perostio roto hoc spatio, quo invicem juncta sunt, investiant, sed cartilagine solum involucretur, nullusque nervus hæc loca subeat, & proinde hæc omnia sensu Tactus destituta penitus sint, dolor interiori hæc sede articulorum fieri nullo modo potest: Ubi neque in articulis femoris in-

terioribus, ubi licet teres ligamentum sit, cum tamen illud cartilaginum & insensibile existat, illius causa dolor aliquis in eo loco subitil potest: Deinde cum ossa in articulis adeo exacte iungantur, ut nullum spatium inane relinquatur, atque in ambitu articuli extrinsecus membranae, ligamenta illis connata ambientiaque, ea penitus occludant, ut nihil ad interiora illorum penetrare possit, quo pacto humor arthriticus gignens eo perveniret eum nulla ad hæc loca parcat via, neque vena aliqua hæc loca subeat. Præterea cum ligamenta fœdus articulum stringant, insensibilia quoque sint; vel si aliquem sensum à petiolis quibus adnascuntur, sicut aliqui putant, sumunt, illeque obtusus admodum sit, quomodo si illis articulus afficeretur, tantus dolor, ut in arthritide sit, nasceretur: Uti neque tendinum illis infectorum causa fieri potest, cum & illis vel nullum aut obcurum sensum inesse ratiis facile iudicet: Ad hæc tumor exterior prominens, & ab articulo tum regione aliquousque interum expansus, & dolor à iungendo ab articulo procul distans, alias ab eo late se extendens, in articuli structura dolorem hunc eventum minime ostendunt: Sicut & hæc quod gypsa illa materia, nodi topheque, quæ arthriticis quandoque prodeant, non semper juxta articulos, sed & aliis vicinis in locis se ostentant: & licet ipsis in articulis plerumque nascantur, illique spatio temporis ob indurata possimum ligamenta, nodosi fiant, non tamen dolorem ideo in articulum constituentibus partibus insensibilibus fieri comprobant, cum illic tandem ob causas alias accedentes nati, nisi vicinas partes sensiles afficiant & purgant, dolorem alioquin nullum afferant, sed articuli motum potius figant, illiusque formam vident, dolorem non possit nisi partis sensilis affectu causa quæ in articuli structura, uti dictum, non invenitur, evenire: Ob quam causam dolores arthriticos, non articulosum, sed illis viciniorum partium sensibilibus accidere certum est quales sunt nervi, simulque partes, ob dispersos per eas nervos nervosæ dictæ, musculi scilicet, ipsique connatæ membranae.

*Arthritici, Podagrici.* Quod hæc circa articulum regionem potius quam alibi patiuntur & afficiuntur, doloresque illic frequentius occurrant, causa est nervorum circa hæc sedes conatus, & quod eo pervenientes, in angustioribus hæc locis coerciti, certis membranis & ligamentis vincti retineantur, & ad articulum motum placent, cum alibi libere circa conentem, & recte per corpus incedant, unde & fit ut cum materia aliqua in hæc loca angustiana & curva desinit, illic facile (substantia, nervosque afficiendo dolores ejusmodi excietur: Qui dolor tamen, si humor defluxus extra articulum sedem in aliis angustis vel indirectis ductibus, per quos nervi feruntur, quoque figantur, & eo in loco tunc concurrant, ut in Coxendico dolore, qui supra illius articulum plerumque in lumbis, illic ubi quartus nervus ad cruræ descendens, è cavitate coxendicis extorsio reflexus curvatur, hærente humore evenit: scilicet, postea quæ alteri s' desinente eo, sedem mutare, & nunc circa coxæ, nunc circa genu articulum in poplite, ad quem hic nervus pervadit, nunc in pede magis afficitur: Quod & si in homoplata sit dolor, hac ratione sæpe contingente consuevit: uti & si copiosa sit materia, non uno loco, sed diversis hærete atque affligere & illis quoque in angustis ubi nervi per ossium foramina transeunt, ut in spina dorsi, maximeque ubi reticularis nervorum plexus juxta cervicem in brachia, & juxta lumbos in crura nervos promit, facile subsistit doloresque movere. *Placemus Praxensi lib. 2. cap. 16.*

P. 382.

*Continua defluxione humoris* Quæ sit natura humoris Arthriticæ patientis variæ sunt sententiæ, quas ad examen revocat Excel. *Willis Tract. de Acuma Brul. parte 2. cap. 14.* Materies morbifica, ait, videtur

nec Sanguis, nec succus Nervorum per se esse: Nec etiam unicus aut simplex humor ab eorum alterutro depositus, Sanguinem ab hoc censu merito eximimus, quia dolores isti corpora, ut plurimum exanguia, easque fere tantum læstunt: Nam licet in vicinia ob impedimentum sanguinis cursum tumor sine phlogosi interdum eveniat, tamen ille non morbus sed tympanoma est, atque arthritidi plenamque supervenit: Porro tumores podagrici raro aut nunquam suppurant, quod certe indicio est nequaquam eos à sanguine ob plenitudinem propriam aut ferocem extravasato, sed in circuitu, ob partium nervosarum contragiones, impedito procedere. Porro *succus nervorum*, (nempeque acris aut acidus, videlicet pungitivus vel vellens suppurans, dolores arthriticos per se non excitare constat, quia tunc affectus quoque in aliis quibusque partium nervosarum ductibus, ac in ossium intermediis dolores accerteret.

Propter eandem rationem improbabile est humorem, aut materiem quamvis singularem excrementitiam aut superfluum à singulis vel succo nervo depositam, dolores arthriticos inferre: Quippe si talis solutimodo per nervos diffunderetur, non primò in pede aut articulari extremis, verum in toto itinere, nervosum genus irritando, dolorificas molestias seriatim & tractu continuo excitaret. Quod si juxta *H. Berni, Sennerii* &c. sententias statueret *impuritates* qualesdam à sanguine effervescente deciduas, & ab articulis susceptas, insu suo Podagrici causam materiale non esse, tunc sequeretur omnes qui arthriticis affectibus sunt maxime obnoxii, etiam in sanguinis effervescentias febiles maxime potestives esse, atque effervescentiam febilem morbi illius quemque insultum precedere, quorum neutrum vitari esse observatio, communis testatur. Nam Arthritici, quasi cum privilegio (nempe ob salinas humorum dyscrasias) ad hæc febiles immunes habentur: Porro insultus arthritici, absque sanguinis turgescentia itumini aut ebullitione (sepiè me improvise extorantur, & statim ab initio atroces sunt. Quod etiam arguit materiem morbosam, haud sensim in parte affecta, velut in minera deponi, & dein plenitudinem suam excitare dolores: Ita namque si haberet, morbi initia & incrementa se per gradatam facta, & longiora & durabiliora magis essent, neque affectus, (uti crebro assollet) statim vehemens, subinde sedem suam mutaret, atque brevi in uno loco evanescens, mox emergeret in alio.

Cum itaque humor quilibet singularis (qualicumque supponitur esse) pro insultu arthritici apparatur haud satis efficax videtur, statuumus oportere, in morbi hujus foco, sive minera, (sive unica sive multiplex fuerit) *succos plures fermentatos* & non facile miscibiles curæ, dein ex eorum luctu & effervescencia fibrarum nervosarum vellicationes dolorificas exorti. Sed siquidem experimento satis vulgari liquet *Sales* in statu diversissimo positos, alios nempe, à kalis, atque, aliosque fluorem adeptos, sive acetosos invicem commixtos, admodum ebullire & effervescente, eorum humiditate in coagulatum album & densiusculum facessente, prout instantia nobissum, quando Spiritus Vitrioli olei tartari affunditur, manifestum liquet, Quidni patet, simile quidpiam in paroxysmis arthriticis fieri potuisse? Nempe à liquorum quæ sunt diversæ indolis salinæ, punga & murio conflictu fibras nervos acriter pungi & irritari, & demum à variis utriusque succi coagulationibus *meturiam taphracem* calculosam in locis affectis interdum congeri.

Ut geninam arthriticis materiem apte designaremus, hoc referri oportuit quæ alibi de Paniam solutimodo nobis dicta sunt. Enim vero in muris illud tum sanguinem tum Liquorem nervum tributa sua confectæ ostendimus: Nempe cum succus

nutritus ē sanguine per arterias ad omnes totius corporis partes deferuntur, liquorem alterum à cerebro per nervos eorumque appendices dispositum, priorem istum acturare, & velut spiritum affiatu proinde ut forandus, & quasi fertilis factus, in partis alendae poros & meatus facillius insinatur, ejusque substantiae assimilatur. Quae super his olim differimus, hic non repetemus quod spectat ad rem puerilem, advenimus humorem nutritivum à sanguine distributum, ē spiritu pauxillo, aqua, terra & sulphure copiosis, atque salis aliquatenus volatilisari modico consistere: porro dum materia nutritiva distribuitur, si quidem particulae ejus cuique parti alendae proportionari, & juxta ipsam manere debent, idcirco dum spiritus est cerebro, & sulphurea carni, parenchymatis & pinguedini destinantur, maxime salinas & fixiores circa ossium internodia deponi, sique dein, liquore nervo fecundante, assimilari oportet.

Quod si ob sanguinis dyscrasiam viscosam, particulas supra modum salinas & fixas in articulis deponi contingeret, illae ob incongruitatem, sive mineram quandam morbificam accrescerent: Artaem non propterea paroxysmus arthriticus, sed membri affecti gravitas solum & languor excitari solent, quae sepe numero abstinenda, aut exercitio, aut phannacia tolluntur, particulis extraneis discussis, vel in sanguinem resolutis.

Sic vero liquoris nervi à volatilitate in fluorem acerbum sive acetosum degeneris, particulae fluxionibus subinde exaritis & uberi nimis copia in articulis descendunt, quatenus ibidem aliae cum minera salina, sive liviali prius aggelata effervescent, paroxysmus arthriticus ciet.

Itaque materies salina, sive vitata, à sanguine arterioso circa ossium intercapedines deposita, morbi hujus quasi semen femininum est, quod tamen, ubi licet copia aggestum, per se infuscandum profusum (quasi ovum tubventaneum existit, donec liquor nutritivus turgescens, recrementa acetosa de se decidua in prioris focum dimittit, quae velut semen masculinum, mox alterum prolificum reddunt: Nam in quantum binae istae particulae, quae diversi status & originis sunt, occurrunt & mutuo congrediuntur, membranarum ac tendinum fibras vellunt, adeoque paroxysmum arthriticum ciet, cujus sedatio à particularum utriusque generis acrimia mutua subactione & dissipatione omnino dependet.

Quoad causas procatarticas, has dicimus esse *Materiam salinam* ē sanguine in articulis depositam, atque *recrementa acetosa* ē *liquore nervos* in eundem locum demissa.

Primo itaque mineram ejusmodi salinam circa ossium intercapedines deponi, plane arguitur à subito ac improvviso morbi insulso, ejusque solutione difficili, quippe materies haud simul ac semel tam uberi copia in locum affectum influeret, & paroxysmum ita gravem ac diuturnum excitare posset: praeterea si quidem dolores intra assuetum usque focum reperunt, videtur eorum fatiatio ab ovo alibi praedispósito certissime pendere: Quod autem materies ista non sit in se extrema titia, sed succi nutritivi verus solum fixam degeneris portio, partibus ibidem offeis destinata, consistere licebit quoniam humor mure excrementibus loco affecto molestiam contrahit & tumorem inferret: Insuper hoc plane convincitur ab Arthritidis curatione per torturam aut amputationem adhibita quippe aeth. res fide digni in scriptis referunt membro cui egrotum insidere solebat, amputato, an graviter vulnere, morbum sine recidiva cessasse: pariter quidem ac odontalgia gravissima ac diuturna aeth. dente evulso saepissime curatur.

Quod si humor arthriticus (ut vulgo ferunt) biliosus, aut pituitosus aliove mure excrementitius esset, ille mox ad alium membrum postquam prius affectum amputaretur affluens, mineram ibi morbificam novam excitaret, hoc autem in articulis quibuscumque afflicti solummodo contingit, quatenus pars haec vel illa debilis facta porciones quasque feculentiores facillius in se admittit, & sique neque assimilans, nec amandans, in mineram morbificam accrescere sinit: Porro in eandem partem, ob debilitatem ejus, etiam humoris nervi recrementa acetosa promptius decumbunt.

Ceterum ad morbi hujus procatartem salinam in articulis jaciendam, haud tantum membri affecti debilitas, sed longe potius sanguinis dyscrasia coartat, utriusque rationis & sciendi modos expendamus.

Et i. Sanguinis culpa est, quod elementares particulae, & praesertim salinae, in statu idoneo non fuerint: Illae nimirum intra massam sanguineam media inter fixitatem & volatilitatem constitutionis esse debent: Fixae dicuntur quando sulphuri ac terrae combinatae, his penitus adherent, prout observare est in urina recenti ac cruda, & quae per distillationem nec salem neque spiritum facili proliciunt. Atque particulae salinae volatilizantur, quando sulphure acetata relictis spiritibus adherent, cumque ipsae avolant uti cernitur in spiritu urinae post longam digestionem distillatio: Dein media inter has constitutio est, quando particulae salinae à particulis sulphureis & terrestribus laxantur adeo & distillantur ut data occasione à spiritibus facili apprehendi ac una ascendere possint, sicut habet in urina per digestionem putrefacta, à qua levissimo calore spiritum & salem utrobis: Partes in corpore animato particulae salinae intra chylum in fixis gradibus esse videntur, & quo tamen per coctionem in viceribus rite peracti in paululum evadere incipiunt; in succo nervoso istae volatilizantur, atque in massa sanguinea constitutionis mediae sunt, nempe, quae circulatione diuturna, vel digestionem exsiccantur adeo, & quodammodo volatiles fiunt, ut partium particulis spirituosissimis afficiantur, cumque in cerebrum exsiliant in spiritus animales evadant, partemque in succum nutritivum una cum sulphureis aliisque abeuntibus partibus solidis inter alendum accrescant.

Quod spectat ad causas Evidentes, de quibus *Liquor nutritivus* ē sanguine articulis allatus, *salem fixum* nimis imbutur, & ob quas haec partes ad suscipiendam quodvis improporcionatum est nimis promptae actiones evadunt, illarum precipuas, cum variae ac multiplices fuerint hic breviter perstringemus.

*Levi ex causa humores commotos suscipiunt* Dispositio haereditaria primo utramque labem producere solet; quippe arthritici ut plurimum gigonum arthriticos, atque morbus hic à patribus in ueros descendens, in utroque non modo partes finit, & circa eandem aetatis periodos maturatas habere solet, sed praeprimis in eisdem membris primas radices agit & similes ubique progressus observat.

2. Ceterum vero Diathesis arthritica, absque lae originali saepe ob malam victus rationem & errata in sex non naturalibus inferuntur. Nam qui crapulam indulgent, atque immodice in alimentis salis vescuntur facile hunc morbum contrahunt, etenim hoc ritu chylus nonnihil indigestus, atque particulis effertis & indoneis praeditus, in viceribus paratur; dein à largiori vi potu crassamenta salia & faeculentia heterogenea, quae alioquin in primis vis subsisterent, nimis exaltata, in sanguinem deferuntur, quibus in viceribus enormitatibus si otium & alia accedant, proinde ut nec superfluentes exhalant, nec improporcionales salinae, quo

quo minus circa articulos subsidere possint, ab exercitio diffidentur, cetero plus nimis seminis hujus afflicti in uberes morbi Articularis segetem confertur.

3. *Articularum debilitas & dispositio arthritica*, non tantum hereditaria, sed ob varias occasiones crebro excitatur; Materia morbifica decubitus hanc sepe inducit, nam si forte contigerit in hac aut illa parte primum arthritidis paroxysmum extitisse, postea postea membrum humor peccans facillius decumbet, & brevi quasi nidum suum, ubi ova condunt deponantur, continuat: Præterea item solutio continui non à frigore, madore &c., non rito arthritici diathesis ciet.

II. At vero ut sanguis minieram salinam pro semine morbo confertur, & articuli eam prompte suscipiunt & recondant, hic tamen apparatus absque seminis alterius accessu, nisi rovi subventanei omnino stans & infundendus pensatur, quia ad morbum hunc in actu constituendum, & requisitum ut liquor *acetosus*, forte turgescens, imparitates salinas alterius conditionis, nempe *acetosæ*, effervescencia quadam deciduas, mineræ priori quasi succedendum suffundat: Quare alteram morbi arthritici procatarsin in humore nerveo, ejusque *affluxionibus acetosis* statuere visum est: Et quidem liquoris hujus particulas salinas, à volatilitatione in fluorem degeneres, acidi evadere pluribus instantiis & rationibus, tum olim sæpius, tum supra, hoc in tractatu, ostendimus. Attamen ad morbi hujus apparatus, non requiritur totam sacci nervei massam continere acetosam, evadere, Verum sufficit ejus, vel portiones in cerebro, aut alicubi in nervoso genere depravatas, vel recrementis hic illic deposita, ejusmodi indolem contraxisse, à quibus postea turgescitibus, cum particula ad minieram salinam in articulis reconditam accurram, modo prædicto paroxysmum arthriticum ciet. Enim vero fluxiones acetosæ, ab humore nerveo profectas, crebro accidere experimento notabili manifeste liquet, videlicet frequenter adverti, Nervosi generis pathematis obnoxios, quandoque levem in toto corpore rigorem (qui partium omnium fere nervosarum corrugatio est) passos fuisse, & deinde strim affectionem ipsammodi am successisse, quo tempore urina valde copiosa & limpida, quæ saporis livialis aut nitrosi (quem alias semper habuit) expe-rit, valde acetosa, quasi merum acrum esset, reddebatur: indicio sane luculento humorem in partibus nervis, ad plenitudinem aggestum, & turgescencia oborta commotum, affectiones spasmodicas intulisse, cumque istius portio exundans in glandulis deponeretur, mox illinc venarum, aut lymphæductuum

commearu in sanguinem reducta, urinae acetosæ profluvium excitabat: Pariter equidem ab eodem humore in minore copia turgescere, ac usque intra ductus nervos manente, intraque articulos subsidente, insulps arthriticos exoriri putamus: Profecto materiz arthritice partem à cerebro & nervis procedere argumentum est, quod plerique huic morbo obnoxij, cum paulo ante paroxysmum de capitis gravitate & hebetudine cum vertigine & somnolentia querantur, quamprimum dolores arthriticos pari incipiunt, velut nubibus à cerebri discussis, ingenio mox libere, cum magno & insolito acumine fruantur: Præterea cum morbi hujus inveterati quandoque plures sunt minieræ salinæ, in diversis membris dispositæ, observare est dolores ut plurimum loca superiora primo invadere, & dein gradatim ad reliqua descendere quare cum initio forsitan vertebrae cervicis laborant, mox brevi postea scapulas, auralia brachij membra, dein lumbos aut ischiada, ac ultimo cunctos articulos, primo hos, dein illos inferiores morbus occupabit.

*Continua defluatione humoris ampliata spatia, veluti attrita*: Sic Gutta cavat lapidem non vi sed sæpe cadendo: At præter defluxionis assiduitatem & frequentiam, sed & humoris illabentis insignem acrimoniam, ab admixtis salibus pendente incusare oportet, quæ sinus in partibus excaver, atque sinibus vel xylocampis exesa essent: hinc A. Parva venenata, maligna & occultam materiz qualitatem agnoscat, non simplicem humoris intemperiem.

*Spatia per quæ defluxiones feruntur.* ] Partis recipientis & deducantis dispositio plurimum facit ut in hanc vel illam partem defluxio potius cadat, sæpeque redeat: Talis est viarum nervis alioquin & reliquis vasibus, quæ cum nervis corpus pervadunt, destinatarum, sediumque, quæ circa articulos sunt nimia laxitas: tum ab ortu insitis de causis à parentibus eventis, consueque una quod hereditarius sit affectus, tum etiam aliis de causis, & à morbis, tum maxime ob continuum defluxum, sæpeque redeuntem, viasque pervadentem & dilatantem contracta, unde fit ut per ejusmodi ampliatas vias & laxas, humor licet non tanta copia, quæ alioquin reperitur, congestus, vel leviter commotus facile defluat & consueta hæc vias reperat, Et cum ad extrema usque articulorum perferri potius quàm in viis intermediis subsistat defluxio, viis sic laxis existentibus, oleat, illicque retenta loca hæc non solum relaxare, sed & sensim separando ab invicem veluti excavare, ideo evenit ut podagra & chiragra frequentiores cæteris sint speciebus. *Platerus l. c.*

## OBSERVATIO II.

*Humor arthritidis parens intra articularum cavitates non concluditur.*

ILLud absurdum humorem Arthritidis de cerebro duci, quia eum insuper credunt in medias artuum cavitates perveni: Quæ vis hunc agitat? oppositæ sunt multæ partes quibus ejusmodi iter penitus obseptum est: Non desunt quidem cerebri humorem negant subsidere in subjectas cavitates artuum, at cum contendunt eo penetrare, quem vasa sanguinis, Arthritide oriente, exudare putantur, Verum illa ad *artuum cavernas* haud ita pertingunt ut ille humor in eas demitti queat: Quid multa? Nec in defunctorum articulis illa humoris sedes notari potest. *Schneiderus l. de Catarrhis special. p. 548.*

*In articulis* ) Humor hic qui est causa continens, non consistit in eo spatio, seu ea cavitate, quæ constituitur duo ossium extrema, quando sibi invicem compinguntur (quemadmodum mulci hæc emulsi formantur) sed fere semper in membranis, tendinibus ac vinculis externis, à periosio originem

suam habentibus, ossium extrema ac musculorum tendines necessitibus: Idque cognoscitur manifesta sic se habere ex nodosa podagra ac chiragra, in qua topus, seu humor in calculeum concretus, aperta ruperave cute plerumque eruitur à digitorum articulis, externo vinculo, ut scribit *Fernelius*, integro atque il-



leso: praeterea si materia in cavitatem internam articuli fluere, nullas vel admodum obfus excitaretur dolor, quod hoc vinculum nebens interius ossium duo extrema ex osse oritur, nullumque sensum habeat. & ideo, quia cum ossis cartilagine connascitur, *χρησινδρυστον* nomen apud Graecos accepit: *Adrianus Spigelius lib. de Arthrit.* Arthriticus tumor cubiti saepe me spectante apertus fuit, Aeger cunctum

brachium semper movere potuit: quare humor se in medios artus haud fudit. Nonnunquam quoque unicus tantum musculus in corpore hominis arthritici inflammatur, cute integra, nec in ea ullum apparet vestigium inflammationis: eo loco si tangitur cutis, dolor fit gravior: nimirum intelligendum est humorem haud ipsius intervallum artuum (subire *Schneiderus l.c.*

*Nova & ingeniosa de Loco affecto in Arthritide ejusque causis Dissertatio, in qua Veterum & Recentiorum sententia ad examen revocantur, Viri Clar. I. Iar. Harderi, Medicinae Doctoris & in Academia patria Basileensi Philosophiae Professoris.*

**A** Rthritis *ῥευματισμός*, unde etiam nomine *ῥευματισμός* *ἰσχυρὸς* Hippocr. Sect. 4. aph. 44. & 45. venit, Dolor est ex intervallis ferè invadeas, notante Fernel. l. 6. de part. morbis & Sympto. c. xvlij. Hujus *subiectum* sunt articuli, patiuntur autem respectu partium quibus investiantur, vel etiam, quæ in illos inseruntur, maxime sensibilibus, quales sunt partes nervosæ, periostium, membranae, tendines imo & ligamenta, quibus ipsi Veteres suum faciliè largiuntur assensum: uti etiam quoad *Morbum*, quæ nomine doloris satis explicatum ipse dem putant. Ast in causis hallucinati esse videntur: Fernel. *proximam continentemque* omnis Arthritidis ac doloris causam esse dicit, non ullam *simplicem intemperiem*, sed humorem p. n. infixum & adhaerentem, huncque nunquam ite admodum rårò in id *cavum* ac *spatium* penetrare, quod inter ossium extrema intervenit, sed *vincula* duntaxat, easque *membranas* quæ extrinsecus ossium extrema neunt & ambiunt: hoc sane argumento, quod in nodosa, tophaceo podagrâ atque Chiragrâ, humor in calculum jam concretus, aperta ruptave cute, plerumque eruitur è digitorum articulis, vinculo integro ac illæso: Et in *schiade* si noxius humor in *coxendicis pyxidem* conditus esset, nec tam vehementem, quod vinculum obruti sit sensus, nec tam latè diffusum dolorem inveheret: Neque porro humor hic, *continens arthritidis causam*, tam rarus atque traditur existit, nec enim *sanguineus*, nec *biliosus* nec *melancholicus*, unquam est, sed omnino vel *pituitosus* vel *serosus*, & *Senten. eand. fovet. River. c. de Arthrit. Capivacc. l. 5. Med. Praecl. Pituitam & sanguinem solum agnoscit, bilem autem nimis mordacem esse ait, & Melanch. minori copia generari, quod & alij veterum dogmatum scellatores ajunt.* In quibus verbis Vir hic insignis plura habet, quæ de humoris natura, huic malo produciendo idonei, quæ etiam de parte specialiter affecta: Et quidem quo ad prius attinet, facile cum ipso consentiant Recentiores, humorem p. n. infixum & adhaerentem arthritidis causam continentem esse: Sed in hoc difficultas erit, qualis sit hic humor qui arthritidem efficiat, & annon etiam ossium sese inferat interapedini: Ossium cavo se insinuare humorem arthriticum, & experientia & ratio testatur: Ista quidem, quia in duobus juvenibus quorum alter arthritide scorbutica laborabat, alter affectu eodem, ex inordinata Venere contracto, observavi tophos, non tantum ossium superfisiebibus adhaerentes, sed ipsissimæ harum cavitati, cum summo dolore, quæ infixi: neque etiam hi circa internodia conspicui de alio quam de materia fixa, ossium cavitati inhzrente, testari videntur: Hac verò, quoniam materia, quæ pro ossium nutritione affertur per arterias, quæque degenerating & aggesta, hujus mali causa est, in membranas vel vincula, non tantum effunditur, vel ossibus leviter extrinsecus apponitur, quin in horum ipsorum substantiam quoquo modo pergit: Imo supposita superficiali appositione nutrimenti, hæc ne propterea impediat hujus ipsius circa ossium articulationes mutuas insinuationem, pro horum capitulis nutriendis: Sane vel hoc *animo* statuere necesse erit, vel dicendum causam continentem in ipso etiam ossium cavo hætere, quo tamen periostii vellicationi, ab hac effervescente & ferosiente oriundæ, nihil adimitur.

Ad ipsius autem humoris naturam & genium, quod spectat, varia hic eurgunt incommoda: Etenim dicere humorem p. n. infixum, causam continentem arthritidis, hunc tamen vel *sanguineum*, vel quod magis est, *biliosum* vel *melancholicum* non esse, minus facile capi potest.

Si humorum naturam lustrare placeat, reperiemus humorem biliosum multo majori jure, præ pituitoso & seroso, primas sibi vendicare, ut de melancholico taceam: Sed novi quò tendat Vir hic Clariss. Nempe humores excrementitios pro causa hujus mali accusat, à capite præcipuè, vel aliis partibus, ad articulos deponi solitos: Ast si, hi humores arthritidis sunt causa continens, quis sit quod, membro aliquo amputato, malum hoc in quibusdam planè non amplius, in quibusdam rarius ingruit, cum tamen materia morbifica non deficiat, vel ullum hæc obijciatur obstaculum: quin via ad aliud membrum arrepta, ibi malum idem fovere & producere possit, imò quod plus est, talis materia pituitosa, juxta nervos, notante Fernel, à capite ad articulos amandata, & quidem incongrua, per totum suum iter rursus dare deberet, neque tantum in articulis dolores ciere: Iam autem constat malum hoc subita-

subitaneo insultu ægrum prehendere: Taceo quod humor pituitosus, adeo efforæ naturæ, vel secundum ipsos Veteres, non sit ut tantas effervescentias, tamque immanes effusions circa articulos producere possit: *Calculosa* quoque, de qua Fernel. agit *dispositio*, alium plane humorem sibi postulat: Rejeto proin humore *pituitoso*, quid de *seroso* dicendum: Minus in hoc exorbitare videtur: Cum enim certissimum sit serum partibus constare Salinis, à sanguine ipsi incoctis, hocque *exiguat* respo-  
nere sancturum, ad singulas partes pergere necessum habeat, & in ossibus insuper materia Salina, (ut infra dicam) pro horum nutritione deponatur, non adeo à vero abluat, serum hocce partibus Salinis degeneribus impregnatum, copia harum circa ossium internodia deponitur: causam arthritidis proximam fieri: Quod aliàs Galenici nomine *seri falsi* interpretantur: Sed nec hæc dixisse sufficit, Attoces arthriticorum dolores adhuc alia efflagitant.

Hollertius in Scholiis ad cap. 23. l. 1. de morb. intern. paulò melius de arthritidis sede, & etiam causis sensisse videtur: Etenim quantum ad illam, *necessum esse ait, ut infra ipsum articulum causa contineatur, antequam vere dicatur arthritidis, neque humorem per carnes, partesque circumjacentes diffusum, sufficere*: Ad has verò, quantum spectat, *Dolorem vehementissimum excitari*, inquit, *si qua materia illuc intercipiatur, sive acrimonia, ut bilis, sive frigiditate, ut pituita, sive asperitate, ut gypsea, peccant, & in quibus etiam si ad ipsam veritatem proximè non accesserit, tamen in eo egit optimè*, quod hujus mali fomitem *materiam quandam acrem & irritantem* agnovit, *bilemque hanc ad rem valdè idoneam esse existimavit*, non quidem quasi adstipularetur falsæ ejus hypothæsi, quod in effervescentijs febrilibus ed amandata, hoc peragat, sed quia natura bilis tali effectui producendo aptissima est:

Adhuc magis cardinem controversiæ tangit Celeberr. Sylvius, qui lib. 1. prax. Medic. cap. xxx. inquit. *Arthriticas felices quæro in succo pancreatico ita corrupto, ut articulis potissimum sit infusus, sive acrimonia sit, ut, quod frequentissimum, insigni, bilem, cum qua vitiose effervesceat, una secum eo deducat, & dolorem atrocissimum producat sive minus acer, atque pituitam viscidam, non itum bilem acrem offendens ab eadem assumpta, plurimum ebundatur, atque Tumore adematoso, quam dolore acuto affecta partis motum potius impediat*: Ex quibus verbis haud obscurè colligere licet, *Virum* hunc ad arthritidem producendam, Salia diversi generis postulasse, unde *succum pancreaticum*, qui acidus, cum bile, quæ alcali est, conjungit, Neque in hac hypothæsi erravit, revera enim ex acidis cum alkali commixtione & effervescentia oritur, & precipitatio subsequitur, quod utrumque in arthritide observare licet: Ast quum *succi pancreatici*, cum bile & pituita ad singulas partes deductio, nondum omnino sit recepta vel probata, neque etiam facile sit concipere; in quo *succi* hujus corruptio talis consistat, quæ articulis potissimum sit infusa, & non alias, propter corruptionem eandem in corpore turbas det vehementes, nec huius sententiæ adhuc adstipulandum, Sed quid alij præterea Viri sagacissimi sentiant inquirendum, inter quos præcipue emicat Ingeniosiss. Willisius, qui in cap. de arthrit. proximè ad veritatem accessit, dum *statuere*, inquit, *oportet in morbi hujus foro sive minera, succos fermentativos, & non facile miscibiles, coire*: *Succi* hi fermentativi, sunt *Salia diverſi generis*, alia quidem *fixa & alkalifata*, alia *acescentia*, in fluxorem evecta, ex quibus combinatis effervescentia oritur insignis, unde *articuli & internodia* vellicantur, summiq; oboriantur cruciatus, *precipitatione* post subsequente, unde *sophorum* progenies.

Dico itaque deponi naturaliter, circa cartilicos & ossium internodia, materiam quandam Salinam, (quam alkalisatam Cl. Willis, bene vocat,) pro horum nutritione, & quidem ipsi Veteres ossibus nutriendis, *materiem terrestrem aptissimam* dixerunt, proptereaque illud *melancholiam* destinaverunt: *Materia* hæc, si nimis *fixa*, & inter volatilis & fixum medium non fervet, circa ossium internodia deponitur, horum cavum, vel difficile, vel non subintrat, sed aggeritur & cumuletur: huic si postmodum accedit *liquor acidus*, magna oboritur lucta: *Acidum* enim cum *alkali* commixtum effervesceat, uti experientia testatur. Illud modo superesse videtur unde *acidum*, quod cum materia hac Salina commisceatur, suppediretur: Nodus non facilis solutus: Equidem si *Willisij* placeret annuere opinioni, res jam esset decisa, cum in *liquorem nervæum* acescentem, præcipuam ille conjiciat culpam: Veluti majori lite adhuc consistendum habet cum turba, quam *Sylvij* *Succus pancreaticus*: hujus enim existentia tantopere non amplius in dubium vocatur, propter defectum ex pancreate manifestum, illius autem maximè, paucique sunt quibus adeò felicibus esse licuit, ut liquorem nervæum colligere potuerint vel videre: *Succi pancreatici* cum bile ad articulos depositionem, summe dubiam & disputabilem esse supra monuimus: Unde quid in hac Authorum litigatione sentiendum, ambigui merito hæremus: nihilominus priori sententiæ quæestionem melius decidi posse ærumantes, si nempe, quæ Clariss. hic *Vir de liquore nervæo* degenerare intellexit, nos de spirituum animalium dyscrasia acescente intelligamus, quæ sententiæ suo non caret fundamento: neque enim spiritibus, ut potè ex sanguine temperato progenitis

temperiem attribuere, absurdum iudico, quicquid demum alij obganniant, Hanc autem esse Salem volatilem, vel ipsa ætherea spirituum natura, à Veteribus hisce adscripta, sufficienter probat, Si hæc in acescentem transit, (transit autem facile) in semen masculinum, pro feminini, circa articulos depositi, fecundatione, maxime congruum: Dico transire facile, quoniam massa sanguinea salino fixa existente, spiritus animales destituti volatili, quod sibi pro sua natura adsciscunt, & quo quasi nutriuntur, à volatilitate in fluorem degenerare, si que acidam naturam induere necesse habent. Hanc autem spirituum *transformationem* esse accusandam, probatur ex dolore capitis, vertigine, aliisque symptomatibus, quæ plerumque paroxysmos arthriticorum præcedere solent, quæque symptomata forte Fernel. moverunt, ut omnem arthritidem à capite derivari: Probatur dehinc ex cura, quæ volatilisantibus præcipue, diaphoreticis & diureticis, hisque quæ acidi cum alkali vitiosas commixtiones corrigunt & tollunt (Salia nîm. prius ab acido ligata, massæ sanguineæ restituendo) perficitur.

De causa antecedente arthritidis prolixior mihi esse non licet, ne in librum excrescat epistola: In hereditaria dispositione, causa antecedens multa inquisitione opus non habet, semina enim Salina copiose in utero massæ sanguineæ communicata, de hac satis testantur: Ad acquisitam autem plurimum contribunt errores, qui in sex rebus non naturalibus committi solent, de quibus singulis videri possunt authores: Hoc unicum coronidis loco subsidio, ipsos Veteres per materiam tephaceam, sententiam nostram insigniter confirmasse, etenim, quam illam naturam aliam, si non Salinam, redolet, neque enim pituita, proutcunque viscida concipitur, in tales tophos, calculis omnino similes concresecere neque quodnam illud sit, quod concretionem hanc, (quam nos per precipitationem ab acido factam ad sensum explicamus) efficiat monstrari potest: gelatinosa facilius fiet pituita, quam calculesa: Melius adhuc egerunt illi, qui humorem biliosum accusarunt, quia & choleriæ dispositio & huius ipsius humoris natura, de qua superius, semen huic malo semineum proximè & remote conferunt: Sunt quidem haud pauci, qui bilem alkali continere negant, sed præperam, vidimus siquidem hac ipsa septimana, bilem bubulam, affuso spiritu nitri, & ol. Sulph. coagulum in fundo exhibere, quod affusione Salis urinæ. Vel ol. Tartari minime habere licuit: Id adhuc mirari subit, unde pus in abscessibus arthriticis vel podagricorum, aëri expositum, in calculos concresecat, hocque Galen. adjumentum asserre posset, humorem vid. quemcunque, etiam absque acidi commixtione, coagulari posse: At facile rem solvent ij, quicunque ipsum aerem acido constare ajunt, à quo hic effectus producat, neque enim vel spiritus nitri destituitur acido, aërem autem nitrosum esse quis negabit?

## OBSERVATIO III.

## Calculi ex articulis erui.

**M**irum non est calculos in Articulis fieri, quorum multos, disruptis articulorum juncturis, meis oculis vidi. *Schneiderus l. de catarrhis special. p. 608.*

**M**irum non est calculus ] Arenulas Platerus lib. Observ. in hepate deprehendit: Apud *Johann. Matthæum* in consil. Tartarus, seu calculus, non solum in renibus & vesica, sed partibus etiam principalibus sedem figit, quod *Fachsius* erudite monuit: *Maximilianus* ij. Imperator, qui Podagra laboraverat, in ipso corde calculos habuit, qui post obitum

reperi fuerunt: *Dom. de Palveiller* in capite & vesica felle calculos habuit: In renibus *Alberti Ducis Bavariz* magni calculi reperi fuerunt: *Strauborgius Michael Baurer*, calculos ex pulmone per os ejecit: mirum igitur calculos quoque in articulis fieri? *Idem.*

## OBSERVATIO IV.

## In quodam Arthritico summa Renum flacciditas &amp; exilitas reperta.

**I**llustr. N. doloribus Arthriticis diu multumque fuit affectus, tandem in Isteritiam & Hydropem incidit lethalem.

Defuncti corpore aperto, Renes flaccidi & adeo parvi inventi, ut magnitudinem ancis juglandis vix æquarent. *B. Timæus Observat. lib. 3. cap. xxviii.*

**H**inc conjicio Arthritidis, juxta & Ascitæ causam in renibus potissimum fuisse, quatenus ob vitiosam constitutionem serosum humorem minus sufficienter attrahere, secretare & excernere valuerunt: urinas enim reddidit paucissimas, etsi largius biberet. *Idem.*

**Renēs** ] Arthritis cum Nephritide necessitudinem adeo conjunctam habet, ut utriusque affectus, quasi ejusdem originis essent, sæpius concurrant: quippe nullas fere illo morbo laborat, quin etiam huic obnoxius reperitur: Porro inveterata Arthritis concretionem lapideam in articulis, quales Nephritis in renibus

libet excitare solet, hinc verisimillimum existimo Nephritin à simili, seu potius eadem causa quam pro arthritide assignavimus, exoriri nampe materiam istam fixam, à sanguine in renibus depositam, cum humore acido per ductus nerveos illic subsidente, effervescente, & ob id dolores nephriticos crebro sentiendi, dein ab utraque materia, post effervescentiam coagulatur, calculum formati. *Willis loco citato.*

*Tandem in Ileritiam & hydropem incidit.* In interitum accidit ob materiam arthriticam fluxiones suppreffas, aut repercussas, modo ventriculi aut viscerum abdominis Termina, modo Dysphoezia, Asthma, aut solve pectoris affectus quandoque etiam Apoplexiam, aut solve morbos soporosos aut convulsivos excutit: Ex quibus observatis obvium erit obijcere Arthritidis mineram non ejusmodi esse ac modo descripsimus, quia pars ejus salina, cum eadem sit quae articulis nutriendis destinatur, exinde depelli, aut alio deferri vel deponi nequit: dein quoad partem alteram, nempe *Semineum acidum* in loco assuetum depositum, videtur illud haud facile reperiendi posse, atque per se aut in via suppreffum, aut alio

translatum parti cuiuspiam haud valde nociturum: Verum enim vero, facile erit his referre, materiam arthriticam portionem acerosam, per ductus nerveos affinentem, repelli aut supprimi posse, eamque aliis partibus suffusam mala saepe gravissima excitare: Profecto *Liquor nervosus*, ejusque secreta, cum partibus valde subtilibus & activis constant, à levi quovis obice, aut repulsa, in *paris* & fluxiones diversimodas adiguntur. Porro cum ista circa partes nobiles, vel intra ductus nerveos turgescunt, vel aliusmodi aliorum humorum particulis occurrunt, cumque his effervescent, affusiones varias aut dolorificas, aut spasmodicas ciunt, &c. *Idem ibidem.*

*Phibys* Arthritici ob sanguinis dyserasiam Salino fixam, febrilibus minus obnoxij sunt: Ceterum à Phibys, aliisque viscerum aut capitis pathematibus gravioribus non omnino immunes degunt, quatenus tum sanguinis tum succi nervi recrementa in articulis non amplius deponuntur sed vel ad pulmones vel ad cerebrum transferuntur. *Willis ibidem.*

## OBSERVATIO V.

*Contractura digitorum, &c. in Arthriticis causa est Calx, spatia omnia occupans & ossicula secedere cogens.*

**A**Nno Domini 1670. fati cessit per lil. Domin. Capitaneus Ammon, qui vitam suam longo spatio annorum arthritide exeruciatus transiegit, ita ut manibus & pedibus contractus remanferit.

Aperto cadavere, causam contracturæ digitorum tam manuum, quam pedum & reliquarum juncturarum indagans, easdem calces vulgo dicta plenas spatia omnia occupante reperi, tanta quantitate ut ipsa ossicula loco suo naturali cedere necesse fuerit, unde dislocatio ossium digitorum, tam manuum quàm pedum, & juncturarum facile inde colligi potest; cum tanta materia ad articulos transmandetur, ut mole sua prius nervos, membranas, tendines, obstruat, & ad obediendas ritè actiones motui & sensui convenientes suffocet, tandem & ipsa ossa suo loco dimoveat. *D. Joh. Jacob. Vene. Dobrzensky in miscellaneis curiosis anni 1661. Observ. 65.*

**N**Otanda, historio quæ in *Plateri observat. lib. 2. p. m. 150.* reperitur meminit is mulieris cujusdam Lucernensis in Helvetia, è nodulo pollice pedis sinistra, pingui magnitudinem excedente, calculos

tephaceos, è quibus minimus piso major erat, plusque xx. suppuratione illic facta, cum maximo dolore, successively reddentis: De causis ejusmodi Tephaceæ materie vide eundem *Praxen* 11. & alios.

## OBSERVATIO VI.

*In quodam Podagra diu vexato Lien exsuccus & omni pulpa carens inventus.*

**D**Om. à Rapolstein in Alsatia degens cum per multos annos podagra diu vexatus esset, tandem supremum diem clausit: A morte, quum exenteratum fuisset corpus, conditumque mumiata curatum: Lien inventus fuit, plane exsuccus & omni pulpa carens, marsupij in modum inanis, sinistris hypochondrijs affixus. *Ex observat. Jacobi Mocchi Professor. Med. in Academia Friburgensi Brisgaurum.*

**A**N quia serum (cujus sedes Lien dicitur *Hypopocr.*) ad artus demandatum fuit, quod Lien præ exilitate & debilitate non suscepit & attraxit?

## OBSERVATIO VII.

*Ischiadicum & Podagricum dolorem parientes humores circa finem medullæ spinalis convernuntur.*

**S**I impotentia in solo crure oritur ob læsionem cervicis, id tunc demum fieri perandum est quando circa velsus collectus humor, secundum longitudinem spinæ descendit, & in finem medullæ ubi descensus ulterius non datur, impingitur: Solere enim hic humores detineri ex Ischiadicorum & podagricorum sectione demonstrat *Cotter* in observat. Anat. *Hinsingus Arnians* in observat. Anat. observat. 2. §. 10.

**H**umor secundum finem longitudinem descendit. Multos videmus aut ischiade laborare, aut alio articulo, cum ne tantillum aut cervicis doluerint, aut collam, aut guttur, aut clavículas, aut occiput. An vero credibile à capite tam effusum humorem, tam

serosum, tam indomitum, aut nullo dolore in multis visis exciter, sed solum cum ad articulos devenierit? Ut idem faciat quod lepus marinus, qui cum perreptet innumeras corporis partes, solos pulmones ulceret? Hoc non credibile, sic valere jubeamus

*Eternitum* : Et non temere innocens caput medicamentis agitemus: Nam sunt qui dolent articulos, & nullus praecessit omnino capitis dolori, nec gravitas, nec aliud simile, *Balnesium Epid. & Ephem. lib. 1. p. 91.*

Ejusmodi sane dolor Ichidicus aliunde quam in capite arcessendus, vitiumque potius malle sanguinis inquinata arguit.

## OBSERVATIO VIII.

*Anatomie Ischiadico laborantis dolore, In cuius coxa inventa sunt glandulae induratae, pus concretum continentes.*

**V**Idua P. Auberti patiebatur dolores atrocissimos in Ischio sinistro, qui sese ad extremum pedem porrigebant: Cum dolor in coxa gravior evasisset, & tumor in parte appareret; concolores tamen, tum etiam pars compressa multum doleret, nec non agra dolores lancinantes in eadem perciperet per vices, vocati fuere Chirurghi qui abscessum profundum latitare asseruerunt: Sicque consilio habito pars aperta est caustico & scalpello, nullum pus effluxit: Post xv. dies ab apertione hydropica facta est, & tandem suffocata interiit.

Aperto cadavere, & scissa coxa usque ad os, in loco apertionis inventae sunt parvae quaedam glandulae suppuratae, quae pus concretum continebant, ita ut non potuerit effluere. *verius Observat. 53. cent. 2.*

**C**OXA) Coxa dicitur, & articulus ille omnium maximus quo os femoris coarticulatur. Et os illud magnum cum quo coarticulatur: quod os dicitur, aut coxa, aut os coxae, est magnum, varias promittendas habens et perforationes, quod quidem cum osse sacro conjungitur per symphysin. Hujus suprema pars, quae à lateribus tendit in partem anteriorem, & est superior pudendis, ea in regione quae dicitur Ile, vocatur os Ilium: Pars media, quae magnam habet excavationem, quae recipit ossis femoris caput, dicitur Coxa, aut coxae os peculiariter, quod quidem à regione pudendorum est, & per partem internam & imam habet processum acuminatum, tendentem sub pudendis, quasi utrinque venientes productiones sine in interfemineo congesturae: propius autem accedunt ad sese in viris quam in feminis, in neutris vero ununtur. Ab hujus ossis suprema parte producit in anteriorem corporis partem, supra pudenda, os quod in medio unitur cum processu alterius partus, cartilagine, & mox deorsum redit à latere pudendi in imam partem coxae, & finit ita perforationem factis magnam quam hoc os habet, vocatur haec ossis productio, os Pubis: Itaque os Ilium, & Coxa, & Pubis, idem os est, verum praegrande, & quod tribus in partibus tria nomina accipere possit: Hoc os coarticulatur cum Femore, atque ita in eo volvuntur crura; coalescensque cum osse sacro, & dictam magnitudinem, figuram & possum habens, simul cum osse coccygis muniat, & commodum locum parat pudendis & podici: nam pudenda erumpunt inter os pubis & internos illos processus coxae, & podex inter hos processus & os coccygis.

**Dolor in coxa.** Saepe tentatur dolore & articulus ille magnus, & ipsum coxae os, & illi haerentes carnes: Articulus quidem, quia maximus profundissimusque est, & asperitatem etiam quandam habet, & interius, quasi in centro ligamentum quoddam, quod inhibet fluxionem, quum ob magnitudinem articulus recipit: Os vero ipsum, (ut ossa dolere possunt) & caro, & reliquae partes, quae illi haerent, quia posita sunt in ipso sordium confluxu: Nam per id osse utinae & fecum vix decurrunt, & genitales, & illi proximae sunt venae haemorrhoidales, praeter venas & arterias satis magnas quae in cura deferuntur: His ob causas solet haec pars recipere multas variasque fluxiones, & ab omni fluxionis genere cruciari, nunc in articulo, nunc etiam extra, juxta os, aut ad interiorem partem, versus inguen, aut ad imam, ad interfemineum, aut ad posticam, ad Bates: Saepaque fluxio ipsa in pus abit, quod nisi tempestive educatur, sponte extra erumpens, fistulas eo loci facit, aut interne manens acerbis cruciat. Sic Eupolemo, & Epid.

(cui coxa dextra dolebat, & inguen, & junctura coxae proxima, quae est ab inguine & antero coxae parte) factum est pus in coxa, inter os ipsum & periossium: *Valdesius comm. in lib. 5. Epid. p. 460.*

**Qui sese ad extremum pedem porrigebant.** In quibus Coxa dolor, aliquando dolor per totum crurum produciunt, secundum nervi longitudinem, aliquando iidem stupet, ob nervos crurum, qui omnes juxta ipsum coxae os ab ultimis lumborum vertebrae decurrunt: praecipue vero ob ordinem quorum qui etiam est posticus, & maximus eorum qui descendunt à lumbis, quia cum tribus sequentibus sacri ossis nervis coalescit: enim simul cum arteria & vena magna, penetrat per foramen quod ex ossis Ili & sacri coarticulatione, velut in hunc solum usum formatum est: Evenit igitur propter fluxionem, coxae dolorem inferentem, aliquid in nervum redidit, aut à venis & arteriis ac cornibus etiam multitudine tumens cum primis, atque ob diversum affectionis modum, modo stupet, crurum, modo dolorem affici. *Idem comm. in sect. 6. lib. 4. Epid.*

**Pars aperta caustico & scalpello &c.** Ob assiduum dolorem merito Chirurghi suspicabatur corruptionem subesse & pus, purabique auxilia ad eam affectionem necessaria: Ea porro ex Hippocr. duo sunt, ustio & sectio, nam medicamenta sola in his non sunt satis, ustio praeterea est duplex, aut enim est penetrans usque ad ipsum pus, aut finis sit ustio & scissio, velut si cutellus, seu stylo ferreo ignito purgas aut feces: Aut est Inulsi, h. e. ustio vulneris superposita cutem, & crustam gignens, non penetrans tamen: Priori ustione, non minus quam sectione educitur affritum pus, Inulsi non ita, sed ulcusculi fiunt, ut per ea natura demittat ea quae ad internam partem colligebantur, Aut etiam quae collecta erant paulatim trahas, interna expurgans: Prosum etiam inunctiones siccando, ut firmando partes quum sunt humidae & laxae, ac intercludendo viam fluxionibus, nimirum cicatrices durantur costringunturque praeter. Hinc fit ut cum educere pus, quod in isto est volumus, sectione uti debeamus. Si pars maligna non sit, nec pars putredini oporuna, solo incisore, Sin autem sit, ferro candente ignia ignis cohibet & excipiat, putrescentiam: Inunctiones vero uti remedia debemus, quum fluxio nondum in pus mutata sit, aut macores adsunt & laxitates partium, & ligamentorum in dolore coxae, & aliis articulationibus aut nisi forte quum sectionem non audemus facere, uti aliquin eam petat morbus. *Idem comm. de 5. Epid.*

**Inventa sunt parvae quaedam Glandulae.** Est in historia non designatur, quae pars coxae doleat, & scissio

terior vel posterior, verisimile tamen est illam circa lumbos doluisse, cum scilicet flexura locum quo supra femoris pars adducitur ad pudenda, qua parte sunt glandulae copiosae.

*Itaque pars non potuerit effluere*] Tum ob loci profunditatem, tum quia concretum erat; Eo vero saepe perducitur malum, quia aegri non percipientes quid mali habeant, id parvi faciunt, neque se curandos. Medici tradunt, putantes se leviori aliqua de causa dolere, & expectantes auxilium temporis: *Euselema* (de quo supra) post diuturnum dolorem inultum, sunt cruciatu valde multo, & illa quidem exantibus eleha-

ris, ut in combullis fieri solet, factae sunt magnae & proximae invicem: Quae in curatione, (ait *Valerius* in comm.) duobus modis peccatum est, & quia sero jam est adhibita, quam aeger per debilitatem non posset ferre, Et quod maior quam pro faciente adeo debili: Non est autem faciendum quantum morbus petit, nisi etiam facultas permittat: Si autem *Euselema* non fuisset adhibita curatio tarda, sed opportuna, antequam scilicet quam debilitaretur; Et mulieri (de qua historia) priusquam pars coheresceret, factum esset quod expediret, verisimile est hanc & illum servari potuisse.

## OBSERVATIO IX.

*Ichiadicus dolor ab abscessu ingenti ad rotatorem musculum femoris dextri exortus: Es atheromate sub musculo Psoa sinistro.*

**A** Medeus, Faber lignarius, 40. annos natus, biennio variis morbis, ac postremo etiam dolore Ichiadico laboravit, & tandem extinctus est.

In dissectione, ad rotatorem femoris dextri ingens abscessus, humorem purulentum copiosissimum, supra librae pondus continens, inventus est; hinc erosio articuli ligamentis, inhibitis etiam muscularis, *Luxatio* quam passus erat aeger: Deinde sub musculo Psoa sinistro, cui ren incumbit, quique in eandem internam partem infertur, ingens atheroma, ultra libras duas puris crassioris continens. *Fabritius Hildanus Observ. 7. cent. 1.*

*Refus articuli ligamentis*] Si in eo articulo, qui est ossis femoris & ischii, humor quidam acris colligatur, inde plerumque Ichiadicus dolor sequitur: Ligamentum si hac de causa laxetur, os a natu-

rali situ parum recedit, & aegrum claudicare facit: Si os aut cartilago corrodat: & vasa comprimantur, pedis atrophia, & aliquando totius corporis infertur, *P. Barbetie Anat. Pract. lib. 5. cap. 2.*

## OBSERVATIO X.

*Ingens coxarum dolor, ob os coxendicis corruptionem passum & erosionem.*

**A** Ntonii laeti filium novimus, qui cum ingenti dolore coxarum vexatus, in maximam primum debilitatem, tum & in mortem, nihil invanibus Medicis, nihilque conferentibus praesidiis, devenisset.

Inciso corpore inventus est; affluer humor in Coxa, quo magna pars ossis erosa, etiam in cinerem versa videbatur. *Benivenius de Abditis cap. 79.*

*Pessifer humor &c.*] De virulentis ejusmodi humoribus, ossa erodentibus, & apostemata in iis producentibus egregie discribit *Langius*, Epistola 42. lib. 1. Ex pituitoso, ait, sanguinis mucore; intra lacertorum velamenta & ossium panniculos, fungi, Graecis *μύκηται*, adnasci solent: Nam ut Hippocr. lib. 3. de artic. testatur, circa ossa conuulsa, fracta, aut quovis modo lesa, mucilaginis accrescit pituita, quae, ut ipse ait, os fit morbosus: quae adeo effi tenax & viscosa, ut nec ulla malagmatis aut pharmacis maturari, aut ullis fomentationibus in halitum digeri possit: Haec si sub ossis panniculo compauctur, & in ossium poros penetraverit, ossa sideratione aut sphacelo, quae illorum caries est; diuturna putrescere, & non ferendo dolore aegrotos excruciaci oportet: quae nullis emplastris nisi sublata carne, ossa putrida celere aut lenta exciso, aut illorum caries caute non adusta fuerit, curari poterunt: Unde qui curam respiciunt, gangraena vel herpese effluviomene tandem pereunt &c. Medicorum autem plerique ignorant ossa, quantumvis solida, quasi phlegmone & apostemate quoque corripi posse: Quicquid sane nutritur, crescit, augmentatur, aut influxus recipit, id quoque putrescere, & apostemate aliquando turgere fatentur: At ossa, & praecipue dentes, qui quotidiana etulentorum masticatione atteruntur per omne vitae tempus, quoque nutriti & refici certum est: Proinde Avicenna & Galenus suo periculo edocti, dentes proprio dolore affici, apostemate quoque disten-

di asserunt: Et Hippocr. os sacrum empyemate quoque computrescere novit: Cujus putredine, & incredibili doloris tyrannide duoseffluam & diu maceratos, tandem contrahere & mori huius oculis vidi: Sed ossa quoque influxus recipere, & abscessibus turgere, Galenus Hippocr. testimonio fretus, 7. aph. 74. probat, solet, inquit, natura, si robusta fuerit, excernendis superfluitatibus, etiam si crasse fuerint, per angusta foramina meatus parat, quando etiam per ossa abscessus fieri Hippocr. docuerit: Hi certe putulenti & acres rheumatism ichores, in ossium poris coarctati, quemadmodum Terebo vermis lignum exest, arrodit & perforat, sic hi eorum accedente ossa corrodunt, unde hic viri ossis morbus Graecis *τρυβος* dicitur: Galeno in lib. Defin. Terebo est a corruptione putrida ossium perforatio, ab accedente rosionum, quasi terebra vel trepanum dicta: Haec ulcerosum ossium affectionem five mavis dicere putrilaginem, Avicenna ventrositatem spinarum appellat, cujus causam ait esse humores acutos, os penetrantes & ipsum corrodentes, doloresque dolori iuncturarum similes efficere: & hoc solo differe, quod huius materia in carne & nervis, illius vero in osse consistit: At si huius putrilaginis ichores, in ossium cavernis coarctati, confertim intra ossium panniculos eruperint, vel etiam alinide, ut & cerebro, defluerint, illorum viscositas pars grossior intra ossium membranas, in tubera & gypseos quasi topheos concreta: altera vero subtilior, sua acrimonia

omnia ossa & panniculus, arrodet & distendit; quorum panniculorum ratione ossa dolere, ac veluti terebra perforari videntur : Unde scite Archigenes, Dolores inquit, à membranis ossa circumdantibus ; quo: Græci *Ischiadus*, ob penitrem in laceris, tendinibus & panniculis, qui ossibus adhærent, doloris sensum dixerunt.

*Magna pars ossis erosa* Si humor acerrimus pu-

tris erodat & cariem inducat articulo, Plurimum coxarum inducit, quæ sensum ducit ad interitum : Si ad exortum magni istius nervi, qui posticus pedis partes perrepat, humor influat, *Nosia Ischiæ* excitatur. Si humor influat in acetabulum, & exorbitare cogat caput femoris, morbus hic in situ curari difficilis, claudicationem tandem adferet. *Rolandi Enchir. lib. 5. cap. 3.*

## OBSERVATIO XI.

*Humores Ischiagram committentes aliquando in eo spatio, quod faciunt muscoli continentur.*

**H**umores in eo etiam ipso spatio, quod faciunt muscoli sibi invicem accumbentes, & plus inventi fuerunt. *C. F. Schneiderus lib. de catarrhis special. p. 908.*

**H**umores] Terminum à quo sunt quidam esse cerebrum & caput : Nos eum terminum, non privatum aliquod membrum, sed ipsam massam sanguineam esse arbitramur ; Terminum ad quem edocent Medici esse illam Ischiæ commissuram ; ac *Vias*, per quas, esse contendunt, vel partes subcutaneas à capite u. que ad hanc Ischiæ junctutam, ut *Fernelius* : Vel extremam spinæ medullæ superficiem, ut *Randius* : vel nervorum & tendinum tunicas, ut *Mercatus & Platerus* : Nos eas arterias quæ ad artus perveniunt censemus humores invehere : *hi in eo ipso etiam &c.* Differentie sunt attendendæ : nonnunquam Ischiæ quæ ex prioris morbo efflatarescunt, ut ex colico dolore & vitio intestini : Hipp. 6. Epid. 4. Ex huc veneræ, ex febre quartana, quotidiana, maligna continua, ut ea qua critica esse videtur : Huic morbo alius sæpe

jungitur, stupor, asthma, febris continua, lepra, ischiæria, malum hypochondriacum, femoris luxatio, tabes & claudicatio miseranda, erosio & caries ossis. In consultiissimo viro D. Taubmanno L.V. Præf. adeo patente ulcere huius musculorum modo carnem & tendines, sed etiam ossa partim consumpta & putrefacta, partim cariola adveniunt : Nunc alia denique Ischiagra est vel magis Humoralis, vel magis tabulosa, qua lapidosa corpuscula increverunt : Suppurationem aliquando fieri scribit Hippoc. 5. Epid. ipsius vera duratæ & calculosæ materię meminit Galenus, in K. T. cap. 2. Negant Rhazis, C. pivaçius, Mercurialis. Obstant vero experimenta, cum ipsi lapilli, figura seminis napi, teste Schenckio lib. 3. observ. 55. incisâ vena laterali, cum sanguine ferventissima ubertim emissi fuerint. *Idem.*

## OBSERVATIO XII.

*Ischiadicus dolor sequitur tumorem circa mesenterii exortum genitum.*

**B**enjamin N. ex lapsu ab equo, circa regionem lumborum contusionem passus est, hinc dolor Ischiadicus &c. Circa mesenterii exortum ingens apparuit tumor, ab appendicibus diaphragmatis superne, ad os coccygis inferne ad umbilicum usque protensus, vertebra lumborum firmiter adhærens : in sua mole aortam, venam cavam, plexus nervos &c. continens. *Vide lib. 2. Tit. de Phihis.*

**C**irca Mesenterii exortum] Per arterias cæliacam & mesentericam potest fieri peccantium humorum metastasis, ut dolor mesenterii & ischiadicus se

invicem excipiant. *Rossiacinus Dissert. Anatom. lib. 6. cap.*

## OBSERVATIO XIII.

*Coxendicus dolor ab utero gangrana affecto.*

**M**ulier fluxu mellebri vexata, accedente febre, de vehementi alterius eorum dolore conseritur, qui ad extremum usque calcem porrigitur : His accessit uteri gangrana. *Vide lib. 3. Tit. de Fluore muliebri.*

**C**oxendicum dolorem uteri causa accidere pluribus in locis tradit Hippoc. & primo cum is replentus in tumorem se efficit, *lib. de locis.* 2. Si is transversus fuerit, *l. de nat. mul. lib. 2. de m. m. 3.* Si ad ventrem vergat, *l. de nat. mul. 4.* Si ex patru inflammationem conceperit, *l. de m. m. 4.* Si ad medios lumbos se convolverit *2. de m. m. 5.* Si ad coxendicem decurrat *ibidem.* 6. Si in sinistram partem inclinavit, *ibid. 7.* Ex fortis corruptione. *6. Epid. 1. 1.* 8. Si genitura continuo carui defuerit. *l. de m. m. 1. 4.* Epidem. Ani, coxæ & cruris dolores ab utero orti videbuntur. Ex meri aurem morbis, ait *Vallesius commun. in text. l. 6. Epidem.* in coxam fieri abscessus, non quidem necessarium, consentaneum tamen est, quia is est articulus maximus, & qui plurimarum partium solet excrementa

recipere, & habet cum utero maximam & viciniam & rectitudinem, adeo ut quum conorqueretur soleat in coxam incidere, ut in aphor. dicitur : Cum igitur uteri morbus produciatur, ratinui consensum est in coxam facere abscessum : *Hællenus Vallesius.* Polemarchi quinque uxori, lib. 5. & 7. Epidem. vehementes coxendicus dolor contrigit, cuius causa fore minime profuissent menses : Idem accidisse vidi anno 1670. In uxore Typographi Genevensis, nomine Chayer, cui mense Decembri à partu subistere lochia, atque ipsa, quo enixa est die, gravem Ischiadicum dolorem pariebatur, ad pedes usque protensum, qui per gradus ad femora, hinc ad genua, postea ad pedem imum decessus est, soribus, campylomatibus & in malleolo utriusque sanguinis missione intra tres hebdomadas desinens.

*Gonagra laborantis Genu dissectum exhibuit sanguinem crassum, adustum.*

**D**Om. de Abbenbrouk (de quo Tit. de Phibis lib. 2.) cadaver priusquam insiderem palam protestans sum quod occasio mortis non ex genu tantum, seu arthritide fuerit &c. Pulmonem enim putrefactum deprehendi, Aperto autem genu, quod inflatum erat, nullo tamen pure existente, sanguis crassus biliosus, adustus, cum multa nigredine sub finem effluxit. *Forculus.*

*Sanguis crassus, biliosus, adustus* Coxendicis morbum Hippocr. lib. de Affect. fieri ait quum bilis & pituita per sanguifluam venam incubuerit, & sanguinem in ea existentem compegerit & morbo sum reddiderit: Assentiendum est, ait *Pr. Martiani in comm.* Hippocrati asserenti materiam doloris per venas sanguifluas ferri ad partes in quibus excisitur dolor: quas quidem sanguifluas vocat ad differentiam articularum: Quam quidem sententiam verissimam cognovi per ea quae observavi in Cmentario quodam hoc morbo laborante; qui dum à vehementia doloris afficiebatur (idque per quoddam paroxysmos contingebat) venae omnes per exteriorum partem laese coxae & cruris disseminatae, mirum in modum intumescabant; remissoque dolore subsidebant statim, nec earum apparebat vestigium: In hoc igitur consistit essentia veri coxendici morbi (nec non podagrici, saltem Gonagrici) quia dolor vagus per crur totum, modo huc modo illuc con-

filit, sitque materia per venam coxariam discurrente: Unde evenit ut plures partes, & inter se distantes dolor infester, quia ubicunque sanguis ille morbosus constitit, ibi dolorem facit: In eaque remedia adhibere jubet Hippocr. quae sanguinem illum coactum emolliendo dissolvant & diffundant: Hinc patet in quanto errore versentur illi, qui doloris extensionem in hoc morbo ad nervos referunt, qui à spinali medulla juxta coxendicem, à summis partibus per femur & crur totum ac pedes disseminantur: certum enim est hanc doloris extensionem, per solam irradiationem, absque materiae concursu ad partem dolentem minime fieri, alioqui dolores nervorum partium semper communicarentur omnibus particulis ad quas propagantur nervi; Nec est verisimile materiam doloris per nervos densissimos ferri ad partem adeo remotam, in qua dolor excitatur, quia id absque convulsione non contingeret.

## \* ADDITAMENTUM.

## OBSERVATIO unica.

*Iscchiadem committentis humoris sedes saepe in musculorum interapedinibus reperta.*

**T**erminum à quo, ut nominant, ajunt esse Caput & cerebrum: Nos eum terminum non privatum aliquod membrum, sed ipsam massam sanguineam esse arbitramur: *Terminum* ad quem, ut nominant, edocent Medici esse illam Ischii eotomissuram, ac vias per quas, ut loquuntur esse contendunt, vel partes subcutaneas à capite usque ad hanc Ischii juncturam, ut *Fernelius*, vel extremam spinalis medullae superficiem, ut *Enslachius Rudius*: vel nervorum & tendinum tunicas, ut *Mercatus* & *Platerus*: Nos eas arterias quae ad artus perveniunt consecutus humores invadere: Hi in eo etiam spatio, quod faciunt muscoli, sibi invicem accumbentes, saepius inventi fuerunt. *Contr. Victor Schneiderns lib. de catarrhis special. p. 907.*

**P**eritè & scite *Serenus*  
*Sepius oculus, vixit coxendicis morbus*  
*Perfuris & gressus diro langore moratur.*  
Vero etiam *Aëtius* tetraz. 3. l. 4. c. 1. prohibuit incommuniem Ischiadis causam existere validam humoris alicujus ubertatem, quae affectum articulo non occupat: at qui humor non fero dilui potest, cui & portio terrestria, quam Tartarum vocant, ali-

quando admixta fuit? *Idem*: Humorem arthritidem & Ischiadem inducentem non à capite ut *Fernelius* sed ex vasis majotibus deducit *Wale* in Praxi, Arthritidis ait, est dolor articulo tum qui per intervalla recurrere aptus est. Subiectum doloris quod efficitur in articulo, est tendo, non ligamentum, sed membrans, praecipue periositem, Dolor afficit has partes, quia humor acris certi generis.



## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

## SECTIO IX.

## De Lue venerea &amp; Plica Pollonica.

## OBSERVATIO I.

*Pluviarum Lue venerea laborantium vena infarcta, nec non musculo, quae doloribus afficiuntur. 1*  
*Infectorum Lue partes interna ulceribus quandoque & Abscessibus sciant. 2. 3. 4. 5. Vitiolosus*  
*Boneti Anatomia Tom. III. Pp 2 humor*





cadaveribus fœda ulcera & pustulæ in ipsis visceribus; haud secus ac exanthemata per morbillos eadem afficiunt; Noyi ego plures quibus ex variola magna non solum trachea, sed & Pulmo ipse fuit exulceratus; *Leubertus lib. de Variola magna cap. 4.*

**N**on in externis tantum esse. Inter externa, sed leviora levioris Lue signa recenseri possunt maculae, nunc rubescentes, nunc flavescerentes, tumores, quæ aliquando amplo spatio cutim occupant, frequenter quidem in pectore ac dorso, aliquando etiam in abdomine & alibi his pressas; colore alieno resurgente, albicans vestigiis dedisse, quod tamen mox ac pristinum colorem redire se observasse narrat Platerus, qui ex hisce maculis solis, quoties alia ipsarum causa nulla præter congestum impurum patet, Lue veneream, licet leviozem concludat. Si quis eorum causas perscrutetur comperiet tandem ipsas ortam trahere à corruptione incipiente aut levissima cutis. Eam voco quæ nondum est perfecta, & à qua regressus adhuc est ad integritatem, nec nisi cum aliqua istius partis de perditione: Exemplis notis rem confirmo. Quamdiu in gangraene meru color cutis est duntaxat rubens, aut subpurpureus, tamdiu corruptio ejusdem est incipiens, atque talis ut ad integritatem redire possit pars affecta, quamprimum ad nigredinem pervenit clamoratum est, atque tanquam extreme corrupta emortuamque cutis, aut sponte, aut arte à vicina separatanda est, ut servetur membrum affectum; Sic in febribus Petechias comites habentibus, quamdiu maculae sunt ruberæ, aut etiam purpureæ, tamdiu ad integritatem, absque sui jectura redire potest cutis; ubi autem extreme livida, aut nigra factæ sunt, non tantum cuticula, sed ipsius cutis aliqua pars separari solet quando convalescent egri, atque foveæ tales in cute remanent quales à variolis ortas conspiciamus: Solent autem illæ maculae omnes, cum extrema cutis supremæ, aut etiam totius corruptione conjunctæ, in pustulas vel ulcuscula degenerare prius quam pars extreme corrupta decedatur ab illa, sicut id perpetuo fit in variolis & anthracibus pestiferis, quorum ortus semper solet incipere ab extrema cute maculis affecta, quæ maculae diutius permanent aliquando, uti citius in pustulas elevantur nonnunquam: Hinc est quod in variolarum præsertim exorta nonnunquam per aliquot dies dubitetur, etiam à periculis: An variolæ sint futuræ an morbilli. In eo namque differant hi duo affectus quod similes plane maculae, tanillum quandoque protuberantes, aliquando iterum sensum dispareant, nec in pustulas abeant, & tunc morbilli

vocantur, aliquando citius tardiusve in pustulas eleventur ac suppurantur, tunc variolæ vocantur: Quoniam ergo omnis corruptio partium corporis quarumvis à causis internis oborta pendet vel à falso lixivo, vel ab acido, videndum à quoniam maculae in hac observabiles sunt deducendæ: Idcirco autem illas à falso lixivo illis deduci non posse aut debere patet; quoniam ubi in pustulas vel ulcuscula ipsæ degenerant, nihil affinis habeat cum corruptione à falso lixivo pendente, sicut id ostendimus (*vide Schollæ ad §. 3.*) quando ulcerum venereorum ortum excutimus: Restat proinde ut istas maculas ab Acido deducamus, tum præsertim succedentia nonnunquam ipsis post pustulas ulcera idem adstruant, atque sic belle omnia ubique sibi consulantur. *Sylvius de le Boe Append. tr. 3. §. 18. & 107.*

**Pustulis &c.]** Pustulis multifariis obidentur Lue inquinati, tum in partibus genitalibus, tum in universa cute, tum præsertim in pilosis, in naribus, ore, faucibusque erumpentibus: Multiplices esse dixi, nam observantur aliquando planæ, ac minime extantes, aliquando plus nimio extuberant, aliquando subrubræ sunt, aliquando subflavæ, omnes autem sunt squamosæ, ideoque solites; quin remotis squamis, tum color varius, tum cutis asperitas & inæqualitas magis patet. Aliquando nullus ex illis promanat liquor, aliquando paucus quidem & acris; sensim serpendo Pustulas illas expandens: Aliquando pruritus molestum habent conjunctum, quandoque nullum aut levem. Non sunt autem similes Pustulis pestilentialibus, in carbunculos desinentibus, & partem affectam mortificationem gangrenosam comitem habentibus, quasque idcirco à sale lixivo volatili & acrideduco, verum similes potius sunt illis quas in scabie graviore speciebus observamus, à bique citius notabili aut celeri corruptione; Deducendæ potius à sale Acido, plus minusve fracto ac temperato; prout namque illud plus aut minus infringitur; gravius idem aut levius fevrit in cutim, atque pruritus graviorem aut leviozem producit: Ubi autem Acidum illud acie magis est concentratum, Pustulas producit magis aridas, ubi contra idem magis est solum minusve concentratum; pustulas producit madiores ac serum aliquod stillantes, imo celerius serpentes. *Idem ibidem §. 9. & 64.*

§. 4. Plerique viri gravissimi, quales sunt *Alexand. Benedictus lib. 23. de morb. Cur. Ferrellius; Leubertus Gesnerus, Bernardinus Tomitanus lib. 2. de morbo Gall cap. 13.* certos nos fecerunt vita Syphylide defunctis confectis, viscera quælibet, nullis exclusis, reperta tum phymatis, tum abscessibus, tum ulceribus fœda, non aliter quam extimo corporis habitu papulæ, collectio-nem, tubercula: Quæ mihi admirabilia quondam visa, comperi mox omnia quam verissima: Etenim in valetudinario syphylidis decumbentibus, si quod aliud, refertissimo, ex his qui conspecti fuerant illo morbo laborantes, complures offendi quibus exulcerati tum œsophagus tum trachea. Quibus item pustulosus Pulmo, pustulosum Iecur; apostemodes vero prostratæ sunt adversi. Fuit autem & cui repertum est sinistrum vas deferens spermatis, qua superinterfemineo ad penem inflectitur, sub ejus loci glandulas interiores aliqua parte demersum atque sepultum; Cum autem eidem homini bubo Syphylidis ulcerosus fuisset adversus, prompta fuit omnium opinio, & ejaculatoria, nedum glandulas syphylidis istos abscessus expertas, quod hæcenus nemo prodidit eorum qui novas observationes medicas describere. *M. Aur. Severinus de Abscessuum rec. doctrina pag. 178.*

**Prostat.]** Quorum vitio virulentia gonorrhœa accidit, si cuim in effluente humore virulentia & acrimonia animadvertatur, nonnunquam post unum coitum, de Lue præsentem non debendum quamvis non prorsum affectum mox esse gravissimum, quandoquidem non raro nullis aliis symptomatibus

accidentibus brevi ac feliciter curatur, nisi neglectus fuerit fluxus; ac serpente humor permittatur: Originem autem sumit à coitu cum persona simili labe infecta, à qua prodicens materia pulicaria & acris se partibus genitalibus applicat; & in maribus quidem seminis

reliquis in urethra remanentibus se admiscet, ne sursum usque ad Prostatae & vesiculas seminales serpit & ascendit, semini accedenti se infundit & ipsum inficit, atque ipsa seminis receptacula itidem afficit, rodit & corrumpit; unde accedens continue aliud semen corrumpitur, & corruptum continuo exstillat: Notandum autem semini sanguinem quoque ad partes hasce afflicti & ulceratas deferri, aliqua sui parte corrupti & gonorrhoeae materiam quoque suppeditare, dum partes ejus aliae ab illo veneno infectae resistent per vias ventis interiora, & cor atque totam sanguinis massam citius vel tardius, levius vel gravior impetunt, & tandem symptomatibus ubique se manifestantibus ansam praebent: In feminis autem, effusum ex maris gonorrhoea virulenta laborantis pene virus, collo ipsarum externo, & imprimis colli interni orificio adhaerens, ac sensim effuso semini, ejusque reliquiis se infundans, quin usque ad uteri cornua, & seminis vasa excretoria assurgens, illa una cum semine corrumpit, ulcera ibidem excitat &c.

*Apoplexodes Prostatae sunt aduersi*] Quamvis nullis partibus parcat Lues venerea, praeter alios tamen omnibus saevit maxime in glandulas, unde non tantum prostratis, peni, & omnibus partibus mulierum obicinis, verum naribus, labiis, gingivis, palato, tonsillis & similibus infestior existit; An quia venenum venereum initium habet a semine corrupto; ac praeter sui naturam de Aciditate participante, quod quia in glandulis perat partibus, idcirco forsitan in ipsis rursus agit facilius & potentius? Docuimus autem alias videri nobis succum subacidum secerni a sanguine in glandulis, eundemque in ipsis contemporari a spiritibus animalibus per nervos ad easdem delatis: Quod si acidum reddatur in corpore actius, amicum idem in glandulis secerni solitum quoties simul redundat, easdem citius ac potentius ledat quam partes alias, in quibus secundum naturam non secernitur a ceteris sanguinis partibus? *Fr. Sylvius Append. Tract. 3. §. 53.*

*Subo*] Inter Luis symptomata locum habent Bubones in inguinibus oborti, & quidem in glandulis conglobatis, ique maligni: In genere maligni vocantur, quia symptomata habent conjuncta longe graviora quam expectari poterant a solo sanguine nobili Acrimonia destituto: Sciendum autem malignitatem omnem ab excedente Acrimonia pendere, atque pro Acrimoniae duplicitate duplicem occurrere. Solam lixivam & Acidam, cum haec duo sint in rerum natura quae subitam homini ad interi-

tum viam sternant, ideoque malignitatis dictae causae verae existant: ut igitur acrimonia: Salina solvit sanguinem, ipsumque ineptum reddit ad laudabilem sui satisfactionem, unde suffocatur igitur non sit vitalis, tum in corde, hinc in toto corpore, atque sic subito interit mors in affectibus pecculentibus, ita Acrimonia Acida eundem sanguinem coagular, & sic quoque ad requisitam sui satisfactionem ipsum ineptum reddit, unde itidem extinguatur ignis vitalis, atque sic obrepit nonnunquam subitum mors in syncope, suffocatione hypochondriaca, terrore & morore summos quod virus acidum se quoque manifestat in Lue venerea, cancro, scrophulis & similibus affectibus: At vero sicut Bubones oriuntur a sanguine in glandulis conglobatis stagnante, & ad inflammationem tendente, ita prout illi conjuncta est Acrimonia vel Salina vel Acida peculiarem sui malignitatem ostentant: A pituita quidem sanguini conjuncta Bubones oriuntur magis ordematosi, a Bilemque erysipelatodes; ab humore austero magis duri ac scirrhosos; ab Acrimonia vero rodente maligni quae tamen acrimonia non raro temperatur tum ab ipso sanguine, tum a pituita ipsi admixta, unde malignitas & acrimonia rarius ex solis Bubonibus deducitur potest, sed ex aliis fere comitantibus, in peste quidem ex anthracibus & maculis nigricantibus; in lue vero venerea ex gonorrhoea, partium genitalium ulceribus cancrois & similibus.

*Cum eadem homini Bubo*] Soli proinde Bubones cum nunquam sint Luis signa diagnostica, ex illis quoque solis ejusdem essentia peti non potest, verum ex aliis hos comitantibus symptomatibus: nisi quis velit venereos non extendi secundum cruris longitudinem, sed potius in obliquum, atque imitari vasorum spermaticorum firum, sicut nonnulli docent: quia in re tamen patet ipsos ex praedictio magis quam accurata observatione id asserere; dum censent Glandulas diversas in peste affici atque in lue: nisi forsitan eveniat ut cum plures sint circa inguina glandulae, in lue ven. illae praeter alios afficiantur quoque vas spermaticis sunt viciniores, tum praeparantibus tum deferentibus, postquam per illa virus assurgit, & partim universae sanguinis massae, partim partibus vicinis, & ipsis adeo glandulis se infundit & ipsas inficit: Quales autem Glandulae in lue certum istius Luis argumentum peteretur nisi de congressu impuro suspicio vel confessio addit; vel alia Luis symptomata certiora concurrant, gonorrhoea imprimis virulenta, vel ulcera cancrois in partibus genitalibus. *Fr. Sylvius App. Tract. 3. §. 126. &c.*

§. 5. Non in externas duntaxat, quae sub aspectum veniunt, verum etiam in interiores quaeque partes, ipsaeque viscera penetrat, quae in mortuis comparent pustulis ulceribusque feda: *Fernelius l. 2. de Abd. cap. 14. lib. de Luis curat. cap. 4.* Omnia difficillime curatur quae confirmata, quae ossium carie, ac partium cartilaginearum exesione se prodit: quam in interioribus etiam visceribus ulcera & tubercula multa proferre in mortuorum corporibus dissectis notavi. *Idem ibid. c. 7.*

**H**inc plurimi, addit, in hoc morbo, in aliisq; venenariis, capitis, ea quae admodum inani ratione falluntur, quod dum vident symptomata cum humoris cujusdam vitio insultare, nihil praeter humorem inesse putant, nihil majus animo concipiunt ne-

que aciore illa animi acie perferuntur nam aliud quippiam in humore subit in quo praecipua affectionis causa consistat: quale proculdubio si sensa non cernimus, oportet certe ratione & intelligentia comprehendere, &c.

§. 6. Vitiosus humor ex oculis venarum cerebri aliquando exit & exudat, qualem *Alex. Trajanus Petronius* in eorum cerebris reperit qui lue venerea perierunt. *Schneiderus lib. 2. de Catarrh. cap. 10.*

§. 7. Testari possum me in dissecto capite medio, inter duram meningem & totam cranii basin spatio, duram, concretam & siccam crustam, cranii ossibus tenaciter adhaerentem, aliquam tamen, deprehendisse: ac talem saepius in insigniter lue vexatis venerea nostro saeculo ex

et violenta materia hinc protusam eodem loco conerescente, experientia habeo compertissimum. *Falkenburgius apud Magnenum de Tabacco p. m. 129.*

§. 8. Anno 1636. in cranio juvenis, qui paralyti extinctus, undique tempora versus à lue venerea caries, utraque membrana citenacissime adhaerente: debilitato nempe calore naturali, credibile est nervos ita fuisse relaxatos ut gravissimus inde subortus fuerit affectus. *I. Rhodius centur. 1. Observ. 34.*

**Q**ui paralyti extinctus. ] Queritur quoniam fundio in Lue primum afficiatur? Nos accedimus, ut qui statim primario ac per se functiones naturales, ac imprimis Nutritionem ladi, secundario ac per accidens tantum Animales: probatur autem illud quia temper in Lue vel coctus corporis, vel quaedam talem partium Nutritionem ladi: ladi hae quando universa sanguinis massa est infecta: ladi hae quando partes, & quidem illae tantum quae infectae fuerunt, quamdiu tota sanguinis massa necdum est infecta nec proinde venenum per universum corpus est distributum: vel quando ita constitutum & affectum est venenum venereum ut non aequè nocet partibus singulis sed quibusdam duntaxat, quod imprimis observamus fieri in melancholicis qui sic diutius resistent veneno venereo, ita fere dolores patiuntur circa osium membranas pertinaces & magis rebelles, cura: tunc magis difficiles quam caeteri, & imprimis sanguinis, quorum constitutio fieri ve-

nenum facile admittit & mox manifestat, ita ab eodem citius & facilius liberatur & curatur, Animales autem functiones ladiuntur secundario, quia humores acidi & acres, quoties ad partes sensibiles accedunt, dolores in ipsis excitant, & tum haec, tum quatenus partes à se erosas ad motum ineptas reddunt, Animalis motui adversantur *Sylvius l. c. §. 57.*

In cranio caries ] Que si circa suturas contingat periculosior est, notante *Marchetti* in sylloge observat. Med. Chirurg. xvi. Vidi inquit, in laborantibus gummate Gallico supra suturas, tortosis à venetica qualitate petechia & cranio, arque distillantibus ichoribus in eo genitis, supra duram meningem, subortam convulsivam & mortem. Imo ab eadem carie etiam Epilepsiam observavit *I. Valerius Rumerus* in Sartore Veneto, morbo Venereo extreme laborante, qui ob excessum calvariae partem posticam in epilepsiam saepius incidebat, à qua tandem interit.

§. 9. Nec miranda cranij caries: in theatro enim anatomico Paravij anno 1651. à V. C. A. Molinette aperto capite rustici lue venerea inquinari, tria gummata candida inhaerebant durae membranae, pia illarum, cujus vestigia calva corrosa erant conspicua. Talia etiam tradit *Mercator de morbo Gall, lib. 2. c. 6. Rhodius centur. 1. Observ. 33.*

**T**ria Gummata ] Gummata sunt Tophi vel Tubercula hinc inde ossibus sub periostris accrescentes, atque materia porulosa, sed valde tenaci, viscida & coagulata constantia, & ubique deformitatem insignem ac inequalitatem comitem habentia: Has prout ab antiquis punitam viscidam pro materia agnoscere vixus evincit, & curatio per medica-

menta eandem punitam incidentia sensimque dissolvencia, mercurium imprimis, & olea Pallasina, ideoque tale volatili oleo abundanter confirmati. Quisquis autem visciditatem omnem ad Acido & Pingui produci novit, concludet hic utrumque habere locum atque acidum necessario simul peccare. *Sylvius de le Boe Append. Tract. 3. §. 94.*

§. 10. Nonnunquam inter duas cranij tabulas transcolatione quadam humor colligitur, qui tractu temporis vitiat, acerbissimos cruciatus inducit, quod saepius accidit in lue Venerea, inveterata, & tum Exostosi quadam cranium protuberat. *Riolanus Enchir. Anat. lib. 5. cap. 7. Ralsincius Dissert. Anat. lib. 2. cap. 11.*

**A**cerbissimos cruciatus ] Doloribus, iisque rodentibus, obnoxijunt lue inquinari, nocturno praesentim tempore gravioribus, caput afflicti- bus & loca inter articulos media: qui dolores quia per laniationes aegros afficiunt hos ab Acido quoque derivat laudatus *Sylvius*, eo quod omnibus con-

stet ab Acidis perperam assumptis lancinantes dolores excitari, quales proinde ab Acidis fornicatus assumptis producuntur dolores tales ab Acido in corpore existente ac peccante itidem produci necesse esse. *Sylvius l. c. §. 98.*

§. 11. Nuper dum mulierem quandam morbo Gallico interemptam rescaremus, causam morbi perquirendo ossa sub membranis suis integris tumentia, & ad medullam usque suppurata invenimus: ea duntaxat ratione quoniam & ipsa nutriuntur, & abcessibus ob id afficiuntur. *Al. Benedictus lib. 1. cap. 6. Anat.*

§. 12. Ossa capitis erodi frequenter contingit sub ijs tumoribus qui Luis symptomata habent, quorum plerique ad artheromatam, alii ad meliceridum naturam accedunt: qui si diu incurati permanerint, os quod subest corrumpitur ac cariosum redditur, Imo & aliquando abcessus gignuntur. *Dodoneus annotat. ad caput dictum.*

§. 13. Ossa in Lue venerea cariosa fieri fragilia non est rari: degi in M. S. Marquardi Slegeli ipsum in musco suo servare sceleron cujusdam nobilis metreticis venetae, ex lue venerea consumptae, epiglottidem quae excelsam habuerat, atque propterea ex cibo in tracheam arteriam illapsa suffocata fuerat: In hac factus repertus est masculinus pariter hae labe contaminatus, ubi ossa cariosa ob lumen dictam videre licuit.

§. 14. Ipsemet Parisius notavi quod Nobili cuidam Burgundo ex confirmata & inveterata lue venerea ossa tam fragilia essent ut ad minimum impulsu frangerentur.

§. 15. Servo etiam & hodie radium dextrum brachij cujusdam militis, qui sex vel septem locis excelsus & perforatus existit: Hoc me Rotemagi Gallorum donavir Chirurgus quidam Castrensis, qui ipsum ex brachio militis lue venerea extincti extraxerat. *Alardus Hermannus Commenus miscell. cur. anni 3. Obser. 112.*

**O**ssa erodi) Inter Luis symptomata locum habet caries ossium; sicut enim partium mollium corruptio & consumptio ulterius nomine venit, ita partium duriorum ac ossium præsertim corruptio atque exsilio caries vocatur: Tantum autem abest ut à lixivo sale producatur ossium caries, ut ab ipso tanquam cauterio potenciali non raro curetur æque ac à caute-

rio actuali h. e. ferro ignito carioso ossi applicato. Si proinde à lixivo sale curetur caries, corrigaturque ipsius causa, si quidem ossa corrodat, itidem acris, ad aliam acrimoniam erit recurrendum, ergo ad Acidum postquam præter acidum lixivam saliam terra hæcenus frustra perquisita *Sylvius Tract. de Lue venerea Append. §. 88.*

§. 16. A me dissectum cadaver in nosodochio incurabilium, hominis lue venerea commor-  
tui, cui reperta sunt ossa pectoris & juguli, & aliquæ costarum insignibus tumoribus exaltata,  
quibus subinde ruptis apertisque, puris graviter olentis nonnulla portio manavit, quo demum  
exhausto, patulus & cavus ossis sinus apparuit. *Phil. Ingrassias lib. de Tumoribus.*

## OBSERVATIO

*Secur ratione morbi veneris ulceratum. 1. 2. 3. 4.*

§. 1. **H**oc vitium Aërius nuncupat colliquamentum, quia emaciatur & velut colliquatur  
eorum corpus: Est autem ulcus Jecoris nil aliud quam soluta unitas Jecoris, ex osio-  
ne proeucta: potissimum succedit inflammationi, quæ ad suppurationem perducitur: potest au-  
tem fieri citra inflammationem prægressam, ex acris succis: Interdum vidi Jecur ulceratum  
ratione affectus Morbi gallici, ratione mordacitatis materię. *Capivaccius Pract. lib. 3. cap. 23.*

**H**inc subjectum ipsius virulentę Luis in quo  
propria Luis substantia, seu in fomite & prin-  
cipali domicilio reperitur, frequentissime esse Jecur  
statuit, quia hoc malum plerumque oritur ob veneris  
usum, in quo ratione motus & caloris, por illius par-

tis recluditur, ut lues: promptum habeat in jecur  
transitum: Hoc autem fomies esse ex eodem cognosci-  
tur, si malum originē à eodem duxerit si bubo in dextra  
ingue dextrę, si reliqua symptomata magis pertinent  
ad dextram partem, potissimum si tanguiscano lęsa est.

§. 2. Aliquando Hydropici, ob Lienis enorme vitium, sectioni interfuit, cui vulnus  
qualis lienosorum: Maximam adolescentię partem Italia transigerat, ubi Syphilidis alicui  
num fuisse fama erat: Jecur quoad substantiam quidem & colorem suam servaverat: Columni-  
tatem, tunica autem omnino erat destitutum, ac tota superficies quasi à foricibus artosa: Hydro-  
pis causam inde licebat arcescere, quasi ob frequentiam hydatidum, ( quæ disruptę serum vel  
lympham in abdomen deposuissent ) ambiente tunica sic foret: politum; atque pro tempore,  
honoris ægri gratia consensum adhibui, Sed si inde origo hydropis ( quæ in liene manifestissima  
erat ) deducenda fuisset, vel superstites fuissent alique hydatides, vel vitium non in tunica am-  
biente solum se aperuisset, sed in ipso parenchymate, quod illi sum omnino apparuit.

§. 3. Ex morbo Gallico in quodam juvene Romano, totam fero Jecoris tunicam ambiente vidi-  
mus erosam, de qua nunquam vivens conquestas fuerat. *Alex. Benedictus Practica lib. 13. cap. 23.*

§. 4. Existimant non inferioris classis autores morbum Gallicum consistere in soluta uni-  
tate Hepatis, quod falsum esse cognoverunt Anatomici, qui Hepata infectorum, marium & fe-  
minarum, diligentissime secuerunt, neque ullam continui solutionem cognoverunt in eorum vis-  
ceribus. Quamquam alij testantur se ex anatome percipisse jecur viri infecti, scabie & pustulis  
veluti quibusdam affectum: Atque ego memini vidisse meretricis insignis sectionem Patavij,  
cujus Hepar altera ex parte scabiosum peno rotum erat, cum tamen nil aliud intrinsecus aut  
extrinsecus appareret quod p. n. existeret, Ea dum secatur, extruditur Jecur, relexus summa  
eum attentione expectatur: constabat enim eam non semel tantum, sed pluries morbo Gallico  
laborasse: Factum autem est ut inuentibus nobis nulla in visceribus noxa visa fuerit, præter  
scabiem in convexa Jecotis parte: Hæc autem etsi vera sunt, raro tamen id evenire testantur  
anatomy & experientia, ad quam transmittendi sunt illi qui de hac re accipites esse non do-  
finunt. *Bernardinus Tomitanus lib. 2. c. 13. de morbo Gallico.*

§. 5. Anno 1624. Adr. Spigelio secante puellę corpus annorum XII. quæ in valerudinario D.  
Francisci non maturefcentibus venereis Bubonibus extincta, Hepar plane integrum, Ex quo  
planum fit non semper viscus hoc lue venerea infectis libefactatum. *Ioannes Rhodius centur. 3.  
Observat. 81.*

## OBSERVATIO III.

*In cadaveribus quorundam qui hydrargyrosin passi, mercurius repertus.*

**Q**uosdam vidit Trajanus ante obitum litu hydrargyrato inunctos, & quorum secto cada-  
vere hydrargyrus copiosus repertus est, in cranio. nempe, scapularum & brachiorum  
juncturis. *Ioh. Remodens Mat. Med. lib. 2. se 4. 1. 34. 15.*

Filia XII. annorum lue Gallica ex parentibus contracta laborans, varijs multisque ex hy-  
drargyrio præparatis, unctionibus adhibitis, neque ad salivationem, neque ad sudores, neque  
excretionem pervenit, sed post annum in mense Martio, quo uncta fuit, suas operationes com-  
plevit, spuitione & superveniente diarrhœa virulenta ex hydrargyro contracta moritur.

Dissecto cadavere circa juncturas gutturæ tremulæ hydrargyri à me inventę sunt. *Nic. Fa-  
stianus Respons. & curat. medic. p. 100.*

P. Castellus Medic. Romanus in Xenodochio incurabilium Romę, in illis qui post mercuriales  
unctiones obierant, capitis tibiæque ossium cavitates argento vivo scatere deprehendit.

*Idem* in uxorē Iurisei infuit, quæ frequen ex inunctione ex hydragyro usa erat, & in maximam capitis gravitatem devenerat, binas ejus uncias invenit.

\* *Enslachium Rudius* lib. v. de morbis oculo cap. 15. scribit se vidisse, idque & alios observasse, corpora quædam dissecata fuisse, in quibus argenti vivi in ossium cavitatibus non exigua copia ex inunctione in morbo Gallico fuit collecta.

*Schenckius* lib. 7. de hydragyro obs. 20. scribit scaidam frequenter utenti mercurio accidisse ut mercurius brachio elevato & dimisso in eo fluctuaret, & motu manifeste perciperetur: Neque quidem Platerus id per inunctiones in corpus penetrare

posse, verum hemo qui argentum vivum traxavit, ejusque vires & naturam perspectas haber, Platero facile assentietur, Rationes adducit Sennertus. l. 1. Prax. p. 2. cap. 25.

## OBSERVATIO IV.

*In cadavere cujusdam lue infecti cuncta viscera nutritia sana reperia sunt.*

**Q**Uoniam Iecur est omnium libidinum, cupidinū, cupiditatumque causa, perhibetur id sedes lue veneræ, Et tamen anno 1632. dissecui in Scholis Medicis Paris. publice cadaver scotti famosissimi, in quo deprehendi euncta viscera nutritia sana & integra, absque ullo vicio: Cum tamen haberet cranium in diversis locis earie exesum, & Exostosin in tibia sinistra. *Riolanus Anthropegr. lib. 2. cap. 21.*

**H**inc inferre liceret Luem morbum esse habitus corporis, cujus sunt affectiones, citra labem interiorum viscerum.

\* *Cuncta viscera nutritia sana* Quæritur in quonam subiecto hæreat venenum venereum, an in partibus fluidis & contentis? Censeo ipsum consistere primario in contentis, ac pro subiecto vero agnoscere humores Acidos naturaliter in nobis existentes, h. e. venenum venereum forissecus communicarum, in fœore acinquinare imprimis partem humorum nostro-

rum ætiam, & illam ita corrumpere, atque à statu naturali abducere ut acrimoniâ rodentem/acquirat, cujus vi non tantum totam sanguinis massam, omnesque alios in nobis observabiles humores, bilem salivam succum pancreaticum, lympham, spiritus animales, ac imprimis semen atque lac inquinet atque inficiat, sed partes quoque solidas & continentas quavis, cutim, carnes, glandulas membranas & ipsa ossa rodar & tandem consumat. *Sylvius de la Boë Append. Tract. 3. §. 6.*

## OBSERVATIO V.

*De Tricis, Seu Plica Polonica.*

*In eorum sanguine qui Plica correpti interiire Pili reperi sunt.*

**N**on sub cute tantum, imo etiam in ipsis venis Crines reperiri genitos, valde punentes & acriter vellicantes probat historia à Slovacio Medico Cracoviensi allata de Matrona, in cujus sanguine pilos vidit ( quique affectum hunc, ut curaretur rogatus, respondit irrita fore omnia, versari enim matronam in eo affectu jam deplorato, qui sanguinem habeat omni ex parte pilis refertum. ) Sed & omnium certissima testis *avivula*, & inspectio sanguinis ocularis eorum qui Plica correpti obierunt, quorum in sanguine pilos acres & stimulantis videbis. *Sculetus Trichiasis admir. p. 52. Saxonia Panthei lib. 10. cap. 25.*

**P**Lica est Pilorum sibi invicem junctorum adeo arcta intricario atque implicatio ut nullo pacto amplius discerni aut extricari possint à certa causa interna & præter naturam proveniens. Familiaris est hic affectus & quasi Endemius Polonis, præcipue Russis, quorum infantes sæpe cum eo nascuntur: vidi tamen etiam Patavii in Germana, in cujus ædibus habitabant Poloni duplicem statuunt Plicam, alteram masculam, alteram feminam; hæc totum horribili spectaculo involvit caput; ita ut non tam capilli, quam alicui Pileus congenitus homini videatur. Mascula est quæ propendentes aliquot ad instar funiculorum spiras habet: Hujus mali cause sunt vitiosi & maligni humores, ob peculiarem loci, præcipue Russiæ, æris & aquarum genium ad caput ferri & in pilos commutari nati: quemadmodum alicubi aquarum vitio Bronchocelæ incolis adnascuntur. *Jochims Pastorii Florus Polonicus* lib. 2. cap. 14. narrat tempore I scilicet Nigri Poloniarum Principis, in Russiâ rubra, à transsibitibus Tartaris immixtis humanis cordibus, quæ veneno imbuerant, infectas aquas, nova morborum genera peperisse, quorum ut illa causa fessellit Medicos, ita sôboles hodie quoque in inexplicabili Tricarum contagio, quam Plicam vocant, creditur vulgo superasse. *Spondanus* etiam anno 1287. n. 10. ita scribit, Ceterum ne Russi quidem quonquam Socii, prorsus expertes malorum à Tarta-

ris fuere: nam excessari illi è Russiâ, ut est malitiosum hominum genus, atque incantationum atque veneficiorum gnarum, aquas omnes infecerant, exfectis capivorum cæcorum cordibus & præsentissimo veneno imbutis, ac verubus subter aquas defixis: unde plurimi mortales, cum tertius mali causa animadversa esset, miserabiliter extincti sunt: Idem ajunt *Brovius, Cramerus, Dlugossius*, alique historici Poloni: Et concordes in Russiâ traditio est Plicam ab illis aquis infectis esse derivatam: cui favere potest ipsius regionis temperamentum sen indoles, nam Plica laboranti caput raderè in Polonia perniciosum: in Tartaria verò, si quis Plica affectus eò deductus captivus fuerit, ratura minime nocet, ob climatis benignitatem.

Defertur ista materia vitiosa & maligna ad Pilos, non per modum fuliginis, ex qua tantum creduntur oriri Pili, sed simul cum sanguine, utpote quo pilos ipsos nutriti hinc manifestum est, quod pili hi intricati abscessi quandoque sanguinem fundant.

Est Plica symptomaticum quid, sed aliquando criticum, ortum ex materie istius vitiosæ expulsiōne versus caputnam Plica nihil periculi ægris adfert, sæpeque sine ullo damno ad mortem usque circumfertur, id vero quod maxime ægrum infestat, est humor ille malus in corpore hærens, unde pili oriuntur, hic enim est qui gravissima illa symptomatica efficit quæ jam enumeratum eo.

Incipiente Trichomate unius & alter cirrus in capite vel barba excrefcit, cum vicinis sibi crinibus introrsum implicatur & densus, antequam sit excrefcit, vel etiam quamvis excreverit, modo tamen materia vitiosa in corpore redundet, ossa infringuntur, laxantur artus, membra conglobantur, ac retorquentur, gibbi efficiuntur, pediculi funduntur, quibus caput ita oppletur ut pediculi in Plica adsint. Narrat mihi Lovanii Ill. D. Theodorus Skuminovius Episc. Gratianopolitans, se novisse nobilem Polonum fere sexagenarium in alba Russia, cui pars capitis Plica formata ad instar pilosae pyramidis circata, nullum unquam habuit pediculum: quin è contrario si vivus pediculus capiti ejus imponeretur, moriebatur. Si cinni hi & cirri radantur intempestive, humor malignus, & virus in corpus relabitur & ægros jam dictis modis torquet: Caput, pedes, manus, omnes artus, omnes juncturae, omnis corporis partes exagitantur, ideo morbus hic Polonica lingua vocatur *Gez dec*, quasi clavis, quod corporis, capitis præcipue, clavis confixi dolorem æquet, ungues aliquando præcipue in pedibus & maxime in pollicibus; scabi, longi & nigri fiunt instar cornu hircini: Observatum est qui tales

fasciculos implicatorum inter se crinium detraherent vel ungues illos præscidissent, oculis capros fuisse, aut deflexionibus ad alias partes gravissime afflictos. Purgantia usitata si exhibeantur, efficiantur maliora. Quidam cum aliquot annis hoc genere mali cruciati essent, nec caput radissent, sed omnem spurcitiem ac molestiam pertinaciter pertraxissent, tandem virulentis illis cirris sponte sua decidentibus convalescere consumpta scilicet tota illa maligna materia in capillos, quod de Mascula Plica intellige, nam femina est immedicabilis: Contrahitur hoc malum etiam per contagium, si quis aliquoties sibi imponat pileum sudore Plica laborantis madidum. *Plempius Tractatus de Pili cap. vii. Vide Sennertum Prae. lib. 5. p. 3. Sect. 1. cap. 12. Sylvaticum conf. 19. lib. 1. Tardanus de signis de Pili cap. 9. & alios.*

Neopolitani, si extremi in occipite capilli puerulis suis cirri instar promineant excrefcantque, nolunt decurrere: persuasum quippe illis à davi moriturum infantem seu Epilepsia seu febre pestilentiali, si pili illi occipitis abscindantur, Th. Bartholini *Hist. 94. cent. 2.*

### \* ADDITAMENTUM.

#### OBSERVATIO unica

In Viro lue inquinato, cum dolore capitis, Epilepsia, Melancholia, Cachexia, Ophthalmia utrius oculi, &c. Sinus cerebri sinister aqua plenus repertus, cum parte cerebri corrupta & gummati in ea.

**A**ffectum adeest complicatio ipsius Luis cum casu Epileptico, & melancholico: Sub Epilepticis concussionibus pustulae in capite erumpunt, Tum capitis dolor, cum totius corporis Decoloratione & livore in eo homine qui coloratissimus esse consuevit: Praesertim hoc in oculis insolentius cernitur, quod Luis familiare est, & à peritis hominibus maxime certum illius indicium receptum: Corpus suapte natura validum, nunquam non aliquod mali sentit: Adfunt in cruribus & pedibus Tumores molles & albi: videmus Somnolentiam, quanquam non arcto somno prementem: memoria valde laesa: Auditus, cum malum recens esset saepe fuit laesus nunc acris admodum est: Verum novissime aliud supervenit quod præceps vite periculum habere videbatur, Factus est impetus dictorum humorum in caput, quo comitiales easus generis ejusdam atrocissimi fiunt, semper aliquod detrahunt usus ipsorum nervorum, & præcipue eorum qui ad linguam pertinent: Casum hunc dolor capitis acerbissimus & diurnus antecessit, qui in dextra capitis parte esset: Cum Gallica symptomata Illustr. Virum primo invasisent, illa tunc per Guajacum facile fuere sublata, adeo ut octava die potionum illius oculus sinister ruborem amitteret, & sinapitis pustulae abolerentur, ulcere etiam glandis sanefcente, atque in eo bono statu fuit toto reliquo potionum tempore, quæ ad 40. diem productæ sunt, post hos levi tempestatis occasione qua vento sese objecisset, repente in capitis gravitatem, in furditarem, in maculas dextri temporis rubras & frontis incidit, tum autem in ruborem Oculi tantum ut totus oculus occuparetur, sine tamen dolore, nihil autem videre oculus poterat: Itaque cum per Guajacum hyberno tempore convalescere visus esset, intergerimæ valentinis speciem jam retinebat, cum repente in sinapite cutis extumuit in mollissimum oedem, Artus dolore tenari sunt, glans ulceribus excisa, & mille alia mala sunt consecuta, &c. Hic Patavium deductus est sub aquarum potione; inde in patriam revertens, ubique exaceratus est perpetuis, convulsionibus agitur, colli præsertim & alterius brachij, neque bene loqui poterat, medicus comminiscabatur motum illum à cacodemone fieri quem mutum appellabat, saepe æger linguam solvere non poterat: Tandem caro superveniente, hicin lethargum devenit & hominem extinxit.

Cui capite aperto Sinus cerebri sinister totus aqua refertus erat, & pars cerebri corrupta, ac si gangrenam tulisset; Erant & in media illa corruptione tria corpuscula tanquam gummata virentia: Febris fuerat acutissima, & una cum profundissimo eo somno ipsum circiter horis 21. sustulerat. *Christoph. Guarinonius consultat. 28. 29. & 30.*

**A**ffectum complicatio. &c.] Præter memorata nunquam non aliquod mali sentit, omitto rot imbecillitatis facultatum concoquentium indicia, quod sunt in cruribus & pedibus tumores molles & albi male coctionis Jecoris attestantes, sub ipsoque theriacæ usu non cessantes; quod urine

continenter crudiores sunt &c. Luis vero natura fere ab omnibus posita est in virtutis nutritivæ vicio, in parte ejus præcipue concoctrice, ut est necesse, cum ipsa malis vitiis facere ejus proprium sit, morbos enim Rheumaticos Galenus in imbecillitatem seu vitium facultatis totum corpus regentis refe-

rebat, quos morbos etiam recenset. cum de tumoribus agit, qui de genere inflammationis sunt; Et profecto si ullus alius morbus est; is vere est, qui cum affectus *psuallens* faciat, & nulli non parti infestus, & in virtutis altricis vitium, & ejus quæ totum corpus continet est referendus, Atque si Galenus ex unius partis inflammatione *psuallens* constituit, tanquam ex symptomate, vim totius corporis male habere, cur non multo maxime id faciamus nos in eo morbo à quo nulla pars tuta est, & nunquam una sola tentari consuevit? Foras vero quæ curatio idem non penitus demonstrat, quo semper duas partes postulat, nunquam earum altera contenta, unam qua Jecur, alteram qua totum corpus expurgat: unam medicinis per alvum aut vomitum purgantibus, alteram sudore in moventibus usum, ut & ventres, & carnes, mediz & eminentes corporis partes expurgentur, nimirum totius corporis natura redintegretur, discussio ab ejus partibus vitio. *Idem consult. 28.*

*Psulla in capite, &c.* Lue vitium esse intemperiem cum materia nulla dobitatio est, ea propter purgationibus & omnino humorum depletionibus consumitur, & ab eo saepenumero homines purgatis ventribus, solo labore & exercitatione adjecta liberantur, quoniam cum materia expellenda intemperies una secum epeit, nunquam vero è contra fit, ut sola temperatione adhibita solis tam celebrati alexipharmaci nominis medicamenti sine repletionem universi corporis morbus vincatur, unde in summa persuasum habeam hoc vitium etiam in Habitu totius corporis effandi, sæpeque in eo contineri, ut scabies prava contagio accepta, Et eos longe errare, qui cum in uno Jecore vitium statuunt, morbumque esse à tota substantia, per substantiam non temperiem certo modo expressam, sed corpus ipsum intelligunt, solis namque exercitationibus illud in suam naturam non rediret quæ calore excitato coctionem solum & expulsionem humorum faciunt, neque vitium in substantia situm possunt exturbare. *Idem ibidem.*

*Comitiales casus generis cujusdam atrocissimi.* Possit aliquis existimare quod casus epilepticus fiat ab humoribus calidis, si calidorum humorum aliquæ notæ existerent, atque neque illæ ullæ sunt, & frigidorum plurimæ: Sed quod verat fieri epilep-

cum hunc casum à maligno illo genere humoribus inducto, quo commune nervorum principium vexetur, aut mordacibus ejus vaporibus immisus, aut ipsomet id principium attingente, &c. Fere quidem casus Epilepticus fit à malo spiritu, dum cum bono in nervos fertur, & impetu expulsi eos tendit &c. *Idem ibidem.* Quæ causa Epilepticotum insaltum fuerit anatome, capitis palam fecit: hæc consentit Willis dum copulam elasticam, spiritibus animalibus commistam Epilepsiz & motum convulsivorum auctorem facit.

*Auditus &c.* Auditus sortem longe mutavit, nam cum malum recens esset, sæpe tum sicut levis, ut surdum hominem penitus diu haberet, nunc acris admodum est & subtilissime audiri, forsitan tunc humidior & calidior morbo suis halitibus aures occupante; vel bile aquosa vaporosaque, cui facilis est osium penetratio: nunc contra corpore & morbo siccioribus, etia recreimenta humidiora sint crassiora, hæc tamen & frigidiora minus possunt in angustissimos auditus meatus induci osibus & nervis contentos, & ipsi corporis siccitate acrior eorum sensus factus est; Sic in multis hydropicis observamus & melancholicis factum esse. *Idem consult. 29.*

*Tanquam Gummata* Dubitavit quidam ne sit aliqua ossis caries, ex qua mali ichores saniesve, malique habitus cerebrum infestantes ejus casus causa sint, Cui ego responsum volo quod caries illa non sine multis secum contentibus esse possit: atque si in cranio esset, aliquam sui notam in eum exhalasset: si in basi capitis, etiam per palatum aliquam ostendisset, maxime fædi odoris: quo pacto vero eum casum asserret, nisi etiam membranas maxime initio suo infestaret? *Vidi ego alius Gummata dicta in cerebro concreta, ejus qui sic corripere- tur & dixeretur, quemadmodum hæc videmus, à quibus ichores & mali generis halitus etiam in multa copia poterant tantum incommodorum asserre: Ita in cerebro potius aliquid timerem ab halitibus & vaporibus continentibus ascendebus concruisse, quam ossis vitia fieri. No enim cerebri affecti non cranii apertæ extant: Mitto quod ex carie breviora essent mala, neque tot incommoda relinquerent tum in cerebri facultatibus tum in membris omnibus. *Idem ibidem.**

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

### SECTIO X.

#### De Morbis oculis, Chronicis, à Veneno inductis.

#### OBSERVATIO I.

*Morbus oculum & diuturnus ob Vlcus sub altera cordis auricula. 1. Ob callum induratum in cordis auricula sinistra 2. Polypi reperti in vena cava diu ob morbum decuborum. 3. In utroque ventriculo lentomorbo extincti. 4. Sanguis coralliformis in venis lenta morte extincti repertus. 5. Languor diuturnus à lapidibus pluribus in Pulmonibus congestis. 6. Diuturno morbo confecti cordis sub.*



*substantia absorbpta, solo superfluo involucro. 7. Morbus incognitus à lapillo in substantia Cordis contento. 8. Diu valedudinarium ob multiplicem viscerum omnium lesionem. 9. Morbus à vermibus in cerebro 10.*

**S. 1.** **M**EMIMI quod Venetijs dum cadaver quoddam secaremus, quod fuerat hominis qui ex diuturno morbo tandem in quodam hospitali mortuus est, invenimus parvum sub altera auricula cordis ulus, quod videbatur antiquum, aliquantulum profundum, purulentum & sordidum. *Victor Trincavellini de ratione curandi lib. 6. cap. 11.*

**L**aborat plerumque cor ex intemperatura ab eo contracta, atque cuiusque tum compositarum tum simplicium differentia obnoxium est, cum interea & circa illam, sed ab ea nequaquam corripitur potest quae sequitur tumorem aliquem p. n. ut sunt inflammationes, citrhi, &c. Nam ut *Galenus* 2. & 3. de p. n. g. ex pulsibus regulis, cum ejusmodi tumores in corde oriuntur, concitantur adeo vehementia animi deliquit, statim inter initia, ut hominem omnino intermag. Quod quidem puto esse intelligendum.

**S. 2.** Incito cujusdam cadavere, & viscera omnia vento plena conspexitimus, Et in sinistro cordis ventriculo obduratum callum invenimus, qui nucis magnitudinem æquaret, Quare ut ventum mortis ipsius, ita callum adversæ hominis valetudinis causam fuisse arbitrati sumus. *Benaventius cap. 81. de Abditu.*

**S. 3.** Jac. Kroll. adolescens xvij. annorum laboravit à calculo vesicæ, &c. Ejus vnam cavam cum dissectissem, corpora alba, pituitosa seu fibrosa, cavitatem ejus fere replentia reperi, qualia in diu decubulis, & à morbis chronicis sublati sæpius vidi *Joh. Jacob. Weyferus Exercit. de Asyplexia p. 124.*

**E**jusmodi concretamenta reperta esse in venis magnis quæ cordi inferuntur, atque etiam in hujus auriculis ait *Idem* p. 177. Quo vero morbo sit extin-

quando in internis partibus & penitionibus oritur tumor, alioquin enim memini quod Venetijs &c. (*Vide historiam*) Quodcumque autem fuerit illud ulcus, sive aliqua vomicæ fuerit, sive ex erosione, sive ex putredine, videtur rationi consonum quod si hæc pertulerit diu, possit etiam scirrhum aliquandiu ferre. Sed externæ, imo externæ partes, non sunt tantum momenti ficiæ interior ejus substantia & ventres. *Idem ibidem.*

gus non aperit : De iis pluribus in locis lib. percedentibus ex eodem & *Wilsio.*

**S. 4.** Vidit N Polypum utriusque ventriculi cordis in quodam lenta morte extincto, respiratione sensim deficiente. *Vide lib. 2. tit. de Respiratione difficili.*

**S. 5.** Magna vis est venarum, quæ conceptum sanguinem coire nunquam sinunt, nisi fortasse ex rara quadam & abditâ causâ, Ex qua vidimus quempiam post diuturnum languorem de vita excessisse, cui sanguis universus in vena concreverat, adeo ut demum coralli modo fricans eximeretur. *Fernelius Physiologia lib. 6. cap. 8.*

**E**x rara & abditâ morbi causâ } Mortem repentinam sæpiissime accidere in Britannia Occidentalis regionibus alijsq. locis, ipsi qui eruen do plumbi reliquisq. metallis operam dant, refert *Malactias Trifolius* diatriba de Respirat. ut putentur halitu quodam ab ore faucibus egresso, morte nec opipantes opprimi. Causam putat esse quod vapor teterissimus ore haustus, atque pulmonibus exceptus pertranscunt sanguini manus injiciat, cursum inhibeat, ejus molem cogat, coerceat, figat, misisset, constingit, indeque minus mirum videri illis, qui docente *Ill. Boyle*, norint argenteum vivum fusi plumbi halitibus momento fere temporis figi posse, & quidem pertinaciter. Tantis nempe viribus pollere Saturnum illud, igneum alias ut videtur silicernium, ut ipsi Mercurio idem faciat quod Vulcanus Marti fecisse dicitur, illi enim quamcumvis volberi & fugaci, levissimo negotio vincula forniat, cōspēdēs necesse, plumarum denique & alarum remigio spoliat.

*Sanguis concreverat in vena* } Sanguinis illam concretione alij observarunt : *Placernus* Qbserv. lib. 2. p. 30. ait in quodam febre hectica extincto, venas melancolicas sanguine crasso & concretæ sumnisse, qui et majoribus venis coralli instar nigricans coherens extrahabatur. *Ballonius* lib. 1. Epidem. p. 242. refert quidam sanguinem nigramentum concrevisse in venis, ut carbonis illi impacti crederentur. Cuiusdam inquit *Bartholinæ* p. 3. hist. 94. sanguis tam erat à melancholico humore exsiccatior, ut omnes venæ cordis, & ipsum cor à Chirurgo dissicari nequiverit : *Riolanus* in En-

cheirid. Anatom. l. 2. c. 27. testatur se aliquoties vidisse in febribus ardentibus malignis, concretum sanguinem intra venas, instar medullæ sambocinæ : Cui similem sæpe se deprehendisse eductum è venis malignis febricitantium asserit *S. Pauli Digress. de Febrib. malignis* §. 30. Idem adnotavit *Satius* De affect. partic. cap. 4. Ejusmodi sanguinem ad coagulationem vergentem *Galenus* comm. in 3. Epid. 6. tit. 29. eductum vidit ab extenuatissima muliercula, cui post octo mensium menstruum suppressionem, secundam curavit vnam. Quia scilicet ipsius vene eminebatur sanguis plena colore livida, cui ex resecso vasculo liquida puri & calidi & crassitudine emanavit. Ideo puri similem & colore & crassitudine à pparuisse dicit *Vander Linden* in Seclæ medic. p. 644. quis ille sero, sanguinis vehiculo, caruit, comparandus lentescens & corrupto viro, vel etiam olei strigmentis. Talem autem, inquit *Lindanus*, ardore fieri, non subito, sed paulatim deperceat quicquid est chymus in massa : Piccus vero, addit sanguis non fit, nisi cum ignis uratur oculis, quæsi cineris doli : Tunc vero nigrorem concipit ex infusione bilis : Lentior vero ex siccatione fibrosus quod est in sanguine : *Spigelius* lib. 6. de corp. hum. lib. 2. c. 2. refert nonnullos à potu frigido, post vehementes corporis motus prociens subucatos fuisse, Arteriam enim refrigerata valde sanguis coagulatus est, tam is qui in aëre fuit, quam ille qui in corde stabulat : videmus enim sella vena sanguinem huius crassum ac frigidum, nec nisi maxima cum difficultate produsse, unde & presens remedium non dicitur iis quæ tennitate partiu sanguinis grumos dissolvunt.

§. 6. Anno 1624. Paterniaci Aventicorum cadaver mulieris diuturno morbo laborantis incidit, In cujus pulmone lapides quamplurimos, tam albi quam atrii coloris reperimus. *Fabritius Hildanus cent. 1. Observ. 29.*

§. 7. Quidam diuturno morbo eum extinctus esset, nullam prorsus in eo portionem cordis, sed ejus tantum tunicam reperimus. *Telescius rerum natur. lib. 5. cap. 18.*

§. 8. *Hieron. Schreiberus* Martio mense anni 1547. in atrocissimum & incognitum morbum incidit, ejus causam præceptores ex nimia cholera & bilis ebullitione profectam, & in colicos dolores transisse existimabant: Cæterum cum Majo mense vitam cum morte commutasset, nos abditam morbi causam indagare constituentes, dissectionem cadaveris aggressi sumus: In quo cum substantia Cordis dissecaretur, repertus est & excisus lapillus nucis muscatæ instar, durissimus, subnigricans, rotundus, & pondo drachmarum aliquot. *Ex observationibus Abrahami Murgelii, Medici Lindensis in Miscell. curiosis anni 1670.*

§. 9. In ejusdem magni nominis viro, post obitum aperto corpore, hæc fuere observata: Scirrhi in dextra parte circa Hepar tres, quamvis ipsius tota substantia solito esset durior: In maximo sinu dexter ren jacuit, in quo duo lapides existerent, oblongus unus alter rotundus: In sinistro rene quoque oblongus repertus; Lien æquavit Hepar suo ambitu: Vesicula fellis 143 lapillos continuit, ex quibus duo facere rotundi, reliqui ovali figura, sed minores: nonnulli adhuc multo minores: in Pulmonum dextra parte magna putredo affuit: Præterea triplex hernia, Omenti, Intestini & Aquosa, quæ caput humanum æquabat: semper fuit valde ordinarius: Ex observationibus *Joachimi Camerarii Noribergensis Archiatri. in miscell. curiosis anni 1670.*

§. 10. Beniventi cum multignoto morbo à vita discederent, tandem Medici hoc morbo interemptum incidere; & in hujus cerebro invenerunt vermem rubeum, brevem, quem cum multis medicamentis vermes occidere vim habentibus occidere non possent, tandem frustra raphani incisâ in vino malvarico ebulliebant, quo vermis occidebatur: atque hoc eodem remedio deinde simili morbo, quasi epidemico, affectos omnes curabant: Hæc in *Cornelii Roterodamensis Medici libro* inveni, qui apud *Gisbertum Horstium* in Nosocomio Maritz consolationis Romæ septem annis ægris ut Medicus assistens inferviebat. *Forestus Scholios ad observ. 2. lib. 9. De vermibus in cerebro. vide alia exempla lib. 1. sect. 1.*

## OBSERVATIO II.

Ignoto morbo extincti cadaver exhibuit cystis felleam bile vacuam. 1. Pancreatis apostema multos occulte perimit. 2. Lenta mors à Pancreate scirrhuso excitata. 3. Valetudinarii pars Jecoris concava fere absumpta reperta est. 4. Morbus incognitus à pulmonibus & hepate vesiculis obstitis. 5. A vesica fellea pluribus calculis obstita. 6. A pulmonum & hepatis putredine. 7. A rene uno, vesica, & cysti fellea sabulo & calculis obseffis. 8. Valetudinarius diu potu glacie refrigerato usus, Hepar habuit prorsus ambum. 9. Morbus incognitus à Jecore lapide juxta vesicam obseffo. 10. A Jecore omnino putrefacto. 11. A mesenterii Glandulis duabus tumidis. 12. A vasorum mesaraicorum obstructione, Pulmonum circa dorsum inflammatione, Abscessu in rene. 13. Ab utero ulcerato, carne spongiosa in ejus cavo. 14. Materia serosa per umbilicum stillans, ab hepate scirrhuso & ulcerato. 15.

§. I. Non paucis è vivis correpti sunt, in quibus non alia interitus causa comparuit quàm quod folliculus bile omnino esset exhaustus, quasi fellis coaccervatio sub Hepate ad vitam necessaria foret. *Fernelius Pathol. lib. 6. cap. 5.*

Veneretamē causam diuturnioris vitæ fellis vacuitatem esse dixerunt, argumento ex solipedum cervorumque genere deducto quæ felle carent & diu vivunt, ex *Aristotele. cap. 2. lib. 4. de partib. animal.* Philosophi sententiam sequutus *Plinius* prodidit fel hominum paucis non esse, quorum valetudo firmior & vitæ longior: Idem testatur non omnibus animalibus fel datum: In *Euboeæ Chalcide* nullum pecori: earent eo quæ abynthio in Ponto vescuntur: quod verissimum putat *Dioscor. cap. de Absynt.* Ergo fellis collectio ad vitam inutilis: Contra *Nemesius, Author Græcus lib. de nat. Homin.* flavam bilem sub hepate per se, atque per aliud reconditam fuisse scribit: Nam ad coctionem conferre, & excrementorum depulsionem movere, simulque calorem quandam præbere corpori instar vitalis facultatis: Nec absurdum est, et si *Pygalus* ridet fellis

vesiculam suppositam & immerfam fuisse Jecori, ut bilis contactu & afflatus, id à putredine vindicaret: Bilis collectionem in cysti ad vitam esse necessariam id apertius convincit quod in hominibus strangulatis, qui dum necem suam expectant per duos vel tres dies inedia sese conficiunt, folliculus nunquam felle vacuus apparuit, imo plenus & rigidulus: Neque in bobus qui per quatuor dies fame macebantur priusquam jugulentur, cystim bile exhaustam invenies: At eo temporis spatio tota bilis vacuari poterat, quum libertas meatuum addit, intestino jejuno vacuo, sed compressa vesicula ne guttatam quidem humoris stillare & effluere semper observavi: addo quod sæpius utero adhuc conclusus vesiculam plenam bile habet. *Rislanus Anthropogri. lib. 2. cap. 20.*

§. 2. Vidi plurimos à fato sectos qui perennibus querelis misere vixerant, quibus ingens apostema, faxe fere duritiei Pancreas occupaverat. *I. Heurnius comm. in aph. 41. sect. 6.*

**P**ancreas Apostematis & puris congestioni obnoxium esse ostendit *Franc. de le Boë Sylvius* Praët. lib. 1. cap. 15. simulque indicia tradit quibus affectum esse dignoscatur, Exemplo mulieris viduae, quæ ex animi dolore in dolorem Lumborum gravem ac diuturnum, hinc & puris vomitum ad dejectionem spontaneam prolapsa est, restitutaque post septennium itidem ex dolore animi grandi in dolorem Lumborum similem ac vehementem deducta est: Conjectans proinde ex superioris affectus narratione latere in loco affecto pus, ex pravâ inflammatione productum ac collectum, exhibuit vomitorio excreta primo die per vomitum puris satis bene cocti plusquam pinta, sive uncie viginti, per alvum vero ejus bona quantitas: Uno autem alterove die

interposito, iterati vomitorii beneficio, denno puris aliqua, minor tamen quam prius, pars sursum deorsumque evacuata: atque pancreas exhibitus cardiacis & putredini resistentibus brevi perfecte restituta. Ex Pancreate autem pus illud vel idcirco proditum putavit, quod illius finis locus affectus responderet: Quodque non semel post mortem in Pancreate offenderit pus majore minoreve copia collectum, nunquam verò in ulla alia parte, à qua vis pateret ad intestina. Nec mirum facile pus inde effundi, aut apostemata crebro creari, quod, ex ejusdem *Sylvii* sententia, sanguinis vomitus ut plurimum ex Pancreate prodeat, propter vas aliquod in ipso à succo acriore apertum, qui sanguis nisi supra vel infra erumpat, in abscessum facile transit.

§. 3. In cadavere profratris mei *Nic ab Hottinga*, 14. annor. pueri, lenta morte extincti, aperti, Hepatis Lienisve constitutio naturalis omnino observatur, cum tamen Pancreas verum, non minus quam illud *Acellij* in mesenterio, scirrhosam omnino maximæque molis fuerit; accedente & præter alia plurima Intestinatorum hinc inde coalitu, neenon Gangræna vera, *G. Blasius ad cap. 4. anat. Veslingii.*

§. 4. Quidam luteoconsultus multos annos fuit valetudinarius cum malo colore: Mortuo inventa pars lecoris concava fere absumpta; Lien vero pulcherrimi coloris, seu lecoris color. *Vesalini Fabr. corp. ij. lib. 5. cap. 9.*

§. 5. Quidam vir doctus scribit filios omnes *Laurentij Gadii* uno & eodem morbo interemptos, Et uno mortuo & dissecto plures vesiculas tum in pulmone tum etiam & in hepate adjacentes. *Marc. Donatus hist. mirab. lib. 4. cap. 18.*

§. 6. Bilis crassior, ac viscidior plerumque ita evadit ab humorem viscidum solum vel simul subansterum illi admixtum, unde non raro in calculos concrevit in folliculo fellis, ductu cystico hepatico, necnon bilario, ut id hyeme nonnunquam contingit bobus: Idem quoque bis observavimus in mulieribus longo morbo extinctis; Harum altera per sex septemve annos continuo laboraverat; In cujus quoque folliculo ultra xxx. calculi variz figure diversique coloris fuere reperti, quos inter unus nucem moschatam magnitudine excelebat. *Fridericus Deekers Exercitat. Med. Praët. p. 250.*

§. 7. Dom. N. languit per 45. dies, nec manifestus erat morbus: Hepar totum putre corruptum, Pulmones corrupti. *Ballonius Paradigm. 174.*

§. 8. Illuſtr. Comes Arundelius affectu Medicis non satis cognito obiit, In rene sinistro calculus sat magnus repertus, cum minoribus: In vesica parvus: Vesicula fellis sabulo plena. *Vid. tit. de Ischuria lib. 3.*

§. 9. *Berius* in discursu Italico de Frigidæ potu cap. ultimo, nimium frigidæ potum non refrigerare, sed per antiperistaltin magis incendere docet, ex visceribus illorum qui ex nimio frigidæ potu obierunt, quæ plane sunt combusta.

Sicut vidit in cadavere Principis cujusdam in aula Romana, cujus hepat profus erat combustum, non aliam ob causam quam propter nimiam potus frigiditatem: Nam cum juvenis esset, nive copiosa utebatur, in mensa sibi apponi curavit maxima glaciæ fusta, præterea ex eadem scyphos sibi confecit ex quibus potabat, & pro singulo haustu novum scyphum: unde per universam vitam cum ægitudine conflictabatur, & adeo ardebant æstu interiora, ut sæpe fassus sit mali sui causam esse quod nihil invenerit quo satis refrigeraretur; Hinc fontanam aquam per canales in museum derivavit, qua neque pro voto refrigerabatur, Et quanquam valetudinarius semper fuerit, minus tamen hyeme quam æstate afficiebatur.

Apparent in quibusdam hominibus monstricæ, qualis in *Augustino Barbado*, Patrio Venetico, quicum dissectus quod ex incerto morbo obijisset, inventus est lapis in jecore juxta fellis vesicam, grandior olivæ nucleo, Et quod magis mirum est, viridis ad nigredinem declinans, qui color durioribus lapidibus solum inesse solet: *Cardanus lib. 8. cap. 44. de rerum variet. Calias Rhodiginus lib. 4. cap. 17. antiq. lectio.*

§. 11. Dissecti cadaver cujusdam Cortigianæ Venetæ, octo mensium gravidæ, jussu Magistratus, ut vere sciretur num veneno aut alio morbo extincta fuerit: ejus enim leno foris jam à quatuor diebus in utero mortuum matrem enecasse certo affirmabat: Cadavere dissecto uterum plane à corpore liberavi: quo dissecto fœtum mortuum omnibus suis involucris denudavi & singula diligenter examinavi, nullam tamen in illo fœtus mortis causam reperi: Unde

ad reliquum cadaveris rediens, naribus aceto fortissimo & angelica bene munitis, ob incredibilem foetorem, reliqua viscera contemplari volui, & primo intestina, deinde ventriculum, mox Jecur, quod plane putridum & foetidissimum offendi, ita ut nullus assistentium ibi manere poterit, & sic festinanter & quasi per transfennam corde viso, reliquisque naturalibus & vitalibus instrumentis, unicuique Jecur mortem attulisse certo pronuntiavimus. *Observatio Georgii Garneri Medici Austriaci.*

§. 12. Vir per x. annos de doloribus ventris conquerebatur, qui cum ad tabem deduxerunt. Ego ad inquirendum ignoti morbi originem admissus, inveni binas mesenterii glandulas insignem molem auctas, quæ renem sinistram ita compresserant ut totus in pus abiret, nullum illis in substantia vitium. *Vide tit. de Ventris dolore lib. 3.*

§. 13. Anno 1678. i. Octob. filia mea *Martina Bonet*, 15. menses nata, obiit, prægresso sex septimanarum langore; commissa fuerat nutritrix rustica in pago, bihori spatio ab urbe distans: unde rediit, quod tertiana febre, tunc temporis epidemica, prehenisa esset, cum insigni abdominis tumore: desit febris, superstitie abdominis intumescencia, cuius causa diu tinctura Rhei, &c. usa est: Comes vero perpetuus fuit languor, inapparentia, solius panis dulcissimi, (bisculis vocant) appetens; extenuatio corporis, citra tussim, lotia effundebat foetidissima; aliorum insignis, adeo ut à solius ignis præsentia iacalesceret; Marcida tandem è vivis discessit.

Me annuente & absente corpusculum dissecut Magister *Lud. Bailly* peritiss. Chirurgus, qui primo adipis omnino eam consumptionem observavit, quamquam non omnino excarnes essent muscoli tum trunci tum abdominis: 2. Jecur amplissimum erat, sed citra labem: Cystis fellis maxima, bilis referta, quæ se ad circumstantes partes, alta flavedine tinctas diffuderat: 3. Splen omnino naturaliter se habebat, ut & 4. Pancreas, quod magnum, succi plenum. 5. Ventriculus, qui cum intestinis omnibus inanis, ad umbilicum usque exputrescens erat: 6. Mesenterium plurimis glandulis, fabam majorem æquantibus refertum: 7. Omentum pinguedine carebat, mediam duntaxat epigastrii regionem stringens, ad latus sinistram convolutum: 8. Vena Porta, cum arteria cœliaca ac propaginibus sanguine turgabant. 9. Renes magnitudinem naturalem aliquomodo excedebant, ureteres sat ampli, sinistram materiam scatomatosa implebat; catheteris introductionem prohibens: in dextro repertus abscessus cum nigredine versus lumbos, Vesicam urina colorata, loturæ catinæ similis, implebat. 10. Pulmonum lobi antici & postici admodum tumidi, Bronchia humore spumoso turgabant: antici color nativus consistit; postici autem ubique fere lividi: Vasa eorum arteriosa & venosa sanguine referta erant: 11. Cor grande: 12. Pericardium humoris omnino experti: 13. Venæ azygos & intercostales admodum distentæ: 14. Cordis auriculæ maximæ, nec non valvulæ triglonides & sigmoides; Paucus adeps cor vestiebat & renes; Ventriculus suas rugas amiserat; Conjectura mea fuit, ex incuria nutritricis casum in dorsum præcessisse, unde sequuta sit latens pulmonum posticorum inflammatio, ac Renis dextri abscessus. Ac præterea deficientē lacte, intempestive solidum cibum & uberiorem porrectum fuisse, unde expansio ventriculi & vasorum mesaraicorum obstructio.

§. 14. Puella post casum de dolore colli conqueritur, hinc dorsi, tandem hypogastrii: Uterus ulceribus erat refertus; In cavitate ejus caro spongiosa reperta. *Vide lib. 3. de Graviditate falsa.*

§. 15. Hæc in viro quidam hujus urbis, cujus nomen erat Urbanus Valcker, notavi: Hic ex vitio Hepatis per annos duos maximos dolores perpeffus est, nihil quicquam perficientibus medicamentis: Ex hujus umbilico sæpe materia alba & serosa distillabat, qui tandem satis concessit.

Post mortem aperto eadavere, hepar induratum, grande, & in gibba parte ultra triginta diversæ magnitudinis ulcusecula habens, inventum est: quæ aperta & dissecta similem, prout ex umbilico fluxerat, materiam, cum foetore tamen aliquali conjunctam, fundebant: In parte autem eava, abscessus, vesicula propria inclusus, magnitudine ovæ gallinacæ deprehensus est. Lien solito minor; Renes, quoad substantiam carnosam in totum consumpti erant, relictis tantummodo involueris seu impedimentis. *Ioh. Frid. Haldenreichius in miscell. cur. ann. 6. & 7. pag. 322.*

## OBSERVATIO III.

*Morbis ignotis ab insigni vermium copia intra Hepatis substantiam. 1. A vermicibus juxta orificium superius ventriculi, & in intestinis ab iis perforatis. 2. In canicula à vermicibus cucurbitinis in intestinis, 3.*

§. 1. Intra Hepatis substantiam cujusdam viri post mortem secti insignem vermium foetoram. In cogniti morbi causam fuisse refert *Cornelius Gemma l. de Divina Natura chyali. Boneti Anatomia Tom. III.*

**P**er experimentorum irrefragabilem demonstrationem stabilitam doctrinam, luculenter patet, plerisque abditos, & Medicis incognitos malignantis naturæ morbos, ut plurimum à virulenta quadam & peregrina putredine pendere, quæ cum tempore animata, uti in verminosam quandam acque insensibilem sobolem degenerat, ita peregrinam quoque exoriorum symptomatum, quorum causa difficultè assignantur Medicis, causam causant: quemadmodum enim nullum cibi genus adeo sanum est, quod non subinde huiusmodi verminosaæ futuræ obnoxium fiat, ita in corpore humano vix ulla vitalium operationum officina est quæ non interdum hac corripitur. Et si universam Medicinæ disciplinæ historiam evolvamus, inveniemus non solum inter præcipuos humani corporis officinas, cordis, hepatis, cerebri, renum, splenis, vesicæ, stomachi, huiusmodi sanctorum ex spuria putredine pullulasse, sed & in ipsis sanguinis canalibus, intestinorum voluminibus, uris variisque modis prognaant fuisse, ut intercutaneos recessus filesam, quos nullo non tempore, etiam in sanitate integra constitutis hominum corporibus huiusmodi fœtere, acari, cimices, ascarides, pediculi, pulices sat superque resstantur: Cum enim unanimes Medicorum sententia, morborum omnium causa sit abditæ quædam inter occultos humorum recessus putredo, putredo vero omnis vel ad proximam dispositionem venies nullis sensibus pervius generet: Pro varia vero humorum dyscrasia putredo pro combinationis humorum malignantium lege varia, virus diversum; diversasque in operando vires acquirat, tales & fœtorem inde pullulantem nascisci necesse est, tanto atque perniciosiores quanto virus animatum inanimi violentius est: hæc siquidem pederentem disseminata, primo humorum massam inficit, deinde serpentes viscera rodit, virus.

§. 2. Virgo N. hinc annos nata xxxvi. filia Nobiliss. N. le Fevre, Domini à S. Laurentii, prope Caralunum in Campania, Galliz Provincia, per sex menses morbo Medicis incognito laboravit: Febricula tenebatur, cardiælgia frequens molesta erat, insignis corporis languor, cum ventris torminibus, tandem corpore nequaquam extenuato subito occubuit.

Dissecto cadavere, vermium in intestinis agmen deprehensum est, à quibus perforata nonnulla reperta sunt: Causa vero subitanæ mortis, & cardiælgia, in peritrigulo se conspicuum dedit, vermium enim agmen conglomeratorum sites orificium superius apparuit. Ex communicatione Nobiliss. Dom. le Gras, desunctæ affinis.

§. 3. Capicula educabat tres catellos, qui una cum matre eodem morbo laboraverant: Uno demortuo projectoque, ipsa quoque mater interijt: Nemine usus agnoscente, Anatomice incidit, interanea dissecutus: Ecce secundum totam intestinorum prolixitatem, series aliquot coherentium candidarum molecularum, cuiusmodi cucurbitæ, aut eucumeri grana sunt, unde videatur fuisse unus ex his latissimis lumbricis quos cucurbitales nonnulli appellant: Erant vero inferne quidem majusculæ duriusculæque, superne vero ita paulatim in minutulas molli usculasque desinebant, ut in summo tandem nihil nisi confusus albor appareret: Peioresque ergo, cum non placeret quicquid curando illi morbo proferebatur tam à Chirurgis quam à quibusdam Medicis, iussit, nescio quo ductus genio, asserri sibi theriacam è qua cum materiz illi ahibuisset, observavit magno suo, circumstantiumque stupore, ipsam statim liquefcere, effluereque in declive: Quapropter iussit catellis duobus, qui supererant, exhiberi theriacam, alexipharmacum effusurum: Ac alter quidem animam iam agens inter exhibendum extinctus est: alter vero adhuc robustior, remedio assumpto omnino convalescit. *Gassendus in vita Petresky lib. 2. pag. 189.*

## OBSERVATIO IV.

Veneno intercepta mulieris cor triplo majus naturali inventum est. 1. Ab hydragryi hæsis extincti sanguis coagulatus fuit. 2. Ab inundatione Mercuriali Pulmones lividi redditi sunt, mucro obstitit, cor flaccidum evasit. 3. A veneno exhibitio ventriculi pars ima excoriata, securis superficialis nigrescens. 4. Inius qui assumpti Arsenici vim evasere, ventriculus à morte exhibitus lateri & profundas erosiones. 5. Venenum corrosivum ventriculum quasi caustico infuso. 6. Puellula veneno intercepta Iecur albicans repertum, intestina fletibus turgida, ventriculus

cali os supernam cresum. 7. Oris ejusdem substantia interna, crofa. 8. Pueri veneno extincti secur  
pallidam evasit, vesicula fellis aqua limpida plena, reperta. 9. Veneni exhibitio falsa suspicio in qua  
dam qui ob retrocedentes morbos occubuit. 10. Veneni dati puella, opinio ab ateri strangulatu  
percutis. 11.

**A**NNO 1596. septuagenariam aperuit quæ venenico tacta dicebatur, quod ipsum con  
firmavit autopsia: Etenim huic cor triplo quam pro consuetudine & proportionem  
subjecti maius, adeo enim intumuerat parte sui dextra, ut universum thoracis latus dextrum  
repleret, distentum una pericardium: Ea parte qua auricula cordis dextra venam excipit ca  
vam, ingens aneurysma in cava venâ conspiciebatur: *Dissecta auricula dextra, reperta in ea ma  
teria concreta coloris flavi, condensata admodum.* Aperta vero vena cava, ipsoque corde, ma  
gna copia concreti plane sanguinis nigerrimi se effundebat: Nec solum illa cavæ parte quæ  
cordi se jungit, sed & omnes corporis venæ concreto sanguine plene erant. Quod nobis su  
spicionem fecit venenum frigidissimum ei fuisse exhibitum, quod adeo extinxerit calorem ut  
sanguis congelatus fuerit: præterquam quod cordi adeo fuerit inimicum ut naturalem ejus  
conformationem perverterit: Aperuit venam cavam in lumborum vertebis, ubi bifurcata  
perit crura, at qui exibat sanguis, concretus erat: Mirum in vivente corpore sanguinem con  
crescere posse: Dissecta fuit hora pomeridiana secunda, cum eodem die hora 7. matutina  
obisset: Arcaput non fuit apertum, licet videremus universam veneni vim in agone mortis  
ad caput transieram: Etenim facies miram in modum inturguerat, labia tumida, palpebræ ita  
distentæ ut bulbi oculorum omni ex parte retracti intra orbitas essent: Tanta autem maligni  
tas ac acrimonia veneni erat ut variis locis cutis faciei exesa esset, emanaretque sanies fulva.  
P. Pawlus Observat. Anatom. 31.

*Dissecta auricula dextra, reperta in ea materia.]*  
Adrianus Spigelius, Epist. ad Sophierum, ratio  
nem reddens cur corda nonnullorum igne domari  
non potuerint, quod Suetonius & Plinius de Cæsare  
Germanico narrant, ait Cor esse in omnibus morbo  
cardiaco, aut à veneno extinctis, sanguine leno ac  
coagulato plenissimum: Id probat partim *avulsio*,  
quod nimirum in ejusmodi dissectionis hominibus, non  
tantum cordis ventriculi, verum etiam venæ cavæ &

arteriæ magnæ trunci, sanguine viscido ac concreto  
plurimo repleti deprehendi fuerint, ita ut incisus il  
lis partibus, satis oblonga ac unita istius coagulati  
sanguinis portio extrahi posuerit: partim etiam  
expulso parvo & vermiculante qui in hisce ægris  
observatur: sicut & denique diversa partium exter  
narum & internarum affectione: nam in talibus æ  
gris partes externas fringere, interiores vero incalē  
cere & uni dicit.

§. 2. Conciliator in libro de venenis narrat Pharmacopolam ætate, cum sitiret noctu, hau  
sisse urecolum hydrargyri: Cum mane mortuus esset invenit, dissecto corpore apparuit  
quod erat, sanguinem quoque in corde coagulatum, tum ipsum cor, ideoque frigidum vide  
tur. Addit Conciliator, invenitque in stomacho fere libram unam argenti vivi, &c. Car  
danus lib. 1. cap. 20. de Venenis: Palmarius de morb. contag. lib. de Hydrarg. cap. 5.

§. 3. Helvetius 26. annorum ex militia rediens, plane excruiatus ac defessus Lausannam  
venit; ac quia de dolore juncturarum & lassitudine conquereretur, Chirurgi hospitio est usus;  
qui nulla neque morbi neque virium ratione habita, statim juncturas omnes, corpore impur  
gato, unguento ex hydrargyro inuaxit, quasi lue venerea graviter infectus fuisset: unde viri  
bus omnino prostratis, in gravissimam lenteriam incidens, paulo post obiit.

Cadavere aperto Pulmones lividos, & humoribus pituitosis instar spongiæ madefactæ re  
pletos: Cor vero molle, flaccidum & exangue deprehendi. Fabricius Hildanus Centur. 3.  
Observat. 92.

**H**YDRARGYRUM in lue ven. presentaneam esse re  
medium constat: Sed morbi habenda est ratio,  
nam genus hoc remedium requirit materiam suam par  
ticularem, in qua tanquam in proprio subiecto vim  
suam exercere possit: habet enim hydrargyrum par  
ticularem facultatem qua pituitosos humores, etiam  
ex infimis corporis partibus ad os & fauces mittit at  
que expellere tentat: Id quod ego sepius non solum  
in crudo, sed & in ejus pulvere calcinato exper  
tus sum, dum ipsum ulceribus, quantumvis extremita  
tarum, veluti tibiæ & manus, præcipue in  
corporibus delicatioribus inpersi, quandoquidem  
ægrî non sine molestia de colore dentium & gingi  
varum conquererantur: Porro dum humor ille pi  
tuitosus vi hydrargyri ex toto, impetu quodam sur  
sum fertur ad os, fieri non potest quin maxima por  
tio in laxos ac porosos Pulmones feratur illisque in  
sidetur: Ab eadem incuræ instituta hydrargyrosi,

topiosoque pituitæ ad os confluxu, gangrenam  
sphacelumque lethalem oris partium contigisse ex  
emplis ostendit Hildanus loco citato.

De dolore juncturarum & lassitudine, &c. ] Ab  
sumpto mucore vel humore qui flexiles & lubricos  
articulos efficit, vel eo impuro reddito, humore à  
carnibus defluente illi permisso: Si purus est humor  
ille mu cilaginosus, articulus recte valet, hujusque  
beneficio, cen ænogiz, a motum agilior redditur:  
Juxta Hippocr. lib. de loc. Mucus aut, omnibus à na  
tura adest, quicumque purus fuerit, articuli sani sunt  
& bene moveri possunt, utpote lubrici inter se  
ipsos: Labor autem & dolor fit, ubi à carne humi  
ditas fluxerit vitiosa: primum enim articulus ad mo  
dum ineptus redditur, neque enim lubrica est humi  
ditas quæ à carne influxit: Deinde propter sui co  
piam late vagara, neque à carne, semper reficcatur,  
&c.

§. 4. Vir uxori dedit venenum quo facta est Tympanites: Apparuit ventriculi finem quasi excoctum, & lecoris superficies tota convexa nigerrima: *Vide tit. de Febribus.*

§. 5. Accidit Leodii cum in convivio multi arsenicum, visc. oryze farinæ edulio mixtum, edificaret in ultima mensa, mulieres eque & viri qui minimum ederant biberantque, statim à veneno sublati sunt: qui ventriculos patrio more suburrant, à vomitu curati, cum multis post annis faris concessissent, eorumque aperirentur cadavera, invenimus in illis latus & profundas erosiones: *Heer ab Heer Observ. Spadan. 16.*

§. 6. Regi nuper mortuo (Carolo IX) Claromontii in Avernia tunc temporis degenti, à Nobili quodam ex Hispania allatus est lapis Bezahar, quem omnis generis venena debellare assererat: Accersitus à Rege, quæsit à me Num simplex aliquod & certum reperiretur alexiterium, quodcunque venenum expugnare potens? Negavi ob diversitatem venenorum, è quibus alia intus assumpta erant adversa, alia admota: Vario præterea modo lædere, nec eadem ad quodvis sequi accidentia, alia enim primis qualitatibus, è quibus confata sunt, nocere; alia vis specifica, occulta, rationique impervia infesta esse, quorum cuique proprium alexipharmacum esset opponendum: Quod Nobilis acriter tueretur sui lapidis efficaciam, facile esse experiri dixi, propinato veneno cupiam furcifero: Cum die sequenti Coquus quidam, ob furtum duarum patinarum argentearum, cruci esset adjudicatus, ab eo quæsitum an venenum aliquod assumere veller, propinata illico antidoro? Sin mortem effugeret delicti veniam sic impetraturum: Annuit Coquus, satius ducens in carceribus veneno necari quam coram populo suspensio vitam finire: Statim à Pharmacopœo propinatum est venenum quoddam dilutum, nec interiecta mora, dictum lapidem Bezahar: Ab utroque in ventriculo ingesto subsequitur vomitus, & paulo post desidendi cum renensium cupiditas; de incendio interno conquerebatur, aquam potandam petens, quæ nec denegata: Hora una post ad eundem carceres impetrata licentiâ, Coquum miserum reperi, pedibus & manibus, bruti ritu incedentem, lingua extra os exserta, rubentibus oculis & facie flammea, inani vomendi desiderio semper laceffitus, accedentibus multis sudoribus frigidis, sanguinem per os, nares, aures, penem & anum emittens; Exhibui olei circiter semisextarium, fugientem sic animam revocare stagens, sed incassum, serius enim exhibitum, misere enim interit, exclamans potiorē sibi fuisse furcam, supervixit horas circiter septem.

Eo mortuo cadaver aperui coram Dom. de la Trouffe, capitali Tribuno, & quatuor lictoribus, in quo inveni fundum stomachi nigrum: acidum & exsuccum, non secus ac si candente ferro inustum fuisset, unde consequi licuit exhibitum illi mercuriam sublimatum: Eo pacto lapidis Hispani inefficacia deprehensa, quamobrem Rex in ignem conjici iussit. *Parém Operum lib. 21. cap. 44.*

§. 7. Anno 1594. puellulam annum aperui quæ fœcino laborasse, ex eoque obfisse dicebatur: Huic abdomen admodum intumuerat, maculæ purpureæ circa clavículas apparebant; In thorace huic omnia integra: lecor pallidum, imo albisans ex valida inrempie frigida conspicebatur; Intestina omnia, præsertim colon, turgidum admodum flatibus; Ventriculo aperto, ejus orificium superius duobus locis erosum apparebat, ita ut venenum ei exhibitum potius videretur. *Petrus Perivius observ. Anat. 12.*

§. 8. Anno 1594. aperui virile cadaver: hic curandus à lue venerea traditus fuerat N. jamque sanitati, uri videbatur, restitutus de abitu cogitaret, subito exclamare cepit venenum sibi propinatum fuisse, postmodum phrenitide correptus aliquot post horas obiit.

Jussu magistratus dissectus œsophagus cum ventriculo: vidimus oris ventriculi superioris internam substantiam erosam ac excisam: præterea universam internam ventriculi membranam exesam, erosam ac putridam, ut ligneo cultello, imo digito simul ac tangeretur, facillime disrumpetur, colore tinctus ventriculus intus ex purpureo nigro erat: Proculdubio causticum corrosivum aliquod pharmacum per os hauserat. *Idem ibidem.*

§. 9. Anno 1596. infantem dissecui decimestrem, qui veneno à venefica osculo infuso interfectus dicebatur: Huic omnia quæ intra thoracem sana ac integra, solum in abdomine lecor pallidum ac non naturalis coloris: cui appendens vesicula bilis multo quam per naturam major capacioreque, tum & limpidissima aqua repleta, imo distenta, in qua nihil lutei coloris conspicebatur: est diaphana plane apparebat vesicula. *Idem Observ. 18.*

§. 10. Quidam laborabat morbo Medicis incognito: suspicio nonnulla fuit poculi venefici, argumenta aderant: Præscripto ludicis res ad Medicos delata: Aperto cadavere, exanthematis obfusus ventriculus reperitur; Iudicantur toxicum præbitum, sed male quidem: Chirurgus oculatus quæsitur num anrequam è vivis excessisset aliquid in cute apparuisset, Cognito quod aliquid tale contigisset, sententiam retrahant, ac judicantur à morbillis ocellis, vi naturæ non erumpentibus id tale evenisse: hinc corpus internum contaminatum: Notandum hoc, ut falsa de potione venefica suspicio potius blanda, & placida ratione in simili exemplo

exemplo fundata cleveretur, quam acerba apud Judicis contentione fragatur ac oppugnetur. *Gallienus Paradigm. 107.*

§. II. Puella ab utero suffocatione interijt, cum veneni exhibitu suspicio incidere, dissecta est, & deprehendi testiculum croceo humore infarctum, &c. *Fide lib. 3. tit. de Hysterici affectibus.*

## OBSERVATIO V.

*Mors Fungorum esum consequuta, à veneno illi commixto.*

**I**llustr. matrona annorum 57. integra alioquin valetudine cum fungos comedisset elixos sub tempus Paschatis sine noxa, ex eorundem repetito usu, & quidem fraxorum, sequenti die in prandio, subortus illi fuit Vomitus eadem nocte, à quo tamen convaluit, circa vespertinas horas tertie diei, usu theriacæ & confectiois hyacinthinæ, sine ulla prorsus offensa, atque bene habuit duobus sequentibus diebus, ita ut non solum è lecto surrexerit sed & sacra frequenter: Paschavis verò festo gravissimis conflata symptomatis, 19. vel 20. hora circiter ejusdem diei extincta est.

In cadavere deprehensa ventriculi ad partem dextram erosio & nigredo; veneni et odoris signa, cum livore renum & lumborum: & ejus & luculentissimum præbuit indicium palvisculus coloris cineritij ulceraræ ventriculi parti adhærens, & vermibus quoque in intestinis deprehensus.

**Q**ueritur utram repentinæ hujus mortis causa Fungis venenatis sit imputanda, vel potius corruptis in corpore humoribus veneni amulis: vel alteri cuiuspiam veneno assumpto, cum potissimum apoplexiæ, aut alterius hujusmodi gravis capitis affectus nulla sese prodant indicia. Quod autem fungorum usus mortis autor fuerit, non levis est suspicio, 1. quod hi non raro venenata qualitate sint infecti si potissimum locis enascantur ubi ferrum rubiginis infectum, vel panis putrefactus læreat, vel in radicibus arborum & ex arboribus ipsis noxiis, vel quæ innata quadam facultate fungos corrumpunt, quod de olivis & nucibus proditum, in tandem prope sepem larebrantia suspicione non vacant præteritis in pratis collecti, vel hoc potissimum nomine quod ab ipsorum usu male habere cœpit, prout ipsius ancilla ab ipsorum noxa non fuit immans eadem nocte. Accedit quod hi fungi primum erumpentes, licet non fuerint delesterii, veneficam tamen qualitatē ducere poterunt à vase æneo, rubigine forte oborto, nec statim oborto, in quo fixi fuerit: hoc indicio quod secundo, non primo appositi, fuerunt noxii. Postremo quod fungorum omne genus, licet veneni expertis, adeo frigidum humidum & viscidum sit, ut ejus perniciem proximè amuletur, *Galenus* testimonio 8. de S. Med. fac. Unde facile contingere potuit ut copia assumpti duos dies continuos, nec omnino vomitu rejecti, tridui spatio vires suas exseruerint, & calidum innatum extinguere potuerint, cum venena frigida tardius longe se prodant quam calida: Quæ potissime sunt rationes quibus evinci videtur mulierem hanc fungorum usu exinctam fuisse: Quæ tamen tanti apud me non tunc id mihi funderi parat: quod enim Fungi non fuerint venenati, patet 1. ex eorum densitate & colore, quippe albi, rubri, parvi & solidi in fungorum genere minus noxii habeantur: Accedit quod ab aliis maxime noxia pars in suis familiaribus empta fuit, quibus innoxii prorsus fuerunt, prout & quos comedit primo defuncta, & quamplurimè alij, quod citra ullam offensam, neque à terra emendatam ullum exhibere colorem, nec ulla veneni perniciem panem cum ipsis cocto impressa: cum potissimum nulla evincat ratio quod virulentia in ipsis tandem delitescere potuerit, ut duos integros dies bene habuerit patiens à vomitu, & usu bezoaricorum, atque triduo post è vita discesserit. Quanquam enim venenum in corpore aliquamdiu sopitum & inertis

possit latere nec vires exstat, fieri tamen nulla ratione potest ut in actum erumpens, & vomitum ciet, bezoaricorum usu coerceatur adeo & obrundatur, ut exiguum ejus in corpore superfluis mortem aliquot post dies inferat, quod à fungorum natura maxime alienum, qui lethales cum sunt, enecant suffocando, cum sopore, epilepsia, paralyti vel repentinâ syncope, atque dolorem in pectine, urinae difficultatem vel integram suppressionem inferant: cujus rei causa *Galenus* curaturus male affectos ab usu fungorum, etiam venenatorum, semper præscripsit attenuantia, incidentia, detergentia & vomitum concitantia, hinc de consensu omnium Græcorum, Arabum & Latinorum, horum remedium usu ægri plerumque sanantur. Non alio referenda itaque causa hujus repentinæ mortis quam vel in humorum corruptionem veneni æmulam, vel in aliquod aliud venenum assumptum: Quod autem in corpore humano in veneni naturam facessint quandoque humores, ex *Galeno* constat, 3. de loc. aff. atque id experientia contemptum in hystericis passionibus, epilepsia, febribus pestilentibus, invadentibus pestilentia non grassante, aliisque lethalibus affectibus derèpente enecantibus absque ulla causa externa: Cujus perniciose humorum corruptionis in hac muliere indicium præbere potest vermis in intestinis deprehensus, corruptionis humorum soboles. Cæterum neque hoc pro comperto habendum, hac in primis ratione quod hujusmodi humoribus venenatis, in ventriculo potissimum redundantibus, gravis affectus quam qualibet alia corporis partium, cum sanguis usa est, & symptomata primo se præbuerunt, tandem delitescere non potuisset perniciosa hæc qualitas, ut biduo incolam fuisse absque ulla operationum noxa: quanquam vero inficia non imus quin aut quadam venenata statim temporibus ab humore corrupto elevari possit, semine scilicet aut sanguine menstruo in utero conclusis, parte longius à corde sumota, Verum alia plane est ratio materiz in ventriculo coacervate, quæ cordi propior cum sit, ab hac continuo illud affici est necesse: Neque vermis in intestinis hoc evincit, cum vermes prodancantur non ope tantum caloris p. n. sed naturalis potissimum, materiam putrescentem foventis, & animal ex ea suscitantis, quo humor venenatus prorsus caret, nec an eo fovetur, quin potius illum corrumpit: Quomobrem statuumdum censeo, quantum conjectura affici licet, nullis suppetentibus firmis argumentis,



est: et an esse praesentem agram à veneno assumpto, his potissimum rationibus adductis. 1. quidem quod biduo bene habuerit, ac deinceps novis accidentibus subortis è medio sublata sit. 2. Quod ex quamplurimis qui fungos illos comederunt nullus praeter eam mortuus sit, cum tamen magna copia eos non assumpserit, neque extincta sit cum ventriculo graves esse debuissent, sed his vomitu rejectis: Quibus accedit unguis livor, laborum siccitas & erosio, mentis motus & flavus color, veneni symptomata, nativum

calorem extinguentis. Et quae in cadavere reperta: Quod autem haec mulier à fungorum est male habuerit, & leviter ipsius ancilla, suscipiens puerum illis immixtum fuisse venenum, quod tamen monem inferre non potuerit qui vomitu rejectum est, & quidem facilius ob cibi copiam, à qua & illud obtinuit potui, quod postmodum cum parco cibo exhibuit, majori sorte dezi, nec vomitu exturbatum, facilius viam suam exierit & enecare potuit. *Bea. Sil. vaticum consil. 79. cent. 4.*

**OBSERVATIO VII.**  
*Canum, & aliorum animalium, à vipera morfu enecatorum anatome.*

§. 1. **C**anis à vipera laceratus in labro inferiore commorsus fuit, qui non illico admodum inde commotus, sed non diu post mortuus evasit, cum maxillae tumore: Vomitus postea subsequutus alimentis ultimo exhibitis, sequuta excretionē paucatum faecum: oblatas insuper panis, caro, aqua, quae omnia respuit: decumbebat absque planctibus, pars demorsa livida facta est, livore infra collum se diffundente, imo ad pectus usque, non secus ac tumore: Tandem obiit, sed quadragesima à mortui hora: Venter non intumuit, nec exterius quicquam extraordinarii apparuit, praeter tumorem & lividitatem partium commorsarum & vicinarum.

Cadaver apertum fuit: In trunco vena caeva non nihil sanguis concreti reperimus, reliquum sanguinem, ibi loci, in corde & ubique, fuscum & obscuri coloris observavimus, viscidiusque consistente, qualis sanguis ex parte dissolutus & corruptus: Ventriculi color quodam modo obscurus fuit, sed manifestius in mesenterio & intestinis: Nulla in corde alteratio fuit conspicua: nulla in hepate, pulmonibus liene, nativus enim & optimus fuit earum partium color.

§. 2. Alius canis in auricula commorsus fuit, qui illico ululavit, atque ex intervallis ululatus per semihoram renovavit, deinceps sine ullo planctu tacitus: locus commorsus lividus evasit & intumuit cum partibus circumscriptis: Vomitus nullus sequutus, sed dejectio paucorum excrementorum, eorumque naturalium: cibum & potum, non secus ac prior canis recusavit, morte post vicesimam quartam à morfu horam subsequente. Nihil exterius insuetum praeter livorem & tumorem partis affectae & vicinarum apparuit.

Eo dissecto, omnia eadem quae in praecedente interius conspicua se exhibuere: nullus hic repertus sanguis coagulatus, neque in corde, neque vena cava aut ullibi, coloris vero erat obscuri viridaeque consistentiae, cum manifesta ad concretionem propensione.

§. 3. Rostrum extremis alterius canis irritatae viperae dentibus objecta fuit: Commorsus canis illico ululavit, sed non diu, locum commorsum lambere satagens, aut ex intervallis, pedibus scalpere: nequaquam decubuit, totus in alterno eo exercitio occupatus, cubiculum perambulans: Locus morfu impetitus levi livore correptus fuit: paulo post objectum cibum & potum accipit, non secus ac si nihil passus esset: livore non diu post evanescente, neque ullo alio damno subsequuto.

§. 4. Catellus septem aut octo dies natus, in tibia commorsus fuit à vipera irata: qui illico ululavit, & usque ad obitum: hora una post contingentem: pars livida & tumida sicut in ceteris erat.

Eoque aperto nihil insolens in cadavere repertum praeter livoris quandam in ventriculo speciem, & in intestinis, cum fuscedine & prava sanguinis consistentia, sicut in ceteris: omnes enim partes interne rite constitutae apparuere.

§. 5. Alterius canis linguam morfu impetivit vipera, qui nobis multum laboris peperit, quo ad excidendam cogeremus, diu enim & strenue obstiit, ictus tamen altus fuit, vipera quippe admodum irritata: Ululatus illico maximi fuere procul pertingentes, qui ad mortem usque, quae semihora post contigit cum summa agitatione, continui fuerunt:

Neque apertionem negleximus, & quanquam, cor, hepar, pulmones, splen optime essent constituta, lingua nihilominus admodum livida evaserat, totum mesenterium maculis lividis conspersum, quarum plurimae lentium magnitudinem excedebant, sub quibus sanguis concretus delitescerebat, Ventriculi quoque & intestinorum color, magis quam ceterorum omnium, obscurus erat: sanguis admodum niger, cum coagulationis initio in corde & vena cava, exterum consistentia dissolutus & corruptus.

§. 6. Alium praeterea canem in imo ventre morderi curavimus, ab alia irata vipera: qui illico vehementer, at non diu ululavit: Locus affectus admodum intumuit cum livore: hoc cum tumore circum circa partes naturales se diffundente: Crebro potabatur hic canis, sed cibum appetebatur, atque in eo statu diu, citra priora accidentia persistit: Biduo post, quo de recertius constaret, iterata vice, juxta priorem locum illum morfu impetiri curavimus: qui iterum

alre ululavit, cum tumoris, per totum pene abdomen expansi, necnon livoris augmento, qui tamen intra eos limites constiterunt; quia canis vulnere crebro ad lambebat, interea potans, ac tandem comedens; adeo ut citra aliud quam à lingua petitum remedium spatio quinque aut sex dierum, omnis intumescencia & lividitas disparuerint, cane ad priorem omnino statum redeunte.

§. 7. Experimenta supra adducta insignis usus fuere ad rectam noticiam effectuum Viperæ, inter quos multa adfuit affinitas: Columbum & pullum Gallinaceum viperæ in iram concitæ expulimus, successivè & pene eodem tempore: Idus parti maxime carnosæ inflectus fuit; pectoris scilicet imæ parti: In utroque illico observare licuit crebram cordis palpitacionem, eamque extraordinariam, amplius semper procedentem, adeo ut ambo, semihoræ spatio occubuerint.

Uterque statim ad apertus fuit, ac sanguinis in corde & vena cava concreti nonnihil reperiunt, reliqui ex ore nigricante, ac ad coagulationem vergente, & dissolutioni & corruptioni proximo: ceterum cor & hepatis, sicut & ceteræ partes internæ externæque, coloris floridi ritæque constitutæ: exiguum tamen livorem demorsa pars præ se ferebat.

§. 8. Uterius experiri libuit an eadem vipera, morsu uno eodemque tempore diversa successivè animalia interimere valeret, ac num ejus venenum exhaustiri posset, adeo ut ultimo idæi immunis esse possent. Rem exploraturi, quinque ex ordine columbas uni eidemque viperæ objecimus, quam toties lacessivimus, quoties dentes impressi, quæ omnes paulo post mortuæ sunt, atque omnium prima quæ ultima commorsa fuit: Quod sanguinem reliquasque partes internas, idem prope status fuit qui primæ columbæ.

Experimentum quarto loco adductum nobis ardet, ex eo enim dilucide effectus veneni viperini, morsu inflatus elucescunt: id scilicet non primo & immediate partes nobiles invadere, quandoquidem nulla unquam in iis deprehensa alteratio, sed præsertim sanguini vim suam imprimere: eas quippe consistentiam destruent, ipsum coagulando, vel partes ejus ab invicem segregando, & circulationem inhibendo, eodem tempore spirituum per universum corpus ejus impediendo, quibus destruat partes nobiles puritatem quoque sanguini adimendo qui antea eas alluebat, eas indirectè & per accensum destruent, quatenus ejusmodi spirituum dissipationem parit, probatæque succorum à quorum cito tenore pender earum substantia.

Animadvertere quoque licuit veneni, per viperæ morsum inducti, progressum, præcipue à loci commoræ conditione pendere, ac magnitudine venarum & arteriarum quibus dens impulsus fuerit: Canis enim lingua cum venis & arteriis polleat, nemini mirum sit, si ad earum occursum, & viam parentem & brevem, venenum, animal commoratum debellaturum, effectus promptè exferuit, necemque illo citius intulit quod obvios habuit ramos tantum exiles & anfractuofos, per quos illi iter angustius, magis flexuosum & longius obtingit: quamvis tandem præstiterit quod citius obtingit liberiora existente via. Facile quoque est colligere ab effectibus veneni, morsu capitis in prædictis impressi, præsertim ultimo, vomitum immanemque dolores, viciniam umbilici co-

cupantes Nobilis (cujus historia infra adducetur) originem duxisse partim à sanguine coagulato, vel ad coagulationem in circuitu suo impedito vergente, partim quoque quod spiritus, sanguinis circuli comites, impedimenta in via nacti, cum ea perfringere conantur, vim partibus lateralibus viarum, quas pertransiunt, inferunt, iis in locis insignes dolores intulerunt, atque adeo molestos, quos quoque augere potuit sanguis extra majora vasa concretus, & forte macularum specie per mesenterium & alibi sparsus, non secus ac in canis corpore: Inferre quoque licet frigidos sudores, convulsiones & tandem agrum delicientes, non aliam causam agnovisse quam interceptionem commercii soliti spirituum cum partibus nobilibus, puritatique & probitatis sanguinis illarum irrigationi destinati: Canes autem sanatos vulneris, lingue ope, deterfione, quod spectat, cenleo optimum fuisse præsidium ad revocandum versus exteriora venenum, illi motum retrogradum conciliando: Illorumque sententiæ accedo, quibus persuasum, si qui commorsus est, aut quispiam illi intus, diuturno & vehementi suctui partis demorsæ incumbat, sanabilem hoc præstare illum esse, dummodo viperæ dentes insignè aliquod vas non attigerint, per quod veneni progressus factus vi efficacior sit: Illud quoque apud me ratum est spiritus illos, suctu revocatos, fore innoxios ingenti, tum quia vires inter agendum amiserint, tum quia exuti sunt organis idoneis ad propriam actionem exerendam, dentibus scilicet.

## APPENDIX.

*Seu Historia viri, à vipera commorsus, medicamentorum efficacia liberati.*

Mense Junio anni 1668. afferri curavi grandem vipetarum viventium, utriusque sexus; numerum, scopum mihi propositum consequuturus, accurate sciendi quicquid boni vel mali in vipera latitat: Plures tunc temporis, ijque docti, in domum meam confluxerunt, atque in ijs petiti quidam Medici, mihi amici, arte insignes, experimentorum meorum quotidianorum testes, doctrinæ quoque sua faciem mihi præferentes: Primus cæcus insaustratus fuit, Nobilis enim extraneus, lugubri & inopinato fato, in se periculum plerorumque symptomatum, quæ parere solet vipera, expertus est, nobisque Invitis experimenti ansem obtulit, nimis insignis ut silentio involvendum non sit: Dicitur Nobilis, annum agens xxv. fortuito domum meam pridie intraverat, quo tempore sexaginta circiter viperæ mihi alla-

te fuerant, videndi illas cupido statim incescit, cui satisfactorius è vase unam ex illarum sume-  
ro depromo, cui intueri eam non satis fuit, sed manu quoque apprehendens per quartam ha-  
re partem eam continuit, gyros illius & contorfiones circa manum & brachium permittens,  
nullo ad speciem viperæ ad mordendum conatu: collum deinceps filo cinxit appensamque  
pelle exiit, intestina eximens ut illa exploraret: Id vero credo morsum illi tunc ineluctabi-  
lem fuisse si vipera læcessita fuisset, sed quod durius contrictaria non esset, atque liberiori ære  
fruens, & amico magis quam quem concludebat vas, in quo diu inæcreata fuerat, passam  
esse vineulum, nec perniciem intrulisse, quæ accidisset nisi filo contricta fuisset.

Post die res aliter omnino cessit, cum enim eorum hora indicta interfuisset, unam corri-  
puit, diu ante sub tenaculis captivam, maxime inde ira percitam: hanc, quanquam periculi  
admonitus, manu arripit, arrepta hæc statim caput contorquet, alterum dentem magnum,  
aduncum, partem lateralem pollicis dextri, paulo altius quam ubi inferitur unguis, feriens:  
Punctura major non fuit ea quam infligit acicula, parum alte, ut videbatur, impressa, forami-  
ne in superficie minimo appatente, cum levissima rubedine, adeo ut solo colore innotesceret:  
Nec supra, neque in vicinia, *conspicuum fuit succus ille flavescens quem continent vesiculae*, majores  
dentes ambientes: qui ut plurimum supra vulnus, cum vipera altum infligit vulnus, effundi-  
tur: Punctura illico dolorem peperit, citra tamen digiti, eo momento, intumescantiam, post  
horas demum aliquot conspicuam: Partem scarificare consultum fuit, arctisque ligaturis par-  
tem morfu superiorem contingere, tum ad inhibendos veneni progressus, tum ad liberandam  
partem afflictam, sed tenuis æger, leve malum ratus, imo ægre scarificationem admittens:  
passus demum spatulam eandentem prope locum demorsum iteratis vicibus ad moveri, cum  
in finem ut pori patentes manerent, revocareturque venenum per eos expiraturum: Interim  
ægro theriacæ ex dimidio vini cyatho drachmæ duæ exhibentur: Vix horæ octava pars ela-  
bitur, cum æger levi debilitate accedente, sedile poscit, eodem momento vultum pallor oc-  
cupat, pulsus debilis fit, creberrimus & exilis, imò interceptus: Dicta symptomata sequuntur  
motus spasmodici, totiusque rigiditas, colli præsertim ac musculorum capitis: Simulque de  
insigni dolore, umbilici regionem vexante conqueritur: artus frigeant extremi, imò tota  
facies frigida & exsiccata, suffusa, tumebant labra, præsertim inferius: vexantibusque tunc dolori-  
bus circa umbilicum, & ventrem dejectionis cupidum animadvertens, surrexit: sed redditis  
paucis excrementis, leipothymia successit cum vomitu, non solum assumptæ theriacæ, sed &  
prandi præcedentis nondum concocti: In auxilium prompti accurrimus, illum adeo debilem  
nacti, ut repetere cubiculum, è quo descenderat, non licuerit: Permanente autem pulsus  
parvitate, crebrite, inæqualitate & depeffione, cum continuis leipothymijs & sudoribus  
frigidis, ère visum est ipsi exhibere drachmam unam pulveris viperini ex aquis theriacali &  
cardui sancti: admo in supergrandi epithemate supra cor, & ventericulum ex theriaca, sed  
statim assumpta per os exclusit: Ex consilio cuiusdam data quoque antidotus orvietana cum  
eodem pulvere viperino, quam quoque venterculus non continuit, rogante ægro ut lecto im-  
poneretur, ac de alijs præiudijs cogitaretur. Interim optime constabat ratio & mens, quan-  
quam insignis adesset totius debilitas: prædictam autem antidotum orvietanam avversabatur,  
cui parum fidendum credebatur: prius assumptam in obsequium eorum qui ejus efficacem vim  
prædicabant: Porro, quod vomitus remedia ad partes nobiles deferri prohiberet, appo-  
situm visum est sale volatili viperino uti, qui quoniam præ subtilitate promptissime partes omnes  
subit, etiam distitissimas, iudicatum est ægrum citissime ejus vires expertum ita, ac majori cer-  
titudine quam aliorum remedium, ea partium tenuitate non præditorum, quæ cum elimina-  
tentur è corpore illico ac ventericulum subjeant, in actum ideo deduci non poterant in sto-  
macho, nec facultatem suam partibus, quibus auxilio esse debuerant, communicare: Disso-  
luta ergo fuit drachma una salis illius volatilis in aquis theriacali & cardui 6. exhibitæque  
circiter quarta pars ejus mixtura, quam aliquandiu retinuit, demum partem illius exclusit,  
remixtam multæ pituitæ admodum viscidæ: Data iterum par dozis præcedentis mixtura,  
quam aliquantisper quoque asservavit, demumque vomitu reddidit quicquid illius in ventri-  
culo superstes esse potuit, plurima una ejecta pituita: Ex intervallis præbebat ejusmodi  
mixtura prout vomitu reddebatur: crebra quoque fuere enemata, sedandæ gratia vehementi-  
tæ & contumaciæ dolorum, umbilici regionem afficientium: Labra adhuc multum tu-  
mebant, pulsus deterrimus cum sudoribus frigidis, animi quoque defectiones pertinaces  
erant: sed tandem continuato viperini salis volatilis usu, desit vomitus, octava dezi illius non  
exclusa, quæ quatuor circiter à morsu horis exhibita fuerat: Inde symptomata remittere, fri-  
gus paulatim superari, locum calori nativo cessurum, qui redivivus omnino circa quintam à  
morsu horam apparuit, redeunte pulsus æquali valido, sed aliquantisper citatiore. Noctis erat  
decima cum sevitia symptomatum deservit: fortunatus fuit æger infortunio, qui citam  
opem expertus sit & legitimam: à lateribus ejus non discessi priusquam lethalia accidentia  
deservit: Tunc in ædes proprias delatus fuit, cui comes adstiri, lectoque imposito præbui  
mix-

mixturam ex drachma una confectiois hyacinthinae, una kermesinae, uncia syrupi de succo limoniorum, quatuor aquae cardui sancti, à Medicis illius praescriptam, ternis vicibus exhibitam, interposito trihorio: Crebro naribus obiciebantur citria mala, atque ex intervallis illorum segmina cum sacchari pulvere praebita fuere: Iuscula optima sorbebat; potus erat pituitosa ex decocto radices scorpionis & rasura cornu cervini, addito syrupo limoniorum: nonnunquam aliquid vini concessum: dissolvebaturque confectio alkermes modo in iuseulis; modo in praedicta pituitosa. Id vero observatione dignum quod per sevitiam symptomatum digito nulla mutatio accidit, in quo nullus tumor, qui demum desinentibus symptomatis emerit: Dolores interim circa umbilicum molesti erant, etsi minores, quae de causa à Medicis crebra praescripta enemata: tensio aliqua aderat abdominis citra tamen extuberantiam: albicans erat lingua, nec tamen atida, oculorum demersorum nitor aberat, cum vultus pallore labiorumque tumore, qui digito inerat noctu in universam manum diffusus, est, quod saepius oleo scorpionum composito *Matthioli* inunctum est, remixtum aequè Regine Hungariae, tumore nihilominus postridie ad totum brachium propagato, cum dolore, rubore & augmento manifestissimo: Quamobrem praescripti foris ex decocto radicum angelicae, imperatoriae, catling & aristolochiae, cum summitatibus scordij, centaurei, absinthij, hyperici, calaminthae, facto in vino albo, pergendo in usu liuum ex oleo dicto, praecedere foris: Quamquam haec rite peragentur, successus tamen operatus defuit: *Antipater* erat aeger, imo semel ingestum iusculum vomitu exclusit, qui tamen fugax fuit: Non desistebat ab usu medicamentum tum internorum tum externorum, eorundemque alimenterum, sed quamvis quoad interiora recte se habere diceret, pulsusque constaret, sitis molesta non esset, nullus item calor aut dolor ullibi infestaret, qui tamen umbilico infederat, contumax supererat, cum incremento doloris & ruboris in manu & brachio, qui exacta tertia die summum humerum, axillam usque, occupaverant mammam integram circumpositasque partes, imo jecoris ipsius regionem, nequaquam tamen intermissis fortibus & inunctionibus praedictis: Quocirca, perspecta etiamnum anni tempestate calidiore tunc vigente, gangraenae metus incidit: Quod vero remedia exterius admotae, quae maxime proficua iudicata sunt, successu carerent, ad interiora deveniendum esse sanctum: quade causa à Medicis sub vesperam tertiae diei exhibita est drachma radices contrayervae, pulveris forma ex aquis cordialibus, & anatico pondere confectiois Kermesinae, persistentibus tamen rubore, tumore & dolore: quin potius tumor latus sinistram impetere videbatur: Quibus omnibus rite expensis, necessarius usus primi remedij interni iudicatus est, à quo, maximum juvamen evenerat, & ejus operatio clare emicuerat, scilicet Salis volatilis viperini: Initium erat quartae diei, morsum sequitur: Data ergo semidrachma salis illius viperini, exunctis quatuor aquae cardui benedicti, optime cooperito corpore quo manaret sudor: non remedium spem fecellit & vota, nec enim copiosus solum emerit sudor, sed maximum etiamnum levamen symptomatum omnium urgentium subsequutum est: inde omnino pene sopitus umbilicalis dolor, resedit tumor labiorum, nec non qui hypochondrij regionem invaserat, mammae, & infra axillam summus humerus, brachium & manus, plurimum detenuit, nec non dolor & tumor. Exinde opinio non vana incidit cetera quoque pariter cessura: quamobrem mane postridie similis dozis data pulveris illius viperini, qui novum & uberem excitavit sudorem: hinc dolor umbilici omnino desijt, humeri tumor disparuit, eo qui manum universumque brachium obsidebat, maxime immixtuto, pariter cum rubore: Ac ne quid desideratur, etsi res aegri multo meliore essent loco, die subsequente iterum parilis dozis ejusdem pulveris data, ac postremo mane sequenti: adeo ut remedium omnino tumorem discusserit, ruborem doloremque brachij, manus, ipsius etiamnum digiti; cui consolidando sat fuit impositio parvi emplastri, & ad cicatrices claudendas factas incisiones, quod intra quattiduum contingit, cum interim liberum fuerit egro domo exire negotijque praesse, non secus ac si cum vipera nullum unquam ipsi fuisset commercium.

**N**obilis à vipera ictus nobis praebuit ansam inquirendi in causas & effectus veneni illius, qui tum. innovare, quamvis à specie exili causa manerent, quod semimortuus tantum adesset. unico dente ictu inflicto, imo nec admodum profundus, unde vitium in pressum augmentum non videbatur suicipere: parte aliqua succi flavescentis gingivae infusi, cuius innocentia necdum plane nobis innoverat: Interim lethifera symptomata acervatim ingroebant, quando à vomitu continuo remedium ejus efficacia prohibebatur, quae moram in ventriculo non traherent, exinde vires affectis partibus impertitum: Ratum tamen erat aliquid eximie subtile, agile & potentissimum eo in veneno delirescere, quod sine dubio sedem haberet in spiritibus, etsi de ejus indole

nondum constaret, nec qua vi aut modo, aut quas partes afficeret: Facendum tamen in tam precipiti, periculosa atque intoleranti occasione, & indicationem urgentem, non alia via procedendum fuisse quam per exhibitionem salis volatilis viperini: Quandoquidem causa febrilis erat & per spiritum effica, opus erat remedio ejusmodi indolis, quod illum aggrederetur, cum ea congregaretur, ac ad corporis ambitum extruderet, eliminandam & exterminandam per vias parentis ab eo factas: Porro vomitus continuus exigebat auxilium quod momento effectum depromeret, aut saltem quod iteratis vicibus praefaret quod prima denegatum erat: felix successus consequutus usum salis volatilis viperini, praestantiam ejus indicavit, nec non viperinam quae

vim malignam spirituum illorum infregit. Inde nobis natum desiderium modum indagandi per quem adeo praestantes effectus produceret, ac de iis eo modo ratiocinari, ut cogitationes nostrae ea de re apodicticae essent. Sane cum ergo sit eum Salem qualitate subtili, volatili & penetrante praeditum, aptissimum esse ad sanguinis concretiones dissolvendas, atque partes in eo coagulatas aut fixas ab invicem disgregandas, a quibus origo interrupti & visiose peccati illius motus: id praestitisse in sanguine dicti Nobilis constat, quem pristino statui restituit; atque eo pacto ab eo restitutum esse liberum commercium, & spirituum in partes influxum, quibus privatae fuerant: Credimus quoque Salem eum volatilem, ob symboliceatam cum dictis spiritibus, facile illis cohaesisse, atque ad extrema corporis, foras per poros cutis depulsa, per stratum a se viam prius egredientem. Ligaturae in partibus superioribus affectae institutionis, infusae erant ad sedandum impetum spirituum illorum ferocientium, illisque per facta emissaria exitum procurandum ne ulterius progredirentur. Theriacae exhibitio, pulveris viperini, & similibus efficaciae erant in iis supetandis si moram in ventriculo traxissent, Nec inutilia fuissent epithemata cordis regioni admota, ex theriaca, & ventriculi, nisi spirituum expande centum actio praeceps fuisset, nec jam progressus eorum insignis fuisset. Sed usus salis illius volatilis, praecellere debebat, ut revera omnibus remediis superior fuit: quae enim demum & intermedia in usum ducta fuerunt, satellites, ut sic dicam, tantum fuere, ducem sequuta, quia fuere confectioes Kermesina & hyacinthina, apertissimae ad robur peritium principium, sicut & syrupus limonum, scorzonere & raturae eboris decoctum: Mali citrii semina, quibusdam fortè malitiae suspecta, quod acida vi sanguinis concretione inducere valerent, tum demum exhibita fuere, cum à Sale volatili fuit dissoluta: eo nomine utilia quod stomacho, à crebris vomitibus debili reddito, robur afflaverint, appetitum proflaturum reduxerint, alimentorum concoctionem promoverint, distributionemque in partes eo indigere. Adde malo citrio vim inesse specificam veneni viperini domitricem, si fides authoribus habenda qui de eo scripserunt, facultatem cordialis quoque partibus nobilibus amicae assignantes. Inundio ex oleo scorpionum Marthioli, commixto aequae Reginae Hungariae, partium tumidarum, ad motum solum alexiteriorum, magnum, ut videbatur, auxilium esse debuerat, sed eventus comprobavit uni soli volatili vim expugnandi venenum inesse, spiritus irritatos expellendi, illique soli victoriam palmam deberi: id vero explicandum superest, cur, & quomodo partes viperæ, intra corpus ingesta, venenum à vipera morsu communicatam superat & debellare valeant. Statuimus ergo omnibus Viperæ partibus copiosum praesertim inesse silem volatilem, qui in destillatione partium solus apparuit, partium spiritus forma, qui revera nihil aliud est quam sal portioni cuiuspiam phlegmatis remixtus: partium olei forma, qui iterum idemmer est parti oleosae viperæ commixtus: Statuimus quoque per concoctionem factam in ventriculo partium corporis viperæ voratarum, eundem quem continent silem volatilem, separari, inde in singulas partes, quæ eo indigent distribui, si praesertim sufficiens sit copia partium ingestarum, quo sufficiens quantitas salis illius suppedietur: hinc dabimus nullum esse debet quin is sal edat effectum illi similem quem produxit dicto Nobili exhibitus. Nisi quis dicere, silem eundem volatilem-partiū viperæ ingestarum, quippe qui ejusdem indolis cum spiritibus irritatis, eos ad se trahere: mediante ea conjunctione cum altero, eorum malignam qualitatem adeo domat: ut nullum

actionem in animal commoritur edere valeant: quæ sententia partum meo iudicio firma est, debilibusque forsitan innititur fundamentis: Credimus autem inter varia experimenta, id quod factum est in quinque columbis, successiva ab una eademque vipera laesa, sita commoritur, à quibus ultimo idem, primus obit, ob irritam magis viperam, quo tempore minus sicco flavo scatebat: Atque in ea columba quæ commoritur est à vipera, quæ iteratis ante vicibus, peni, imo usque ad sanguinis effusionem, dentes impressit, quo succo omnino privaretur, subsequente nihilominus morte columbae. Ea inquam experimenta ex parte ostendunt faciem flavam ad veneni naturam nihil conferre, ex altera, spiritus eos irritatos, invanibus aperturis à majoribus dentibus factis, solum ac legitimum veneni esse causam: Morsus à vipera non irritata facta, cujus apprehense erant maxilla, & cujus dentes comprimendo corpori columbae imprimebantur, quem quoque multos comitabatur succos flavos, nullo tamen subsequuto pravo symptomate, non secus ac punctura facta ab iisdem dentibus, & capite vivente exemptis, vel adhuc insitis capiti viperæ mortuae, nullius mali capacibus, ample nimis hanc confirmant veritatem, causam scilicet veneni spiritibus adscribendam esse irritatis, adeo ut universum inde eximi debeant partes omnes corporis, imo ipso majores dentes, nisi comites sint spiritus irritati.

Viperam in urao concitatam maxime, &c. Antiqui, quæis persuasum erat paucas inesse viperæ partes quibus venenum insitum non esset, earum naturam parum accurate indagaverunt: Cum vero judicarent ad veneni vim acuendum non parvam conferre iram, tati in selle ejus sedem esse, in eodem quoque venenum constituerunt, credideruntque id sel, acriter admodum & amatum, permixti ejus esse indicium, venaeque & arteriae fel illud ambientes, ad maxillas usque deductas, illis filimiles quæ per totum corpus sparsæ sunt, supra & infra fellis capsulam, canales esse à natura destinatos succo fellico in gingivas deferendo, atque in eo succo vim deleteriam constimebant. At illis perspicuum esse debuit iram viperæ in selle sitam non esse, fel item plurimorum animalium gustatum persimile esse viperino, nec tamen venenosa esse: Vasa juxta sel transeuntia, quia inde proficisci videntur, ad gingivas usque derivata, necnon ad omnes alias partes corporis, sanguini devehendo solum consecrata esse, quæ à selle originem non ducant, quæque exportare nequeunt succum in ipsa non delatum: In vasculis illis fictis nihil contineri quod fel respiciat, non secus ac in gingivarum succo, neque in toto reliquo corpore supra fellis sedem: Totamque cystin fellis unicum possidere, vas notum dignum, idque admodum exile, quod è parte interna partis superioris cystis prodians, infra descendit, eundem supra vergit, in primum intestinum se exonerans: Nos vero praetermissis ejusmodi de principis tum leviter constitutis, innixi experimentorum numero, statuimus Fel viperæ veneni omnino experti esse, ac contra pollere vi balsamica, mundificante, pluribus idonea: Nullum adesse vas ejus succum in vesiculis majores dentes ambientes deferens: Succum flavum in iis contentum omnimode à selle disterre, hoc excepto quod urrique deest venefica vis: Succum illum flavum congestum esse & formatum à glandulis salivariis: Illum in vesiculas deferri in vasis lymphaticis, ex glandulis dictis prodentem: Illum nihil aliud esse quam puram salivam, Ac tandem eum nihil conferre quo morsus evadat venenosus, quandoquidem gustatus & deglutitus, (quod saepe saepius experti sumus) neque homini neque ullo animali nocet, imo innoxie vulneribus a partibus, atque incisionibus in cute factis, adhibita etiam frictione, & cum sanguine mixtus, imponitur.

*Dentes magnam adnascunt, &c.* Asserimus etiam reliquas omnes corporis partes veneni esse expertes, imo majores Dentes, nisi vivat vipera ac morsum comitetur irritatio spirituum. Malum à dente impressum, cum mordeat vipera, in eo præsertim sumum, quod viam spiritibus irritatis apperiat absque qua irritatione, morsus à dente inflicti lethalis non est, neque, sub aliam considerationem venit quam ratione profunditatis & angustie vulneris, à dente adeo acuto, longo & tereti, ab alio quovis animali inflicti. Experimentorum à nobis factorum numerus hæc nos docuit, quandoquidem à nobis manifestissimum amoratum discrimen circa morsum irritare viperæ & eum qui excitatur maxillis viperæ manu detentis, & adactis majoribus ejus dentibus in corpus cuiuspiam animalis: Coacta enim ea actio conducit potius ad cohibitionem spirituum, quam eorum commotionem, cui rei animalis libertas necessaria est. Iam spiritus emanare tantum possunt ab imaginatione & ira viperæ, eos immediate præcedente & impellente: Morsum enim ejusmodi, qui sit per compressionem maxillarum, & dentium impressionem in quodpiam animal, quam vis plus effundat succi flavi supra partem demoriat, quam cum vipera sponte mordeat lacerata, nullam sequitur molestum symptomata, curationem simplicis vulneris admittens, cum alteram mors excipiat si salutaria desine pericula.

*Cum levissima rubedine, adeo ut solo colore innotesceret.* Effectus ergo veneni cum spirituosus omnino sit, aliter non agentis quam pro majori aut minori spirituum irritatione & impulsione, proque majori aut minori viarum libertate, merito à nobis spirituum irritationi adscribitur, cum nulla ejus vestigia, neque realia neque apparentia, in partibus quibuscumque oculis obvis nobis inveniunt.

*Partem lateralem pollicis feriens &c.* Spiritus ab ira in vipera concepta irritati, naçti viam à dentibus factam, impetum nativum sequuntur, qui cum sit semper progredi & penitus se insinuare, quod id præstent illico vias vi faciant, plus aut minus progredientes, pro majori aut minori quæ occurrit facilitate aut difficultate: hinc evenit ut morsus periculosior sit si majores vasa dentes attingerint, quam ubi solæ carnes aut vasa capillaria occurrunt: Adeo ut spiritus viperæ irritati, obvios habentes sanguinem & spiritus in vasis contentos, animalis commotio,

eos impellant & urgeant quo commearis liber sit, atque confusione inducitur particulis sanguinem constituentibus, ejus concretionem pariant aut in circulatione impedimentum, unde impedimentum spirituum in partes principes, à qua earum subsistentia & vitæ illa deficitur necessario succumbant, aut quia vim passæ sunt in arce sua ab illis spiritibus, ab iisque inquinare: aut potius quod iidem spiritus viperæ spirituum vias occupantes, iis potantur, obstruxerantque spiritus & sanguinis illis communia itinera: Concludimus ergo imaginationem viperæ, ab idea vindictæ sibi propozitæ irritatam, motum spiritibus, quem experiri non liceat, conciliare, eosque vi insigni per nervos illorumque fibras versus cavitatem dentium impellere, tanquam in infundibulum, inde in sanguinem animalis deferri per foramen ab iis factum, unde producant recensiti effectus. Ea ergo irritatio in imaginatione aut spiritibus viperæ fit, præcipue causa est energię & penetrationis ejus veneni, absque qua stupendos adeo effectus non ederet. Hinc est quod non sola vipera inter animalia morsus infert veneficos, ab aliis usque procedens cum ea in eam adiguntur: Canes, lupi, homines ipsi testimonium perhibent, ac ne extra oleas vagemur, serpentum morsus, cujus species est vipera, magis aut minus maleficus est pro ratione & natura spirituum, ac præsertim prout incitantur ii impelluntur.

*Succus flavens quem continent vesiculae.* Cum nobis mens esset omnia rite explorare, in experimentis perreximus, & ut amplius innotesceret qualitas succi illius flavi, omnium judicio adeo periculosi, curavimus à sex viperis laceratis, scorsim & iteratis vicibus, ab una quaque mordere segmentum panis, quousque exhaustum & imbibisset totum succum flavum delitescens in gingivis sex dictarum viperarum, quod exhibitum cani famelico, non magis illi noxium fuit quam si panem vulgarem edisset eo loco non imbutum: Deglutienda quoque sæpe præbuimus pallis gallinaceis & columbis frustra panis eodem succo infecta, testatur tamen omnibus innocuum fuisse: Nec detrectavi ipsemet in os proprium ingerere, pluribus testibus, absque sequuta aut præcedente oris collatione: Imo ulceri, vulneri aut excoriatori in ipsius innocentiam suam semper prodidit: *Moses Charas Tractatu de vipera edito anno 1670. Parisiis.*

## \* ADDITAMENTA.

## OBSERVATIO I.

*Morsus vipera, ex quo Sanguis coagulatus &c.*

Crus à Vipera Turtur, quem Steno objecit, tremore initio correptus est, ambulans ille tantillum sed ebrio ac vacillanti similis, spatioque exiguo interjecto, post convulsionem insignes in dorsum decumbens expiravit: Meretur observationem imprimis quod subito copia humoris ingens, unde bullulæ excitatæ os oculosque irrigaverit: Corpore Turturis aperto ita visa interiora, Hepar ex nigricante flavescens, sanguis in vasis omnibus coagulatus, manente etiam auriæ in corde motu: Circa sanguinem & in cerebro & in corpore reliquo coagulatum copia ingens humoris serosi in vasis apparuit.

Unde duo imprimis agere videntur viperæ venenum, serosi scilicet humoris secretionem partisque rubisundæ coagulationem promovere: Unde credidere multi non eoagulatum fuisse sanguinem, visa fluidi ibi existentis copia, quod pressio sanguine tinctura eliciatur loturæ carnem haud dissimilis: Intestina quibusdam in locis intumescere, In confinio vulneris, unde emanans sanguis, in momento coagulatus. *Oliyer. Jacobus in Actis Danicis anni 1679. observ. 100.*

## OBSERVATIO II.

*De Viperarum morfu.**Ad Illustrē FRANCISCUM REDI, Nobilem  
Aretinum.*

**J**Am in experimentis circa viperas faciendis occupamus, visuri quid ipsorum morsus venenatus possit. Hæc quidem in columbâ, cujus alam sinistram una momorderat, sanctum ipsum comperimus, alâ mox intumescente, & sanguine extravasato gangrænam unâ inducente, cum spiritus dispendio, præcedentibus aliquoties motibus epilepticis: circa præcordia verò, sanguis rutilus magis & fluidus, quàm coagulatus extriit: Morderi hinc curavimus sub vespæram autem sinistram canis medioeris magnitudinis, ab unâ alterâve, qui deinceps ingenti vomitu corripiebatur, per alvum deiciebat fœtida, atque cum urinam eruentem copiosè reddidisset, sex circiter horarum spatio interlit. Sectioni quam primo manè d. seq. instituimus, adfuerunt Viri aliquot Excell. & Clariss. Inter integumenta abdominis communia & musculos, sanguis extravasatus paucus his illuc conspiciebatur: paulò copiosior in epiploo. Viscera imi ventris nullam labem monstrant, ventriculus & intestina tantisper distenta: In renibus sanguinis extravasati vestigia nulla: urinæ verò tenuis & etuentæ idoneam adhuc copiam vesica exhibuit. Mediastinum sanguinem extravasatum & coagulatum variis in locis ostendit: cujuscumodi pulmones penitus caruerunt: Cordis thalamus dexter cum auriculâ prætumidus, sed non renitens, incisione factâ sanguinem summè tenuem & acrem fudit, qualem etiam in vasis majoribus, venis aequè ac arteriis offendimus. Similem quoque stillavit auris vulnerata incisa.

Eodem manè morderi curavimus canem alium majorem, in crure sinistro, hinc etiam in pudendis: viginti hæc horas substitit, antequam corrueret, ab initio equidem evidentis noxæ nihil comparuit, post meridiem verò crus, quod summopere intumuit, affectum claudicare, & salivare per vices cepit: sub vespæram alvum deiecit vehementius: totâ die nihil comedit, sed quiescit jacuit: urinam hinc eruentam mixxit, tandemque altâ die, postquam motus epileptici ipsum hæc obscurè vexasset, periiit. Separatis integumentis præsentibus Vir. Excellentiss. D. D. Ioh. Rod. Barcardo, D. D. Rothio, aliisvè, musculi cruri affecto interius incumbentes, planè denigrati fuerunt ac gangrænati, sanguine ad aspectum grumoso, fluidotamen, ex læsis vasorum osculis stillante: Idem quoque in abdominis musculis anterioribus & interioribus, maximè pene pudenda observavimus. Abdomine aperto, in epiploo & mesenterio, sanguis grumosus copiosè satis depicchenus fuit. In hepate nulla manifesta labes: Vesicula fellis liquore suo tumuit. Renes salvi ac incolumes, nec vesica urinaria ita sanguinolenta. Thorax resectus sanguinem extravasatum & coagulatum, pariter hæc illic ostendit, in cordis præprimis auriculâ & thalamo dextris, ubi insigniter grumuerat: similem quoque in vasis huius appendis comperimus.

Eadem quâ canem hunc vulneravimus die, animum sublit capite vipetæ abscisso, vulnus alæ columbæ infligere, experturi, quid inde eveniret: bihorio ergo post, cum alâ itidem intumisset & gangrænam concepisset, vidimus motus convulsivos illam prehendere, tandemque corruere, liberatâ à funesto hoc exitu gallinâ, quam vipera alia momorderat, ope ferri igniti, quod è longinquo parti vulneratæ applicuimus, & incolumi persistente capellâ, quæ à tot moribus inflatis, citra ullam medicamentorum exhibitionem, nihil prorsus detrimenti sensit, felicior in hoc cane alio, qui ex aure morfa vulneratâ, hæc dubiè succubisset, ni salè viperarum ex hito, mali vires infusæ fuissent: multum etenim auris intumuit, ipseque lassus, mali serpentis enormitatem monstravit.

**N**ihil est nostro iudicio, quod mentem veritatis avidam, magis oblectet, atque in cognitione rerum nature magis confirmet, quàm curiosi experimenta, præcipuè de his rebus, quas perici scriptores aut omiserunt penitus, aut incipiri ac diversâ ratione exposuerunt. Idem tamen officii etiam, turbæque experimentorum contrarietas atque dissensus, licet enim illa, quandoque faciem veritatis illustriorem accendant, accidit nihilominus ut ipsa non raro sint suspensa & dubia: De viperarum sanè morfu elegantissimè arguens Vir Nobiliss. in medium protulisti, quibus cum non parum refragari viderem Cl. Charas in sua viperæ Anatome, in rem præferrem nobis libuit, viperas subministrante Perisij D. Eglingero, Pharmacopoli quondam nostro,

qui eas ad theriacam conficiendam, è Gallia adferri curaverat: Antequam autem utriusque Vestrûm sententiam excutiamus, effectus in nostris animalibus productos, tantisper rimabimur: utque ab animalibus mississimo ortum, columbæ alæ, venenari morsus damnum mox luit, irritaris partium membranarum & tendinosarum incolis, in quos sanè vel maxime vim suam hostis hic exercere videntur, sanguinisque massâ infectâ, cujus portio extravasans, gangrænam sanctam induxit: nec immunes evasere canes, licet alter paulò diutius subsisteret, cujus easdem equidem nunc in parte morfi magis resistent, nunc in ipsius veneni citiore vel tardiore communicatione quærendam arbitramur, uterque vel salivavit vel vomuit, alvum deiecit vehementius, & eruenta min-

xit, evidenti indicio mali, cum fibras nervas, spiritumque animale illico aggrederentis, & in motum impetuosorem concitantis, unde cum œsophagi, tum ventriculi & intestinorum fibræ, ad expulsi-  
onem stimulate fuerunt, tum ipsum vitæ principium  
massam humoralem graviter fundentis, unde san-  
guinis nimium attenuati particulis serum impre-  
gnatum, urinae tincturam sanguinolentam concilia-  
rit, cujuscmodi à spiritu nitro aëreo incitato, cordis-  
que machinâ in motum velociorem actâ, malum  
quandoque subsequitur: Clariora hujus effectus ve-  
stigia sectione prodierunt, in cane præcipuè priore,  
impoce cujus thalami cardiaci, cum vasis appendis, san-  
guinem tenuem & ætenuum fuderunt: in altero  
vires suam præcipuam lustrum, in crure affecto, vasique  
istud cum partibus vicinis perreptantibus, præter-  
quam enim quod musculosæ partes innumerae,  
denigratæ fuerunt in super, à liquoris & sangui-  
nis eo infecti corruptelâ, qui fluidus ex vasculis  
singulis prorupit, aliquâ ejus porzione in parti-  
bus reliquis, ( crasi destructa ) nunc grumescere  
nunc fluiditatem concipiente, cujuscmodi effe-  
ctus, rationi consensu omnino videtur: nec  
enim fieri potest, quin solutis particularum com-  
binatione & motu legitimo, aliquæ heic illic sese  
prehendentes, grumescant & in motu subsi-  
stant: Eandem noxam intulit alæ columbæ vi-  
peræ caput abscissum, gallina ope ignis veneni  
communicationem cohibentis liberatâ, cujusc-  
modi emolumentum Sal viperarum, cani ultio  
attulit. Minus verò capellam nihil damni  
proctus sensisse, animal quod etiam cicutam  
innoxie comedit, cujus rei causam alij pro lu-  
bita explicant; id apud nos ratum est, non mo-  
dò exugendo vires ejus infringi, aut igneam  
particularum ope extrahi subtiles veneni parti-  
cules posse, sed etiam, quod supra innuimus,  
variâ trituratione subigi, macoque involvi, imò  
partem nunc minus commodam esse, aut aliter  
existere, aut venenatus liquor osculis vasorum  
decenter instillari nequeat, quandoque etiam  
vires suas cupido amittere, inprimis ubi viperâ  
suerit fatigata, à frequentiore mortu: imò ip-  
sius massæ humoralis talem posse esse *diâtern*,  
cui enervandæ illic, tale venenum non suffi-  
ciat: de activitate autem hujus liquoris, nunc  
superiore, quæ præter regionis diversitatem ab ip-  
so etiam materis solaris copiosiore influxu, ( unde  
animalis illius vivacitas vel torpiditas ) pendere  
videtur, evidenter fortè testari possunt, expe-  
rimenta imminente boreæ tempestate, in phar-  
macopolio Præstantiss. D. Frey, Art. pharma-  
ceut. Mysterij iterata; Tum enim vulnera capi-  
bus inflicta, præter partis intumesceniam, unde  
difficiliter incefferunt noxam nullam intulerunt,  
quæ quidem subsequi debuisse, si in solâ spi-  
rituum ex mortu irritatione; nocivi insulas de-  
ducendi essent. Perit tamen ex mortu graculus,  
moribus convulsivis, corculique palpitatione con-  
festim insequens; cum alæ quælibetque intumescen-  
tiâ & gangrenatione. Atque in fune-  
stis huius labis causam, malique genium & fon-  
tem, jam penitus est inquirendum: Tu Vir No-  
biliss. in Teis de Viperis Observ. liquorem flavum  
quem glandulæ vaginales suppediant, potissi-  
mum in scenam trahis: Verba pag. 23. & seq.  
Edit. Amstel. ita habent. *Sed prætermittâ hæc de-  
gressione, redeo ad descriptionem liquoris illius flavi,*  
*qui intra vaginas dentes continentes invenitur. De*  
*hac cum ore assumptus, neque hominibus neque brutis*  
*lethalis, pergam inquirere, an fortassis vulneri instilla-*  
*tus causa mortis exstet. Et verum esse spiritus trinum que-*  
*ritur de bovum, mortuos esse omnes gallinaceos, omnes-*

*que columbines pullos, quorum vulnera eo infecta fue-*  
*rant, tamque necare liquorem viperarum vivarum,*  
*quàm desuperatum à palato & vaginis viperarum mor-*  
*tuorum, etiam mortuos sint ante 2. vel 3. dies quod ip-*  
*sium in Epist. ad Eruditiss. Bourdelotum & Mo-*  
*rum confirmas. Equidem de liquore isto seorsim*  
*nulla fecimus experientia, id ramen Tu Vir omni*  
*lande dignissime, sententiam stabilimento esse vide-*  
*tur, quod, si pars à liquore maduerit, sanguinem-*  
*que stillât, symptoma pejus inde sublequi nun-*  
*quam viderimus, infallibili communicationis cum*  
*crure necessariè argumento: Columba quoque,*  
*quæ à capite viperæ abscisso vulnerata interit,*  
*liquoris nocivam vim facis prodâ, cui morsus*  
*solus utcumque insufficiens esset, imò ineptus,*  
*si sæpe laudatam in experiundo industriam tuam*  
*consideramus. Clariss. D. Charraz qui post Te ea-*  
*dem experientia tentavit, morsu plurimâ anima-*  
*lium intereccioni desinere enim quod quidam can-*  
*es evaserunt, ad illias impunitatem argumenta-*  
*tur, cum ipse viderit, à viperâ vivaci, si partem in-*  
*primis laxam, aut vasculis sanguiferis copiosè in-*  
*fluxum memoratit audierit, interitum illico as-*  
*ferri: De liquore verò paulò aliter sentit, cum verò*  
*quod hic ore animalium assumptus, & per gulam in*  
*ventriculalem trajectus, pejus malum non inducit,*  
*inucus quo dictæ partes oblinuntur, in causâ esse*  
*potest, ejusdemque postmodum & subactio & cum*  
*particulis aliis commixtio, unde pari sinceritate*  
*eum crure inpossibile misceri potest ( videbis quæ*  
*suprà de cantharidibus memoravimus ) Contrahit*  
*hinc primùm Charraz experientia de panis ra-*  
*leolâ, quæ cum succum flavum à gingivis sex vipe-*  
*rarum irritatum exhaustis, cani famelico inno-*  
*xie objecta fuit, hujuscus inipuni ab hominibus*  
*etiam per os assumpti onè: Id verò majoris momenti*  
*est, quod prædictus Vir Clariss. astruit, succum fla-*  
*vum in vesiculis contentum, partique vulneratæ ci-*  
*ta morsum instillatum, nullam gravius symptoma*  
*induxisse, contra quam Illustris Aretine experimen-*  
*tis iteratis, suprà laudat ad Abbatem Bourdelotum*  
*Epistolâ comprobavisti: Arduum sanè negorium*  
*nec expeditum facile, ubi propria experientia deficit.*  
*In partes verò tuas ut eamus plura sunt quæ nos*  
*movent; partim liquoris à spiritu animalis viperâ ex-*  
*candescente major actuario, unde morsu massæ hu-*  
*morali immixtus, turbas sanctas infert, quâ cadere*  
*utcumque posse videntur, si extractus, in momento se-*  
*re vulneri recenti instillatus, volatilis enim illud est,*  
*& in auras ab ita citissimâ quo singule liquoris parti-*  
*cule, siquidem vivaces fuerint, acrimoniam noci-*  
*vam acquirunt; partim Rationum quibus D. Charraz*  
*labem lethalem evincere satagit, obscuritas: Vult*  
*nampe viperæ phantasiam, ab ideâ vindictæ, quam*  
*sibi innoxie irritatam, motum quendam inexplicabilem*  
*spiritibus conciliare, atque vi impellere, per nervos*  
*eorumque fibras, versus dentium cavernulas, quasi*  
*insudibulum, exinde in sanguinem animalis de-*  
*morsu deferri mediante foramine ab iis inflicto, un-*  
*de cuncti effectus emergunt: Ast æquè crassa est hæc*  
*viperæ phantasia, quàm ideâ vindictæ, imò D. Char-*  
*raz ratiocinatio: cur quæso illum sibi fingit demum,*  
*mali illari consensu: equis ipsam edocent, spirituum*  
*explosioni per dentes perforatos viam esse: quàm*  
*facile non avolare animali ad morsum se compo-*  
*nente? quis fibrarum nervearum multam seriem in*  
*cavernulas ipsorum inferi ipsi monstravit? Stagite*  
*hæc nata videntur, & multo magis inexplicabilia*  
*esse, necdum veritati congrua, quàm esse spirituum*  
*motus: Atrox sinè evadit iste & concitatus animalis*  
*irritato, cum istud convulsionem celerem, cum lingule*  
*protenfione ostendunt, inde verò vel phantasiam*  
*vel ideam vindictæ non arguit: Cogit D. Charraz*



animal unumquodque sui defensionis & conservationis studio sum esse, indeque singulari providentiâ summâ Opificis, motibus certis gaudere ac instrui, quibus inimicum depellat, quem nec novit nec nosse potest: perpendat aculeos aliorum insectorum, liquorem istum immittere, quem de ipsis pendulum in apertis & vespis saepenumero vidimus, cum tamen æquè perversis, spiritus animalis ad vindictam concitatus sufficisset, & probè consideret, huic explosioni, in capitis quindecim viperis præcisis, & per quatuordecim in vase vitreo coaceratis, locum amplius non fuisse, fuisse tamen enecationi quinque gallinaceorum & quinque pullorum pahambinorum, seu Ta feliciter observasti: ut scilicet D. Charrias nunquam vesiculas illas, & quibus liquor nocivus jugiter suffunditur, penitus resecuisse, quò de præconcepit & effectus hâc spiritus irritari per denticulos concavos explosione, symptomatum quorumvis unâcâ matre, ipsi melius constaret: Nova cerè & insaudita opinio, quæ hanc dentium cavitate, ejusmodi tutele loco infectis pluribus daros esse pronuntiat. Verum enim verò ne philosophemata ipsius tantum rejecisse videamur, datâ occasione, succo ipso plura tentabimus, quamvis de morfu à capitis viperarum præcisis illato, experimenta cum nostris non conveniant: sed satis de his: de naturâ liquoris hujus adhuc quædam delibabimus, quam alcalinam acerrimam esse, sanguinis fusio & tenuitas, cum partium vulnerarum gangrenatione, nichilo sanguinolenta aliâque, nobis perscrutare optime possunt, nec obstat magnopere, quod in cane altero sanguis circa & recordia coagulatus fuit; lentius enim in illo labes nociva sepsit, inque parte ipsâ, fluidum fundendo acrimoniam suam prodidisse verisimile sit: Quis autem non novit sanguinis crassi ita dejectâ, dum hoc tumorem fluiditatem induit, alibi sæpe humero coagulati, seu super jam inuimus: Ipsemet D. Charrias iis, quâ in spiritibus animalibus arcanam quandam latentem aciditatem credunt, responder, acidum istud in massa sanguinea generari potuisse, ab ipsismet partibus, quæ digregationem & dissolutionem passæ sunt, cum à veneno infusæ fuere & corruptio ipsas invasit, vide sis cap. 1. Tu: bato itaque motu massæ humoralis, ejusque crassi à liquore morfu præcipuè communicato dejectâ, quis non vider varios effectus, huic difficulter succedere: Id verò mirari subitumodo nominatum Virum Doctibilibi adjicere: Neque etiam Viperâ inter animalia, sola morfu laesiva esse, quæ in vâbiem aliquando transiunt, si in iram concitata fuerint: sicut faciunt canes, lupi, quæ imo & homines ipsi. Ardeat in his spirituum exandescens explosio, dentibus ita perversis non existentibus? Vereor ut sibi ipsi similis heic sit, quod de D. Redi incautiùs dixerat; Etenim sur aliunde illa petenda est, quod etiam in Viperis obtinebit, aut morsum liquor salivæ ita aculeatus, activitate suâ præcipuè sustentat. Contrâ acido naturæ venenum hoc esse, sal volatile viperarum, quod vulneratis solatio esse solet, probabiliter evincit, cum aliter non juvet quàm spiritus animales præcipuè misceando & coagulatum præcipitando, à fermenti venenati contagio oriundum: sed etiam sacculus citri, qui calci non est esse Clariss. Hoffmanno, morsui venenosi medela est, & quæ ab acido corrumpuntur partes carnosæ, rubent magis nigredine (quæ in cane altero deprehendimus) contrarium ejus inique: forte etiam volatilia sanguinis grumescunt, quam ex ejus fusione aliquibus in locis necessariam coniecimus, tollendo juvenat, ut difficile sit sententiam infallibiliter dicere. Commodè de his liquor ipse sanguini instillatus plura & certiora docebit. Clariss. Joh. Jacob. Harderus in Observationibus Anatomico-Præcis.

*In Viperini veneni absolutiorem cognitionem adducimus hic rursus de Viperarum moribus ac Veneno Observationes proprias.*

Anno 1633. captam majorem viperis irritatis mordendam exhibuimus, atque ab earum unâ vulneris in nates est infectum; unde ipso momento morbi ac tremula facta est panemque aquâ imbutum & sale multo conspersum respuit; imo vix ab unâ parte domus in aliam, præ debilitate, commigrare valuit. Ab hinc humi cubuit tremolofque, per totum corpus motus cum abdominis distensione passa est. Post horæ circiter quadrantem salivatio, eaque admodum viscosa, atque spumosa, oborta est, & ad aliquot minuta talis perduravit. Inde in dyspnæam incidit; quæ paululum diminutâ, somnô corripiebatur, quem rursus sublequebatur salivatio, seu tenuis & minus quàm prius ipsa: somnus hinc cum intensiori dyspnæa committique stentore, ingenti partium corporis omnium tremore, & musculorum colli convulsivâ tensione, eam corripuit: Sic per momenta afflicta, cum canis objectum fuisset, caput quidem in eum extulit, sed reliquum corpus nullatenus movit. Salivatio interitum non ita copiosa subsistebat, dyspnæa ut & tremor sensim remittebant; ac oculos idemdem aperiebat, donec post duas, cum unius quadrante, à morfu horæ, pedibus insistent, rigida & quasi cataleptica fiebat, non ita tamen pertinaciter immobilis, quin excitata, vique aliquatenus adolâ, horæ quadrantem per cameram obambularer; donec veneni vi rursus prostrata, & vehementioribus motibus, convulsivis sacculis, totò tandem corpore resoluta pervenit. Aperto corpore, præter alia de quibus in sequentibus, reperiebamus sanguinem non tantum in grumos coactum, sed ejusdem particulas sibi invicem ita coherentes, ut in cordis ventriculis polypos admodum renasces, valvularum tum sigmoidalium, tum tricuspidalium varietumque caverthularum in prædictis ventriculis excavarum, imaginem apprimè per externa referentes, efformaret. Idem præterea sanguis à majoribus ac minoribus venis, in ramos ac ramulos distributus, sine disruptione extrahi poterat, valvularum inde omnium, tum jugularum venarum, tum aliarum, figuram non minus accuratam exhibens; quàm à cerâ præparata ac eadem infusâ, illud effectum fuisset. Prædictæ autem sanguis nullum præter nigrorem contraxerat, sed vividus omnino ac rutilus visebatur. Canes quos in experimentum sæpius adhibuimus, ut & feles, cuniculi, porcelli Brasiliæ, columbæ, piez, pulli gallinæ alique animalia, ipsidem propè prehensâ symptomatis, alia citius, alia tardius veneno fuere enecta; super quo adnotavimus quod illa in quibus sanguis varique succi fuerint naturâ suâ acriter, imo particulas volatilioribus magis saturati; veluti feles, columbæ, piez &c. citius, nec etiam intra præca horæ minuta sint occisa: alia vero in quibus & sanguis & alius succi aquosiores viscidiores ac lentioris fuerint motus, vitam longius protraxerint: quodque etiam alia inter ipsa, quamvis pluries ac profundius commota, sine remediis evaserint, nec à veneno lethaliter affici potuerint: citius census vobis præcipuè fuit Mus Alpinus, Marmota vulgo dictus, qui etiam tumores multos in labiis vulneratis, os prope per tempus occludentes fetoremque gangrenosum spargentes, gessit; cõvaluit tamen tandem, nec aliquo medicamento in illud eguit, nisi inde medelam sibi assumpsisse crediderimus, quod eo ipso momento quæ cõmorsum per sentiebat, dentibus viperæ caput arripere illudque contenteret, verum non usque adeo ut ipsâ confringeret

ita lethaliter violatur; nulla siquidem viperæ sic mortua est) et potius ut contentendo ac coagulando sugeret succum è viperæ rostris per compressionem exeuntem. Ut autem è diverticulo (for-  
 san non adeò ingratò) ad viam jam redeamus, observavimus, ni nos memoria fallit, in his omnibus animalibus quæ veneno perire viperis, intestina distenta, aliquatenus inflammata, maculisque lividis hinc inde leviter picta; sed eo loci quo bilis casalem suam habet apertum, livore, sen potius nigrore gangrenoso infecta; unde conspiciere licet venenam non tantum viam suam in nervos exerce, illicque tor turbas, tremores convulsivos ac fibrarum contractiones parere, quorum ex parte foras sunt constrictiones glandularum salivarium, totiusque palati ac faucium, quas salivario necessario consequitur; item ventriculi & intestinorum convulsiones, comitesque contentorum dejectiones: Verum etiam in omnes alios permeare succos istudemque deleterium quod imminere. Ea ratione sanguinem lethaliter coagulat, dum serum ejusdem à parte fibrosa secretum, per vias urinarias, & intestinales copiosius amandari, proveniuntque biliosum eò fermentationis & acrimonie vehit, ut non tantum vellicandis intestinis, eorundemque motui pro deturbandis propriis excrementis accelerando, sed etiam illis ipsis ad instar lapidis crustici è salibus laxivialibus confecti, corrodendis, aptus sit; eoque præcipue loci, ubi tota vigat: & antequam aliis incocis in fluxuolam intestinorum tubum effusis, immittis, illa rerum fuerit. Hic exquisitendum venit à quò demum principio tot funestos pronascentur effectus; quid hinc coagulationes, hinc fusiones, ac fluorem salium pariat; quid spiritus animales, nervorumque succum, quid fibras undique prorit? Verum hic fatemur ignorantiam, malumque alium filite quàm conjecturas minus ad rem facientes perorando tempus terere. Adiciamus tantum venenum hoc esse admodum subtile & paucum, quod magis mirum esset, si divisio corporum in infinitum à recentioribus Philosophis validis rationibus comprobata, imò experimentis super capri particula flammam à lampade accensâ ascendente colore viridiâculo plures dies tingentem, peractis, à Nobiliss. ac Præclariss. Dom. Boyle quæ demonstrata foret. Non tamen conclusum volumus hoc venenum tam paucum esse ac asserit Clarissim. Dominus Charaz, dum illud totum in spiritibus ex animalis irarò evolutantibus, minimæque sui portione vulnus à dente inflictum subeuntibus, repositum opinatur: Agnoscimus enim hic præterea succum quempiam pinguem & oleosum succis propriis per gingivæ longitudinem expansis conclusum, cui princeps hoc in negotio ministerium deberet, cuiusque propterea naturam ac effusionis modum conveniens fuerit ut explicemus. De memoratis sacculis & liquore contento sic habet Illustriss. Franc. Redi in suis observationibus super viperis. In fundo vaginarum intra quas viperæ dentes habent repositos, humor stagnat colore & sapore similis; oleo amygdalarum dulcium. Unde apparet ipsum pro uno & eodem sacculo habere tum quod vaginulam, conficit denti dum supra maxillam recubat, tum quod succum oleosum, gingivalem non absurdè decendum, concludit. Clariss. Dom. Charaz idem in sua viperæ anatomia sentit, ac proin scribit. Vidi majorem dentem ad duas suæ longitudinis tertias, tunicâ, seu vesiculâ cinctum, quam vesiculam complect succus subflavus, pellucidus ac mediocriter fluidus; addit præterea

succum hunc in hæc vesiculas à glandulis salivariis per canaliculos amandari, & nullatenus à folliculo bilis assurgere, ut male crediderant quidam super Naturâ succi, præcitati Auctores non contenti colore, consistentiâ, ac sapore in examen adhibuisse, illum etiam animalibus hominibusque propinquum, nec multum acrimonie aut ex gustu, aut ex effectis in ventriculo, in ipso pervidere potuerunt. At vero illud ita ipsis apparuisse, quia infasciatæ, utriusque ab oleosis admixtis venis particule, in linguae cavernulas illicque conelulas papillulas nervæ spicula suæ inferre non valebant; & quia postea succis ventriculo inquilinis immerse præcipua sua vi spoliabatur, fas est opinari. Nam iste succus proculdubio, non tantum vivente animali, ac per ejusdem irritationem commotus, venenosus est; sed etiam postquam animalis capite expressus fuit, dummodo immediate in venas pertingat; idque non semel experti sumus in canibus, in quorum vasa sanguifera cum succum prædictum è capitis viperinis paucâ aquâ calidâ inter exprimendum ablutis, extractum infusidissimus, brevi illi perire. Nec valet contra experientiam objectio, quod innocuè exhibatur, quodque plagis cultro confectis innocuè afficitur; siquidem multo stomacho non sunt nociva quæ in sanguinem immediate excepta letum inferunt, sic ego ipse sæpius largiflimas volatilibus doses haurire valui, quatum in venas injectionem animalibus omnis generis lethales observavi; & præterea quod plures spectat ejusmodi succo inunctis; quis non videt, non ita liberum succo illi vasa per plagas aperta subire; quin potius à sanguine elabente dilui, & in terram, aut lineæ applicita effundi? At etiam deficientibus hæc rationibus, quid obiecto contra experimentum certum & indubitatum. Non itaque hesitant pronuncio, venenum viperinum totum in succo gingivali residere, superest tantum ut exquiramus quomodo in venas protrahatur dum animal quodpiam à vipera commoretur. Illud autem demonstrationis non erit multum difficile, si primò affirmaverimus cum Illustriss. Dom. Redi, viperarum dentes majores esse cavos ac per longitudinem suam, exceptò extremò tantum apice, tubulatos; sed etiam non longe infra illud extremum, lateraliter ita esse perforatos, ut communi diffime liquorem per vesicularum compressiones in ipsos, non aliâ quam enervantem materia è vesicis bulbis manu constructis in fistulas in id illis apertas, momento trahentem vulnere infundant. Hoc autem eò confidentius asserimus, quod non ex propria nostra observatione addamus, obstante foraminis exiguitate, succum ex compressione longè quasi per lyringam ejectum sæpius viderimus. Hic itaque idem præstant tubulati dentes, quod in urticâ utrentè villi illi crassiores ac tubulati, è pluribus vesiculis hinc de solium plantæ contigebatibus, ac humorem corrosivum contentibus, assurgentes: nam dum à villis rigidioribus tubularis & per sui extensitatem acutioribus vulneratur pars aliqua, eo ipso infunditur in vulnus liquor subjectus fermentationis dolorificas producere paratus. Atque jam de veneno ac de modo quo in vulnus transmittitur satis, operæ nunc præcui fuerit si aliquid de antidotis adjecerimus, idque per experientiam in animalibus ac etiam hominibus petita. Nobilissimum sanè ac præsentissimum hoc in casu medicamentum, (ut alia tericem) est ipsam sal viperinum, totaque viperæ substantia, super quo minime ingratum fuerit quod in ju-

venie annos circiter octodecim nato observavimus adferre: Ille scilicet cum in medelam affectionis cuiusdam faciei crustosæ pūcula viperina, viperarumque sal volatile, adhiberet; aliquando à vipera forcipe comprehensa alitum inter pollicem ac digitum indicem commorsus fuit, nec inde tamen quidpiam noxæ retulit, quod longò jam prædictorum jusculorum ac salis usu præmunitus quasi fuisset in muci virulentissimi & perniciosissimi expulsiōnem ac extinctiōnem. In aliis vero quibus non contigit ita beatis esse ut antidotum propriò sanguini conclusam gererent, non difficile fuit symptomatis à veneno enascentibus occurre-

re, tum per sectionem partis vulneratæ, continuoque institutam ejus scarificationem, ac lotionem ex aceto theriacali, tum per propinatum pectorea sale volatile viperinum in largiori dosi. Sic providimus adolescenti qui prope talum super tendine, Hippocrati chorda dicto, vulneratus fuerat; ut & ancilla quæ dum viperam à capsa se se ploripientem, caudà arrepta, retrahere tentat, in brachio profundius sauciata fuit. Sic etiam varios canes, commorsos curavimus. Verum non est quòd plura addamus de remediò satis omnibus notò; Itaque hæc sufficiant.

## OBSERVATIO III.

*Historia varia circa Cicuta tum aquatica, tum terrestris exhibitionem, ejusque noxas.*

Cum circa finem Martij 1670. Jumenta aquatum è pago ad fontem ducerentur, Ripas. annis calcando Radices Cicutæ hujus, cauliculis eum foliorum germine jam protuberantibus in aprium produxerunt. Tunc temporis Pueri duo & sex Puellæ paulo ante meridiem ad fontem & pratium, per quod amnis præterlabitur, excurrerunt, & conspecta Radice non male suadæ famis jussu, sed petulantis luxuriæ imperio, sati pastinacam luteam esse, de illa avidè comederunt, & quædam Puellæ ex illis Radicem cæteris à dulcedine & suavitate commendarunt, unde imprimis pueri largius filam devorarent, & læti domum properarunt, unæque ex puellis Matri lachrymabunda querebatur sibi à fœcis avarius Radicem suppeditatam fuisse.

Jacobus Mader, puer sex annorum, capillis albis præditus, tener, vegetus tamen, domum rediit hilari ac subridens, quasi re bene gesta, paulo post conquerebatur de præcordiorum dolore, & vix verbum effatus humi prostratus urinam magno impetu ad Viri alitudinem eminxit; mox terribili aspectu, eum omnium sensuum abolitione convulsus fuit, os arctissime clausit, ut nulla arte aperiri valuerit; dentibus stridebat, oculos mire distortuebat, sanguis ex auribus promanabat; circa præcordia tumidum quoddam Corpus pugni virilis magnitudine Paris afflicti manum & miserandi pauci præcordia, maxime circa Cartilaginem ensiformem, validissime feriebat, singultiebat crebro; Vomitus quandoque videbatur, nihil tamen ore arctissime clauso ejicere valuit: artus mire jactabat & torquebat, læpius caput retrorsum abripiebat, totumque dorsum incurvabatur in arcum, ut puellus subtus per spatium inter dorsum & stratum inoffense repere potuisset. Cessantibus convulsionibus per momentum matris opem imploravit: mox pari ferocia illis redeuntibus nulla velleitatione, nulla acclamatione, nullove alio ingenio excitari poterat, donec viribus deficientibus expalluit & manu pectori admota expiravit. Durarunt hæc symptomata vix ultra horam dimidiam. Post obitum imprimis abdomen & facies intumuerunt absque livore, nisi paucò circa oculos conspicuo. Ex ore eadaveris usque ad horam sepulturæ spuma viridis largissime emanavit & quamvis sæpius à patre moestissimo deterta fuisset, mox tamen nova succedebat.

Catharina Maderin, lævobi Soror adultior, postquam Frater convelli cepit, ad Patrem non procul à pago arantem properavit fratrisque infortunium indicavit ac Patrem domum festinantem concitato cursu sequuta est. Post fratris obitum post fornacem sedens & ipsa se male habere querebatur. Vix dimidia hora elapsa manipulum integrum radicum devoratarum evomit: mox Epilepsia vera corripiebatur cum sensuum omnium abolitione & terrificæ capitis, artuum & totius trunci succussione & torsione, Pater ipsi os clave effregit & Theriacam Venet. aceto solutam infudit, unde iterum manipulum harum radicum evomit. Postea horis 24. cum mortua in lecto jacuit brachiis compressis & pedibus quietis; dentibus tamen subinde stridebat, subinde quoque inelamabat Marrem; quando verò Mater responsum dederat, aut ipsam aliàs alloquebatur, Puella continuat, nec audire videbatur: Novem horis Puellam plane emortuam Parentes crediderunt, facies enim cadaverosa & respiratio ipsorum opinione infensibilis erat, extremaque frigebat: Imò Parentes adhuc dum illam vere mortuam opinantur & vitam se Voto nuncupato debere persuasi sunt. Post horas 24. ad mentem rediit: at diu ob linguam morfu vulneratam commode nequijt edere: dinque de præcordiorum dolore querebatur.

rebat: obambulavit quidem sed per quadriduum delassata. Nunc bene valet; nullaque labe in Visu, quam vis convulsionibus oculos graviter torserint & propemodum extra orbitam expulerint, nec in auditu animadvertitur. Est Carnosa, vegeta nec quicquam imbecillitatis in hunc usque diem passa est, ac si nunquam de radicibus istis comedisset.

*Maria Maderin*, annorum duorum cum dimidio comedit quoque de radicibus, sed parelo-re manu: itidem Epilepsia corripiebatur, sed non tam atroci ac Frater & Soror. Pater ipsam ulnis gestans à tumore intra præcordia sensit magna vi, eeu à pugno, diaphragma percussit, unde singultijt, ejulavit, facies erubuit, mox strinxit, artus jactavit sensusque amisit. Viore aperto & Theriaca aceto soluta ingesta, manipulum dimidium harum radicum evomuit. Intra horas octo penitus convaluit: die sequente obambulavit; comeditque, Carnosa & robusta est, nec quicquam aduersi hactenus passa est.

*Matthias Graff*, puer annorum octo, Jacobo Mædero ad extremum usque halitum additit ac se quoque radices comedisset jactavit, nec tamen quicquam incommodi inde se sentire gloriabatur. Postquam vita defunctum socium vidit, domum suam abiit; antequam paternas ædes attigerat, super lapidem sedere præ quadam vertigine cogeatur: vix subsidit, pronus in faciem nitit: sine ullius ope surrexit & ceu temulentus domum properavit ac in scamnum prope fornacem decubuit; mox inde à motibus convulsivis in pavimentum hypocausti, distantiâ passus, præcipitatus fuit. Iterum surrexit atque per aliquot passus vacillante gressu incedit & post mensam dejectus fuit: protractus terribiliter convellebatur, cum arctissima dentium constrictione: Imprimis aspectu horribilis erat *dentium*; dum cultri manubrio quidam altantium dentes diducere conabatur, aliquot dentium fracti fuerunt: infusam Theriacam acetosolutam ob gulam pertinacissime ocellasam deglutire nequijt. Corpus intra præcordia tumidum vehementissime & validissime diaphragma percussit, ut à manu Viri robusti nec reprimi nec impediri potuerit, cum singultu quodam sonoro. Paroxysmus iste Epilepticus tantâ violentia ad dimidiam horam, sine ullis inducijs continuabatur: nihil neque per vomitum, aut secessum exerevit, neque eminxit, donec viribus exhaustis expiravit. Post obitum abdomen & totus habitus intumuit ut vestibus exui nequerit: spuma viridis larga ex ore indefinenter emanavit, donec terræ credebatur. Facies circa oculos livescēbat: in reliquo corpore, præter inflationem nihil observabatur.

*Christina Grafin* Soror, annorum novem, de radice quoque, sed patre comedit; quod primum negaverat. Ad vespertam usque nihil mali passa est: nocte ingruente post fornacem sedens sibi zgre fieri & cadendum esse dicebat & radices se quoque devorasse fatebatur, indeque circa præcordia dolere cum sensu punctonis & ardoris ibidem: postea convellebatur. Pater harum calamitatum ignarus opportune vesperti domum rediens folisque Tabacci minutim coneisa in promptu habens, quantum duo acetabula fistulæ, quæ ejus fumus hauritur, capiunt, aquæ fontanæ permiscuit ac dentibus vi deductis Puellæ infudit, unde liquorem infusum eum radicibus mox violentissime evomuit: in lectum reposita quievit, post brevissimam quietem esurijt, cibum petijt: sibi que bene esse dixit: tamen pater radicum reliquias superesse suspicatus, cibum denegavit: interea verò eandem dosin foliorum Tabacci aquæ fervidæ per horam dimidiam infudit & colatum liquorem ebibendum porrexit, unde iterum non sine violentia mæcum & bilem sine ullis radicum reliquijs evomuit, jējuna tota nocte dormivit: mane læta surrexit, obambulavit & hucusque sanissima vixit.

*Martini Mülleri* Filia & *Georgii Maureri* due Filie, gemellæ annorum quinque de his radicibus quoque comederunt, sed parca manu. Tres istæ Epilepsiam, sed mihiorem passæ sunt. Data Theriaca in aceto soluta omnes vomuerunt & brevi penitus convaluerunt.

*Catharina Weberin* & *Georgii Maureri* Filia tredcem annorum die 29. Augusti 1671. narrarunt mihi se quoque has radices degustasse, sed sine noxa, quæ alieius momenti esset. In colæ Pagi istius retulerunt mihi nec Equos nec jumenta Cicutam aquaticam frondentem attingere, nec siccata vesei illamque illibatam in præsepi linquere, nisi summa fame ad comedendum ad-gantur. Ante aliquot annos magnam porcorum jacturam fecerunt, causæ ignari; nunc omnem culpam huic radici deferunt, quamobrem postquam ipsis virulentia ejus ex puerorum pernicio innovit, undiquaque illam extirpant, ut jam rarior occurrat.

*Cicuta Aquatica propinata, Historia.*

1. Canimolosso robusto, ejusmodi laniones ad urgenda jumenta, pecora & vitulos in itin-  
tibus adhibent, d. 1. Sept. 1676. horâ 2. pomeridianâ obijci eicutam aquaticam minutè coneisam  
& contusam, carni vitulinæ affz involutam; verum statim subodorato veneno bolum hunc gu-  
stare noluit: aliam buccellam carnis solius mox devoravit. Itaque ligatis pedibus, ore basillo

ducto, radicem istarum contusarum 3. d. cititer intrudi, nares digitis compressi, unde dimidium horam salivavit & subinde eructavit: capite tremuit: aliquantulum pedibus vacillavit: nullum aliud symptoma notatu dignum supervenit. Circa 7. vesperti catenam, quæ arbori in horto alligatus erat, sæpius momordit. Per noctem in horto relictus vinculum coriaceum morsu tandem perstrit ac cum catena ferrea aufugit, Danubium transivit d. 3. Sept. alacris hinc inde per vicum curavit, ac si nec vel minimum à ciura passus fuisset.

2. Domias *Ioh. Christophorus Simonius Tubingensis*, Chirurgus præstans d. 8. Sept. 1676. eam juvenulo famelico, cui cibus 24. horis denegabatur, radicem à me relictam, minutim concisam, circa additamentum, ultra unciam intrudit. Post elapsam horam dimidium salivavit, vomuit, spuma pugni magnitudine ex ore pepedit: mox misere ipsum torfit, varie convulsus fuit, nunc opistotono, nunc emprostotono, nunc tetano; nunc oculos pervertebat, quandoque jactabatur: convulsionibus aliquantum remittentibusangebatur, ut in nullo loco manere posset; in gressu titubavit, & paulo post rursus in alterutrum latus præcipitatus ruit: duravit afflictio duabus horis. Postea vires recuperavit, alacrior evasit. Hinc denuo aliam radicem portionem ingessit, salivam statim movit, non vomuit, semel alvum solvit. Convulsionibus per vices affligebatur: surgens protinus in latus præcipitabatur: omnem cibum, etiam carnes, & potum fastidiit: supervixit ad diem tertium usque: & ad secundam usque horam ante obitum subinde agitabatur,angebatur, ut nullo in loco permanere posset: incedens brevi in latus cecidit. Ultimis vitæ horis, ceu fessus, jacnit, solummodo respiravit, donec expiravit.

Cadavere aperto ventriculum plâne contractum & corrugatum invenit: continuit ille radices integras, non comminutas nec emollitas, quales sc. intruserat; cætera prorsus vacuus & exsiccus fuit: deteriso pauco muco, vidit internam superficiem rubicundiorē debito, & in fundo, ubi præcipue jacebant frustula radices, maculæ rubræ livescētes apparuerunt, foris ampliores quàm in superficie interna ventriculi. Intestina prorsus erant vacua, contracta, & intus veluti sicca: in fine recti mucum viridem reperit. Vesica parva, corrugata, vacua. Ventriculi cordis pleni erant sanguine nigro concreto.

3. Eodem tempore lanionis molosso eandem radicem minutim concisam cum lacte ingessit; salivam movit, vomitum excitavit, quo radicem aliaque contenta ventriculi large eiecit, non convellebatur; nec quiesquam sinistri postea passus est.

4. Ciuræ aquaticæ virus experiendi otium & occasionem nactus Doneschings d. 15. Septembris 1676. canem vetulum, mediocris magnitudinis, coloris fuscī, cætera vulpi similem, à tempore vespertino ad horam 10. anti-meridianam d. 16. Septembris ab omni cibo & potu jejuna detinuit: tum ciuræ aquaticæ recentis radices contusas, unciarum quatuor pondere, pedibus ligato & ore pistillo diducto, intrudi; ægerrime radices in ventriculum admisit, & iteratis vicibus dju in gula detinuit, ut partem naribus oclusus, partim foris, gulam deorsum fiteando, illuc promovendæ fuerint. Cum ligabatur ac radicis intrusiono vexabatur, largissime alvum & vesicam exoneravit. Vinculis solutus, aliquandiu angī videbatur ac celetius respiravit, sed inde nec vomuit nec alvum solvit; paulo post vegetus iterum evasit, ac si nihil adversi prorsus pateretur. Itaque hora prima pomeridiana ad radices in taleolos & majora frusta coniecit, mediante bacillo, linteo obvoluto & oleo imbuto, ultra quatuor uncias intrudimus. Vinculis solutus aliquandiu celerius respiravit, quod potius torturæ quàm radicis virulentæ tribuendum erat, nam in aliud conclave ultra quinquaginta passus deductus, nunquam nutavit, neque ullum visceris alicujus afflicti signum edidit ad 10. usque vespertinam: circa illud tempus crebro ad vomitum stimulabatur, arque liquor aliquis usque ad fauces trudebatur, quem tamen protinus rursus deglutit: tota nocte quiescit fuit. d. 17. Septembris mane vegetus erat, nunc surrexit, nunc rursus decubuit, appositam aquam bibere noluit. Hora 9. maturina rursus ad vomitum urgebatur, liquoque usque ad fauces pertingebat, quem statim iterum deglutit: postea crebro pedes ligere cepit: Hora 12. carnes & frustum panis cum ossibus avide comedit & paulo post bibit: quod iridem fecerat hora 7. vespertina noctu inquietus erat, & vinculis, quibus ne aufugeret, contractus erat, se liberare conabatur, aut quiritabatur. d. 18. Septembris vividus erat ac validus, ac si ne misam radicis acceperat: sicciosus multum aquæ bibit, & comedisset, si ei datus fuisset. Itaque hora 10. anti-meridiana constitui fuscum ex herba & radicibus contusis, & aqua fervide aliquandiu maceratis, foriter expressum infundere: dum pedes vinculis stringuntur, pistillum ori transversim inditur, magna vim ligamenta rumpit, venatorem morsu graviter vulnerat, ac fœces atro virescentes in cylindros compactas, copiose egerit & largissime mingit. Tanto robore

recuperaſſe, poſt aliquot dierum ſumēti, & ſuperata, cicutæ virulentia, vix & non niſi poſt multos labores ligando, ad inſuſionem aptari potuit. Inſuſi tandem ante undecimam huius liquoris plus quàm libras duas. A liquore inſuſo abdoſmen valde intruſit. Poſtquam vincula maximam partem ablata fuerunt, largiſſime vomuit mucum reſaciſſimum; ſubnigrum, aliū redolentem eum aliquot radieum cicutæ taleolis emolliſiſ, ſed non diſſoluſiſ, quos nſtra ſeptuaginta duas horas intra ventriculum continuit. Circa duodecimam crebro præ anxietate ſitum mutavit, nunc ſedit, nunc in ventrem; nunc in larus decubuit, nonnunquam prono capite diu arronitus ſteſit: paulo poſt ſaliſa ſpumæ copioſe ex ore manare cœpit, non ſecus ac ſi mercurius vel illuſus vel ingeſtus fuiſſet.

Ante primam pomeridianam mucum album, penitus ſpumæum, ſimilem ſaliſæ ex ore ſtilanti, copioſum, magnonixu evomuit: ab illo tempore ſaliſatio parcius eveniebat: valde angebatur: ſæpe ad vomitum ſtimulabatur; reſpiravit celeriter cum ſono quodam triſti & querulo: ſitum ſæpe mutavit, ut quo ſe venteret, neſciret: Poſt 3 pomerid. ruſus mucum copioſum, ſpumæum, atro viſceſcentem, cum aliquot taleolis Radicis Cicutæ 16. Sptemb. intruſiſ, magno nixu evomuit. Ab illo tempore ad 10. noctis ſæpiſſime ad movendum urgebatur, at liquorem & quicquid ad ſauces uſque protrudebatur, nunquam ſimplius egeſſit, plerumque gembundus exſpiravit, ſere decubuit, omnibus tamen ſenſibus valuit, & irritatus baculum morſu petijt: accedentes fixis oculis intuebatur, & ad quemlibet ſtrepitum attendebat: ruſus & crepitus foetidiffimos, aliū redolentes, crebro emiſit. Cibum ſc. Bubalam elixam, & fruſtulum pellis cervinæ, in quo receptaculum lachrymæ continebatur, circa ſeptimam deguſtare noluit, & naribus propius admotum, aveſabatur; Tota nocte ſerò inquietus fuit: audivi aliquoties vinculum ferreum, quo pedi menſe alligatus ſuit & totum corpus ſuocurare: an aliquid convulſivi paſſus fuerit? præ denſiſſimis tenebris videre nequijt: mane ramen d. 19. Septem circa quintam inſum lorum, ubi coriaceum erat, avulſiſſe & cibum in cœna appoſitum devoraſſe, comperi. Valde tum languidus erat, minusque alacris, unde facile paſſus eſt ſe denuo menſe alligari: Vomituriebat ſæpius, nihil ramen excrevit; reſpiravit adhuc ſono querulo. Circa 7. matutinam ulteriori motæ impatientes, ſunculo collo ei cum poſito, ipſum ſingularunt: vix ſuffocari pomit, & ſtatim in principio ſunculo, vehementiſſime corpus agitando diſrupit, parum minxit: per alvum præter ſtatus nihil emiſit. In cadavere ſequentia obſervatu digniora notavi. Primum abdomine aperto, omnia intus vere ſervebant, imprimis epar attractu admodum calidum erat; ventriculus non admodum diſtensus fuit, dum adhuc calebat, poſtquam frigefieri cœpit, magis intumuerat: inreſtina maximam partem graellia, contracta & corrugata, etiam rectum, videbantur: Cœcum turgidius fuit: ſuperficiēs ventriculi externa ex albo ruſcebat: inreſtina albidantiſſima fueiunt: epar erat atro ruſcens: pancreas ſolito rubicundius: lien longe pallidior hepate. Renes à ſolita facie non deſciverunt: veſica diſtentiſſima & lotio flavo impleta fuit. Vaſa ejaculatoria abſciſa, inſtar vermium corrugabantur. Pectore reſerato omnia quoque intus æſtebant: pulmones in ſiniſtro latere utrinque non penitus ſubſiderunt, ſed ære adhuc aliquantum turgebant, adeo ut veſicula in lobis ſiniſtri lateris videri poſſent; non ramen ita inflati ut vel tertiam cavitatis partem vix adimplerent: in ſiniſtro latere ex albo ruſcebant; in dextro intensè rubri fuerunt. Cor ſanguine admodum turgebat. Gula valde inflata & ſoris admodum rubicunda fuit. Dum in chyli receptaculo ſere inani & non niſi pauca lymphæ prædito occupor, ac inreſtina cum ventriculo & gula eximo, eor perfrigit: incifo dextro ventriculo omnis ſanguis in illo, & auricula in grumum magnum, atrum potius quàm rubicundum, ſed facile diſſolubilem conerevit: ſimilem in ſiniſtro, ſed multo minorem inveni. In vena cava aſcendente & deſcendente ſanguis maximam partem fluidus, & non niſi ille grumofus ſuit, qui eum cordis grumis continuuſerat alibi ex vaſis ſanguiferis ſauciatis emanavit ſanguis fluidus, intensè rubicundus & ad nigredinem aliquam vergens. Veſicula Biliaria plena erat Bile valde ſlava, viſcidiffima. Inciſa gula erupit ſcoror, totum aliſſi ſcororem ſpirans: intus prorsus alba fuit, muco pellucido oblita: ſulci recti. Ventriculo à ſtomacho ad duodenum ſecundum longitudinem inciſo, circa ſtomachum occurrit aqua turbida in fundo inveni aliquot Radicum taleolos; quam plurimos pilos, quorum quidam jam in pilam nuce juglande majorem compaſti fuerunt, plures per univerſam ſuperficiem ventriculi ſpargebantur, atque intra anfractus abſcondebantur; omnes ſimiles erant illis quibus canis tegebatur; fruſtulum pellis cervinæ pilis adhuc conſiſſe fruſtulum pinguedinis condenſatæ magnitudinis avellanæ, denique plurimum muſci, cui etiam pili involvebantur & reliqua ejus contenta: muſcus iſte qui in ejus cavitate fluctuabat, turbidus erat, albus potius quàm ſlavus, aut atro viſceſcens; nec ſpumæum ſumit. Circa pylorum in antro ad unciæ unius latitudinem muſcus cœcens, ſed paucus hærebat. His omnibus ſublatis anfractus comparuerunt, muco pellucido tenui obducti; qui deruſus protinus, cœu è poris pulſus, novus repullulabat, etiam citra compreſſionem forinſecus factam, latus anfractus om-

omnes, maxime in fundo, tum in parte prominente, tum intra interstidia rubebant; alicubi, imprimis in intestitijs apparuerunt maculae intensius rubrae, quam ipsi anfractus erant, quae fere in locis tribus exulceratae fuerant. In principio antri pylori praeminuit tuberculum valde rubrum, pisi magnitudine, in cacumine prope exulceratum; Reliqua pars antri, ipseque pylorus non rubebat, sed albicantes manserat post elotam flavedinem. Intestina sex ulnas longa omnia crassiora solita erant, f.r.e quia vasa fere erant, nec ullum discrimen observavi, nisi quod portio illorum amplior esset, tum imprimis sub pyloro ad ulnae dimidiae longitudinem, tum ulterius ad ulnam unam cum dimidia: reliqua vero ad caecum usque gracilior. A pyloro ultra duas ulnas illorum cavitas muco flavo, viscido, pellucido obducta erat; postea ultra ulnam cavitas magis coarctata, omnique muci flavi experta erat, solummodo muco albo, pellucido; tenacissimo obducebantur, nihilque prorsus continebant, quam aliquot vermes cucurbitinos, spirithama longiores, quasi ex seminibus cucurbitinis secundum longitudinem apicibus conglutinati. Ab hac intestini portione reliqua, usque ad valvulam in fine ilei, muco intense flavo plena erant, cui videbatur aliquid cruoris permixtum: prope illius finem hinc inde excrementa atro-virescentia, sed pauca quantitate apparuerunt, prorsus digesta, ut ejus rei reliquiae fuerint vix dignosci posset. Caecum quod in duos quasi sinus contortum erat, quoque multum hujus muci continuit, cum excrementis paucis, superioribus simillimis. Ejusdem generis mucus intestinum rectum incrustabat, & sub finem illius aliquid excrementorum atrovirescentium detinebatur, sed omnino paucum. In toto intestinorum ductu, nec minimum frustulum, vel ossis, vel radices in taleolos consisse apparuit, quamvis longe majore quantitate radix ingesta fuerit quam vel evomit binis vicibus, vel in cavo ventriculi reperit. Detergo muco undique intestina intus inflammata erant; maxime sub pyloro, & ibi, ubi intensius flavescerebat in illa portione ad valvulam usque, etiam rectum rubebat magis quam solet: observavi plerosque ambitus areolarum, quibus glandulae circumscribuntur quoque rubuisse, ipsas glandulas vero non nisi in paucis locis. Rubebat quoque intestinum caecum intus. Gulam, ventriculum & intestina aqua fontana saepius mutata per triduum maeceavi, ut fibras discernere & separare, aliaque observare possem. In gula maeceata sulci recti pauciores, plures vero transversis inaequales apparuerunt: foris erant fibrae rectae: ablata membrana interna nervea, fibrae carnae oblique ascendentes & glandulae quam plurimae militares occurrerunt, quibus foras pressis, interna gularum superficies glutinosa & valde lubrica evasit, ac in parte externa nibileminus glutinosa mansit. Detracta membrana nervea, à stomacho ad pylorum, observavi plurimos nervos, imprimis circa stomachum & pylorum, eosque non adeo parvos, validos, non paucos: etiam in alijs locis, maxime circa fundum in illam inseri, atque in illa obliterari & in membranam degenerare: deinde plurima vasa sanguifera inter illam & fibras carneas ferri: Insuper avulsa haec membrana nervea à fibris, protinus omnes anfractus evanescere. Praeterea dum haec membrana cum fibrosa cohaesit, compresso inter separandum ventriculo, semper interna superficies admodum lubrica permansit, ac muco viscido pellucido, imo etiam citra compressionem, aqua immersa, protinus iterum copiose obducebatur, quamvis nullas glandulas inter hanc & corporum fibrosum observarem, quales, in gula, membranae nerveae foris copiosissime aeseumbebant: Imo postquam illum penitus à fibrosa separassem, nihilominus lubrica manebat; quamvis illam iteratis vicibus fontana eluerim, cum facile corpus fibrosum ab omni lubricitate hac ratione vindicaretur. Hanc membranam nerveam in plurimis locis inflammatam manifeste vidi: aliquot in locis inveni ulnoscule superficiei, mitioribus aphthis similia: tuberculum in antro pylori in hac quoque perfiti, non ulterius progressum: videbatur in cacumine exulceratum esse. In fibroso corpore foris per membranam communem transparebant fibrae rectae, à stomacho ad pylorum protensa, intus ablata membrana nervea, apparuerunt fibrae circulares carnae, illaeque validae maxime circa medium ventriculi, ut & in antro pylori: à stomacho oblique primum ferebantur; antequam plane circulares evaserant: aliud fibrarum genus nullum observavi. In toto intestinorum ductu observavi triginta areolas glandularum tubulosarum, à pyloro ad valvulam ante intestinum rectum, valvulae coli vices agentis, firmam: areolarum circulus extremus limbus, altior est, & prominulus magis quam fundus, in quo conspicua sunt minuta capitella, acuum similia, ex quorum osculis, foris intestinis compressis, exsudat humor albus, turbidus, viscidiusculus, qualis ex tubulis in gula volatiliis, compressione prodit. In prima portione ulnari à bilarii ductus insertionem;

oſto numeravi, dimidij bazij amplitudine, nullam vidi à pyloro ad inſerionem ductus uſque, ſed infra illam demum: In 2. ulnâ, duas parvas, adeo ut in una quatuor ran- rum capitella comparuerint: in ulnâ 3. quatuor maiores ovales: In 4. & 5. decem ro- tundas & ovales: circa finem quintæ ulnæ, inveni tuberculum verruſe ſimile, in am- bîu inflammatarum, ſuperne excoriatarum. In reliqua portione uſque ad valvulam, nume- ravi ſex areolas, cæteris ſerè ampliores, quarum una quinque uncias longa erat, verum anguſtior alijs, maxime circa principium. In portione inteſtini valvulæ propiore, aliquot areolarum oblongarum limbi, dimidiam partem inflammatæ erant; glandulæ verò ip- ſe nullibi: ſibi ubi areolæ in inteſtinis ſitz erant; inteſtina luſi obverſa, magis perſpicua ſex pellucida erant, quàm in alijs locis. Inteſtinorum membrana extrema, fibris carnoſis, robuſtis circularibus: tertia proutus nervea, ad quam pertingebant plurimi nervuli, va- ſi ſatiſ & robuſti, & vaſa ſanguifera, quæ tenuiſſimorum capillamentorum inſtar, cum reticula areolas ambibant; quarta villoſa ſeu mucosa, quæ totam internam cavitatem inſtruſtabat, exceptis areolarum ſparioliſ, unde ibi inteſtina pellucida. Dum villoſam tu- nicam abraſi obtuſo cultello, à nervea plerimum liquoris candidi, turbidi, chylo perſi- miſis ſimul expreſſi, quamvis per triduum ſepiſſimè inteſtina eluerim, etiam propè val- vulam inteſtini recti. Poſtquam tunicas fibroſas inteſtinorum ſuſtuli, Valvulæ Keckerin- gianæ proutus obliterabantur, quæ adhuc conſpicuæ erant, quamvis meſenterium ab- ſtulerim. Abtaſa fortius tunica villoſa, ſimul abſcripiebantur in areoliſ glandularum capitel- la prominula, & loco illorum apparebant oſcula minuta, ſ. papay. alb. capacia: ſi verò nul- lam vim adhibui, perſiſtiterunt capitella integræ. Inteſtinum cæcum in duas quaſi cellas di- reſumptum, & rectum inſtar ventriculi, intus anfractuosa erant; præter communem, etiam quatuor tunicas habuerunt, quarum externa fibris rectis, ſeunda circularibus prædita erant: In recto fibre rectæ inſigniores erant, quàm in reliquiſ, circulares quoque robuſtæ & carnoſæ fuerunt: Membranæ nerveæ inſignia vaſa ſanguifera accumbebant: In cæco & recto cruſtacea, ſeu mucosa, minus villoſa erat quam in reliquiſ inteſtiniſ: In cæco nul- las quidem areolas inveni, verum aliquot oſcula glandularum vices præſtantia: in recto nullum neque oſculum, neque areolam obſervare potui, quamvis hoc quoque inteſtinum admodum lubricum eſſet.

5. Circa idem tempus caniculo ſemeltre, admodum famelico, appoſuit juſculum carnis, cui Radices cicutæ minutim conciſæ immixtæ erant, *Clariff. Dom. D. Iohan. Conrad Stenzelius: Medic. Viſſinganus;* juſculum avidè devoravit, verum nec vomitum movit nec alvum: debillor quidem inde evaſit, ac internæ afflictionis indicia præbuir, verum poſt ali- quot horas ſuperatas integrè convaluit, nec quicquam deterius paſſus eſt, ut narraſi Doneſchingæ d. 21. Sept. 1676.

6. Die 4. Junij 1677. lupo, qui oſto circiter ſeptimanarum credebatur, ante horam octavam manu, Radicis eicutæ aquaticæ unciâs circiter duas conſuſas vi digito in- trudi; humi poſitus ululavit vagientis inſtar, continuo: exiguum portionem vomitu rejecit abſque magno niſu. Poſt horæ quadrantem magno conamine Radicum portio- nem evomuit, ſed vix decimam ingeſtarum partem: poſtea diu non amplius nec vo- muit, nec ad vomitum ſtimulari videbatur, verum prodijt ſolum ex ore ſpuma albâ copioſè. Ab illo tempore nutare in dextrum laſus cepit, ac illuc ſæpe caput incli- navit, ac ſi motu convulſivo traheretur. Ante nonam vehementer ad vomitum ſtimula- batur, nihil tamen excrevit, quamvis per gulam ad laryngen Bolus aſcendere & me- re, brevibus intervalliſ crebro videretur: continuante aliquandiu hoc nixu linguam, hian- te plurimum ore, longè exſeruit, mox convellebatur, caput reſoſum terrahebatur iterato, pedes extendebat, ac in hac luſta alvum exoneravit, non autem minxit: paulo poſt totus rigidus ſine omni motu & ſenſu, reſpiratione penitus ceſſante, jacuit, ut mortuum putari- mus. Tetanus iſte duravit, ad horæ partem circiter duodecimam. Cum jamjam eultrum admoturus eram, cor ruſus ſe movere, moxque unum alterumque ſuſpirium edere cepit, paulatimque reſpiratio, ſenſus motuſque redierunt, atque ruſus vagijt, verum ſubmiſſa & fracta voce & oculos aperuit. Poſt nonam conatus vomendi redijt, in quo Bolum iteratis & creberrimis ad laryngen pertingere vicibus vidi, ſcendenrem & remeantem breviffimiſ intervalliſ, denuo longè exerta lingua, epilepſia corripieba- tur. In ipſo paroxyſmo abdomen incidi, nullo ſenſu indico primum lupo dante: dilatato vulnere, & aliquoties muſculis abdominiſ & peritonzi ſanciatis, tandem ſenſus in- dicia præbere motu & vagitu cepit, ac concitatus reſpiravit.

Penitus denudatiſ viſceribus imi ventris, ventriculus apparuit valde diſtensus, tum à Radicibus, tum à Flatibus, ſubinde ſe conſtrinxit ſere in medio, proxime antrum py- lori, uſculeus ibi videretur & rotus anguſtior, minusque globosus & æqualis, ſed rugoſior appareret. In collo tunc videbam Bolum verſus, laryngem aſcendere, moxque relabi,



nihil tamen prodibat ex ore, quamvis linguam non raro longè exseruerit; ac si ad summas fauces jam aliquid pervenisset. Quando ab amplexu contentorum ventriculus cessavit, à levi contactu, stylo facto, subinde illum repetijt. Intestina propè vacua & contracta erant, nisi sub finem ilei, ubi distentiora. Diaphragmatis centrum nervum in inspiratione convexum reddebatur, ambitus verò illius carneus, costis adhaerens, corrugabatur: In expiratione totum diaphragma planum evadebat: Exeiso ventriculo & leviusculè diaphragmate in centro fasciario, in inspiratione unieâ vice valde expandebatur centrum, in expiratione, spuma per vulnus copiosè cum Radicum frustulis in abdomen erupit, ac postea diaphragma equaliter tensus manit: subinde, ore aërem captavit, linguam exseruit, costæ unâ alteraque vice attollebantur & descendeant: quod fortiter adhuc pulsavit, postquam respiratio cessavit. Omnique motus animalis subsistit.

Post mortem iaveni gulam, Radicibus in cylindrum coactis, à stomacho ad mediam ejus partem plenam, reliquum ad fauces usque, implebatur & distendebatur mucos spumeo, subflavo, cum Radicum frustulis: circa fauces inflammata erat, fortè à violenta intrusione: in fine una alteraque macula rubra apparuit.

Ventriculus ovi galinacei amplitudine, plenus erat Radicum, quæ multo mucos pellucido involvebantur; sublatis contentis & detergo mucos anfractus, maximè in fundo & ad latera, rubebant, antrum pylori album fuit, ita tamen ut non procul à pyloro appareret macula rubra.

Intestina sub pyloro ferè vacua erant, continentia unum atque alterum frustulum Radicis, oblita erant mucos flavo, quululra ulnam, nunc magis nunc minus obducebat intestina, citra ullum aliud corpus.

In reliquo ductu, ad quadrantis distantiam à valvula ilei, mucus copiosior aderat, atro flavescens: in portione ad valvulam mucus adhuc copiosior, cum recrementis subnigris. Cecum & rectum prorsus vacua fuerunt. In hepate, renibus & liene nihil dignum occurrit. Vesicula Biliaria turgebat felie flavo. Pulmones albicabant. Sanguis ex cava ascendente emissus, pulchre rutilus fuit, qui brevi in grumos concresebat: inflatâ cava ambæ auriculæ cordis movere se cœperunt, & aliquandiu rythmos continuarunt. Cordis ventriculi sanguine vacui fuerunt, forte ob prægressas hæmorrhagias & inflationem. Thoracis ductus lymphæ plenus fuit, cum pauxillo chyli: Cerebri ventriculi omnes vacui erant: at quatuor sinus implebantur sanguine atro in grumos concreto: similis continebatur in basi cranij, eo loci ubi reo mirabile resonatur.

7. Die 5. Jun. 1677. Lupæ prioris forori uterinæ, magis vegetæ & robustiori, ventriculo jam lacte pleno, dedi hora 8. matutina succi ex Rad. & herba cicutæ terrestres contusis, pauxilloque aquæ maceratis, elieiri ʒvi. circiter. In omnibus plantis hæc cicutam referebat, sc. figura, caule maculoso cavo, foliorum colore obscure virescente; nisi quod folia averfa, splendida essent. Hæc puellis venatoris ejusdem Doneschingani, non ita pridem, comesta, pene lethum attulit, vomitum, delirium & convulsiones excitando. Post epotum succum iacebat instar temulentis: latebras quæsitit, multum dormivit: subinde ad vomitum stimulabatur, nunquam tamen evomuit: nam ad fauces protrusa deglutijt, aliquoties alvum exoneravit, eiecitque enim vi quadam liquorem viridem succe perisimilem. Crebro & multum minxit semper equaliter caluit: nunquam vagijt, aut sitientis, aut esurientis signa præbuit. Hora 1. pomeridiana lac calefactum, digito ori indito, sugendum præbui, quod avidè hausit; vellitata instar canis ludentis murmuravit, & blandiens larravit. Multum minxit. Dormivit fere continuè ad 5. vespertinam: expergefacta multum escitavit, ac si somnum nondum absolvisset, iterum lac mediante digito sorbendum dedi: digitum transversum, aut recta iaditum, tam fortiter lingua & faucibus undique corripuit, ac si digitum deglutitura esset. Post 6. vespertinam rursus iteratis vicibus, viridia & flava cum lacte coagulato exerevit, ac si purgans sumpsisset. Tota nocte, se post velum parietis abscondens dormivit. die 6. Junij mane hora 4. famelica me quæsitit, ac catelli instar famelici sequebatur, quorsum cumque gressus moveram: lactis pauxillo dato se rursus ad quietem composuit.

Die igitur 6. Jun. mane hora 6. succi radie. cicutæ aquaticæ per noctem in aqua maceratæ, primū nunciavi, & paulo post ultra unelas duas cum labore infudi: vix quadrante horæ elapso, succum pene omnem cum mucos copiose & lacte coagulato evomuit, & paulo post rursus mucum turbidum bis. Aliquoties ad 10. horam nigra seu atro virescentia, pulcracea & viscidissima alvo deiecit. Ad vomitum sæpe urgebatur ac ore hiabar, nihil tamen prodijt, nam ad fauces ascendentem bolum deglutijt. Diu spuma, aut mucus copiosus ab ore pendebar: Tandem salivam modo salivavit multam, saliva renui, pellucida largiter extillantem. Primū vagijt multum, sed voce submissa & querula: irritata murmuravit. Ante & aliquandiu post vomitum temulentis instar iacebat, circa 9. vero firmius: latebras quæsitit. Hora 10. antemerid. lac rursus avidè, mediante digito ex patina fuxit. Hora 11. & hora 1. pomerid. cum vivida & vegeta

vegeta esset, qualibet vice ultra unciam radicis siccior. aquar. maceratae in faeces trudi: post horam dimidiam plusquam dimidiam unciam evomit: per alvum quoque bis egressa plurima frustula radicis emollit, cum mucos turbido, fusco. Mansit haecenus satis adhuc valida, incedebat, solito more laebat quarens; aequaliter calida. Hoc à 2. pomerid. dedi radicis eient. aquar. non maceratae, parum in umbra siccat & minutim concisae, unciam cister, paulo post ad vomitum urgebatur, solà spumâ succedente, quàm saepius os lambendo rursus deglutit: crebrius urgente vomitu, tandem frustulem unam alterumque protrudit. Alvum aliquoties exoneravit, ac cum mucos fusco, turbido radicis maceratarum plurima frustula excrevit. Haecenus rarissime vagit, saepius se quasi ad somnum composuit, ut dormire videretur: aequaliter caluit: oculos splendidos huc usque retinuit.

Circa horam 4. vesp. res ipsius in deterius labi coeperunt. Abdomen intumuit, instar remulenti incessit: ad vomitum stimulabatur: antequam vomeret, abdomen iteratò validè contrahabatur, subitum & validum clamorem edidit, os amplissimo rictu dilatavit ac si offeciret; mentum ad capulum sterni propè accessit; in hoc nixu primum spuma prodijt, postea sequebantur frustula radicis non maceratae, parum immutata & solummodo emollita, mucos item pelliculosus. Uique ad horam septimam aliquoties alvum solvit, faeces erant maximam partem radices maceratae, mucos fuscus, viscidissimus, turbidus; cui aliquid cruoris immixtum erat. Copiose minxit, quod toto hoc die nunquam factum fuisse non observavi: incessus erat languidior. Lac ori illitum deglutivit quidem, sed mox vomitus sequebatur. Interca multum quievit, somnum simulans, adhuc aequaliter calida: attentatà protinus evigilavit, ac ad latebras suas quantum potuit propetavit. Ad septimam aliquoties alvum exoneravit, faeces erant nunc solummodo mucos turbidus, subfusus, alquando flavus, nunc radices, quantum observare potui, adhuc ex illis, quas aique prius infuderam: Minxit largiter: Urina elara erat, sed flava. Post septimam rursus os magno rictu dilatavit & vomere conabatur, mox minxit, large emanante urina ac statim emissò validò clamore, humi vi quadam prostrata & à p. iectè cuius inirebat, ultra duos pedes in pavementum projecta, vehementissimè convulsa fuit: Paroxysmus verò epilepticus erat; caput rectorum itahebatur, dorsum incurvabatur, artus validè nunc succutiebantur, nunc rigidi evadebant; abdomen nunc intumescere, nunc contrahabatur, respiratio nunc inaequalis, nunc cum stertore peragebatur; oculus pervertebat; labra vatie deducebantur, cauda inire agitabatur, in ipso paroxysmo per alvum radices excrevit: tandem respiratio penitus intercipiebatur, instarque mortuus rigida iacebat; spuma copiosa os obtegebat: duravit paroxysmus sedè ad sextam horae partem. Superato paroxysmo in pedes surrexit per aliquot passus incessit cuncta pede calcata murmur, seu larratam, edidit & morsum intentavit: aliquoties stertnavit.

Vegeta satis adhuc subinde pedibus insistebat, os & pedes lambebat; aliquoties faeces pulveraceas, mucos, atque virescentes excrevit: subinde quoque canis instar, capite pedibusque antecursoribus ad latera inclinatis, ad somnum se composuit, raro vagit. Post 11. noctis paroxysmos diurnior & vehementior redijt, quàm praecessit conatus vomendi, cum amplissimo & diurno oris rictu, abdominis contractione, eructatione sonora; item clamor validissimus: in ipso paroxysmo saepius caput valde pavemento alisit; per os mucum fuscum, cum portuoculis radicis non maceratae protrudit & alvum exoneravit, radicis fuscae particulis excrevit: semel validum quoque epulatum edidit: respiratio inaequalior fuit cum stertore, tandem prorsus cessare videbatur ac mortuus simillima, copiosa spumâ ab ore pendente. Verum & hoc paroxysmo finito vires recuperavit, ac in pedes surgeret & incedere valuit. Ab illo tempore usque ad 2. matutinam propè qualibet horâ dimidiâ supervenit paroxysmus: omnes otzcesserunt oris rictus; sonus quidam, ac si aliquid avidè lamberet, lingua palatum fortiter foricare & ereberrime, brevibus intervallis: nostri *Schmerzen* vocant: Clamor validus nunc larrat, nunc vagit, castellorum à matre desertorum, aut percussorum, nunc ululatus, lupi petulanti similis, qui saepe tam sonorus erat, ut aures impensè feriret & me dormientem excitaret: Aliquando singulus saepe etiam eructatio sonora: abdominis contractio. In ipso paroxysmo urinae & alvinae faeces egressae; nonnunquam vomuit: spumavit copiose; tandem instar mortui jacuit sine respiratione: finito paroxysmo, omnes sensus & motum recuperavit, ac languida evasit & frequentius respiravit, subinde vagit pedes lambit, seque ad somnum adhuc componere valuit. Habitus calebat, ac nasus & lingua frigesceri coeperunt.

Post horam 2. non amplius surgere valuit, semper alitrutri lateri iniebat, artus continè motu convulsivo succutiebantur; aliquando rigebant, caput quassabatur, totus truncus curvabatur retrorsum, non raro antrosum, cum oculorum perversione, labiorum tor-

sione; respiratio aliquandiu intermittebatur ac prope mortua videbatur, mox tamen oculos aperire & respirare cepit; caput, quietum tenuit, manente motu artuum convulsivo. Hos paroxysmos præcesserant quoque vagitus aliqui, sed vix submissi, oris rictus; vibratio lingue versus coelum palati, singultus, eructationes sonoræ; Videbatur extra paroxysmos istos holus quidam in colli parte anteriore, à capulo sterni ad laryngem, brevibus intervallis pelii & rursus suo pondere descendere. Inter respirandum erebra suspiria edidit: ipsa respiratio nunc tardior nunc frequentior evasit. Paroxysmos non raro præcessit rugitus ventris satis sonorus. Tum in his paroxysmis, tum extra illos, aliquoties per alvum radicum frustula excrevit cum mucos turbido fusco; subinde minxit, sed parum admodum: ex ore prodit vel spuma vel mucus. Oculi splendidi manserunt; extrema frigere cum lingua ceperunt, habitu reliquo calido manente. Extra paroxysmos distentum fuit abdomen; quam primum verò contrahi cepit, doloris signa edidit, ad vomitum irritabatur ac ore hiavit, protinus novus aderat. Circa horam quintam die 7. Jun. mane ante insultum & in ipso insultu, frustula aliquot radiis non maceratz evomuit. Paulò post curim à capulo sterni ad os pubis & transversim ad ilia incidi, nulla doloris gravioris petPELLI signa præbuit, donec musculos abdominis & peritonæum discidissem, tunc enim caput motavit, artus tetano afficiebantur, vagiit parum & respiratio contentior reddebatur: nihil per alvum aut ex vesica excrevit. Sanguis ex vasis subcutaneis & musculis abdominis splendide rubescens, satis copiosus emanavit, statim concreescens.

Visceribus ventris in aprium productis, vidi ventriculum valdè distentum, ovum gallinaceum magnitudine superantem, antèrius æqualem glabrum & prope pellucidum, ita tensum ut renitetetur. Aliquoties ejus pylorus se ita constrinxit ut ejus regio minor multum apparetet, datusque admodum instar cartilaginei globuli evasit: aliquando circa principium antri pylori constringebat se ventriculus, unde minor, rugosus & carnosior reddebatur; quàm primum verò se explicuit, primam amplitudinem cum tensione acquisivit: pylorus, constrictione cessante, mollis & amplus evasit. Ventriculo magis in aprium deducto, vidi partem sinistram sesqui digiti distantia à stomacho pertinaciter constrictam, unde ventriculus quasi ex duobus compositus apparuit: Portio hæc trans constrictionem angustior, carnosior, & rugosior erat: ibi quoque foris inflammationis vestigia videbantur: relaxata hac constrictione partem cum dextra parte amplitudinem & superficiem acquisivit. Intestina statum plena erant, ac imprimis in ileo radicum frustula per tunicas translucebant: corrugabantur subinde, minora evadebant ac valde lente movebantur. Cecum amplum lacurum, tensum à contractione non advertenter facta minus & dutissimum, instar cartilaginis, evasit. In illo vidi maculas & stria minutas albas, ac si venis lacteis præditum esset. In omnibus apparuerunt foris vestigia inflammationis. Hinc inde quoque in illorum superficie, maculas quasdam latiusculas albas albastrulorum promissulas, sub quibus glandulæ intestinales, reperi. Hepar splendide rubuit: Vesicula fellis bile plena erat ac si ne guttulam bilis effudisset: erat vitellina. Lien satutate rubicundus videbatur. In mesenterio nullum vitium observavi. Renes pro animalis magnitudine majores: Carunculæ papillares rubræ. In pelvi parum utinæ aderat. Vesica vacua fuit.

Diaphragma in inspiratione corrugabatur in ambitu carnosio, & fibræ crassæ carnosæ veluti musculi lumbricales protuberabant; centrum verò nervosum convexum reddebatur; in expiratione planum totum evadebat. Ad latus reiecto ventriculo, in crure diaphragmatis, dum inspirationem auspicabatur, vidi illud rugosus fieri, ne admodum interiorum se movere, quod in animalibus vegetioribus accuratus observandum. Post denudationem viscerum imi ventris ferè ad septimam horam matutinam respiratio perduravit, cum cordis motu, ita tamen ut respiratio sæpe diu intermitteret, ac demum rediret post plures cordis pulsationes sua sponte, quandoque puncto centro nerveo. Sæpè magno rictu os aperuit ac aërem captavit. Vibrationem diaphragmatis in hac lupa non observavi. E mortua illa pectus aperui: Pulmones albicantes erant, & aëre pleni. Cordis ventriculi ambo sanguine turgidi, ut & venæ cavæ & ambobus ventriculis emanavit sanguis copiosè, veluti liquor aqueus, qui brevi in grumos splendide rubescences concrevit sui prorsus similes: neque in cordis ventriculis, neque in vasis majoribus vel minorem grumulum inventi. Os spumâ albâ plenum fuit. Gula longior quadrante ulnæ, indicis latior multum muci subflavi & spumosi continuit; prope laryngem hæsit frustulum radiis non maceratz; deterfis mucos & spumâ sub larynge plurimæ glandulæ minutissimis osculis hiantes, non ab aëne inflatz, apparuerunt: similes in reliquo ductu observavi usque ad stomachum: quæ magis conspicuæ evaserunt, illâ per biduum in aqua macera-

maceratâ. Inflammationis vestigium apparuit læulentum in principio, ubi larynx incumbit & sub larynge, quam portionem inter intrudendum radices digito attrectaveram: præterea etiam in reliquo ejus ductu hinc inde rubor aliquis sparsim occurrit.

Gulâ separatâ ventriculus statim subsidit, ac dimidia propè parte minor seu angustior evasit. Continuit præter radicem non maceratarum frustula pauca, scil. vix sextam ingestorum partem, mucum flavum turbidum, in antro pylori flaviores fereque clarum & pellucidum. Ablatis contentis totus anfractuosus erat, inflammatus maximè in fundo; ad latera minus; circa stomachum magis quàm in latere & magis in sinistra parte inferiori, quàm in dextra. Antrum pylori non inflammatum erat, excepto limbo versus ventriculum spectante, qui levicule quoque inflammatus erat. Intestina duas ulgas longa erant, A pyloro ad quadrantem ulnæ mucus flavus apparuit, eo deterso, minus inflammatum vidi: postea ad quadrantem ulnæ chylus mucosus, crassus, turbidus, minus, flavus cum aliquot vermibus brevibus & latis continebatur, cum pauculis radicum frustulis: hinc ultra ulnam dimidiam continebantur plura frustula radicum, tum maceratarum, tum non maceratarum, cum mucu atro rubescente: in his majora, ampliora & conspectiora signa inflammationis apparuerunt. In reliquo ductu usque ad valvulam in extremo ilei, hujus mucu atro virescentis major copia, ut & radicum, aderat. Intestina summo opere inflammata fuerunt, imo jam atro rubescentia erant, maximè area glandulosa, 3. digitos longa & digito latior; hoc quoque intestinum etiam dissectum & per bidentum aquâ maceratum, retinuit suas plieas transversas, ac si fortissime contractum fuisset: Ubique major copia radicum detinebatur, ibi intensior & amplior inflammatio in conspectum venit, quod imprimis circa ilei finem ad ulnæ dimidiæ longitudinem conspiciebatur.

A pyloro ad valvulam in fine ilei, quindecim rotundas & duas oblongas areolas glandulosas numeravi, quæ per bidentum aquâ intestinalis maceratis omnique mucu & truncâ crustacâ sublatis, tum foris tum intus admodum conspicuæ erant: quædam illarum atro rubescentes erant maximè in porzione intestinorum inferiorum, ubi plura radicum frustula & diutius decerata fuerunt, ob ilei ibidem contractionem.

Cæcum continuit mucum turbidum, album, chylosum: intus quoque inflammatum apparuit. Rectum continuit adhuc aliquid de radicibus cum mucu atro virescente, copioso, turbido: Anfractuosum, inflammatum intensè usque ad extremum pedicem.

Cerebri sinus omnes sanguine atro rubescente grumoso impleti erant: talem sanguinem quoque reperi in basi cranij, ibi ubi rete mirabile detinetur.

Ventriculi omnes mundissimi erant. Abscissa modulla spinali in superficie apparuerunt macule rubæ.

Abrasâ runicâ crustacæâ intestinorum, manifeste videre potui glandulas, non illi sed netæ membranæ insculptas esse.

Ductus thoracicus lymphâ plenus erat, absque ulla chyli mixtura, fortè quia nimis tarde in illum inquisivi.

Tum temporis Donefchingæ, ob commissionem quandam, ut vocant, plures viri illustres ac literati aderant, sermoque de cicutz viribus non semel fiebat. Cum ex Clem. Bodæi à Stapel ad lib. 6. Histor. Plant. Theophr. cap. 17. commentario retulissem, Cicutam in Batavis non adeò lethalem esse, quia crescat sub Zonâ frigida & ventis diffletur, sequentia subnectere volui; eoque magis, cum clima, cicutz viras non tollere puraverim, & plantæ virulentissimæ in locis frigidissimis, ex gr. Thora, Napellus, aliaque crescant, non minùs damnosa illis, quæ in calidis regionibus nascuntur.

Generosus Dominus Baro de Blittersdorff, Donefchingæ 6. Junij 1677. narravit mihi, in agro seu Ducatu Juliacensi magnum proventum esse Cicutæ aquaticæ, crescentis ad margines lacuum & fossarum arcium; ejus frondes, si anseres juniores decerpant, procius illos in gyrum circumagi & brevi emori: atque hujus causa illam ab agricolis diligentet exstirpati.

#### De Curatione post Cicutam assumptam.

Prolixius fui inquirendo in vires Cicutæ tum aquaticæ tum terrestres, ut invenirem indicationes certas & utiles ad debellandum hostem intra corpus admissum prope inter necinum, nisi maruro auxilio succurratur. Rationibus & experimentis existimo me deprehendisse, Cicutam calidam & acrem esse, suisque aculeis membranam nerveam potissimum ventriculi ferisse, ac fibras ejus circulares, membranæ arctissimæ fibrillis nervis con-

junctas, ad violentam contractionem irritasse; tum ob vellicationis vehementiam, tum ob contractionis atrocitatem, maxime circa orificia ventriculi, ubi nervi insigniores apparent, & Præsidem systematis nervosi in furorem actum, unde convulsiones; & cor in consensum raptum fuisse; unde plurima mortis imago apparuerit, imo pueri enecati fuerint, & puellæ expulso hoste imminentem mortem vix evaserint. Ut hac de re certius, aut saltem verisimilins aliquid statueri possem aliorum venenorum tum vegetabilium experimenta & ob-

servationes, tum Amicorum, tum proprias ad-  
jungi, & quasi in subsidium vocari, ex quibus  
didici propè eadem ratione ventriculum afflic-  
tissimè, ac sèrè eodem ordine symptomata produxisse. Re-  
tinnii generale nomen acrimoniz, cum scirem &  
Alkalina, ut vocant, & acida tam volatilia quàm  
fixa, irritandi & vellicandi membranam nervæam  
vi valere, ac hos tumores instituire posse, atque  
sufficere ratus sum, obtusâ cujuslibet veneni acrimo-  
niæ & sublatò hoste symptomata cessatura, ac  
hominem è præsentia vitæ periculo vindicatum iri.  
Tum cicuta tum alia ipsi, similia rubificantibus,  
vesicatoriis, erodentibus & putrefaciendis affini-  
bus per me dici possunt, à quibus quoque non  
multum differre puto, quævis in ventriculo &  
intestinis nunquam vesicas, raro ulcera & cru-  
stas, rarissimè integrum sphacelum, ut in cure,  
producant, nam ita cum tunica crustacea compa-  
ratum est, ut non facile, necunquè nervæa im-  
pense vellicetur, ab illa abscedat atque in vesicam  
atrollatur; deinde semper humida est, ut etiam  
ferocissimorum venenorum aculeos aliquò modo  
obundat, & continue magna copia, maximè ner-  
væa valde irritata, novum humorem è massa san-  
guinea recipit, ut non raro illa, imprimis si in mi-  
nore quantitate assumpta fuerint, aut imbecilliora  
sint, superet.

Indicationes igitur erunt clementer quantocunq;  
ventriculo educendam, ejus acrimoniam infringend-  
dam, spiritus vitales consumptos à vehementia  
symptomatum instaurandos, aut ob motum san-  
guinis varium, vel interceptum oppressos excitandos,  
labem ventriculo vel intestinis impressam si-  
ve infirmam, siue denudatam membranæ ner-  
væ, siue exulceratam sit emendandam & vires lau-  
dabili victus ratione restituendas & conservandas  
esse. His sequenti methodo satisfaciendum esse vi-  
deatur.

Cicuta breviorè, tutiorè & certiorè via extur-  
babitur è ventriculo. Vomitu concitatio; per am-  
bigas longas purgantibus educeretur non sine pe-  
riculo, dum afflicto ægio ob ventriculi cruciatum  
jam in viæntes, nova afflictio adderetur, hoste ad  
intestina pulso, quibus non minùs infestus esset,  
quàm ventriculo atque illorum quadam minùs ejus  
præsentiam tolerarent, utpote teneriora & ipsamet  
exquisitissimò sensu prædita. Idquè ante omnium  
aliorum medicamentorum usum faciendum est, ne  
virulentia cicutæ acuatè ventriculus irritatus exas-  
peretur, cicuta, aut fermentum stomachi illius suc-  
co imbutum ad intestina, & chylo permixtum ad  
massam sanguineam perveniat. Hoc suadere vide-  
tur Diofcor. de Alexipharm. cap. 11. *Καμψάκη, ἢ 3' ὡς  
τοῦ δ' αὖτε, διὰ τὸν ἐμπερισταλὸν χυμὸν ἐκβάλλει.* Inter  
initia, uti in reliquis sc. Venenis, illam scilicet. Cien-  
tium vomitu excutimus Cui assensum quoque Aët.  
Tetrab. 4. Serm. 1. c. p. 63. Optimum quod occurrit  
in Ardoyn. Sant. 17. 3. cap. 61. de curatione cicutæ ab-  
sintipic, est, quod ex Albucasi excerptum, fessilanter  
vomitu movendum esse: cætera consula sunt &  
forè minùs tuta, maximè interpestive in usum du-  
ctæ. Clem. Sennert. Pract. lib. 6. pag. 7. cap. 6. Alexi-  
pharmacis vomitorum præminere jubet. Fr. Joel.  
Operat. tom. 2. lib. 1. sect. 1. curationem symptomatu-  
rum à cicutæ factorum esse subitum revomitionem  
scribit.

Verùm cum cicuta intra ventriculum admissa  
Epilepsiam producat, ut Pueris & puellis evenit,  
atque alius quoque contingere possit vomitoria ex  
sententia Nobil. Ludov. Septal. Animad. & Caut.  
Medic. lib. 6. par. 30. non tota forènt: Ita namque

illè: Cave ne in paroxysmo Epileptico vomitum  
provoces; vidi enim aliquos in invasione hoc ten-  
tantes, scriptorum quorundam autoritate ductos,  
præcipi: em in mortem duxisse: ex violento enim  
illo motu, magis repleto capite, ac concitata ma-  
teriâ in capite existente, ad perfectam obstruc-  
tionem faciendam: deducunt, unde apoplexia seorsum  
solet. Clarissim. Domini Frider. Hoffmann. Meth.  
Med. lib. 1. cap. 9. quoque illa improbat, etiam si  
epilepsia per consensum ventriculi fiat: & licet  
extra paroxysmum concedere videatur, vix tamen  
ex illorum mente exhiberi poterunt, cum, ut in  
his Pueris fiebat, paroxysmi vel continui sint,  
vel brevissimis intervallis invadant. Verùm hæc  
tentari non sunt, ut Vomitoria prohibere possint;  
nam Septalii sententia quamlibet epilepsiam perio-  
dicam respicere videtur, etiam illam cujus focus  
intra cranium absconditus est; deinde niti vide-  
tur falsè & jam à plurimis explosâ opinione, illam  
scilicet oriri obstruâis cerebri ventriculis, commo-  
tisque humoribus à violenta agitatione, etiam ca-  
pitis, à vomitoriis facta, ventriculos cerebri po-  
nitus facile obstrui, & apoplexiam accessuri.  
Præterea dum vomitoria ad cicutam ex ventricu-  
lo excutiendam exhibentur, non inveteratæ epi-  
lepsie, aut quæ alias radices egit, ac jam plurimis  
paroxysmis ægros defatigavit, sed recenti oppo-  
nuntur: denique causam proximam & primariam  
è ventriculo eliminant, quâ sublatâ epileptici in-  
sultus protinus, aut paulo post imminuuntur, ac  
brevis penitus cessant. Atque hanc vomitoriorum  
in hoc casu necessitatem & fructum non solum  
ratio suadet, sed quoque experientia probat:  
Catharina enim & Maria Mæderin, Christi-  
nam Gräfin, Filiam Martini Mulleri & duas Fi-  
lias Georgii Mæderi vomitus tum à præsentè mor-  
te, tam ad insulubres epileptici protinus vindi-  
cavit: dum pueri, quibus vomitus, quamvis ad  
illam stimulabantur, non promotus fuit, ob ve-  
hementiam & diurnitatem paroxysmorum epi-  
lepticorum extincti fuerunt, qui proculdubio li-  
berari potuissent à morte, si eadum cicutæ ex-  
cretio, quam natura molebat, vomitoriis faci-  
litata ab artis medicæ perito tempestive fuisset.  
Ipse Santorellus Anti-Prax. lib. 21. cap. 10. quem  
pio se Dom. Hoffmann. lib. cap. allegat, hæc sen-  
tentia faver, ac summo per os veneròd. vomitu-  
m suadet, & paulò inferius citiorem illorum u-  
sum dicit & magis commodum, quia promptius ve-  
nenum extrahatur. Vomitus tempestivi Arsenico  
inglutito profuerunt duobus puellis hist. 1. puero  
& puello hist. 10. Juvenex Fabr. Lyne. hist. 11.  
Item Mercurio sublimato ingesto hist. 3. supra re-  
centis: & nemo non practicum suique deque  
habitis convulsionibus vomitoria commendat &  
si casus ferat, illa propinat post assumptam venenâ:  
atque usus docuit quo citius dabatur celeritatem  
& firmiterem valetudinem restituisse: Si verò  
properatum fuit ad alexipharmaca, accelerabant  
mors, ut puello evenit hist. 6. de Arsenico: aut  
morbus cum symptomatibus prolongabatur ut  
eisdem contingit apud Nobilissim. Tamarum de  
Guldenlee lib. 7. Med. cas. 4. qui post comestâ  
rad. cicutæ, loco petroselinî, cum bubula co-  
ctas, vinum abstinches bibit, unde cordis angus-  
tia, dyspnœa, vertigo tenebrosa, singulus &  
liquandiu mitigata, recruduerunt, accedentibus  
strangulationis metu & virum exolitione: cui  
postea mox vomitus movit & alexipharmaca  
dedit, ut non efficere potuit, quin ad tertium  
mensẽ cordis angustia & dyspnœa perdurarent.

Cause legendi & imitandi omnino videntur illi, qui promiscue alexipharmaca contra cicute virulentiam concervant atque ante evacuationum usum, seu nondum expulsa & ventriculo cicuta, exhibent: Vinum generosum plures suadent, inter quos est etiam Scribon. Larg. cap. 47. Santes Andromas & alii, ex quibus sua compilavit, cum tamen etiam ipso Galeno libr. 3. de Simplic. Medicin. Facultat. cap. 20. & Plinio histor. Natural. libr. 25. cap. 13. testibus cum vino pota citius e-neccet, & ut Plinius loquitur irremediabilis existimetur: putant quidem id fieri propterea quod cicute virus citius ad vitalia cum vino abstripitur, potius cicute acrimoniam à vino generoso intendi, ut magis posita in membranam nerveam ventriculi ferociat, existimo; quamvis non negem quoque celerius particulas, maxime si succus ejus in vino solvatur, quod veteres facere solebant, aut si radix vino maceretur, aut si jam radix in ventriculo emollita sit, cum vino ad massam sanguineam pervenire ac gravissima symptomata, præter consuetam, excitare. Agyptæ ventriculo suo quædam facientes, devoraturi turpis luctu causa venenum, non solum antequam illud ingerant, ventriculum & intestina contra ejus spicula muniant unduosis largiter epotis, sed quoque divericula querunt ac ventriculum vomitoriis exonerant, præmissis munimentis non fidentes. Non ita pridem audiivi à fide dignis hujusmodi rebus præcipue, cum præter morem vomitum differre cogere, in urili Orvietano suo, cum abominabili & detestanda arte misere periisse ac meritam penam temeritatis luisse. Vomitoria ventriculum ad cicute expulsionem adjuvantia, non necessum est, ut fortiter irritent & stimulent, cum jam aliis ad constrictionem à cicute pellectus sit. Etius & Albucaz. lib. cap. Aquam & oleum suadent: si tepida & larga manu, iteratis haustibus, plenis buccis ingerantur, vix magis laxantur, vomitus citius minoreque nixu sequitur, si malique quicquid cicute in ventriculo superest quasi ejaculari, nam pleno ventriculo, laxato stomacho, contractis etiam in medio ventriculi fibris circularibus leviculis, absque labore facillimeque vomitum in canibus & ranis fieri non semel vidi; nec semper ad hanc actionem absolvendam necessarium est, ut constrictionis exordium à pyloro ejusque antro, motu intestinorum peristaltico simili, fiat ac sensim progrediatur; quod non raro ventriculo prope vacuo vel ab humore, vel pharmaco irritato nonnulli magno coarctam, diaphragmatis vibratione in subsidium veniente, evocare solet. Ad vomitum ciendum in hoc casu valent juscula pingua, decoctum hordei cum oleo simpliciter, ut non opus sit oleum irinum permiscere, aqua tepida cum butyro, lac cum oleo & butyro, flocerum aut aqua dulcorum: Cerevisia cum oleo & butyro. Oleum amygdal. d. rec. sine igne expressum haustus suaviores reddit: olei lini & nucis per se nauseabunda sunt, commodius ad vomitum faciendum aqua tepida, decocto lacti hordei, cerevisiæ aut jusculis ejusdem generis permiscetur: quæ unà operâ cicute acrimoniam demulcent & obtundunt.

Haustibus istis tam diu pergendum donec omnis cicuta & ventriculo pulsa sit: admisceri possunt scilicet singulis libris oxymel. sq. 3 ij. Oxymell. squill. 3 i b. aut El. Diar. Fern. 3 ij. vel 3 iij. si tempus concedatur, nec ob symptomatum ferociam festinandum sit; cum aqua aut cocture coqui possunt rad. asar. beton. encumerummitar. aut cortic. virides sambuc. aneth. flor.

genist. persicor. semina. aneth. atripl. aliaque hujus generis. Fortiora non necessaria quoque sunt propterea, quia vomitus promptè sequitur, si modo opera derur, ut fibræ circularis gulæ & stomachi motui fibrarum circularium ventriculi inverso non resistent: quod scilicet imperatur, si solummodo aliquid deglutendum infundatur, unde theriaca aceto soluta, quinque pnellis vomitum movit, quæ aliâ enormem vomitum compescere solet: idem fecissent quævis alia potulenta, dum fibras gulæ & stomachi aliquo modo relaxant, libenterque impulsui motuique ventriculi inverso cedant, adeo ut non necessum fuerit Patri Christianæ Infinitum tabacci arripere: ea tamen laus tabacco debetur quod appetitum hinc pnellæ reparetur, omnesque molestias sustulerit, tota nocte dormiverit & mane læta sanaque surrexerit. Si verò ventriculus his in expellendo adjutus voto non respondeat, & vomitus tardetur, ad fortiora vomitoria recurrendum esset ac præmissis liquoribus supra dictis tunc demum stimulari posset ulterius, Oxymell. Helleborat. Gelsem. 3 j. vel 3 i b. Oxysachar. Emet. 3 s. vel 3 vi. Gilla Theoph. Diaphragm. 1. aut simili cum joscuro aut alio liquore. Excellentiss. Domin. König in Histor. 3. de Mercur. Oxysach. Emet. puella cum fructu dedit, cum aliis mercurial. sublim. per se fortissimum irritans sit: Fabricius Hildanus antimoniatam profuiss. memorat. Clement. Beverovic. in Thesaur. de Sanit. conservat. lib. 3. cap. 20. scribit Feli à devorato arsenico pessime habenti frustulum tabacci cum cibocrurum fuisse, unde vomitu excitato viva manserit.

Si vero propter Epilepsiam à cicuta excitatam diutius cocontinuantem, aut brevissimis intervallis paroxysmis increbescentibus evacuationem seu expulsionem ex ventriculo moliri non liceat, Præsens systematis nervosi à tumulibus istis averteendus & aberrans in viam reducendus erit, illis quæ in paroxysmis epilepticis & hysterica suffocatione vulgo dicta adhiberi solent: qualia sunt quæ sensus veluti topiis expetgefaciunt. Naribus admoveantur acrimoniam aliquam spirantia, ex herb. satoreiz, puleg. rutæ, majoranæ, hyssop. flor. lavend. ruræ, sem. angelic. levistic. sinap. bacc. Laur. Juniper. piper. caryophyll. Assa fetid. castor. & similibus parata, in nodulum ligata ac aceto aut vino madefacta: Balsamum & oleum succin. rut. Præstans ad hanc expetgefactionem est spirit. salis Armonici. Urinof. quem Exc. D.D. Sylv. semper secum gestasse aiunt, ut in tepentibus hujusmodi casibus ad manum esset. Hujusmodi topica naribus quidem prope admoveo, neutiquam verò illis nares inungi, aut profundius indo, cum cessante paroxysmo illis, aut intrusa diu postea illis molestissima didicerim. Ancilla quædam ante aliquot annos ab hysterica convulsione rigida instar chidii humi prostrata jacebat, absque ullo respiratoris superstitis indicio, arctissime deoribus contractis, artibus prorsus inflexibilibus: frustra pila hysterica in pharmacopolio nostro prostrans ex assa fet. castor. sem. rut. angelic. ol. succin. & tereb. promp. confecta, naribus admovebatur; frustra corii & succioi fumus naribus imminebatur; à frictionibus, vellicationibus, compressionibus digitorum fortissima non magis movebatur, quam sine vita truncus: tandem incendi cremas sulphuratas, & dum fumum in nares adigo atque leviculis Libium ardente cremis attingo, inspirum edidit ac paulò post respiratioem ac mentem recuperavit, & congruis medicamentis

assumptis plene convalescit. Aliis quoque compertis paroxysmos epilepticos brevi finiri vel mitigari ut aquæ anti-epileptice inmodi possent, explicatis digitis, impium pollicibus à robusto & cordato, sive Præcis sua sponte ad saniora consilia sibi proclivis, sive ætate ratione invitatus fuerit. Dum hæc tentantur, ano supposito acia intrudantur ex sale gemmæ, alumine fuso, sapone, aut si tantum temporis concedatur ex spec. Logad. el. Hier. pier. Galen. sale cum mell. coct. Pareur quoque Clyster acris, quales Scribon. Larg. de compos. Med. cap. 47 adhibendos cicutæ comesta monet; propter parat possent ex aqua, melle, paulillo olei vel butyri & sale copiosiore quàm vulgaribus clysteribus immisceri solet: non semel experientia didici, sal, citra ullum purgans, liquoribus permixtum tam potenter alvum movisse, quam ullum aliud purgans, exceptis colocynthide, quæ tormina sava, & creco metaliorum, qui ditas convulsiones simul pepererunt. Si cicutæ visusenda motam permittat in aqua herb. cephalicæ cum herb. & sem. statim discutientibus coqui ac colaturæ Benedicte laxative pro Clystere addi possit, cum alijs, quæ utilia censebantur Supposito acia & clysteris motum peristalticum intestinorum sursum vertentem, deo loco proficiunt, unaque opera efficiunt ut minus arde ventriculi fibre circulares constringantur; non semel observari in vivorum sectione & in femina cui ab annis intestini putio extra abdomen nuda propendebat, intestinorum motum sursum deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel infera, etiam levicula illa pupugi stilo quodam, citra vulneris inflictionem. Dum hæc peraguntur opera danda quoque est, ut dentes à se invicem diducantur, tum ut facilius spilent, tum ne suffocentur ab illis quæ ut ventriculo ad fauces trans fuerint, quod ebrioso cuidam evenisse novi, qui in thodo mortuus repertus fuit ore & faucibus lordium plenissimis Id manibus facile paroxysmo declinante fieri potest, ut non opus sit clavibus, alijsve ferramentis ut effingeret: apertum teneatur dentibus ligno tenaci, aut bacillo glycyrrhizæ interposito, aut instrumento dilatatorio cum cochlea Clar. Dom. D. Johan. Scultet depicto in Armament. Chirurg. Tab. 9. Fig. 9.; aut speculo oris depicto Tab. II. Fig. 4. Utriusque utendi modum ante oculos ponit Tib. 36 Fig. 6. & 7 Specillo linguæ & maxilla inferior depressantur infusioles & attonis. donec cibum & potum faucibus indurum succientes degluerint. Si itaque vomituant, ut Jacobus Mederus, nihil tamen ejiciant, aut si deglutire nequeant, ut Matthias Graff, propter arctissimam gulæ contractam oriem dilatato ore Clar. Sculteti instrumento, aut de pressa lingua & maxilla inferiore Hydrælanæ tepidum siphonem, cui cannula incurva adpressæ sit, utque ultra epiglottidem intudi possit, injecturus quod hoc impulsu gulam, fibris circularibus laxatis & stomachum perumpet, ac cicutæ exitum quem jam ventriculus molitur, parabit & facilitabit. Ad hoc opus commodam diphendi siphonem æneum à Clar. D. m. Dom. Graef post l. d. Pancreat. depictum nullam ei & argenteæ maxime si lamina tensoris fr. facilius arterantur à dentibus, remotis instrumentis dilatatoriis ut postea inusiles sint, ut eventus infectioibus illis in crinibus tentatis. Vomitoris supradictis petgendum d. nec cicutæ omnis aut maximam partem ejecta sit, nullaque ejus in ventriculo superstitis signa supersint: si nullos tactus

alii tamen fastorem spilent, non angustur circa pectora, nec valde doleant; si esuriant ut Christina Græff, ad Alexipharmaca à Veteribus laudata progredendum erit. Antequam tamen hoc fiat Dioscorid. de Alexipharm. cap. 1. dejectiones faciendas monet, ut illa quæ ad intestina de cendunt, excernantur. Idem repetit Æt. Terr. 4. 5. m. l. cap. 23. Verum Pællæ sex non opus habebant amplius purgantibus postquam vomuerunt; nec fuisse necessarium est, cum aut pyl. ris cicutæ transitum non concedat, aut si forte aliquid cicutæ elapsum sit, clysteribus & suppositoriis supra dictis ad excretionem maturam adpositum sit. Si vero ex torminibus, ardore & inflammatione ventris aliquid in intestinis de cicutæ hæret, illam suppositoriis & Clysteribus mitioribus & potius enolentibus ad exclusionem alliciendum erit. Si omnino purgantia exigantur, solummodo mitiora convenient, scilicet syrup. ros. s. f. syrup. viol. C. f. syrup. de cichor. cum Rh. Elect. lenit. El. cathol. El. de ramanid. nullo modo autem danda potentius stimulantia ex Gialapp scammon. & similibus, neque uaque adeo bene fidelem aloerici.

Educta è ventriculo & intestinis Cicutæ omni vel maximam partem, Dioscorid. de Alexipharm. cap. 11. tum demum ac tunc purgare statim ad maximum & presentissimum auxilium vini generosi potum deveniendum e c monet. Eadem verbosius Ætius l. c. in sua transitu, Plinius H. N. l. 15. c. 13. Vini naturam excoficatoriam, priusquam perveniat aut, ut alia M. S. habent perveniat ad vitalia, remedio esse dixit presentis evacuantis. Scribonius Larg. de Compos. Med. c. 34. quoque vult adjuvari debere in huius vino meto, subinde quàm plurimo, calido & per se & cum pipere & cum styrace potu, ac clysters demum vini meri & lactis interpolari potest subjungit. Plinius vinum excoficatorium commendat procul dubio, quia Cicutam cum plurius alijs frigefaciens tem credidit, Idque non obscure dum sanguinem spiliando succum ex semine paratum necesse asserit. In eodem errore magna turba hac usque versata est, quæ calida eo solo nomine cum vino sumenda deprecatur. Verum cum multis rationibus & experimentis demonstratum sit Cicutam calidam esse, vinum alio modo quam calefaciendo jurabit: & credibile mihi videtur vinum eliminata cicutæ ex ventriculo ideo auxilium presentissimum esse, quia citrillu spiritus ex afflictione vehementissima deperditos reparat, oppressos ob circulationem sanguinis, nunc impeditam, nunc confusissimam, suscitæ atque hac ratione præ alijs vires instaurat. Vinum ita efficax præstabit adminis ex Dioscorid. traditione l. c. absinthio, pipere item castoreo, mentha, amomo, styrace, sem. uricæ ræ, folijs hani, succ. laserpitii: & si quæ alia sint hujus sortis à Dioscoridis sequacibus superaddita. Antidoti magnæ Theriacæ, Mithridaticæ, El. Orricæ proderunt quatenus dissolvunt sanguinem & lympham ob coactum post cicutam sursum, circulari motu intercepit, alicubi stagnantes, ac propterea virum aliquam oppressionem & litudinem aliaque molestias post se relinquentes. Hæc pertinent aquæ cordiæ ex aq. borag. bugloss. scabios. card. bened. angelic. cinamom. aliisque paratæ, add. conf. alk. conf. de hyacinth. ol. citr. d. lap. bez. margarit. oculis cancr. tab. man. Chir. perlat. similis quoque paratæ item Tincturæ B-zoad Cl. J. an. Dan. Ludov. Cl. J. h. Michael. aliqueque duntaxat Viduas comesta in aqua Cicutaria, altero die juxta circa meridiem hæc potio propinata.

℞ Aq. charrefol. card. ben. an. ʒiſs. aq. Antid. Math. ʒſs. Theriac. Andr. ver. Dij. ſal. C. C. volat. drach. 8. Mixt. ſimpl. ʒſs. ſyr. de ſcond. q. ſ. ad dulced. in Digreſſione Febr. Exc. D. Sim. Paul. Cl. Fr. Joſ. aq. juniper. per deſcenſ. ʒv. commendat & poſtea Antidotos, aut pulv. gentian. ʒj. aut ol. angelic. d. gr. vii. cum vino.

Hic non prætereundum videtur Conſilium Santorelli. Antipræx. l. 21. c. 16. qui poſtquam in præpreſſis ſudorifera non improbat, ſi venenam ad partes penitiores ſeſe inſinuat; & præcili veneno recenter ſumpto pingua lac, oleum, butyrum & pingua quæque aſſumpta, ſubjungit demum Juvare aquam calidam potam & lac, quid habeant vim exſtinguendi calorem, quem ut plurimum venena ſolent inferre. Et huc quoque Dioſcor. l. c. de Alexiph. collimare videtur, nam Vinum, ceu præſantiſſimum auxilium, præſentibus per intervalla dare jubet ac inter hæc ægerſtibus lac aſinum aut vaccinum quod Cl. Sarracen. in not. ex Paulo addit, potui datum proſuturum ait. Eadem Et. l. c. ſiſis inferunt. Scribon. l. c. verba æque conſiderari digna ſunt; poſtquam enim in initiis ſubinde vino mero quàm plurimum calido adjuvando dixit, protinus huic ſententiæ hæc adjungit. Atqui maxime prodeſt lac aſinum datum: ſi minus, ſc. in promptu ſit, vaccinum, aut quodlibet. Dioſcoridi alii quoque conſentiant, quos omnes huſus inferere non libet: quicunque demum ſint, ſi Dioſcoridis & Scribonii ſententiæ ipſique veritati accedere velint, ſi unquam cicuræ viſus probe expendierint, aut ſi unquam ægro qui cicuram ingluſierit, adſtiterint, deprebendent illa vomitu rejecta, & viribus à vino mero ſolo, aut aliis admixtis potentiore reddito, vel ab aquis cordialibus reſtauratis, labem ſeu ardorem quandoque inflammatorum ventriculi demulcendum & emendandum eſſe, quod lac optime præſtat, quod ratione ſubſtantie butyroſæ demulcet, ratione ſeri abſtergit & ratione caſeolæ refrigerat & roborat. Lactis ultiores laudes ad hos effectus præſtandos accommodas, ejuſque differentias ex Gal. Dioſcor. Ariſt. aliisque collectas atque rationibus confirmatas ſi quis planius noſcere aveat. conſult. Nob. D. Melch. Schæz de Aliment. Facult. l. 3. c. 7. p. 751. & ſeq.

Illud ramen diligenter obſervandum puto, Lac non ſtatim poſt vinum hauſtum bibendum, nec lacti puto protinus vinum ſuper ingendum, tum hunc ob errorem protinus lac grumefceret, unde novæ turbæ metuendæ ſortent, quas experiantur illi, qui lactis poti podagram exſtirpare, aut mitigare amittunt. Ad ardorem ventriculi à cicura impreſſa prodeſſent quoque juſcula alterata herbis reſcentibus horrag, bugloſſi, portulacæ, endiv. flor. bellid. min. acetof. hiſpan. & ſimilibus. Bibant mane & vespere duabus horis, ante ætuum hauſtum ʒiſs. vel ʒv. calide. Commode addi poſſent crem. hordei, quod nunc contra eſſi hypochondriacam unner: paratur. ex bordei mundati M. iv. cum ſufficiente quantitate aque fontanæ lenito calore; donec in pulvem hordeum præſuſus diſſolvatur, colatur & exprimitur fortiter: quantum v. vel vi. cochlearia capiunt, juſculi alterari doſi permittentur: quandoque butyri recentis drachmæ duæ vel triæ admiſcantur. Alia attemperantia & demulcentia ad ardorem & ſuperficiariam inflammationem ventriculi aufferendam ſuadere

poſſent, ſcilicet decocta, julepi, electuaria, pulveres, tabellæ, aut ſi alia forma placeret aliter conſecta medicamenta: Verum quoniam præcipue hic ventriculus à cicuta male muſtatus tractandus ſit, ſarque omnia ſere medicamenta ſtomachum lædant & mali, certè ſtomacho non uſque adeo graſi ſucci ſint, ut Aſclepiades apud Celi. in præſat. l. v. de medic. loquitur, nallum potius omnem curam ad viſtus rationem, ſeu ad alimenta medicamentofa, ut nunc vocant, curam transferre quàm medicamentis labem hanc emaculare, maxime apud illos quorum valerudinem antea neque deſidia neque luxuria viciavit, coque magis quia multiplex iſta medicina neque olim neque apud alias gentes neceſſaria, vix aliquot ſeneſcentis principia perducit, ut idem Celi. in præſat. l. i. de Medic. bene judicat. Certe poſtquam ſex iſtæ Puellæ omnem radicis cicutæ ſaburram evomuerunt, de medicamentis nequidem cogitatum fuit: convaleverunt autem integre poſtquam ad conſuetam viſtus rationem redierunt, ve e bantur nimirum juſculus & pulſtus ex lacte juſculi avenaceis, hordeaceis piſorum, ex pane primum in butyro frixo & aqua cocta; poſtis farinaceis, raro pane aut ovis admixtis & in aqua elixis, rarius butyro conditis; braſſica capitata & radicibus raparum muria conditis: Vix ſemel in ſeptimana canibus illiſque ſuillis ſale conditis & fumo conditis poriebantur: Potus erat aqua: vinum ab illarem mentis exulavit: delitias enim iſtas ſibi Patres & ſubinde matres ſervabant. Cupedias aſſimileſcent poma & pyraſſicata, præ omnibus ſacharatis, ſi illorum compotes aliquando fieri potuiſſent. Poſt demulcentia & attemperantia, ſi odor ventriculi permaſſerit, ægi una atque altera hora à paſtu abſtinerent, neque ab anxietate ullæ induciæ darentur donec aſſumpta evomiſſent, vix dubitandum eſſet de denudatione nimia atri pylori, imo non levis ſuſpicio oboriretur exulcerationis alicujus, quæ neglecta in peſſimæ noxæ ulcus degeneraret, ut plerumque ſit partibus nervoſis exeiſis, maxime ſi continue ab humore ſuperfluo madefcant. In hoc caſu ſine ægronomia ſiccantiſſa ſalutaria præ aliis competeri: Ante aliquot annos Amicus quidam aphthiſ ſancium, gulæ ipſuſque ventriculi aliquandiu aſſigebatur: vix alimenta miſiſſima ore ferebat, ægerime deglutiebat, videbaturque bolo inglutito quaſi ſerum candens per gulam traduci atque cibo intra ventriculum admiſſo ardor quem alias continue ſentiebat ſummopere augebatur. Suaveram tunc pulverem ex bolo armen. terr. ſig. unic. ſoſſ. C. C. ſem. portul. cum æquali pondere ſachar. pehid. mixtum, de quo ſæpiſſime lingebat: portionem hujus pulveris cum duabus partibus butyri permixcuit, & ſubinde fruſtulum nucis avellane magnitudine in ore liquatum deglutivit: quibus aliquandiu continuatis, ab aphthiſ liberatus fuit. Similia quoque ita aſſiſto ventriculo prodeſſent: addi illis inſuper poſſet Pulv. Antidotic. Poterit probe à nitro-mundatus. In magno ardore ſubinde lambere poſſet mucilaginem ſem. cydon. maj. arboreſc. rad. alth. conſolid. major. cum aq. nymphet, lactucæ, borrag. aut ſimili extractum, addito pau. ſachar. alb. Viſtus ratio ſit ex cibis boni ſucci & facilis digeſtionis, quibus cum coqui poſſent herbe recentes aſſum attemperantes, quales ſunt borrago, bugloſſa, acetofa Hiſp. portulaca, ſempervivum maj. ſi. nympha. aut ſanguinem depurantes, quales ſunt charrefolium, pimpinell. flor. bellid. min. nolleim dum ſuſpi-



cio ulceris adesset cibos condire aromaribus, multo minus aceto, succo citr. aut similibus. Neque etiam vinum concederem: magis prodesse Decoct. hord. cum passul. sem. anil. aut Decoct. rad. Chin. cassia. lign. visc. quera. Post comestam cicutam quidam morum commendant, verum quia hoc consilium falsa hypothesi nititur, nempe à cicuta sanguinem congelatum motu incalescere ac dissolvi, unde Crito Socratem à loquutione fortiore prohibuit, ne mortem tardaret, motum non imperarem, totque minus quia dum cicuta adhuc intra ventriculam hospitat, ita plerumque affliguntur ut vix ad motum persuaderi possint; quia denique manifeste vires optime reparantur quiete, hoc præceptum diæreticum non magni faciendum, nec ægros etiam à somno arcendos existimo: eoque magis quia omnibus puellis profuit: sola Catharina Medici 24. horis. u. magno vitæ discrimine versabatur, quod tamen ipsum non plene somno adscribendum est, sed forte aliquibus radicis reliquis in ventriculo tribuendum videtur, nam illis elapsis, cicuta subacta, postea optime habuit, nulla vigiliarum aut motus habita ratione.

Quomodo dympnea diuturna cicute virulentia producta, prout ab Exc. D. Timæo l. 7. cap. 4. aut dementia item chronica à Dalechampio not. ad Plin. H. N. l. 25. c. 13. observata, aliave morbi diuturni cu-

ranti sint nolui his inferere, quia animus erat habitaneis affectibus à cicuta illarum medelam ostendere. Erassmus illi chronici peculiariter inquisitionem dispositionum præviarum, causæ proximæ & locorum affectuum postulat atque plerumque nullum commercium cum cicuta amplius habere. Morbi diuturni Medico Practico tempus & otium suppeditabunt accuratius omnia pensitandi, auxiliūque opportunum inveniendi. Curationum methodicarum propriarum exempla his generalibus subjicere debuisset: nullæ h'c in oris sunt Annæ Athenienses, aut Fœminæ Batavæ quas libido cicutæ vescendi titillaret, sive famis compescenda, sive somni conciliandi causa. Rarissime & non nisi per eiretem cicuta ingeritur & plerumque non nisi à prole rustica; adhuc rarius his in casibus opem medicam postulante, maxime in locis ab urbibus distitis, cuiusmodi sunt ubi cicutæ aliquæ proveniunt. Jam aliquo tempore captavi occasionem in huius periculum faciendi: prout ausus sum ipsa cicutam, virulentia ejus indagande causâ, ingerere, verum hæc tanquam votis meis excidit: in retea commodam non negligam & si quid memorabile competero illud publico non invidbo. Inter hæc de Cicuta Aquatica scripta sufficiant. *Hæc Clariss. Iob. Jac. Wepferus Dolissimus de Cicuta aquatica tractat.*

## OBSERVATIO IV.

*De Noxis Cicutæ terrestris. Ex Epistola ad Virum Celebratissimum Iob. Jac. Wepferum, Archiatrum Scafsburgi.*

Quotiescunque tua in me merita rumino, rumino autem sæpius, nihil cordi solet esse æquè ac grati animi tessera, qua favorem tuum porro mihi promittere ausim: hujus vices si sustinere jubebis præsentem de cicutæ terrestris noxâ historiam, hæc quantum non menti moræ gaudij accedet & solatij, cum norim tibi probatam, nec alijs valdopere displicituram: Ansam autem meditationi isti, tua suggestit cicuta, cruciatorum ore jam decantatissima, cui levicula, quæ tum ex succo terrestris vulpeculis, & porcellis Indicis exhibitio nerarum, addi voluisti: his prolixius illustrandis, cum experimenta deinceps necessaria viderem elapsa hæc rempestare, ad herbæ vires noviter explorandas me accinxi: De effectibus ipsis, ubi singula enarravero, Excellent. T. judicium feret facillè, subjungam & ego ratiocinia aliquot, quæ autem prodromi loco tantisper haberi velim, dum iteratis, ubi Deus vitam anno imminere concesserit experimentis plonius de plantæ hujus forsan & aliarum genio differere possim.

Die 15 Octobris. Cani vetulæ mediocris magnitudinis hora 2. antemeridianâ. sæci Cicutæ 3ß. præter propter infudimus, à quo mox salivare, toto corpore eestromiscere, tandemque vomere cepit: Horâ primâ pomeridianâ languescenni deuo 3i citroter infudimus, unde mox ejulabat, & circa præcordia vehementer opprimebatur diaphragmatis iteratâ succussione, ad attractum evidenti, respiratio rarâ & anhelâ: salivavit insuper & tremuit vehementius: scsquihorâ post evomuit mucum viridem spississimum satis copiosè, istinc tamen melius non habuit, oppressione graviter persistente, minxit inde, & sub vesperam languidus omnino, pedibus insistere nequit: caput cum erigeretur: instar remulenti jactitavit, moxque concidit, insultibus spasmodicis in utroque pede anteriore & posteriore, ut & aure sinistra, conspicuis, tandem noctu interiit. Instructa sectione in abdomine inflati nihil compertuit, præter vesicam urinariam & fellæ, quarum suo humore utraque rursus, vasa intestinorum tenuium seriem, duodenum præprimis perreptantia rutilo suo colore intensè oculos refecerunt: Venter parvulus, fibrarum valide corrugatarum faciem, exteriùs jam ostendit, quæ fundi parre superiore incisâ rubicundæ insuper videbantur mucosâ viscido heile illis hærente, cum succi viridis coagulati reliquijs, inrer ipsarum intersticia detentis: Intestini duodeni facies interna, spithamæ longitudine tota inflammata & cruore fere perfusa, jejuni verò & ilei externa livescens, intus mucum sanguinolentum copiosissime exhibuit: in quo vermiculi exigui numero se stabulantur, ceu in nido ipsis destinato, crassius ab ista labe liberis magis existentibus. Pulmonum lobus dexter maculis ex rubro li-

vescentibus, varie inquinatus fuit, disseffus verò vesículas à sanguine tenui effuso rubentes exhibuit, sinistro in eolumi: cordis thalamus dexter cum auricula ad actum molleculas sanguinem fluidam subatrum, ejusmodi ex alijs etiam vasis effluit, continuit. Cerebri facies elegans, glandulæ præprimis pinealis subrubentis, quam vasa sangulifera artificiose amplectebantur: In ventriculis anterioribus feri copia idonea deprehenta fuit, sanguinis verò extravasati nihil.

Die 25. ejusdem D. Lisenr. Schorkopff Hildesienf. & D. Nabel Heidelberg. alij Cani succi ejusdem recenter expressi 3 ij. præter propter exhibuerunt, post horæ quadrantem murmura & rugitus vehementiores audiverunt, cerros fermentescitæ indices: Hinc abdomen inflati & distendi cœpit, perque intervalla spasmodici insultus leviores suboriri, ejulavit juxta & frequenter minxit; ex uno loco in alium migrando, succedente motu cordis palpitante & diaphragmatis forti succussione: Sub vespertam cū accederem ei languenti 3 ij. circiter propinavi; à quibus contremiscere, angere & vehementer succuti incepit, cum insigni cordis palpiratione & abdominis rugitibus, inde copiose minxit, non tamen vomuit nec dejecit. Die insequente adhuc vixit sed languidus, nec qui diebus ante vehementer, latravit amplius: Hora 1. pomeridiana, ejusdem succi ad 3 ij. fese infudimus; à quibus eadem symptomata passus, est, nisi quod vomiturijuxta: Die altero abhinc succi ejusdem 3 iß. præter propter venæ jugulari siphone blande immisimus, unde cor palpitare vehementissime, canis totum corpus convelli, maxillas retrahere, totusque obrigescere cœpit, horæ autem circiter quadrante paulatim se recollegit & qui ante erebro & anhele, jam liberius respiravit, sibi que redditus tantisper obambulavit: cum deinceps 3. circiter blande injiceremus mashina confestim corruit & obriguit.

Cultro injecto cura præcipua fuit medijs & imi ventris, in hoc ventriculi & intestinorum vasa egregie rubebant, ipseque tantisper distentus, quum orificium superius incideretur, spumam fraulentam fermentescentem copiose exhibuit, qualem eum mucosanguinolento & succi particulis, fundum etiam continuit, plicis ejus corrugatis & aliquantum rubus: In duodeni ductu pariter aliqualis inflammatio, ac non tanta uti in priore: Vesicula fellis bile distenta & uterque ductus cum cysticus tum pancreaticus paruli: Tubuli bilarii ad vesicæ collum pergentes evidentes erant: cordis auriculam dextram, sere per cavam ascendentem infra hepar injecto, pulsum sæpius ingeminare vidimus; ipsammet verò, quamvis inde tumuerat, sanguine prorsus vacuum fuit, nonnisi in auricula & thalamo dextris, sæci coneteti reliquijs conspicuis: in pulmonum lobis maculæ rubræ heic illie conspicebantur, præprimis verò lobi dextri majoris superficies inferior 3 duas in longum latumque inflammata fuit, reliquis fere singulis, ubi incidebantur, virentibus, imò & succi particulas ostendentibus.

Die 28. ejusdem Cani Molosso 3 iß. circiter in venam jugularem injecimus, à quibus ejulare, cor palpitare & convelli cepit, inde aliquandiu defarigatus, semimortuus jacuit, respiratione nunc rara nunc erebra & anhele existente: Inde ad se paulatim rediit, caputque erectum huc illuc jactavit: semihora post lateris sinistri venæ pariter succi aliquid immischimus, & cor palpitavit vehementissime, misereque ejulavit, & abdomen succussus fuit, moribus spasmodicis in fascibus & collis musculis conspicuit: Tandem verò 3ß. circiter adhuc injecta eum sterore & anhelatione respiravit, ad mortis imperum, spumam sanguinolentam per os copiose reddidit, cordis pulsu longis intervallis recurrente: Abdomen incisum, ventriculus enim intestinis inflammatum exhibuit, imprimis vero sub finem cœci & initium instini crassi portio 3 ij. circiter longitudine distenta fuit, ut & vasa transparenter, maxime, & ob tenuitatem glandulæ solitarie elegantissime conspici possent: in utroque thoracis latere serum suberuentum fluctuavit: Pulmones flaccidi erant, eorumque facies exterior præsertim in lobis majoribus satis inflammata: ex aspera arteria spuma priori similis multa adhuc effluxit, ejusmodi etiam in ipsis pulmonum vesiculis quum insiderentur, idonea copia stillavit: Ventriculus sanguinis dexter, eum auricula sua admodum tursit, ex utrisque sanguis fluidus profluit: Remoto cranio & dura meningē; prope cerebellum ad sinuum latera, sanguis similis copiosissime qua data porta prorupit.

Die eodem, hora quinta pomeridiana caniculæ succi recentis 3 ij. præter propter exhibuimus, à quibus abdomen succuti, crebroque vomiturie incepit, donec hora post materiam satis copiose exerneret: hinc tamen melius non habuit, quin urgentibus oppressionibus temula incederet, tandemque pedibus insistere nequirit, vomuit inde iterum, minxit, tandemque temulenta corruit. In hujus interitibus, ventriculo & intestinis succum cicuræ pariter spumantem, & utrobique inflammationis musque cruenti hinc inde adherentis certissima vestigia vidimus: Pulmones quoque in diversis locis in:

inflammationibus & sanguine extravasato fœdabantur, cordis verò ventriculus uterque omni sanguine erat destitutus.

Die 29. ejusdem Porcello Indico semellæ succi ejusdem § j. circiter intrusimus, à qua præcedentibus cunctis moribus convulsivis illic spirare desit: In causam repentini interitus eum inquireremus, reperimus in aspera arteria succi reliquias cum sanguine extravasato in pulmonibus hic illie comparente: In abdomine mali nihil, grvida hæc erat binis fœtus, & partui quantum colligere licuit proxima.

Sub vespèram Porcello mari § j. præter propter propinavimus, à qua primum male non habuit, hora autem circiter post corrugabatur, & tremulos pedibus amplius insistere non valuit, vomit quoque sed minùs copiosè: die inseq. rigidum invenimus eum abdomine inflato, vesicula fellis & urinaria admodum distentis: Ventricleus dissectus spumam fermentescentem, cum mucos sanguinolento copiose exhibuit, conspicua circa pylorum & duodeni initium inflammatione, cujusmodi sanguinis extravasationes in tenuibus hic illic quoque animadvertimus, pariter etiam pulmonum lobi infestabantur: intestinum cœcum amplissimum cellulatum: Atque his experiendi finem fecimus herba recentis nos deficiente: Ne verò nostræ fidei unice subscribere teneantur artis curiosi, singulorum testes, qui nobiscum adfuerunt appello Viros Nobilissimos D. Shorkopf Hildesienf. D. Lehenheer Augustan. Medicin. Licentiatos. D. Nâbel Heidelberg. D. Facio Viviacenf. D. Kartseher Briga. Siles. D. Astorium Italo Consentin. *Philosophus.*

**D**E nocivâ Cicute vi pleni sunt Medicorum Veterum libri, nec opus esse arbitror ea prolixius hic repetere, quorum Tu ipse in Cicute aquaticæ historiâ eruditam mentionem iniecit: Apud nos frequenter illa crescit in pago Monchensteinsf. & Michelseldæ: odoris acris & præpissis, ubi conteritur nauseibundi, succi particule linguam potenter ferunt, cum nec digitorem apicibus pepercerint; herbar & radicis in bolos coactæ efficaciam non exploravimus: ob tempestatem anni declinantiem, & materiam, si ita loqui fas sit, solaris decrecentiam, unde forsitan ipsius etiam succi in enecando torpiditas in canibus deducenda venit, dubium enim non est, quin vagante Solis influxu, planta decepta non tuculenta magis sit, particulisque ætævis copiosioribus & magis evectis instructa, seu istud opus iterata docebit: Snum tamen genium nobis probavit abunde, ei quadrantes similes, quem in sap. p. 137. animadvertisti, in canibus etiam binis temulentia manifesta fuit, & frequens mingendi necessitas: certo caliditatis, quâ sanguinem fundebat & attenuabat, sicque parti aquosæ facilius & copiosius abicidendi animum suppetebat, indicio: possem quoque de narcotici melle hamoralis attenuationi sepe numero succedente verba facere, ni plenius de illâ agere alibi cõultum foret; Nec verò hic substitit cicuta, quin salina suæ acrimoniæ, aculeorumque igneorum, quibus non parum stipata est, evidentior edidit ac reliquit vestigia, sibi verò ubique consona: in cane vetulo & caniculâ, totius tremor; cum vomitu & oppressione circa præcordia, diaphragmaticæ succulione, fibrarum nervarum, cum stomachicarum tum phrenicarum, intimam cum his consinitatem habentium irritationem satis arguit, quæ seu prodromus Salivationis præsit, non tam ex continuata succulione, vel confractione musculorum, oris, vomitus imminente aliâ conspicua, quàm apicularum lingue necrearum, ut & partium vicinarum à particulis succi exhibiti residua agitatione: in ventriculo verò suam *visum* adeo vehementer non exercuit, ulque dum mucos obmuneat solum, spicula sua insigere potuit fortius, quibus semel impactis, etiam si evomuerint, marginem idoneam morus ipsamodici nihilominus subsisterent, spirituumque ulterius diffusionem; quam corporis linguecentis necessariò exceperit prodromerunt: Adjumento his accessit vasorum ab hoste rodente denudatio & erosio aliqua, quam sanguinis extravasatio non potuit non subsequi, cuius nique cum in renibus, intestinis duodeno maxime, tum in ventriculo inflammatio & mucos sanguinolentus certissima sunt signa: & fortè suffe-

cissent hæc pro machinæ destructione illarum noxæ, si intra ista potenter delitasset, aut ulterius perrexisset, particulique subtilioribus sanguinis oculo immixtus eum insigniter rarefecit & vidit, unde corda thalami, non modo sanguine vel nullo vel fluido admodum gaudebant, sed in pulmonibus etiam à sanguine tenai hic illic extra vasa profliente & stagnante, vesiculæ rubore & maculis iniolis decoloratæ fuerunt, quibus faciliorem ansem perinacis diaphragmatis succussiones & oppressiones hand dubie suppeditarunt, donec hinc labe aliqua ipsi cerebrò (si non potius spiritibus illatis, claustricem fluidi utriusque influxu præcedente temulentia corruerunt, de quibus in secundis curis plenius, nec enim de cerebri cortice, in quo spirituum expansionis in affectibus soporosis impeditæ causam querunt eruditi, jam dicere vacat: de ovis verminosis addenda pauca, quæ ex putratæ vel seminis certo modo putrescente deducunt Galeni filii, forte quod purgante exhibito, vel talem nudam, vel cum illa lumbricos externi animadverterunt, pariter uti ex fimo equino, aliore fœtus ejusmodi deservant alii, de ovulis inibi depositis parum cogitantes: Est sane mucos cum ventriculi, tum intestinorum, commodus vermiculorum urticulas, cui dum adherentes & involuti, accedente etiam huc materia motum vitalem suscitavit (calorem dicunt aliqui, ego vero subtili præsentiam insuper arguo, exigui valde prodierunt, nutrimenti sui partem aliqualem deinceps debere videntur, indeque est, quod ioluto & ex eo mucos temporis tractu ipsam intestinorum substantiam erofisse ac perforasse quandoque prehensum fuit, seu in observationibus infra exempla fingeremus: sepius tamen hospites isti in nro alterove corpore stabulantur, præter practicorum opinionem & suspicionem, unde vulgus pro sua impetitia, labem ipsi afficere consuevit, quod exhibito purgante anthelmintico effectus non respondit: Verum enimverò materia graveolens adinstar spermatis ranarum, vel ovi pusilliginosi, quid fœtus subfœris satis edocet: Quis enim nescit, vermes sive enectos sive seminum collectum, nec tamen eductum, ita corruptum aut putrescere posse? pariter uti pituitum in dictis locis ad saturationem agebat, putredinem concipere, communicarique victiosis massæ humoralis misinatis morum hujus variè pervertere aliæque symptomata indidere experientia comprobaturum est: Spuma fermentescens, cujus vehementer ruginis, cum abdominis distensione in cane ultero prædignum erant, cum mucos sanguinolento satis ostenderunt, quam in isto succi exhibiti particula lætam insinuerunt, à qua egi-

agitato tantisper Helmontii Artheo angī & succuti cepit: cani tamen exitiales istæ æque non fuerunt, ac porcellō indico mātī, cuius animantis ventriculus posterior videtur urique, nec mucō obnudent caninorum instar instructus, ossa aliæque cura noxam diffingentiam ac coacoquentiam, unde etiam diæte succi particule pariter insangi non poterant, quin libe ventriculo & intestinis tenuibus gravi lemi illa, qualis etiam in pulmonibus vitali organo conspiciebantur, vitæ animalis dispendio afficerent: Mucus certe viscidior, & copiosior à particularum enormitate aliq̃ue ipsum præmanavit, cui, ceu supra meminimus, planè ex ore dicto demum menie collectæ, virtus faciscere incipens jungenda est, propterea tamen sospitem non præstitit quin symptomatum vehemēti iteratione languiceret, concurrente interna aliq̃ue ventriculi & intestini labie: Interitum vero inmit fucci ejusdem sanguini proprie t. c. t. immittio, unde ipsius compage soluta, præcedentis convulsivis moribus, cordis thalami liquore vitali prius exhausto fuerunt, motum insulo pabulo natio aspero per intervalla in gemitum auriculæ dextræ, de quibus videlicet eruditæ Pythagoræ nostræ parerga. Neque funestam hujus vim effugit e. m. s. Molotus, viatoribus alias formidabilis, quia à succi immisione sanguis supra modum rarefactus, vehementissimis in corde arteriisque motibus occasionem daret, effusaque ab impetu vesicularum pulmonalium structura, non modo iste collabesceret, sed facta insuper sanguinis terebri tenuis, extra vasa profusio, cum aere agitato & rarefacto confusa à r. m. s. spuma languinolenta per os copiose efflueret, quam etiam postquam spirare desisset, frequenter erupit, reliquis aliquibus in ipso thoracis cavo stagnantibus, pulmonumque flacciditate, quæ æt. em. injicere tentantibus magis patuit, & inflammatione evidentibus: utrum verò sanguis fluidus acris, ad sinum latere visibilis, (cui, si venæ jugulares utrinque lateris ligatio ortum suggestit, pulsus arteriarum impetuosus augmentum non exiguum subministravit) motuum convulsivorum in faucibus præcipuè & collis musculis: mater extierit, cum potius apoplectici quid inducere valuisse, principii nervorum compactionem, verò fibre motricis à sanguine vehementer irruente, aut cordis eorum ab eodem impetu ipso insula facta irritatio, humoris ipsius acrimonia non rejecta in causa fuerit, decidere non videtur, nec opus est: Sufficit ab ejusmodi motibus in machinæ animalis destructionem sepiusculè tendentibus, & partium muscularum, præcipuè verò spirans vitalis, cui animalis, impore à cruore (saltem liberatus, affinis) successione, validè (paucis modicis quæ) libenter subsequi, ceu istud etiam animi pathema inopia, terror aliæque testantur: solen verò cani mollosa venam jugularem externam pariter utrinque ligavimus, soporem cum idue epileptico prestolantes, ex sanguine liberâ commotione inhibita, ista festellæ spem evenus, inque diff. di. cerebri sanguinis extravasari parvi omnino reperimus, nec in sinibus grumosis vestigia, firmissimo argumento, viâ hæ præclara, quam per venas maxime jugulares internas naturam ubi parassit: in Porcelli femelle mortem subitam inquirere supervacaneum est, succo irritante labem doleriem ipsi, vitalibus organis proximè inferentur: de istius autem animalis atero & scitibus, que memorandæ sunt in scholis superius expedivimus. Vale his Artis Alepidæ columnæ, & mihi, ut soles, facite perge.

Dabam è Musæo Basil. d. 17. Decembr. 1684.

Anno proximè subsequente, ejusdem Cicute succo alia adhuc experientia in canibus instituitur, plura verò symptomata, præter supradicta, nascuntur

namque vomitionem somnolentiam & paulatim machinæ corruptionem non observavimus, de aëris verò per venam jugularem, siphonis ope injectione quædam heic addenda habemus, quæ nec Cicute infusionem illustrabunt potius quam turbabunt, enimvero fortissimè vis omnino abiit, licet tantillum quoque in officiendo adjuvamento esse potuisse, pertinaciter non inficiamur: Mens. Octobr. libentis annis 1686. presentibus D. Cand. Burgovvero, Sc. F. D. M. Stachelno & D. M. Tonjola, cani medioeris magnitudinis, aëtem fortiori, inspiratione in venam jugularem infundimus, hic postquam tantisper ejulasset, respirare confestim desinit: Abdomine & thorace mox cultro apertis, præter ductum thoracicum, vaiaque venosa turgida, motum nem interst. erum peritæticum elegantem, cor prius distinctum comparit, ejus tamen parietes valne infusio, illico conciderunt flaccidi & enervati, præterque tantillum cruoris spumosi nihil exhibuerunt, ut inde ad fibrarum cardiacarum enervationem, ab aëris vi injectæ expansione, s. elasi, fortè non incongruè argumentari liceat, unde ad pristinum tonum illis non redeuntibus, cor in motu suo faciscere necesse habuit, propterea tamen non rejecta sanguinis ab aëre permixto rarefactione, quam bullæ spumose ubique probasse videntur. Decem circiter diebus post anum subit liquores diversi generis alcalinum & acidum, sanguini successivè immiscere, cui negotio operam unà præstiterunt Viri Præstantiss. D. Mejerus & D. Meislerus Scasul. Medic. itidem Licent. solutæ hinc utrinque venæ jugulæ ex uno quidem latere spir. urin. sil. arm. ex altero verò spir. vitrioli tabulæ permiscere studuimus: Et quidem post illius miscelam, vehementer ejulantes cordique impulsus aliquando animadvertimus, qui autem cum diu nota subliterent, nec ab hoc injecto, pejora symptomata subsequi videremur, aëris forti infusione, scenæ finem pariter fecimus, atque præter ea, quorum superius meminimus, cruoris effervescencia, vis sanguiferis incis, satis conspicue, animos præcipuè refecit, cum sanguinis grumosi portionibus hic illic palpabilibus, quam diversæ naturæ liquorum concursu adscribere, nihil fortè est, quod verat, inprimis si alcali & acido parocinari velimus. Clar. Joh. Jæ. Harderus in Observationibus Anatomico-Præclis.

### Dissertatio Medico-Philologica de Cicuta ejusque Veneno.

Ad Clarissimum Virum Dn. Joh. Jacobum Mangetum Medicum apud Geneveses Excellentissimum, &c.

Cicutam venenum esse naturæ humanæ insensissimum, & Antiqui, & recentiores referunt scriptores; Sicde Cicute malignitate plena sunt historicorum volumina; hinc ope cicute occisi fuerunt Demosthenes, & Seneca, teste Sim. Pauli in *Quadrup. botanic. clas. 3.* & Socrates, ejus mortis historiam Plato in *Phæd.* exponit, quam non sine lachrimis legebat *Jul. Cels.* Scaliger necnon venosè cicuta, præter alios multos, necatus fuit Francisc. Triapolinus præceptor Pomponatij, ut monet *J. C. Scaliger de febrilib. ad Cærdan. exercit. 152.* Unde Athenienses maleficos homines cicuta necare soliti erant, ne passim testantur historia, & *Plinius histor. natur. lib. 25.* hanc invifam Atheniensium penam fuisse ait Cicuta variè à Variis appellatur, unde à multis *Egyptos*, aliis *Ethiopia*. *Apolegusa*, *Dolia*, *Amatrosia*, *Aphro*, *Cæren*, *Abioton*, *Timoron* dicitur, aliæque plura etiam habet nomina ut videre est apud *Tragum histor. Stirp. lib. 1.*

Nascitur ipsa herba sponte incultis; & aequo um-  
brosis locis, caulis quandoque tricornibitalis est; Fer-  
niculum imitatur, geniculatus, ac nodosus, & cujus  
sinibus saeculi prodeunt, florem album facit, se-  
men aniso respondet, insecto tamen odore, & Myrsinidi admodum similis est Cicuta, & ab ea  
tantum differt viroso, ac maligno suo odore; Flo-  
ret autem Julio, & semen habet Angusto: Duplex  
est, nimirum Cicuta major, atque Cicutaria vulga-  
ris; prima apud nos Ferrarientes haud nascitur, altera  
passim advenitur, eamque manducatam Asi-  
nos inebriare credit Vulgus nostri; De hujus plan-  
tae descriptione, ac differentiis supra tradunt Bau-  
hin. Dioscorid. Matthiol. Trag. Hoffman. Fuchs.  
Ruell. Chabreau, & alii Botanici. Frigida: hanc her-  
bam esse temperiei narrant multi; Cardanus autem,  
eam calida esse inebriatam temperatura ait l. 1. de Ven-  
enis. Primit. ejus frigiditate venenatam qualita-  
tem deducunt, qui tamen reselluntur à Sennerto,  
nam aqua, & nix ea longe frigidiora sunt; & ta-  
men non sunt Venenatae; Ex eo vero quod sit im-  
morta, deducit citatus Cardanus l. c. eicutam esse cali-  
dam; Sennertus Praet. lib. 6. part. 7. cap. 6. an, to-  
tant illam actionem; quæ ut venenum agit; esse ab  
oculta proprietate, ego vero cum Sim. Pauli Q.  
Bot. Fossio de Idololat. lib. 3. & Frider. Hoffmann. clavi.  
in Schroder. esset, Cicutam merito inter venenæ re-  
ferri à tota instantia agentia; De cicuta frigiditate  
tradunt Matthiol. in Dioscor. Fichsus in histor.  
Plantar. Caspar. Hoffmannus de medicam. officinal.  
lib. 2. aliquæ plures; de Cicuta caliditate Car-  
dani lib. 1. de Venen. Ermol. Barbarus in corolar. cap.  
694. Cicutam aquatam frigidam esse, terrestrem  
vero calidam ait; Quidquid vero sit de ejus primis  
qualitatibus, de quibus penes Autores; certum est  
eam esse Venenum, & corpori humano inimicum, &  
qui ab hac herba venenæ mortuuntur, incipiunt al-  
gere ab extremitatibus corporis, quemadmodum  
accidit Socrati monente Platone; & hic notandum,  
quod quando hac planta in Vino est pota irreme-  
diabilis putatur. Potentissimam eam esse oscutim,  
ait Plinius cum Matiholo, quæ oritur in Panha,  
Lacônia, Creta, Asia, Megara, & Athenis in Græ-  
cia; in Italia vero non apparet tam venenata; in-  
nocens tamen non est; hausta cicuta oculorum ca-  
liginem inducit, cum Vertigine, furore, ac amen-  
tia, difficultate respirations, strangulatione, sin-  
gultu, corporis tumore, frigiditate, atque virium  
exsolutione, tandemque morte, tanquam ultima linea  
vitæ. Ob illud vandum Titum, qui fuisse, venenatus  
à Cicuta, præmissis prius vomitorio, ut in omnibus  
sit Venenis, vel etiam purgante aut clystere, statim  
alexipharmaca adhibendi sunt, V. G. Distamnus,  
rua, gentiana; Urticæ semen, absinthium, & Zi-  
theria, vel mittituri Vinum generosum valde  
commendo, debite enim tanquam vehiculum ven-  
eni agnoscit Sennertus; unde Athenienses, dum  
aliquos cicuta veneno occidere volebant, pauxi-  
luna Vini debilis ei admiscebant, ut sua venen-  
te venenum ad eorum cho. deduceret; Tòrum cor-  
pus venenati estefaciendum est, agrotumque ad  
mortem cogendum; idcirco Scaliger. exercit. ad  
Cardan. 192. ait Athenienses monuisse Critonem,  
ne Socratem permitteret, attentis disputare,  
propterea quod ex eamensis agitatione caloris ali-  
quid contrahi poterat; qui calor veneno cicute  
obstaret; Sicuti vero homini venenum est cicuta,  
ita cicuta vinum, de quo egregius ille cœdicionis  
25. Iulianus Calvus Rhodiensis test. antiqu. lib. 18.  
cap. 15. hinc valde miratur Job. Brucianus de re cibari-  
lib. 2. cap. 71. Plinium, atque in Gravem virum, tra-  
didisse causas Cicute plerumque in patinis, cum  
germe confiter cicutam noxam esse; quam maxime à

Toxico differt scribit citat. Gaf. Redigis. hanc fer-  
vabant Athenienses ad publicam penam, quod &  
Juvenalis notavit canendo.

Nul prater gelidus ansa conserre cicuta.

Quam penam subivit olim Socrates, ut supra me-  
mori, casus mortis historiam fuisse scribit Eilerd. Le-  
bicus. com. in A. Pers. Satyr. 4. pag. mibi 757. quæ qui-  
dem digna est, ut legatur. Certo igitur constat, Ci-  
cutam venenatam plantam esse; notandum tamen  
cum Luciani in Ermo. cicutam non in omni quan-  
titate occidere; refert enim Galeus historiam de  
quadam Atheniensi, quæ à minima cicute portio-  
ne aspicata nullo detrimento ad magnum progres-  
sa est copiam; similisque observationes notant  
Fontanus in respons. Med. Sext. Empiric. Marc. Du-  
rante, Mercenialis, & alii, imo Anum quandam 30.  
drachmas cicute innoxie devorasse, scripsit Casp.  
à Reies Camp. Elyf. quest. 69. qui auctor concludit ci-  
cutam quandoque nutrire posse; Externus autem ci-  
cute usus non rejiciendus est à Praxi Medica; ex  
hac enim, uti & ab aliis Venenis, morbi aliqui edo-  
mari queunt; Sic doctiss. Ettmullerus in Schord. di-  
scid. Emplast. de Cicuta commendat pro splenis  
obstructione; imo, & strumis cum gmmi Ammo-  
nisco in aceto solut. adhibetur. Ad mammas indura-  
tas à Lacte coagulato feliciter emplastratur Cicuta,  
quod bis ego expertus fui; hanc herbam Dio-  
scorides tritam, & testibus circumlitam applicari  
juber ad Venenem exstinguendam; hinc est posita,  
quod succo Cicute, aliquo modo nobis adhuc in-  
cognito, præparato Sacerdotes Athenis libidinem ex-  
tinguebant, ut legitur apud D. Heronym. ciutr. Ju-  
vianæ Alexandr. ab Alexandr. 4. genial. dur. & à  
Reici l. cit. Ad omnes inflammationes, & tumores  
externe cicutam prodesse docet Tragus hist. Stirp.  
Succum Cicute, & ejus aquam destillatam juvare  
in Erysipellate docent multi; Ex hac fieri ad resis-  
terendum malagma; ait in hist. Planer. Leonard.  
Fuchs. cap. 155. multi usus, ad cohibendas epipho-  
ras æstivas, oculorumque dolores sedandos; unde  
optime postea Plinius ait, eam misceri collitis, &  
omnes rheumatismos cohibere; Podagram refrige-  
rare cicutam cum litargirio in primo ejus impetu  
docet idem Plinius hist. nat. lib. 26. cap. 10. & cap.  
12. ejusdem libri, membris luvatis apponit; in sa-  
rium hæmorrhagia cicuta semen ritum ex aqua, ma-  
ribusque induram. efficacie multæ esse ait cit. Plinius,  
qui etiam ulcera curare vult cicutam cum filigine  
mixtam, necro; Ego tandem expertus scribo, Cicu-  
tam nostram confusam & appositam tumorebus val-  
de prodesse.

Si Asini Cicutam depascantur somno profundo  
corripiantur, ut saepe à Rusticis tanquam mortui  
exorati fuerint; ut monet Ant. Miraldus, & Mat-  
thiol. com. in Dioscorid.

Sturnos in pane veluti Cicutis, quæ tamen homini  
sunt venenæ, asserit cum malis Anthoribus Clar.  
Dr. Jul. Casar. Scaliger comment. in l. 4. Theophrast. de  
Plantis; ita pariter me legisse memini Gallinas vel-  
licatissimas, Anates domesticas Buffonibus Feles ja-  
ceris; absque ulla noxa; hic autem pro epilogo no-  
tandum Cicutam venenum esse acerbis particulis  
præditum, linguam enim acrimonia quadam pun-  
git, & vellicat, homini tam infensum, ut qui im-  
pulerint brevi moriantur, nec ulla prorsus ope medi-  
ca salvis possint; Plura de Cicute veneno cupienti  
dabit insignis, ac nunquam satis laudatus Dux, Theo-  
philus Bonetus in suo Mercurio, compendiat. lib. 18. &  
Job. Jacob. Wepferus in Hist. Academia nostra Censu-  
ria Socius semper estimandus, atque celebris, hæc  
brevis à me scripta sufficiat de Cicuta.

Raptem scribebam, & currenti calamo in museo natus Lector, & Academia Leopoldina Socius dictum  
 meo die 7. Decembris 1695. ego Joseph. Lanzani Epicarum.  
 Med. Doct. Ferrariensis in Patria Universitate ordi-

## OBSERVATIO V.

## De Napello.

**H**istoria 1. Castello trium circiter septimanarum eum Nobiliss. Dom. Dom. Secreta à Zavor-  
 zek 14. Julii 1676. radicis *Napelli* recentis bene contusæ drachmam dimidiam cum la-  
 ste, norâ secunda pomeridiana, intrudi: aliquandiu incescit ac si nihil deleterij accepisset,  
 subinde vagiit, quandoque caput suecussit, quasi nausearet. Præterea prope hora dimidia  
 pedes posteriores traxit, paulo post ingressu ad latus sinistrum inclinavit, atque sæpius in il-  
 lud lapsus est: subinde totum corpus motu convulsivo concutiebatur. Non diu post evo-  
 mit lase spumeum & aliquomodo grumosum. Motus convulsivi aliquandiu continuantur;  
 hinc in latus decubuit; non obriguità tetano: decubuit instar moribundi ultra duas horas  
 ab accepto *napello* & quasi suspitose vagiit. Abdomen intumuit: illo inciso fortius vagiit &  
 valide artus movit. Venterculus valde distensus erat: integrum excidi: movit se motu ver-  
 miculari: stomachus seu orificium sinistrum arctissime semet constrinxit, ut ne guttula qui-  
 dem excideret: quando verò circa medium se contraxerat, motus lente versus pylorum  
 procedebat, illeque erigebatur, liquorque subpallidus, nunc spumeus nunc viscidus quando-  
 que sensim, aliquando cum impetu prorudebatur: Constrictio pyloro ventriculus rursus in-  
 tumuit totus, moxque rursus circa medium se constrinxerat, novusque liquor per pylorum  
 ejiciebatur: Hæc constrictionis in medio & inflationis alternatio continuavit per octavam  
 partem horæ, stomacho semper arctissime clauso permanente. Postquam ventriculus se mo-  
 vere desistit, illum superne à stomacho ad pilorum incidi: continui radicis *Napelli* reliquias,  
 lase grumosum, frustula straminea, mucum & liquorem spumeum; his sublati interna super-  
 ficies alba erat, nec ullibi vel minimum inflammationis signum apparuit. Diaphragma post  
 ablatum ventriculum aliquandiu movebatur, cællasque aërem ore hiantè captavit. Sanguis  
 ex venis & arteriis promanans admodum fluidus fuit. In cordis ventriculis nihil omnino san-  
 guinis supererat. Vesica ab urina valde distenta.

**H**istor. 2. Reverendissimus Dom. D. Romanus Abbas St. Blasii ex benevolentia, qua erga stu-  
 dium Medicum fertur singulari, 1676. die 27. Augusti. concessit lupum, ad experimentum  
*Napello* faciendum. In nido pausarum septimanarum adhuc captus nutriebatur lacte; ado-  
 levit & aliquomodo cicur factus quosdam ferebat, cum cane ludebat, illumque hinc inde se-  
 quebatur, non tamen penitus lupinam naturam exuit, quosdam ferre nequit, erga illos ringe-  
 bat & propius accedentes morfu petiit: tuncque præ timore statim alvum & vesicam exone-  
 tavit, fugaturus hac turpitudine inimicos suos. Jam semestris erat, ac robustus. Ab hora 6  
 matutina ad 2. pomeridianam nihil cibi dabatur: per hortum & aream bacillo abactus valde  
 incalescit, carnem objectam comedere noluit, serum verò appositum avidè lambit & postea  
 eam devoravit.

Postea aliud frustulum carnis, in quo drachma dimidia radicis *Napelli* abscondita erat,  
 objectum fuit, quod venenum subodoratus attingere noluit. Itaque illum auribus appre-  
 henderunt, os bacillo diduxi ac duo frustula carnis quibus *Napelli* drachmæ duæ circiter in-  
 volutæ erant, intrudimus. Vix octava horæ pars præterit, quum ad vomitum stimulare-  
 tur, & paulo post mucum viscidissimum crassum, spumeum cum uno frustulo carnis evomit:  
 ulterius ad vomitum concitatus alia duo cum *napello* & mucu viscidissimo, crasso, spumeo  
 & flavo ejecit. Interea abdomen mire attollebat, valde angebatur: robustus tamen man-  
 sit, pedibus non nutavit, erga ignotes rictum edidit, baculum protensum morfu petiit:  
 Subinde mucosa & viscida evomit. Postquam ambo frustula carnis cum radice *napelli*  
 egerit, adhucque vegetus esset, veritus me experimento frustratum iri, paulo post ultra  
 drachmas duas radicis contusæ sero lactis immisi: ac ore diducto denno infudi. Brevi  
 post frequenter ad vomitum irritabatur, multis nixibus frustaneis, tandem ter mucum vis-  
 cidum crassum, spumeum, quartâque vice ejecit mucum gryseum, turbidum, cui radices  
*napelli* & fæces subnigræ immixtæ erant: postea evomit iteratis vicibus liquorem tennem,  
 flavum, pellucidum, nonnunquam nullo colore tinctum, miro angebatur: hæc illi ivit,  
 corpus quandoque ad parietem inclinavit; huc usque nondum decubuit; abdomen crebro  
 contrahebatur, ut prope venter evanesceret, dorsoque accedere videretur: diaphragma-

eis tensio & relaxatio frequentissime alternabant : nunquam vel alvum vel vesicam exoneravit, quod antea facile ex solo metu fiebat. His ultra dimidiam horam perdurantibus, subito ambobus pedibus anterioribus fortiter terram fodit brevique amplam foveam, cui sibi sepulchrum paraturus, excavavit, ab opere avulsus fune quo ligabatur subsedit, moxque in latus decubuit : extractus è fovea aliquot gressus fecit : rursus fodere incepit, profundè os nasumque foveæ immisit, evomens mneum pellucidum, viscidum, coloris expertem : stans aut sedens subinde toto corpore tremuit : rursusque fodit : retractus & compulsus aliquot gressus peregit, non nutante corpore. Paulo post in latus decubuit : celerime & cum suspiriis respiravit : ad vomitum adhuc stimulabatur : os spuma implebatur : nunquam convellebatur. Cum expiraturum præviderem, duabus horis à primo bolo intruso, vivum sed prorsus enervatum asseri pedibus & capite alligavi, ita tamen ut os apertum maneret : abdomen incidi ; nulla doloris signa dedit : inter secandum expiravit, licet parum sanguinis profusum fuerit. Quamvis diaphragma non amplius moveretur, ventriculus tamen nunc in antro pylori, nunc in medio se contrahebat, ibique gracilior, imò quandoque angustissimus evasit, versus stomachum verò intumuit ; mox contractus iterum relaxabatur & in amplam molem distendebatur ; mox iterum nunc circa antrum pylori, nunc in medio coarctabatur, atque crebris vicibus istæ ventriculi contractiones & dilatationes alternabant. Inestina motu peristaltico se movebant, nec tamen post contractiones ventriculi dilatari videbantur, imò post iteratos motus suos peristalticos angustiora manebant, quamvis nihil per alvum quoque excreverit. Remoto sterne gula summopere distenta occurrat, quovis brachio pueri annui amplior ac si à statu è ventriculo pulso & circa pharyngem derento in hanc molem exerevisset. Ad latus inclinatis pulmonibus receptaculum chyli nuce moscatâ majus, oblongum, subpallidum vidi. Pulmones erant ex albo rubescences, molles, penitus collapsi. Ventriculo prope stomachum inciso gula concidit, & protinus ad pristinam magnitudinem pervenit ; nulla inflammationis vestigia in illa aderant. Ventriculo à stomacho ad pylorum inciso ultra duodenum, vix grana decem radicis napelli inveni : continuit mucum valde spumæum flavum : illo absterfo tota interna superficies in fundo & in parietibus inflammata, & anfractus atro rubescences, nullibi exulcerati, apparuerunt : stomachus vero & pylorus ab inflammatione immunes fuerunt. Tota interna superficies duodeni & maxima pars jejuni & ilei quædam portiones, nunc unciz unius nunc duarum longitudine, imprimis prope valvulam in ejus fine, admodum rubebant ; etiam limbus hujus valvulæ. Duodeni & jejuni superficiem incrustabat substantia coagulo lactis similis, alba viscida, alienubi flava. In ileo continebantur cucurbitini vermes solitarii, semen cucurbitæ figurâ & magnitudine referentes, coherentes duas spithamas longi, desinentes in filamentum prope spithamæ longitudine, in cujus extremo globulus, caput acus referens ; Item teniz seu lumbricilati ; omnes adhuc viventes.

In recti extremo feces virides, mucosæ paucissimæ aderant. Cecum statibus distentum & incurvum continuit mucum viridem, sabuli aliquid & frustulum unum alterumque radicis minutim concisæ. Intestina ulnas quinque superarunt ; Cecum palmare. In jejunio & ileo quam plurimas areolas glandularum inveni, plures rotundas, quasdam oblongas, dimidii bazii latitudine, quasdam ampliores : areola in fine ilei palmâ longior erat : illarum ambirus prominulus ; pleræque in centro etiam inflammata. Vasa sanguifera mesenterica ampla & sanguine nigro plena ; hepaticæ atro rubescens fuit. Vesica biliaria bile valde turgebat : Lien pallidior longe hepate : in dorso se corrugare videbatur longus sed gracilis. Renes caninis similes ; nulli in illis vermes. Vesica prorsus contracta : vix nucem moschatam magnitudine æquavit, quamvis glandem filo constrinxerim. Vena cava ascendens & descendens valde sanguine turgebant. Pancreas Asellii venæ lacteæ plures transcenderunt & percreparunt. Receptaculum chyli incidi, effluxit multum chyli lactei, candidissimi, multâ lymphâ diluti, sine ullo vel minimo grumulo. Ductum thoracicum ibi in flavo, inde vena cava prope auriculam dextram primum misare ; hinc systolen & diastolen edere cepit, mox auricula dextra ex parte, non tota aliquot systoles & diastoles motus peregit. Cor ante inflationem amplum, ab illa magis distendebatur, ut & vena axillaris. In pericardio multum feri pallidi, turbidi continebatur. In eis e cordis auriculâ dextrâ & ventriculo, aliquid sanguinis spumæi emanavit, plurimum vero in auricula & ventriculo grumosi permansit, extracto grumo sequebatur appendices spithamâ longiores ex cava & arteria pulmonica. In ventriculi sinistri summirare grumulum parvum, nullum in fundo reperi. Artus post mortem flaccidi & flexiles erant. Oculi diu lucidi permanferunt. Dum vivebat nasus ad oculos ut & pedes, ubi depiles erant, admodum quasi à sudore mædebant. *Clar. Joh. Jac. Wessels Tract. de Cicuta aquat.*

**H**istor. I. Feli masculo adulto die 28. Decembr. 1677. hora nona antemeridiana jejuno dedi, presentibus *Excellentissim. Domin. Dns. Heinricho Sereto* & aliquot Candidatis & studiosis Medicinæ, Coccularum contusarum & cum jussulo permixtarum drachmas duas. Cochlearim infudimus jussulum, cujus magna portio antequam deglutiret ex ore effluebat, procius tamen mucosum factum vidimus, nihilominus prope drachmam in ventriculum admisit. A vinctulis liberior os lambit. Statim post intrusum jussulum, instar canis cursu longe defatigati, celerrime linguâ exserta & hiante ore respirare cepit & paulo post quasi exterrita succutiebatur. Vix octante horæ elapso convelli cepit & primum convulsa jactabatur ad pedis unius & duorum distantiam; tum inter convulsiones, tum ab illis libera sæpius lamentabilem vocem edidit: spuma satis copiose ex ore stillavit: semel manifesto vomere conabatur: nunquam alvum solvit: nec multum eminxisse observatum fuit, quamvis permissiones importunæ ipsam ad cocculas damnarint. Paulo post convulsiones invaluerunt creberrimis paroxysmis & omnis generis, imprimis *opisthotica* & tetano; non raro solummodo pedibus tremebat. Post paroxysmos aliquoties seu mortuus jaeuit. In ipsis paroxysmis & dum à convulsionibus liber erat, sæpius nullum motum cordis, nullamque respirationem animadvertere potuimus: ambobus motus nunc sponte, nunc compresso & constricto atque etiam succusso pectore redierunt, statimque rursus convulsiones ordebantur pari vehementia; inter convellendum cauda mirè intumuit & arrecta fuit. Fere ad extremum vitæ oculi splendidi fuerunt; circa finem vitæ retrahividebantur; tunc quoque jam diu mortuus credebatur; post succussiones tamen denuo iterato convellebatur atque vocem querulam, sed submissam, edidit.

Ante 10. antimeridianam vivere desiit. Aperto abdomine ventriculus rugosus & anfractusus quasi conspicebatur, ac circa principium antri pylori aliquantulum contrahebatur & coarctabatur, sed motu lentissimo; paulo post amplior & superficies planior evasit, diuque talis mansit & non nisi levicule se subinde contrahendo & egrugendo mutabatur. Intestina à pyloro ad finem recti diu motu peristaltico movebantur, qui motus nunc à pyloro supernè, nunc infernè, nunc circa medium incipiebat, & nunc sursum nunc deorsum vergere videbatur, idque diu, quamdiu sc. intestina calebant.

Ventræ gastricæ, epiploicæ, mesentericæ & porta admodum sanguine tuebant. Intestina motu peristaltico contracta durissima & quasi cartilaginea videbantur: foris conspicui erant, præter rugas circulares, etiam sulci recti. Cavum hepatis rubicundius erat parte convexa, atque ibi manifeste apparuit illud ex minutis glandulis compositum. Vesicula Biliaria Bile virescente turgebat. Pancreas molle mansit. Lien saturare rubescebat: Renes pallebant. Aperto thorace, pulmones sinistri lateris subalbi cum aliquo rubore permixti, in dextro latere rubicundiores erant: in utroque latere lobi inflati erant, adeo ut pulchre in ipsorum extremitatibus Vesiculæ Malignianæ conspicerentur; Vena cava ascendens & descendens, item azygos & intercostales sanguine valde distentæ erant. Cor ejusque auriculæ sanguine admodum turgebant; dextro ventriculo inciso copiosus & fluidissimus emanavit: ex sinistro verò, superne proffuso corde, cum impetu profluit: in neutro ventriculo vel auriculis ne minimus quidem grumulus observari poterat, cum tamen extravasatus brevi grumesceret.

Ventriculo à gula ad pylori finem superne inciso, ipsam plenum muco viscido cum jussulo & coccularum pulvere mixtis inventibus; quibus deterfis anfractus albiabant; & alibi paululum magis quam aliàs observatur, rubebant, non tamen manifeste inflammati erant. Inestinis à pyloro ad finem recti incisis, sub pyloro in duodeno paucillum de jussulo muco permixto offendimus. In reliquo ductu ad finem ilei ne minimum vestigium harum apparuit: imo omnia vana & exsucca erant, mucusque ipse paucus & condensatissimus fuerat: reperimus verumenum latum, adhuc vivum & plures lumbricos teretes. Circa insertionem ductus Biliarij & pancreatici, nec Bilis vel alius liquoris guttula visa fuit. Intestinum Cæcum & principium recti, plena erant substantiâ pultaceâ pallide flavescere: in fine recti aliquot scibala sicca & indurata detinebantur. Rectum à sordibus mundatum intus rubicundus cum suis anfractibus fuerat ventriculo.

Inclinatis pulmonibus ad latus vidimus per ductum thoracicum, lympham omnis inquinamenti expertem transperere.



*Hist. 2. Ab Excell. D. D. Christophoro Hardero, communicata.*

Die 8. Novembr. 1678. Cani venatio, novem fere annorum, carnoso tamen, valido & robusto Coccularum in pulverem redactarum drachmas circiter duas exhibuit. Elapso vix dum medix horz spatio, toto corpore, ac si frigeret, tremuit: in hortulum tractus gramen lambere, subinde devorare cepit: brevi ventriculus ad vomitum urgebatur, qui & paulo post sequebatur: unâ atque alterâ vice stomacho per vomitum à Cibus evacuato, tremor artuum in motus convulsivos mutabatur: rictum sæpius deducebat vero spasmo Cynico: stans eructabat plurimum salivæ tenuissimæ, ab ore pendulæ: motus ventriculi nauseabundus identidem rediit: tandem humi prostratus, horrendas Convulsiones universales ad quantum fere horz partem passus est. Tandem remittente sensim violenta ista artuum extensione & Convulsione, (non tamen ventriculi, qui perpetuo ad vomitum irritabatur & sine intermissione spumam eructabat) paulatim canis se recollegit, caput erigere, surgere ac pedibus insistere conabatur: quod tamen effectum dare minime potuit, sæpius enim recidit, pedesque posteriores corporis onus fere recusant: vacillavit instar temulenti, oculi caligine suffusi, ut oblata & accedentes non videret, nec exclamantes audivit. In hoc statu fere per horam mansit. Postea in secundum paroxysmum epilepticum delapsus est, priore tamen miorem & breviorum, quo cessante sensum reviviscere cepit, robur artubus rediit, firmo talo stetit, torpor, oculorum caligo & temulentia discutebantur, stomachus quievit, suâque sponte convaluit. Globus sclopeti per caput tractus vitam sustulit. Canis eviscerati subiectus ostendit in ventriculo magnam spumæ copiam & in fundo cibos; detergâ spumâ ventriculus non usque adeo alteratus vel inflammatus, at rubicundior debito erat intestinorum interna superficies; glandulæ verò nec prominentiores nec rubentiores erant: Nihil Coccularum in intestinis occurrit.

*Hist. 3. A. Doctissimo Domino Hurtero, Medic. Licentiat. communicata.*

Die 8. Januar. 1678. horâ primâ pomeridianâ caniculæ viginti horis jejuna, coccularum contusarum drachmas tres cum pane in Bolos redactas exhibuit. Post quadrantem horz oculis frequenter, ceu obdormitura nistavit, mox, ceu ab insomniis territa & expèrgefacta, caput succussit iteratis vicibus, os lambit, semel atque iterum oscitavit; sequebantur vomitus; primum evomuit cibi reliquias crassas & Bolos ex cocculis fere integros, hinc materiam pultaceam crassiusculam, postea tenuiorem flavescens, tandem mucum tenacem album, cujus partem dimidiam ab ore pendentem resorpsit. Ab illo tempore valde inquieta fuit, surrexit, mox rursus decubuit, frequenter os nunc lambit, nunc aperuit, nunc clausit & maxillas ac si manderet, versavit: exporrecto capite torvè circumspexit: parietes delingebat: celerrimè ceu à longo cursu defatigata, exsertâ & variè commotâ linguâ, respiravit, ubinde murmuravit, caput succussit; pedes tremuerunt: semel voce submissâ & ore propè clauso laravit. Nondum horâ elapsâ adhuc semel emovuit mucum tenacem spumeum, sublavum: pedibus anterioribus insistens caput crexit, tremebundè caput succutiebat: subinde totum corpus motu convulsivo tentabatur; aliquandiu oculos unico objecto obversos immotosque tenuit. Post horam elapsam saliva copiosissime ex ore ultra horz quadrantem emanavit: stupida, ceu omni sensu privata, jacuit, nec baculo percussa ictus percepit, interdum totum corpus concutiebat, quandoque solum pedes posteriores tremebant, erecta stare nequit; semel, instar canis ad iram conelati, murmuravit; tandem capite in terram extenso, clausis oculis, ceu somno obruta jacuit & paulisper quievit: somno finito surrexit, sensus omnes recuperavit, hinc inde cursitavit; & secundâ cocculis devoratis horâ, nihil adversi amplius passa est. Vegetæ post dimidiam horam coccularum drachmæ duæ cum juscule carnis ingestæ fuerunt, quas post horz quadrantem evomuit, nullo subsequente alio symptomate, quàm iteratâ capitis succussione. Die 9. Januar. ter cocculæ non parva dosse fuerunt: Primum aure meridiem, unde per alvum egressi fæces atro flavescens. Post meridiem bis exhibitæ nihil nisi vomitum exiecerunt. Die 10. ejusdem ante meridiem rursus drachmæ tres coccularum intrusæ fuerunt, nullo subsequente symptomate notatu digno, quin potius unâ atque altera hora elapsa ipsi appetitus rediit, objectos cibos avidè devoravit atque integre convaluisse, nisi ad nucem vomicam damnata & hujus vim expertura aliter ejus curiolitati inservire coacta fuisset. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO VII.

## De Nuce Vomica.

**H**istoria 1. Catello projectio trium circiter septimanarum, 16. Julij 1676. limaturæ Nucis Vomiceæ drachmam dimidiam, hora secunda pomeridiana, cum *Nobil. Domini D. Heinricho Screta à Zworze* lacti permixtam infudi. Aliquandiu nihil p. n. observatum fuit, nisi quod vagiter: elapso horæ quadrante caput subinde succutiebat, aut instans trahebatur, aliquando tremuit ac si rigorem pateretur: interea vagiit continuo, evomit lac sincerum, non coagulatum; paulò post nunc pronus, nunc supinus, exporrectis pedibus inflexibilibus, vero tetano extensus, jacuit, quandoque totum corpus motibus convulsivis concutiebat & multivariè jactabatur, mox toto corpore & collo instar schidij rigidus protensis pedibus evasit, atque ab illo tempore vagire desit, exserta continuè lingua: abdomen valdè intumuit. Postquam duabus horis convulsionibus affictus jam semimortuus esset, abdomen incidi, inter secundum rursus vagire & motu convulsivo agitari cepit, qui protinus in tetanum vertebatur. Ventriculus, utroque orificio arctissimè clauso, supra modum distensus erat: Illo exsecto vidimus diaphragmatis cruta, antequam illud in inspiratione ad plenam distensionem & expansionem perveniret, motu convulsivo, ut in singultu, succuti. In ventriculo invenimus lac grumosum cum mucro spumoso multo & frustulis straminis: illo à contentis mandato, nulla inflammationis signa observare potuimus, anfractuum tamen superfices minùs alba erat ac aliàs conspicietur. Ventriculo exsecto nihilominus artus & collum à tetano rigebant; diaphragma diu & sæpius brevibus intervallis motu convulsivo succutiebat: ex venis & arteriis sanguis large, splendide rufescens emanavit nullibique concretus, aut grumosus à nobis visus fuit. Aperto pectore cor veluti emortuum, cuncti apice irritatum, movebatur subinde. Tertià hora post exhibitam nucem Vomicam incisus cordis ventriculis & Venà cavà prodit sanguis fluxilis, grumorum prorsus experts.

**H**istor. 2. Caniculæ proventriculi ætatis, medioeris magnitudinis, pilis nigris præditæ circa principium Septembris 1677. *Clariss. Dom. D. Iohann. Conrad. Brunnerus* dedit Tartari Emetici grana aliquot, nullo subsequente effectu memorabili, imò quasi nihil hujusmodi assumpsisset, sana vixit, permanente urinæ incontinentia, ob quam cætera fidelis custos hero suo evolvit. Die 18. Octobr. 1677. cum Domino *D. Brunnero*, præsentè *Clar. D. Matthæo Scherffo Durlac. Med. Licent.* tum ex Italia reduce, dedi nucis Vomiceæ limatæ drachmam dimidiam circiter; quam cum mæca panis in bolum redegitimus. Prætimore mox alvum & vesicam excoeravit. Ultra dimidiam horam nullum symptoma observavimus, nisi quòd latebras quæsierit & subinde fugam tentarit: nunquam vomuit, nunquam eructavit, aut spumam profudit: sæpebro os lingebat. Ante decimam antimeridianam stans, aut lumbis infideas erectis trunco, collo & capite ac pedibus anterioribus, subinde oculis connivendo caput antorsum inclinavit, mox caput ceu ab infornio perterrita, ut & pedes anteriores in altum attollebat; subinde caput retrorsum trahebatur nunc fortius, nunc mitius, nunc brevioribus, nunc longioribus intervallis: interea crebro mingeat; semel egressit scibala alba concreta, non tamen indurata: frequentes subsultus, seu *salvus* in partibus earuosis trunci & artuum visi sunt. Circa decimam forti Epilepsia correpta fuit: in hoc paroxysmo, qui fere per horæ duodecimam partem duravit, caput retrahebatur, oculi fixi manserunt, pedes nunc extensi obtriguerunt, nunc succutiebantur & tremebant; respiratio aliquandiu penitus cessare videbatur; Cor celeriter, frequenter & validissimè pulsabat marium attingentis: nec excrementa per alvum aut urethram, nec salivam aut spumam ore egressit: quæ ullius sensus indicia animadvertiebantur. Finito paroxysmo immobilis, ceu paralytica, jacuit, respiravit celerrime & frequentissime ceu à cursu incensa, cor frequentius celerius, ac debilius quàm in paroxysmo movebatur: brevi tamen vires recuperavit, in pedes surrexit, leviculo baculi attractu cucurrit & solitas latebras quæsit. Verùm non longè inducitur concedebantur, stanti enim caput & pedes anteriores subitò & vehementius in altum abripiebantur; plerumque primum oculis clausis, postea etiam apertis, ac si in somno torrita fuisset ipsaque coma vigil pateretur: quandoque etiam caput retrorsum trahebatur. Hi Epilepsie prodromi cerebriores & vehementiores erant, quàm primò paroxysmum præcedentes; mansere tamen hæcenus sensus integri: crebriò mingeat, alvò semper oclusa, Vix horæ quadrante elapso rediit Epilepsia, in qua stans proliebatur cum impetu quodam in pavementum: in principio artus, truncus & caput valdè quassabantur, mox artus & truncus, capite retracto, rigebant, pedes posteriores mirè elongabantur tensique manebant. Os claudebatur, oculi fugebantur: respiratio erat intercepta; nulla spuma ex ore prodit: cor vehementer, citissimè, sed æqualiter move-

movebatur: paroxysmus iste citius primo & sua sponte remisit. Cessante paroxysmo oculos movit, hinc inde circumspexit, celerrimè, ceu post cursum, respiravit, sicca lingua longè exsertà, ceu valdè defarigata & debilitata diu sinistro lateri incubuit; decabue pedes nunc tremebant, nunc succutiebantur. Compulsa ægre tandem surrexit, aliquor passibus incescit, aliquandiu parieti innixa stetit, torve circumspiciens, quandoque ringens. Paulo post denuo imminenti Epilepsie prodromi apparuerunt, brevibus intervallis incrementales, vehementiores prioribus; nihilominus oculis nitidis & veluti flammis circumspexit. Vix horæ decimæ signum perfonuit, tertia vice correpta fuit epilepsiâ vehementissimâ; at nec in hoc paroxysmo spumavit. Cessante paroxysmo primùm oculos movit, mox citissime respiravit, linguam aridam longè exseruit, & quamvis senibus videret, nihilominus artus nunc rigeant, nunc succutiebantur, nunc veluti tremebant: post aliquam quietem compulsa surrexit, leno gressu pedibus veluti rigidis incescit, posticos pedes quasi trahendo; parieti rursus innitenti caput motu convulsivo retrosum trahebatur & quævis scæmi humilioris affari caput valide crebro fortiterque allisisset, simul in altum sublevis pedibus anterioribus, locum tamen non mutavit, torve semper circumspiciens & baculo monstrato ringens. Dimidia ante undecimam matutinam forti paroxysmo omnibus sensibus abolitis prostrata fuit, omni genere motuum convulsivorum exagitantur, cum respiratione intercepta, citra ullius excrementi sensibilem excretionem: duratio hujus paroxysmi cæteris non longior fuit. Finito paroxysmo instar mortui jaceit, mox celerrimè & frequentissime respirare & oculos movere iaccepit: sensibus integris nihilominus multifariam artus moribus convulsivis afficiebantur; vidit, vellicatis aur compressis auribus signa perceptionis dedit; dum pulvis tabaci naribus indebatur, reniti conabatur, mox caput succussit absque sternutatione, nasum lambit & aliquandiu vegetior videbatur: nunquam tamen etiam compulsa surrexit; oculi turbidiores fiebant: motus convulsivi subinde invalescebant, manentibus respiratione & sensibus; labia tremebant & quandoque motu Cyaleo torquebantur: paulo post cor magis magisque in motu clanguit brevique citra paroxysmum Epilepticum planè substitit & canicula vivere desit. Pectus statim fractis costis aperuimus: Cordis dextrum ventriculum sanguine rurgidissimum forfice dissecidimus, cum impetu sanguis rutilus ad ulnæ dimidiæ altitudinem profuicit, licet nec vel minimi motus vestigium in corde apparuerit: neque in hoc ventriculo neque in illius auricula neque in Vena Cava vicina vel minimulum grumulum, aut granulum coagulati sanguinis invenimus: indito digito insignem calorem in hoc ventriculo perceptimus: Inciso sinistro ventriculo prodijt sanguis copiosus, splendidus rutilus, at citra impetum: & isto erat grumulorum expers: Indito digito nullum calorem dextri ventriculi majorem, tactu iudice, deprehendimus. Sanguis extravasatus protinus in grumos concrevit, ut & subclavia sinistra, jam aliquomodo cadavere refrigerato. Pulmones erant molles, non inflati, sed aliquantulum collapsi, subrubri, alicubi maculis rubris quasi conspersi. Imò ventris apertè primo manifeste vidimus ventriculum secundum longitudinem corrugari, sulcis rectis & profundis planè conspicuis; postea etiam, fibris circularibus motis, circa antrum pylori, circa medium & versus stomachum, contrahebatur: à contractione ventriculus minor & angustior evadebat; relaxata contractione magis distendebatur & amplior, quàm contentorum fluidorum & crassiorum moles postulabat, manifeste reddebatur; repetita contractione rursus minor & angustior fiebat idque sæpius alternante contractione & relaxatione: Intestina omnia, etiam rectum motu peristaltico sursum deorsumque movebantur. Hanc intestinorum & ventriculi motum, diu continuantem vidimus, pridem emortuo corde & sanguine prope omni effuso, quandiu scilicet hæ partes calebant. Dum intestina movebantur, observavimus contenta metaperistaltico propelli ulterius; alicubi portio intestinali inter duas constrictiones stans pertinaciter retinuit, ut nec vi sursum deorsumve adigi possent, quod forte in colica & affectu hysterico credito frequenter fieri solet. In spatio vix eo hypochondrii sinistri inter ventriculum & lienem ac crura diaphragmatis & renem sinistram calorem tactu comperimus, cordis calori prorsus non imparem. Ventriculò à portione gulæ in dorso, seu summitate secundum longitudinem ad duodenum inciso, occurrit in ipsius fundo bolus nondum penitus dissolutus, mucos turbido immersus & obvolutus: aderat quoque aliquid pulcræci, juseulo avenaceo, quod manè devoraverat, non absumile; ossum & cartilaginum fragmenta; quibus remotis nihilominus superficies mucos oblaebatur: omnium contentorum pondus vix 3 ij. vel ad summum 3 iij. erat, quamvis ventriculus non distensus 3 viii. capax esset. latera superficiei ab omnibus contentis mundata anfractus rubebant, ceu inflammati, magis superne & ad latera, quàm in fundo, minus circa stomachum: rotum antrum pylori album permansit; foris nulla inflammatio apparuit; ac vasa dorsum perreptantia à sanguine rurgidiora debito erant.

Separatâ tunicâ fibrosâ foris, quod celerius quàm cunctis, aut laucetta succedebat, circa stomachum & sub pyloro in duodeno glandulas sporadicas plures tunice nervee adhaerentes conspexi, in tota reliqua superficie hujus tunice nullas, at plurimos vasorum sanguiferorum & nervorum ramulos illam perrepantes, eique se immergentes. Ablatâ tunicâ fibrosâ solum nerveam inflammatam vidi; omnes anfractus oblitterati erant, plana prorsus apparuit ac solummodo muco pellucido oblita videbatur primum, postquam verò aquâ tepidâ macerata fuerat, interna nervee superficies granulata & quasi glandulosa evasit, multo muco pellucido nihilominus obrecta; muco deterso plures aphthae in conspectum venerunt. Superficies granulata facile abscessit à nervea; in illam nullum vas sanguiferum desit & manifestè constitit, nihil nisi tunicam crustaceam esse, quæ pelluciditatem affusâ tepidâ amittit, crassiorque facta facillè abscessit à nervea, non totus atque illa, quæ linguam obtegit, fervidæ insula.

In externa parte tunice fibrosæ vidi centrum quoddam fibrarum rectarum non procul à stomacho, à quo fibræ rectæ sursum & hinc per dorsum, ad latera & deorsum per fundum ad pylorum usque, seu radij, diffundebantur: sub his latebant Circulares nerveam tunicam immediate involventes: hæc circa stomachum carnosæ, hinc ad antrum pylori magis albæ & graciliores, circa antrum pylori crassiores, densiores & planè nerveæ erant: illis circa antri pylori finem remotis, lumbus in duodenum prominens evanuit. Intestina foris albicabant, quamvis vasa sanguifera turgere: aliquot in locis vasa lactifera ad latera, non in convexa parte nec ubi mesenterio annectuntur, manifestè emergere vidimus. Illis incisus in duodeno & jejuno aliquotusque mucus turbidus continebatur, in ileo aliquid pulchelli & portiunculæ nuci Vomice similis, item excrementa liquidiora, circa ejus finem compactiora, in cæco & recto in scibalas coacta. Contentis sublagis duodenum & maxima pars jejuni inflammata, in ileo hinc inde maculæ rubræ, nunc ampliores, nunc angustiores, apparuerunt: rectum duodeni & jejuni instar inflammatum fuerat. Agmina glandularum intestinalium non magis quàm alie partes inflammatae erant: uno alteroque foris presso manifestè prodijt mucus turbidus: glandulae solitariae cæci manifestè osculo patebant: omnes tunice insculptas esse clarè videre potuimus. Vesicula biliaria, ductus communis & tres hepatici soli & seorsim aliquotusque incedentes, antequam communi infererentur, scil. major sinister, minor dexter, minimus medius, superne ex cavo hepatis emergens, omnes bile admodum turgabant. Plura quoque vasa lymphatica diffentissima in cavo hepatis occurrerunt. Hepar erat mollè, rubicundum, naturali simillimum: Lien lividus, major debito & duriusculus: Pancreas naturale duplici ductu præditum fuit, quorum quilibet peculiari ostio, dimidij digiti distantia scil. habet in cavum intestinorum. Ren dexter sanus fuit, sinister foris lividus & inæqualis. Vesica erat vacua, contracta, inferius præsertim circa urethrae insertionem in vaginam, inflammationis indicia ostendit: Collum vesicæ uteri laxa erant. Testiculis seu ovarijs destituebatur, nam castrata fuerat, relicta maximâ parte uteri.

Receptaculum Chyli amplum fuit, continuit Chylum multâ Lymphâ dilutum: eo inflato æt celeriter ad auriculam dextram pervenit. *Clar. D. D. Brunner*, præter ordinarium ductum thoracicum inverse vas quoddam insigne, quod Lymphaticum credidit; hoc in latere sinistro per thoracis carinam, juxta portam supra ramulos intercostales ascendit, & ductum thoracicum conscendit eo loci, ubi versùs latus sinistram declinare & ad suam insertionem properare consuevit; hinc pertexit ad glandulam quandam supra gulam positam, ubi visum subterfagit: inflato ductu thoracico observavit quoque hoc vas inflari atque indito mercurio vivo sursumque truso vidit mercurium sub cava à capite descendente, facto circulo, propè insertionem ductui thoracico inferi ac contenta cum ipso in subclaviâ fundere. *D. D. Brunner* die seq. carniem rostro corvino confregit: in sinu longitudinali nullum sanguinem grumofum invenit. Ventriculi scatebant lymphâ: cerebri mole vola manu pressa ex infundibulo circa glandulam pituitariam abscisso lymphâ stillabat, minime vero ex processibus mammillaribus etiam resectis, quos manifestè impervios deprehendit: minimeque in eoryza per os cibiforme in narium eavernas mucum exstillare didicit. Nec in hoc nec in alijs canibus glandulam pinealem hactenus invenit.

*Hist. 3.* Canis nondum ætatis annum supergresso, mediocri magnitudinis, *Cl. D. D. 166.* *Conrad. Brunner* d. 1. Nov. 1677. vulnus in dextro Epigastrio oblongum, in cavum abdominis penetrans infixit, duodenum cum pancreate & portione omenti extra vulnus protraxit, filum sericum cum acu prope insertionem ductus pancreatici traduxit, fortiter constrinxit ac trans vinculum Pancreatis ductum penis cum ejus & omenti portione abscidit; vulnus confuit, quod citra traumatica coaluit, cane frequenti linctu præcipuam opem præstante. Canis paucis diebus elapsis edit, cucurrit, sanissimi instar se

habuit, atque ad Januar. d. 2. 1678. sospes & incolumis vixit; nec in illo vel min.  
nium vitium in actionibus naturalibus, vitalibus & animalibus animadvertam fuit, ca-  
nes majores etiam adoriens victor recessit; famelicus hero suo Lanioni non semel fu-  
sta carnis, vitalina imprimis, surripuit, ut propter tot furta ad mortem damnares  
fuerit, quomvis magni ipsum constiterit; nam illo debitum centum florenorum à pau-  
perculo ad incitas redactio expungebatur. Cum vagabundus esset, ne experiretur cer-  
titudine de ductu pancreatico abscessio nobis periret, die 2. Januar. 1678. Dissectioni in  
predio meo, hora 2. pomerid. præsente Clar. D. D. *Heinrico Scretia*, Clar. D. D.  
*Brunnero* & D. *Matthæo Scherpfio Durlac. Med. Licent. pulv. Coclearum Ind.* 33 cum  
jusclo infadimus, vix quadrante horæ elapso bis cocculas copiosissimo muco immixtas  
evomuit; incescit aliquandiu vegere, postea ceu vertiginosus nutabat, semel atque ite-  
rum convulsiones supervenerunt, stante ceu exterrito caput retrahabatur & pedes ante-  
riores attollebantur: verum ante tertiam pomeridianam omnia convulsionem aut gra-  
viora minitancia evanuerunt; hinc inde cucurrit & sibi fugâ consulere tentavit. Post  
3. pomer. coccularum costularum 3 ij. cum mica panis in bolum coactas intrusimus:  
at nec hic bolus illum multum affixit: circa quintam Vespertinam quievit: circa 6.  
Vesp. bolum cum multo muco & frustulum ossis evomuit. Post. 7. panis frustula &  
ossicula objecta avide devoravit: totâ nocte quierus fuit. die 3. Jan. mane vegetus erat,  
ac si nihil adversi expertus esset, cum importunitate cibum sollicitavit. Circa eum pa-  
ne in bolum redactum: nullum symptoma observatum ad decimam usque, tum larebras  
quæsit, fugam mœditatus est, sub fornace aut scannis delituit quierus: paulo post vali-  
dè ceu vomitatus eructavit, quamvis nihil egressit. Post 10. ex limatutz Nacis Vo-  
micæ 3j. & pane duos bolos confectos intrusimus, primum statim evomuit, alterum reti-  
nuit; aliquandiu sani instar hinc inde cucurrit, scibalum durum, magnum, ficosissimum  
egessit: brevi postea stans subito exercebatur, incescit cruribus divaricatis & pedibus  
anterioribus proterentis, omnibus pedibus quasi rigidis nec amplius flexibilibus: quiescenti  
ab ingressu caput & reliquus truncus retrahabatur iteratis vicibus, ac si quis ipsum ma-  
nu circa cervicem & lumbos prehensum vi quadam invitum retrorsum ageret. Vix horæ  
quadrante præterito januz limiti insistens, cum impetu quodam à paroxysmo Epileptico  
vehementissimo terrorum, ultra duos pedes à sua statione, projectus fuit, in quo artus &  
caput nunc succutiebantur, nunc retracto capite extensi & rigidi manserunt, eum omnium  
sensuum abolitione. Paroxysmo gravissimo superato aliquandiu, ceu à longo cursu scissus  
jacuit, & anhelose repitavit: mox tamen surrexit & aliquot passibus cucurrit. Brevi secun-  
dus paroxysmus successit priori vehementior & diuturnior, quo exantato rursus pedibus insti-  
tit & aliquo usque progressus est: verum brevioribus intervallis tertius & quartus paroxysmus  
gravius ipsum affluerunt, nam præter abolitionem sensuum manifeste respiratio intercipie-  
batur; pulsationem cordis inæqualem, scil. nunc debilem, nunc fortem, aliquando per plu-  
ra momenta intermittentem, maxime in quanto paroxysmo deprehendimus: paroxysmis  
cessantibus, ceu mortuus jacuit & artus ac caput motibus convulsivis, sensibus integris, con-  
tinue succutiebantur, anhelose imprimis stans paroxysmis respiravit. Ante 11. antemerid. 4.  
paroxysmo correptus fuit, nec prioribus moribus convulsivis ferociore, nec diuturniore, at  
pulsus cordis inæqualior erat, sæpeque intermisit aliquandiu rediitque, tandem prorsus sub-  
sistit artubus & trunco flaccidis & protus flexibilibus atque ita vivere desijt. Statim spe-  
rimus pectus; pulmones quasi miniatæ erant, rubicundiores tamen in dextro quàm in sin-  
istro latere, in quorum extremis ramuli sanguiferi turgidi admodum fuerunt; manibus cavo  
pectore immisis mire omnia fervere experti sumus. Dissecto pericardio cor amplissimum in  
conspectum venit. Ventriculus dexter ejusque auricula, venæ pulmonicæ, cava ascendens  
& descendens, azygos omnesque intercostales summo opere à sanguine distendebantur; mi-  
nus auricula sinistra. Inciso dextro ventriculo sanguis largiter emanavit isque fluidissimus  
nullus grumulus vel in ventriculis, vel in auriculis, vel in venis etiam minoribus repertus  
fuit: Vase autem terreo vitreato exceptus mox in grumum coaluit, ac aliquandiu repo-  
situs tertia pars in serem solvebatur: quod prunis suppositis, in gelatinam, instar feri huma-  
ni, concrevit. Imum ventrem D. D. *Brunnerum*, cautissime aperuit, vulnere perfecis-  
sime consolidato intus in epigastrio dextro omenti portio, & duodenum, medianibus fibris  
oblongis, ut & peritonæo vicino, accreverunt; lobus dexter hepatis convexi intermedijs  
fibris oblongis, diaphragmati annexus fuerat. Ventriculus amplus fuit; in superficie  
à rugis & manicalis veluti asperiusculus, ob venas sanguine turgidissimas aliquomodo  
variegatus; antrum pylori album; pylorus & stomachus satis arcte constringebantur.  
Omentum sanum fuit: Lien fortis quasi granulatus, instar glandulæ conglomeratæ:  
Duodenum amplum & plura ex tenuibus stribus turgebant: rectum & cecum etiam  
debito ampliora apparebant: pleraque intestinorum hinc inde contracta statim detine-  
bant,

bant, non tamen adeo pertinaciter: in sulcis ubi constringebantur, circuli rubri videbantur. Venter mesentericæ aliarum venarum more à sanguine valde distendebatur.

Pancreatis pars superior & major satis florida & molliuscula, naturali rama, gracilior & durior erat; inferior gracilior, pallidior, lacera & veluti exsucca fuit: ut de experimento plane certus esset *D. D. Brunner*. duodenum & jejuni portionem cum pancreate & ductu hepatico exemit: osculum pancreatis duabus uncis infra bilarium intus prominulum durum & hians fuit, non tamen pervium esse inflatione aut stylo gracilimo deprehendere potuit: foris ubi ductus pancreaticus inferebatur atque abscisus fuit filum sericeum adhuc constrictum reperit. cui areolæ albæ accreverant: ductuum abscisorum extrema ab illo fore ad unciam abscedebant. & quasi retrocedebant: ductus inflati in extremo, ubi detruncati fuerunt, ne minimum flatum transmittabant, adeo perfecte coaluerunt, quamvis neuter ante vel post detruncationem ibi filo constrictus fuisset: ductum etiam metuit. vivo implevit, quem etiam pertinacissimè retinuit, quamvis vi quadam versum extensum adigeretur: adeo ut nec *D. D. Brunner*, nec nos spectatores dubitare potuerimus, nec vel minimam guttulam succi pancreati post abscissionem in eorum intestinorum missasse: inferior ductus vacuus fuit: superior multum succi adhuc continuit, seporis non acidi sed subtilis, qualis sero sanguinis inest.

Vesica urinæ turgidissima fuit, nam intra triginta horas canem minisse, nunquam observatum fuit. Ventriculo à stomacho ad pylorum inciso, circa stomachum circumquaque ad palmi fere distantiam occurrit protinus mucus pellucidus, aliquantulum spumefus, cui bolus ex nucè Vomica & pane confectus involvebatur: hinc usque ad pylorum invenimus mucum crassissimum, viscidissimum, valde spumefum, turbidum & obscure albicantem. Dererso mucō circa stomachum aliquosque, ut & superne usque ad antrum pylori interna superficies non parum rubebat, minus fundus & latera: antrum pylori plane album mansit. In duodeno & jejunio ultra sex spithamas reperimus mucum prope candore lacteum, viscidiusculum, turbidum prorsus mucō ventriculi dissimilem: ne guttula quidem bilis etiam prope ostium ductus bilarij, nihilque alieni alius rei huic mucō chyloso hucusque admixtum vidimus: Iede quatuor spithamas mucum magis fluidum invenimus, cum aliquot Lumbicis latis, cucurbitinis & teretibus, quorum plures adhuc vivebant, proboscides firmissime interæ intestinorum tunicæ insistentes, à quæ etiam hirudinum instar pendebant, sublato intestino. A termino hujus portionis fere ad finem illi mucum flavum, fluidum, satis copiosum, cui arsenici & auripigmenti scintillantes portiones in mixtæ erant, invenimus: occurrit etiam frustulum nuci vomicae limatæ simile, sed dubie, cum bolus adhuc in ventriculo integer fuerit. Reliqua portio illi vacua prorsus fuit: mucus illius paucus & valde inspissatus erat. Cæcum continebat materiam pulveraceam flavam, cui frustulum ossis & pilli permixti erant. Simile excrementum in principio recti occurrit, sed spissius. In fine recti scibala molliora continebantur, quam post nucem vomicam intrusam excreverat: in his scibalis adhuc reliquæ coccularum detinebantur. Omnibus contentis ventriculorum sublatis glandularum areolas, maxime illarum limites magis prominulos quàm in alijs conspeximus, imprimis longissimæ in fine ilei. In una areolarum glandulosarum, ubi arsenicum & auripigmentum subtiliter, punctula duo rubra in medio enituerunt: Ileum, ubi vacuum, & rectum solito quoque rubicundiora videbantur. In cæco & recto glandulas solitarias plures invenimus, clucescente clarè osculo in illarum medio, ceu ab acu inflicto: detractâ tunica fibrosa majorem numerum glandularum solitariorum clarè conspeximus, quæ tunicæ nervæ manifeste insculptæ erant: similes variolis, quæ ubi fibrosam respiciunt convexæ, ubi intestina concavæ fuerunt. Sublato etiam vasa sanguifera, maxime ad sinum tertium tendentia ipsique sinus sanguine turgidissimi erant. Neque in ventriculis, neque alibi nullam guttulam sanguinis extravasati aut albi liquoris invenimus: nihilque tale in cerebro aut cerebello visum fuit. Glandula pineali & hunc canem caruisse constitit.

*Hist. 4. Ex communicatione Clar. D. D. Joh. Conrad Brunneri.*

Canis medioeris magnitudinis & ætatis, vegeto 1677. d. 5. Aug. hora 1. pomerid. nucis vomica 3ß. cum mica panis in Bolum coactæ intrusit: deglutito Bolo alacris aliquandiu mansit & canino more blandiebarur: post se ad quiescendum composuit. Vix dimidiâ horâ clapsâ surgens pedibus stemuit ac incessit ceu rigidis nulloque articulo præditis: deinde convulsiones quasdam & subitaneos terrores expertus est, ac contentius extensâ lingua respiravit, surgens mox convulsus in terram prostratus fuit, denuo se erigens, ceu fulmine ictus, vere epilepticus corruit & aliquandiu jacuit: sub finem paroxysmi citissime res-

respiravit exsertâ linguâ, rursusque non usque adeo viribus exhaustis surrexit, nam paroxysmo, licet celeriter, respiravit. Horâ 2. pomer. Tetano aliquandiu affligebatur rursusque anhelosus surrexit. Circa 3. Epilepticus factus rigidusque jacuit aliquandiu, ac copiosa saliva ex ore emanavit. Post dimidium horam anxie respiravit, ac apertâ janâ aufugiturus per seclm descendens terribiliter convulsus deorsum præcipitatus fuit. Hac vice convulsiones dñi ipsum infestabant, spiritumque intercipiebant, unde quoque vivere desijt. Calentem adhuc incidit. Venterculus tumidus & turgidus apparuit. Vasa lactea plena & ductus thoracicus à chylo niveo candore nitens in conspectum venit, plurimæque vasa Lymphatica. In ventriculo cum gulâ & portione duodeni exempto continebatur plurimum cibi se. caro suilla, lardum alijsque cibi, quibus pinguedo innatabat; sublati contentis gulâ & pylorus albicabant: tota verò ventriculi concameratio atro purpurea, inflammata & gangrenæ proxima apparuit: etiam intestini cum ventriculo resecti portio tutilabant; reliquis intestinorum tractus superius rubicundus, inferius albicans, erat: continebant materiam chylosam, tænas longissimas: prope Cæcum folium graminis integrum & prout demorsum fuit à Cane, illibatum occurrit. Glandularum areolæ plures accurare in conspectum venerunt.

Canis iste, dum in vivis erat, tumorem in regione lumbari gestavit, qui nunc augebatur, nunc rursus minuebatur, brevi tamen rursus lacrementa sumens, sacculo dorso imposito similis videbatur: Injurie externæ repullulanti tumori ansam dedisse credebantur. Apertus tumor continuit substantiam polyposam suberuentam: Ren dexter huic tumori vicinus atrophici consumptus apparuit, in pelvis continuit substantiam grumulosam coagulata & officulam quoddam mollius: pelvis prope nuda erat, parenchymate renis fere omni consumpto.

*Hist. 5. Ex communicatione ejusdem Clariss. D. D. Brunneri.*

Felisonum Bimestri, 1677. d. 18. Octobris circa 9. antemeridianam, Bolus ex nucis vomicæ scrupulo dimidio, & panis mixtum factum intusit; non integrum deglutit; propter etiam partem rejecit: dimissa statim multum salivavit, hinc inde per cameram vagabundavit: crebros edidit: mox parieti innixa torve circumspiciens pedibus titubavit: rursus currens pressis gressibus, instar lepusculi, in pedibus, maxime anterioribus, obrigescere cepit, hinc angulos ad se occultandam quæsit, verum nullo in loco quietam manere potuit, arque paulo post, ceu fulmine tacta, derepente Convulsionibus prostrata fuit: jacuit aliquandiu convulsa: sensim ad se lacessita radijt, suspiriose respirans: surrexit ac corpus ad partem inclinavit capite nutante: Non longè indecè conecdebantur, nam redijt paroxysmus Epilepticus vehemens, qui statim post nonam antemeridianam vitam sustulit. Aperuit Cadaver dum adhuc cordis motum, sed summe inæqualem & intermittentem deprehendit. Ablato sterne ad cordis apertionem properavit, ut sanguinis conditionem perspiceret: erat ille fluxilis, fervidus & fumigans, nullus ei grumulus permiscebatur: non erat floridus, sed saturate rubens & ad nigrorem quendam vergens. Aperto abdomine vidit motum intestinorum tenuium & crassorum peristalticum sursum & deorsum, maxime recti, celerissimum, simulque quomodo chylus & fæces propellerentur. Ab appulsu aëris frigidioris conspexit intestina valde constringi. Venterculus immotus, flaccidus erat. Incisis, gulâ, ventriculo & duodeno, sublati contentis, observavit harum partium superficiem internam profus albicantem & omnis inflammationis expertem, secus ac in cane vidit. Contenta erant bolus muco turbido obvolutus & portio brassicæ in antropylori. *Idem ibidem.*

#### OBSERVATIO VIII.

*De Helleboro Albo.*

**H**istoria I. Catello trium circiter septimanarum die 14. Julij 1676. circa 2. pomerid. cum Clar. D. D. Henrico à Zavariz. Hellebori albi scrupulum lacti immixtum infudi, vix per momentum admissum maximam partem evomit. & paulo post flavum per alvum egressit; mox rursus aliquoties vomuit simulque convulsivis motibus variè jactatus fuit. Vix quadrante horæ elapso mortui instar in larus decubuit ac linguâ exsertâ mortuo similis jacuit, movente se solum adhuc diaphragmate: peractâ horâ cum dimidia semimortui abdomen incedi, unde inter sceandum pedes movere & vagire cepit: aperto abdomine, ventriculum flaccidum & rugosum invenimus: illo exemplo cor & diaphragma satis valide, sed per longiora intervalia, se moverunt. In inspiratione diaphragma

gnatis motus à cruribus incepit, ibique intumorem abdomen spectantem attollebatur, infernam planitiem expandebantur, eamque tensam, ita tamen ut in ambitu viderentur sulci inter fibras carnosas, crassas & veluti tumidas: in expiratione laxius, æquale & omnibus regis destitutum evadebat. Tum aliquoties linguam adhuc exseruit, sanguis ex venis & arterijs effluens rutilus, fluidus minimeque grumulosus erat. Ventriculo à stomacho ad pylorum superne dissecso invenimus pulverem Hellebori lacti grumoso & mucosissimo immixtum: contentis ejus sublatis circa stomachum intus ventriculus rubebat & aliquomodo inflammatus erat. Jam diu mortuo animale sanguis in ventriculis cordis partim fluidus partim grumulosus & obscurior erat. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO IX.

De Gialappa.

**H**istoria 1. Catello prope menstruo d. 13. Dec. 1675. cum Nob. D. D. Heiprico Secreta. Magisterij Gialappæ scrupulum dimidium sacchari drachmis duabus permixtum ori indidi, quem sensum abligurij. Paulò post capite semper ad latus nutavit atque incedens instar tumulenti vacillavit: ultra dimidiam horam nec alvum movit, nec vomitum ciebat: ac infuso lacte frigido tet atroflavescentia & viscida per alvum excrevit; nunquam vomuit. Tormina vagitu prodidit crebro. Inciso pectore in latere sinistro inter inspirandum aliquoties pulmonum lobus turgidus profiliit. Dissecso abdomine in hypochondrio sinistro ventriculus distentissimus prorupit. Denudatis omnibus imi ventris visceribus vidimus ventriculum se circa medium aliquoties contrahere accoartare; mox ramen rursus expandebatur ac sulci contractione facta explanabantur: dum intestinad latus remotis insignem lacteum canalem prope renem succenturiatum intueor, multum muci spumei cum grumulis evomit, quamvis diaphragma ad gulam usque divisum & solummodo in dextro latere integrum esset, patetque vomitum à ventriculo cirra diaphragmatis opem peragiposse: tum quoque corpus aliquod intra gulam sursum deorsumque moveri vidimus: aliàs gula amplior & plenior solito erat nec ventriculus circa orificium sinistrum constringebatur. A lobo hepatis imo, sub vesicula biliaria, ductus hepaticus peculiaris versus ductum cholidochum means, ei prope insertionem in intestinum jungebatur. Sterno maximam partem ablato & dissecso, diaphragmate nihilominus in inspiratione costas attollebat & largissimo oris hiatu aërem quasi capavit: tunc sibi relictus in ventrem se volutans pedibusque insistens fagere non semel antecebat. Glandularum intestinalium regionem & minutissima vasa capillaria ad illam pertinentia, foris pulchre vidimus in jejuno & ileo ac fibras rectas hanc regionem operientem. Ventriculo à sine gule ad duodenum secundum longitudinem superne inciso, cavitatem mucosissimam spumeam & frustulis lacteis coagularis plenam invenimus: nullum vel sacchari vel magisterij Gialappæ vestigium apparuit: deterso mucosissimo inflammatum in fundo ventriculum vidimus. Duodenum, jejunum & præcipua pars ilei vacua & prorsus munda erant, adeo ut nec bilis nec mucosus in illis conspiceretur: in reliqua portione ilei reperimus vermes teretes admodum longos, mucum flavum pellucidum condensatum: prope valvulam spumeam: in eæso parum muci condensati conspicebatur: rectum mundissimum, attamen valde rubicundum velutique inflammatum fuerat.

**Hist. 2.** Cani semestri Doctissimus Dominus Melchior Hurter d. 22. Mart. 1677. Magist. Gialapp. 3j. dedit: ab assumpto nunquam vomuit, subinde singultit, nec post tertiam horam ab ingesto magisterio alvus solvebatur. Vivo abdomen aperuit, foris in ventriculo sub stomacho sinistro macula rubra videbatur: ab uno orificio ad alterum superne dissecso ventriculo, tota cavitatis infarcta reperire fuit pane, rapis, radice petroselinæ, ossiculis ferme integris, omnibus aqua dilutis: de magisterio Gialappæ ne gry quidem occurrit; pylorus arctissime constringebatur, ut nec gracilior quidem stylus transmitti posset; Omnibus contentis sublatis, superior pars ventriculi inter stomachum & antrum pylori insigniter rubet; in fundo anfractus paulo rubicundiores erant; sub stomacho, ubi foris macula rubra apparuit intus portio illa alba ut & totum pylori antrum manserunt; intra anfractus hinc inde oscula vidimus ex quibus aliquid mucosi transsudavit. Intestina prope quatuor ulnas longa, à pyloro ultra ulnam mucum album, turbidum, ne minima quidem flavedine tinctum continebant; inde ultra ulnam ingens copia vermium cucurbitinorum cum magisterij Gialappæ portunculis occurrit; Vermes isti ex particulis semini cucurbitæ figura & colore similibus, intermedio quadam filo connexis compositi apparebant; quidam præpè dimidiam ulnam longi erant; quidam quoque se movebant adhuc; illorum extremum latum fuit, caput



verò in filum tenuissimum duarum vel trium unciarum longum attonabatur, quod intesti-  
norum tunicae inter se infigebant, atque à proboscide, hirudinum instar euni affixarum, pen-  
debant, ac si hoc vermium gremio non chylo alijve intestinorum contentis victitaret, sed li-  
quorem ex tunicis proboscide exfugeret: Inde ad finem illi continebatur liquor flavus, pel-  
lucidus, viscidus, cum portionibus magisterij Gialappæ & sordibus gryseis, quamvis ultra duas  
ulnas nec guttulam quidem bilis observaverimus: nullus quoque hic vermis comparuit. A  
valvula extremum recti & in cæco excrementa liquida grysea, humore aquoso diluta detine-  
bantur. Contentis remotis intestina à pyloro ultra ulnam rubebant, etiam ibi ubi vermes detine-  
bantur; sed minus, minimè in reliquis portionibus usque ad podicem, Areolæ glandularum  
manifestæ altiores erant reliquâ intestinorum tunica, oseula verò glandularum quasi oblite-  
rata & à copioso mucò oppleta videbantur, nihilominus, Intestinis foris pressis, mucus qui-  
dam instar minutarum guttularum prodijt; quædam areolæ inter se rubebant. Intestinorum  
quædam portiones ante dissectionem contractæ, partibus intermedijs inflatis, conspectæ, un-  
de proculdubio tormina passus est. Chyli receptaculum inflammatus, unde cor emortuum re-  
vifcere coepit, diuque movebatur; inflatis pulmonum bronchijs, ligatâ aortâ & auriculâ dextrâ,  
vidimus ærë ad ventriculum sinistrum penetrare. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO X.

## De Corona Imperiali.

*Ex communicatione Excell. D.D. Elie Rudolphi Camerarii P.P. & Archiatri Srenissimorum Principum Wirtembergicorum, Collegæ gratissimi.*

**A**utumno 1678 elapso bulbum *Corona Imperialis* drachmarum sex circiter pondere, *Clar. Joh. Rhodii*, observatione inductus, caninon magno intrudi curavi. Horâ elapsâ lassus videbatur & morosus, post vomebat, sed non bulbi particulas, verum mucum flavum visci-  
dum: subsequēbatur tremor membrorum & hunc convulsivi motus, mox his præsentibus vi-  
vum adhuc speravi canem: in ventriculo contracto & contracto repertiens bulbi particulas  
non planè integras, sed emollitas & in mucilaginem fere redactas, quibus exemptis ipsas ven-  
triculi tunicas, singulas rubentes, imò liventes magis; intestina penitus vacua, sed levinflam-  
matione & leviori excoaratione infecta; Hepar cum Liene & Pancreate à naturali ac vivido  
eolore versus livorem declinans; bilem iusto viscidiorē, chylum in eisterna ipsi dicata pau-  
cum eumque flavum ac viscidum conspexi. Relinquens canem avocatus per negotium ur-  
gentissimum, altero die, cum lustrare ulterius vellera eadaver, non ventriculus solus, vo-  
rum & intestina cum visceribus, tam infimi quàm medij & supremi ventris livida putrilagi-  
nosa & corrupta penitus erant. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XI.

## De Amygdalis Amaris.

**H**istoria. 1. Ciconiz femellæ die 6. Novembris 1678. hora 2. pomerid. præsentibus *Clar. & Excell. D. D. Christophoro Hardero, D.D. Heinrico Scretæ, D. Joh. Heinrico Hillero Stuttgardiano & Theodoro Zwingero Basil.* bolum ex Amygdalis amaris contusis & parum aquâ hume-  
ctatis, magnitudine nucis molcharæ, in gulam infra laringem intrusi; mox alium pari ma-  
gnitudine, quem statim iterum excussit: in pavementum locata aliquo usque incescit sed nu-  
tans ac temulenti instar vacillans; ad facilitandam boli deglutionem, boli forte in faucibus  
hærentis aquam infodimus, quæ tamē tota inclinato collo rursus emanavit. Igitur tertium  
bolum fortius compactum infra latyngem in gulam trusi, & blanda manu ventriculum ver-  
sus promovi, quem ipsamet vero deglutionis motu quoque ulterius propulit. Dum quartum  
bolum præparo, caput ipsi subito & violenter retrorsum trahitur, pes dexter succutitur,  
semel ore hianre ærë captavit; succutiendo semel adhuc pedem & caput re-  
trahendo, brevissimo spatio & quo vix quispiam sexies orationem Dominicam enun-  
tiaret, sine motu & sensu jacuit: pulsus cordis nihilominus ad latera sterni pressio pectore,  
per aliquot momenta adhuc tactu percipi. Nulli motus, nullæ corporis agitationes observa-  
bantur, similes illis quibus suffocatio impendit aut quibus collum illaqueatur; solummodo  
primum motus convulsivos animadvertimus, quibus tamen non rigebar, postea aliquid su-  
pervenit morbo potius attonito aut syncopi cardiacæ simile, nam sine metu & sensu diu ja-  
cuit cum oculorum obtenebratione. Horâ post obitum dum apertionem molior foris & in-  
tas insigniter caluit & sanguis ex vasis limpidior & fluidior emanavit, quam aliàs in avibus  
ob-

observavi. Gula à pharynge ad orificium sinistrum ventriculi incisa, intus aqua atrovirescente fluida maderat; pauca amygdalarum amararum frustula aquâ hæc dilata in illa fluctabant: Ventriculus plenus erat terrâ & arenulis aquâ istâ dilutis, absque carnibus & ossibus: Amygdalarum nihil distincte ferè apparuit; confusæ erant cum terra & arenulis. Omentum pingue erat; ejus & totius habitus pinguedo plane crocea & prope miniata & granulata erat. Corpus tubulosum à muco prorsus desnudatum solummodo aquâ viridi perfusum fuit; intus habuit sulcos profundiores quàm ciconia pridie à me secta, angustus quoque debirò erat ac si hæc gulæ portio ab amygdalis irritata se foris contrinxisset porius quàm aliter corrugata fuisset: Intestina flatibus distenta erant. Pulmones aëre turgiduli, eorumque vesiculæ conspicuæ & membrana circa claviculas, ubi aspera arteria cum gula pectus intrat, tensa & quasi expansa fuit. Sanguis circa regionem renis dextri fluidus, circa pectus in eodem latere partim fluidus, partim intra membranas clausus, coagulatio cum portionibus fluidis apparuit. Cordis ventriculi ambo vacui, paucis grumulis cum sanguine fluido intra anfractus & circa oscula vasorum supersitibus: reliquus sanguis, utpote dum calebat, adhuc fluidus, omnis emanavit abseisus vasis cordis magnis. In asperâ arteria ne granum quidem amygdalarum inveni, at plurimos vermes ascaridibus similes, sed crassiores & longiores circa asperæ arteriæ primam divaricationem & in bronchiis vicinis; in glomerem coacti erant. Pylorus flavus, arcte cludebatur. Duodenum uncias duas longum, admodum amplum, nucis juglandis capax, intus vasis rectis præditum; videbatur quasi tertium additamentum ventriculi: Intestina reliqua minora parvo digito parum magnitudinem & crassitatem ac cæca retinuerunt: Foris nodos pisi dimidiatæ magnitudine plures visi, 20. numeravi, erant albi duri: plures in duodeno ad insertionem ductus biliaris & pancreatis, pauciores infra illam, nulli in fine ilei, in cæcis & in recto. Duodenum continuit chylum turbidum paucis arenulis permixtum: reliqua intestina ultra sex spithamas chylum puriorem mucosum alicubi albicantem, alicubi suberuentum: inde ad cæca mucum crassum turbidum frustillatim: ex cæcis foris pressis prodit mucus chylosus turbidus: in recto parum mucî crassi apparuit. In toto intestinorum tractu ne mica amygdalarum amararum à nobis inventa fuit, quamvis nec vomuerit, nec alvum exoneravit: Cloaca plena erat urina craccæa. Absterfo muco à duodeno ultra insertionem ductuum interna superficies rubebat. Ubi foris nodi in intestinis conspiciebantur, intus vidimus oscula al quantum prominula, labiis filorum quibusdam nigris & duris, quædam semina milii admittentia, quædam angustiora: foris pressis nodulis ex quibusdam prodierunt vermiculi vasis sanguiferis præditi, ex quibusdam mucus pellucidus: omnes cavernosi, lentis, etiam majoris corpusculi capaces: An glandulæ seu intestinorum tubuli, an vermium niduli fuerint, certo dicere non ausim: & quamvis nulli vermes in tota intestinorum capacitate occurrerint, plures tamen in bronchiis morabantur non ibi post obitum geniti, cum brevi postquam vivere desiit aperta fuerit, nec casu aliquo illuc dilati fuerint.

*Histor. 2.* Columbo adultiori die 23. Novembr. 1678. paulò ante 2. Vespertin. presentibus *Clarissim. Dom. Dom. Heinricho Scretæ, Dom. Millero, & Dom. Zwingero*, paulo minus quàm drachmam amygdalarum amararum non excoctatarum, minutim confusarum & in bolum coactarum in fauces trusi. Alz unius pennis deorsus illum sivismus per conclave ingredi, quod aliquo usque citra titubationem peregit; interea ingluvies & collum inflari videbantur; mox pennæ in dorso & hinc cauda surrigebantur; paulo post epileptici instar in pavementum prosternebatur, alz, pedes & collum motibus convulsivis exagitabatur ac imprimis caput, post aliquot contorsiones colli, rorsum trahebatur statimque sine motu & sensu instar apoplectici prostratus mortuusque jacuit: quæ omnia tam celèriter peragebantur: ut vix aliquis ter vel ad summum quater orationem dominicam recitare potuisset. Asperæ arteriæ vulnusculum infixi, atque aërem inspiravi, sed frustraneâ operâ, nec enim vel minimum vitæ indicium rediit: Denudavi totum collum à pharynge usque ad sternum: Gula à pharynge ad ingluviem inflata & inflammata erat, prope pollicis capax, infarcta aliquot bolis amygdalarum: ingluvies tam à copiosis contentis, quam à flatu admodum distenta fuit: Contenta erant lentes, avena & frustula amygdalarum, omnia prorsus exsueca & prope nec vel guttulâ liquoris imbuiebantur: paulo rubicundior: reliqua portio gulæ, imprimis superficies interna corporis tubulosi irrigua erat ab humore fluido minus viscido, tenace minusque crasse, ac alias hoc in loco observatur, simul quoque coloratio, ac si plus humoris ex tubulorum osculis prolectum, & operimentum osculorum corporis tubulosi plerumque crassum & glutinosum absterfum fuisset. Ventriculus arcte contractus erat: continebat fursures, lapillos albos & pauca amygdalarum amararum frustula, humentiora omnia solio. In principio duodeni statim ostendit chylus crassus pultaceus: flavus; eo de-

runcato non procul à pyloro statim emerferunt lumbrici teretes; ascaridibus crassiores & firmiores. Abscessus venis & arterijs subaxillaribus, erupit sanguis copiosus fluidissimus & nitidissimus: apertis postea ventriculis cordis, in illis nec guttulas quidem sanguinis nec vel minimum grumulum, aliudve coagulato sanguini simile videre potuimus. Tunc & aliquandiu post adhuc calebat. Intestina ultra tres spirhamas continuerunt chylum crassum, viscidum, turbidum, subflavum cum multis vermibus: bilis se nullibi effudit: in reliquis intestinis nulli vermes, paucæ feces aliquantulum coactæ, maximam vero partem vacua apparuerunt: à pyloro ad extremum intestinorum nec vel minimum amygdalarum amararum frustulum reperire potuimus. In faucibus plura amygdalarum frusta & prope integri boli hærebant: quædam micæ illarum etiam palati rimam intrarunt. In occipite intra duplicaturam cranii spongiosam & quasi puniceam, sanguis niger, grumulosus detinebatur, eâ ratione, quâ in aviculis laqueo strangulatis his in locis semper reperitur. Ablato cranio medullæ spinalis principium, cerebellum & interstitium inter hoc & cerebrum omnia sanguine suffusa erant: exemptis cerebro & cerebello, tum interstitia, tum basis humectiora videbantur. Remotis membranulis in locis sanguine suffusis, sanguinem extravasatum & grumulosum cum ichore sanguineo reperi. In pulmonibus nihil vitiosi animadvertimus fuit.

*Hist. 3.* Columbæ eadem horâ pennas alæ detondendo vas sanguiferum in extremo apice faucium, prorupit sanguis largiter nec ab imposito atramento sistebatur: tandem hæmorrhagiam serramento candente adusto vase brevi suppressi: verebatur debiliorem fore, at vegeta persistit. Igitur Amygdalarum amararum decorticatarum & contusarum cum aqua in bolos coactarum drachmam circiter intrusi ultra osantem horæ partem absque ulla vacillatione incessit, unde secundâ vice unum alterumve bolum ultra fauces in gulam adeg; vegeta nihilominus incessit, & nondum languidæ ingluviæ non diu post hæc instabat: tandem pennæ in dorso surrigebantur & cauda potius deprimebatur: quàm attollebatur: mox paroxysmo epileptico prosternebatur: alæ pedes & caput validè concutiebantur; caput subinde retrahebatur; imo totum corpus jaçtatur. Paroxysmus brevi duravit, iterum se in pedes recepit, aliquandiu incessit: postea sensim pedes agrius loco movere, nec diu post illis non amplius insistere valuit; semel aliàs adhuc succutit, subinde collum leviculè torquebatur, tandem instat apoplectica: aliquando jacuit, tarde & intercessis vicibus respiravit & oræ hiantæ aërem quasi captavit aliquoties; oculi diu splendidi & nitidi permanserunt: paulo ante obitum demum obtenebrati fuerunt & post serè elapsam horam dimidiam spirare desier.

Gulæ superior pars amplior erat & rubescens: ingluviæ plena lentium, avenæ & frustulis amygdalarum amararum candentium; omnia ut in columbo exsucca. Corpus rubulosum impletum erat humore turbido lacteo, ut primum abscessum bene maturum hic ruptum crediderim: ejus superficies ab operimento mucoso, deterso humore lacteo, prorsus denudata & rubicundior solito conspiciebatur. Ventriculi contenta erant fursures, lapilli albi & paucæ frustula amygdalarum amararum, candida liquore aqueo & alicubi spumeo imbuta. In principio duodeni continebatur chylus crassus, viscidus, turbidus, subflavus cui lumbrici teretes immixti erant. Ex vasæ axillaribus fauciatæ profiliit sanguis admodum fluidus, ut in columbo; inde quoque ventriculi cordis prorsus vacuabantur, nihilque sanguinis in illis reperiebatur. Pulmones rubicundi erant. Intestina magis corrugata videbantur quam alias observatur; duodenum tamen rotundum & planius, ecu chylo impletum, mansit. Columbæ hujus corpusculum citius quam columbi perfrigit. Corpus spongiosum inter duplicaturam cranii & vasa sanguifera plena erant sanguine grumoso nigro: penitus ablato cranio medullæ spinalis principium, cerebellum, interstitium inter hoc & cerebrum etiam basis cerebelli, omnia sanguine suffusa erant, minus tamen quam in columbo, attamen plus liquoris aquei hic detinebatur: forsitan minus sanguinis in columba extravasatum fuit, tardiusque apoplexia supervenit, quia ob hæmorrhagiam prægressam fauciatæ vase multum ejus profusa fuit. Rima palati à frustulis amygdalarum amararum admodum insarta & quasi obturata erat: Larynx quoque & gula ad ingluviem usque valde à statu & amygdalis distentæ erant. Asperæ arteriæ annuli cartilaginei integri sunt, ut etiam à gula valde impleta comprimî & coactari nequeat. In toto intestinorum cavo ne micæ amygdalarum amararum apparuit: continebat, ut in columbo aliquotiesque chylum crassum, viscidum, subflavum, turbidum, cum plurimis vermibus teretibus, nullibi bilem. In reliqua portione feces coactas, alicubi mucum condensatum; magna pars vacua erat. Ureteres urisæ cretaceæ transparenti pleni erant. Oviductui inerat ovum sigata nucleî pinei, sed duplo crassius: in ovario plurima ova lymphâ pellucidâ plena, pisum ignitæ, nulla lutea continebantur.

*Hist. 4.* Felis bimæstris serè die 14. Maji 1679. ex alto cecidit & in primis os graviter læsit ut

ut ab illo tempore nec edere, nec fugere valuerit: die 17. Maji. *Filius meus Job. Conrad. Med. Doff. præfente Excell. Dom. D. Heinricho Scretæ & D. Hillero* drachmam circiter amygdalarum amararum non excorticatarum in bolos coarctarum intrusit ante secundam pomeridianam, paulò post quasi semi paralytica pedes posteriores languide traxit, anterioribus verò vix repare potuit: non diu postea sequebantur paroxysmi quatuor epileptici, qua misè artus & caput exagitabantur & tendebantur: inter unum alterumque paroxysmum inducè concedebantur: post ultimum paroxysmum anhelose spiritum traxit: ante tertiam vespertinam spiritu sensim deficiente, respirare desit. Detræcta pelle, in inguine dextro & circa costas ejusdem lateris portiones, forte à casu sanguine suffusæ erant: pinguis adhuc fuit quamvis parum intra triduum alimenti nactus fuerit vel prorsus nihil. Aperto abdómine ventriculus satis amplus, sed foris rugosus & multis sulcis orbicularibus, seu transversim ventriculum intersectantibus præditus apparuit: incisus ab orificio ad pylorum nihil præter bolum ex amygdalis in unum bolum compactis & muco pellucido involutis continuit: bolo cum muco sublato superficies, imprimis in fundo & superne inter duo orificia, rubuit. A pyloro duodenum & jejunum ultra palmam bile croceâ ringebantur, postea ultra aliquot palmas intestina erant alba vacua, nihilque præter paucos vermes continuerunt: hinc rursus portio palmaris flava, reliqua ad principium recti alba & vacua erat. Rectum impletum fuit fecibus nigris piceis, foetidissimis, forte à sanguine post casum inglutito & huc è ventriculo & intestinis detruso. Vesica ab urina admodum distenta erat. Ductus biliaris admodum bile targebaræ hepaticus supra insertionem ductus vesiculæ nodosus fuerat. Cor sanguine plenum cum auriculis, faucium fudit sanguinem admodum fluidum & prope aqueum ratione consistentiæ, cætera rutilum. Pulmones non erant inflammati; nisi in lobo dextro rubor apparuit, quem potius adscripsi casui.

*Hist. 5. Eodem Clariss. Dom. D. Scretæ & Dom. Hiller Gallo* gallinaceo intruserunt bolos ex amygdalis amaris, unde octies alvum exoneravit & post miras convulsiones iterato percellas mortuus est. Ventriculum examinandum transmiserunt: foris ejus caro atro rubescens erat. Amygdalas in corpore tubuloso & atrio ventriculi substituisse reperit: abiterfo muco minus viscido rota superficies interna corporis tubulosi admodum rubicunda erat, ut & atrium ventriculi. In fundo ventriculi furfures & lapilli liquore aqueo diluti continebantur, cum aliàs contenta sicca & exsucca sint.

*Hist. 6. Ex communicatione Clar. D. Joh. Heinrichi Hilleri Med. Licent.*

Anno 1679. Die 9. April. faucibus bimulæ felis amygdalarum amararum c. corticibus contusarum 3 ij. per vices intrusi, non multo post universum os faucesque copiosissimâ primo tenuiore mox tenaciore ac viscidiorè lymphâ, diffuiebat quasi, insequente tremore totius, quibus cessantibus, sopore seu somnolentiâ notabili prehensa, uni loco immobilis, oculis conniventibus, quasi affixa esset, inhærebat, post autem horæ fere dimidiæ decursum, caput ipsi aliquoties violenter satis concutitur, quo motu excitato oculos aperit, adstantes adspicit, clamat, fugamque tentat, frustra tamen, progredi enim atque loco se movere nesciebat, leviter autem non multò post ad progrediendum impulsâ, ægre admodum vermibus ad instar rependo, posterioresque pedes penitus resolutos post se trahendo per pavimenti longitudinem ad ejus fere medium perrexit, ubi dextrum in latus decumbens, violentissimis ventriculi subversionibus aliquoties tentatur, omneque prius devoratum per vomitum reddere cogitur, quo factò brevi post pristinas recollegit vires, solâ aliquandiu durare salivatione.

*Hist. 7. Ex communicatione ejusdem D. Licent. Hilleri.*

Subsequente die 12. April. fortè ac grandiori feli 3 ß. amygdalarum amararum exhibui, ast sine ullo insequente affectu vel alteratione præter levissimum quendam ac vix notabilem soporem, quo tamen brevi discussò ac evanescente sanam dimisi.

*Hist. 8. Excommunicatione ejusdem D. Licent. Hilleri.*

Die 21. April. Cani juniori 3 v. Amygd. amar. intrusi, hic elapsâ semihorâ immutatas adhuc amygdal. per vomitus repetitos rursus ejecit, & nullo alio aecedente symptomate citissime convaluit, huius secunda vice 3 ij. Amygdal. amar. in fauces ingessi, at pari plane successu ac effectu, rejecit enim iterum uti prius devorat. amygdal. postquam per dimidiem vel quod excurrit horam eas retinuerat & priorem recuperavit sanitatis statum quo & adhuc integro fruitur.

Hijf. 9. Ex ejsdem D. Licet. communicatione.

Die 9. Maij Vulpeculo novem vel decem præter præter septimanarum, amygdalas atque ras num. 5. minutim incisās inque globulos duos mediante saliva concinnatas, devorandas exhibui, perexiguo dehinc elapso temporis spacio, puſilla hæc vulpes toto corpore tremens, incerto talo vacillante gressu temulentorum in morem incedere, capite & pectore progrediendo, per vices in terram procumbere, mox etiam diris omnibus convulsionum speciebus rentari cepit, cum pulſu cordis celeritimo ac imbecilli, respiratione etiam quadantenus laxā. Rebus sic constitutis cultro, durantibus semper convulsionibus subijcitur, ubi apertæ abdomine ventriculum reperiebam collapsum omnino, mollem ac flaccidum, ab omni convulsione immunem, pariter & intestina quiescebant, omnisque eorum motus ablatum fuit, maxima interim in partibus externis ferocia perseverabant convulsiones, quæ tam diu durabant, donec thorax apertus erat, hoc enim dissecto sub atrocissimis convulsionibus, cordisque vehementissimis motitationibus exspiravit. Dissectus ventriculus leviculis plicaturarum ejus exhibuit inflammationes, pylorus arctè clausus erat, œsophagus contra referatur parebat, intestinum duodenum conspurcatum deprehendi hîc porracea copiosa, nullo modo autem inflammatum erat, in fine jejuni similis latrabat materia, non tamen in tanta copia, &c. *Cl. Joh. Jacob. Wepferi Tractatu de Cicuta Aquatica.*

## OBSERVATIO XII.

De Antimonio,

**H**istoria I. Cani robustiori præsentibus Dom. D. Henrico Scretæ Dom. D. Gavelino, D. Sibellæ van Geor. & aliis Medicinæ operam dantibus, die 25. Novemb. 1675. Flor. Antimonijs alio 3ß. carni elixæ involutum objeci: cum à bolo devorato non vomeret; Croci metallorum 3ß. similiter occultatum porrexi, et non omne inglutit, nihilominus postea vomere cepit & quidem nihil nisi recensiter devorata, nam jejuno antimoniatæ dare consilium erat. Quæprimum pedibus & capite scamo alligatus fuit, vomere desit: et largissime mixxit. Inciso abdomine ex vulnere nondum satis amplo ventriculus flatibus distentissimus prorupit: dilataro vulnere magis adhuc extendebatur: inter abdominis incisionem levicule fasciata fuit superficies ventriculi fibrosa; retrocessit ac crassior & carnosæ evasit, nerva interna prorsus nuda apparente aliquo usque. In ventriculo in apicem ducto vidimus fuleos reſtos, utcuque valde distentus esset: prope stomachum in sinistro latere macula palmo latior saturate rubicunda apparuit, quæ tandem atro rubescens evasit. Idem flatibus tantopere distentus erat, fibræ circulares non nisi levicule, & quidem motu in duodeno occipiente se contraxerunt; ambo officia arctissime clausa pertinaciter status inclusos retinebant: compresso ventriculo fortiter manibus flatus sursum per stomachum & gulam eruperunt, cum ructus; postea ventriculus circa pylorum & in medio à fibris circularibus constringebatur ac contenta evomebantur; observavimus semel in illa contractione diaphragma vomitum quasi adjuvasse, fortè quadam succussione brevissimis intervallis repetiā. Flatibus non semel expressis ventriculus denue implebatur atque admodum distendebatur, quibus fortè manu expressis, rursus quoque primùm circa pylorum, postea etiam in medio contraheretur. Per siphonem aquâ calidâ injectâ etiam constrinxit & levicule etiam presso ventriculo copiose muscum bile permixtum evomuit, ipsamet aqua mucosa facta. Ventriculus distentus tenui tunica præditus putabatur, exoneratus & à flatibus vaquus crassior evasit. Presso ventriculo circa pylorum, aut circa medium, aut circa stomachum mire vagiit & capite à visculis soluto obvia quæque morsu petiit. In vomituriente seu sua sponte, seu irritato ventriculo semper ore hiabat & exordium motus erat in duodeno, hinc pergebat ad pylorum ejusque atrium & medium, tandemque eiecit vomitu mucum spumantem nunc pellucidum, nunc subflavum & bile tinctum.

Ventriculum dum adhuc vivebat excidimus: inciso stomacho & superna ventriculi parte ad pylorum, nihilominus fibræ circulares pylori se contraxerunt: vacuus prorsus erat, solummodo musco pellucidâ interna superficies admodum anfractuosa, & circa pylorum bile tincto obtinebatur. In duodeno observavimus motum peristalticum promiscuè, nunc sursum nunc deorsum vegisse, qualem motum in lumbrico lato ulna longiore in hujus canis intestino reperto, atque aliàs in lumbricis, hirudinibus, intestinis ovium, canum & capræ vidi. Intestinum rectum sublaris musculis abdominalis se exoneravit. Ubi foris macula atro rubescens foris in ventriculi latere sinistro visa fuit, intrus

levicule

leviculus rubuit. Vesica, postquam vinculis scamno<sup>4</sup> affixus fuit, exonerata inter media tormenta rursus valde implebatur, quæ remotis muscularis abdominis nihilominus omnem urinae largiter expulit, sensim se constringendo, foris sulcis rectis apparentibus, ut tandem vix nucæ juglande major apparuerit. Diaphragma in inspiratione planum fiebat & in ambitu carnosio costis vicinæ, sulci recti conspiciebantur; inflicto vulnere ac indito digito sensu tunc digitum valde stringi: in expiratione relaxabatur & abdomen versus, instar veli à vento inflati utrinque protuberavit, non à pulmone deorsum labente, quod digito per vulnus immisso comperi, quo pulmones assequi nequii, sed ab aëre prius inspiratione attracto, nam digito facilius quam in inspiratione retracto aër cum sibilo prorupit; adeo ut aër omnino in pectoris cavum à pulmonibus penetraret unde pulmones inflati, utcumque arctissime aspera arteria ocludatur, sensim detumescunt, nisi statim juxta fornacem calentem suspendantur & celeriter extrema tunica siccetur. Quia canis iste diu famem toleravit, intestina vacua erant & ramulos lacteos pauculos intestinorum superficiem perrepantes vidimus. In mesenterio arteriæ venis multo minores & graciliores diu egregiè pulsabant. Chyli receptaculum, ductus thoracicus, in cane hoc unicus, & vasa lymphatica die sequente valdè à lymphâ turgabant. Uicunque vesicula biliaria post aliquot vomitus inanior & flaccidior evaserit, tamen noctu cum hepate in cadavere relicto, mane denuo plenior & turgidior apparuit. Glandularum areas, ut in aliorum canum intestinis, reperimus: in recto tamen majores videbantur atque aliàs, ex quibus foras pressio intestino erapit mucus turbidus.

In fine gulæ prope stomachum fibræ circulares erant nervosæ & validæ, unde tam firmiter stomachum & gulam constrinxerunt, flatuumque egressum prohibuerunt, ut non nisi vi sursum adigi potuerint. Externa tunica tota musculosa fuit. Suprema pars gulæ fascium partem obtegens crassior erat & multis glandulis ditata, unde foris illa compressa liquore quodam irrorabatur. Sphincter gulæ non solum à lateribus laryngis oritur, sed etiam pars superne oblique descendit: fibræ à larynge oriundæ prope circulares, ceteræ obliquæ sunt. Tonillarum oscula manifesta admodum erant; nihil in illis pilosi, ut in alio cane, vidimus. In caverna ossis frontis unicum vermem hircini similem, sed planiorem reperimus & acuminatum, acumine anteriore brevior, postico longior & quasi in filum angustum desinente. Rene secundum longitudinem incisio canaliculi in parte carnosâ lueulentius, in pallidior angustiores apparuerunt; transversum sectâ illius carne, porosa instar canis Indicæ videbatur.

*Hist. 2.* Castello projectio die 14. Julij 1676. cum *Clariss. Dom. Dom. Heiarico Screta* Viteri animonij *Hi.* cum lacte infudit, avidè deglutit & ne guttulam relinqueret os lambebat. Vivacior cæteris catellis, quibus Helleborum album, nucem vomicam & napellum ingessimus: mire tamen ejulavit & vagit per integram horam post sumptum pharmacum, licet hæcenus erectus incesse. Post horam nutare incepit, pedes posteriores subinde traxit, elumbis instar, mox tamen rursus bene incescit, interea doloris interni indicia clamore validiore continue edidit. Post secundam horam ab assumpto vitro animonij demum vomuit. Circa tertiam horam satis adhuc vegetus erat, nisi quod subinde nutaret, pedes posticos traheret & aliquando caput motu convulsivo quateretur, brevi tamen vires iterum recollegit. Post horam tertiam abdomen incidimus: inter secundum robur ostendit, vi sectionem eludere conabatur, morsu peribat obvia: vulnere amplo facto intestina & ventriculus cum impetu prorumpebant: Ventriculus supra modum distentus erat. Intestinis prorsus denudatis & extra abdomen propendentibus nihilominus fæces flavas, consistentiæ prope naturalis per alvum exoneravit: videbatur motus intestinorum peristalticus egregiè. Vesica urina plena erat, quamvis iterato minxerit. Ventriculum integrum excidimus, contenta largiter primum ex stomacho eruperunt, quoties se jam exemptus in medio constrinxerat, quod aliquoties fiebat, copiosius contenta expellebantur; tandem quoque motus peristalticus à medio versus pylorum contractis fibris circularibus pergebat, sed leviculus atque tum nihil è stomacho elabebatur, causam invenimus mucum crassum & grumum officium hoc obturantem. Contenta ventriculi erant liquor lentus, mucus viscidissimus, lactis coagululum, fragmenta straminea: omnia flavedine tincta. Sublaris contentis manifesta inflammatio circa stomachum aliquousque intrus exensa conspiciebatur: nulla in fundo & circa pylorum. Duodenum bile plenum erat. Vesicula biliaria à bile valde distendebatur & pellucebat. In inspiratione diaphragmatis motus circa crura incepit, ibique versus abdomen in gibbum attollebatur, reliqua vero pars cum centro nerveo in planitiem expandebatur, conspicuis nihilominus sulcis in ambitu ejus carnosio: motus iste valide peragebatur. In expiratione tensio relaxabatur ac diaphragma versus abdomen protuberavit. Incisus arteria epigastrica & plurimis vasis gastricis, multo profundius sanguine in motu animalis vegetus mâsit,

imo aperto pectore vagire adhuc conabatur & objecta momordit. Cordis dextrum ventriculum cum auricula abscidimus, nihilominus cordis reliqua substantia aliquoties, & quidem validè vera systole & diastole movebatur. Sanguis dextri ventriculi maximam partem fluxilis erat, portio quædam grumosa: obscurior fuit minusque rutilus quam ille quem profudit arteriis & venis imi ventris faucibus.

*Hist. 3.* A. S. Sutoris uxor ex pago nobis vicino, stature justæ, carnosa, aliquandiu cachectica, difficiliter spirans cum cordis palpitatione, lassæ, ita tamen ut negotiis domesticis diligenter vacaret. Molestiarum cachexiæ familiarium pertaxa ex suavis Vetulæ ejusdem ætate 1648. aliquot grana vitri Antimonii vino albo per noctem infudit; mane vinum cum pulvere cibavit: non statim virus suum exseruit, unde maritus domo egressus aliquandiu solam reliquit, interea antimonium enormes vomitus excitavit ipsamque humi stravit: maritus domum rediens humi prostratam, rigidam & velut mortuam reperit: varis modis illam excitare conatur & tandem faciem frigida conspersit, unde respirare cepit. Postquam ad mentem rediit nondum tamen vomere & postea convelli desiit, donec post iterato epota iuscula, ferocia antimonii domita fuit: attamen summe debilis permansit: postquam aliquantulum vires recuperavit, conquesta est de intolerabili pedis dextri dolore. Postridie *D. Iob. Georg. Cræmer Lithotomus* noster vocatus fuit, invenit pedem ad mediam fere tibiam nigrum & veluti atramento sutorio immersum non durum, non tumidum nec exulceratum; ad subitam hanc cutis pedis discolorationem obstupuit nec ob atrocissimum dolorem urentem, pungentem & læcerantem, sphacelum adesse inanimam inderece potuit: imposuit fomentum anodynum absque ulla doloris mitigatione: ipsemet postea accersinus clanculum aliquot in locis imi pedis etiam ad tendinem magnum acum profunde intrusi; puncturas iteratas non magis quam lignum aliudve sensu destitutum percepit: unde de sphacelo non amplius dubitatum fuit. Pedis abscisionem, ne malum ulterius serperet, maturandam suavi, quam *Excell. Dom. Dom. Io.annes Scretæ à Zaverzie*, tum temporis Archiater noster quoque non differendam statuit. Abscinditur pes palmi distantia à genu: in pede abscisso, dissecto & diligenter examinato sphacelus non tibiam mediam superasse cognovimus: vulnus non urebatur italo; sanguinem compescuit gossypium aqu. forti imbutum vasisque majoribus positum: totum operiebant pulvilli albumini ovi, cui pulvis sanguinem sistens permixtus, immersi ac vesicæ tegebatur. Sic sanguis substituit brevi, remotis pulvillis, adhibitis congruis, cutis pulchre succrevit, ac spes erat brevi pedem cicatrice opertum iri. Die 15. à sectione subito à catarrho suffocativo obruta, frustaneis omnibus medicamentis brevi desit. Aperto pectore pulmones arctissime maxime in dextro latere, pleuræ aceret; erant admodum maculosi, bronchia undiquaque mucosissimo spumoso adimpleta. In cavo pectoris aqua redundavit, ubi pulmones non adhæserunt. In corde polypos inveni. Ventriculus admodum distensus & flaccidus erat: Hepar pallidum & quasi variegatum p.n. diaphragmatis aliquot locis annectebatur. Lien naturalis major fuit, *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XIII.

*De Arsenico & Auripigmento.*

*Historia 1.* Ampliff. Dom. Clariff. W. Pr. Filiolus duorum circiter annorum Mense Augusto 1677. febris tertiana intermittente correptus fuit, in qua nihil periculosi animadvertum fuit; aliquando aliquot diebus intermisit, mox rediit, nullos certos typos observavit. 30. Mense Augusto cum locum habitationis transiret, febricitantem inveni cum inflatione ventris, non parum æstuantem & sicculosum: medicamentis congruis bibicis. 14. Septembr. satis bene habuit, atque illum à febre vindicatum parentes credebant. Paulo post inordinatos æstus sæpius passus cum siti, & licet subinde bene habere videbatur, nihilominus cadaver redoluisse matri videbatur: nunquam noctu nisi intra brachia Dom. Parentis dormivit. Febris quæ pridem periodos tertianæ intermittentis exquisitè observavit & aliquot diebus planè intermisit; postea prorsus anomala erat, nec ulli typhi animadvertendi poterant: nunc enim continua nunc intermittens, sine ullo typo, videbatur. A die 1. Octobr. stylo novo valde sitiit duravique ad mortem usque. Die 4. Octobris mane catarrho cum magna anxietate & suffocationis metu corripitur, venter inflatur; dantur syr. pector. cum aqu. prophylact. Barbett. à *Dom. Simone Schmid Chirurgo præstantissimo* unde vomuit, venter detumuit: vomitus continuavit. 5. & 6. Octob. fudor subinde frigidus emanavit, signa torminum dedit, mukum tussit, non convellebatur: aliquando diarrhoeam patiebatur, unde venter detumuit amplius: tum quoque subinde singulit, valde sitiit, æstnavit die 7. Octobr. *D. Schmid* dedit lap. Bez. Hoc mane *D. Mater* parabat aq. cordial. ex Cinnamon

in aq. coct. add. Saccharo; singulari Dei providentia Domin. Maritus aliam ob causam hypocaustum ingreditur & aquam hanc per colaturam Domin. Conjugem alloquens, observat in fundo vasis znei frustula candida instar lapillorum, & mox quid lapilli isti sibi velint, querit? ajebat saccharum esse, pernegat ille, cum saccharum in calida statim solvatur: gustu acrimoniam percipit: Domin. Chirurgus vocatus protinus Arsenicum Crystallinum agnoscit: accersitur ancilla, puella 16. circiter annorum, misterriata ferebatur se ante paucos dies frustulum Arsenici in vicino oppido W. precio à pharmacopoeo redemisse; frustulum in atrio domus sub vase vinario occultatum ultro attulit, & postea ulterius confessa est se portionem Arsenici confusi unam pulciculæ permisisse, alteram in aquam hanc conjesisse: puellam parum & vix quantum duo Cochlearia capiebant, reliquam Filiam adultiorem & sororem natu minorem comedisse: falsa quoque est se poreo d. 6. Octobr. Vesperi aliquid Arsenici esse permiscuisse, qui mane mortuus in hara repertus fuerit, atque hac ratione didicisse venenum hoc vehemens esse: postea nec minis neque equuleo ab illa impetrari potuit num sepius venenum hoc puello suggererit, præter illam vicem quo illud pulciculæ permiscuit. Antequam in vineula conjecta fuerat dicebat quoque puello aquam ex fungi & cobalti decoctione paratam ad muscas necandas, quandoque propinatam fuisse ab ancilla se adultiore, sed illam ad mortem inferendam, quod unice optavit, insufficientem fuisse, nam aliquando se ad miscellum suffocandum manibus os oclusisse: unde tandem de arsenico cogitavit. Astantes observarunt muscas gustantes aquam cordialem, qua à multis diebus puellis reficiendus erat, protinus mortuas fuisse, unde aquam hanc ex fungis pararam cordiali admixtam indubie conjiciebant. Puellus post meridiem à sumpta pulciculâ valde æstuebat, sitiebat, singultiebat, angebatur; sudor frigidus emergebat: non vomuit: toto corpore rubicundus evasit & maduit, in ore apertæ obortæ sunt quæ primum albæ erant, postea nigricabant. Puella adultior & media, sorores, quæ reliquum pulciculæ comederunt; statim vehementer vomuerunt ambæ; dedit ipsis D. Schmidt. Theriacam Andromachi, unde statim rursus & postea sepius vomuerunt: Filia natu major simul vermem mortuum per os excrevit, frasi tunc cum D. D. Secreta absens hunc pulv.

24. Pulv. antihætic. pot. ʒi. Bez. min. C. C. phil. præp. an. ʒi. m℥. F. p. C. Hujus pulv. ʒi. m℥. cum aq. scabios. ʒi. Syrup. violac. ʒi. m℥. de hac mixtura tum puello tum puellis sæpe dabatur quantum cochli j. capir.

Item 24. Butyr. Rec. ʒi. Sacch. alb. ʒi. pulv. memorati ʒi. m℥. sape portiunculam N.M. magnitudinis deglutiunt. Bibant emulsionem Amygd. d. cum decoct. C. C. pararam: vescantur hordeato: nihil vini concedebatur. Filia natu major diligenti horum usu d. 14. Octobr. st. n. extra periculum erat: minor nondum integre restituta erat, lingua adhuc tumuerat: sensum tamen postea his convulvit. Filiolus singulis horis pectus horruit, signaque lethalia invaluerunt scilicet extremorum frigus cum sudore frigido, anxietate, indicijs torminum, singultu crebro: nunquam vomuit post sumptam. 7. Octobr. pulciculam, ut 5. Octobr. quo die Sim. Schmidt quoque venenum datum credidit; unde illum gravius à pulcicula jejuno stomacho ingesta, puellas vero quæ vomuerunt minus afflictas purat. Puellas sensim viribus magis magisque evanescentibus d. 9. Octobr. vesperi hora lividum reddebatur. D. Chirurgus aperto eadavere & dissecto ventriculo in ejus cavitate nihil nisi aq. cordialem reperit: ejus internæ tuniæ exulceratæ, hepatis pars dimidia gryseæ & quasi elixa: Pulmones inflati admodum atro livescunt: pectus aqua flava plenum: Colon totum & magna portio reliquorum intestinorum à gangræna atro rubentia erant: in corde, Liene & renibus nihil p. n. observavit.

Postquam facinus anellæ veneficæ innouit, careeti inclusa fuit: interea disceptabatur, Num arsenicum causa mortis Puelli fuerit?

ICTUS quidam persuasus potius centum nocentes dimittendos, quàm unicum infonem vitâ multandum in dubium vocavit, quod omnes credebant & res ipsa loquebatur: Putavit ille necis causam fuisse febrem diuturnam: verùm demonstrabatur febrem tertianam simplicem defuisse aliquot diebus, rediisse autem febrem quandam nullos certos typos observantem & prorsus anomalam, atque hanc quoque intervalla sæpe aliquot dierum habuisse, quam adscribebant domestici aquæ muscas necanti, puello nequiter suggestit; quod Venefica non negavit factum fuisse, non quidem à se, sed ab ancilla socia, idem confirmavit mors muscarum subita, aquam cordialem dulcem omnis acrimoniz expertem degustantium, atque equuleo subiecta fidem meruit se hæc in re innocentem esse. Verùm cum hæc quoque febris nondum vires adeo exhaustisset ut ipsi mors imputanda foret, D. Simon. Schmidt persuasus erat arsenicum à Venefica jam d. 4. Octobr. st. n. alimentis admixtum fuisse, cum illud ad manus haberet, virulentiz in porco fecisset periculum 6. Octobr. & 4. Octobr. symptomata Puellis pateceret tali veneno attribuenda.



Cum & hoc per tormenta iterato tentata non falsa esset, obieciatur arsenicum causam mortis statui non posse, quoniam Puellus vix quantum duo cochlearia capiunt comederit, sorores vero omnem reliquam comederint & nihilominus evaserint. Itaque à Judice loci supremo, Excell. D. D. *Heinrico Scretæ à Zavorziz* & mihi proposita fuit.

An Puellus duorum annorum ab Arsenico pulicula permixto & in non magna quantitate scil. duorum cochlearium assumpto, antea valetudinarius evectus fuerit?

Vtunque Febris tertianæ intermittens tunc credatur & rarissime lethales compertiantur, rehellæ tamen ætati in ætatis quandoque post errores, maxime in cibando, aut in medendo commissos, funestas fuisse observari fuit. Puellus isti diu febricitanti idem citra Arsenici culpam evenire potuisset, epota aqua muscas necante, cum plerumque hæc aquæ fiant fungis quibusdam & cobalto, nitroque venenoso, in aqua decoctis: & forte non negabitur liquorem hunc febrim anormalem, carnem depascentem, sitim intensam excitantem ac respirationem difficilem reddentem effecisse, unde hæc per semielixum & cavam pectoris ob copiosum potum aquâ plenum in cadavere reperiuntur fuit. Verum neutri mortis præpropter causam adscribendam sentimus, sed Arsenico & quidem omnium funestissimo, sc. Crystallino: idque ob sequentes rationes: nam utcumque prægressis diebus jam occulta malignitas in Puella, imprimis die 4. & mane d. 7. Octobr. à D. *Simon. Schoidt* animadvertita fuerit, non tamen ita de vita ædum esse persuasi erant, ut post meridiem, qua cetero constabat Puellum venenum arsenicale inglatuisse: protinus enim aderant signa lethalia sc. extremorum frigus cum sudore frigido, continuus singultus, summa virium prostratio & cetera non nisi supremum diem instare indicantia, frustra neis remediis deinde hæc singulis horis, imò momentis ita invaluerunt, ut illa d. 9. Octobr. hora 7. vespertina sc. hora quinquagesima quinta mors seu exceperit, seu abolerit. Tum symptomatum vehementiam tum inexpectatam & præpropter mortem arsenico deferendam

Anatomè denique probavit: repertus enim fuit ventriculus erosus & excoriatus: totum colon & maxima pars reliquorum intestinorum gangrænâ affecta conspiciebantur. Hæc non nisi arsenici effectus esse potuerunt, nam arsenicum, vi septica præ multis aliis valet; & licet aqua muscas necans similem gangrænam efficere valuisse, hanc tamen neutiquam produxisse vel inde constat, quia diu post illam inhibita evenit, atque impossibile fuisset Puellum tot diebus præsentem gangrænâ supervivere, cum robustissimos paucorum dierum intervallo perierat, ut observatur in herniis, si neglectis gangrænâ superveniat. Nec obstat quod puellus de pulicula parum delibaverit, sorores vero totum cacabum pulicula arsenico intoxicata plenum exhausserint citra vitæ iacturam: nam puellum vesciebatur pulicula vacuo ventriculo, & inglutitum hæc ultima vice derogavit ac ne micam quidem evomit: sorores autem sanæ & robustæ puliculam arsenico adulteratam ventriculo cibis impleto comederunt, & paulò post & sua sponte & theriaca Androm. sumpta iteratis vomitibus puliculam cum arsenico ejecerunt, antequam roderet: si quid vero lesum fuisset, mitigari tamen à congruis medicamentis potuit, cum puella robustiores essent & arsenici spicula à cibo jam obtusa fuissent. Concludimus ergo & statim Arsenicum à scelerata manu porrectum misere Puellum interfecisse, hisque bona fide attestamus. *Joh. Jacob Wesper M. D. Phys. Scaphus. Heinric. Scretæ à Zavorziz.*

Scaphusii d. 19. Octobr. 1677.

*Hist. 2. Ex communicatione Excell. D. D. Joh. Iodoci Cysati Physici Lucernensis optime meriti die 13. Januarii 1679.*

*Franciscus Cysatus filius, puer vegetus & obesus 1671. d. 20. Masi, vespere horatertia, in orto suburbano domini Avi postquam prius tria poma pro merenda comederat, vesciebatur mixtura ex Arsenico Crystallino, farina avesacea & nucleis juglandium, muribus vites ardentibus destinata; post horæ quadrantem vomuit, expalluit cum extremorum frigore, emanante undique sudore frigido: cor fortiter palpitavit, artubus tremuit. Domum deportato statim crebro lac calidum infundebatur, quod protinus, sed grumofum, evomit: sæpius lactis potus repetebatur, quod semper in grumos concreverunt rejecit. Post repetitas lactis propinationes demum dedi lap. bez. cum congruo vehiculo, item el. Orvietan. Circa medium noctis instar mortui per quadrantem horæ & immobilis jacuit: resectus aquis cordialibus & topicis soporū excitantibus sensim convaleuit. Ultra triennium postea, quotiescunque ventriculum paulo plus debito cibo oneravit, omnia assumpta evomere cogebatur: unde emaciatus & gracilior minusque agilis reddebatur: verum & hoc symptoma evanuit. Nunc optimè valet & robustus est, literis deditus surgit in magnam spem Celeberrimi Domini Patris.*

*Hist. 3. 4. & 5. Ex communicatione ejusdem Excell. D. Cysati.*

Dux Puellæ de Arsenico Crystallino butyro permixto comedentes statim vomuerunt. *Exc. D. D. Cysatus* vocatus protinus lac iteratis vicibus propinavit & postea Lap. bez. & El. Orvietan: ambæ convalescerunt, nullo symptoma supervenisse hodieque sanæ vivunt. Alia puella similiter incautè devorato arsenico, toto die vomuit: neglecta per triennium morbo sa supervixit ac tabida ex febri, ejus inoleum nemo agnoscere potuit, tandem obiit.

*Hist.*

*Hist. 6. Ex communicatione Excellent. D.D. Francisci Reinardi Physici & Senatoris Solodurensis gravissimi, d. 17. Maii 1679.*

Filius ipsius trium circiter annorum, tempore autumnali post prandium improvide comedit de Arsenico Crystalino, nuncibus minutim concisis mixto, ad mures enecandos in angulo conclave sepelito: quantum inglutierit, ignorabatur. Statim ab hac mixtura comestâ de ardore linguae conquestus est, illamque longe exseruit: mater ad ignem hunc extinguendum acinos uvarum recentium masticandos dedit, ignara mali & devorati veneni. Mox in lectum locabatur, statim indormivit atque expalluit: post 2. circiter horas ab assumpto veneno & somno into expergefactus nigra evomuit; expalluit cum frigore totius intenso & summo languore. *Excell. D. Parens* statim oriburyum rec. cum bezoar. miper. gr. v. indidit, quod deglutit erebroque repetit ad horam 10. vespertinam; adeo ut ultra drachmam bezoard. min. hac usque inglutierit: cum illud amplius deglutire non posset, infudit aquam theriacalem. Post decimam noctis huc usque frigidissimus primum circa fontanellam, seu circa concursum suturae sagittalis & coronalis calere coepit; postea in toto corpore valde iaculuit, imo astituit ad horam 12. diei sequentis, sine ullo tamen sudore. Integre convaluit, coloratio evasit, antea pallidus, optime habuit, vivitque adhuc sanus & vegetus.

*Hist. 7. Ex communicatione ejusdem Excell. D.D. Reinardi.*

Eodem mense Filiolus D. I. T. de simili mixtura arsenici & juglandium incaute comedit, ætate & viribus priori non impar. Parentes inconsultis Medicis theriacam Androm. iteratis vicibus suggererunt. Verum frustra & sine ulla levamine symptomatum quæ patiebatur nam quarta hora à comesto veneno exspiravit.

*Hist. 8. Ex communicatione Nob. D. D. Heinrichi Secreta à Zavorziz.*

Puellus undecim mensium matre natus ad iram prona, quæ quum propter abortum, difficilem partum ac fœtus mortuos bis de vita pericluaretur, super nostram implorans opem hunc infantem debito tempore salvum Lucina favente caixa est: hic per totum &c, quo auram exteriorum habebat, tempus satis sanus vegetusque vixit, nutritissima tenellæ huic ætati convenientia semper ac lac matrum aliquandiu cum appetitu sumsit, unde iustum corporis membrorumque incrementum ac robur acquisivit. At quum præterlapsis aliquot diebus à matre culinam petente, ad fenestram supra icamum in sedili poneretur, ibidemque forte fortuna asserculum pigmento litorum viridi, ex sandaracha ac glisto indico composito, infectum prehenderet, ac cum isto aliquandiu luderet, nescio quo fato insons puellus illud osi admovit, ejusdemque angulum colore tinctum linxit, unde fere tota facies una cum lingua virore conspurcatur, quem quidem mater mox rediens, quoad potuit, abluebat; attamen quia aliqualem ejus partem infans jam deglutierat, statim æstus ac sitis immanis cum appetitu omnino prostrato ac vomitibus frequentibus illam invasit: & quia hæc symptomata à dentitione ortum habuisse credidere, ideo post quartum demum diem me, ut Medicam manum adhiberem, accesserunt; ferre potuit remedium internum, & quæ prius statim post commissum errorem, profuissent, lac tepidum ac oleum amygdalinum dulce, nunc vix deglutita rejiciebantur; mixturae etiam cardiacæ ac antispasmodicæ frustra data sunt, convulsiones enim ingravescentes, omnem illi deglutionem interceperunt, à quibus & venter unâ cum stomachi regione & pectore quoque valde intumuerunt, per alvum glande prius solutam, copia fœtidæ ac bilis colorem æmulantis materis ejecta fuit, ex ore autem unâ cum ingestis, gurgies blennæ tenacissimæ decoloris, nullis quod observavi strigmentis cruentis maculæ, prodixit; vomitus externis itidem frustra, cum externa non succederent, compescere studui; spatio diei naturalis tres quatuorve aquæ mensuras ebibit, quam mox iterum vomitu rejecit; convulsiones similiter omnes corporis partes magis magisque, nobilissima præfidia, eludendo, ita distorserunt, ut tandem sexto morbi hujus venenati die exspiravit, animæque tenella ac insons creatori suo reddita sit. Cadaver ob fonticas causas non dissectum est.

*Hist. 9. Nob. D. J. H. H. J. U. L. Pr. E. Filiola nondum quinque annos nata, 1679. d. 23. Januarii sanissima extra ædes paternas in aliena merendam sumpsit: ad seram vespertam hilaris manit & noctu petulantior, nã Matre increpanda fuerit. Post septimam lectum petijt: circa undecimam noctis subito exclamare & ejulare coepit, ac imprimis de ardore intensissimo abdominis conquesta est, accesserunt tormina, abdomen intumuit, vomuit, singultit. d. 24. Januar. iterum deorsumque nigra fœtidissima excrevit, Ardor, tormina & singultus continuarent cum siti intensissima, solum aquam petijt; omnia alia potulenta, item cibum & medicamenta respuit, eadem patiebatur 25. Januar. supervenerunt convulsiones terribiles; quando cessarunt, va-*

gijt & vermem mortuum evomuit. Perrexerunt convulsiones, vomitus & dejectiones fecum migrarunt ad 27. Januarij, quo summe mane expiravit non sine suspitione clanculum suggesti veneni.

*Hist.* 10. Fr. G. Filiolus quatuor à annorum & filiola annum supergressa; utraque proles sanissima & facie rosea. d. 3. Mart. 1679. mane ante octavam projectaculo comederunt iusculum ex lacte, de quo pridie in cœna sine illo nocumento vescebantur, nam tota nocte dormierunt maneque alacres erant. Circa decimam antimeridianam angere & vehementer vomere continuo cogebantur: Puella jam convellebatur simulque aliquoties alvum solvit. Ante undecimam vocatus statim lac aquâ rapidâ diluimus cum ol. amygdal. dule. sæpius propinavi: Puella avidè bedit, unde brevi vomitus, anxietas & convulsiones cessarunt ac quietior evasit: Puellus vix ad potum adigi poterat, unde vomitus vehementior ad primam pomeridianam continuavit: tandem precibus & pretio victus largiter bibit: evomuit mox lac coagulatum cum mucro partim pellucido & coloris experte partim flavo. Anxietas multum remisit. Postea sumpturum subinde quantum cochlear capere de hac mixtura:

3℥. Aq. borrag. scabios. Card. bened. ʒ ss Bol. arm. or. T. S. or. an. ʒ j. unicorn. fossil. ʒ i. L. bezoard. occid. ʒ ss tab. man. chr. perl. ʒ ss Puella hora 4. pom. subinde ridebat ac cum narre ludebat. Puellus adhuc quandoque vomere; vegetior tamen erat: nunc erubuit. Puella post 6. vesp. rursus mucosa cum grumis lacteis evomuit: Puellus bis gryles & spumea per alvum excrevit. Ante vomitum facies utriusque plumbea quasi & frigida erat, frons sudore frigido maduit: à vomitu facies rubicundo colore suffundebatur & toto corpore incaluerunt. Post septimam pulsem ex lacte comederunt. Noctē mediocriter dormiverunt. d. 4. Mart. bene se habuerunt. Postea indies amplius convalescerunt citra ulteriorem usum medicamentorum. Puellus diu postea lac & omnia lacticia aversebatur, minus quam solebat appetijt, siticulosior erat ac macilentior reddebatur, alvine quoque feces diu summo opere credebant. Puella extra lectum frequenter expallit: suffulra nec stare nec incedere amplius voluit. Neglecto medicamentorum usu nihilominus convalescerunt vivuntque hucusque optime.

*Hist.* II Ex communicatione Nob. D. Iob. Conradi Pejseri.

Historia anatomica feminz, veneno, ut crebar suspicio, peremptæ.

Die 27. Decembris 1676. in Xenotrophio cum D. D. Mattheo Hardero discipuli feminam 23. ut existimavimus circiter annorum, pingui robustoque corporis habitu & magno præditam, capillis fuscis aut ad nigros vergentibus & subcrispis. Moriebatur repente cum antea putaretur sana. Postquam enim noctu cum aliquot Gallis in eodem conclavi decubivisset, ab iisque potum quandam propinatum hausisset, posteris diebus in Xenodochium rediens de maxima præcordiorum angustia querebatur, pauloque post cruorem ex ore fundens viram quasi suffocata finivi. Quoniam verò nec Medicus ad eam fuerat accessit, ut opem ferret; nec adstantes symptomata & querelas ejus accurate observarent, idcirco de morbi aut mortis genere non certo definire quidquam possumus: id tamen relatum nobis fuit, ipsam cordis angustiam & concussionem, atque adeo mortis culpam, in potum à Gallis propinatum rejecisse. Ut autem viscerum constitutionem nosse daretur, cadaver ejus diffocimus; apertoque abdomine notavimus ventriculi dorsum & pylorum universum extrinsecus admodum fuisse infectum Bile ex vesicula eò transudante, à qua etiam pylori fibræ jam corrodebantur. Idem ventriculus flatu plurimum distentus tumebar, qui ex eo facta incisione cum impetu erupit: intus continebatur amurca nigra, cruenta & mucosa. Crusta ventriculi villosa alibi detersa & mucus interiori omnis à parietibus deterfus erat, Pylorus exacte fibris se contrahentibus claudebatur. Intestina tenuia, nempe duodenum & ileum, quatuor in locis prorsus rubiunda ac inflammata atque in gangrænam prope conversa reperimus: eodem fere modo, ut in dysenteria fieri solet. Hepar pulchre admodum rubebat, nec viri quidquam in eo animadvertum est; nisi quod Bilis in ejus vesicula valde acris & caustica videretur. Neque in reliquis abdominis visceribus labe ulla apparuit.

In Thorace Pulmones adhuc aëre semper pleni extumescabant, proinde ut ultimo halitu aërem non omnem efflaverint. Idem à sanguine stagnante & quasi sphacelato seu corrupto nigricabant. Invenimus quoque in sinistro pulmone lapillum seu calculum durum fabæ magnitudine. Cordis ventriculo dextro inerat Polypus crassus ex albo rubescens: reliquam pericardij cavitatem implevit aqua turbulenta & sanguinea à carnium loturæ similis, quantitate unciarum circiter octo. Præter hæc nihil amplius investigare vacabat. Advertimus insuper cruorem in vasis sanguiferis plane atrum ac velut adustum fuisse. Partes generationi dicatas seorsum postero die in ædibus Excell. D. D. Harderi examinavimus, quas tamen nullo

laborasse vixio comperimus. (Ovula in his manifeste conspici poterant, quibus uterque Testiculus scatebat. Tubarum extremitates patebant lacinijs plurimis ornatæ: Flatûs immensus per eas in uterum more penetravit eumque distendit. Cavitati uteri nil nisi muci paucillum inerat Orificium internum hiabat.)

Hist. 12. Canis invito Domino vescabatur sebo, cur Arsenicum permixtum erat, d. 13. Jul. 1676. d. 16. Julij mortuus. *Dofl. D. Alexander Stokerus* *Philosophus* cadaver aperuit. Circa stomachum in ventriculo superficiem rubram & inflammatam invenit, ibique ventriculi tunicas tenuiores debito: in fundo stagnavit amurca vappæ similis, foetida, eni sebi conglobati frustula immiscebantur. In fundo ventriculi & circa pylorum nullum inflammationis vestigium vidimus. Intestina tenuia tribus in locis petrosa erant, duobus in locis perforata ut facile faba transmitti posset: alibi ulcus pervium facile pollicem admisisset. Cavum abdominis continuè ichorem flavum, cruore tinctum cum amurca intestinorum contentis simili. Pectoris cavum implebatur sanguine grumoso obscuro, Ambo eordis ventriculi, Venæ majores & sinus tertius cerebri quoque infarciebantur sanguine nigro grumoso.

*Clar. Joh. Faber Lynceus in Exposit. Animal. Nov. Hispan. p. m. 475.* Cani drachmam Arsenici dedit, Antidoti probandæ gratiâ, confecta ex serpentum pulvere; multum tunc deprædicatæ. Antidotus nihil profuit. Canis post plurimas vomitiones mortuus concidit. Aperto abdomine ventriculus amplius admodum apparuit: intus rugæ & vibices atro sanguine subducti. Existimari quod plus pinguis ad virus arsenici debellandum profuissent, quam antidotus ex serpentibus parata: Romæ enim juvenem robustum curavit, qui Risagalli pulverem in chartula repositum loco cinamomi pulmento insperfit ac comedit, unde tormina & vomitus molestissimos passus est. Medebatur ipsi Philonio Roman. & Mithridatio cum iuseulis pinguibus & lacte copiosè exhibitis: his feliciter pristina sanitati restituebatur.

Hist. 13. Ex communicatione Excell. D. D. *Joh. Jacobi Harderi Basil. Prof. Publ. Celebrissimi* d. 22. Febr. 1678.

Puellæ phthiriasi capitis affectæ 12. annorum circiter, arsenicum loco coccularum, butyro permixtum, per errorem capiti illinebatur: statim oborti sunt sævissimi dolores. Pharmacopœis, ejus famulus ob germanicorum vocabulorum affinitatem delusus loco veneni contra pediculos, dedit mures necans, fuxerit caput aqua perluendum esse. Verùm frustra, imò supervenerunt vigilæ, totius capitis intrumescencia, deliquia, inappetentia, febricula, delirium. Vocatus tardius Excell. D. D. *Engelmannus* suasit alexipharmaca, verùm & illa frustanea erant, forte quia serius exhibebantur, venenatis atomis jam sanguini permixtis. Sexto die ab inunctione puella mortua est. *Idem ibidem.*

#### De Arsenicâ sine noxa deglutitâ.

Robatum jam esse ait Clariss. & nunquam satis laudatus Dom. Lucas Tozzi, Archiater Pontificius & Amicus meus semper recolendus in Comment. Aphorism. Hippocrat. 16 lib. 4. pag. m. 209. graviss affici eos qui jejuni arsenicum assumpserunt, levius verò qui à pastu; idque verissimum notavi nuper in circumforaneo quodam arcinorum pastore, qui ut rudem illaderet plebem, arsenicum elapsâ die, horâ 12. publice manducavit absque ullâ noxâ: Hoc scotem accidit, ut ipse candidè mihi fassus fuit, quia ante prædicti arsenici assumptionem cibis oleosis ac pinguibus usus fuit, quibus ventriculi interior tunica ad veneni particulas retundendas, fuerat obnuita.

Hæc ex communicatione Præclariss. Viri Domin. Josephi Lanzoni; quibus addimus, nos aliquoties observasse ejusmodi agyrtas non tantùm assumptis oleosis ventriculum suum contra venenorum motum præmunisse, sed illis etiam materiis plurimùm viscosas adjunxisse, quibus quasi insciarentur ac hebetarentur vis particularum corrodensium earumque actio prorsus reprimeretur, ut videmus motum globuli plumbi à sclopeto emissi, momento ab argilla opposita cohiberi. Viscosa autem quibus præcipuè utimur illi, sunt animalium interanea, in puruliginem propè cocta, indeque etiam apparatus jacula crassiora ac viscidio-

ra. Hoc mihi in memoriam revocat historiam ejusdem viti, qui apud nos horrenda cephalæa diu tortus, in istiusmodi circularum manus prædeperatione tandem se coniecit, quique experiundis venenis in theatrum productus; (facta spe nihil ab ijs commotionis fuisse exarari posse in ventriculo satis superque oleosis pinguibus præmunito, sed à super assumptis antidotis quicquid ad rebellioris mali eradicationem necessarium foret, abundè suffectum it) (eorum periculum in se ipso fecit, atque ex eo convulsas, varique vexatus per quatuor septimanas orti vestigia premeus, nescio quò factò tandem ad vitam redijt, ac revera per concussionem à venenis oppositisque largijs antidotis suscitatus; pro tempore liber à cephalæâ suâ evasit, ac tandem ad vitam redijt, ac revera per concussionem à venenis oppositisque largijs antidotis suscitatus, pro tempore liber à cephalæâ suâ evasit, ac tandem ab eâ de novò post aliquot annos recrudescente, brevi, nihil proficientibus auxilijs, è vivis ablatu est. Itaque isollo vis viscidiorum ac oleosorum non satis oblinivit ventriculi parietes, quin aliquid indefensum veneno paruerit, ubi letiferam actionem suam exercuerit. Credo equidem apud alios, qui talia sæpius experti sunt, ventriculum per omnes sui partes facilius posse defendi, sicque eos minus ladi, quia scilicet præterquam quòd eorum stomachus à reliquis viscosorum prius assumptorum continuè pro-

pe oblitus, facilius à super adjectis integre defec-  
ditur, non absolum etiam videtur addere, membra-  
nam interiorem visceris in ipsam minus fieri sensibi-  
lem ac lacerabilem, velut equus calcari assuetus, non

ita ejus punctiones prae callò cuti indurò pectenti.  
Hocque novum non apparebit iis quibus de histo-  
rià Mithridatis Regis Ponti, ac præcipue illius Mi-  
lieris quæ Alexandro Magno fuit oblata, constabit.

## OBSERVATIO XIV.

## De Mercurio.

**H**istoria. I. Cani d. 16. Decemb. 1675. ante primam pomeridianam Mercurij sublimati  
scrupulum dimidium carni involatum exhibui, quem avide devoravit: paulò post fur-  
sum deorsumque purgabatur: vomitu rejecta spumosa & viscida mucosa e rantesces alvine pul-  
taceæ & subflavæ. Alium bolum ex carne obiectum citra Mercurij inquinamentum odoraba-  
tur, stramen degustare noluit. Pedibus & ore ligatis, cane ad laus inclinato, abdomen in la-  
tere sinistro incidi, prorupit statim ventriculus admodum inflatus cum intestinorum portione:  
diu intentus eram ad ventriculi contractionem: sicbat lentissime, incipiens ferè à pyloro, aut  
ejus antro: quandoque in medio à fibris circularibus contragebatur: contractis fibris rectis sulci  
superficialii secundù longitudinem, in fundo imprimis, ex porrecti conspiciebatur, pressio ven-  
triculo flatus per os elidebantur, mox tamen rursus flatus impletus fuit: Injecta aqua calida  
per gulam in ventriculum iteratis vicibus, semper illam cum muco & spuma rursus evomit:  
in hoc actu ventriculus non admodum contraheretur, at diaphragma valde succutiebatur; ac  
si illud cum musculis abdominis vomitum plurimum promoveret. Intestinorum motus peri-  
stalticus itidem lentus fuit. Utinque canis parum comederit diebus prægressis, nihilominus  
venæ lacteæ in conspectum venerunt, quibus circa pancreas *Astelli* pressis, noduli prominue-  
runt; Receptaculi quoque chyli portio trans diaphragma eum ductu thoracico chylo plena ap-  
paruit; eà sauciata chylus promanavit, cujus superficiei, oculi, et loquuntur, pingues innatabant,  
ut iusculis carnis pinguisculis. In flatum ductum prope insertionem bifurcatum inveni. Cane  
jam diu emortuo, repetitis inflationibus ductus thoracici, cor intumuit ac paulò post auricula  
dextra aliquandiu verà systole & diastole moveri incepit: similem motum observavi in cru-  
re diaphragmaris, qui nullo modo palpitans erat, sed ex vera constrictione & relaxatio-  
ne fibrarum compositus & alternans; ac si ab inflatione sanguis adhuc in vasis stagnans  
per arterias huc propulsus fuisset, & spiritus animales simul ulterius urtisset, vel vegetas-  
set; nam aer per ductum thoracicum inflatus non solum ad dextrum ventriculum, sed  
etiam ad sinistram pertigit, unde totum cor intumuit, arteriæ coronariæ implebantur,  
imo pervenit ad cerebrum, cerebellum, meninges, ipsosque sinus duræ meningis, quod  
apertè oculis usurpare licuit. Ventriculum cum portione gulæ & duodeni totum exemi:  
illo à stomacho ad pylorum incisio inveni unicum bolum carnis & mucum spumèum copio-  
sum; eo deterso nihilominus superficies mire anfractuosa protinus novo muco pellucido ob-  
linebatur; nullum ulus observavi; stomachus amplius erat; pylorus multo angustior &  
constrictior, vix parvum digitum admisit. Circa finem gulæ & circa stomachum aderant in-  
signes fibræ carnosæ circulares, sub limbo pylori in duodeno rubro & quasi inflammato  
hæret mucus croceus. Ventriculum superne divisum maceravi fervida; tunicam fibrosam à  
nervea unguibus facile separare potui: nimirum fibras rectas & circulares se decussatim in-  
tersecantes; externæ rectæ, internæ circulares; utraq; junctæ fibrillis obliquis & perpen-  
dicularibus: Circulares circa pylorum ejusque antrum & circa stomachum crassæ & robu-  
stæ. A tunica fibrosa ad nerveam plurima vasa sanguifera & nervi emitebantur, vasa sangui-  
fera in plexum reticularem dirimebantur, nervi in tunicam nerveam expandebantur. Ablata  
tunica crustacea seu mucosa cultri manubrio, aliquot oscula rotunda apparuerunt, per quæ  
mucum transudasse arbitrabar; cæterum non similia erant osculis glandularum in ventriculo  
suillo repertarum. Intestinis à duodeno ad finem rectis secundum longitudinem incisio in duode-  
no & principio jejuni continebatur mucus flavus concretus, hinc in toto jejuno & princi-  
pio ilei mucus albus, in ileo mucus pellucidus coneretur, similis gelatinæ, quæ ex amylo in  
aqua cocta paratur, in fine ilei similis mucus cum alio fluido & spumoso: Rectum pro-  
fus vacuum & anfractuosum fuit. In toto intestinorum tractu arcarum glandularum triginta  
& unam inveni: erant rotundæ & oblongæ: foris pressio in intestino & osculis glandularum rotun-  
dis prodijt liquor pellucidus viscidusculus; erant quædam magnitudine seminis milij, per mi-  
croscopium conspectæ transparebant ac instar margaritarum splendebant. Jejunum & portio  
ilei rubebant: in medio arcarum glandularum manifeste aderat superficialia crôso. Venæ  
capillares intus conspectissimæ erant, ut & valvulæ *Kerkerugianæ*. Mirum unde chylus in lactis  
cum intestina vacua essent, tum ob famem perpeßam, tum ob mercurij vim purgantem: Unà  
mucos

musco à mercurio allesto? Inter tunicam fibrosam & nerveam in gula manifestè conspiciebantur glandulæ. In vena cava à capite descendente & ab hepate ascendente ad cor sanguis in tenacè grumū concretus & splendide innigrescens erat, ut oeu culter ex vagina extrahi posset.

*Hist. 2.* Canem majorem, pellem, Trigidis instar, pilis nigris guttatim conspersam habentem, cum *Excell. D. D. Heinricho Secreta* plurimis diebus quotidie bis anguento ex pinguedine suilla & mercurio vivo parato, in capite, per totum dorsum, sub axillis & in inguinibus ubi depilis erat & ubi majora vasa sanguifera excurrunt, innigendum curavimus; sc. à 3. Dec. 1677. ad 25. Dec. circa 11. Dec. aliquantulum salivare cepit, brevi tamen salivatio substitit: d. 15. Dec. in occipite non procul à vertice, tumor natæ similis emerfit, ab attritu dolens. Ubicumque locum iunctum attingere valuit litum mercurislem lambendo abligurivit. Toto hoc tempore nunc in aere aprico pluvio, nivoso aut gelido, nunc in hypocausto versabatur: semper vegetus mansit, hincinde cuturrit, comedit: non magis quam ante inunctionem purgabatur: ultimis diebus lingua & ossa adhuc rotebat, non tamen tam diu ac antea consueverat: subinde tamen dentibus stridebat; aliquando oeu baculo percussus vociferabatur subito: abdomen quandoque tumidius apparebat. A 26. Dec. ad 2. Ianuar. 1678. postquam inunctiones intermittebantur, symptomata hæc cessarunt nisi quod adhuc dentibus strideret d. 2. Ianuar. mane mercurij vivi libram dimidiam cum quatuor uncis pinguedinis suillæ devoravit, atque ita lambendo patinam extersit, ut vix pauca granula mercurij superessent. Ab hac mercurij vivi portione devorata nulla actio vel minimum læsa fuit: nec quicquam in excrementis p.n. animadversum fuit: imo inde magis famelicus reddebatur.

*D. 3. Ianuar. 1678.* mane hora 8. mercurij sublimati drachmam eum mica panis in bolum redactam dedimus, præsentibus *Excell. D. D. Secreta, D. D. Iohann. Conradus Brunnerus & D. Lic. Scherffus Durlaccensi.* Vix quadrante horæ elapso magno nixu vomere cepit, primum mucum crassissimum tenacissimum, spumeum idque parvis intervallis novies. Prima vice frustulum panis crustaceum sine bolo eiecit, nec in tot vicibus ullum boli vestigium in vomitu reiectis animadvertere potuimus. Circa horam 9. decima vice mucum priori similem primò cruore tinctum, postea adhuc sexies, sed longioribus intervallis & magis magisque eructum, & ultima vice atro rubescentem evomit: vomitu reiecta semper copiosa erant. Post quemlibet vomitum fessellum, ubi oeu à magno labore fessus quiesceret, quæsit; inde non recessit, nec pedibus consulcatus locum movit, donec ipsum irritamen internum denovo sollicitaret & quasi expergefaceret: tunc enim in pedes surrexit, unum alterumve angulum elegit, ubi ventriculum vomiturienti exoneraret. Vomitus præcessit aliquoties pulsus quidam sonorus in hypochondriis, mox capite demisso, rictu amplo, os aperuit, & tanta vi, quasi omnibus nervis intentis, mucum egressit ac si ventriculum & omnia intestina eieciurus esset. Aliquoties quoque antequam eruenta vomuit, alvum solvit; primæ fæces erant pinguedine suillæ pridie comestæ, ubi mercurius vivus permixtus conspici poterat, postea pulcræ, etiam crassiores & in scibals coactæ, quibus quoque mercurius vivus & pili inerant. Circa 6. Vespertinam exetevit fæces eruentes, postea nigras & piceas: bolus mercurio sublimato insarctus nupiam comparuit. Post 6. horam per scalam tractus ultro stabulum petiit, & pluribus passibus citra nurationem incessit: circa 9. plæide decubuit ac si dormiret. Toto hoc temporis intervallo nunquam convellebatur. Dum pransimus erupit, an è fonte biberit, rescire non potuimus: repertus in stabulo stramini quietus incubuit & compulsus ad primam stationem rediit. Omnia oblata fastidiit.

*Die 4. Ianuar.* mane hora 6. mortuum in stabulo adhuc calentem, artubus flaccidis, plano non rigidis, invenimus.

In cavitate pectoris nullum sanguinem extravasatum reperimus. Pulmones inflati erant, rubicundiores debito, maxime in latere dextro: in limbis illorum extremis ramuli sanguine turgidi conspicui: ibi quoque apparuit macula quædam nigra inæqualis, citra tumorem aut duritiem, dimidio bazio angustior. Cordis dexter ventriculus & auricula, vena cava ascendens, descendens, azygos & intercostales à sanguine distentissimæ erant: in sinistro quoque ventriculo & auricula multum sanguinis aderat, minus tamen quam in dextro: in aorta paucus sanguis occurrit. Sanguis neque in ventriculis neque in vasibus majoribus & minoribus neque ullibique coaluit nec vel minimus grumulus inventus fuit. Ductus thoracicus & chyli receptaculum lymphæ cruentæ plena erant. Aperto abdomine plurimum sanguinis extravasati inter hepar & ventriculum in hypochondrio sinistro, ut & intra duplicaturam omenti circa ventriculum invenimus. Ventriculus & intestina plena & distenta, non tamen valde inflata erant: foras atrorubescencia, in paucis locis minus rubicunda apparuerunt: cæcum solito non multum majus fuisse rectum verò valde turgidum & nihilominus sulcis rectis profundisque præditum. In reliquo cavo abdominis nullus cruor extravasatus videbatur. Venter mesentericæ & porta sanguine admodum distentæ fuerunt. Vesica vacua & corrugata: Pancreas rubicundius solito: Lien atro rubescens: tenebatur naturali colore

uncti. Gula intus rubicunda & inflammata. Ventriculus, mucro eruento spumoso viscido plenus; similis mucus in toto reliquo intestinorum ductu conspiciebatur: in caeco feces pultaceae flavae cum pilis in recto feces pice nigriores & tenaces, nulla scibala, nulla vestigia mercurij viviant sublimati apparebant. Contentis sublati ventriculus intus undique rubicundus & inflammatus, excepto antro pylori, videbatur: intestina à pyloro ad immum intestini recti itidem inflammata erant, minus tamen areolae glandularum rubebant. Ablata tunica fibrosa gulae & ventriculi inter illam & tunicam nerveam, sanguinem grumulosum, extravasatum in plurimis locis reperi, ut & in plerisque intestinis inter has tunicas. In ventriculo & intestinis quoque crustacea rubebat, alieubi etiam abrasa, vel potius crosta, sed non penitus erat. Ventriculo & intestinis aliquandiu aqua maceratis crustacea facile abscedebat: nervea, quamvis per totum ventriculum & in intestinis inflammata esset, nullibi tamen exulcerata, aut crosta conspici potuit. Antrum pylori & areolarum ambitus ab inflammatione immunes erant. Intra Cranium nihil p. a. aut infectum visum fuit, nisi quod vasa sanguifera & sinus quoque sanguine turgent.

*Hist. 3. Ex communicatione Excell. D. D. Sigmundi Königs Physici Bernensis.*

Non ita pridem Puer annos duos cum dimidio natus, hora quinta vespertina elanculum officinam Aurifabri subintrans, Mercurij sublimati grana circiter octo inglutiit, unde mox tormina saeva, ventris inflatio & salivatio excitabantur. Mox Excell. D. D. König vocatus protinus dedit syrup. Emericum cum succo cydon. paratum: vomitu peracto, large ipsi lae caprinum cui mucilaginem sem. Psyllij permiscuit, potandum propinavit. Inflatio & tormina brevi cessante ac noctu dormivit. Post 14. dies, Phthisis periculum imminens declinavit potu lactis caprini cum sem. cydon. & malvæ coctio: nec haecenus quicquam adversi passus est.

*Historia 4.* Catellæ nondum menstruae d. 27. Dec. 1675 cum Excell. D. D. Heinricho Scteto hora 11. antimeidiā dedit mercurij dulcis drachmam dimidiam: non diu postea feces liquidas, pultaceas, pallide flavescētes excrevit. Hora 1. pomeridiana fistulosa erat lingebat manum admotam lingua propē exsēta; lae ori instillatum avidē deglutiit: seu à mercurio dulci dolens voce admodum submissa vagiit: vegetior tamen persistit catella illa cui nuper magister. Giallappæ iniurimus. Lac non evomit. Post 2. hora pomeridiana thoracem in sinistro latere incidit: pulmones exemplo vulnere, etiam costis digito diductis, aere pleni protumebant in inspiratione, nullo vacui metu, cum vulnus admodum patulum esset. Vulnere in abdomine facto ventriculus distentissimus erupit, circa medium constringebatur, cortugabatur indeque antērius & in fundo, inaequalis & quasi anfractuosa reddebatur sensimque parvus admodum evasit: gula distendebatur, nunquam tamen vomuit. Intestina lentissime movebantur. Dum pectus in dextro latere adhuc integrum erat, subinde adhuc vagiit fortiterque respiravit: ablatō sterno nihilominus in inspiratione adhuc sūsum eolus tollebat: ubi vero diaphragma costis annectebatur illæ abducebantur & pectus inferius fiebat angustius. Diaphragma in inspiratione planum, in expiratione convexum reddebatur. Cor subinde in motu substitit: inflato ductu thoracico & hinc corde ventriculis, auriculis & vasis coronariis valide rursus cor movebatur, imò ante quartam exemptis ventriculo, intestinis, hepate, liene non sine largissima hæmorrhagia & detruncato capite cordis totius motus persistit ad hor. 5. usque: auriculæ vero dextræ motus spontaneus fiebat adhuc hor. 8. noctis: ante 10. noctis irritata aliquoties rursus movebatur. Ventriculus prope omnino vacuus erat, nihil præter mercurium dulcem grumulis involutum, aliosque grumulos lactis sinceros continuit: nulla prorsus inflammatio apparuit. Intestina quoque fere vacua erant; subinde in illis mucus paucus flavus, condensatus & aliquot vermes mortui occurrerunt: eorum paucum humorem turbidum flavum, & rectum feces atto flavescētes tenuissimas, quibus grumuli cum mercurio dulci permixti erant, continuerunt: Nullibi nec circa areolas inflammata apparuerunt. Ex quibus conclusimus Mercurium dulcem miens ventriculo & intestinis infestum esse, quàm Mag. Giallappæ; minusque ferocissē quàm illud in alia catella fecerat. *Ioh. Jac. Vesperus Tractatu de Cienia aquatica.*

#### OBSERVATIO XV.

*Inunctione Mercuriali usus scabiosus, cor exhibuit coagulato cruore turgidum.*

**H**aud ita pridem in Nosocomio Bernatam, quod Insulam vocant, occubuerunt viri duo, ad scabiem simplicem & ulcera crurum sananda Mercurio inuncti, quorum alter à Sigismundo Kœnig dissectus, cor habuit coagulato cruore turgidissimum. *1. Contr. Pejerus obs. Anatomico Med. 35.*

**M**ercurij vim clandestinam non sine damno experti sunt multi; Clar. Schmid. Practicus Argentinenſis, sublimato inyenam jugularem canis infuso, subitam sanguinis coagulationem cum mortis periculo supervenisse adnotavit. *Ioh. Jac. Harde- rum ibid.*

*De Oleo peti Veneno fœtiffimo, quædam è Præclariffimi Viri Dom. Francisci Redi Experimentis Naturalibus exscripta: quæ hic Appendicis loco, pro natura ac hiftoria venenorum illustranda, quamvis nihil anatomici complectantur.*

**N**on omne animal oleo Peti infectum moritur; aut certe non æque cito, si vulnus aliquam ex minoribus venis vel arteriis attingat. Præterea non omne oleum Peti mortiferum est; sed dantur ejusmodi species quæ nullum quasi detrimentum adferunt: cujus rei me certissimum experientia reddidit. Maximam differentiam invenio inter Petum Brasilianum, & illud quod ex insula Sancti Christophori advchitur. Varinense & Brasilianum effectus parum inter se differunt. Terranovannum, & quod ex insula Nivis, Sancti Martini & Anguillæ adferunt, easdem fere cum Sancti Christophori peto facultates obtinet. Diversos ab aliis speciebus effectus nostrum producit, nunc omnes ejusdem species in eo conveniant, quod oleum reddunt empyreumaticum, putidissimum & fœtoris non ferendi. Non ignoro me forsitan nimis obscure de tot speciebus peti egisse, sed cum materia sit periculosa, intelligat qui potest, ego memet intelligo.

Sed audi quæso mitas rerum vicissitudines. Hoc oleum in vulneta immissum, brevi momento necat, aut certe fastidiosissima symptomata excitat: & ego novi homines, qui solo pulvere peti incisas & vulneta, à Chituvæ simplicia dicta, curant. Et Reverend. Pater Antonius Veira, Iesuita, qui per annos triginta duos in Brasilia vixit, mihi tetulit, illis in Regionibus nullum aliud medicamentum in curandis vulneribus magis in usu esse, quàm succum recentem & folia peti. Quod plus est, Nicolaus Monardes narrat, Indos, dum vulneta curant, à Cannibalis infecta, mediantibus sagittis veneno infectis, non nisi hoc succo, ut qui non solum veneno resistit, sed etiam celotiter cicatricem ducit, & fluxum sanguinis prohibet. Nec desunt alij, qui singulis diebus matutino tempore jejuni non exiguam quantitatem peti dentibus conterunt & deglutiunt, nullo, ac ne minimo, quidem quod appareat, præjudicio, cum quævis olei ejusdem gutta, per os assumpta, vel in stomachum demissa, exitioforum & lethaliū majorum cadix & origo sit: haud aliter ac pulvis ille peti, quem per momenta fere non per nasum attrahit, si in os bestiarum ejusdem, & specialiter læetæz mittatur, momentaneo illam deliquio & distentis membris morte afficit. Idem ab eodem peti pulvere serpentibus accidere dicerem: Sed de his nihil dicam, ut ut per integrum biennium mihi de illius experimenti veritate constet: etenim hoc eurrente anno, ob causam quæ me læret, ne unum quidem ejusdem generis serpentem hoc pulvere interimere potui. Id affirmare possum, hirudines pulveri peti involutas post paucas aliquot horas mori, idque non vi pulveris quæ pulvis est, sed virtute peti.

His, qui verum modum præparandi oleum peti non ignorant, majoris momenti videbitur, his temporibus apud externos ubivis, atque etiam apud nos, multos homines secutè, & citra periculum peti fumum per os assumere, quo palatum omnesque vicinas partes ita imbuunt, ut magistraliter eundem per oculos, aures, & nares, emittere possint: & eo usque progressus est luxus, ut ingeniosam facillimamque rationem invenerint: deducendi hunc fumum per canaliculos sub nive sepultos, ex quibus usque adeo gelidus prodit, ut nihil calidius sit cur frigidiori aquiloni invadeat. Et multi non contenti hunc fumum assumpsisse per os, eodem, sed calido nova arte, & recens invento instrumento intestina repleat, idque loco clysteris, eundemque contra multos contumaciores morbos, maxime vero contra colicam passionem, prodesseprehendunt.

Querere mihi videris, an artificium præparandi oleum peti per se ita comparatum sit, ut violentissimam illam necandi virulentiam producat, vel an venenosum aliquod ingrediens recipiat, sine quo id perfici non possit? Et hæc tua instantia mihi illis inniri videtur, quæ circa hanc materiam ab erudito quodam homine Gallo, in curiosissimo suo & elegantissimo tractatu de peto affirmative scripta, & optimo jure nobilissimo, & doctissimoque Abbati Burdeto, Condei & S. Legeri Domino, &c. Verba Autoris hæc sunt. Eo non obstante, nonnulli venenosum illud esse probent, obijciunt experientiam ejusdem quinzæ essentiz peti non ita pridem Florentia Lutetiam Parisiorum allatæ, cujus unica gutta, in punctiunculam missa, ea ipsa hora mortem inducit. At vero, cum petum natura sua nihil istiusmodi producat, quæra hæc essentia debet esse suspecta mixturæ alicujus, aut certè venenosæ alicujus qualitatis, à diversis præparationibus chemieis acceptæ.

Hic nihil aliud quo tibi respondeam habeo, quàm eodem, quo oleum peti fit, magisterio, etiam diversa alia fieri, quæ in usu Medico evadunt innocentissima, & si ore assumpta, si vo extrinsecus vulneri applicata, non nisi eximia & salutifera medicamenta esse deprehenduntur: ideoque certo affirmare non ausim, hoc oleum tali magisterio converti in naturam venentis: id libere affirmare possum, nihil ei, dum præparatur, admisceri, quo infici venenosa qualitas



possit: & hinc est, quod nonnulli subdubitantes crediderunt petum à creatoribus in regionibus Americæ, Elleboro & Euphorbio corrumpi: quare proprio motu, simul oleum euphorbii, & ellebori extrahi curavi, & experimentum in diverso genere vulnecrum capto, utrumque semper veneni experts esseprehendi.

Atque hæc Vir Præclarissimus de olei peti actionibus. Nos illud etiam aliquando vidimus nullo labore paratum ab iis qui incensa Nicotianæ folia è fistula artificiosius fugere norunt, ad guttas enim commodè colligitur mediante gossypij particulas ad imas fistulæ partes collocata. Iam autem non tantum observavimus enecta animalia dum per eorum cutem superficialiter traheretur filum ipso hoc oleo imburum, sed etiam feles occisas quibus eodem tantum exterius levius perficabantur labia. Fumum rabaci quod attinet, quem plures volunt viperis esse funestum, si in earum oesophagum insuffletur; experimentum pluries de eo sumpsimus, & vidimus quidem hæc animalia pro tempore inde convulsa ac rigida, nullam tamen mortuum, omniaque potius brevi per se, & nulla adhibita alia opera, in integrum restituta.

## OBSERVATIO XVII.

*Radix lupariæ & Olei nicotianæ effectus in Ciconia majore.*

**M**ense Septembri Anno 1686. Ciconiæ majori amygdal. dulc. 3iſſ. in bolo exhibuimus: hinc coclearum confusum ʒi. sed citra ullam noxam: Postridie Radic. Lupariæ luteæ coactæ ʒi. circiter intrusimus, quæ illico vomendi desiderium induxit, tanisper subsistens, usque dum radices evomeret, quas cum in bolos coactas, tantillo spatio interjecto, denud exhiberemus, iterum sed mucotas brevi post ejecit, atque hoc itidem terra vice contingere, quamvis majori cum mucositate vidimus. Ut propterea genius radieis istius patefeceret magis, bolum alium ex ista mera paratum, deglutiendum obrulimus, post quem cum capite valde incipeter nutare, alios duos adhuc, eodem modo paratos intrusimus, qui vomendi conatum vehementem ac pertinacem excitantur, donec eosdem sed fluidos & solutos ejiceret, cum subita alæ utriusque volutatione, pedum vacillatione & totius corporis delassatione, citra tamen pejora symptomata. Postridie filum ol. Nicotian. per retort. destillato madidum, per partem alæ dextræ carnosam superius trajecimus, mox alis volutare & tremere incepit, hinc humi prostrata, rostrum & caput convelli, tandem ingenti, vomendi conatu, quem ejectio materiæ cujuspiam, solidæ & fluidæ & sublavæ insequeretur prehensa fuit: Semiquadrante post ʒi. præter propter ejusdem olei, quæ in substantia, quæ in bolo infudimus, à quibus convellebatur ilico, pedibusque & capite retrahitis, motu omni, viraque privata cecidit.

Calentem adhuc cum feceremus, motus convulsivos undulantes, in musculis pectori incumbenribus, ex residuis spiritibus animalibus agitaris vidimus, hinc costis disiectis & sterno elevato, in medio ventre ramus subclavius insignis se obtulit, & membranz quibus pulmones infimo ventri hinc inde circa iniria annectuntur plures, diaphragmatis vices supplentes comparuerunt: foramen quo infimo ventri sær communicatur, in utroque pulmonum lobo unum: Pulmones ipsi egregie vesiculosi micabant: Pericardium bimum seroso plenum, ut & vasa pulmonalia insignia: Auriculæ cordis binæ cum totidem ventriculis, sanguinem fluidum continebant, & quasi ipsomet illo oleo tinctum: qualem etiam in arteria magna deprehendimus, in quam cum aerem siphone injiceremus, auricula cordis ter palpitare cepit: Hæc ipsa dum ex eorde egredirur, aliquot ʒ distantia in subaxillares & carotidas dividitur: Sternum musculos suspensores duos obtinet, & aspera arteria circa sui in pulmones insertionem, in utroque trunco foramine donatur: Venter intus omentum exhibuit pinguiculum & bepar duobus lobis constans, cujus parti cavæ vesiculam felleam annecti, parvam cum ductu bilario notavimus: Renes erant grandiusculi, oblongi & quasi ex variis lobis conflati, vasisque emulgentibus à cava & aorta oriundis stipati, quoad interiorum verò substantiam, omnino fibrosi: Ureteres ex borum medio circiter prodibant, oblongi & albicantes, versus finem intestini recti terminantes: Oesophagus summe fibrosus & orificium ventriculi superius glandulosum omnino & crassum. (vid. sis fig.) glandulæ hæc parte posteriore incisæ, tubulofana faciem monstrantur: Pancreas secundum longitudinem intestini duodeni protendebatur: Intestina tandem cum suis glandulis quod concernit, de iis videri poterunt, quæ tum Clariss. D. D. Pejérus enteradenographiæ suæ, tum etiam Exercitationibus nostris familiaribus p. 212. inseruimus.

**L**upariæ hæc est Tragi. l. 1. de stirp. hist. cap. 82. Aconitum flore luteo Bauhin. hist. plant. l. 34. pag. 632. Græc. *Antoxia* dictum, quod lupos exhibita enecat, unde etiam Antuerpienses in acetaris radice hujus gulam oblectantes inscii, funestas pergas dederunt, adurentia enim est faculatis si Trago,

calida & seca in quarto gradu, si Dodonæo credimus: Nepello sanè vices satis affines obtinere, ex irritatione & vellicatione, quam particulatum filinarum nociva acrimonia produxit constat: etenim vix dum ingesta, nauseam peperit pertinacem, usque dum ejecta, cursum fuerit, inde vicibus aliquot iter-

stera, cum ulteriores mori, tum partium aculeata-  
rum, à fermento ventriculi spirituosiori majore solu-  
tione, spicula in fibras nerveas adegit vehementius,  
adeo utrimque multum primum excerneret, inde  
archeo atroci concitato vomeret, motuumque  
spasmodicorum, cum spiritus animalis manifestâ  
destructione quam vomituriis crebradubio procul  
adjuvit, hæc obscura ederet indicia: Equidem ci-  
conia ad vomendum naturâ quædam propensio  
inest, nam pullos suos re hortante, cæ quam ante  
deglutiverunt, alimonia cibant, quod opus rumi-  
nationi quidamtenus est analogum, cœ Nobiliss.  
Peyerus Merceolog. l. i. cap. 4. ostendit: hoc tamen  
negari nequit aconium lycochodon ingentem stim-  
ulum addidisse fibræ actunicis oris & gulæ, quas  
ingestum proximè attingit, cumque fieri non possit  
vellicatio, citra spirituum in nervis excubantium  
commotionem, manifestum oppido est, spiritus  
animales per fibras nerveas à veneno affici, atque  
ad rei molestæ expulsiõnem, vi ordinis nature im-  
pelli. Id animo veritatis avido obstare posset magis,  
cujus præfatus Excellentiss. Pythagoras amicè nos  
monuit; quod cantharides Sale acerrimo præditas,  
cœ effectus testantur, sine noxâ devorent ciconia  
nec tamen plantæ illius spicula queant eludere.  
Verum si quod integras fermè deglutitur, nec man-  
dacando resolvant, confidètare libuerit, multa am-  
plius difficultas non erit, Sal enim nisi debite solu-  
tum effectû patili potiri non potest, uti quoque  
in aliis volucibus, venenata quandoque devoran-  
tibus notamus: Ventriculo autem vim inferre ne-  
queant, crusta callosi adversus ejusmodi injurias  
obmnino, cui accedit copiosus è glandulis tubu-  
latis mucus, qui particulas aculeatas irretiendo  
obdundit, distæ quæ crustæ fomentum præbet: Nihi-  
lominus ex radice istâ penitus non concklit, quod  
rejectionis vomitu, radicis intrusæ reliquiis, maximâ

saltem ex parte, spirituum motus explosivi paula-  
tim cessant, hinc alterâ die viribus tantisper re-  
sumptis, nicotianæ demum enormibus insuleibus  
perit: de herbæ autem istius oleo in subseq. proli-  
xioribus esse licebit, addituri jam panem ad volati-  
lis hujus inrerantia: de gula & ventriculo Ciconiæ  
Ann. 2. Ephemer. quædam inseruit Celeberr. Wep-  
ferus, in accuratissimâ Castoris Anatome, acinorum  
autem glandulorum coronæ instar officinum su-  
perius stipantium necessitatem ac utilitatem No-  
biliss. Pythagoras in Anatome Ventriculi gallinacæ  
detexit, inique adeo ut volatile nullum esse arbitre-  
mur, quod hisce theculis defranderetur, bene tamen  
quod in gluvie careat: habent hujus loco *σιμαρξον*  
*επι τοις πτεροις*, uti quidem cum in anserum tum  
anatum sylvestrium Anatome vidimus: Pariter  
etiam è foraminibus asperæ arteriæ, (fortè & pulmo-  
num) hincis ær in veliculis membranæ ruit, sic-  
que respirationis negotium adjuvat: alias mirum esset  
utrumque, qui pulmones costularum inter interstitia  
hærentes, nec uti in aliis animantibus liberi, com-  
modum expandi queant, nî elastica æris vis, cui ex-  
perientia suffragatur, musculique validi pectori-  
morum largientes, rem omnem satis explicarent.  
Contenta uterum albicantia, de Renum ( quos  
penatis male denegar Aristot. cap. 9. l. 3. de partib.  
Anim.) actione, quæ crassiores partes, easque in gal-  
linaceorum genere perquam salinas unde in calculos  
concreverunt sæpius, cum tantillo humoris serosi  
sequestrant, abunde testantur: In aquilis tamen feces  
habentibus liquidissimas, & negry quidem, uti  
propriâ experientia compertum tenemus, bibentibus,  
unde serum istud suppeditari queant, inferius  
in ejusdem Anatome apertum dabimus, Clariss.  
Joh. Jacob. Harderus in Observationibus Anatomico-  
Præliis.

## OBSERVATIO XVIII.

*Olei ejusdem effectus in Ciconia femella juvencula.*

**D**ie 24. Maji Ann. 1681. Ciconiæ femellæ juvenculæ, bolos aliquot ex pane, ol. nicotian.  
mædidus intrusimus quos autem vomitu illico ejecit: Hinc guttulas quatuor ejusdem  
olei infudimus, post quas vomiturire, caput varie motitare & aliquantisper angustè cepit, nullo ta-  
men graviore symptomate ulterius insequente, sibi relicta fuit: Die postero 25. circiter olei  
ejusdem tursus infudimus, unde mox collabascere, caput retrahere, convelli, tandemque  
penitus corruiere visa fuit, motibus convulsivis adhuc in quibusdam musculis, quos cultro in-  
cidimus, satis conspicuis: Inceranea hujus, uti in præcedente habebant. Præsertim vero hæc  
notare licuit sanguinem grumosum, in lobo pulmonum utroque, dextro potissimum, forte  
quod aliquid de dicto oleo per asperam arteriam hausit: Egregius quoque fuit uterum ma-  
teriam gypsum continentium, è renibus glandulosis exortus.

**N**icotianæ herba est, non solum ubivis decan-  
tata, sed præcipue hominum parti, cuiuscun-  
que dignitatis aut sortis illi fuerint, variegata  
sunt enim qui solita masticant innoxie, aliis fumo-  
gulam resistentibus, sunt qui Medicinam parant,  
quovis antidoto præstantiorem. Authores serietenus  
in scenam producere, nec proderit, nec opis est. Suffi-  
cient Neandro & post hunc Magnæo Vir. Clariss.  
aniam hinc fuisse, in plantæ hujus naturam ac  
vires industriè inquirenda. Ex quidem ille folia sic-  
cata, calida & sicca in gradu tertio assent, vid.  
Tabicolog. p. 17. hic verò pag. 47. Exercit. 3. Sale  
suo piratum crustum fundere, acrimoniam incidere,  
& excretionem præparare ait: Hic tamen ipsis parti-  
culis, quibus oleosè punciore, junctæ sunt, phleg-  
matis adest plurimum, à quo ille non parum oban-  
datur, adeo ut nî vel beneficio ignis tantisper, vel

destillatione eliciantur ac concentrentur, à civitatis  
suz vestigia, minus evidenter relinquunt, fieri quin  
etiam potest, ut pro diversitate æris, visus, loci,  
consuetudinis, &c. in aliquibus mitius, in aliis ma-  
ximè nocivè sint. Ita cum ratio tum experientia  
confirmat, sumum nicotianæ horrenda sympto-  
mata pluribus accersere, nauseam, vomitum, extre-  
morum frigus & tremorem, quatenus particulæ ejus  
subtiliores, salinæ volatiles, cum oleosis conjunctæ  
acerrimæ, una cum ære inspissando haustæ, fibril-  
que vel œsophagi vel ventriculi impactæ, irritatione  
sua motus, spasmodicos in hisce partibus cient, spi-  
rituumque animalem misere agitant; eò magis quo  
ob ramositatem suam oleosa peritarius adhiærere  
solent, quin imò massæ sanguineæ communicant,  
ejus motum summopere infestant: In sequentibus  
verò pyalissimum enormem à sale fundente obortum

facili demonſtrabimus, unde etiam apophlegmatizantibus à ſui præconiis Nicotiana accenſetur Felix vino inſuſa & altero mane à maleſeriatibus quibdaſſim hauiſta, per ſuperiora & inferiora purgaſſe, imo hypercathariſm prodaxiſſe alii nobiſcum nōrunt, maniſeſto acrimoniæ vehementis indicio: inprimis autem oleum deſtillatum, quod pauſillum exhibet, docivam obrinet vim, utpote in quo particulæ activæ concentratæ, ſuique juris magis exiſtant. Animadvertit iſtud ſane nos Nobiliſſ. Reſti in ſuis experimentis natural. parique experiendi aſſam ſubminiſtravit, inprimis cum Magnenæ, ol. Nicot. quod per inſuſionem præparat, in arthriticis, Renum, colli aliſque doloribus valdè potè comendare videremus, Exercit. II. p. 105. Quam ſuneſti fuerint noſtri olei effectus, ex modo recensitis hiſtoriis palam ſit, ulteriusque patebit deinceps: in ciconiâ maiore non ætus, ſed particulæ oleoſe ſilo adhiereſcentes, ſbrillaſque nerveas debinc adorinæz, alæ volutationem, motus tremulos & convulſivos, cum vomitione accerſiverunt, quam ex ſpirituum agitatione & motu impetuoſo continuoſi magis, quàm ipſius olei ad ventriculum uſque accuſſu proveniſſe exiſtimamus: motus hi crebriores evaſerunt, quum internè propinaretur, tum enim ſibras nerveas ſuox ſerbociter aggredi, ſanguine inque ſui communicatione fundere admodum & machinam penitus deſtrere cepit. In femella parilem atrociam non modo in ſibras ventriculi ac maſculorum, ſed & aſperæ arteriæ exercuit, unde teſpitationis motu intercepto, ſanguis in pulmonum lobulis grumavit. Mirabitur hinc nonnemo, per uſum internè, cum ejuſmodi acribus particulis ſcateat, &

pluribus tantopere commendari: aſt alia ratio eſt herbæ ſuo adhuc conſtantis phlegmate alia ejuſdem ab hoc deparatæ, quamvis & internè, nī ab aliis ſilium acrimonia vel inhibeatur vel corrigatur, neque tura ſemper non ſit, inprimis ubi ſibræ teneriores ac demadatæ jacent, in quas etiam blandiora medicamenta non raro fortius agunt, neque etiam oleum, quod Magnenæ parat, idem planè eſt cum noſtro, licet & iſtud externè ſine periculo paribus corporis forſitan applicari poſſit, nī ſibrillatam ſubcutaneæ, cui partium vicinarum ſepè illud reſpondent, ſubſecuturam irritationem memere velimus, interno uſu ceu periculoſo penitus reſecto. Quod verò ſuccum nicotianæ toxicis adverſari ex Aſidio Everhardo reſert Neander p. 34. Exemplo felis cujuſdam furacioris, cui bolum roxiæ mixtum aliquis propinavit, quem dehinc globulo in ſucco Nicotianæ, folio butyro compoſto evomuerit feliciter, magnopere nos non vexat, cum vel inde particularum deliteſcentiam & ſyrina pateſcat, inprimis quòd felis ante bolum, ſurſum deorſumque curſitando venenum hauſſam, fruſtrà evomere conata ſuit, nec dubitamus, quòd in ſis, qui ſumo Nicotianæ admodum deſectantur, ex crebriore uſu, linguæ & nervulorum pori ita immutentur, ut re integratæ, & quæ intaminatos alios lædit, alexipharmaci & ſuſtentationis quali loco fruantur, unde etiam ad alia, quæ de Nicotianæ uſuſare multi jugà Authores deprædicant, differenti modo reſpondere poſſemus. Sed in immenſum iſta exteſcere nolumus, olei deleteriam virtutem ulterius probaturi. Idem ibidem.

# OBSERVATIO XIX.

## Olei Nicotiana effectus in Ranis.

**D**ie 8. Maji 1681. præſentibus D. Cand. SpecKero & D. Andrea Kœlio Curiens. tanas bſnas gutt. aliquo olei Peti in dorſo inunximus: mox iſtud inflari, oculi mire intorqueri, artus obrigere, & motus tremuli, citra convulſiones gravioreſ, in toto corpore obſervari ceperunt. Ventrem harum cum aperiſſemus, cor diu adhuc pulſavit motu ſyſtoles ac diaſtoles admodum conſpicuis. Vena cava ex hepate, in cujus ſubſtantiam ramos aliquot diſtribuit, in illud recta perrexit, inflataque cum altero pulmonum lobo ſimul intumeſcere fecit adeo: ut veſiculofum proriſ, non tamen citra ſibrarum indicium appareret: Pulmonares veſiculæ maniſeſtiſſimæ cum vaſis ipſas perreptantibus (vid. ſis. Malpig. de ſtruct. pulmoa.) Sub his Oſophagus pergit amplus ſatis, vaſiſque conſpicuus, quem ventriculus membraneus & validus excipit, à quo protenditur Intestinum duodenum cum reliquis tenuibus, in quibus ad ſuporem uſque vaſorum ſanguineorum circumgyrationes videre lieuit: Sub duodeno progreditur pancreas oblongoſculum, cum quo in progreſſu ductus choledochus è veſicula fellis, in hepate ſubatro & trilobulari ſira egrediens, artius uniti videtur: Meſenterium vaſis admodum ſuperbit: Renes quoque oblongi ad ſpinam utrinque ſiti, vaſa emulgentia, ex cava & arteria magna, quæ evidentia erant, turgida oculis objecerunt: pergit ex his ductus limpidus verſus veſticam, quæ inſtincto recto fortius adhaeret, quem ureterem diximus: E ſiniſtris ventriculo ſubjacet lien parvulus, glandulam ovalem referens: Adjacet ex utroque latere ovarium nigricans, vaſis & ductibus donatum: Oviductum, qui inſtar farciminis multifariam intorquentur, ex utero bicorni prodeuntium, amœna eſt facies: alterutro uteri cornu inflato, alteruter quoque inflabatur, nec tamen penitiorem horum cum ovario communionem colligere lieuit, quamvis pone illud æt. m injiceremus, ſecus ac in alijs animantibus fieri notavimus. Chr. Jacobus Tubam ſuperius intra regionem cordis, hepatis, & pulmonum ſe abſcondere ait, nec ſcire quo poſtea pergat, & Svamerdamius Mirac. Natur. pag. 24. In Ranis, quæ una vice undecies centena ova ponunt, & in quibus ova ſingula ſeſe mutuo per inſundibulum ſubſequantur, oriſcium tubarum duorum circiter digitorum laritudine ab ovario diſtare inquit, & non modo valde anguſtum, ſed etiam immobile eſſe, nec ſeſe ad ovarium applicare, ut obſcurum ſit, qui ovorum ſubſceptio contingat: Nos de hiſce in ſecundis Cochlearum curis quædam diſtinctius dicere ſtudebimus: Quoad partes exteriores, præter ar-

ras musculolos, manuumque digitos quatuor, & pedum anatisformes; notavimus foraminula duo prope os, quæ nâres constituunt, hinc oculos micantes, quos membranula palpebræ loco obducere norunt. Post hos ad latus utrumque maculam rotundam subalbidam, quæ aures supplet, nec cerebrum parvulum ipsis deest, cum nervulorum propaginibus, de quibus qui voluit plura, adeat Barachographiam, præfat. Clar. Jacobzi.

**O**leum commune esse insectorum hostem, ex Verberibus plarimè traditur: docuit tamen Recentiores experientia, non omnibus perinde illi-um necem intulisse: Etenim ante nos Celeberr. Malpighius, in Bombycibus aliisque notavit, nisi officia trachearum oleo asperguntur, gravius damnum inde non ferre, verba ipsissima heic apposuisse, non erit abs te. Ue autem intimis (*inquit Dissert. de Bombyc. p. 51.*) rem hanc perspectam haberem, ventrem, caput, os & dorsum, ille testamen tracheæ orificiis, sæpius oleo aspersi, nec unquam extinctos vidi vermes, nec etiam lava inde suborta symptomata: Nec obstat quòd Nobiliss. Redi lib. de georat. insector. p. 155. meminit, se vermes omnium maximas, & inter eos aliquos autumnò natos, variis liquoribus, cum primis autem plures in oleum immersisse, nullo tamen eorumdem mortuo, quin omnes statò tempore in ova nigra mutarentur, siquidem culices ex his prodire soliti, in ipso prodeundi acta maximam partem succubarent, iudicio manifesto, osei insensam vim vermes non penitus eluisse. Fontè etiam singuli tracheæ hiatus oleo non fâere oppleri, quia patribus aliquibus, pabulum nitro ætærum subingredi, sicque vita protrahi tantisper potuerit, quam coincidente licet ex oleo animalis illud, per aliquod tempus subsistente cordis motu, subsistere quoque sæpius depreheodimus: Elucescit hinc oleum & pinguis ejusmodi, insectis funesta esse, non quòd sanguini in circutulum eunti obstaculo sint, uti quidem aliqui hæsiolati sunt, siquidem & effectus nocivus promptus sit admodum, cordis motu aliquandiu persistente, & aliis, quàm tracheis oleum illud partibus, non perinat, sed quia ætærum subiripiendo, respiratione insecta privant, unde aliquid subitæ suffocationi simile succedit protinus: In ranis Nicotianæ oleum, non sanguinis circularem motum impedit, siquidem sanguinis motus integer peritit, nullaque grameiscentiæ indicia apparuerunt, neque suffocationem induxit, cum per tracheas ejusmodi ætærum non hauriant, libero in pulmonales vesiculas ei existente impulsu, pro vitalis auzæ conservatione, sed solâ particularum irritatione, spiritus in motu suo turbavit & quasi obtriscere fecit, ceu etiam aliis salina figendo & oleosa irritando spiritus, machinis hæc ioterium affertot: propterea tamen non iocissimar, ubi oleosis totæ iongerentur ranæ, damnum præsto esse posse, forte ex transpiratione prohibet, quâ tamen pariter, utpote aquis maximam partem immerse, indigere non videntur, unde veritas hujus ulterioribus experimentis tentanda ac confirmanda. Io homine alia cùm partium est textura, tum transpirationis ratio, unde nec oleum Nicotianæ, nec alia pinguis illa, labem ita funestam accersunt, &c. Alais in ranis mentem oblectavit maximè, quòd discisso penitus abdomine, corde cum vesiculis pulmonalibus exempto, saltus robustos aliquandiu adhuc iogemmare possunt: Scimus quidem adeò artificiosè fabricatos esse pulmones, ut particule nitro-ætræ, facili opetâ, tum in sanguinis massam pro hujus motu sustentando, tum in cerebrum

pro spiritus animalis confectioe, in illis sequantur: Ubi autem hoc ipsum ætæris receptaculum, & materiz nitro-ætræ vehicula deficient, motus muscularis, in aliis saltem animalibus, ut plurimum deficit, vir alio quopiam, præter undulationem, tantisper residuo. Observavimus tamen iu viperarum excoriatione, capite præcisso, omnibusque interaneis exemplis manibellum in exuviis circumgyrationis motum, per plusculum tempus subsistentem, spirituum idoneâ adhuc copâ residuorum, certissimo indicio, etiam si unde sustentari potuissent, cerebrum amplius non adnectit, quo utique ranarum saltitatio probabilior evadat, utpote spiritus animalis fonte necdum orbatis; utrobique tamen particulas, minus solubiles, subviscidas, nec tam citò desegregantes, ex sanguinis circulo residuas, agnoscere nihil verat, quibuscum spiritus animalis blande irritatus, motus ingeminat, priusquàm in auras velocius abeat: neque eoime ejusmodi vehiculum viscosum, in ipsis nervis illi adungi verisimile est. Illud vero præprimis hîc memorandum, cujus Clariss. Caspar. Bartholinus in Epist. de Nervor. usu ad Oliger. Jacobum meminit: nivea corporiscula ranarum dorsum utrinque stipare, nervisque & spinali medullæ continuari, atque in his, ceu vascula intertexta evincere videntur, probabiliter aliquam spiritus animalis secretionem fieri, cujus ope abscisso etiam capite, Mortibus aliquibus ingemioandis adhuc sufficere: Uterius admirati sumus, qui vocem in aquis tanæ edant, quod Aristoteles lib. 4. hist. animal. cap. 9. explicare contendit: Πάνθ δὲ τῶν ἐλαττωμένων, ὅταν ἐν τοῦ αἵματος τῶν ἀνδρῶν εἰσὶ τῶν ὕδατι περιεσθῆναι τῶν ἄνδρῶν: Reddunt ranæ itam illam ologyinem, maxilla inferioris labro demisso, pari fibrâ cum aquâ modicè in fauces receptâ: cui autem rationi contrariari videntur respiratione cessans, in hoc amphibio cum in aquis degit, siquidem ex trachearum aperione, aque itruentes statim pulmones inundarent, quod adhuc magis contraret, ubi intra aquas labrum inferius demitterent, prout illud fieri Aristot. ibidem affirmat, cùm ad Venerem semellam iovitaur: Ejusmodi tamen ululatus, si in vel sub aquis auditur, potius istarum ab ætære, (quem intra vesiculas pulmonales modò recondiderant) vi ejecto agitationem, quam intra fauces diutinam retentionem demonstrat: Ranarum coax in pratis saltantium, & extra aquas constitutarum nunquam audivimus, id tamen alii nobiscum fortè animadvertent, exerto capite illud edere, ut adaptato, ore, ætæris idonea versus organa vocis quantitas decenter itruat, qui ibidem repercutus, motu undulante, ad organum auditus nostri illicò defertur, talisque soni, quem vocem hujus animalis dicimus, ideam in mente nostra parit: facit huc etiam labri inferioris depressio, seu certa moeritatio, non modo pro aque pauxillo, quod pertinaciter non negabimus intra fauces suspiciendo, sed pro ætæris repercutione vicissim adjuvanda: atque ita simili, quam in gargarizatione animaladventus aspiratione, coax ipsarum perficietur, dummodo fauciam eadem sit structura. Idem ibidem.



deis, fufiffimè diffedit, fimulque fel veneno illi natales præbere auctor eft, quod de viperis alios fomniæ Nobiliff. Redi fuis de viperar. morfu obfervatione oftendit: Nos ex faliva, quæ ad iram concitati infecti morfu acerrima juxta communicari poteft, fepofitis tantisper veliculis diſtis, de quibus nondum profus conſtat, ſymptomatum ſubſequi ſolitorum rationem poſſi debere, verifimiliter exiſtima-

mus, præterquam enim quòd acrimonia fibras nervas pungendo intumefcentiam parit inſignem, ſanguini immiſta deſuper, fundendo craſſum ejus non raro maximopere pervenit: de quo autem in Schol. ad viperar. morſum aliqua adhuc addemus, ad ani-les nugas ablegantes, quod de ſtudioſà veneni de- poſitione, ſerpente aquas tranſiituro, vel vulgus, aut alij parum prudentiores comminifci ceperunt.

## OBSERVATIO XXI.

*Olei Nicotiana effectum in laceratis & limacibus.*

**D**icto 2. die Maji laceratæ gladio vulnus infiximus, eique poſt guttas aliquot hujus olei inſtillavimus, unde ſtatim corpus contremiſit, & artus primùm ſuperiores, hinc quoque inferiores impetuoſè convulſi fuerunt, ſubſequente infecti inſeritu.

Die 6. Maji limaces duos dicto oleo inunximus, caput imprimis, ſed citra ullum effectum deteriorem, hinc foramini pupilli-formi ſtylum eodem oleo madidum intruſimus, nec mali quidpiam inde perpeſſi ſunt, mox acu eodem infecta pupugimus; ſed nulla plane motuum convulſivorum ſequébantur indicia, adeo oleum hoc ipſum lymphæ limacum renaci inſiſcarum, quæ per dorſi exteriora ſecedeat, quæ ex foramine dicto & loco vulnerato effluebat, egregio documento particulas irritantes, interdum ſua in activitate impediri.

**Q**uod in limacibus non parem, quàm in laceratis, effectum edidit oleum noſtrum, ejus activitati nil præjudicare poteſt, ſiquidem in illis munimentum adſuerit limoſum, ſeu *mucosum* quod irritatæ medicamenti particule, ſuæ quacunque vi ceciderunt, præprimis foramini pupillarum inſtillatæ, quod ejuſmodi *mucosus* copioſe, animali irritato effundit: quin imò puncta externa curis diſtinctum nullum ſentit, quod hoc ipſo glandulæ hic illic diſperſæ, ad muco quo totum coſſilearum corpus madefcere ſolet, imprimis autem baſis ad uberiorem materiæ limoſæ exercitiorem, ſeſe coſtrinxerunt: dubium autem hic qualecunque pulſat, qui iſtius ope olei ſpicula limaces eluſerint? cùm animalium ventriculi, muco viſcido æque obſtinantur, quibus tamen atrocia ſymptomata peperit, cui autem ſatiſſimi credimus cum ſupradictis, ubi mucoſum copio-

ſiorem ac viſcidum Nicotianæ activitati aliquantulum obſiſtiſſe monſtravimus, tum quòd ſerum quo ventriculi animantium opetiuntur, raro ejuſdem cum limacum muco tenacitatis ſiſceruntibus ſine nobis limacum generationem, ova ſe obſculerunt varij generis, quædam enim liquorem, quædam ſortes excluſioni proximis, (qui putamine fracto tantisper propeſcunt) in limum inde concreſcentes exhibuerunt, ut proin mucoſum aliorum animantium, non ita compactus & renax, ſed fluidus magis & poroſior, habito ad hunc reſpectu dici debeat, de quo ſuo tempore proluxius. In laceratis iſtiusmodi vehiculo deſtitutis, & texture tenerioris, ſerocij vehemen- tius, vix enim toti tremorem induxit, cùm archæo undique concitato, convulſionibus corpufculum peſſundedit. *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO XXII.

*Olei Nicotiana effectus variis in Canē moloſo.*

**D**ie 2. Julij 1681. præſentibus Viris Nobiſſis & Clariſſ. Dom. Martino Johanne Haëſbaërri Clivenſ. Medic. D. D. Phil. Jacobo Speckero Medic. Cand. & D. Andrea Kôllo Curienſ. Cani moloſſo ante meridiem 5. præter propter dict. ol. inſudimus, unde ſalivationem moleſtam illico ſenſit. cum ejulatuſque vehementibus, hypochondriorum ſuſcuſſione, reſpiratione frequenti, oculorum niſtatione & vomitu enormi: fæces quoque flavefcentes cum impetu deſecit, tandemque ſarigatus humi decubuit: Veſperi nunc per femoris, nunc abdominis muſculos, acumol. ſatis madidam aliquoties trajecimus, quàm exceperere artuum laſſitudo, ſalivatio crebra, motus imi ventris per intervalla tremuli, tandemque vomitus; citra tamen convulſionum crebriorem impetum. Poſtridie hora circiter prima pomeridiana in venam brachizam, inferius ligatam, ſuperius vero ſecundum longitudinem lancetta inciſam, turundulam oleo hoc madefactam blandè intruſimus, & non diu poſt valde ejulare, eor motibus convulſivis, palſatione imprimis vehemenſiſſima prehendi cepit, una cum arteriis, adeo ut fortiffima iſthæc pulſatio, inſtar aquarum undulantium & per diverſa loca ſubito irruentium, non ſine admiratione, ab adſtantibus commode fuerit audita: Sed vix dum ad viſceris vitalis pathemata ſtupuiſimus, & ecce omnes artus cum capite quàm validiſſime convellebantur aliquoties, uſque dum machina plane ſuſcit deſtructa.

Sæctionem in corpore adhuc calente inſtituiſſimus; in quo quæ inteſtinorum plexus glanduloſi, quæ ductus renales, cum ſerpentina vaſorum circa papillulas corticales ſeu glandulas circumgyratione, quæ etiam vaſcula lactea cum glandulis ſtomachicis, ductibus item pancreaticis & choledochis egregiè compaunerunt, veſica urinaria ob ſui diſtentionem, præ aliis protuberante: Interiora ventriculi laudabiliter habebant, nr & inteſtinorum, niſi quod in tenuibus lumbricos duos, ulnas duas & tres longos, ſive faſciales teretes, exiguo capitel-

lo, & circinnis instar annulorum asperæ arteriæ formatis donatos reperimus: (de quibus vid. sis hist. de fascia lata) Venter medius eor exhibuit amplum, sanguine plenum impitum quodam articulum dextram, quæ sanguine spumæo & florido, qualem etiam dexter ventriculus continuit, fuit distentissima, sinistra contra naturaliter habuit: & ventriculus ei subten- sus sanguine rubicundissimo, tenui, turguit, aliquam equidem, haud dubie ex palpitatio- ne pertinaci, portionem coagulata reperimus, sed & pauca erat, & coloris saturati. Cete- rum vasa hæmagoga per totum corpus micuerunt.

**I**N Cane isto, animali robustiori, effectus itidem notari dignissimos, Nicotiana edidit, dum quæ in fibris ætophagi particulæ aliquæ hærescentes, quæ ventriculi ferocius ævientes, musculorum oris & nervorum (planchnicorum continuatâ insecutione & agitatione, quæ imò constrictione glandularum sublingualium eliamvè nauseam, vomitum, salivatiopem, fecum item per alvum dejectionem pe- pererunt, cum hypochondriorum motibus (pasma- dicis, unde organa spiritalia, diaphragma præsertim in motu suo magis concitata fuerunt, non sine mul- tæ spirituum jacturâ: eorundem ferè symptomatum mater extitit, vulnusculum remota iussit, à quo vicissim salivabar, non tam communice- tione parti- cularum quarundam massæ humoralis factâ, quàm continuatâ spirituum agitatorum contentione, ver- sus glandulas maxillares usque, ed fici- lis quod ali- quot horis autè, labem evidentem jam acceperant:

vitam tamen, nonnisi sanguini ipsi illaræ partes deli- aliquo abstulerunt, acrimoniæ suæ alkaline mani- fissimo reemerio: etenim rarefcentis inde (supra mo- dum humoralis massæ (uti quidem cordis thalami adaperiti confirmantur) motus fervidiores edere, cordis auriculæ & ventriculi, dexter præprimis, co- piofius impleri, palpitare vehementer, & ex conti- nuato per aortæ propagines impetu, undulatio fœ- tis per universam corpus obaudiri cepit, usque dum ex enormi isto sanguinis motu, spiritus animalis li- dem imperuosior factus, convulsiones terribiles susci- citant, quibus tragediæ coroneis imposita fuit: an particulæ æstiores, tunicam arteriarum interiorem, quæ nervæ est, adoriendo motus ejusmodi adaxe- rint, vel etiam hinc inde in artuum musculi, spiritui animalis post associare, horrendam hæc elasin pro- duxerint, alij divinent, quibus facilis est aliorum sententias fugillare quàm corrigere. *Idem ibidem.*

### \* OBSERVATIO XXIII.

*A Veneno exhibitò ventriculus lividus redditus. Lien gangrenosus affectus, in hepate & corde sanguis grumofus repertus &c.*

**S.** **H**istoria horrenda est Venetiæ Zeuningenfis, quæ anno 1680. igne cremata fuit: hæc personis xliij. veneno varijs modis exhibitò necem funestam intulit, quatuor ejus ma- ritis, totidem liberis privignis, & quique consanguineis *Muteti* incolis (pagus est una lœdæa ab urbe Basilea) distans: Illis venenum vino commiscuit, istos vero nunc patris triticeis, nunc jusculis eodem refertis necavit, hos autem pane ex farina, quam ipsa prius venenavit pisto, oc- cidit: Ex dictis personis, præter puellam unicam Gibenacensem, annorum ceteris xvij. nulla fuit sub cultum anatomicum revocata; Chirurgi qui adfuerunt, juramento edixerunt, Abdo- mine aperto *ventriculum* totum *lividum* comparuisse, è quo incisò sanguis nigricans erup- rit: *Lienem* gangrenosum penitus affectum, & ex parte corruptum fuisse, *Hepar* quod primo in- tuitu sanum videbatur, incisione factâ sanguinem extravasatum ostendisse; In corde vero juxta sanguinem grumofum nigricantem, ichorem quendam subflavum extitisse:

Miscella ista semi ægrotâ, iulculum quod à matre propinabatur, primum recusavit, hinc unò alterumve coehleare cum veneni spiculis haast, quorum vim lethiferam, vomitum enormi, cum cardialgia & intensa siti, quæ totius corporis intumescencia subita excepit, statim perensit: Da- materia quam vomitu ejecit comederunt gallus, gallina & carus, & interiere, præcætibz vo- lutationibus, circumgyrationibus, artuum varia succussione, veneni activitatem prodentibus. *Iob. Jacobus Harderus Exerc. An. Med. xli. & xliij.*

**S**ummopere controversetur inter præstantissi- mos artis nostræ duces, quâ tandem toxica ene- cent, æque etiam in homine Animam, in quam ta- men juxta potestativè nihil propriè loquendo exer- cent, è suo, cui tantisper unitur domicilio aufuger facilius: Id mihi persuasum jam habeo, & experien- tia comprobatur; dari varias venenorum species, neque uno eodem modo, parique celeritate intres- cere singula; quidam coagulando sanguinem, quæ- dam hæc ipsum nimium sandendo: Nonnulla in ventriculo statim & intestinis vim suam deleteriam exerunt, alia sanguinis massâ demum immixta, om- nis rursu fluidum vel corrumpant, vel irritant ve- hementius nervosum genus. *Idem ibidem.*

**S.** **P**ræter xvij. annorum puellam *Muteti* me præsentè dissectus quoque fuit vicennis ado- lescent, veneno item misere peremptus: Puellæ ventriculus non sanguine featebat, sed bile plurima; rubebat tamen interna ejus superficies utpote inflammata ac erosa, à veneno ad- eque à bile sursum translatâ & regurgitante; In corde utrobique flexillis sanguis abundavit, neutiquam coactus in grumos: Pericardium inhabitavit subflavus & copiosus ichor, non cor- dis penetralia quæ turgebant fuso sanguine. *Iob. Conrad. Petrus ibid Exerc. 41.*

**N**ota, etsi narratio de una eademque puella, *Muteten* cum sectione, cui adstiter, loquatur, *Harderus* de Puella Gibenacensi pago ditionis Basileensis. O 25

## OBSERVATIO XXIV.

*Morbis ignotus ob Taniam, seu Vermiculatum intestina omnia opplentem.*

§ 1. **D** In horrendis symptomatis divexata laboravit Uxor Dom. Alexandri Plantij Civis Ganevenfis, Ejulatus erant perpetui, cubili contineri non poterat, sed idem idem id deferebat, imo impetu facto exiliebat ut à fascino contractum morbum medici crederent, vel cacodæmone obsessam: Ea tandem mortua, ut obitus & singularem accidentium causa innotesceret cultro anatomico exposita est: Nulla autem alia se exhibuit præter ingentem vermiculatum sive Taniam, intestina omnia tum tenuia tum crassa investientem, tam dirorum symptomatum auctorem.

§ 2. Anno 1633. famulus Aromatopolæ Francofurtensis postquam strenuam navavit operam per plures dies in tritutandis speciebus ad confectiorem Theriacem, morbo prehenditur ignoto, mira symptomatum terribilium varietate stipato, mortem tandem accersentium: Aperto cadavere deprehensus etiamnum vermis insignis, totam intestinorum longitudinem occupans: Hic proculdubio odore à speciebus dum conterentur emanante, perculsus, lancinavit intestina unde accidentium omnium origo: *Ex narratione Clariss. Dom. Iohannis Rocca, qui dissectioni interfuit.*

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QUARTI

## SECTIO XI.

## De Cutaneis Infectionibus, Doloribus Externarum partium.

## OBSERVATIO I.

*Lepra infecta Matrona cadaver exhibuit viscera tum vitalia tum naturalia marcore confecta.*

**I**llustris Matrona, Vasconiz Proceribus proxima affinitate conjuncta, Burdegalam venit anno 1660 aditque Dn. *Debelis* seniorecm, Chirurgum, apud quem tunc temporis artis tytochia ponebam, Lepræ, qua infecta erat, curationem ab illo exposcens: Lepra fuit, eaque confirmata ex judicio Clariss. Medicorum D. D. *Mingelozæan & Emery*, Facultati Medicæ Burdegalensi adscriptorum: Magistrorum item *Desclis & Choves*, Chirurgos petitis. Illius quippe morbi vix ulla desiderabantur indicia: Capillitium omne deciduum tum sponte tum pectine, quod fursureas sordes fœtidas simul decussit: Torvus erat aspectus micantesque oculi, Vultum gutta rosacea fœdabat, & luidus color violaceo proximus; maxime nasum, & labia: Auribus ramen nativa fœvata confusio, nec pone ullæ tuebant glandulæ: quæ in parte colli sinistra, juxta claviculas, juglandis nucis magnitudine utrinque eminebant mobiles: Lingua tuebatur, extrema parte & prope venas tanquam pustulis obstita: admodum fœtebat anima: Thoracem anticum adhuc candidum nullæ squammæ exasperabant sed macies illic summa ut & totius corporis habitus: Mammatum nulla vestigia: Vox nequaquam rauca nisi sermonem protraxisset, fusca enim illico fiebat & adeo obscura ut aures vix feriret, subsequente mox potus desiderio ad inductam siccitatem leniendam: Pollicibus sua constabat crassities, manus squammas aut fursures nullos dabant, at sensus tactus obtusus, erat, ad punctiorem tantum & fortem vellicationem sensiles: Respiratio qualis phthisicorum anhela; Abdomen, præsertim citra præcordium dextrum durum, & ævisum: Loria effundebat pauca cruda, sæpius & crebro cum fœtore turbida: Alvi fœces, quanquam *viscida & cruda* tantum demitteret, tetro odore nares fœriebant: Cutis color ab imo pectore ad pedes usque fuscus erat, nigro proximus, ubique ea arida & scabra: Femora & ribas, non scus ac Gallorum Indisiorum, squammæ vestiebant, omni sensu destituta, acus quippe citra sensum alte adigebatur: Genitalibus ob importunum pruritus manum perpetuo inferebat: Ea nudata pustulas pisi magnitudine exhibuerunt, è quibus nigricans sanies exsudavit: Terreis erat moribus, in excandescentiam prona, maxime post scalptum: Narrabat Illustriss. Parentem similem morbum necasse, contagio in legatione ad Lusitanos contractum, imo in marrem, (ante natam Illustris Aegram) transfusum, paulo post puerperium mortuam: Patrem xij. annos illi superstitem fuisse, sed à fœda illa lue tam male exceptum, ut non Aula solum, sed & omni consortio se subducere necessum



cessum habuerit, quanquam celeberrimi *Garcia à Lopes* Medici Hebræi, opera usus fuerit toto biennio: *Affectus primordia* quaruor ab obitu Illustr. conjugis annis clarescere cepisse. Ex eo duos liberos, utriusque sexus suscepisse, non diu infantes: Luis immunem fuisse, at non scabie levis, quem phthisis anno ætatis xlii. sustulerit: Consanguineis cæteris perperisse: Curam Illustris Matronæ suscepit supra dicti D. D. Medici & Chirurghi, strenuamque operam toto trimestri navarunt, quorum industria, Deum rector, pene salva & incolumis, castellum suum procul diffisum repetiit: pleraque enim recensita Lepre indicia delinuerunt: Novo & nativo capillario ornamur caput, desit scrotor, evanuerunt faciei pustulæ, nasi ramen apice suum servante livorem & crassitiem, imminutum tamen; depositæ & lingua suæ tubercula: Sitis non amplius molesta, subsedere quæ circa clavicular glandulæ: Femoribus & ribiis cutis æqualitas restituta, solus pruritus, ex intervallis reddivus molestus fuit: liberior fuit Respiratio, oculi non ut ante truces: At ab axillis virus odor manabat: Si de venereis sermo incideret, recurrebat in os saliva: detumuit quoque abdomen, cessique hypochondriorum durities: Vegetus ubique erat sensus Tactus, punctiones vel levissimas impatienter ferens: nec excrementorum alvi tantus scrotor comes fuit, liberiusque & liberalius efferebantur: Urinæ colore & consistentia naturalibus erant proximæ, aculeare sale exutæ qui ad crebriorem mictionem excitabar: Sibi tandem omnino dissimilis facta est, candidis mirantibus qui in ea tam insignem ad statum naturalem reditum, quo xiv. mensium intervallo frui licevit, à quo in priorem, & sex intra septimanas pejorem relapsa est, cui se febris continua adjunxit, quam sitis inextinguibilis consequuta est statim letalis: Lethum præcessit vulnus defecatio horrorem omnibus incutiens: Crura, quæ in priore morbo excarnia, insigni rumore conspicua erant.

Cadaver à dicto Dom. Dezeliis, me præsentē, prænominatis Medicis & Chirurgis dissectum fuit, cujus imæ & medix partes solum evoluit: Pulmones scirrhusi omnino & aridi apparuerunt, obfessis illorum bronchiis mucoso, crasso & extrême viscido humore: Sanguis vasibus thoracis conceptus crassus erat & adustus, sero omnino destitutus: Trachea arteria adeo exsucca & arida ac si sub dio plures dies jacuisset. Cor minimum, parvumque serum in pericardio: Pulmonum lobi ab omni connexu liberi. Iecur scirrhusum lividumque apparuit, imo adacta in visceris interiora novacula, strepitus perceptus ab occurso corporum durorum, quasi lapilli oblari essent: admodum quoque parvum erat & aridum, cujus minor lobus vix latitudine duos digiros transverfos æquabat, & longitudine tres: Major eam sequebatur proportionem: Cystis fellea magna, bile turgens: Splen summe parvus & durus: Pancreas succo quodam ad nigrum vergente turgens, & sicco: Mesenterium duris glandulis, magnis & aridis obstrum, succo sebæ unguento basilico remixtum, referente tumidis: Inania quoque & arida erant intestina quoad utramque tunicam: Renes calculis infarcti, sinapi instar se minis exiguis, duris, solidis, porri semina colore referentibus: quotum plurimi ureteres occupabant: pelvis & carunculae laceræ erant: In vesica plurimi etiam reperti calculi cum phlegmate; tres item lapilli phaseolum æquantes ad instar topi molles vel indurati gypsi: Uteri quoque membranae exsiccatae erant, nec non illius substantia, coarctata etiam & vulva & rugosa, patentibus nihilominus admodum multis vasibus spermaticis: Incisuris factis in habitus corporis musculis, præsertim artuum inferiorum, reperta pluribus in locis caro scirrhusa, præterquam in ribiis, in quibus paulo minus arida: Venam cruralem implebat sanguis niger & adustus, inanibus pene arteriis: absque vi à digiris pedum ungues abscessere, manuum pressus cohererebant: Ex communicatione *Mag. Ludov. Bailly Chirurgis Genev. peritiss. qui curationi & dissectioni interfuit.*

**L**epra fuit enque confirmata.) Rogat Senatus ut selecti viri judicent num Socrates sit elephantiscus, Est enim Artificis absolute respondere vel Elephantiscum esse vel non esse, Sed hic nec precipitanter timidos esse oportet, nec temere securos: Ex æquo quippe & bono res est æstimanda, ut ne nimia facilitate res extenuetur vel eleveur, vel præjudicata opinione aliter ac est judicetur: Quod Pater dicitur fuisse Elephantiscus, id quidem ad casionem majorem valet, ut nihil negligatur, imo ne levissima quidem indicia & argumenta, vel, ut serio magis dicatur, nil curemus quid ante, nec quid post, sed omnino ad hanc hypothesin veniat. An hic qui nobis sinitur Socrates sit elephantiscus, quoniam de eo segregando disceperat. Hoc uno judicio tota hominis fortunæ disceperat. Cæterum forte aliter se gerere oportet Medice agendo, aliter ex æquo &

bono: Nam sunt signa medica, & hæc sunt altioris estimationis, Alia sunt signa vulgaria, ut quæ sub obtutu oculorum cadunt: Si medice, id est paulo severius agatur, quoniam antequam signa foris edantur, minus confirmata & perfectum malum à Medicis credatur, potest elephantiscus ita judicari nullis signis foris eminentibus: Maxime vero semē mali fovetur ac semper iustus si à patre elephant. quis oriatur: Morbi enim quidam jure hereditatis ad posterorū derivantur, maxime vero elephas, & qui morbi partes solidas, quarum vis natura esse dicitur occupare solent: Semini enim nescio quæ vis impressa est, quæque valet ad speciem ita latenter morbosam diarrheam devehit & transfundit: Eos vix insita est tanquā tradux, ut ex macrocephalis macrocephali generentur. Ex ista lustrare oportet internas partes: Contra si ex æquo & bono res est iudicetur, relicto paucō exactione internarum partium

erumque, ad signa externa tam univoca quam aequivoca deveniendum, ut per hanc tanquam manifesta ad rei noticiam delabamur: quin id nequit fieri quin & internæ partes explorentur &c. *Ballonius consilio 49. lib. 2.*

**Lepros.** ] Communiter Latinorum & Arabum Lepros nihil aliud est quam Græcorum Elephantiasis, quam non incommode definitimus *Cachexiam fœdam, contagiosam admodum, cancrum totius corporis habitum ex adustis atrabilariis humoribus, à jecoris & hepatis infectione potissimum provenientibus genitam.* Hinc *Paulus & Egnetia* lib. 4. cap. 1. cancer universi corporis dicitur: *Avicenna* verò *Fenestræ* 3. cap. 1. est morbus corrumpens complexionem, & formam, & figuram membrorum, proveniens ex multa asperione cholæ corruptæ ad totum corpus: *Cachexiam* ergo fœdam pronuntiamus hunc morbum, quatenus universalis est corruptio nutritionis, à depravata *assimilatione* proveniens, quam non tantum calida sicca viscerum *duroregia* gignit, sed specifica venenata qualitas concurret, cujus ratione merito morbus hic occultus & à tota substantia vocatur *Fallapia, Palmario*: Qua ratione diu delitescit priusquam se prodar, nec ejusmodi conjecturam principium ejus exhibet, ut alij morbi, quos intemperies manifesta & putredo communis humorum introducit: Dicitur autem *contagiosa admodum cachexia*, quod non tantum fomite & contactu, more suis veneret, sed etiam bilis inficit, quatenus seminatia ejus in adusta materia consistunt. Causam continentem statimur *specificam & veneratam hædionem jecoris & Lætiæ*, quam aliqui magnam temperatissimam huic malo propriam dicunt, cujus ratione talis depravata sanguinis & reliquorum humorum elaboratio: Quanquam vero calidam siccam intemperiem *Avicenna* & alij assensent, sanguinem crassum & læculentum scilicet adurentem, adeoque causam materialem proximam, producentem, cujus ratione morbus ipse, tanquam principis vitalibus admodum contrarius, frigidus atque siccus dici queat. Non tamen hæc sola sufficit, sed necessario simul substantialis occulte corruptiva qualitas, huic malignitati leprose propria, ponenda venit, quæ varia nihilominus symptomata generat, quatenus cum humoribus diversis complicari solet, quod *Avicenna* quoque inhiuit, dum dicit Lepros magis fœdam plus noxiam, & difficiliorem accidentium esse quæ sit ab adustione bilis, illa quæ sit à fæce sanguinis: *Paulus & Medici Græci*, duplicem statuant ex hoc fundamento Elephantiasin: Minus malignam, ex hoc bemere maligno adusto: Deteriorem, ex flava bile, per adustionem in atram permixta. His tertia solet addi, *subalbida*, quando cum melancholico humore simul pituita falsa miscetur: Talis causa *Continens* & proxima triplicem originem habere potest. Est enim interdum *hereditaria*, ab impuro parentum vel avorum semine communicata, quatenus hic morbus ex eorum est numero qui firmas obtenent radices, quibus posterituti quoque communicari possunt. Interdum *Contagio* quoque malum contrahitur, ubi maxime locum habet congestus veneris, in quo massæ sanguineæ quidam effervescentia fit: Tertio sponte quoque præputio vitio contrahitur Elephas, cum possibile sit ut in corpore humano qualitas venenata generetur: Hic omnia quæ melancholici humoris malignam generationem juvant perpendenda veniunt, ubi primum externæ causæ recensentur, ætæ scilicet ambientis constitutio sicca, tam caliditate quam frigiditate excedens, quatenus illa sanguinem adurit, hæc incassat & perspirationes prohibet: Hinc etiam in calidissimis regionibus, ut in

Alexandria, quam in frigidioribus, ut pote septentrionalibus, frequens est morbus, accedente simul victus ratione, quæ alias secundum locum ubi nec inter causas extrinsecas omnia illa quæ adustos humores augere possunt observantur, quæ ratione *Forestus* etiam ambiente ætæ frequenter humiditate prædido, nihilominus in *Baravia*, propter salisrum carnium, & plurimum salamentorum corruptorum ac piscium non bene salitorum usum, plurimum Elephanticos fieri statuit: Imo *Fallapium* etiam hodie in Gallia & Germania Lepros potius ratione victus quam ambientis ætæ causa fieri statuit: Adde his ex rebus non naturalibus eas quæ quæcunque ratione causam adustionis, & corruptioni humorum præbere possunt, præsertim consuetarum vacationum, ut sunt fere mensium & hæmorrhoidum suppressiones &c. At sicut externa causa nunquam morbum producit nisi interna interveniat, ideo dictæ minime sufficiunt, sed requiritur ut internæ antecedentes concurrant: Ubi sese offert omne illud quod efficiunt, & collectionem adustæ peccantis materię potest augere, tam respiciendo *duroregias* viscerum concoctionis secundæ malignam, quam (supra abundantes humores ad adustionem atrabilariam promptos: Quid ergo mirum erit, si propter naturam labem hepatis venisq; impressam à prima nativitate, pedetentim sanguis & spiritus simili malignitati prædicti consuecantur: Quid mirum si atrabilariis morbis ita debilitentur viscera, ut sponte sus postea præclivæ reddantur ad ejusmodi faccos malignos producendas, idque eo magis si symbola victus ratio, vel ætæ ambientis constitutio, vel denegata superfluum tolemnis evacuatio concurrat: Quid mirum si per contactum impurum, per communia pocula, quispiam malignitatem illam attrahat, ita ut consequenter spiritus atque sanguis, pedetentim, vero Jecur etiam, & alia viscera cernuntur, ut exinde totius temperamentum ad naturam leprosam immuetur?

*Vix ulla desiderabantur indicia.* ] Cum cognitio morbi (qui non immerito vocatur occultus) appareat, libet subijcere modum quo in examine Leprosorum ipse uti soleo quando ad magistratus nostri mandatum pronuntiandum est: Primo nomen proprium, cum familia parentum, & ætatem annotamus, eoque ipso inquirimus num forte parentibus vel avis leprosis genitis fuerit: Deinde quo vitæ genere utatur, quoque sodalatio hæcenus usus sit. Num forte per contagium aliquid contraxerit: 3. Quibus morbis alias obnoxius fuerit, simul temperamentum & constitutionem naturalem ante morbum recolligendo. Ubi una etiam consuetudinem evacuationum forte suppressarum mentio facienda: Tandem 4. Lædentiæ & juvenitiæ consideramus, inquirendo in regionem, habitationem, victus rationem præcedentem, & similia quæ adustionibus atrabilariis anam præbere possunt: Hoc factum, quod interna symptomata, functionum naturalium, vitium & animalium constitutionem perpendimus: Quoad *naturales* actiones querimus 1. An *ructus* frequenter adsint ventriculi. 2. An alvus p. n. sicca 3. *Urine* cum frequenter subjugalis, varia, quam tamen fallax signum stotunt multi, licet *Lemnius* 2. de oculis cap. 52. ubi plumbi cineres in eadem natantes pro certo signum ponat, 4. Num imperis in *Venerem*, affligat, 5. *Sudor* & *expiratio* num fœtida: Quoad *Vitales* 1. Num *Pulsus* frequenter debilis & varius. 2. Num *Spiratio* difficilis 3. cum *angustia* pectoris 4. eaque fœtida: Quoad *Animales*. 1. Num adsit *seguis* totius. 2. Torpor sensuum 3. Externarum refrigeratio 4. *adæquatio* cutis, 5. Motus difficilis 6. Somnus gravis, Incubus, 7. Somnia perturbata, 8. *Puffillanimitas*. 9.

Num *Pruritus* aliquis sub cute instat formicarum, seu lassitudo ulcerosa? Quibus diligenter inquisitis, denudatis partibus omnibus. caput inspicitur, num pilis capitis leviter decidere incipiant, num sabuliosiores redditi in barba, supercilis ac palpebris cadant, & in radicibus extrahi carnis quippiam secum auferant? Num oculi rotundi, torvi, aures acuminatae, labia crassa, nares exteriori tumentes, interiori occlusae & ulcerosae, facies tuberculis inaequaliter tumida, coloreque rubicundae ex livore tinctae? Num sub Lingua *Variculae* instar intumescunt venae, cum tuberculis grandinum instar, quae in angulis oculorum saepius etiam observantur? Num cutis unctiosa, ut affusam aquam non recipiat? Num sub ea *Tubercula* fere insensibilia, praesertim post aures, circa extremitates etiam & crura? Num eadem instar asherum deplamatorum, vel fissuris horrendisque rugis corii elephantis referat, vel verrucis grandinem suillam emulantibus scateat, vel morphae, impetigine, scabie sicca & insanabili constet? Num articuli nodos? Num extremitatum partium musculi, praesertim prope pollicem consumpti? Num ungues incurvantur? Num puncturas per Cbirurgum acutifectas in cute sentiant? Num ulcera foetida & caecothoe habeant? Num digiti pedum & manuum fissuris & ulceribus foetidis, laborent? Num vix rauca & obtusa? Quibus omnibus inquisitis, ubi etiamnum incerti sumus *Pena sepiens* institutus, ut in sanguine observari possit num sit crassus, adustus, faeculentus, pinguem quasi superficiem exhibens, qui per pannum colatus atepotum quid post se relinquat, quippe cum sale & aqua parum per mox permixtus, non facile dissolvatur (praesertim cum interdum una cum aqua gelatinae modo congelati solet, quod *Marc. Donatus Historiæ ab. lib. I. cap. 4.* observavit) nec etiam additione additi prompte miscetur, sed potius effervescat? His igitur equivocis etiam signis ex parte tantum,

una cum iis quae ab essentia morbi sumuntur, praesentibus, Elephanticum morbum iudicabis, cumque tantum incurabilem, à contagiosa Lepra praedicta à consorcio sanorum separandum esse statimimus.

At si desint *universa* morbi signa, etiam si scabies sicca, sicca cutim afficiat, eamque pustulis majoribus exasperet, duriores tumidioremque reddat, exedat, findat, in eaque furfures producat, non dum *Elephantiasin*, sed potius *Psoam Graecorum*, praesentiamus, Imo si in pectus adhuc malum illud progredatur, ut maximo cum pruritu & corporis aetiole care sub cute simul exedat, cutique non solum in furfures, sed etiam squamulas resolvatur, nunc crassiores nunc tenuiores, maxime circa pilosas etiam capitis & faciei partes, Lepam Graecorum inde colligimus, plurimum adhuc ab ipsa Elephantiasi differentes, ut pote quae saepius curationem admittit, nec ita contagiosa sit, itur, quamquam procedente tempore in Elephantiasin veram, mutari possit. *Gregorius Horstius Observ. lib. 7. Observ. 18.*

*Affectus primordia etc.*] Hippocrates morbos distinguit ex Sexu, ex Aetate: Aetate, ante xiv. annum *Leuce*, seu Lepra alba & *Cancer* non affligit, nisi sit *congenitus affectus*, ac si dicat, se prodi non merito aetatis sed alia ratione: Hic morbus aetate nil impediens prodi: A xiv. ad xlii. omnes morbi se produunt, ai: Hippocr. à 41. ad 63 (annus aetatis 42. notat annum climactericum secundum) strum non ad sunt: *Balonus loco citato.*

*Capillitium omne*] Quod ad sexum attinet, Hippocr. ait mulieres non laborare Podagra: *Seneca* addit Desfluvium capillorum, quo mulieres non laborant (id tamen apud Hippocr. non legitur) Tamen Aristoteles ait mulieres non fieri vitiliginosas, & ob menstrua & cutis densitatem, Tamen his morbis laborant mulieres, non quod mulierum natura sit mutata, sed vita, *Idem ibidem.*

## OBSERVATIO II.

*Psoa laborans in cysti fellea lapidem habuit.*

**O**riuntur lapides in animalibus duobus modis, altero quidem à frigore, ut in limace &c. altero à calore, ut in taurorum vesica fellea saepe, & in hominum etiam aliquando: Nam inventus est annis ab hinc paucis ante lapis in vesica fellea hominis, eo scabiei genere quod Lepra vocatur laborantis. *Cardanus lib. 7. de subtilitate.*

**A**b obstructione Vesicae felleae & ad pororum choledochorum Icterus induci palam est, quia scil. bilem non segregant, quae sanguini remissa in habitum diffunditur, atque ut varia est bilis conditio & acrimonia, sic vel icterum, sim plicemque cutis defecationem invehit, vel scabiem aut psoam inducere apta nata est: Quamvis eadem intra sanitatis limites consistit, excreticem intestinorum promovet, si insigni acrimonia praedita sit, Dysenteriam etiam parit.

*Psoa.*] Psoa sive scabies in variis & crebris totius corporis locis, cum pustulis sive eruptionibus exiguis, modo siccis & saepe squamosis, modo humidis & ad ulcerationem dispositis, cum pruritu valde molesto infestat: atque huiusmodi affectio propriissime istius partis morbus est, atque quae in ipsa cute propter contagium externum saepe incipit, & frequenter per remedia quaedam tantum cutanea sanatur, saltem urinisque ratio eam tenet, ut raro aliter perfecte aut suscipiatur aut curetur.

*Psoa*, sive scabies vulgo describitur esse Pustularem in toto corpore sparsim erumpit, ab humore acri & salso, intra poros cutis aggesto procedens; & exinde ut dicatur, ob pruritus insignem, scalpendi necessitatem inducens.

Ut morbi huius causas & symptomatum rationes rite investigemus, paulo altius de materia *supra* causa ejus conjuncta inquiramus, nimirum ut innotescat cujusmodi sit humor iste intra cutim aggestus, quo pacto illic aut generetur, aut aliunde adveniat, dein quibus partibus aut loculis contineatur, & quomodo foras erumpere nitens pruritus adeo molestum cieat.

Inaque circa huius morbi ortum, ut non cum veteribus jecori, vel lieni, culpam nimium imputemus, materies ejus non esset quilibet humor singularis, & quatuor vulgo suppositis, videl. non pituita, non bilis flava, vel atra, nec etiam ipse sanguis per se extravasari aptus; porro nec illa à duobus vel pluribus humorum simul mixtis constare videtur: Enim vero ut denotat tales humores, ex iis tamen si morbus hic semper constet, non ita facile per merum & leve contagium suscipi, aut litu solo cutiri possit: Quamobrem potius opinari fas sit materiam morbosam esse humorem lymphaticum, in glandulis cutaneis constanter residens, at tamen ab indole sua gemina, scil. salino volatili in acidum aut alias vitiosam degenerare, Eumvero cum huius ita depravato, & perpetim evaporanti, supplementa continua à sanguine adveniant, latices isti, vetus & recens, non facile

congruunt aut ununtur, ac salum dissimilium ritu mutuo effervescentes, in materiam recrementariam coagulantur, quæ poros cutis implens ac diffundens nique passim intumores attollit: insuper sanguinem in transitu nonnihil impedit & extravasari cogit: Hinc Pustulæ crebræ excitantur, & quatenus materies ista in ichorem faciens, à sero & sanguine subsequenteribus usque prorumpit & foras urgetur, in moleculas assurgunt, dein spiritus animales fibras nerveas, ut ichoris istius excretionem promoveant, inordinate subeuntes, molestia Pruritus sensu efficiunt.

Profecto humorem quandam lymphicum in glandulis cutaneis, quæ singulis foraminibus sudatoriis subjacent, propter usus quosdam recondi; quin & juxta copiam, & motum ejus diversimodum, glandulas hæc plus aut minus turgidas existere inspectio microscopica detegit planissime: Latex iste à sanguine per arterias in glandulis hæc deponitur, nempe ut sarcinula bæ exuta, facilius iste per venas deat, interim illic repositus suos usus habet, scilicet imprimis papillas miliares, quæ cum fibrillis suis nervis substratæ proprium Tactus sensorium sunt, continue madefaciens, ab ariditate, qua sensatio impeditur præservat: Insuper idem effluvia adusta à sanguine accenso perpetim decedentia, juxta cutis transitum humiditate quadam imbuir & halitosa reddit: dumque adeo laticis hujus pars cum sanguinis effluvis continue evaporat, impendia ista per lympham, usque recentem à sanguine arterioso (uti dictum est) jugi exutam reparantur.

Attram hæc cutaneæ regionis æconomia non ita regulariter usque servatur, quin humor iste glandulosus, ab indole & functione sua desciscens, no modo in cute, sed interdum in toto corpore affectiones præternaturales diversimode excitabit: Hic lente scens, inque localis pertinacius hærens, diaphoen obstruit: Ab eo nimis uberim foras exodante, tudano immodica: Ab eodem intus restagnante diuresis debito copiosior procedunt: Porro ad scabiem & eruptiones pustulosas quod spectat, humor iste cum pluribus, ita potissimum tribus hæc modis depravari, proindeque diathesin cum sero à sanguine recens affluvo coagulationem inire solet, videlicet. Ipse sanguis valde impuratus, simulque dissolutus, corruptelæ & recrementa sua uberrim in glandulis cutaneis relinquit, quæ ibidem fermenti magis corruptivi naturam induentia, cum succis aliis adventitiis, aut pertransientibus effervescent, & varie coagulantur, adeoque non solum affectus *Urticæ*, verum & leprosiis diversimodos pariunt: Hinc piscium crustatorum, quin etiam aliorum, & quadrupedum salutarum, & sole aut fumo induratum comestio crebra & assidua, item potus incongrui, & pharmaca venenata assumpta, eruptiones cutaneas passim, & non raro horrendas cient.

Secundo humor glandulis cutaneis apgestus, interdum mera stagnatione non tantam *Urticæ*, sed

etiam frequenter *Scabiei* evadit, quare non tantum diu incarcerati, sed etiam qui vitam sedentariam agentes, squalori insuper & pedori adhaesunt, prædictis affectibus obnoxii degunt: quatenus nempe latex cutaneus minime evenitatus, liquorum putrescentium ritu, meta stagnatione corrumpitur, adeoque fermenti *Scabiei* indolem adipiscitur, cui insuper à sanguine, perinde etiam depravato, putredinis complementa accedunt.

Tertiò, si forsan hæc causæ defuerint, ut cujus humor Glandulosus nec à sanguinis vitio, nec propria stagnatione labem ullam contrahet, atram miasma virulentum ab extra communicatum, cum quoad morbos istos nihilominus prolificum reddit: Ex observatione maxime vulgari hoc liquido constat, in quantum maxime sani, & constitutione optima præditi, vix unquam in eodem lecto, ubi scabiosus simul decumbit, aut nuper decubuit, impune dormiunt, nec ita tantum, quin & scabiosorum sudaria aliis in eodem lavacro lons, ejusdem sepe affectus contagium impertiant: Nullus certe morbi labes (peste tantum excepta) facilius aut certius quam *Scabiei* propagatur: Quod si hujus ratio inquiratur, statim occurrit liquorum miasmatis *Urticæ* susceptivum ad illud maxime exponi & facillime disponi, ad utrumque: certo multo promptius quam aut sanguinem aut succum nerveum: Enimvero cutis latex glandulosus, in extrema corporis superficie scærens, atomos quascunque per foramina & meatus nique patentes intromissus primo inibet & à sanguine anticipat: Porro quod iste à contagio scabio o ram cito inficiatur, faciunt tum fermenti communicati activitas, tum liquoris glandulosi ad degenerandum eo modo proclivitas: Enimvero effluvia à cutis scabiosæ efflorescentis decedunt, satis apte comparantur cerevisiæ floribus, summatim ejus quasi pellicula extitit: occupantibus quorum si portio perquam minima inde dempta alteri cerevisiæ novellæ fermentatæ committatur, totam illico massam quantumvis magnam fermentat, ac in liquoris unde admittit indolem commutat: Magna certe energia est quam particulæ, utcunque minime ac paucæ, ad summam activitatem evadere præstare valent, præsertim vero si in liquorem (cujusmodi est cutaneus) è particulis subtilibus cufusque generis, tum à sanguine tum à succo nerveo delibatis constatum, preindeque citissime fermentari aptum incidunt: Ubicumque igitur miasmatis prædicti effluvia corporis sani parti cuius extera impinguntur, imprimis humorem cutaneum tantum illic loci confutum inficiunt: deinde vero hujus ita infecti particulæ, à sanguine venoso susceptæ, & mox arterioso traditæ, per totum corporis habitum diffunduntur, adeoque brevi humoris istius totam massam coinquinant, & *Urticæ* efficiunt. *Willis operis posthumi sect. 3. cap. 6.*

## OBSERVATIO III.

*Pedes Leprosi, vesicis obfiti, ob corruptionem omnium viscerum, solo salvo corde.*

**G**eorgio N. longo cruciatus & morbis detento, ampullæ ac vesicæ ovi columbaei magnitudine in pedibus enatæ sunt, qui tandem magis quam in Leproso squalidi facti sunt: Diffecto corpore, solum cor illizsum fuit, cæteræ partes erant putrefactæ: vesicæ meatus obstructus, adeo ut bilis reciproco gradu spinam dorsii perforando ad pedes defluerit. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*

[*De leprosi, vesicis obfiti.*] Scabiei cum pruritu nonnihil affinis est affectus alius ob pustularum eruptiones, qui communiter *Impetigo*, à quibusdam *Boneti Anstom.* Tom. III.

*Lichen & Vitiligo*, atque ab aliis Lepra Græcorum: Hic uti diversa sortitur nomina, ita eadem ab authoribus varie applicantur, & ab his morbi unam spe-

ciem, & ab illis aliam designare perhibentur: Quare cum affectus hujus appellationes varie confundantur, & forsitan quoad naturam, & rationem ejus formalen in diversis regionibus diversimode habnerit, neque profus idem sit in nostro hoc seculo ac fuit olim, idcirco non ex libris, sed ex propria negotiorum observatione morbum hunc describere satagamus.

*Impetigo* ad hunc modum exoriri & afficere solet, videlicet imprimis papillæ, sive pustulæ rubræ, modo singulares, modo plures simul congestæ, in variis corporis partibus, præsertim vero in brachiis aut cruribus excitantur, quibus singulis, (morbo incrementum fumente) undique novæ adjunguntur, & brevi ejusmodi molecularum plures velut aggeres, sive corymbi fiunt: Etenim papillæ iuxta unamquamque stirpem, primo in dies erumpens, & latius usque serpentes, sese in orbem diffundunt, adeoque exanthematam aggeris quidam ampliari faciunt: Cujusmodi harum superficies alpeia, & nonnihil albida & squamosa apparet, unde, si scalpatur, squamæ decidunt, & schor læpe, tenuis exudat, qui tamen mox exsiccat, in squamosas, rursus crustaceas indurefcit: Hi papillarum corymbi primo exigui & pauciores existunt, in brachio aut cute, aliove membro singulares tres forsan, aut quatuor magnitudinem denarii, aut fonsdrachmæ apparent: postea vero, si morbus crescere sinatur, crebriores ubique erumpunt, quæ quidem, quod æreas sensum auctæ, postea coronam argenteam æquant aut superant, verum non semper rotundæ, aut figuræ regularis, sed variiformes existunt: Porro in hoc statu non sistitur, sed affectus, nisi per medicinam cohibeatur, in pluribus usque locis ebulliens, & latus ubique serpens, tandem haud solum membra integra, sed & totum corpus vitilagine leprosa obducit: atque hanc impetiginis speciem, sive gradum potius summum, veteres propter effusionem ejus *scylla* appellaverunt, & plerumque incurabilem censuerunt.

Hinc morbi hujus differentia præcipue innotescent, & imprimis quoad morem ejus plus aut minus malignum distinguitur, juxta quod propius ad scabiei aut lepræ naturam accedit, vel statu medio se habeat: Insuper notare est affectum hunc quandoque membra quædam singularia, uti brachia forsan, aut eruta, corporis partibus reliquis intactis infestare: interdum vero in iis omnibus simul incipere, & ubique sparsim papillas: aut eorum corymbos excitare: Porro hujusmodi eruptiones in quibusdam temporariæ, adeoque diversimode existunt, namque in his fore tantum in hyeme infestant, circa æstatem evanescentes: Item è contra in aliis, quasi brannam horreant, hirundinis adventum & exitum observare solet: in aliis vero plerique hic morbus continuus nullas inducias concedit, imo nullam remissionem, vel mediocritatem habet.

Porro Impetiginem à morbis aliis affinis, atque imprimis à scabie & lepra distinguere oportet: A priori differt quoad pustularum formas, namque in psoa ubique fere singulares, & sparsim, licet exiguis, ab invicem remotæ existunt, hic plures conglomeratim, & quasi per racemos magnis intervallis junctos, erumpunt: Verum inter hos affectus discrimen maximum inde nascitur, quod scabies per contagium facillime, & vix aliter exoriri aut propagari solet, Impetiginis vero infectio rarior aut nulla est, uti mihi à viro in exoritur, aut ab hoc in illum assidue conuehantur: minime transeat. Hic morbus etiam à lepra differt nam, tum quoad eruptionis formam, tum respectu contagi, quod in hinc pariter actum est ac in psoa, ipsaque *differt* multo immensior & horrenda est, videlicet crustæ & squamo-

sa, ubique continua & per totum corpus diffusa.

Hinc constat Impetiginis causam materiem non esse, humorem mere cutaneum, propter miasma ab extrinsecum, aut ob alias occasiones depravatum & à crasi sua degenerem, quia nimirum non, uti in psoa per contagium aliis facile communicatur, neque statim per totum corpus dispergitur. At vero pustulæ circa morbi initia primo erumpentes, inde procedere videntur, quod in massa sanguinea concretionibus quædam acido saline (insitit tartari in vino) contingunt, quæ cum subigi, aut rursus dissolvi nequeant, hic in cutem, quemadmodum illic in doli parietes depelluntur: Hujusmodi concretiones, nec parvæ ac pauciores fuerint, in membris forsan uno aut altero, perque unicuique aut alterum forsan arteriæ ramum in cutim conuehantur: Dein quævis natura eundem quem cepit excretionis modum continuare solet, materies per eadem vasa ad eandem ubique nidos advectæ, juxta pustulas primas, aliam circumcirca consistunt aggeris facit: Postea vero cum sanguinis dyctæla in dies aucta materies ista tartaræ intra massamque uberius progignitur, plures ejus portiones per arterias alias, & subinde alias excretis conuehantur: & propterea pustulæ etiam plures, tum in isdem, tum in aliis etiam membris erumpunt, quæ nova materies per easdem arterias contriungere accedens, & juxta posita pustularum aliarum adjectione in dies ampliat, ac undique dilatat, & deum hi hujusmodi sanguinis tartarus in immensum accrescit, per pluriimas, aut simul omnes arterias extra delatus in cute deliquet, & processu temporis superficie ejus omnem incrustationem squamæ, aut plane leprosa obducit: atque tunc humor ipse curaneus per totum corruptus, in morbi partes cedit: namque hoc sanguinem & humores, dum inter circulandum pertranseunt, magis inquinando, sen potius venenando, materie morbificæ penam augeri facit: quin etiam effluvia *scabiei*, sive corruptiva à se dimittens ejusdem morbi contagium aliis tradit.

Itaque affectus hujusque causa tum procrastitatum conjuncta, in eo consistunt, quod imprimis absque ullo cutis vicio, sanguinem partialis salinis diversimodi status ac indolis saturari contingit, (in cuius diatheseos causas *scabiei* var. mox inquiratur) atque salia ista, præsertim ubi fixa ac acida præpollent (uti eorum mos est) se maculo præbendunt, adeoque in coagula quasi tartaræ concrefcunt, quæ portiones in sanguinem protrusæ, papillarum eruptiones, quasi totidem hujus morbi nidos inchoant: Dein illæ sensum juxta materie supplementum numero tum magnitudine, in dies auctæ, morbi hujus initium, incrementum & a *scabie* producant.

[*Morbis detento*] Ad causas *scabiei* & evidentes quod spectat, duo sunt præcipua occasionum genera, à quibus hic affectus plerumque originem sumit, scilicet mala victus ratio, & morborum aliorum, uti imprimis Scorbuti ac Luis Ventris mala aut minime curatorum miasmata in corpore relicta: Quoad prius, præter communes circa dietam ordinationes, quibus nonnulli carnium salutarum, dein & sale aut fumo induratarum esui, simulque vinorum acidorum potui nimis dediti, hunc morbum facile contrahunt: Insuper vulgaris observatio est plures in eum à carnis porcine, & piscium præcipue crustatorum, comestione nimis crebre aut assidue disponi: Hinc opinari subest utrumque cibum, sive quæ rancidas sive alias improporionarias, sanguini nostro particulas non rite miscibiles, aut facile domabiles conuehere, quibus ita heterogeneis, & dein longo talis diæte usu in magna copia aggregitis, particule cujusque generis saline se facile

facile afficiunt, adeoque congloba tartarea in carum exterminanda, & affectus Imperiginosi aut Leprosi feminis constitunt: Autamen abserrima ejus leges à Scorbuti, ac hinc Venereæ misfmaris in corpore relictis, & demum quoad salum ac sulphuris effervorum combinationes ad *Asperitatem* evectum progignitur: Morbi prioris, & speciatim symptomatis perdidicis, eadem *Myrmecia* rationes alibi explicavimus: Atque hinc venereæ inveterate, imo interdum curati vixit, ita passim accidit ejusmodi erupciones pustulosas supervenire, ut nullus fere his af-

fectus, morbi istius pudenti suspitione careat, (saltem Medici, quoties in tali casu consulitur, prima statim questio est, an non patiens iste labem veneream aliquando prius contraxerit? Enimvero sanguinis corruptelæ, postquam diutina mora heterogeneæ prorsus ac indomabiles sunt, tandem particulas filinas sibi consciscunt, quibuscum in coagula ejusmodi tartarea concretescentes, ac in cutim protrulæ, exanthemata impetiginosa produnt. *Willis loco cit. cap. 7.*

## OBSERVATIO IV.

*Pruritus Vagus in muliere, cui Tumor cancrusus in vulvâ natum.*

**M**ulieri in vulvâ delatcebat Tumor lividus & ater, quædam foret in vivis conquereretur de vago *Pruritu*, oberrante ardore cum mensruis suppressis. *Vide lib. 3. tit. de mensruis suppressis &c.*

**V**ago *pruritus* Pruritus cum sit sensio molesta, ut ratio ejus formalis innotescat, considerare oportet ad quod sensorium proprie spectet, & cuiusmodi ejus affectio sive passio fuerit, Circa hæc, 1. certum est Pruritum ad sensum Tactus pertinere, atque hujus instrumenta primaria esse papillas miliaris, earumque fibrillas per totam cutim dispersas; Insuper hoc sensu fibræ omnes nervæ, ubique per totum corpus diffuse donantur: Atamen cum Tactus dux sit passiones superhe, & quasi genericæ, *Dolor* & *Voluptas*, merito ambigitur cumam ex his pruritus referri debeat: Pro cujus solutione, ostendere oportet quo ritu spiritus animales, Tactus sensorium incolentes afficiuntur in *Dolore*, quomodo item in *Voluptate*, deinde eorumdem geitu etiam circa pruritum designato, facile constabit cujus ditionis hæc passio fuerit, & in quibus ejus natura & fiendi modus consistunt.

De *Dolore* Vide scholia pag. 536.

Cui opponitur voluptas, estque sensoris modus isti plane contrarius; qui nempe oritur quatenus blandi mulcimine supra sensorium factis, spiritus illic confluant, & mox densius conglobati, & delectatione quadam perfusi, in organa quasi exultant & conjuvant: Dein quatenus spiritus intra corpora strati, insimul parem ovationem ineunt, voluptatis perceptio accietur: Maxima voluptas, quæ Tactus offertur, in eo consistit, ut doloris causa amota, partes ab ea prius affectæ temperiem & conformationem pristinam recuperent, ita namque spiritus animales prius fatigati, & ab invicem dispersi, se recolligunt, & ad loca quibus exularant, copiis duplicatis irruentes, quasi ad ovandum se accingunt: Hinc Peripaterici voluptatis rationem formalem solummodo in molesti cuiusdam remotione posue-

runt, uti cum frigoris aut caloris excessus, à statu opposito & magis congruo excipitur: Profecto objecta tangibile (si quidem hoc crassum usque ac hebes fuerit) vix aliud (si *Asperitas* exceperis) spiritus animales ad sensorium conglobatum alleclat, nisi quod eorum confusione præcedenti succurrit.

Ex his circa passiones istas designatis, facile constat *Pruritum*, quoad rationem ejus formalem, plene & perfecte, nec dolorem esse nec voluptatem, verum imperfecte & inchoative de utroque statu participare: Enim vero materies *Suppurans*, intra poros cutis aggesta, & pluribus in locis continui solutiones faciens, versus dolorem inclinatur: Atamen cum illa sit volatica, mobilis, & versus exitum properat; idcirco spiritus animales è sibiis, etiam si divulsis, non fugantur, nec cum molestiæ sensu rettovertantur, verum è contra, quasi humore infesto se potiores, eique ejiciendo pares sentient, inter fibras cutaneas densius, se inordinatim agglomerari, eas varie convellant & deducunt, quo citius materiam morbificam excutiant & foras depellant: Quapropter, quatenus spiritus animales minime fugati & repulsi, sed extoriorum conglobati in tactus organa consueverunt, ibidem *Asperitas* & tumultuarie se gerunt, atque fibræ sensiles velut titillando in leves spasmos cientes, non voluptas, verum sensio molesta, quæ item nec doior est, sed passio ab eo plane diversa exoritur: Quamprimum autem fricando aut scalphendo spirituum copie ubique circa sensorium aggregatæ inelus disponi, ac quasi in ordinem redigi incipiunt, maxima exinde voluptatis perfunctio inducitur. Quare *Pruritus* medius quidam inter doloris & voluptatis initia status, sive spiritus ab illius rudimentis versus hujus complementum transitus videtur. *Willis lib. 2. cap. 6.*

## OBSERVATIO V.

*Penis perpetuus Pruritus à carcinomate in vesica.*

**M**ercator (de quo tit. de urina per alienum locum excreta) cum ardore urinæ, perpetuo dolendi conatu, perennem habuit pruritum in cole. Sordidum carcinoma ambebat meatum illum, qui à vesicæ urinaria illi descendebat in intestinum rectum.

## OBSERVATIO VI.

**Pallor vultus à mollietate pulmonum.** 1. Pustulæ rubræ per totum, præsertim circa hepatis regionem; ab hujus duritie & subsidentia cystis felleæ. 2. Tubercula per totum à vitio hepatis & lapidibus in cysti. 3. Pallor vultus ob Lapillos in cysti, vitium hepatis, hydropem pectoris. 4. Macula purpurea circa regionem ventriculi, in umbilico, inguinibus, à vitio Pancreatis, Hepatis; Lienis. 5.



destinatarum affectuum causa, crudus ille succus cachectiam gigens, uti & malus succus cacochymiam procreans, oritur accumulatque, cujusmodi sunt ventriculus, hepar, lien, ipsique adnexa vasa membranacea: Ventriculi enim intemperiei, imbecillitatis, aut alterius affectus causa, si concoctio sit imperfecta vel viciata, imperfectus quoque & crudus gignitur chylus, qui postea in secunda coctione, cum non sufficienter elaborari possit, similem producit sanguinem, eoque magis visceribus secunda coctionis labem quoque aliquam patiantur, Hepatis, lienis, venarumque vitio, cum hæc ad sanguinis generationem faciant, sanguis imperfectus elaboratur, crudus, vel vitiosus aut aqueus gignitur: Hepatis quidem, cum instrumentum sit sanguificationis, dein & lienis morborum causa sanguificationem impedit, vel eo solo comprobati posse existimamus, quod hepate penitus sano, tamen lien male affectus, *Sicut Sclio hoc sepius patescit*, sanguificationis notas enarratas, uti & hydropem sæpe procreavit: Dein & venarum affectuum causa, cum ad sanguinis elaborationem opulentior, sanguis minus absolute concoquitur, crudiorque remanet: Morbi vero hepatis, lienis, venisque accidentis, unde imminuta sanguificatione crudus sanguis, indeque cachectis gignitur, vel sola vel vitioso accedente simul chymo, sunt imbecillas, intemperies, Obstructio, durities aut alia lesio. &c.

Certis tamen patribus communicatus succus nutritiens, Maculas in illis diversas efficit, prout vel poris cutis, vel divisioni alicui ejus se infinat, Ad poros cutis succus qui pilos illi infixos alere debet, deveniens maculas, quas *Lentes* vocant, frequenter producit: hi enim illis prius assimilatus, coloreque antequam illorem radicibus apponitur non nihil correspondens: si ab illis ulterius in poro, & ambitu aliquoque dispergatur, maculas ejusmodi colorem fuscum plius minusve ad pilorum colorem, dum illis assimilatur, adspicitur, non nihil inclinantem procreat &c.

§. 2. Foeminae pustulæ rubræ per totum corpus, maxime circa regionem hepatis, oboriantur: Hepar: eperum durum, & cystis fellis exhibebat in sese collapsam. *Vide lib. 3. tit. de Alvo adstricta.*

§. 3. Matronæ per cutim passim tubercula enata sunt: Hepar illi erat decolor & durius: In vesica fellis tres lapides. *Vide lib. 3. tit. de liero.*

§. 4. Vesiculam, quod mireris sine felle, tamen cum tribus lapillis interdum conspeximus: Hepar tamen erat rugosum, maculis artis deturpatum, sed ejus succus omnino lividus: Quodque in illum, Pectus aque plenum & ægri facies adeo pallida ut mortuum quis dixerit, *Nic. Fantauum Epitomes Vasalii p. 21.*

§. 5. Puelli cachectici, hydropici cadaver aperitur: Cutis circa regionem ventriculi, umbilici & inguinum, maculis atro purpureis, instar ecchymomatum picta erat: Ex abdomine puncto humores biliosi, ferofi, fetidi effluunt: Omentum & Pancreas consumpta, Venæ mesentericæ obstructæ: Lien ferri, durus: Hepar cocto similis, In eo & liene foveæ aqua plene. *Vide lib. 3. tit. de ventris tumore.*

§. 6. Quidam conquestus est de molesto hypochondrii dextri dolore, cum æstu affatim, & plerumque faciem, manuumque palmas, pedumque post cibum, plantas in vadente &c. Inventa est vomica sinæ partis hepatis connata, satis magna atque aperta, *Vide lib. 3. tit. de hypochondr. tumore.*

§. 7. Juvenis capite doluit, febris erat vere *κεφαλαία*; facies illi rubra, sed maxime genæ &c. Aperto capite, venæ quasi varicosæ, tabo & sanguine nigro turgentes repertæ &c. *Vide l. 1. tit. de Delirio.*

§. 8. Cuidam febre maligna laboranti nasi extremitatem rubra macula obsedit, symptomatibus benignum quid portendentibus: Omnia viscera nigricantia erant & sphacelata *Vide tit. de Febribus.*

§. 9. Virum illustr. adoritur insolita respirandi difficultas, dolor universi thoracis &c. supervenere sopor Genarumque rubor &c. Pulmo insigniter tumidus & quodammodo exesus repertus, in isque unus humor albus & tenax ac purulentus delitescens, *Vide tit. de Febribus.*

A succo pilos nutriente, porisque se infinuante, & vitiosus sit, maculae, quas *vitiligines*, seu *Albae* vocant, prodeunt, quando illis ad poros delatus, ob vitium ad pilos alendas inutilis, in ambitu illis pororum, se in cutem exiguo spacio circumfundens, maculas ejusmodi pro succi pravi divertere gignit: Talis succus vitiosus ex depravata assimilatione illius loci, ubi maculae hæc fiunt, prodit, perquam sanguis ille, qui ad nutritionem eo deferretur, non in succum convenientem, sed pravam locoque depravato similem &c. quo deinceps fovetur, vitioseque nutritur, convertitur, eadem scilicet ratione ut in Elephantia si &c.

*Bilis*, quæ colore eximio prædita est, si ad superficiem corporis feratur, hæc simili colore tingitur: Idcirco cujuscunque causa esse potest &c. *Vide de liero lib. 3.*

A pravis humoribus in morbis malignis varicæ maculae generantur: in febribus malignis, pestilentialibus, venenatis, lue venerea &c.

*Calor*, non solum sanguinem alliciendo vividum vel rubrum colorem, friguse eundem reprimendo pallorem corpori conciliat, sed & calor quia cutem dilatando, ut per eam sanguineus color melius effluat efficit, & frigus eandem constringendo & condensando minus pellucidam reddit: Siccitas nimia cuius colorem etiam immutat, eamque fuscam magis efficit, tum quia exsiccando spissiore, vel contrahendo rugosorem reddit, cum crassities illius, ut opaca fiat efficit, & rugarumbram facientes obcuratatem in ea inducit &c. *Platerus Practica lib. 3. c. 2.*

*Insigniter pelluerat, Pulmonum albedo* Pulmonum albedo & mollities, ut penuriae sanguinis in his index est, sic palloris in vultu causa efficax: In Peripneumoniacis, quorum pulmones sanguine multo & lente turgent, vultus & male rubent servido sanguine ob levitatem ad partes superiores sese effertente, qui consistit ibidem & per cuticulæ tenuitatem veluti per vitrum colorem suum ostendit.



- §. 10. Franciscus N. cum febre continua, dyspnœa &c. adfuit intensus rubor Genarum, In Pulmonibus reperta vestigia inflammationis, qui tumentes, lividi cum pure. *Vide tit. de Febribus.*
- §. 11. Caspar N. dolebat pectore cum dyspnœa. *Genæ illi rubore suffusæ erant: Pulmo dexter colore erat nigricans, ad jugulum retractus, pleuræ ad claviculam connexus: Sinister sub pallido cum tuberculis. Vide l. 3. de Hypochondr. tumore*
- §. 12. Cachecticus cum tussi, febre continua, *Genæ* habuit macilentas, perpetuo purpureo rubore suffusas. Pulmonum parenchyma, integra membrana, totum fere erat in pus commutatum. *Lib. 2. tit. de Phthisi.*
- §. 13. Agricola plaustrifeno onusti ruinam in se passus, de dolore pectoris conqueritur, cui accedit Febris *Genarumque rubor*: Pericardium scatebat pure copioso, cui velut immersum cor: Pulmo ejusdem labis particeps. *Lib. 2. tit. de Pectoris dolore.*
- §. 14. Adolescenti facies rubebat in levi febre, sed maxime *Genæ*: Illi Pulmonis partes dextræ lateri adhæsu contumaciore nexæ lacerabiles, plenæ vomicis, tabo & pure scatentibus: Peripneumonia anno præterito illum oppresserat. *Lib. 1. tit. de Syrenitide.*
- §. 15. Rev. Pater febre prehonditur cum dyspnœa, tussi, pectoris gravitate & Malarum rubore: Inventa est altera Pulmonum pars aucta in magnitudine, densa, dura, rubra. *Vide tit. de Febribus.*
- §. 16. Vir Nob. febricitabat cum dolore ad dorsum & lumbos, cum tremore & fextore totius nulli ferendo: Ex utroque Pulmone serum putre & foetidum defluebat: In Pancreato ingens erat abscessus, cum multo pure & fextore intolerabili. *Vide tit. de Febribus.*
- §. 17. Ill. N. cum febre assidua & fervore in lumbis, horis vespertinis Faciem habebat rubicundiorē: Inventa est corruptio & abscessus in sinistri Renis exteriorē carne. *Vide tit. de Febribus.*
- §. 18. Juvenis in febre assidua, ruborem genarum habuit: Inventa est corruptio gangrenosa in parte interna Renis dextri. *Vide tit. de Febribus.*
- §. 19. Uxor, N. à partu substiterunt lochia; hinc febris, dolor lateris sinistri &c. Facies tota sæpe erat velut subalbida, alias genarum aderat rubor fugax: Aperto cadavere omnia sœpe occurrerunt præter pulmonem; pars sinistra fere magna sui parte tabuerat & tabo infecta erat, sana reliqua substantia. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*
- §. 20. Juvenis robustus, sed pallido faciei calore, à frusto carnis devorato suffocatus interijt: Pulmones illi à naturali statu defecerant, colore lividiores & flaccidi. *Th. Bartheol. cent. 1. hist. 11.*
- §. 21. Quidam diu admodum pallidus fuerat, & mali in facie coloris: Hinc omnia viscera interiora corrupta & foetidissima. *Lib. 3. tit. de Inappetentia.*
- §. 22. Virgo brevi morbo sublata est: Facies illi totusque habitus pallore albescebat: Thoracæ aperto, ab utraque ejus cavitate aquæ virosæ effluxit copia: Pulmones syderati inventi sunt &c. *Vide tit. de Phthisi lib. 2.*
- §. 23. Uxor D. N. parte satapulmonico, tota sæpe erat velut subpallida, facie turgida, pars sinistra pulmonis magna sui parte tabuit: Perulenta materia ea thoracis parte continebatur. *Vide lib. 2. tit. de Phthisi.*
- §. 24. Illustr. N. gibba hepatis pars à nativo colore ad pallidum declinans manifeste visa est: Per virginitatem perpetuo pallente facie omnibus innotuit. *Lib. 3. de Ischuria.*
- §. 25. In virgine pallidis coloribus divexata, inveni testiculum sinistrum pugno majorem, iustus humore seroso & subflavo repletum, foris sanguine suffusum. *Riolanus Anthropogr. lib. 2. c. 30.*
- §. 26. Rustico in sinistro hypochondrio renitentia erat, in toto corpore color plumbeus: Lien erat scirrhusus, arcto coalitu sub membrana adiposa renem sinistram amplexatus, aïdorem ferens. *Vide lib. 3. tit. de Lumborum dolore.*
- §. 27. D. N. erat *μυγαλτοειδής*: Omnia interna membra, hepar, pulmones & cor admodum grandia & pallida erant, ac pene plumbei coloris visa, haud aliter colorata ac adhuc viventis facies tincta & plane livida: &c. *Vide lib. 1. tit. de Melancholia.*
- §. 28. Quidam subito vomitu & alvi fluxu tentatur: & paulo post interit, cadaver à tergo lividum plane erat, imprimisque pudenda nigra: In ventriculo reperiuntur arsenici albi frustula tunica affixa. *Vide lib. 3. tit. de vomitu.*

## OBSERVATIO VII.

Dolor summa scapula & humeri ab Abscessu in corde in ulcus desinente, Pulmonibus accretis 1. Brachij & Clavicularum à sero corrupto circa pericardium, in sphacelum desinens. 2. Suræ dolor intolerabilis à Vomico hepate 3. 4. Circa coccygem dolor ab Empyemate ossis sacri 6. 7. Humeri dextri dolor ob hepar tumore cancroso affectum. 8. Dolor circa pubem ab incremento & relaxatione Testiculi semine. 9. Dolor in infima regione hypochondrii dextri, ob vitium Mesenterij vicini & psoæ dñi Muscularum. 10. Circa regionem ossis sacri ob quatuor lapides in vesica. xi.

§. 1. **F**ilia D. N. (Vide lib. 2. Tit. de Hemoptys) patiebatur dolorem in summa scapula sinistra, & summitate brachij qua humero committitur; Magna erat suspicio Abscessus in sinistra Pulmonis parte; Pulmo costis undique & diaphragmati adhaerebat, cum etiam Pericardio undique, cor media sui parte fere excisum, &c.

**D**olorem] Dolor à tristitia distinctus, & ad rationem pertinens, definitur solet *Sensio molesta à rationis solutione procedens*. Siquidem exoritur iste; quoties & quotenus sensibile incongruum, aut improporcionatum, sensorio isti applicatum, fibras ab invicem dividit & divellit, proinde spiritus animales in his hospitantes, à solita & placida emanatione sua repellens, ab invicem distrahit, & quasi in fugam vertit: deinde propterea fluxum; quatenus iste spiritum exteriorum populus, contrariata aliorum serie ad *spiritum adveniens* communicatur, spiritus illic dependentes in partem confusionem ciet, doloris sive molestiae exterioris insensibile perceptio efficitur: Revera tota spirituum animalium quae dolore afficiuntur series, quasi animae sensitivae membrum quoddam singulare, objecti impressione velut anxietatem concipiens, cum molestia contugari, inque dimensionem minorem sese contrahere cogitur, Cum solario continui doloris causa statuitur, non ita intelligendum est ac si affectio hæc tantum à vulnere aut plaga corpori inflata crearetur, namque eadem à frigore, calore, flantibus, &

sanguinis aliorumque humorum extravasatione, aut alicubi aggestione, sæpe membri conformatione adhuc integra manente, passim induci solet, in quibus casibus, licet continui partes, ac imprimis fibræ & filamenta nervæ minime præcendantur, ista tamen in omni doloris affectu, aut ab objecti pressione, aut à particulis alienis cuneorum instar adactis, à solita positione divellantur, inque tensionem nimiam, aut distortionem, aut divulsionem adiguntur, proindeque spiritus incolæ, à mutuis amplexibus divulsi & dissipati, gravate habent; & molestiae sive doloris passionem inducunt *Willis Operis Posthumi lib. 3. cap. 6.*

*La summa scapula*] Quibus grandis hepar; amplius, ramentis & calidius, cum febris magnisprehenduntur, maxima ex parte tempore urgentis febris dolores in claviculis & secundum homoplatas sentiunt: Sic pleuritici per continuitatem membranarum majores sæpe quam in loco affecto ibi dolores percipiunt *Hippocr. 4. acut. ascendente pleuritidem* vocat cum dolor ad claviculas pertingit.

§. 2. Dumxi fili: annos 17. nata febricitavit; huic dolor nonnullus ad claviculas & brachium, fere ad olecranon: non parabatur fluxio tam maligna, nec quod subtus cuniculos spergeret: Cœperunt illum morbum quibusdam remedijs agitare, anodyna applicare, purgare, oppositæ partis venam secare: 6. die comarosa ac velut resoluta fit; partes quæ dolebant, cœperunt esse indolentes; nil in superficiale apparebat, mors.

Brachium erat velut syderatum parte interna ad periostium, ante mortem nigrescebat; circa ipsius periostium serum & virus reperiatur, quod exusserat ac corruperat partem; Imo jam labes pervaserat ad anteriorem thoracis partem, ac si ferda fuisset, ut ita loquar, pleuritis: Admiranda sunt effecta feri venenati. *Ballonius Epid. & Ephem. lib. 2. pag. 150.*

**C**irca periostium serum & virus] Mirum est quod quædam materia venenata, ut ea est quæ facit exanthemata & variolas, non vertitur in pus, sed in quid simile puri, & in quandam novam speciem putredinis, quam natura non domat facile; Quod Hippocr.

poet. in Epidemias annotavit: Porro in suspitione cauteria adhibere imprimis oportet, licet materia non educatur & magnum dolorem non inferat: Item litus ex hydragyro confert. *Jacobus Thourart. annos. 3. in eum locum.*

Mortuis ergo ægris iussimus crura & furas aperiri novacula, invenimusque pus album pallidum, læve, æquale, spatij inanibus diffusum & majore vena conclusum; Atque ut notaretur locus unde pus ejusmodi prodiret, aperto ventre vomicosum hepar & putre inventum est; Itaque verisimile est loco sanguinis, pus per majorem venam in crura & furas, quæ admodum venosæ sunt, transfusum: *Iacotus comment. ad Cosc. Hipp. p. 349.*

§. 4. Hollerius scribit adolefcenti xvi. annorum crus dextrum vehementer doluisse, nullisque cessisse remedijs; Acuta febris, urinx sæculentæ, sius paucæ, reliqua mediocris, nisi quod deliravit ex intervallis; Tribus ante mortem diebus obscuratum lumen & splendor oculorum, palpebræ lividæ; postea quoque cœpit & sinistrum crus dolere; xiv. obiit.

In mortuo abscessus cum pure albo in apice gibbæ hepatis partis & musculis obliquis; Dissectione cruris anterioris parte facta, in medijs musculis pus album & crassum inventum, quod & in alijs visum fuerat; In corde sanguis veluti mucosa pituita; Eidem abscessus purulentus sub ala dextra, & impotencia brachij dextri. *Idem comment. in Cosc. Hipp. p. 845.*

§. 5. Refert etiam Bauhinus Lutetiz virum quandam cum abscessu hepatis laborasse, mortuum esse, & corpore aperto repertas venas usque ad tibiam pure repletas, & sinistrum testiculum putridum. *Dan. Sennertus præf. l. 3 p. 6. sect. 14.*

**C**erte spontanei longique dolores crurum & partium inferiorum, ulcera quoque & color malus viscerum latens vitium ostendunt: Hinc intelligitur pus istius suppressum, non solum locum in quo

est, putredine corruptelaque depravare, sed etiam partium circumpositarum, & eorum omnium in quas sese insinuarè potest, temperiem & naturam evertere. *Idem.*

§. 8. Hipp. os sacrum Empyomare quoque computrescere novi, cuius putredine & incredibili doloris tyrannide duos probitate spectatæ viros efflctum & diu maceratos tandem contabescere & mori hæc oculis vidi. *Langius Epist. 42. Tom. 1.*

**T**ertium addit, J. Henr. Brechtfeld in Actis Bartholini annor. 1671. & 1672. Observ. 107. Fabrum scilicet ætatum, quem tam immanis ossis sacri prehendebat dolor, ut horrendis præ doloris immanitate,

contingeret convulsionibus: Causa mihi antecedens fuit lapsus ex alto in trabem, ita ut illi divaricatis cruribus inequitraret, hinc ossis sacri contusio, indeque ortum empyema.

§. 7. Senex Colonienfis per aliquot annos dolore continuo circa regionem ossis sacri, cum ard. reurinz & mingendi difficultate afflictus fuit.

Aperto corpore inventi lapides quatuor præduri ac asperi: Circa regionem vero ossis sacri, ea nimirum parte ubi cava bifureatur: Abscessum magnum in quo materia fetida & sanguis coagulatus continebatur offendimus: Os sacrum ea in parte ita erat corrosum & excusum, ut facillime digitis minutatim extrahi atque conteripotuerit. *Fabritius Hildanus cent. 3. Observ. 70.*

§. 8. Vidua N. tumorem habebat in abdomine versus umbilicum, ad dextram partem inclinantem: Hepar tumoribus scirrhefis erat refertum: Ejus extremo adnati duo tumores canerosi. *Vide tit. de ventris tumore lib. 3.*

**T**umorem versus umbilicum] Cavendum monet Sennertus cap. de Inflammatione Hepatis ne fallamar, & hepar non inflammatum putemus si tumor in ventre medio apparet, quia quibusdam hepar ad medium ventrem extenditur.

*Humeri dextri dolor*] Idem magnæ hepatis inflammationes signum esse ait si dolor percipitur juguli quasi ad inferiora tracti, præsertim dum vehementius æger inspirat. Dum enim hepar inflammatum, (aut

gravis tumore affectum) pondere suo diaphragma, cui alligatum est, deorsum trahit, tñsum diaphragma membranam costas succingentem, cui etiam obpascitur, tendit: unde dolor tractionis in jugulo sentitur, *Galenus* hoc fieri putat ob tensionem venæ cavæ sursum ab hepate ascendentis.

§. 9. Uxori N. Testiculus sinister erat fere mali cotonei magnitudine, & prolabebar in capacitatem ossis sacri: comprimens & vesicam & intestinum rectum, ubi ingens dolor. *Vide tit. de ventris tumore.*

§. 10. Juvenis ictus & in hypochondrij dextri lateris infima regione coxendici proxima, unde dolor in dextrum erus expectatus, quod ægrè movebat: Mesenterium in mortuo circa originem velut contusum vidi, psoasque musculos illi lateri succumbentes similiter affectos. *Vide lib. 3. tit. de Hypochond. dolore.*

§. 11. Senex per aliquot annos dolore continuo circa regionem ossis sacri vexatus fuit: Inventi in vesica lapides quatuor præduri, *Vide tit. de mictione difficili.*

# ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBRI QVARTI

### SECTIO VLTIMA

### MISCELLANEA CONTINENS.

#### OBSERVATIO I.

*Ex Tabacifumi abusu lingua, trachea arteria atra fuligine tincta reperta, Pulmones aridi, hepar inflammatum. 1. Pulmones flaccidi, torridi, costis annexi. 2. 3. Cerebri substantia exsiccata, ad parvam molem redacta. 4. Tabacifugo papillares processus cum nervorum odoratoriorum extremitate defuerunt. 5. Cerebrum nigrum & fuligine tinctum observatum 6 Crassa fuligine & spissa obductum cranium repertum. 7. Cerebri nigredo observata in quodam Tabaci pulverem per naves crebro attrahente. 8. Spina triplex lapidea reperta inter utramque meningem Tabacifugi. 9. Stomachus fœvedine tinctus à fuliginibus Tabaci. 10. Vestigia fumi in visceribus notata. 11. Infignis Tabacifugi cerebrum mitidum repertum. 12. 13. 14. 15.*

§. 1. **I**NVALUIT in Europa cacoëthes sugendi fumum herbæ Tabaci per tabos ad id confectos. Quantum sanitati suæ noecant qui roties illi indulgent, oculis subijcio hominem quem in Medicorum corona secui: Is supra modum hisce fumosis delicijs addictus, vix ullum obibar negotium quin sibi, ut patuit, fatalem scorum hauriret: ubi enim crebris quasi pulsata ictibus natura fatiscere, atque in morbum collabi cœpit, ille nigricantem materiam per anticum, per posticum, utrumque gutturem tamdiu ejicere, donec fulcra simul ejiceret animam:

Hospitium certe, quod illa reliquerat, visitavi & peragravi, fultus cultro anatomico: Quid viderim quæris? domum mihi intrare visus sum vere Plutonium; ecce tibi in foribus atrato colo-

colore tincta & quasi venenato succo imbuta intumuerat lingua: Quid trachea: camino similis, nigra fuligine undique obducta: Pulmones atridi, exsucci & pene friabiles: Hepar, tanquam si prae ceteris traxisset incendium, totum erat inflammatum, à cujus flammis ne bilis quidem in cystide sua immunis erat: colorem enim extraxerat ex purpureo virescentem: Ad intestina vero, ut sunt corporis saburra, conflaxerant totius adustionis carbonem, plena etenim erant nigricante materia, quae non mitiorem ipso Averno spirabat odorem. Ecce frequentis huius suctionis Medicos fructus, *Th. Kerckringius Observ. Anatom. xc.*

§. 2. Quum mense Martii in Theatro Anatomico cadaver virile boni habitus & robusti dissecaret, inter alia singularia inveni in sinistro cordis ventriculo rria frustula adiposa lenta & candicantia, ex nimio, ut arbitror, cordis calore & sanguine antiquo efficta: praeterea valvulam in vena emulgente dextra nullam. Et quum omnes partes tam interiores quam exteriores sanae essent, solos pulmones flaccidos tamidosque costis adhaerentes: Hepar supramodum magnum, libras civiles tres, Lienem vix uncias duodecim cum dimidia pendentem, Pulmones ideo credidi vitium contraxisse: quod frequentior Nicotianae usus destillationes ex capite ad hos concitaret: Nec ulla noxa, nigrorisve ullum vestigium in cerebro apparuit: quam nimia Tabaci suctione his homo apud plurimos innotuerit. *Th. Bartholinus cels. hist. Anat.*

**P**ulmones flaccidos torridosque ] Ideo juvenes moritur Simon Pauli quadripart. Botan. cl. 2. tit. Pimpinella, ne utatur Tabaco, nisi velint molestissimam

ducere vitam, ac ærumnosam senectam ante expectatum accipere, Pulmones data opera ita corrumpe, ut hydrops pulmonum eos jugulet.

§. 3. S. R. M. magnae Britanniae, Regem Jacobum, publice in Oxoniensi Academia disputasse contra hanc fatuaretam (usum Tabaci) ostensis exemplis eorum qui laborassent quidem diu insanabilibus pectoris morbis, delirijs, insomnijs, convulsionibus &c. Post mortem autem inventi fuerint pulmones habuisse totos nigros ac terotridos, non secus ac si fumo indurati essent testatur G. Hofmannus lib. 2. de med. officin. cap. III. 20 §. 30.

**D**isputasse contra hanc fatuaretam ] Nec tamen omni utilitate caret teste Clariss. G. Horstio, In catarrho enim ejus usum probat siue in pulvere per nates attractum, siue in censi fumum per os sumptum, purgato tamen & jejuno corpore: Quin & fumus ejusdem sitis & famem silitere posse non sine ratione affirmat, quidem pituitae copiam insignem ad palatum attrahit, quae deglutita chyli insitit concoquitur: Certum est multa militum in Germaniae bellotam diuturno conservata esse per Tabacum, hoc enim in annonae penuria miseris cibavit milites: in aëris in temperie eos servavit incolomes, aquas quas non pro libitu, sed pro occasione biberant, siue putidas siue turbidas salubiores reddidit, putredinem attingendo & corruptos jam humores morbosorum plurimorum causas proximas per superiorem & inferiorem detrahendo: Accedit quod vi sua narcotica suavem somnum inducendo noxiorum ciborum difficilem concoctionem juverit, nec non singulari quadam suavitate etiam invitos ad sui amabilem usum ita traxerit, ut maluerint pane quam Tabaco carere: Tacco quod animi nonnihil ad cordatius pugnandum addidit.

\* Delirijs; Insomnijs ] Impetum fumi Tabaci in cerebrum ejusque effectus credere & eleganter demonstrat Excell. Lucas Scroechius Filius. Schojlis ad Observ. 4. Helvetigian. Copiose, scilicet, aër, sulphureo salinis atomi ex accensa Nicotiana densa æmine evulantes, oreque attraxerit, vel potius ab aëris elaterio, laxiori fistula officio incambentis ipsi intrusit, non palati tantum obnoxiabant cameram, sed subtilissimis suis ac penetrantissimis corpusculis minutissimos quoque poros subintrant, sanguini sese adolant humores obvios resolvunt inque Cerebrum

copiose strunt, ac spiritibus animalibus ibi confusi, varium ipsi labem imprimant, mox insueti suo sulphure narcotico abruentes, mox & acedine, biliosa perfectum constitutionis in corpore, in furorem concitantes: Quamvis itaque lubens assentiar Primrosio, l. 4. de viugi in med. erroribus, cap. 31. fumum Tabaci ad cerebrum non pervadere scribenti, nubilosum scilicet illum crassum, & terrene fuliginis facie à fistula expulsum, nihil tamen omnino eo usque penetrare, aut solam spirituum & humorum à calore ejus concitatorum motum insequi, arguere nentis quæ adducit, nequiquam evincit, cum poruli ubique in corpore patent, sanguinis in universo praesentia, corporiculorum in fumo latentium subtilitas, vis penetrans & activitas ipsaque symptomatum, soli calori nequiquam imputandum scies longe aliud persuadeant: Ut majorem ideo mereatur aplausum J. Christ. Magnenus Exercit. 6. de Tabaco §. 4. fumum Tabaci intimos cerebri recessus, tumescencia & somnolentia id adestantibus, adite concedens; crassa tamen in eo nigra, quia fuligo hæc crassioribus suis partibus jam sit expurgata, productionem permansens licet enim & pervius, & alij cerebrum atque fuliginibus ex hac causa obstruam se deprehendisse referant. In omnibus tamen id nequiquam deprehendi frequentior aliorum fide & experimento constat: prout nec mihi olim in capitis coram, qui vivi fumo Tabaci delectati fuerant, tale quid deprehendere contigit &c. Contrarius vero quæ prodemonstrant rarioribus exemplis Bartholiniana judicium, vel l. Adot Hafnienf. Obs. 24. commode applicabimus, morbi potius non fumi vitium id extricasse.

§. 4. Medicus aulicus Tabaci usum tam familiarem habuit, ut non interdum solum, sed & noctu temperare sibi non potuerit quin semper ad lectum lychnum pensilem eum cereis candelis & fistulis adjunctis haberet.

Cum ille ante annum defunctus, ejus capite aperto, res stupenda! Tota cerebri substantia adeo exsiccata reperta ut vix nucis magnitudinem æquaret, prout mihi à quodam Medico Augustano, relatum. *Augustinus Thenerus Epist. Medic. xvj. lib. vj.*

Cum Medicus ille fere diu cerebri substantia destitutus, ratione salva & sensibus integris in vi-

ta superstitia manserit, Et Zacutus in Observat. de puero decenni referat eum sine cerebro per triennium

nium vixisse, tandem ex hydrocephalo defunctum, cranio aperto nihil cerebri deprehensum: cum idus præsupponat potentiam, & jam constet testimonio fide dignissimorum Auctorum de facto, ergo de possibilitate indubium quantumvis crediti arduum: Exin P. illophilus Peripatericis insultare Galenistis, & adversus eos triumphare liceret, præterdentibus illustribus illis exemplis demonstrandum in corde Animæ rationalis domicilium constituendum, exin omnes vires ac facultates cæteris membris communicari, quod adstipente videntur sacre literæ. Idem ibidem.

Quod *Thevenius* aliena fide refert, hoc falsum est.

§. 5. Impossibile non existimo ut à fumi hujus acrimonia, & siccandi vi, cerebri aut capitis pars aliqua, in quam præcipue salvis adhuc vitibus penetrat, atque incursionem facit, ita exsicceetur, ardescat, tabidi fiat, corrugetur atque indurescat, ut exterior ejus superficies, respectu reliquæ substantiæ crustosa veluti appareat: Ira enim in quodam, qui vivus reminem sibi in Tabaci usu parem extatse laudat, ut socij attestabantur, immerito gloriatus fuerat, post supplicium dissecto, papillares cerebri processus, cum nervorum odoratoriorum extremitate prius defuisse, ita ut ne vestigium quidem eorum reliquum esset, hinc oculis una cum multis meorum æqualium conspeximus: *Observat. Hadriani Falckenburgij.*

**P**arsus defuisse &c. Causa hujus defectus à Speculantium Doctores, in vim fumi T. bacini, omnia siccandi, exhauriendi, arcescendi, extenuandi, corrugandi, ac proinde marcere quodam consumendi, confitebantur. Sic etiam vera, extrema & deploratissima hecicorum, culis; cum sani ac succo pleni hominis ture comparetur, crustæ potius universo corpori inductæ quam geminæ viris speciem præferre videbitur, & in atterentissimis febribus membrana linguæ exterior involvens, interdum ita siccata, scabra, rugosa & dura perferitur, ut crustæ potius linguæ inductæ, quam verâ membrana esse appareat, & quia ipse fumi Tabaci insigniter nigricat, eundem suo indeficiente recenti contactu inque contagione prædictam cerebri, aut capitis particulam inficere ac denigrare posse docetur, alia omittam, eadem febribus acutissimis laborantium linguam, quæ sæpe à famis & vaporibus febilibus, exustis, fæculentis & nigricantibus, & corpore infestioris in eam exhalantibus insigniter nigrescere conspeximus: Contendo alia de causa processus mammillares & nervos odoratorios defuisse. Ego eos in cerebro præti, qui hydrope capitis mortuus erat, dispersos & eos etiam nigricantes, aliquando deprehendi. Idem. *Contradicentem Schneiderum vide lib. 2. de catarr. cap. 3.*

**Nervorum odoratoriorum.]** *Magnus* de abusu Tabaci exerc. 6. §. 15. dicit olfactum ab abusu Tabaci in multis aboleri, tum qui fumo utuntur, quia nimis exsiccantur processus mammillares, unde cum sicciores quovis odore redantur, non possunt ab his immutari, odor enim est à sicco superante humidum, ex *Aristot.* l. 3. de *Animal.* A Tabaci autem pulvere olfactum ideo lædi censet, quod ossis ethmoidis meatus tubi, ibique hætere aliquandiu possit, quibus obturatis, cerebrum neque ærem, ut eo ventilaretur, neque rerum odorabilium species admittere potest, quin olfactus necessario intercidat: Sed levissimum, ac forsan momentaneum hoc esset malum, si cum Tabacum insigni narcotica vi præ multis simplicibus præditum, calidum, siccum, unctosum, penetrantissimum, hæc illius vis, aut specifica facultas, facit ut octavo *Spicelli*, aut primo *Beuhii* nervorum cerebri partem olfactui dicatam, olfaciendi potentia sensum tandem omnino adimant, cum quod in processum, mammillarem traducatur, qui interiori cerebri parti ad os ethmoides, dura matre involutum, sita sunt, ac regionem istam occupantur:

se, & venerando *Semi* impostum fuisse D. *Jacob. de Maphis* & Dom. *Ferdinandus Therman*, Medici Electorales, falsum esse affirmant, ac cerebrum sectione sanctissimum repertum fuisse: Quod & confirmat *Schneiderus* de cathari. l. 2. c. 2. authenticæ *Clariss. J. D. Hartii. I. Jacobus Wepferus misc. cur. anni 1672. obs. 129.*

\* Romæ hominis plebei cerebri ex eadem causa condensatum, nigricans, atque ad exiguum guttum redactum; membranis lavo lucis coagmentum, repertum est. *Franciscus Josephus Burrhus Epistola 2. de cerebro.*

Cum ergo ad nasi radices usque polvis Tabaci Narcoticus magna copia violententer attrahatur, & punctum temporis natura otiosa non sit, ac in vivo corpore omnia sint, ex *Hippocr.* pimeabilla ac transpirabilia, utque aliter fieri non potest quin partes olfactui destinatæ à narcotica Tabaci vi assigantur. Nec tantum permulti olfactu privantur, sed & plurimi caprophili, non ex quisto sunt gustu, affectis quanto & primo nervorum partibus.

Volunt quidem nonnulli jugi usum pulveris Tabaci visum acui, sed quanto cum periculo conjuncta hæc se medela ostendit. *Adr. Spiegelius* Anat. lib. 7. c. 2. Per multos, atq; de industria concitatis stertutionibus in cæcitatem derepere lapsi sunt, vel quia arteriarum exosidum rami, qui nervi optici sic vicini sunt ut tangant, repleantur, & se pleri hos comprimant: vel quia copiosus, isque pignosus humor ex cerebro ad opticos nervos traductus fuit, qui obstruxit, illos quandoque seraceo curat: vidi & hos quibus ab humoribus pignosis malum hoc enatum fuit, nunquam convalescere memini. Quin & *Magnus* Exerc. 8. de Tabaco defendit, stertutamento violentius agitato capite, distulpsis, & impetu meningibus, laxatisq; cerebri compaginationes, non rarios interisse: Fietat *Stryda* exemplo pictoris *Subura* ni, cui cum xxxiv. stertutasset, continue succedens proximè stertutamentum xxxv. exiit fuit, dispersis arterijs & membranis: cerebrum circumcinctibus: Idem *Magnus* §. 4. testatur se vidisse quemdam, cui insanus hujus pulveris nias crystallinum corrugaverit humorem, unde & stantia cerebat obiecti.

**Papillares cerebri processus.]** Censet *Cl. Schneiderus* Lib. de ossibus si processus mammillares, & nervi odorarii fumo Tabaci tam vehementer viciari possint, etiam nervos qui ex utraque meningem, ac qui de terio pari oriuntur ipsam duram meningem, eos processus cingentem simul affligibine hominem non ideo affici, sed ob runicam narum, ratione propiorum nervorum male affectam, hoc sensu olfactus obatum iri.

**Exterior ejus superficies crustosa veluti appareat &c.]** *Pavani* & *Falckenburgij* dicunt à nimio fumi usu congeri fulgines atras, probantque experientia & ratione. Dubium non est, quin inter cranium & meningem durior congeri possit aliqua pituita viscida, quæ dissipatis subtilioribus tenuioribusque partibus ibi fixa adheret: quare si quis in crura sus-

fungio Tabaci item penetrat inlilit, cum ad crustam illam recta via indefinenter appellat, nihil implicat quo minus ab oleaginoso nigricanteque fumo exsiccatior crusta nigrescat: Pituitam ibi congeri, & in crustam concrelescere *Falkenburgius* asserit, repetamque sic in insipienter huc veratis, è venerica: quod quod si huiusmodi Tabaco utantur frequentissime, quid facilius quam materiam eandem nigredinem contrahere? Quod autem illic fumus appellat, nemo anatomiz petius dabitur. 3. Tabaci fumus habet in se unctuosum & oleaginosum materiam, quæ successu temporis, vel cerebro refrigerato, aut tabaci familiaritate non afflicto poterit concrelescere, suoque lentore partem us adhaerere: quod ex ignis fumo in caminis evenit, quotidie videmus, propterea est suspicari id iis qui hypochondriaci aut maniaci sunt. 3. Quædam cerebri partes ita poterunt exsiccati & calcicere, ut reliquis salvis manentibus denigrentur, ergo difficile non est à Tabaco aram fuliginem in capite generari. *Secunda opinio est Gnl. de Meara* qui negat Tabacum ad cerebri substantiam, multo minus ad ejus cavernas seu ventriculos pervenire, ac ibi gigni fuliginem, dicit autem ab Tabaco, tanquam ab magnete trahi pituitam: *Verum enim verò* falsa ratione adstruit *Meara* probabilitatem partem, dicit enim fumum Tabaci cerebri intimis adire recessus, cæteroque, quæ ratione fierent impudenti aut somnolenti: Ratio vero cur ego assentiar *Meare* hæc est, quod non potest fuligo ideo sensibilibus generari in cerebro quin gravissima inducat symptomata, quæ tamen nulla in fuliginis deprehenduntur.

dantur: 2. Tenuior, & minus viscosa Tabaci expulatio, unde nullo negotio per poros elabatur, & vi expultrice prodigatur: quare camini, exemplum non valet, cum in camino nulla sit vis expultrice; deinde rationes *Falkenburgii*, nihil de Tabaco probant, sed tantum de fumo in genere, unde sarnarii, fullones, fabri, alique operæ in fumo perpetuo versantes, debereent illam crustam fuliginosam contrahere, cum etiam sitam fuliginosam accingant ea cubacula in quibus laborant: *Pavvii* autem experientia: 1. dubia est, deinde potuit à vehementiori melancholia excludari incassatque hæc fuligo: In mortis enim violentæ expectatione, ita moventur miseri illi, ut totam humorum æconomiam perturbati non sit dubium: De crusta vero eorum qui gallica lues afficiuntur, non dubito, cum in aliis partibus inexpugnabilis visciditatis pituita sepiissime congeratur, at illam crustam fuliginosam tingi posse nego, tum quia fumus, qui illic pervadit, jam est tenuior & expugnatus: crassioribus partibus, unde ob tenuitatem ab expultrice, suoque nativo imperio facile dissipatur: tum quod concretioni fumi valde intensa requiritur frigiditas, quæ in nulli viventis parte est. 3. Ratio *Falkenburgii* minus obtinet vitium, etsi aliquid cerebri partis non potest fieri, quin ad huiusmodi symptomata: Ergo licet absolute, & metaphysice loquendo, nature scilicet otianiis torpore aliqua huiusmodi contingere possent, nunquam tamen contingunt, aut secundum ordinariam fumifugorum habitudinem possunt demonstrari. *Magnentii de Tabaco Expositio* p. 130.

§. 6. Narrantem olim audiivi Dom. *Pavvium*, se disseccasse cadaver juvenis robusti & sani, cujus cerebrum nigra fuligine tinctum fuit: atque cum in ejus rei causam inquireret, quam diarrhesia quandam Maniacam statim credidit, vel similem quætopiam cerebri morbum, asserit fuisse ab iis, quibuscum intima familiaritate junctus fuerat juvenis, hunc nec morbis unquam obnoxium fuisse, neque cuiquam ex iis quos suspicatus esset *Pavvius*, sed Tabaci fumum ipsi adeo fuisse familiarem, ut ne diem unam abstinere ab eo posset: Quod eo adduxit *Pavvius* ut crederet congeriem eam excrementorum non aliunde originem traxisse quam ex abusu fumi Tabaci. *Iustus Raphelinguus* Epist. ad *Neandrum* in huius Tabacologia.

§. 7. Anno 1667. 12. Julij, obiit Hanoviz Prædicator miles, *Caspar Schlechtus*, annos natus lxxij. Apoplecticus: Ab ipsa pueritia familiaris ipsi fuerat Tabaci fumus, quod quoque perpetuo masticabat: Magister *Tabannes*, Urbis Chirurgus, cadaver ad dissectionem impetravit, cui addidit Illustriss. Comes Hano-vienfis, Præfide D. Doctore *Krausio*, assistantiumque corona.

Aperto capite inventa fuligo plurima & densa cranio adhærens, fuligini caminorum tum nigrore tum sapore omnino similis: Causa autem non aliunde quam à creberrimo illo fumi Tabaci usu deducta est, *Ex communicatione D. Petri Regis, Pharmacopæi Genevensis peritissimi, qui dissectioni interfuit.*

Interrogatus à *Neandro Falkenburgio*, an Tabaci fumus ad ipsam cerebri substantiam perveniat? Itemque nimio huius fumifugii usu crusta quædam nigra in capite generari queat? Respondet ad utrumque annuendo: Et primum quod spectat, fumum ore & partibus haustum exceptumque, non tantum ad utrumque cerebri omentum seu meningem, verum etiam ventriculorum cavitatem, in ipsam cerebri substantiam universam, i. e. poros meatuumque insensibiliter penetrare posse statuit: modum etiam declarat, exponendo & digito commodas monstrando vias dures: Primam ex ore ad nares & basin cuneiformis ossis, 1. Per foramina palati postica ex ore fumus pervenit ad nares, & supra finces ad cuneiformis ossis basin, 2. Per foramina palati innumera, majusculum illud anticum, circa inchoatam destinationem medium, vapor ille ascendit etiam ad nares. Alteram viam ex naribus interioribus ad cribrum designat. 1. Numerosi ossis cribri-formis foramina, quæ omnia & singula, requissimis partim pie matris (quæ papillares cristæ galli in-

cumbentes processus cingit) partim duræ (superiorem cribrum tegentis superficiem) involvantur productionibus seu canaliculis fistulosis & membranæis: Per hos etiam tempore necessarii pituitæ, spiritui, fuliginibus egressus, imo etiam fumo Tabaci conceditur. 2. Ex palato autem cuneiformis ossis foramina decem, vasis in & efferendis dicta, fumum deducere in proclivi esse ait. Alterum argumentum id fieri posse, principis & cause quæ hunc fumum ad superna motum efficiunt, præbent, inter illa autem primum locum obtinet respiratio, & cerebri diastole & systole? Secundum locum occupat capitis & cerebri sinus in fissigio, ad quos vapores ascendunt naturaliter: Tertium locum tenent ipsa fumi sursum tendentis proclivitas: Secundum quod attinet quæsitum, crustam etiam ex continuato fumi huius fuliginosi & atri usu in cerebro nigram generari posse verisimili judicatur & rationibus confirmatur. 1. In iis quibus magna cacochymia copia pituitose, crasse, lentæ ac viscidæ colligitur, & tenuibus exhaustis dissipatur ac portionibus

indurescit, 2. Fumus ille quidem siccus est, atramen substantiae tenuitate & consistentia nucleosus est, pinguis, lentus, ut facile adhærescat, eo in quo caminis nostris modo niger etiam est: 3. Impossibile non existimat quod à fumi huius acrimonia & siccandi vi cerebri aliqua pars indurescat & crustosa

veluti appareat; Ita refertur in quodam Tabaci bibulo post mortem dissecto papillares cerebri processus cum quadam nervorum odoratorum extremitate defuisse. *Vide Neandrum in Tabacologia. An viz hæc sint pervix, vide fule apud Schneiderum lib. 2. de catarrh. c. 3.*

§. 8. Narravit Illust. Christianissimi Regis Legatus, Eques Terlon, nuper in Gallia observatam esse cerebri nigredinem, collectamque ex pulveris Tabaci nsu duritiem, in sectione cuiusdam cui hæc narium deliræ placuerunt, *Bartholinus Aët. Medic. Observ. xvi. annor. 1672.*

**F**orsan virio præter naturali viz hic patentiores, erosius vel apertis membranæ cerebri, admittere poterunt raro spectaculo rariorem pulverem: Nam in sano statu nihil tale metuendum, cum nec fumus per fistulam attractus ad cerebrum penetrat,

nec illud inficiat, sicut optime in Anatome, observavit Gulielm. de Mera Epist. ad Neandrum, cum morbi potius non fumi vitium fuerit in homine à Pavio dissecto.

§. 9. *Philippus de Arantio* suspensus in platea pontis Romæ Febr. 9. 1650. qui quotidie Tabaco rum in fumo tum in pulvere utebatur, à me publice sectus, spinam quandam ossæam, seu potius lapideam tricipitem, Neptuni fuscinam repræsentantem habebat, inter duram & piam matrem in parte sinistra prope falcem, è directo intersectio vis commissurarum coronalis & sagittalis, sed piz ita fortiter adhærebat, ut sine laceratione ipsius avelli non posset, quin imo acuminaibus in cerebri substantiam ingressa conspiciebatur, si suspensus non fuisset, certe brevi mortuus fuisset, apparebant enim citra ipsam spinam inflammationis rudimenta. *Dem. Parnalos pentec. 5. observ. 14.*

§. 10. *Helmontius* ex Tabaci fumo stomachum flavedine tinctum à fuliginibus narrat.

§. 11. *Tulpius* in visceribus eorum, qui Tabacum ore trahere consueverant, vestigia ejus notavit. *Schneiderus lib. de Osse cibriformi.*

§. 12. Sunt qui nescio qualem noxam cerebri nigredinem ex usu tabaci frequente metuant, quasi fumus nigrotem salutaris intus induceret, ut ignis fumans camino: Hoc idem cum suspicaretur Sereniss. Dux Bavarie Maximilianus, cuiusdam Consiliarii sui tabaco abutentis, (fuit Ferdinandus Sagittarius, Medicus Excell.) & vomitu continuo tandem extincti, caput per Anatomiam explorari mandavit, quod una cum cerebro & membranæ factum rectum, sine omni noxa inventum est: Nihilominus pro continua continui vomitus & mortis causa potuit statui abusus Tabaci, vi cujus nimium piquitate ad ventriculum transiit, quæ vel copia & frigidity eundem tandem enervavit: vel malam qualitatem & corruptelam per metam inducens, vicina membra, & ipsam adeo ventriculum in commune malum traxit. *Hæserus Herculæ Med. lib. 1. cap. 5.*

**V**icinus nimium piquitate &c. ] *Henningus Arnsæus* Archiater Regis Danie Christiani Quarti, de Tabaci fumo, & omni ore capto, ita decernebat, eum ob acrimoniam esse penetrantem, atque adeo cœu per testos cuniculos pertere & alterare universam cerebri massam, atramque meningem cerebri, omnis generis vasa & in iis contenta &c. Qui cum semper ipso actu quoque effere calidus, dum ex calice tubulorum ignito & flammante Tabaco ore exsugeretur, fieri per rerum naturam aliter non posse, eum, cum ex decretis Aristotelicis, caloris esset colligere homogenea & segregare heterogenea, quin fundere puitam, cujus metropolis ab *Hippocr.* cerebrum statuitur: Neque dubito rem se habere ut *Arnsæus* deceiverit: Nam puto prodromos catarrhorum sternutationes, sputationes, salivationes, omnes hæc actus (non de generatione materię, aut materię morbificæ causa loquor) à calore proficisci, aut illum esse causam sine qua non catarrhorum: Sic *Hofmannus*, lib. 3. Institut. cap. 109. Solum calorem, eumque ut plurimum externum, ut est ignis, solis, ab exercitio, à vino, aromatis, fundere puitam, aut acre seram defendit: Quod si ergo quis ellychnio ex emunctorio coactis, funis ignis miliaris stipei præsemine, vel denique ræzæ bituminose fossilis frustulo calicem tubuli Tabacarii, loco Tabaci (quibus dolis milites prædicari se invicem decipiunt) referferit, ntique non

minus quis spontabit qui horum incensorum fumum surget, quam si optimæ notæ Virginiano Tabaco calicem tubuli repleverit: Positis ergo his & concessis, nempe acrem fumum & calorem quemcumque dicto modo intromissum in cerebrum, fundere puitam, eamque, quæ dantur portæ, ut sunt os sphenoides & ethmoides ruere, ac illas præter naturam institutum per nates emungi, hæc, ac pelati celum eandem percolari, ac oris beneficio naturaliter excerni, Quid ergo causæ sit ut statim per ceteris Tabacum mira ubertate ore ac naribus puitam evocare, vel ratione peculiari cerebro esse dictam, facileque eo viam affectare, ac ab omni inquinamento eluere, causam nullam video. *S. Pauli de abusu Tabaci p. 9.*

*Nescio qualem noxam &c.* ] Cum Tabacum per aliquam multis simplicibus insigni narcotica vi sit præditum, hinc ratione sulphuris sui narconci stupescit & corrumpit cerebri temperiem, usque adeo utrum ex aliis simplicibus conestatis fumis. v. g. majorana, betonica, rotisamarina, succini, matiches & similium, puita à cerebro citra noxam eliciatur, moderate usurparis, à Tabaco illius *vis* semper dissolvatur: atque hæc narcotica Tabaci qualitas in causa est ut capnophili Tabacarii ad unam usque sint sputatores: Non ergo ideo quia ab illius frequentiori usu mira ubertate puita veluti stillat cerebrum, peculiari ratione illi id eon specifi-  
aliquid

Aliquod dicatum, sed quia narcoticum, aut narcotico subijure circa omnem controversiam abundat, tota substantia cerebro ac nervis insensum ac noxium est: Hinc non tantum permulti olfactu privantur, sed quoque capnophilos Tabacarios non exquisito esse gustu, quarto & septimo nervorum paribus affectis, observare est: Quis jam deinceps Tabacum cephalicum esse; aut salubre cerebro defendet, cum nervos stupefaciat? Ergo recte argumentari licet, Tabacum est calidum, est valde tenuium partium, maxime penetrans, ergo ob hæc omnia, quia una narcoticum, tanto est nocentius quanto est penetrantius, cui? quia narcotica vis ex se tarda, beneficio dictarum qualinarum in actum producitur: Nec credas quamvis nares non amplius fument Tabaco, sinciput non amplius celere, omnemque fumum evanuisse, quam post biduum aut triduum, ubi sterutas, olidum exspires. *Idem ibidem.*

§. *Pauvius* Delphis apud Batavos diversa cadavera publice secuit, quos inter Rhedarium furem, qui inter alios fumifugos erat celeberrimus, quique hora mortis Tabacifumo sese munierat: In illo tamen inventi sunt omnes processus; ductus & ventriculi cerebri, capitique meatus purissimi ad fuliginibus & nigrore, *Magnenus de Tabaco exerc. 6 p. 130.*

§. 14. Roterodami architabacarius quidam suspensus & diffectus, nulla cerebri corruptela aut fuligine inventa: multos præterea secuit fumifugos idem Meara, nullam tamen nigredinis notam reperit, quamvis duos diffecuerit, gibbum, aliumque qui hora mortis Tabaco sese refecerant. *Idem p. 131.*

§. 3. Genève anno 1638. quidam nomine *du Ferrouil*, ob eadem uxoris rotæ supplicio condemnatus, vir robustissimus, annos circiter 50. natus, fumifugorum dux, cerebrum quoque & cranium exhibuit omnis nigroris aut viri expert.

§. 15. Ego plurimos, nec ego solum, sed alii clarissimi Professores & Anatomei, sectos viderunt, & observant studio, præsertim in Anglicis militibus, & aliis celeberrimis Tabaco fumis, quorum secta cerebra adeo alba & pura erant inventa, ut aliterum cerebra albedinis superarent; Quod de Indis forer dicendum, quorum cerebra non nigra sed albissima sunt, qui Indi nihil aliud faciunt quam per totum diem continuoque istum fumum sugere? *Iob Nür. Bannmannus.*

§. 16. Color pulmonis in sanis est cinereus aut variegatus, & in corporibus morbofis, præcipue eorum qui invita multo sordo Tabaco fumifugatione usi fuerant, multoties sub nigricantem colorem reperi, & in publicis privatisque sectionibus demonstravi: imo in quodam Tabaci & spiritus vini mancipio, *asthmæ* longo tandem extincto, totum Pulmonem non tantum subnigrum, verum etiam ad mediocrem duritiem exsiccatum inveni, exiguis hic illis intercurrentibus ulcusculis, pure non fluido sed crasso & sicciore repletis.

§. 17. In alio autem magno Tabacario publice profecto, illum ejusdem subnigri coloris, & totum ulcerosum, sed non exsiccatum reperi. *De Diemerbrak Anat. lib. 2. c. 13.*

## OBSERVATIO II.

*In Calvaria cujusdam, qui quovis tempore & loco horas potius determinare, Pulli gallinacei figura reperta expressa.*

**I**N capite *Antonii à Franckenstein* Belgæ, inusitatæ magnitudinis viri, qui anno 1596. in Academia Julia secus fuit, cujusque ossa adhuc ibi servantur, Gallus gallinaceus expressus fuit: Ne dubitemus, *Henrici Meibomii*, Anatomei Helmstadiensis epistolam ad D. Sim. Pauli non ita pridem scriptam, hic subnectere debui: In cranium nullæ suturæ, sed loco lambdoidis duo conspicua foraminula æque distantia, ex quibus nervi duo per iterario annexi prominuerunt; Crassities erant digiti minimi articulo extremo respondet: Os frontis geminum, exterius non adeo spissum, interius vero perquam tenue & cartilaginis instar: In concava parte medietatis calvarie, occurrit figura quædam ossæ tenuissima, representans expresse gallum gallinaceum: Cerebri substantia æquavir pondo librarum duarum: Hæc ita præsentibus Medicis annotata acceperimus: Vulgo quidem apud nos quoque scitur illum singulari quadam sagacitate quovis tempore & loco potuisse horas determinare: *Thomas Bartholinus Altor. Med. Obscrv. 3. Annor. 1671. & 1672.*

## OBSERVATIO III.

*Cranium rustici, qui laqueo fances sibi præclusit, insolita conformationis repertum.*

**A**NNO 1672. rusticus annorum circiter xl. Genève fruges in area trituras, à sociis tanquam Adzonis arma gerenstradueitur: injuriam ille tacitus concoquit, recedit quasi prandium de more sumpturus: domum vacuum reperiens (uxor enim lepidula extra urbem secesserat nec ad coëctam horam redierat) fores præcludit, lacunari fonem appendit, ex



eo laqueum format; hinc corbem de fluarium scandit, laqueumque collo adaptat, post altero pede suppositam corbem excutit: Uxor momento post redit, praelusasque fores contra salitum reperiens, valide eas ferit; nemine respondente, ope scalæ humilem domum per fenestras subintrat, suspensumque maritum videt; ad ejulatium concurrunt vicini, eulstroque funem discindunt, sed strangulatus & rigidus deprehenditur, etsi à reditu ex arca vix horæ pars octava effluisset: Re ad Magistratum delata, pro more crati impositum cadaver, equo trahente, & manu ducente carnifice, ad patibularium deferretur: postmodum ministrorum Chirurgorum præda fit.

Caput illius, pro statutz ratione, ad minimum tertia parte naturali minus erat: cranium insignis crassitie, densum adeoque coactum ut ex simplici lamina constare videretur: Os frontis vix pollicarem altitudinem possidebat: Occipitij pars sinistra præ dextra ad pollicis crassiciem eminebat, Sutura arctissima erat commissura: Lambdoidea ad dextrum latus pollicis latitudine iusto magis deflectebat.

Viridiosa hæc cranij conformatio cerebri pravam constitutionem arguebat; sed multo magis mentis error, quod à tam levi occasione violentas sibi intulerit manus.

## OBSERVATIO IV.

*Dissecti cordis fragrantia ex diuturno cardiacorum usu. 1. Cutis Dorsi aliarumque partium mobilitas, ob membranam carnosam fibris carneis donatam. 2. Frons depressa in quibusdam ad nasi radicem, ob deficientem cavernam ossis Frontis. 3. Infans xvj. mensium secur habuit in sinistro hypochondrio, Lienem, in dextro, Cor ad dextram propendens. 4. In venata vna mulieris, à frigore externo enecata, Polypus carneus inventus. 5. A frequentiori Enematum usu intestina stercore vacua. 6. In canis, inter eundem ad latus sinistrum inclinantis, Renis sinistri substantia duo vermes reperi. 7. Quod quidam sint Scævola, aut ambidextri causa in ossibus brachiorum sita. 9.*

§. 1. Sereñissimus Princeps Christianus, Marchio Brandenburgensis, &c. valde senex moriebatur anno 1660.

Eius cadavere aperto, eor dissectum spirabat odorem gratissimum, similemque prorsus illis Emissionibus & julepis, quibus, tanquam confectioe Alkermes, aqu. cinnam. rosar. carfunculi, & id genus aliis confortantibus pro more imprægnatis, ante obitum aliquot dies roboratus, & pene non nutricus quasi fuerat æger.

Infallibili sane argumento quod medicamenta assumpta in primis viis non hæreant, sed continuato usu, viribus fere integris & retentis (saltem ex parte) suis qualitativis in ipsum usque eor penetrare possint. *Joh. Sigismundus Elsholtius in Miscell. cur. ann. 6. & 7. p. 332.*

§. 2. Membrana carnea versus lumbos carnis speciem præ se fert: Inde oriri dicitur quia dorso firmissime coheret: Uti sunt, inquit *Valverde*, qui cutem in dorso moverent, aliisque partibus, in quibus hæc membrana eariosis fibris conspersa erat.

§. 3. In osse Frontis cavetutulam observandam inter utramque laminam, ad nasi radicem sitam, interdum unam, maxima autem ex parte geminam non præteriemus: In puellis, aut quibus Frons depressa, vel frontis os cum sutura est divisum illam non inveniri asserit *Bartholinus*: Nos vero ad eundem modum & situm in dissectione cranii non semper invenimus: Nunc enim unam amplam ad latus alterutrum inclinantem cum multo minore in alio latere: In fronte futura sagittali divisa binas, utrinque unam æqualis magnitudinis, à quibus utrinque ad narium cavitatem foramina expanduntur, sæpissime reperimus, In aliis veto, quibus scilicet Frons multum depressa fuerat, ut in femina quam nuperrime dissecuimus, nulla vestigia invenire licet.

Cavernula hæc, simplex ne sit an gemina, meatus binos obtinuit, quorum uno à cerebro per os cribiformis foramen in illam ducitur piritia, atque hinc per alterum ad nares descendit.

De usu harum cavitatum maxime dubitatur: *Placentinus* mucosum humorem, qui in nares distillat, continere: Alii, ut *Fallopini*, illas voci inservire ut sit magis canora, quia in illis qui male loquuntur non inveniuntur: Alii, ut in illis elaboretur aer ad generationem spirituum animalium contendunt: *Spigelius* ad odores hauriendos facere existimat, cum ibi aer odore prægnans excipitur, paulumque conservetur ne nares tam subito præterlabatur, unde odor per integrum diem in narium summitate persistit: Alii illas humorem quod oculi humectantur & lubricantur continere putarunt; Nos vero illas à natura primario institutas arbitramur, ut protuberantiam illam & eminentiam superciliorum extendant, quæ aliter adeo feliciter fieri vix poterit: Si enim ex osse solo extruberet frons & supercilium, onus nimis grave naturæ molestum effingeretur: Hisce vero cavernulis processus seu prominentia superciliorum, ad faciei gratiæ & oculorum propugnaculum tenditur, neq; gravitas offensiva inde conciliatur: Arque

Atque hanc in omnibus processibus & prominentiis, ad quodcunque officium designatis, methodum observavit natura, ut nulli parti inutile pondus designaret, quo officium damno inevitabili compensetur. Si os maxillæ superioris magnum est, maximeque protuberat, cavum tamen est, adeo ut natura non solum robur, sed & utile quandoque ac conveniens excogitare videatur: Hanc nostram de cavitatum harum usu sententiam abunde illustravit illud *Bartholini*, assentientis cavernulas hæc in frontibus depressis non inveniri, scilicet ubi nulla est superciliorum prominentia, *Atque talem faciei formationem in ancilla à nobis dissecta anno 1640. fuisse, in qua nullum invenimus cavernula hujus vestigium*: Hoc itaque officium esse à natura primario excogitatum existimamus, alios vero usus secundarios habere negare nolumus. *Higbomus disquisit. Anat. lib. 3. p. 1. cap. 4.*

§. 4. Doctiss. Medicus Dom. Puyson, vidit cum D. Sim. Pimpernelle, Chirurgo peritissimo, in cadavere infantis 16. menses propositi, Jecur in sinistro hypochondrio, Lienem dextro, cum magna porzione ventriculi eo inclinati: Aperto thorace, inventum fuit cor in dextrum latus propendens, Pulmones in ea cavitare dextra locati, ut in sinistra naturaliter: An quibus cor rite salit circa mammillam dextram, talis inest conformatio, dubitare licet? Nihil affirmo quoniam id non satis liquet: *Riolanus in sine Anthropogr.*

§. 5. *Æthiops* femina Nigritarum stirpe oriunda, & exinde fugitiva, Kiionii obambulabat, & stipem ostiatim quætebat, secumque circumferens infantulum, ut dixerat, duarum septimanarum, qui & extinctus, & paulo post falcem in mortuam matrem quoque arripebat mors, hæc que extincta ad Anatomicum theatrum expetita est ab Excellentiſſ. Dom. Dom. Pechlino.

Uterus castaneæ quantitatem vix excedebat, quod ego miror in novella puerpera: Pulmo sinister perforatus lateri adactus videbatur: In vena cava frustulum carnis Thaleri imperialis magnitudinem æquabat, sed crassius erat; hoc carnis concretum laudatus Anatomicus Polypum cordis nuncupabat: Memini me legiſſe apud nostros curiosos Tom. 1. Obser. 31. hunc Polypum sæpius inventum fuisse in corde: Polypum tamen Kerkringius negat.

**F**otian fibræ illæ in sanguine subito concreverunt, ubi plus solitam refrigerationem sanguinis. nam Languinem in nostro subjecto Anatomico fuisse refrigeratum satis constat, tenui enim vestitu hæc paupercula erat amicta, & sub Jove frigido decumbebant, sub quo & mortua, nec ab ullo mortalium in domum recepta est: Mirum ergo non est tam intensum frigus sanguinem condensasse, in qua fibras concretum, hæcque venam cavam obstruxisse, hinc vitæ jectura: Plures particulæ polypi hujus ex ventriculis & aliis locis extractæ sunt à D. D. Anatomico, *Job. Lud. Hennemannus in Thesauro Bartholini Alis Med. anatomicis 1674. 75. 76. p. 40.*

De Polypo Cordis varii varia, videri possunt quæ inter alios scriptis exhibent Viri Nobiliss. *Tulpius & Bartholius*: Cujus constitutionis in viro 30. ann. eum reperi in Observatis meis Anatomicis declaravi: Placeat nunc cujus figuræ eum observave-

rim in muliere 60. annorum, Crassus valde erat durusque, sic ut cartilagineam quasi naturam indidisse diceretur: Occupabat non solum utriusque ventriculi cavitatem (cujus etiam cavernis extremitates suas, quas plurimas habebat, inferebat, imo ejus columnis filamentisque nervis firmiter hærebat) verum & vasorum pulmonalium principia cordi unita, sine laceratione, ne quidem ex corde dissecto eum auferre licebat.

Plura hæc de materia addere superfluum cenſeo, cum certi hic nihil constitui queat, eo quod in subjectis variis variz magnitudinis figuræque, imo etiam variis qualitatibus præditus reperitur à me fuerit Polypus talis: Quid si in pleſique demortuis Polypum ejusmodi reperiri dicerem; nec ideo quod in cadavere observetur, etiam in vivo eum adfuisse bene inferri? *Ger. Blasius p. 6. Observat. Medicæ.*

§. 6. Filiolæ infudit Pharmacopolæ uxor, ob intestina à spiritu distenta, tam frequentes clysteres, ut in ventre post obitum dissecto vix pugillus stercoreis superfuerit: argumento certe evidenti immoderato clysterum uso non semper subduci superflua, sed interdum quoque necessaria, quæ tandem cederent indigz naturæ in utile alimentum, sine cujus perenni adminiculo consumitur necessario homo, & exauritur tandem uberrimus nostræ vitæ fons. *N. Tulpius Observat. lib. 3. cap. 16.*

**A** Purgatione frequentius, & abs re instituta, simile quid à me animadversum in anniculo puello Domini *Henrici Faxæger* Neocomensis, à phthisi interempto, cui nimis sedula mater pridie ante obitum purgationem pro ætate validiorem ex-

hibuerat: illi intestina fecibus omnino destituta erant, flatibus ab imo ad summum mire admodum distenta; conficiente cum lacrymis matre obitus anticipacionem.

§. 7. Quondam in Parisiensi Medicorum Schola inferiore in dissecto cane, quem videramus cundo in sinistram latus inclinantem, Renis sinistri substantia interior à duobus vermibus consumpta occurrit, quorum unus pedem longus erat; alter vero semipedem longus apparebat, in *Alis med. Th. Bartholini anni 1675. Ex Franc. Delesans.*

§. 8. Illustr. N. filium 4. annos natum habet, qui cum levam manum dextra ad omnia magis agilius haberet, omnia ea conficit ut sinistri nomine mereatur: Cæterum pater agricola.

rens pueri virium, remedium quaerit quo puer dexter evadat; Porro cum multa machinata sint, & per plures dies manum alligarent & vineirent ut dextram exereceret, & ea functiones cunctas obiret, nihilominus tamen puer sinister semper mansit: Sed qua ratione nemo, quod sciam, dixit, cum id ex anatomica diligentia, potius quam ex rationibus philosophicis deprehensum sit: cum igitur superioribus annis plura & varia corpora dissecarem, anatomiz exquisitam cognitionem desiderantes, non tantum corporum sectione, & particularem cognitione contenti evadebamus, sed etiam eorum vascula, syphone impulsu spiritu, primo alibi dissecta; impellebamus, unde multa & varia nunquam antea scripte, neque fando audita invenimus: Sed non hoc tantum machinabamur, sed ossa ponderabamus, dextra sinistris conferendo: ex qua libratione quaesiti rationem invenimus: nam cum os brachii dextri, & sinistri a cubito ad humerum incedens aequa bilance librarem, dextrum in uno latere, sinistrum in altero ponens, dextrum, sive brachii dextri, longe plus gravitare os sinistri esse inveni: quod tunc considerans, ac in dubium trahens, forte id evenire ob dextrum exercitatum brachium, ad quod nutrimentum majori in quantitate confluit, haesitabam; neque pro hac roboranda affectione exempla mihi deerant, prout ex Amazonibus desumitur, quibus dextra mamma urebatur, ut omnis vis ac robur in dextrum humerum & brachium deferretur: Ceterum restabat id experjundum in puero parvo, qui nondum brachium exercebat, cum ejus dissecandi corpusculi occasio daretur: Sed ecce cum periculum facio, id quoque in puellulo evenire prout in homine iuvenetam, deprehendi: Unde iudicium facio eos qui a natura dextrum brachium robustius habent, raro vel difficulter ambidextros evadere: Si tamen contingat brachio dextro non admodum additamentum illud plurimum esse, tunc exercitatione & longa consuetudine, ita bene sinistra manu ac dextra utetur hic, cui huc evenerint, & tunc ambidexter evadet, ut multis evenire experimur; Et *Galenus* notat enarrat. 44. lib. aphor. Quibus tu addas *Ad Hebraeorum* ducenti, ambidextrum, qui 80. supervixit annum, ut lib. Iudicum legitur: Porro si ut natura brachio dextro additamentum illud fere semper clargitur, brachio sinistro evenire contingat, tunc vir sinister omnino evadet, & ut dixi, ambidexter quoque erit, modo tamen non magna inter sit ponderis disparilitas: est namque brachium dextrum (si modo *Hippocr.* fides habenda est) sinistro robustius, quum omnia dextra membra sinistris robustiora lib. 3. de morbis dixerit. *Amatus Lusitani* Observ. 100. cent. 4.

**A**mbidextrum] Raros esse qui ex aequo & ad omnia officia utraque manu utantur ostendit exemplum ex S. S. allatum: Producere liceat b. m. Parentem D. D. *Andream Bonetum*, Medicum celeberrimum, primo Lugduni Galloium, quod ejus patria; mox Genevæ: brevi statura, sed quadrato corporis habita, nonagesimum prope attigit annum, dysenteria epidemica anno 1639 sublatu; cui alias diuturniore vita ut digno, sic optima corporis

constitutio prolixior spondebat, imo annos Nestoreos: Ne unicus enim deesset d. n. omnes integerrimi, candidi, nitidi, quod sobrietate praeterea eximia debebat: Id vero mihi observare licuit cum mense assideret, si culter laevæ manus occurreret, eodem eadem dexteritate in quibilibet dissecandis usum ac si in dextram venisset: paucis, ad solam scripturam dextra tantum urebatur.

## OBSERVATIO V.

*Quidam in summis torturis Frontem nunquam corrugavit. 1. Prae tortura violentia homoplate disrup-  
ta. 2. Quidam frontem elevans nasum simul attollebat, ob peculiarem musculum illi concessum. 3.  
Latrones ut plurimum carent musculo interiore manus primo.*

§. 1. **M**usculi frontis alligantur cuti immediate: quibus autem pinguedo intercedit, his cutis frontis corrugari nequit: quod accidit anno 1623. furi Paravino, qui in summis torturis cutim frontis nunquam eorrugavit: Cum autem eadaver in theatri Anatomiei usum peteretur, *Adr. Spigelius* ab Ill. Praetore Julio Contareno causam rogarus, respondit id provenire ab interventu pinguedinis inter cutim & musculos frontis, quem ipsa a multis post uberrimum confirmavit. *Rolfinckius* Diss. Anat. lib. 3. cap. 10.

§. 2. Anno 1624. Ampliss. meo Magistratui meo, Bernensi pro Bibliotheca sua Sceleton vile obruli, in quo homoplate in tortura adeo contractae fuerunt, ut eas filo zinci cohaerere necesse mihi fuerit.

Habeo & aliud in Museo meo, in quo simili modo disruptas & à me connexas homoplatas fuisse oculus inspectio fidem facit.

At quis quaeso hominum tam cordatus esse posset qui in extremis istis angustiis atque tormentis non potius mori mallet falsum fatendo, quam diutius vivere erusiatu hosce ferendo? *Fabritius Hildanus* in Operum Praefatione.

§. 3. Per spinam nasi musculus extendebatur secundum illius longitudinem, nunquam ante à me visus: Videbatur propago & appendix carnosa musculi Frontalis, hoc enim elevato movebatur

vebatur ille: Musculus labij superioris longus, ab osse jugali ortus, appendicem quoque mittebat, ad alterum ejusdem labij musculum, cum naso communem. *Th. Bartholinus cent. 1. hist. 38.*

§. 4. Musculi extremæ manus in internos & externos dividuntur: Interni sunt octo, primi verus usus est digitis flectendis auxiliari, & ut acuto sit sensu: Ergo si quid nocuum nobis manum constringentibus occurrat, id dictum ac factum abjicimus priusquam læsio procedat, non autem est usus ut vola dextilis fiat, quod aliqui voluere: Observavi in quibusdam furibus ac latronibus magni nominis ob præclara ipsorum facinora, eos hoc musculo caruisse, licet tendo adesset, qui exortum ducit à ligamento brachialis interno: Hoc primum Patavij observavi in illastri fore Cotola dicto: Idem Pisus animadverti in Tympanista, & superioribus annis Romæ idem vidi, & spectatores admonui in Presbytero Lucensi, qui furum Rex merito dicebatur, & propterea aureo torque, diadema gestans aureum suspensus est. *Columbus de re Anatom. lib. 5. pag. 288.*

**H**inc forte Cheimantes cruci destinatos agnoscent, quod hujus musculi defectus aliam & divertam in vola manus signaturam efficiat & exhibeat: usus vero musculo assignatus à *Columbo* huic musculo, ut si quid nocuum manui constringenti oc-

curret, id protinus eo mediante abjiciatur, dissentit à Gallorum adagio, qui forem designaturi, de ipso inquirunt, *Il ne trouve rien de trop chand*, calidissima etiam & dententia amplectitur.

## OBSERVATIO VI.

*Robustissimorum quorundam cranium suturis destitutum repertum. 1. Vir summe robustus os unum indiscretum habuit à jugulo ad ilia, costarum vicem supplens. 2. Singulare robur capitis, ob crassitiam cranii extimam, & totius corporis ob ossa crassissima, unctuosum humore copioso delibuta. 3. Quidam admodum agilis singulares obtinuit musculos. 4. In Audacissimis quibusdam cor hirsutum repertum. 5. 6. 7. 8. Audacissimus cor habuit hirsutum & partem trunci Aorta ossam 9.*

§. 1. **H**erodotus, *Synesius*, qui *Herodotum* laudat, *Theophilus*, *Pollux*, *Arrianus*, *Æthiopum* crania produunt & maxime firma esse, & Sutaris carere: *Arrianus.*

*Sape ego sic medio tantum de vertice vidi*

*Lineolam junxisse caput: quin plurima cernos*

*Firma hominum capita, & nulla compagere vincla.*

§. 2. Quod *Herodotus* & *Aristoteles* suo tempore observavit, idem nos quoque in decollati cujusdam Viri robustissimi crania deprehendimus: *Tessentius.*

§. 3. *Albertus*, Marchio Brandenburgicus, Germanicus Achilles cognominatus, corporis magnitudine & robore insignis erat, Nec morbis adeo maceratus fuit, Cranium vero fuit solidum. *Schenckius ex Reinero Reineccio. Vide Observat. 92. lib. 1. sect. 1.*

**Q**uestio existit, plures futuras an pauciores commodam creant valetudinem? *Hippocr.* & *Celsus* inter se dissentiunt. *Ille*, Qui plures futuras habent, hi capite melius valent: Contra *Celsus*; Raro calvaria solida esse sine futuris, locis tamen æstuosis facilius in venit: & id caput firmissimum: atque à dolore tutissimum est: Ex ceteris quo futuras pauciores sunt, eo capitis valetudo est commodior: Verum si hujus verba perlitamus, hic *Hippocr.* refragari non videtur: Sermo enim *Celsi* tantum de iis qui locis æstuosis degunt, *Hippocr.* vero de Græcis, & cæterarum nationum hominibus maxime loquitur, qui tam æstuosam non incolunt terram: His moris est caput velibus tegere, maxime si iter faciant, at Sole ambulant: Quare his sunt crania futuris secta, atque quo plures eorum capita habent futuras, eo magis illi capite valent: E contrario homines locis æstuosis degentes caput ab incute ætate nudant, radunt, ac Soli de industria subijciunt, ut futuras archus coeant, concrecant, ac cranium quoque vehementius indurascant: his itaque quo pauciores sunt futuras, eo commodior valetudo: nam ejusmodi cranium & externis injuriis illatisque plagis fortius resistit, & morbis internis minus patet: Quare *Synesius* illud cranium appellat *ἀνδράων νότον* *δυσμυσαμένον*: atque *Celsus* Indos tradit neque ex capite, neque ex oculis laborare: Dicit quispiam, Vapores non possunt exhalare, hinc morbi: Homines illam terram incolentes æstuosam, inquit *Galenus*, siccioris naturæ durique habitus,

cum & Solis ardoribus quasi torreantur, ac multe sunt viæ quibus hæc & ejusmodi alia excrementa cerebri emittantur: Atque qui in Germania vixerunt, & caput solidum sine futuris habuerunt, hi maxime prospera valetudine fuerunt, & corporis robore insignes: Hæc & ejusmodi alia expendere is qui futuras aut aliquando, non vitio morboque ac senio, sed vi ac robore facultatis officine concrecere, ut illi longe integerrima commodissimaque sunt valetudine: Sed si *Ægyptii* detestatio taloque capite, ut eorum sertimos, in Sole versarentur, ac hocum capitis ossa futuras laxius juncta essent, nonne tantus æstus sanguinem cie-ret, inflammationem moveret, vix perferendum capitis dolorem concitaret? At, inquires, non omnes *Ægyptii*, *Æthiopes*, capita habent futuras vacua, Nec id contendit *Celsus*, locis tamen, inquit, æstuosis facile invenitur: Facilius vero eo quod caput soleant insolare, quo sit ut cranium illis caloribus mirifice indurascant & futuras perdat: Ac Indorum quoque capita tam dura sunt tamque solida, ut aciem ferri respuant (*vide lib. 1. sect. 1. observ. 92. in schol.*) Illud etiam hic considerandum est quod ingentem habeat vim confutudum, atque si ex *Hipp.* ex macrocephalis macrocephali generantur, fieri possent ex parentibus, quorum crania futuris paucioribus donata sunt, similes proles gignantur, quarum crania eandem naturam & duritiem quam citissime acquirunt, præsertim cum tantus æstus Solis cranium, non nisi naturali veste tinctum; mirifice arefacere queat ac indurare; atque

credendum est quosdam ibi futuras citius, quosdam tardius amittere : quare haud mirum in Aethiopiae cranio *Riolanus* Parisiis futuras notasse : nam quos etiam Aethiopes in Germania dissecamus, ii admodum pueri Aethiopicas oras reliquerunt : Et nos in multis Indorum craniis futuras notavimus, quae nunc coespiciunt etiam, nunc obsecunt : Ossa vero cranii densissima, crassissima & maxime solida invenimus. Hacque ratione *Hippocr.* interpretatur : Alioqui vulgus hanc rem hoc modo expedire videtur : Caput sacris cirens, coeli aëtrique injuriis minus pater, ac propterea ejus valetudo, ut *Celsus* docet, est commodior, at internis morbis ejusmodi cranium, ut *Hippocr.* tradit, magis opportunum est, *Schneiderus lib. 2. de Catarib. cap. 5.*

*Nec morbis maceratus* ] Recentiores auctores futuras in admodum plures res usui esse arbitrantur : i. credunt cerebrum, *molliculam partem*, membratim per futuras cranio adnexis providentissime suspendi, quod & docet *Galenus* ; Verum cui hoc probari poterit ? quia vehementer hae membranae cranio, uti

ostendit *Berengarius*, adhaerentur, ubi illae simplices sunt, ubi nulla apparent futurae : 2. Tradunt vapores hic exhalari : Nos non inficiamur futuras nonnum aburi : ac negamus hoc primarium futurarum munus esse : multi integerrima velerudine fuerunt ac robore corporis praestiterunt, quorum capita post mortem sine futuris inventa sunt : Quidam senes cranij futuras amittunt, & sunt incolumi ac firmo capite. *Galenus* auctore, ajunt ex futuris venas & arterias foras emitti, quae cranio & pericranio sanguinem subministrant : Verum quae venae iuribus egredi possunt, quae tam arctae sunt & quarum dentes tam sunt acuri, tam asperi, tam commode coeunt : pericranium sanguinem ab alijs venis haurit, quo alitur. 4. Caput futuras confectum esse ajunt, ut altero capitis ossis fissis, alterum ne findatur : At *Galen. 6. meth. m. art.* se os syncipitis & temporis una plaga fissam curasse, ubi certe tanta rimae scissura squamiformis obstrare haud potuit : Cujus rei testes etiam *Fallopianus, Pavvius, Spiegelus* & *Idem*.

§. 2. Apud Magnesium, quidam Lethum sunt, quidam fuit *Protophanes*, qui de pancratio & luctu eadem die in Olympia victor est renuntiatus : In hujus sepulchrum aliquando latrones praedae spe ducti penetrarunt, post illos alij multi visuti mortuum, costas non habentes discretas ; sed pro illis continens os habuit ab humetis ad eas costas quas Medici nuncupant nothas : *Pausanias in Atticis, sive lib. 1. p. 66.*

Qui robustis costis sunt, fortis animi sunt, & reserantur ad masculos. *Aristot.* in figura iracundi, eum bene costatam facit, Et in figura fortis, ossa & costae, & extrema corporis fortia & magna ad-

scribit in *Physiogn.* In figura fortis *Polemon* & *Adamantius*, articuli & latera fortia & robusta. *lib. 8. apt. Porta lib. 2. Physiogn. cap. 33.*

§. 3. Cum *Patavii* Medicinæ operam datemus, plura cadavera, dissecimus : Cum multi in his rariora observare licuerit, tum istud singulare in bajulo animadvertimus : Cum proceræ staturæ esset, & ossa haberet validissima & crassissima, multum curæ adhibuimus ut illa quoque rite composita evchere possemus : Soli igitur per ætatem integram in testeo planiori exposuimus, sed nunquam ut satis fessarentur obtinere posuimus, quia semper unctiosa remanebant, Nec javir denuo coxisse & soli exposuisse : Hæc causa fuit ut amiceo reliqueremus omnia cum iter ingrederemur, solo cranio nobiscum deportato, quod etiamnum habemus nullis omnino futuris, ut vocant, praeditum, & densissimum ut digiti fere annularis crassitiem exæquet : Hic *Bajulus* cum viveret, nulla vi externa facile ladebatur in capite, nec unquam à causa interna dolebat. *G. H. Velschius Observat. phys. med. hexacoela 1. §. 77.*

§. 4. Capite truncatum mense Martio 1651. evisceravi : Inter musculos radij, duos illos parvos *Casseri* non inveni, negatos quoque à *Riolano* : Unum tamen vidi triangularem, à summo cubito ortum, & desinentem per caecum medium ejusdem, carnosum sine & angusto, qui nullius eogito musculi fuit portio, quos omnes diligenter ante separavi. In minimo digito pedis Floxorem musculum observavi singularem, longum & teretem, à tibiz capite exortum, duobusque tendinibus circa insertionem divisum. In Lumbis, juxta musculum *Psoas*, alius musculus comparuit à nullo hactenus observatus, Ex parte majori musculo *Psoas* subiacebat, sed exterius ad latera magis vergens : Initium idem cum majore *Psoas*, carnosum, inferebaturque carnosus in superiorem ossis *Ilij* marginem posterius, ubi *Iliaci* interni est ortus : Estimavi usum hujus esse ut pulvinaris instar majori substerneretur, si quidem os *Ilij* ex se immobile, vel ut os idem sustineret, ne nimium stante homine oneri esset.

Tantum masculorum ubertatem & varietatem non memini in alio unquam me vidisse : Homo vero hic, dum in vivis erat, compacta membra motuum agilitate facile & cum robore versabat. *Th. Bartholinus cent. 1. histor. 38.*

§. 5. *Jacobus* Latro è patibulo quo suspensus fuerat, veluti jam mortuus, sed qui tamen adhuc viveret, depositus atque curatus convaluit : Verum ut erat homo ingenio malo pravoque, ad eandem statim scelera revolutus, quibus antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur.

Quare hominis admitti nequitiam, mortui cadaver incidendum curavimus, & inventum cor ejus ob eximiam caliditatem undique pilis refertum.

Hoc idem inventum est in corde *Aristomenis* Græci, qui solus perhibetur integras acies pugando in fugam vertisse : Est ergo non tantum scelesti ingenij signum, sed quandoque etiam feræ fortitudinis. *Bertruvius cap. 83. de Abditis.*

§. 6. Olim Ferrariæ experti sumus in quodam à nobis confecto, cujus cor pilis circumseptum erat, audacissimus hic erat grassator & latro insignis : *Amatus centur. 6. curat. 65.*

§. 7. Memini cum Venetijs essem sumptum capitis supplicium esse de quodam nobili latrone, qui cum à carnifice dissecaretur, corde admodum piloso repertus est. *Ant. Muretus lib. 12. c. 10. Var. Lecl.*

§. 8. Hirsuto corde gigni quosdam homines proditur, neque alios fortioris esse industriz, sicut Aristomenem Messenium, qui 300. occidit Lacedæmonios: Ipse convulneratus & capitis, semel per cavernam latomiarum evasis, angustus vulpium aditus sequutus: Iterum capitis, sopitis custodibus somno, ad ignem advolutus, lora cum corpore exussit: Teisid capto, Lacedæmonij pectus dissecuere viventi, causa videndi, hirsutumque eor reperitum est, *Plinius lib. 11. cap. 37. nat. histor. Valerius Max. lib. 1. cap. 6.*

§. 9. Nob. Polonus studiorum causa in Italiam ablegatus, & ut Palladem non hastatam, sed rogatam potius coleret, Patavium antiquissimam Antenoris civitatem Masarumque delubrum devenit: is neglectis studiis humanioribus, arma pro more ibidem loci inter studiosos detestanda, serio tractavit, ut strenuus omnibus digladiationibus & congressibus nocturnis, tanquam miles legionarius, mercede conductus & veluti semper primus aciei interesset, unde post id præmij reportavit ut victus ab hoste suo, globo traheretur, vitamque miseram eum miserrima morte in ipsa acie commutaret.

Hujus cadaver in theatrum delatum, anno 1650. more solito apertum, cor in publica Patavinorum Anatomia, præsentibus Rectoribus Civitatis, &c. ut & tota tum Doctorum tum studioforum cohorte numerosissima exhibebatur, undeque pilosum: Truncus vero attoriz magis descendens, circa septum transversum, ad minimi digiti longitudinem tutus offensus: Quæ causa fuit ut pugnacissimus hic juvenis per plures annos de ardore cordis, & dolore quodam pungitivo ad dorsi spinam conquereretur, præcipue ex leviori aliqua facta commotione, *1. Scultetus Trichiasus admiranda pag. 82.*

**A**udacissimum fuisse nostrum ne mirere, cum ut *Avicenna lib. 3. Fen. 2. Tr. 1. cap. 3.* pilorum in pectore largiorem proventum, præcipue si incurvantur, calorem cordis præfagiant: hæc sunt ejus verba, Pili plurimi super pectus, & propriè illi qui sunt crispi, significant caliditatem, &c. Si id ab externo corporis habitu præsumere licet & judicare,

sane æstus ille cordis major, cum sanguine glutinosiore, materiam pilis subministrante, quo ipsum cor, cum secaretur, repletum erat, majus calcar addidisse, certo nobis persuasum habemus: quo factum ut incitato quasi spiritu singulari, impetuosior in hostem rueret. *Idem.*

## OBSERVATIO VII.

*Homini ferocissimi cor pusillum ac durissimum. 1. Mulieris ob flagitia decollata cor inversum inventum. 2. Latronis ferocissimi cadaver viscerum imi & mediæ ventris, à dextris ad sinistra transpositionem exhibuit. 3. In viri ferocis & nequam cordis majorum orificiis caruncula reperta. 4. Latro cor bifidum habuit. 5. In juvenis dissolutissimorum morum cadavere duo Lienes inventi. 6.*

§. 1. **I**n quodam nebulone ferocissimo, qui dum virgis à carnifice exderetur, lictoris subfannantensem arripuit, eumque vulnere perfodit, deprehendi cor pusillum admodum & durissimum instar cartilaginis, ut nullum unquam viderim solidius. *Riolanus Anthropogr. lib. 3. cap. 12.*

§. 2. Mense Januario anni 1671. Halæ Saxonum Collegium Medicum feminam 20. annorum, ob erimen incendij & furri decollatam, cultello Anatomico subjecit, in qua præter Pulmones diaphragmati & pleuræ firmiter annexos, aliaque observavimus cor plane inversum, ac sinistrum ejus ventriculū dextram thoracis partem occupantem; Arteriam verò magnam statim supra cor in viam, seu latus sinistrum, erroris sui quasi memorem, redeuntē, nullius alterius partis situ mutato. *Valentius Andr. Mollenbroccius Observat. 76. Miscell. cur. ann. 1671. Vide Cardianostrophon admirandā Friderici Hofmanni, ubi fuse hæc describitur historia.*

§. 3. Cadaver sicarij cujusdam, dicti Richardi Francætur, qui eum nobilem virum in rheda illustr. Principis de Beaufort sedentem noctu silopero interfecisset, supplicio rotæ fuit additus anno 1630. dissectum fuit, & sequentiā exhibuit.

1. In venæ umbilicalis sira, progressu & insertionē immutatio animadversa est, hæc enim quæ consuetō & à natura institutō ordine versus hypochondrium dextrum tendit, atque in scissuram Hepatis, dextro illo hypochondrio contenti, inseritur, aliter sic se habebat, si quidem hæc vena ex hypochondrio sinistro orta in umbilicum desinebat.

2. Diviso peritoneo major admiratio sublit, dum venæ umbilicalis progressum inspectando. Hepar sub hypochondrio sinistro prorsus reconditum, lienis & fundi ventriculi locum occupans animadvertit: cujus pars gibba costas nothas sinistri lateris respiciebat, parsque hepatis, quæ secundum naturam versus sinistrum latus protuberat, in hoc versus dextrum protendebatur: proinde venæ truncus ascendens & descendens in partibus sinistris collatus erat, parte nempe laterali & sinistra vertebrarum dorsi & lumborum superstratus; qui pro solito naturali instituto super prædictarum vertebrarum parte interna, eaque dextra & laterali jacent:

ex quo factum est necessario ut situs partium omnium internarum, tam in abdomine quam thorace contentarum, immutari atque in verti debuerit, ut deinceps patebit, cumque Hepar sit veluti basis, quo exteræ partes superstruæ videntur, ejus sedem, dispositionem & colloca- tionem necessario sequi coguntur; illo namque transposito fieri non potest quin & cæteræ partes internæ transponantur.

3. Ulterius progrediendo ventriculus in dextris partibus situs inventus, ejus orificium superius super dextro latere vertebrarum metaphreni collocatum erat: quod insolitum est, nam secundum naturam ad diaphragma accedens sinistrorsum vergit, ejusque fundus dex- trorsum inclinat: In hoc cadavere orificium ventriculi inferius, sive pylorus, in latus sinistrum reclinabat, qui solet in partem dextram tendere, propterea lienis, intestini duodeni situm in- versum fore tunc Chirurgo verisimile visum est, quod postea verissimum comperit.

4. Fundo ventriculi in oppositam partem reclinato, lienem in hypochondrio dextro col- locatū adinvenit, cujus pars gibba nothas costas, sima verò ventriculum, prout solet, respiciebat: cui per vas breve, quod trifidum erat, membranasque ordinarias alligabatur. Ex quo lienis po- sitione oritur etiam in venæ splenicæ, proindeque totius venæ portæ situ & distributione immu- tatio atque inversio: Vena enim porta, quæ naturalem situm in aorta dextra obtinet, in si- nistra parte erat constituta; & splenica, quæ è sinistris esse debebat, erat è dextris partibus.

5. Ventriculi situm immutatum sequitur identidem situs intestinorum mutatio: cum enim pylorus ad sinistram partem esset propensus, intestinorum principium è partibus sinistris du- cebatur, duodenumque in sinistra parte erat collocatum, neque ut solet constitutum: cum enim secundum naturam sub pancreate ducatur, sitque ut convenientem dispositionem si- tumque obtineat, obliquum & in medio reflexum, ut quod semel egressum est è ventriculo in illum refluxu non possit, hinc contra sese habebat, supra enim pancreas quasi recta fere- batur; intestinumque jejunum, ejus initium esse solet in parte sinistra, hic in parte sinistra erat locatum, sitque intestinorum omnium situs erat inversus, quæ enim ad dextram partem pertinebant, sinistro loco continebantur, veluti cæcum quod in sinistra parte erat cum appen- dice sua, una cum initio coli, cui in dextra secundum naturam sedes convenit, & in dextram terminatur, rectum pariter à sinistro latere initium ducere solet: E contra in hoc cadavere Colon intestinum in dextrum latus desinebat, rectum vero ab eo latere exordium sumebat: proindeque mesocolon in dextra parte situm erat, cui pars dextra dieata est secundum natu- ram: Sic vena hæmorrhoidalis, quæ è splenica ut plurimum, interdumque è mesenterica si- nistrorsum oritur, & per coli intestini & recti longitudinem fertur, & ad extremum recti in- testini deducitur, in hoc cadavere è splenica dextrorsum exoriebatur, quo loco lien situs erat, dextrorsumque per longitudinem coli & recti extendebatur.

6. Utque vena cavā descendens sinistram versus vertebris lumborum incumberebat, quæ in parte dextra reperiri debebat: sic Aortæ truncus descendens dextram sedem occupabat, quæ cavæ descendenti trunco naturæ lege debetur: inde factum est ut cæteræ venæ trans- positæ fuerint, quod potissimum in vena spermatica dextra cernebatur, quæ ab emulgento dextra emergebat, & spermaticæ sinistra, quæ è trunco venæ cavæ sinistrorsum exiliebat.

7. Renum pariter situs erat inversus: renem sinister digiti latitudine sinistro depressior erat: Jecore nempe in sinistro hypochondrio collocato ipsum comprimente; renvero dex- ter erat elatior, liene minorem locum in dextro hypochondrio occupante.

8. Insuper *cavalis quidam conspicuus* inventus fuit in abdomine, è cavis jecoris emergens juxta venæ portæ exortum, per medium pancreas transiens & intestinum duodenum inter duas tunicas desinens, propter meatum cholidocorum insertionem: is erat substantia nervosa, figura rotunda, pennæ gallinæ magnitudinem referens, in ejus cavitatem tubulus introdu- ctus fuit, qui Hepar ingrediebatur, & inter duas tunicas duodeni perducebatur hincque cana- lis plures ramulos in pancreas diffundebat.

§. 8. Partes thoracicæ eundem situm obtinebant: Tres enim Pulmonum lobi ad dextrum latus pertinentes sinistro latere, duo vero dextro continebantur: Cordis conus, qui ad sinistrum latus paulo inflectitur, basisque quæ ad dextrum paululum vergit, contrario modo hic sese habebant: pericardij enim & cordis macro latus dextrum, ejus vero basis latus sin- istrum respiciebat, sitque quatuor vasorum cordis ordo etiam immutatus fuit, ut & ventricu- lorum cordis situs inversus; dexter enim sinister erat, & contra: sic aorta in dextro latere erat posita, Ostiumque venæ cavæ, quod in eor dehiscit, in sinistro aspectabile erat enim auricu- la cordis majore: Arteria vero venosa, venaque arteriosa, cum minore cordis auricula, in dex- tro conspiciebantur: Vena sine pari partem sinistram internamque venarum metaphreni per- reptabat, ortumque suum ducebat ab initio subclavium ramorum, octo ramulos emitten- do, qui tam ad dextras quam ad sinistras partes deducebantur.

9. His ita constitutis, sequebatur necessario nervorum recurrentium situm quoque immanum esse: solet enim nervus recurrens sinister reflecti circa descendentes aortæ incurvationem: dextri vero reflexio circa subclaviam dextram veluti circa trochleam perficitur; Et sane contrarium positum in hoc cadavere nervi recurrentes obtinebant, aorta enim in dextra parte locata, nervus recurrens circa ejus incurvationem reflectebatur; in sinistra verò circa subclaviam reducebatur. *Cattierus Observat. 17.*

**C**Analisis quidam conspicuus ] Ignorasse videtur Pancreatis ductum peculiarem, seu canalem à Virsungio inventum, qui venæ speciei & structura aliorum oculis ante imposuit; secundum pancreatis longitudinem exprotrigitur, brevis, sed numerosos ramulos quaquaversum diffundens: Ampliitudinem

insignem obtinet, ac orificio amplo ad intestinum duodenum, quandoque in meatu bilisarii extremum desinens, quandoque peculiari meatu prope porum bilisarium, digiti latitudine distanti intervallo intestinum jejunum bians; In prodigioso constituto homine, canalis ille ad cava jecoris exporrectus est.

§. 4. In *Joanne Dorleans*, malis moribus prædito, audaci & feroci, veluti carunculae repertæ sunt, exque oblongæ, in orificiis vasorum à corde ad pulmones pertinencium.

**C**Aruncule, &c. ] Credunt an eo sanguinem crevisse à calore nrope maxime fibrosam, & id induxisse: atque in andacibus & calidioribus sanguinem per se in aliquid carnosum & pelliculosum cogi posse, ratione fibrarum quæ ipsæ sunt ejus rei causæ effecrices. *Ballan Epid. & Eph. l. 2. p. 144.*

*Veluti caruncula* ] Discernas an sit sanguis solum, an vero caruncula, quoniam hic decipi facile est; Si sanguis est, aqua facile solvitur; Si carunculae, pelliculae adsunt, restant post affusi sanguinis eliquationem. *Idem ibidem.*

§. 5. *Christophorus Gioè*, vir Nobiliss. narravit mihi in Norvvegia pridem à se visum latronem qui poenas scelerum luebat: Quam exenteraretur à carnifice, cor habuisse singularis figuræ, muerone non auro, ut fieri solet, sed bifido, ut distincti ventriculi manifestius externa facie apparuerint, dexter nempe & sinister, interjecto hiam. *Thomas Bartholinus cent. 1. l. histor. 68.*

§. 6. Venit ad officinam meam anno 1560. dissolutissimis moribus adolescens, *Joh. Aurias*: fignus erat tantum quantum ex eo non memini, tum ille ad me; Ecquid, inquit, tempus hoc sectioni aptum? apertissimum inquam, si modo magistratus furem aliquem, quorum hic tanta copiam quanta muscarum cum ealer maxime, in crucem ageret: Cum ille, bono animo es, materiam tibi sectionis præbebo: dixit simulque stricto gladio (nox erat) egreditur: Egrediam inimicus, qui ex insidiis ad fenestram sermonem ejus hauserat, excipit, gladiumque ventrem exigit, concidit exanimis *Aurias*, altera, ut præfagierat, luce, theatro secandus offertur.

Duo illi Lienes erant bellissimi, singulis suæ arteriæ venæque, & quidem hæmorrhoidalis maxima, è medio liene progrediens, hinc quicquid erat humoris melancholici excernebatur, nec unquam per omnem vitam tristitiz se multum dare visus, *Jovis* non *Saturni* pullus: *Cæbralius Observat. Anat. 15.*

**H**Oc exemplo suam firmare de Lienis usu sententiam *Clariss. Wildius* licuisset, qui tract. de affectione hypochondriaci, vult à sanguine per arterias adveho portionem quandam facultentior, facile fixo constantem, in hoc viscus deponi, quæ illic velut digestionem exalata, & in fermenti naturam evecta, denuo sanguini per venas resflu committatur,

quæ ipsum *viscus* quodam inspexit, atque circa ejus *visum* idem præstet quod fermentum vulgare massæ farinaceæ commissum: hinc credit spiritus acutiores in tegimine tum vitali tum animali progigni: Id si simplex lien præstare potest, nedum duplex actionum ejusmodi promptitudinem & imperum invehit. *Vide loc. citatum.*

#### Observatio VIII.

*Furis pusillanimis cor ulceribus exesum deprehensum. 1. Fur sine cerebello. 2. In Fure insigni vas breve bifurcatum inventum, Abscessus in sinistro cordis ventriculo, Pusillimum cerebrum in occipite. 3.*

§. 1. **P**ueri trimi sinistra cordis auricula variis ulceribus exesa erat, à quorum eructante fetore defecit proculdubio frequentius ipsi animus; Cujus deliquium etiam aliis ex simili causa vidimus contigisse, sed præcipue cuidam *Lari*, quem propterea ceu pusillanimum vituperaverunt qui cum ipso versabantur nebulones. *Tulpius Observat. lib. 2. cap. 16.*

§. 2. In cerebello, propter duriciem & siccitatem, Arabes memoriam collocant: quibus favere videtur observatio *Benivenii*: In quodam fure cerebellum defuisse vidit, idcirco sæpius in furo deprehensus & admonitus, præcedentis facinoris non meminerat.

**C**Uriose inter Medicos & Philosophos disceptaturum animæ facultates distinctis sedibus in cerebro disparentur, elegitque Imaginatio partem ejus anteriorem ceu molliorem, uti memoria posteriorem, quasi duriciorem ac retinendis spectatæ accommodariorem: qua controversia alijs relicta, proferam hic duo duntaxat exempla, luce clarius demonstrantia læso occipitio potissimum offendi nobilem remi-

niscendi vim: *Famulus N.* ob glaciem procidit supinus in occipitium, unde orta rerum omnium oblivione non meminit deinceps nominis sui, nedum domus è qua venisset: Quem mentis stuporem brevi ætatem quidem emendavit, ut iterum recordaretur longe præterita, at quæ casum hunc immediate præcesserant illorum memoria plane exciderat.



Quem eandem remissionis labem exiebat quidam mercator nobis similiter obculis; qui ignarus vulneris quod nec opinanti in occipito conigerat, Chirurgum obtestabatur, ut indicaret vulneris sui

auctorem, locumve in quo id incidit: quorum notitiam licet vel avidissime expectaret, neque tamen vel minimum invenire vestigium. *N. Tulpus Observat. lib. 4. cap. 14.*

§. 3. In inciso Jacobi cujusdam furis cadavere, bifurcatam venam à liene ad ventriculum atram bilem deferentem adnotavimus: Tum & abscessum in sinistro cordis ventre pituita redundantem: Postremo & posteriorem ejus epipis partem, ubi memoriz sedes est, adeo brevem, ut taceillam cerebri portiunculam obtineret: Quam ob causam cum priorum scelerum, & eorum quæ pro his sæpe passus fuerat, tormenta scilicet exilia & carceres minime recordaretur, toties ad vomitum, tanquam canis impudens reversus est, ut in laqueum tandem incidere; vitæque ac furti finem fecerit. *Beniventus de abditis observ. 89.*

## OBSERVATIO IX.

*Senex ad iram proclivis post obitum sine felle & cysti inventus est. 1. Iracundus; pericardium exsuccum & squallidum habuit. 2. Invalde iracundi cysti fellea repertus lapis eam adimplens. 3. In muliere ira & merore confecta, carnea cordis substantia plane consumpta fuit. 4.*

§. 1. **D**Ecrepitus quidam senex in iram mire propensus, post decessum sine felle ac sine cysti inventus est: in cujus sede ingens calculus concreverat. *Fernelius lib. 5. Patholog.*

**I**n iram mire propensus Nam fel commovet iras, quod quò uberius melle sanguinis remiscetur, cò propensio in iram major est: Singularis veto ojanino fuit hujus senis constitutio, qui felle & cysti caruit; hac proculdubio à calculo ingenito ingenti dilacerata & absumpta: Alijs suapte natura, & quamdiu integra sanitate fruimur, semper moderate plena est, inquit *Clar. Glisson Anat. Hepatis cap. 20. propos. 1.* quod inde liquet, quia in omnibus animalibus (quibus vesicula hæc concessa est) cujuscunque demum ætatis aut sexus fuerint, ipsæque vel jejuniaribus, dummodo prospera valetudine utantur, eadem semper plena cernitur, quod à nullo Anatomico negatum: quineriam in foetu, dum in utero est, repleta conspicitur, & in morbois constitutionibus rarissime felle vacua est: At, inquit (testibus viris doctis quamplurimis) haud raro vacua reperta est: Neque istuc infirmitas, aut ex naturæ autem lege id inquam contigisse omnino pernego; atque illas solummodo ejus rei causas comminisci queo, nempe, ut vel à compressione aliqua violenta bilis omnis extra vesiculam propellarur, vel ob insignem fibrosi anuli laxitatem (quæ fit ut bilis ulterius retineri nequeat) sponte illinc excidat: quorum posterius sine omnimodo vicinarum partium torpore atque enervatione haud facile contigerit: ideoque verisimile est (quod à nonnullis dicitur observatum) nempe à totali hujusmodi bilis evacuatione repentinam mortem subsequutam esse: utrobique autem talis evacuatio præter naturæ ordinem contingit, neque enim vel à faciliore expultrice, vel à spontanea aliqua aut spontanea vesicæ contractiōne perficitur, quod tamen ut naturæ opera id fieri dicatur, necessario requiritur, ac propter ea naturalem vesicæ hujus plenitudinem penitusquam oppugnant: Licet verò, addit *Glisson ibid. propos. 2.* vesicula fellea semper modice intume-

scat, nunquam tamen naturaliter usque adeo inflatur, quàm diu diu saltem cochlearis mien iram porro excipere posse videtur: Neque enim distenti folliculi instar indurecit, sed molliis potius tactuque cedens deprehenditur: Quæres autem, Si quidem uberioris humoris est capax, cur non aliquando in corporum dissectionibus summo pretere referta invenitur? Profecto cum de vita res agitur, partes omnes, & præsertim quæ humoribusurgent, ad opus sese strenuè accingunt, ut quod ipsi molestum fuerit, emoveant: Ita canis jam suspensio periturus, vesicam urinarum, si modo plena sit, atque interdum intestina quoque exonerat: Sin vero cervix vesicæ felleæ ab incunato calculo, aut aliter obturata fuerit, compertum est eandem ultra usitatum repletionis modum dilatari: indicio manifestò illam posse vi adigi ut consuetos distensionis terminos excedat, atque humoris plus solito in se complectatur: Quod enim inde de propositionis hujus veritate, quod nempe fibrosus anulus haud adeo arcte atque pertinaciter constringitur: quin humori huc illuc fluxui locum cedat, quemadmodum si diguotum compressu periculum feceris, id clare comperies.

\* *Sine cysti (Etc.)* Admirandum hoc vocat *Merc. Donatus l. 4. Hist. mir. c. 30.* Forse membraneus ille folliculus à calculo ingenti excidit, alimodum amenuatus atque adglutinat, minus cariosis observatoribus, ac si abesse, impossuerat: vel una cum liquore suo biliolo in calculosi duritiem concreverat: Quam hæc ipsam historiam *Goeschedus Moebius cap. 15. Fundam. med. Physiolog. illustratus* in Polonia olim innumeros boves, excita quasi peste quadam interisse refert, in quorum cadaveribus dissectis nihil aliud notari dignum fuerit, repletam quæ vesicula fellea tota in lapidem conversa.

§. 2. Venerus quidam cum irasceret frequenter, in syncope cadebat ex qua postremum obiit. In eo repertum pericardium omni humore vacuum, squallidum, rugosum cordique adherens. *Vide lib. 2. tit. de Syncope.*

§. 3. In quadragenario laceritiam per septem annos patiente defuncto, lapidem magnitudine fellis reperi; Et autem persona antea maxime iracunda ac violentissima erat. *Lab. Hænen lib. de Morbis Tartareis.*

§. 4. Proma conda Nob. cujusdam in Misnia, in Tibia sinistra fonticulum, non arte sed natura factum, perpetuo madore scaturientem gestabat, multis retro annis: Anno 1669. à prædicto Nobili irato, altero die Bipatio percussa, nihil inde dampni percepit; altero vero die ob incidit ab eo alapam, excanduit, & sic in fervore abiens, inter abeundum arcu allisit, & recentium locum affectum laceravit, ex quo sanguis tanta effluxit copia, ut medicamentis sangu-

guinem fiftentibus destituta, elapsis paucis horis vitam cum morte commutaret. Postero die terræ corpus fuit traditum: Elapsis à die sepulturæ integris septem septimanis, iussu Seren. Electoris Saxoniz sepulta effodiebatur: nullam autem à læsione externa manifestam causam per Bipalium aut aliam insidiam, factam invenire valui.

Quare ad interiora perlestranda ventrem inferiorem aperui, & deprehendi Hepar magnum & adhuc incorruptum, bovis 4. annorum hepati simillimum, Lienem vero parvum: Erat effossa bene carnosæ, in vita vino dedita, unde effarum solertissimi Bartholini Anat. lib. 1. cap. 14. verum offendi, quod ita se habet, *Majus tamen Hepar est infrigidioris temperiei corporibus, & in timidis, & ingulosis, &c.* Ulcerius spartam nactam prosequendo, in aperto thorace occurrebat Cor, non flaccidum, quod & multi authores se vidisse annotarunt, sed quoad ipsius substantiam plane consumptum, instar loculi vacui & corrugati: Cor tabidum vidit *plinius*, exsiccatum instar pyri tosti; *Jordanus* totum immo iterato calore absumptum; Reliqua persequi vetuit odor cadaverosus. *Melchior Fribe in Miscell. curiosus anni 1673. Observ. 65.*

# OBSERVATIO X.

*Obesitas totius insignis ob viscera insolite magnitudinis.*

**A**NNO 1603. 27. Aprilis, Georgius Fridericus, Marchio Brandenburgicus, Onolsbachii in Noricis vivendi finem fecit, obesitatis insitatz Princeps, cujus corpore ad pollincturam exenterato, viscera ad miraculum magna reperta sunt, 1. Hepar librarum quinque communium, 16. uncias pendentium: 2. Lien libræ unius cum quadrante: 3. Cor librarum duarum: 4. Pulmo librarum quatuor: 5. Ventriculus in latitudine per transversum spithamatum duarum, Crassities ejusdem pollicum trium, ventriculi extenti amplitudo mensuras Germanicæ, quarum singulæ uncias 64. pendit, septem & decem facile capiebat, h. e. libras Medicas seu Romanas 90. cum uncis 8. Ottonis. 6. Omenti crassities sesqui spithamam habebat, plurimarumque erat librarum: quippe ventris aqualiculum latè longeque, protensum lata fascia à cervice appensa, gestare & constringere cogebatur. Proceritas corporis erat pedum septem, universi autem pondus cccc. atque 16. libras mercales pendebat, Ingentem tamen hanc corporis molem haud incommode ferebat, adeo ut equitate & choreas duceute posset, utpote sensim accrescenti ponderi assuetus. *Smerius Miscellan. lib. 10. p. 579.*

# OBSERVATIO XI.

*Suffocatio suspensis impedita ob tracheam arteriam ossæam.*

**I**S qui diu suspensus Bononiz jacuit, vivus inventus est, quod asperam arteriam non cartilagineam, sed ossæam haberet. Hoc nos & ab aliis accepimus, *Cardanus lib. 2. tr. 2. contradi. 7.* Constat quendam bis suspensum servatum mitaculi specie: inde cum tertio ludicis solertia periisset, inventam ossæam asperam arteriam. *Idem lib. 14. de rerum variet. cap. 76.*

**O**ssæam asperam arteriam. *Columbus lib. 1. tuens, de illa in ossam trachæam agit: Quod autem ossa hæc sint, probat ex colore, duritie, ac medullosa substantia, qua cætere cartilaginem omnem certum est.*

# \* ADDITAMENTA.

# OBSERVATIO I.

*Dorsi vehemens dolor & diuturnus, ob Tumorem in illius regione obortum, spina tandem rupturam invehentem, & sanguinis in imum ventrem effusionem.*

**Q**uidam spatio quatuor aut quinque annorum ingentes dolores universam Dorsi spinam secundum illius longitudinem occupantes passus est; quorum causa incassum adhibita fuere remedia quasi Repum inflammatione laborasset, aut nephritide, calculo, &c. appetitu interim salvo ut & concoquendi manere ad ipsam usque obitus diem; qua cum familiaribus pro more prandium sumpsit; quo adsumpto in aliud cubiculum illi secessere, reversi autem elapsa quarta horæ parte, cum mortuum humi stratum reperiunt, spinam autem Dorsi disruptam, id quod illi verisimiliter contigit dum inclinato corpore matulam arrepturus fuit.

*Relatio eorum quæ in cadavere M. Guillelmi Parisiensis deprehensa sunt à D. Amiens*

*Chirurgi Régie Mense Januarii anni 1681.*

Nos subscripti D. Medicus & M. Chirurgi Jurati Parisienses, convocati aperiri causa cadaveris

dayeris mag. *Guillelmus*, certum facimus, illo quoad exteriora perlustrato nihil singulare deprehensum fuisse: Dissectione autem facta primo Infimi ventris ex eo statim ingentem copiam sanguinis profuissse; postea sublato sterno, universam thoracis regionem sinistram sanguine repleam repertam esse, in grumos concreto; quare accurate indagando causam tam copiosæ effusionis, inventum Tumorem insignem, à sexta Dorsi vertebra ad primam usque Lumborum expositum, membrana validissima præditum, coronati argentei crassissimi obrintente lacera juxta primam dictam Lumborum vertebam, ex parte periosio destitutam, adeo ut postremæ duæ costæ notæ spæz amplius non cohererent; His perspectis, membranaque Tumoris abscessa, hunc repletum adparuisse ingenti carnis copia carcinomate affectæ, imbutæ & obductæ paucis pure ac sanguine in grumos concreto: Observasse præterea sex inferiores vertebrae Dorsi, & Lumborum primam, earie omnino corruptas, quasi terebinthe erosas, adeo ut ibi loci spæz omni careret soliditate & stabilitate: Imo ipsum Diaphragma pertusum ad parvisse ut duobus digitis conjunctis introitum concederet: Renis sinistri venam Emulgentem præterea disceptam se exhibuisse, Totum vero imum ventrem sanguine repletum, Quare judicium tulimus ægrum occidisse paulo ante obitum, ac tunc disrumpit spina, ac vi subito divulsis costis, quasi motu elastico, factam fuisse dilacerationem dictarum partium hinc sequentem hæmorrhagiam. Ceteras porro partes sine vitio occurrissse, exceptis Pulmonibus quorum flaccidi inventi lobi Tumori proximi. *Nic. de Blegni in recens Explor. Febr. an. 1681.*

## OBSERVATIO II.

*Hydrops thoracis dissectione post mortem cognitus.*

§. 1. **A** Nno 1645. 6. Martij corpus Susannæ Spitznagel, in Hospitali aperui, ubi hæc visu mira fuere inventa, Thoracis capacitas fere tota aqua repleta, Pulmones nimis flaccidi, Diaphragma summe uliginosum ac præ nimia lubricitate laxatum, reliquæ partes multa serosa humiditate udæ: Cor vero amplum & dilatatum, aqua turgidum, imprimis in sinistro ventriculo, ubi arteria aorta trium digitorum amplitudinem superavit, cujus frustulum in ambita continuum, prope exortum resectum, curiositatis ac rei fidei causa inter mea rariora reposui: Ventriculus fuit vacuus & prope Lienem putris, uti & Lien, reliquis in abdomine collavie serosa satis ubique infectis ac corruptis existentibus. *Mantissa observ. Plateri pag. 24.*

§. 2. Humor in thoracis cavitate communiter reperitur similis cruori aquæ permixto, quo thoracis partes obliuuntur ne nimium colescant & exsiccantur; aliquando adeo copiosus ut instar crumenæ magnæ diaphragmate depresso propendeat. *Blasius in Veslingii Anat. cap. 9.*

## OBSERVATIO III.

*In Calvis meninges à cranio semper distare deprehenduntur.*

**M**embranas à Calvaria in Calvis semper distare observavi. *Petrus de Marchettis Observat. tionum Med. Chirurg. v.*

**A** B hæc distantia an calvitiæ causa deducenda? Si ex *Galeno* cap. 1. lib. 1. de compos. medic. H. T. Calvities oritur ex defectu humorum alimentum capillis suppeditantium: Si pericranium, cui capitis subditum, (cui capilli insiguntur) futuris crani firmiter adhærescit, transmissis per eandem (ut per alia quædam ossium cranei foraminula) membranosis fibris, quibus daræ meningi continuatur, unde magnus inter membranam utramque consensus: Si ex naturæ lege dura meninx cranio undique adhærescit, in calvis autem meninges à calvaria semper distant, necesse est cranium superjacentem, huicque superposita tegumenta, minus esse irrigua, atque adeo inepta continendis capillis, pro inopia alimenti illos sustentantis foventis: Revera si calvorum contræctes capita, in plerisque adeo tenuia dicta tegumenta deprehendere est, ut non ex multiplicibus sed simplici contextu videantur, ipsique cranij futuræ & asperitates transparent, ariditatis & extenuationis manifesto indicia. Quid si Calvitiæ causam in pinguedinis cuti substatæ defunctum referas? Ut enim ab hujus vitio & colligatione Finæ causam ex autopsia deducit *Fr. Bayle problem. med. 87.* quidni ad ejus inopiam, unde cutis non sufficienter irrigetur, capillorum defectu referas? Sed iterum causæ distantie meningum à calvaria disquirenda: Fosse hæc à distantia substantiæ cerebri ab eisdem repetenda? Salaces *Quædam aquæ* sicciter incurrere notum est, A nimio Veneris usu substantiam cerebri immitti (*dura mater* vocat *Hippocr. 16. Epid. 43. 1. 1.*) plurimi tradunt hinc subidente cerebro diffidere membranas ab invicem necesse est, hinc exolescere cutim capitis capillorum fundamentum, & fomentum illis præbentem. Assertionis veritas confirmari videtur ex eo quod Eunuchis, juxta *Hippocr. non calvefcunt*, quia videlicet cerebrum ab abstinentia venereorum *lygogon* naturam coelervat, hinc irriguæ manent meninges, ab his pericranium & cutis capitis madescit, unde præ madocis copis infixi manent capilli.

## OBSERVATIO IV.

*Similitudo causa ex anatome deprehensa.*

**Q**uibus os à palato abscedit, his medius subhider Nasus: Quibus autem pars ex qua dentes prodeunt, extremus Nasus fit finis. *Hippocrates 6. Epid. sect. 1.* Quibus os ex palato &c. Quibus vero Dentes anteriores superne partis excidunt, si extremum Nasum habent latum *idem 3. Epidem.*

**Q**uibus os à palato &c.] Os hoc esse videtur quod Vesalius vocat sextum maxillæ superioris, quia collocatur ad finem palati, quia narium foramina in oris amplitudinem pertinent; Hic cum firmetur, ut quodam cemento, nares, si ob corruptionem id os delinquit ab alijs, & subdilat, media etiam nasi pars subdilat, ut fieri solet in morbo venereo, aut Elephantæ correptis; *Vallesius commun. in distillat. locum pag. m. 354.*

*Quibus vero Dentes anteriores*] Hi censentur habere extremum nasum latum, quia maxillæ lamina exterior, elevari ab infixis dentibus desinens subdilat, ac cum illa nasi extremum.

*Nasus fit sinus*] Si miraris naturalis causa esse potest vel in errore tormatricis, quæ eam partem, ut aliam quamcumque solet, vitiose efformare, vel in malo positi ossium maxillæ superioris quibus innititur, nimirum si ea ossa demissa ac profundiora

sint quam deceat demitti etiam ac subsidere necesse est nasum, & secundum eam partem præcipue quæ innititur officulo quod humiliter situm est, itaque si os quod ad medietatem pulsatur est introitum sit veluti detractum; Simitas erit secundum medium nasum, si postremum superioris maxillæ, ex quo dentes nascuntur, erit simitas secundum nasum extremum; nimirum hæc nasi partes his maxillæ ossibus innitantur; Simitas præter naturam fit ex eisdem causis præter naturam contingentibus; figura enim vitari potest à re aliqua contundente ut pugno, casu &c. Ossa etiam illa possunt p. n. a proximis ossibus decedere, quibus decedentibus nasus subdilat, fietque sinus p. n. Hoc modo solent qui Elephantæ morbo laborant, ab ossium aut eorum compaginum corruptione simi evadere usque ad magnam deformitatem. *Idem lib. 6. pag. 573.*

## OBSERVATIO V.

*Senes incurvi sunt & repandi, minusque dorsum movent ob vertebrarum coalitum, &c.*

**I**n puerulis observari malim, quod ipsis ossium noxæ crebrius quam ætate confirmatis oboriantur; cæterum in ætate paulo provectioribus hæc ossium frequentia obolerunt: appendices tamen etiam vigoris tempore aliquando non ita difficulter distinguuntur: In senibus autem non solum appendicum connexus obliteratur, verum vertebrarum corpora alijs magno intervallo ob cartilaginei ligamenti interventum diffusa, adeo coalescunt, ut modo tres modo quatuor vertebrae in illis ita concrevisse, ac simul in cæmeteriis effodi videas, ut invicem divelli nulla ratione valeant: Coalitus iste quorundam processuum fit interventu, quos corpus unius vertebrae ab externa ipsius superficie in aliud producit: Cæterum coalitum hunc in causa esse quod minus dorsum moveant Senes, & quod nequaquam dorsum extendant, ipsique magis incurvarur, neminem ambigere reor, præcipue si quis aliquando *Gibbosi* vertebrae inspexerit, hasque incurvaras, & suis corporibus pertinacissime unitas: Quamquam ad hæc difficilem in senibus motum angustum ossium superciliorum mira asperitas & ossium tubercula, quæ capita suis finibus moveri prohibent: Postremo & insignis ligamentorum durities prompte vertebrae moveri vetat. *Vesalius Fabr. C. hum. lib. 1. cap. 6.*

## OBSERVATIO VI.

*Tinea subiectum principale non cutis sed pinguedo illi subiecta.*

**I**n Tinea autem affici satis comprobant crustæ quæ illam deturpant, Non tamen inde constat solam affici cutim, aut eam esse præcipuum hujus morbi subiectum, quod accuratior observatione inquirendum esse censui, cum primum se obtulit occasio: Anno 1673. mense Decembri, juvenis annorum circiter xx. laborans ab aliquot annis Tinea, quæ partes anteriores & exteriores capitis, circa sururam sagittalem & coronalem fere ad pericranium eroserat, & per reliquum corpus variis in locis, maxime circa scapulas, crustas excitaverat, superveniente febre continua interit in Nosocomio Tolosano: Quia ab aliquot annis observaveram radices pilorum in pinguedine infixas esse, ita ut in capite eutem & panniculum carnosum penetrarent, & adeo erant pinguedini immerse, ut fere pericranium attingerent: cum deinde viderem in iis qui Tinea laborant, tandem pilos desuere, existimaveram hujus affectionis sedem præcipuam esse pinguedinem: quare placuit rem in istius juvenis cadavere explorare.

Cutis itaque & panniculo carnosio demptis è capite, pinguedo se exhibuit humidior & sero diffuens, ita ut in ejusmodi humorem liquata videretur: In reliquo etiam corporis habitu pinguedo fluidior apparuit, sed potissimum iis in locis ubi crustæ fuerant excitatae, sub quibus pinguedo instar feri liquidissimi distillabat: Aperto abdomine, omnia viscera & colore, & modo, & consistentia satis bene se habebant: Ex his infero pinguedinem esse præcipuum Tinea subiectum, & eutem tantum per consensum affici, propter viciniam. *Fr. Bayle Problem. med. 87.*

**O**mnia viscera è colore &c.] Unde collige (quod alibi adnotatum) sæpe malo topico laborare corporis habitum cui somnem non submittent viscera, perperam sæpe, quamvis innocua, Bonis Anatom. Tom. III.

remediis vexata, quamvis febris continua, juveni lethifer impressum labem illis relinquere debuisset plerumque manifestam in iis quos interficat.

*Flatuum cohibitionem sequuta insignis intestini coli distensio.*

**C**Obibendi flatus consuetudine non paucos dissectione animadvertimus quibus dilatatum Colon brachij amplitudinem adaequabat: Alios quibus ex imo ventre flatus toto astractu in ventriculum resiliens; Ductu emittebatur, & quibus pro crepitu ructus erat, Alios quoque aliis ex eansis hoc symptomate continenter affligi, ut his plures ructus quam verba essent: *Fern. ath. lib. 6. c. 10.*

## OBSERVATIO VIII.

*Acidulis vitriolatis diutius quidam usus cor, & ventriculum corrofa & exsiccata exhibuit.*

**Q**uidam mortuus ob diuturnum usum Acidularum vitriolarum, dissecto eadavere exhibuit cor & ventriculum corrofa & exsiccata. *P. le Givre Tra&. Gallico de Acidulis p. 65.*  
**E**nter. vir Clariss. eruditissimo dicto libello, quas morrem inferunt chalcantio plurimo consistere dicit, quod interiora corrodit: Item *Avicenna* tract. 5. de Removendis nocum. cap. 13. qui de Acidulis ait quod intestina & stomachum ulcerant, nauseam faciat atque hydropisim; de vitriolatis proculdubio pronuntians: Et *Franc. Guenault. med. Parisiensis* hic tract. de Hygienē cap. 20. de Aquis mineralibus, vitriolum cacotomachum esse ait, acre, erodens & vomitorioium.

Quando quidem Clarissimi Viri Ioh. Baptistae Fantoni Medici Taurinensis & Celsissimi Sabaudiae &c. Principis Archi. ac Bibliothecarii Observationes Anatomico-Medicæ satis citò ad manus nostras non devenerunt & proprio suo earum unaquæque loco inferi potuerit, quippe novissimè tantum è prælo elapsæ sunt, nec tamen volumus eas ab hoc exulare opere; commodum arbitrati sumus si tantillæ loco Miscellaneis nostris adderentur, doctissimis Scholiis à Celeberrimo Autoris Filio adjectis, stipatæ.

## JOANNES FANTONUS

## LECTORI S.

**V**T primum Pater meus è vivis excessit, efflagitarunt Amici, ut si quid studio Patris mei scriptis mandatum apud me esset typis divulgarem. Verum ob immaturam mortem, & assiduas curas, quæ dum viveret, oculi dulcedinem suam misis extorquebant, nihil perfecti, aut completi relinquere potuerat, sed quasdam tantum annotatiunculas in suis Adversariis, & incompasita diversa materia fragmentula, quæ tunc temporis seligere, concinnare, & in qualemcunque ordinem digerere mihi non licuit. tum ob tenerioris ætatis imperitiam, tum quia funebrium chartarum assidua inspectio consanguinei doloris speciem molestè nimis refricabat. Postea verò patientia temporis composito animo paternas cogitationes memoriis expressas excavando, fragmentula expoliendo, & additionibus illustrando operam navavi. Nunc igitur nostras Lucubratiunculas publici juris facere insitui diversis distinctas libellis. Tu itaque Lector primum hanc observationem seriem cum Scholiis meo studio aditis tinentem benevolo animo excipe.

## OBSERVATIO I.

*Aneurisma arteria magna paulo supra iliacas, & polypi infra locum aneurismatis reperti: sanguinis intra tunicas mesenterii, & circa renes extravasatio.*

**V**It habitus corporis carnosus laborabat frequentibus animis deliquijs, & vagis ventris doloribus, cum febre continua nullis accessibus distincta, pulsu ordinato, sed duro, insigni extenuatione, urinis crassis, paucis, & turbatis, & aliquali in partibus genitalibus dolore. Tandem ex oppressione, & lipothymia obiit.

Dissecto eadavere apparuit aneurisma arteriæ magnæ paulò supra iliacas, & infra locum aneurismatis aderant crassissimi polypi, qui sanguinis fluxum versus iliacas impediabant. Aderat etiam extravasatio sanguinis intra tunicas mesenterii, & enormis circa renes hæmorrhagia. Viscera omnia sanissima erant, arteriæ iliacæ protus inanitæ.

**R**eperiuntur frequentissimè polypi in ventriculis, & auriculis cordis, qui ramosas propagines in arterias, & venas emittunt. Inveni sæpius hæc productiones polyposas in cæcoridibus, venis jugularibus, vasis pæumoniceis, arteriæ magnæ, venæ cavæ, vasis cruralibus &c., sed non ita frequentè deprehenduntur in canalibus, polypi, qui continuitatem non habeant cum polypis cordis, ut nuper observatum est in nobilissimo filiolo epilepsiâ defuncto, in quo invenimus est polypus in

sinu falcis superiore. In nostro casu nulla sit polyporum cordis mentio, sed arteriæ magnæ paulò supra iliacas.

Pater autem crassissimos polypos ibi repertos obstaculum fuisse sanguini ad arterias iliacas fluenti, qui proinde cum ex impetu à corde accepto, rem copia, & gravitate vim fecit pro superando obstaculo, cujus tamen resistentia major fuit, quam vis contractilis arteriæ, quæ idcirco violenter distenta enormem passâ est dilatationem, absque eo quod

quod contrahi rursus posset, quemadmodum contingit in vesicâ urinâ nimis distentâ.

Impedimento sanguinis fluxu ad iliacas ratione obstaculi canalem arteriæ magnæ obstruuntis, non solum sequens est aneurisma in dicto canali propè obstaculum, sed sanguis, qui in iliacas fluere debebat, in arteriâ magnâ retentus, auxit copiam, & impetum liquidi nitentis in latera canalis; Et quemadmodum liquidum ob maiorem copiam & impetum potuit dilatare membra arteriæ magnæ efficere, potuit maiori jure abundantiâ, & validiori impetu ruere in emissariâ arteriarum ab arteriâ magnâ derivantium, quæ sunt suprà locum obstaculi: igitur fluxit per arterias celiacam, mesentericas, emulgentes, spermaticas &c.

major copia sanguinis, & majori impetu, quam fluere naturaliter debebat; hinc sequuta est enormis sanguinis extravasatio intrâ tunicas mesenterij, circâ renes &c. Ab hac causâ dependebat dolor ventris, & partium genitalium, qui iisdem principis faciliè demonstrari potest. Animi deliquium pendebat ex eo, quòd aliquando arteria magna sanguine omnino turgida incapax erat suscipiendo sanguini in quolibet systole à corde protrulso, qui per consequens in corde remanere coactus erat, & copia ejus aucta à superveniente in diastole sanguine animi defectum inducebat dependentem à suffocatione cordis, quo affectu extinctus est. Plura addere possem, à quibus ut brevior sum abstinere volo.

## OBSERVATIO II.

*Tumor sarcomatosus intrâ tunicas coli.*

Pler decem circiter annorum habitus corporis carnosus cepit ægrotare dolore ventris violento cum febris, & vehementi vomitu. Lenita prius alvo clysteribus; potentibus deinde remediis per os assumptis optimè expurgatus est. Observabamus infra sinistram hypochondrium versus epigastrium oblongam eminentiam cum aliquâ durtie, quæ videbatur zemulari prolapsum lienis. Pueri febris supervenit, & cum dolor continuus nullis adhibitis remediis remitti, neque tumor diminui potuerit, extinctus est.

Aperto cadavere omnia satis sana invenimus præter intestinum colon in latere sinistro, & sub ventriculo, longitudine palmarum valde durum, & tumidum, cujus tunica exterior purulenta humore infarcta, & fracula secedebat, & apparebat tumor carnosus, fibrosus, admodum densus, qui cavitatem coli coarctabat.

Observo quòd in partibus, quæ componuntur ex pluribus membranis non raro oritur quidam morbus illis partibus peculiaris, qui produciatur ex eo quòd membrana à se invicem secedant per intromissionem alicujus humoris, potissimum serosi, qui si fluidus sit per porositates membranarum sensim perfiltrare potest, vel radices venarum subire, aut repelli à vi fibrillarum contractionum membranas constituentium, vel etiam à compressione extrinsecis factâ. Quòd si materia membranarum inclusa crassa sit, ut ser gelatina, tunc membranis tenacius hærendo longiorem morbum facit; Et quæ quemadmodum aliquando contingit serum gelatinosum ex longiori inter membranas morâ maximam durtiem contrahere, & cum membranis unicam substantiam cartilagineam, aut callosam efficere, ut in scroto, vesicâ, liene &c. observari solet; illud etiam in canali intestinali non raro contingit; Et quia materia illa tenacissima sensim magis cumulat, & durefcit; idèò canalem angustando gravissima symptomata, & mortem ipsam infert. Interdum in ca-

nali intestinali materia tumorem faciens non est solum gelatinosum, sed videtur potius sanguis concretus sub specie molis carnez fibrosæ, quæ intrâ tunicas excrefcere solet absque eo quòd tunica ipsa excrefcant; quia hæc tumoris materia non est ita viscida & tenax, sicuti serum gelatinosum, quod excrefcere solet cum membranis in cartilagineam, aut callosam durtiem; unde hi tumores longiori tempore perdurant sine febre & dolore; sed tumores facti ex mole carnez & fibrosa minus duri sunt, & particule sanguinis in tumore depravate faciliè abripiuntur à sanguine circulante; eorumque vitio sanguis inficitur, atque febris excitatur; Et quia tunicarum consistentia parum mutatur, neque multum durefcit, aut saltem non evadit cartilaginea, vel callosa; idèò dolorificæ sensationis tunice capaces sunt. In hisce carnosis tumonibus interdum adeli corruptiva humiditas, quæ tunicas compingem laxando, illas reddit ad fraciditatem, & corruptionem dispositas.

## OBSERVATIO III.

*Cerebrum febricitans flavo humore tinctum: vasorum cerebri exsiccatio:*

*Aque oculorum humoris consumptio &c.*

Vix ætatis annorum quadraginta quinque, temperamenti atabilaris, acutissima febris laborabat cum intensissimo calore: sanissima mentis erat, & amissa cum sensuum diminutione loquella intra paucos dies expiravit.

Aperto crânio totum cerebrum flavo humore tinctum apparuit, cum vasis sanguineis in corticali substantia ferè exsiccatis, & plexu choroide penitus inanito. Iuxta nervorum conjugationes paucus humor stagnabat ibidem concretus, qui feri gelatina videbatur à calore febrili fortasse densata. In oculis consumptus erat humor aqueus, reliquique humores semi-corrupti.

Effectus humidi, qui persèpe observatur in temperamenti atabilaris causa esse so-

let plurium morborum frequenter lethalem ob gravissima damna quæ in œconomia animali ne-

cessatio contingunt ex privatione humiditatis. In primis enim deficiente liquido humido sanguis non diluitur, ut dilui oportet à debita quantitate feri; unde glutinosus evadit, crassius, grumulosus, & fluere liberè non potest per canales suos, nec impetum à corde communicarum servare; quia propter visciditatem, partes ejus sibi invicem adherent, ac veluti colligantur adinstar glutinis, & inserviunt sibi invicem ut rotidem obstacula impetum reprimant; quia nequeunt liberè alia super alias excurrere; adherent etiam canalibus suis, illos angustant, obstruunt, & motum circulationis impediunt. Reliqui humores eadem patiuntur damna: bilis crassior evadit, & secerne difficile potest, & secerne fluere: lymphæ concreverunt, quia deficit basis ejus, quæ liquidum humidum est. Idem de cæteris humoribus dicendum. Arescunt, & coarctantur canales omnes, qui in blandâ humectatione servari debent, ut conveniens præbeant spatium fluenti liquido, & distrahi opportunè valeant, & contrahi; quod fieri non potest exsiccatò canali. Exsiccantur etiam membranae, ac veluti crispantur, quocumque earum pori & fibrillarum interstitia non irrigantur liquore humido, qui illas extensiles facit, emollit, & levigat. Indurantur etiam reliquæ corporis partes nisi humectentur: fibræ constringuntur, porositates obturantur &c. unde frigidior motus, vegetatio, & functiones reliquæ peragi nequeant, & corpus marasmo afficitur; ac tandem mors subsequitur remanente corpore instar trunci emortui, aut melius instar geninæ mumie.

Quum igitur in temperamento atrabiliari san-

guis paucò serò relictus accenditur: particulae rubrae sanguinis motu febrili agitantur, deficiente intromissione liquidi humiditatis inter se contrahuntur, & confricant vasa, & partes omnes, quas sanguis abluat; unde particulae abraduntur, & & dividuntur in minima, & crassis sanguinis ex illâ violentia abrasione, & divisione perveniunt eademque de causa calor suscitatur intensissimus, qui ob carentiam liquidi humiditatis facillè extricatur, & extricatus mitigari non potest, & ipse calor dividit moleculas sanguinis, & alterat, & evaporationem superfluitis humiditatis promovet; & post violentam effervesceniam accidunt ea omnia quæ dicta sunt de multiplici alteratione sanguinis, & humorum omnium, & canalium, & membranarum, & totius corporis: observando quòd ea, quæ in genere asserimus, in casu specifico proportionaliter intelligantur, quemadmodum proportionaliter intellecta applicari debent casui nostro: unde ex his principiis facillè explicari possunt præcipua phænomena. Quoniam enim bilis in nostro ægrotante redundans, & naturalis crassior supponitur, minor ejus quantitas secerbitur in convenientibus emundatoriis; & major quantitas sanguini permixta remanet, inordinatè afficiendo partes corporis, quibus facillè adherere potest propter visciditatem ex defectu humiditatis, quò solet dilui, vel suis spiculis in porositatibus, quas facillè penetrare potest, irretiri; hinc ratio flavedinis cerebri in casu memorato petenda est. Patet etiam ex his quæ dicta sunt causa exsiccationis vasorum, concretionis feri, humoris oculorum acri consumptionis &c.

#### OBSERVATIO IV.

*Inflammatio pulmonis, hepatis, & intestinorum: Aqua pericardii purulenta, & superficies cordis alterata.*

**V**ir robustus trigessimum quintum annum agens, habitus corporis carnosius acuta febre detinebatur eam maximâ spirandi difficultate, levi tussi, & paucâ excreatione, ac ferè suppressa, dolore laterali, difficili supra dorsum decubitu, pulsu parvo & celeri, sed tamen æquali. In principio non exsistit.

Dissecto cadavere vidimus intestina omnia phlogosi affecta; hepatis tumidum, & in parte cava inflammatum; pulmonem costis undique adhaerentem, valde inflammatum, sanguine & pure turgidum; lympham pericardii copiosissimam, & purulentam, quæ superficiem cordis alteraverat; denique in cordis ventriculis concreciones polyposas.

**Q**uoniam in hoc febricitante aderat fervor, & lentior sanguis; idcirco partes facillè poterant affici obstructione & inflammatione; sed quemadmodum major est periculum obstructionis &c. inflammationis in partibus quæ recipiant majorem copiam sanguinis; idcirco pulmones & hepatis obstructione & inflammatione affecta sunt. Intestina etiam maximis sanguineorum vasorum numeris insignita, adeo ut vix possint intestinis aciem insigere, quin perforos aliquod vas; unde etiam facillè inflammationem patiuntur; sed est alia ratio mechanica, ob quam dato hepatis tumore, & inflammatione, facillè sequitur inflamma-

tio intestinorum; Quoniam enim dato hepate tumido & inflammato sanguis venæ portæ non potest liberè & naturali velocitate in hepatis diffundi, & in cavam effluere; idcirco in vena portæ sanguis lentescere debet; Et quia venæ intestinales, & mesentericæ sunt ptopagines venæ portæ; idcirco etiam in his venis lentè fluit sanguis, & in intestinis aliqualem motum faciet; sed ab arteriis mesentericis continuo, & velociter fertur sanguis ad intestina; igitur in intestinis congeritur copia sanguinis ibidem motum facientis, quæ cum supponatur igneus inflammationem producere aptus est.

#### OBSERVATIO V.

*Moles hepatis maxima: Ventrículas in regione umbilicali: Cor insolite magnitudinis &c.*

**I**llustrissima Domina temperamenti biliosi, valetudinaria, post varios morbos, diversaque symptomata, nempe febrem, difficultatem spirandi, impossibilem supra dorsum, & diffi-

difficilem suprà latus sinistrum decubitus, enormem flammam emissionem; tandem ex hydropce obiit, cum ventre tumido, cedematefis cruribus, pedibus, & dorso. Notandum etiam aliam symptomata, de quo *Agra* conquirebatur, nimirum, quod videretur illi lingua ligari, & ad latus retrahi.

In dissecto cadavere vidimus hepar naturalem magnitudinem plurimum excedere: bilem in cystide non invenimus: Ventriculus infra hepar depressus erat, & situs in regione umbilicali: pancreas pene scirrhosum: omentum semi consumptum, ac suprà retractum. Pars sinistra thoracis repleta erat sero, & io ea parte pulmo lienis colorem & consistentiam referebat: dextera pars nihil feri continebat, pulmo ibi turgidus erat sero & ichore imbutus: Infoliz cor magnitudinis dextram thoracis partem cum pulmone penitus occupabat: exiguum dexter ventriculus habebat polypum.

**O**bservo primò quòd quando moles hepatis est insigniter aucta, ventriculus est in situ decliviori, quam naturaliter esse debet; quia hepar mole & pondere suo ventriculum deprimit, quod communissimum est, & oon observatum; & cā decursa esophagus à ventriculo depresso nimis trahitur, & cum tenuitate elongatur; Hinc est quòd *Agra* coquebant de linguz retractione ad intus,

Observo secundò in hydropicis vesiculam bilis vel

vacuam omoin) esse, vel flaccidam cum pauca bile viscida & gloriofa. Hujus ratio phænomena à vitio hepatis obstructi peti quidem potest, sed melius deducitur à vitio sanguinis, qui in hydropicis serosus est, minimè vegetus & per consequens ad generationem bilis inhabilis, ad quam requiritur sanguis vividus & fermentativus; & idè monet Galenus in *Arte parva* quòd hepar calidum maximam gignit bilis copiam.

## OBSERVATIO VI.

*Cranium crassissimum cum suturis vix apparentibus: medulla oblongata bilio sero tincta &c.*

**R**eligiosa ætatis viginti septem annorum, valetudinaria, & debilis constitutionis à rara corporis textura, & sanguine tenui bilioso serositate referto cepit leviter febricitare, sed cum maxima vomendi violentia, vomebatque multam bilem, quam etiam sinceram, modico tantum sero dilutam deiciebat speciatim à sumptione purgantis. Tandem incidit in convulsiones epilepticas, quarum importunis accessionibus triduo correpta, tertia diò obiit.

Cerebrum in cadavere inspecturi crassissimum cranium offendimus, & suturis vix apparentibus tam strictè connexum, ut illis prorsus catere videretur. Vasa suprà ceteri anfractus dispersa admodum turgida erant sanguine: substantia cerebri ad sensum naturalissima apparuit, nihilque notabile deteximus, nisi quod medulla oblongata tincta erat serositate biliosa. Ventriculi sero destituti apparuerunt: Vasa plexus choroidis inania, tum etiam ductus falcis superior: montes aridissimi.

In epilepticis insultibus hujus patientis quædam peculiariter notavi. 1. profundam somnolentiam à qua tamen ex afflictu partium vesicatorum experscebat querula oculis prominentibus, capite, manibus, & toto interdum corpore irrequietis; sed cessantibus stimulis ad soporem revertebatur. 2. videbatur in insultibus lucida habere intervalla in quibus nutriebatur, & pia verba proferebat & assistentes cognoscebat, 3. insultus erant frequentissimi, convulsiones horridæ, capite posterius in spinam tracto, manibus, femoribusque contractis, ore spumoso &c.

**C**rasstem crani in multis observavi, qui oequè epileptico, neque ullo alio cerebri affectu laborarent: est tamen considerabilis in illis qui similibus affectibus dixerantur fortasse ob rationes, quæ communiter à Medicis afferuntur; & potissimum in hoc casu notabilis est in quo adest etiam strictissima osium crani connexio per suturas vix apparentes, quod juvenili ætate contingere non solet, etiam ætate provectis familiare sit apparentibus tantum suturarum vestigiis, quæ interdum etiam dignosci vix possunt.

Turgescientiam vasorum in aliqua parte corporis denotat lentescientiam sanguinis in illa parte, in qua est turgescientia vasorum: & vice versâ lentescientia sanguinis in aliqua parte corporis importat turgescientiam vasorum in illa parte, in qua adest lentescientia sanguinis. Quandoquidem si sanguis fluere per universum corpus æquali velocitate proportionaliter, omnia vasa corporis essent crassa proportionaliter æquè turgida; sed jam supponitur

solum turgescientia vasorum in aliqua parte corporis; igitur sanguis io dicta parte fuit dispari velocitate; sed dici non potest, quod ibi fuit majori velocitate, quia abiretetur sanguis, qui efficit turgescientiam; igitur diceodum est, quòd fuit velocitate minori; & per consequens turgescientia vasorum io dicta parte, denotat velocitatem sanguinis in illa naturali minorem, idest lentescientiam, ita videlicet quia propter lentescientiam sanguinis in aliqua parte corporis, minor ejus quantitas à venis refluxit versus cor, quam à corde traditur in arterias igitur in illa parte in qua sanguis lentescit accumulatur copia sanguinis naturali major, quæ efficit turgescientiam vasorum. Quoniam igitur suprà cerebri corticem major est in valis sanguinis quantitas, quam naturaliter esse deberet, & corticem cerebri comprimere à superincumbente in valis liquido necesse est; igitur comprimeretur magis à superincumbente liquido cortex cerebri, quam liquidus major est quantitas, quam quum minor est; & quemadmodum



liquido naturali velocitate fluente diminuitur gravitas ejus supra corticem cerebri propter directionem motus ejusdem per longitudinem canalis; ita lentefcente liquido sogetur gravitas ejus supra corticem cerebri, quia diminuitur momentum velocitatis ejusdem per longitudinem canalis. Quare cum ratione lentefcentiae, tum majoris quantitatis sanguinis in vasis plurimum augeatur gravitas ejus supra corticem cerebri, quae fortasse occasio esse potuit profundae somnolentiae in casu exposito, & in simili-

bus.

Medulla oblongata sero bilioso tincta potuit etiam à spiculis liquoris biliosi irritari, & ex fibrillarum ejus irritatione spiritus violenter commoveri; unde convulsionis ratio petenda est; quemadmodum enim idem serum biliosum ventriculi fibras irritando violentos vomitus excitavit, pari ratione medulla oblongata fibrillas moleste vellicando convulsivam inferre facile potuit.

## OBSERVATIO VII.

*Pulmo inflammatus: cor magnum, variegatum, & durissimum.*

Miles ex gravi morbo convalescens in acutum incidit febrem cum respiratione difficili, tussis sicca, & dolore fixo circa medium sternum. Pulsus erat frequentissimus, calor intensissimus, & sitis inextinguibilis. De cordis phlogosi aliquam suspicionem habuimus; opportunitate remedia tentavimus, quibus non obstantibus Miles brevi extinctus est.

In dissectione cadaveris invenimus hepar valde obstructum, ac tumidum: paucum in abdomine serum: omentum semi consumptum: dextrum pulmonem valde inflammatum, cujus portio superior densa, dura, ac veluti scirrhusa erat, inferior adhuc spongiosa, & respectivè mollis. Cor mole maximum erat plurimis albicantibus maculis variegatum: substantia ejus durissima, ac fere scirrhusa, coloris atrii, cum vasis coronariis turgidissimis. In dextro ventriculo duos invenimus polypos, quorum maximus in venam cavam, minor in arteriam pulmonalem ramosas productiones emittebat. In sinistro ventriculo nullus aderat polypus praeter sanguinem grumosum omni sero destitutum, quemadmodum reliquus sanguis apparuit.

Quod ex febre acuta post gravem morbum superveniente majus imminet periculum, quam non praesens gravi morbo evidentissimum est; sed non ita facile videtur invenire rationes mechanicas, quibus demonstrari possit unde hoc grave periculum depeodat: Illae etenim periri debeor tum à constitutione sanguinis post morbum, tum à solida tum partium conditioe, in quibus peculiaris quaedam notanda sunt tempore quo aliquis ex gravi morbo convalescit; ex quibus supervenientis morbi periculum eruitur; sed illa hic recensere nimis longum esset.

Respiratio difficilis videtur in hoc casu dependere ab obstructione, vel compressione canalium aereorum: obstructio autem tam repentina esse non potest, quia in corpore actu febricitante materia obstruens debet esse quantitas notabilis liquidi in canalibus aereis, & vesiculis deplentis; quod tamen in hoc casu esse non potest; quia tussis est sicca, quae supponit solum molestem vellicationem factam in interiori tunica bronchiorum & asperae arteriae, quae acutissimi sensus est; ab exigua quantitate humoris acrimonia peccantis, quae impossibile est, ut possit canales aëreos obstruere. Dependet igitur compressio, quae videtur faciliè explicari posse supponendo quod pulmo turgear, ut de facto torget sanguine ebullitione, & rarefactio: ex qua turgescencia necessario sequitur canales aëreos & vesiculas undequaque premat, & coarctat, unde liquidum aëreum non habet vim sufficiens canales, & vesiculas distrahendi quantum opus est, ob resistenciam sanguinis undequaque premantis dictos canales, & vesiculas.

Dolor fixus circa medium sternum, quando extenuatus est, probabiliter judicari potest, quod in corde, vel in pericardio sit. Fieri enim potest, ut pericardium ab humore acri moleste vellicetur, vel dari accensione sanguinis phlogosi afficiatur; quemadmo-

dum reliquas partes corporis similiter affici persèpe observamus. Praeterea sunt aliquando emacerationes in pericardio, interdum etiam abscessus: ex quibus constat causam doloris in pericardio multiplicem esse posse. Cor autem phlogosi affici tanquam causa pulsionis dolorificae indicare videbatur pulsus frequentissimus, qui deoortabat cor importune irritari ad frequentem contractionem propter aërem sanguinis, qui non solum in ventriculis, sed etiam in ejus substantia villos praeter modum calefaciendo, ac veluti utendo, maximum in filis rarefactionem liquidi nervosi excitabat; unde cor semper dispositum erat ad contractionem; & eo momento, quo sanguinem recipiebat, illum conabatur expellere.

Cordis substantia naturaliter dura est ex fibris tenaciter complicatis, ac circumvolutis compacta; unde fieri nequit tam notabilis, ut in aliis partibus, effusio sanguinis in substantia cordis, quia fibrarum interstitia artissima sunt. Praeterea sanguis qui spargitur per substantiam cordis ab arteriis coronariis, in systole urgetur in venas ob turgescenciam villorum cordis, ut patet per consequens exigua tantum sanguinis portio naturaliter remanet in interstitiis, & porositatibus; Quod si sanguis febriliter ebulliens, & io interstitiis, & porositatibus cordis effusus quicumque de causa, quae multiplex esse potest, non possit in venas, vel à venis in cordis ventriculum liberè effluere; ideoque moram in interstitiis & venis faciat, quia sanguis supponitur accensus, calefaciet cordis villos praeter naturaliter, eosque veluti urit, & phlogosim inducet, & turgescunt vasa cordis, & cor indurbitur tum ob excitationem villorum, tum ob sanguinem in interstitiis fibrarum, & porositatibus stagnantem.

## OBSERVATIO VIII.

*pancreas durissimum, cum liquore lymphatico in canali virsungiano: capsula atrabiliaris maxime, & alterata: cor magnum, & planum &c.*

**S**acerdos ætatis consistentis terra scabie laborabat cum pruritu molestissimo, & sibi inextinguibili; exterum bene se habebat. Præter expectationem nocte quadam ex improvviso mortuus est.

In dissecto cadavere vidimus pancreas obstructum, ac durissimum cum canali virsungiano lymphatico humore repleto: capsulas atrabiliaris notabilis magnitudinis, interius alteratas, & friabiles. In dextra thoracis parte pulmo valde alteratus arctissime adhe-rebat pleuræ. Cor subrotundum non erat, sed valde depressum & planum, & insignis magnitudinis: auricula dextra varicosa cordis ventriculo æqualis.

Auriculæ sinistræ, & ventriculis nihil lnerat sanguinis; aderam vero concretiones polyposæ, quæ in quatuor magna vasa producebantur.

**P**uritus molestissimus, & sitis inextinguibilis in corpore terræ scabie laborante indicat defectum humoris aquei, & exuberantiam, & summam acridinem salinam; unde pater utilitas, immo necessitas existentie liquidæ aquei in corpore animalis, quod præter alios præclaros usus abstergendis salibus, atque eliminandis per sudores, urinas &c. infervit; nemini ætatem ignotum est, quàm facile salia confociantur cum aqueis. Deficiente verò humido detinentur salia in corpore arescente, & sanguinem acridine inficiunt, & amissâ convenienti fluiditate in solidis partibus fixantur, quas interdum enormiter deturpant morbos producendo nunc magis, nunc minus graves pro quantitate, & acrimonia illorum majori, vel minori, & prout pars affecta magis, vel minus ratione peculiaris usus, & texture considerabilis est.

Mors improvisa polyphis in corde reperitis, qui producebantur in quatuor magna vasa rationabiliter tribui potest; adeo ut obstructis majoribus va-

sis circulariis sanguinis fuerit intercepta.

Quia sanguis destitutus quantitate congrua humoris aquei, gignitur lymphæ, cujus basis est humor apueus, minus diluta, minus fluida, quàm in statu naturali esse solet, in canalibus suis lentescere debebat, & hac de causa ductus virsungianus lymphæ pancreaticæ rurgidus adparuit. Quare autem obstructio, ac purissimum, existente pancreate ductus, & canaliculi excretorii non fuerint adeo compressi, ut conspici vix esse poterint potius, quàm lymphâ turgescere esse videtur, quia liquor viscidus in ductu, & canaliculis impedimento erat concidentie ductus, & canaliculorum contra vim compressionis corporis glandulosi obstructi, & ducti. Præterea adverte, quod pancreas est corpus compositum ex acinis glandulosis molis valde notabilis, qui facile digitis disungi possunt; Et quia spatia acinis interjecta satis ampla sunt; ideo canaliculi excretorii minus comprimuntur.

## OBSERVATIO IX.

*Inflammati meningum, & cerebelli corruptio.*

**A**dolescens ab ingenti trabe ab alto cadente in capite percussus fuit cum fractura & depressione ossis parietalis. Ablatis squamis & vulnere methodice curato versus diem septimum ingens fere totius corporis, potissimum verò capitis, & pectoris erysipelas supervenit. Die undecimo obiit. Notandum quod nunquam febricitavit, neque deliravit nisi paucis horis ante obitum.

Refecto post mortem cranio inflammata apparere meninges, & cerebellum corruptum.

**R**arissimum sane est, quod inflammantur meningæ, absque eo quod exciteretur in sanguine motus febrilis, qui fere semper inflammationum comes est, potissimum verò inflammationis membranarum cerebri, quæ non solum febrem, sed etiam delirium, & phrenitidem sapissimè comites habet; Quia verò sanguinis crasis in corpore bene constituto difficillè alteratur, nisi accedat aliquis potentissimus stimulus qui sanguinem neque in qualitate nec quantitate, nec motu peccantem, possit vitiosum in aliquo, vel pluribus ex his efficere, ideo si sed potest, quod particule sanguinalis in parte inflammata depravare, & reticulantes cum sanguine, & motus turbatus sanguinis in par-

te inflammata & spiritus propter dolorem, & concussionem cerebri etiam per consensum affecti, non potuerint vim sufficientem habere ad excitandam sanguinis effervescentiam, nisi ultimis vite horis, quo tempore inflammatio jam plurimum aucta & cerebelli corruptio febrem cum delirio produxerit.

Circâ corruptionem cerebelli plura dicere possem, quæ sagis omittere iudico; quia in explicandis phenomenonis morborum capitis, speciatim illis qui rard contingunt, & cum symptomatibus non correspondentibus morbo, fiteor ex infinitis penetrationibus, quæ ab Authoribus adducuntur, & ex illis, quæ mihi passim in mentem veniunt, nullam mihi attidere.

## OBSERVATIO XI.

*Tumor fibrosus intra tunicas cæci & coli &c.*

**V**ix ætatis annorum sexaginta circiter, temperamenti atrabilis, valetudinarius doloribus ventris sæpe obnoxius conquerebatur de dolore fixo circa regionem iliacam dextræ lateris; febris non aderat, sed facile, & frequenter vomebat; vomitus autem non erat vehemens. Post irerata enemata, & oleum amigdalorum dulcium remissus fuit dolor; sed mox sævitra sumpto pharmaco ex cathar. passal. & diaphen., ex quo nihil fere deiecit, neque ulla ex repetitis purgantibus evacuatio nisi per vomitum sequuta est; frustra etiam imposita fuere enemata; namque deieciebat talia, qualia imponebantur, nec feliciori eventu iteratum fuit oleum amigdalorum, ex quo nullum doloris levamen obtinuit; Hinc leviter febricitare cepit, & missio sanguinis instituta fuit; à missione languidis non febricitavit amplius; nihilominus dolor exacerbatus est, & languinus Ager sensum defecit cum vomitu, extremis frigidis, pulsu formicanti, mente constanterissima, ventre instar ascleitici tumidissimo & duro, prout inileo sæpissimè observavi.

Dissectio canavere vidimus intestinum cæcum maximè magnitudinis, & gangrena affectum, sicuti etiam principium coli. Intra tunicas cæci & coli concreverat caro veluti musculosa fibris distincta, quæ illorum crassiciem plurimum auxerat. Hæc caro mollis in cæco, & coli initio luxurians sua corruptione gangrenam intestinale induxerat. Colon non apparuit in cellulas distinctum; unde fortasse à relaxatione ligamenti explicatum fuerat. Reliqua intestina livida erant.

**P**luribus modis canalis intestinalis angustari potest, vel omnino occludi: in primis à materiâ aliquâ, quæ multiplex esse potest canalem obstruente: vel à tumore ipsius canalis; potissimum verò ab humoribus intra tunicas excrecentiam producentibus, & crassiciem ejus plurimum augentibus; vel etiam à compressione, aut strangulatione ejusdem, quæ frequenter contingit à quacumque causâ angustia, vel omnimoda occlusio canalis procedat manifestum est alimenta per vomitum rejici debet; idè quæ chylicationem, & nutritionem lædiginappetentiam, & dolores ventris contingere, & alia plura; ac tandem mortem ipsam subsequi, si motus perleveret. Supposito enim evidentissimo illo principio, quod ex contractione canalis cylindrici directio motus liquidæ fiat æqualiter ad utrumque extremum canalis, si utrumque pervium sit nullo existente obstaculo vel ad unum tantum, si alterum impervium sit; vel aliquod ad sit obstaculum; patet quod in statu naturali pervio existente utroque canalis intestinalis extremo ad utrumque æqualiter protruderetur materia alimentorum, (quæ plus minus diutè liquidationem habet) & tùm per vomitum tùm per feces rejiceretur, nisi occurreret aliquod obstaculum in

parte superiori canalis à naturali contractione ejus non superabile, per quod directio motus materie alimentorum fiat versùs inferiorem partem canalis, in qua etiam si reperitur etiam aliquod obstaculum aliis de causis necessarium, sufficit tamen, quod minimum sit respectu obstaculi partis superioris canalis, & quod facillè superetur à naturali contractione canalis. Jam supponamus dari angustiam præternaturalem canalis intestinalis in aliqua ejus parte, occurrat igitur in illa parte maximum obstaculum, cujus resistentia major est naturæ resistentiæ obstaculi superioris; Quare directio motus liquidæ erit magis versùs superius extremum canalis; ubi respectivè tunc minor est resistentia à contractione canalis naturali majore superabilis, minus verò versùs angustiam, & inferius extremum canalis, ubi resistentia major supponitur. Si verò ad sit omnimoda occlusio canalis patet omnem directionem fieri versùs extremum superius; idè quæ fieri fluxum & refluxum cibi à pharynge versùs occlusionem intestini &c. Ex his patet quomodo vomitus explicandus sit in hoc casu, & quomodo lædatur chylicatio, & corporis sustentatio contingat, & animalis æconomia perturbetur, & mors subsequi debeat.

## OBSERVATIO XII.

*Hepatis & diaphragmatis inflammatio: cutis, cerebrum, & intestina bile rincla: Lien monstrosus: cerebri fraciditas.*

**E**mpiricus quidam lacertosi corporis, alique staturæ, ac tanti roboris ut sine capillis alligato exuberantis ponderis saxum elevaret, cepit febricitare cum levi subdelirio. Medicus vocatus statim proposuisti illi vitrum antimonii, ex quo enormis sequuta fuit evacuatio tam per vomitum, quam per feces; post aliquot dies phreneticus evasit tanto accensus furore, ut media nocte è lecto surgens validissimam januam ferratam brachionum vi frangeret, & fugam è domo sibi procuraret. Obijt phreneticus.

Dissectio eadavere vidimus hepar phlogosi affectum, & diaphragma pariter inflammatum in canro nerveo, hinc delirabat ut plurimum eum riu, varias efformans ob consensum nervorum deformes oris, & genarum torturas. Intestina omnia bile rincla erant: cutis etiam, potissimum faciei icterica. Lien apparuit monstrosus, rotundus scilicet, membrana inclusus durissima, & crassissima, & ea parte, quæ respicit costas nostras cartilaginea, ac fere ossa.

Sinistri

Sinistri pulmonis extremas inflammata erat ex contactu diaphragmatis; unde in ea parte zgerans acutissimum perferentem dolorem cum tussi molestissima, & sicca.

In cerebro vasorum plenitudinem, & turgescentiam observavimus; substantiam cerebri bilem, flaccidam, & ad corruptionem dispositam.

**V**is potentissima plerumque inest delirantibus cum furore, quia in illis sanguis plurimum effervescit, & particulae constitutae sanguinis dividuntur & attenuantur; & per consequens copiose elaborantur spiritus corporis, quae ignae sunt, & volatiles, & in cerebro, nervis, ceterisque partibus, quae ab illis irradiantur, multas, & validissimas motus excitant. Et quia bilis in hisce casibus copiosissima sanguini incit,

ideo facile partes afficere potest, illisque flavedinem conciliare.

Lienis membranam, & substantiam ipsam aliquando induratum inveni in aliqua ejus parte; sepius etiam aliae membranae, & canales, potissimum vero ligamenta, & cartilaginee indurescent; quod aetate provecitae familiare est. Vidi neperitima arteria coronaria naturali multo majorem & durissimam, veluti ossam;

## OBSERVATIO XII.

*Hydrides in superficie cordis: vesicula bilis maxime magnitudinis, & meatus cystici obstructio &c.*

**V**it aetatis annorum quadraginta circiter a quatuor mensibus laborabat febris tertiana duplici continua per subintrantiam patoxyfomorum; post iteratas purgationes febris mutata est in tertianam simplicem; mox universaliter cedematosis evasit; inde febris tertiana in quartanam desinit. Tumor evanuit, & importuna tussis agrotanti supervenit, qui valde emaciatus evadebat. Tandem debilem Aegrum motus convulsivi ex improvviso corripuerunt; unde in extremis frigidus brevi expiravit.

Aperto cadavere mediocrem feri copiam in Abdomine, & Thorace invenimus, nihilque morbo in capite observavimus praeter inanitionem vasorum sanguineorum. Vidimus in superficie cordis hydrides conerescibile sero turgidas; substantiam pulmonum densam, & duram instar substantiae hepatis, & phlogosi affectam. Vesicula bilis ingentis erat magnitudinis; nam intra ejus tunicas ferum conerescibile instar gelatinae compactum aderat; unde tunicarum crassities digitum aequabat. In meatu cystico, quem callosum invenimus adeo conereverat serum illud, ut bilis transiret omnino intercuderet.

**A**pparet frequenter hydrides in superficie hepatis, lienis, cordis, aliarumque partium, quae ab aliquibus habentur pro varicibus vasorum lymphaticorum; Observantur tamen aliquando in quibusdam partibus adeo copiose, ut omnes vasorum lymphaticorum varices esse difficile crediderim. Quamvis igitur fieri possit dilatio vasul lymphaticae in aliqua ejus parte, quemadmodum contingit in vasculis sanguineis, non tamen hydridis nomen illi tribuendum est, sed varici. Formatio autem hydridis ita explicari verisimiliter posse videtur. Cogita enim membranas corporis constare ex villis contractilibus extensiles esse, seu distendi posse a quocumque vi resistentiam naturalis eorum extensionis superante: Observa etiam quod membrana partem aliquam investiens illi tam recte non adheret; quin aliquis ejus portio possit a subiecta parte quoquo pacto elevari sine laceratione, quia supponitur extensibilis. Jam facile concipere potes formationem hydridis, quae nihil aliud est, quam portuncululae membranae partem aliquam investientis elevata, & distracta adinstar vesiculae, causa elevationis, & distractionis membranae est liquidum serosum propria fluiditate, gravitate, & motu a sanguine, a cordo, & villis contractilibus aliarum partium communicato vim faciens in portunculula membranae, in quam incidit, & cum naturalis tensionis & cohaesionis, resistentiam multiplici momento vincit; unde cogitur elevari & distrahi adinstar vesiculae, quae eodem humore seroso inflatur, & inflata permanet, donec a vi humoris flu-

xa vesicula distrumpatur ob impotentiam majorem dilatationis, vel diminuat vi liquidi vitantis in vesiculam, villi ejus contrahantur & sibi procurent suam restitutionem per repulsionem liquidi &c. Potest etiam liquidum per porositates vesiculae dilatatas perspirare.

Substantia pulmonum naturaliter levissima est, & rarissime textur; quia nihil aliud est, quam membranae, & canalium coegeticae. Si etenim a pulmone demas membranam continentem, canales aereos cum vesiculis, interiores membranas, arterias, venas, nervos, & vasa lymphatica nihil aliud superest substantiae pulmonis; nisi peripateticus sit, & a omnia quae memoravimus accidentia substantiae pulmonis vocare velis. Est igitur substantia pulmonis humorum facile suscepiibilis adinstar spongiae propter vesiculas, & canales innumerabiles, quae fluido aereo destinata sunt; & multis de causis repleti possunt humoribus in corpore fluentibus: Quod si contingat, evidens est pulmonem densum fieri, & dum nunc magis, nunc minus prout humor spacia implet plus vel minus crassas est.

Eandem cystidis crassitiem aliquando observavi ob serum glutinosum ejus tunicis interceptum; Et meminime in aliquibus hydropicis illam crassitiem reperiisse; unde non male cystidis hydrops vocaretur. In his casibus fere semper natavi meatum cysticum non solum obstructum a glutinositate feri, sed etiam coacturatum a crassitie tunicae.

*Hepar steatomatosum, & muscutorum Abdominis supra corpus hepatis extenuatio.*

**Q**uidam Gallus à pluribus mensibus febre lenta detinebatur, & à laudabili constitutione in habitum corporis semi cachecticum degenerabat. Siccitissimus erat, & vomebat sæpius. Tactu observabamus ingentem in regione hepatis tumorem: occupabat enim totum epigastrium, & levissimo tactu durities veluti superficialis dignoscebatur; adeo ut tumorem externum tanquam in musculis latentem mentiretur. Frustranea fuerunt quæcumque tentavimus remedia; unde Ager præ longitudine morbi obiit.

Cadaveris aggressi fuimus dissectionem, & observavimus miram muscutorum abdominis supra corpus hepatis extenuationem; Ablatis etenim communibus integumentis vix apparebant vestigia fibrarum muscutorum, quæ penitus exsiccatae erant tanquam peculiari marasmo affectæ. Secto hepate apparuit steatomatosa illius substantia, albicans scilicet, & plusquam naturaliter compacta & dura. Aderat mediocris quantitas bilis flavo sanguineæ in vesicula.

**Q**uoniam hepar tumidum erat, & à ligamentis non relaxatis in proprio situ detinebatur, debebat majus spatium occupare, & per consequens quæcumque partes contiguas comprimendo. Contiguæ partes, quæ à situ proprio possunt quoquo pacto dimoveri, aliquantulum declinando compressionem minus patiuntur. Partes verò, quæ à contiguitate tumidi hepatis nullo modo recedere possunt, manifestum est majorem compressionem pati. Musculi autem abdominis tumido hepati semper contigui sunt intermedio solum peritoneo; igitur ab hepate tumente plurimum illos comprimere necesse est; Et quia hepar non supponitur solum tumidum, sed etiam durum; igitur hoc etiam de nomine compressio major esse de-

bet. Ex duritia autem compressione facta à corpore duro supra corpus molle compositum ex fibris, canalibus, humoribus fluentibus &c. sequuntur fibras corporis compressi distendi, & constringi, & tonum amittere, canales angustari, & humorum fluxum impediri; unde oritur partis compressæ exsiccatio, extenuatio, marasmus.

Tumidum, ac durum evaserat hepar à materia crassa in ipso congesta, quæ porositates ejus, & canales obstruxerat, atque in illis induruerat; unde læsa texture ejus organici viscus erat inutile, quia impotens secretenda debite quantitati sincere bilis, & nosum ob incommoda, quorum multis de causis occasio fuit.

## OBSERVATIO XIV.

*Tumor cartilagineus in pyloro & superiore parte duodeni.*

**R**usticus ætatis consistentis jam ab aliquot mensibus inappetentia, vomitu, & languore vexabatur sine febris; vomebat serosa in maxima quantitate; pulsus erat æqualis, sed parvus. In abdomine ex carne tactu percipiebatur tumor durus, & circumscriptus sub ventriculo in parte dextra, tali modo ut videretur hic tumor contineri intra musculos, & peritonæum. Nullus aderat in parte tumente dolor. Purgantia per alvum evacuabant, ita pariter enemata. Tandem cum vomitus serosæ materie ægrum molesteret, ita ut alimenta nullo modo possent in ventriculo retineri, insensibiliter defectu nutrimenti, constanti mente expiravit.

Aperto cadavere vidimus tumorem illum contineri in pyloro, & parte superiore duodeni; Etenim crassities pylori, & duodeni sexies circiter naturali major erat; & hæc crassities non erat carnea, sed cartilaginea; neque totam circumferentiam pylori, & portionis duodeni occupabat; sed partem dumtaxat illius exterioris vergentem, quæ erat circiter totius circumferentiæ medietas.

**I**nappetentia in hoc casu dependebat ex eo quod cibum liberum non habebat fluxum à ventriculo ad intestina propter tumorem pyloræ angustantem; ideoque quamvis aliqua cibi portio semper percolaretur in intestinis, notabilis tamen ejus quantitas semper in ventriculo retinebatur, qui per consequens in continua distensione detinebatur; unde fieri non poterat, ut ventriculo alimenta contingeret, & semper distento famis sensatio excitaretur, ut multis rationibus ostendi potest.

Et quoniam alimenta in ventriculo distenta detinebantur ob angustiam pylori, fieri non poterat, quia à longiori mora, & fermentatione vitium aliquod contraherent puta aciditatis, vel acrimoniæ, ratione cuius irritate ventriculi fibrae ad violentam contractionem stimulabatur; unde vomitus sequebatur, qui ul-

mis vite diebus violentior erat ob majorem pylori angustiam, & copiam cibi in ventriculo.

Et quia deficiebat debita restauratio sanguinis, & conveniens corporis nutrimentum ob vim alimentorum coarctatam in pyloro, & duodeno, ideo non mirum si Ager languore vexabatur.

Præterea, quia nulla aderat dyscrasia sanguinis, & quamvis materia tumorem faciens à sanguine suppetiret talis nature erat, ut nullum in sanguine vitium argueret, ideo nulla contrigit febris. Vicerius quia materia tumoris dura erat, quæ proinde non poterat cum sanguine misceri, & etiam si mixta fuisset cum sanguine, utpotè nullum haberes vitium præter crassitatem, & duritiem, fuisse vim non habuisset sanguinem in febrilem moram concipiendi; & hinc causa carentis febris petenda est.

Materia glutinosa tumorem pylori, & duodeni efficiens cum ipsi tunici concreverat, & induruerat; unde tunice crassiores, & duriores evaserant, & per

consequens obtusissimi, aut nullius fortasse sensus capaces erant; ideo Agrotans nullum in parte tumente dolorem persequebatur.

## OBSERVATIO XV.

*Pulmo carnosus &c.*

**G**allus quidam ætatis consistentis, qui à Patria nuper advenerat ægrotare cepit cum pulsu parvo & raro, micissimum calore, nullo dolore capitis, nulla siti. Parum tussiebat, & interdum, sed raro quid spumosum & albicans excreabat; verum difficile respirabat, & suffocari aiebat, & à pondere pectoris opprimi; quod amplius tolerare non poterat. Varia simplicia remedia, à quibus nihil levaminis habuit; sed oppressione aucta, pulsu sensim deficiente, ac tandem abolito, viribus, & mente constans loquelam amisit, & paucorum horarum spatio obiit.

Aperimus cadaver, in cujus abdomine omentum semi consumptum, hepatis ex obstructione tumidum, & viridi colore tinctum à bile, quæ in cystide viridis erat, & lienem denratim juxta longitudinem ex altera parte divisum vidimus. In Thorace apparuit exterius pulmo non variegatus, naturali durior, & consistentiæ valde compactæ non quidem ex infarctu feri viscidum, vel alterius materiæ, sed ex propria substantia excrecente, quæ carnosam potius videbatur, quam vesicularis. Cor copiosissimæ pericardii lymphæ ianarabat, quæ flavi coloris erat; & cordis apicem ex disrupta hydatide alteratum observavimus. Dexter ventriculus parvum polypum, sed durissimum continebat.

**C**arentia memoratorum symptomatum in hoc Agrotante denotat sanguinem non effervescere, neque turbatum esse ejus miscellam, qua servata in ætatis sanguis in naturali crassi, & placido motu mansuescit; ita ex parte sanguinis nulla dyscrasia affecti, & naturaliter suecitis functiones omnes tunc petegi debent juxta leges œconomiz animalis. Si igitur polito hoc statu sanguinis aliquis malè se habeat, signum est malum esse in aliqua parte corporis, quæ morbo laborat independentem à sanguine, qui bene constitutus supponitur.

Difficultas spiritandi cum gravissima oppressione ferè semper lignum est affecti pulmonis, parva vero nullis cum levi excreatu spumoso, ratò etiam succedente denotat pulmonem neque sanguine, neque feri copia infarctum esse, sed aliquali tantum ferocitate, quæ cum arte mixta spumositatem efficit. Hæc autem minima feri fluxio exigui, ac nullius ferè momenti est respectu gravissimi symptomatis, seu difficultatis maxime spiritandi. Agrum molestissime vexantis. Igitur tanta difficultas spiritandi vix, aut ne vix quidem dependere posse rationabiliter videtur ab humore in pulmonem depulso, sed ab alia majori causa potius cedere debet. Et hæc esse quidem potest impeditus spiritum in fluxum in organa respiratori inservientia ex obstructione, vel compressione nervorum; sed frequentius esse solet aliquid comprimens, vel obstruens canales pneumonicos, speciatim æreos, & vesiculas æreas; unde æris in pulmonibus impeditur commercium; ita in nostro casu per excrecentiam substantiæ pulmonis angustiantem vesiculas æreas cum

tubulis; idèoque liber fluxus, & refluxus æris haberi non potest; nam vesiculæ compressæ, vel crassiores redditæ, nec etiam tubuli difficilioris distrahi possunt à gravitate & elatere liquidi ærei unde inspirationis oritur impotentia. Eadem de causa coardantur vasa sanguinea pneumonica, in quibus sanguinis motus interceptus; & idèò fortasse in dextro ventriculo genitus fuit polypus, quia vasa pneumonica excipere non poterant omnem sanguinem à dextro ventriculo qualibet syllabe propulsam.

Si porositates hepatis obstruantur, evidens est humores, qui easdem permeare debent, occurrente obstaculo retineri in substantia hepatis, & molem ejus adaugere. Ex mole hepatis aucta, seu mole compacta, ac tumida fit, ut comprimantur, & coarctentur canales ejus tum sanguinei, tum biliares, & acini glandulosi, ex quibus substantia hepatis consistit; unde bilis ob impeditum liberum fluxum ex acinis & canalibus versus communis receptaculum, movetur lentissimè, & viscidior evadit, & adhæret omnibus superficibus, quas tangere potest in substantia hepatis; Quare substantia recremento bilioso impregnata colorem bilis exhibet; Et quamvis hoc phenomenon non semper contingat obstructo hepate, tamen sufficit ut explicem quomodo data obstructio hepatis illud possit contingere; nam reverà dantur casus, in quibus illud accidere non potest etiam data obstructio hepatis maximè.

Figura lienis frequentissimè variat; Interdum rotundam vidi, aliàs irregulariter circumscriptam, saporis dentatam.

## OBSERVATIO XVI.

*Pulmonis abscessus: Pus in pericardio, & cor exterius corruptum.*

**R**obustissimus juvenem acuta febris corripuit cum dolore laterali, maxima anxietate, tussi, & spatu cruento, pulsu valido, & duro &c. Perseverabat febris cum calore intensissimo, & siti inextinguibili ex maxima accensione sanguinis; unde erysipelas in facie exortum fuit. Sanguis à vena eductus crassa gelatina, eaque flava refertus erat. Circa diem decimum obiit.

In cadavere vidimus abscessum disruptum in parte sinistra pulmones, ubi dolor aderat: pleuram pariter corruptam ex aëzatione pulmonis, & notabilem puris copiam in cavitare Thoracis. Maximam etiam puris copiam in pericardio invenimus, à cujus contagio cor exterius purulentum evaserat.

**I**nflammatiō pulmonis interdum fit in tota ejus substantia, aliquando in aliqua tantum ejus parte superiori, vel inferiori, vel mediā, superficiali, vel interiori. Si inflammatiō pulmonis fiat in aliqua ejus parte non longē à superficie cum notabili fluxu sanguinis in illam partem, facillē disrumpitur pulmo, & materia fluit in cavitate Thoracis. Distractis enim, quantum distracti potuerunt, interioribus membranīs, & membranā continente, quia semper cumulatū sanguis in parte inflammata, ibidemque urget, & quaquaversum, evidens est tumorem seu abscessum; qui semper nititur in membranā continentem jam multum distractam, & quae ulcerosis dilatationis incapax est, ibidem disrumpi debere ob minimam dictae membranae resistentiam. Præterea motus respirationis plurimum faciliat hanc raptionem abscessus; quia in inspiratione, quæ in peripneumonici violenta est,

sæpè tepidè fertur in substantiam pulmonis per innumerabiles canales versus ejus peripheriam tendentes; unde materia abscessum faciens ab impetu aëris magis urgetur versus membranā continentem, ubi capulis imminet periculum. In expiratione verò quæ pulmo concidit, materia abscessum faciens urgetur, & nititur indifferenter quaquaversum excepta illi ex grā quantitate, quæ esse potest in vesiculis, & canaliculis aëreis: hæc enim à coincidentia pulmonis urgetur quo pacto potest versus asperam arteriam, sed lentissimè fluxu ratione debilis compressionis, crassitie matris, & angustie canaliculorum & vesicularum, unde ad promovendum ejus fluxum vel voluntariè, vel ab impetuna irritatione coacti rursus auxilium utimur, ex qua concitatur rapidus aëris in expiratione motus. Quare patet multiplicem esse causam disrutionis pulmonis.

## OBSERVATIO XVII.

*Cor in basi vulneratum &c.*

**A**Nno 1680. die 26. Martij apertum fuit cadaver militis, cui vulnus insiditum fuerat Thoracem penetrans. Ensis sternum perforaverat, & perforato etiam pericardio cordis septum in basi vulneraverat, vulnere leviter penetrante sinistrum ventriculum, & in dextro siliante. Vixerat 17. dies, & quotidie educbatur à vulnere libra sanguinis. Suprà dextram Thoracis partem decumbere non poterat ob copiam sanguinis in opposita parte extravasari. Nihil sanguinis, aut puris repertum est in pericardio, sed cor exterius corruptum apparuit, & in ventriculis aderant polypi.

Cur autem ex insidito intrā cordis ventriculos vulnere non illiso mors subsequuta fuerit, ratio est; quia cor vulneratum erat in basi, sanguisque ex parvo foramine non nisi guttatim effluere poterat; unde requirebatur longum temporis spatium, ut per illud foramen in basi totus sanguis egrederetur; Quod si vulnus versus medium, vel eorum cordis extitisset minori temporis spatio universus sanguis effluxisset.

**I**N quæcumque parte cor leviter vulneretur concipi vix potest quomodo in diastole sanguis possit per exiguum vulnus egredi, quia statim cor contrahitur sed evidens est quod per quodcumque datum vulnus debet in systole cordis sanguis effluere: Effluet autem magis si vulnus sit in cono, quam in medio parietum, & in medio parietum magis quam in basi.

Quoniam enim in systole cordis omnis caro ejus inflatur, & unus lateris partes nititur parietem alterius lateris; ex hoc mutuo nixa fit, ut sanguis in neutrum ex oppositis parietibus detrahatur; nam quilibet paries rationem habet potentie, & resistentie; Et quia cor rationem habet canalis conici, ita in contractione ejus sanguis recipit directionem motus versus utrumque extremum illius; sed insertis extremum canalis conici, sive cordis impervium est; Igitur omnis directio fit versus extremum superius.

Supponamus ergo cor in apice vulnerari; erit igitur cor in utroque extremo pervium; & per consequens effluet etiam sanguis ex inferioris extremi orificio, sed vulnere juxta proportionem vulneris, & æquali proportionaliter velocitate, quæ fluit per extremum superius naturaliter pervium.

Hinc patet quod vulnerato uno cordis pariete circa medium minus, quam à vulnerato cono sanguinis effluet quantitas; quia in contractione cordis directio motus sanguinis fit versus duo cordis extrema propter mutuum nixum parietum, eademque servatur directio

perforato pariete, ex quo fluere tantum potest portio sanguinis, qui à parte parietis opposita parieti vulnerato tradi potest; nam ubi vulnus est, ibi deest potentia impellens sanguinem, & resistentia contra impetum illius, qui traditur à parte alterius parietis opposita vulneris, igitur &c.

Denique supponamus cordis basim vulnerari; quia cordis caro ad basim gracilescit, & ibi ventriculi amplius sunt; igitur in systole contractionis carnis, quæ circa basim & minimam vim habet, & per consequens nequit impetuum sufficientem impingere sanguini, ut per dextrum sibi vulnus sanguinis velociter effluat. Accedit quod sanguis protinus à tota mole carnis cordis versus basim reslingit impetum sanguinis qui nititur versus locum vulneris lateralem; unde exigua erit sanguinis quantitas, & cum minimo impetu per vulnus egrederetur, quia totus sanguis recipit directionem motus à cono versus basim directè ad vasa.

In casu memorato non solum vulnus est ad basim cordis, sed ad angulum qui est inter septum, & parietem sinistri ventriculi; ex quo fit quod in systole caro parietis, & caro septi, quæ angulum efficiunt, invicem approximantur ob utriusque impetum; & reddunt angustius vulnere orificium; unde hac etiam de causa minori copia, & impetu effluit sanguis à vulnere in basi cordis, quam in medio, & apice in casu exposito.

## OBSERVATIO XVIII.

*Colon in hypogastrium diductum.*

**V**trum ætatis consistentis herniosum ex epiplocele febris corripuit cum vomitu enormi, siti inextinguibili, inquietudine, & ventris doloribus. Enemata imponebantur, quæ æger difficilè excipere, nullo modo retinere poterat. Remedia per os assumpta nec vomitum compescere, nec tormina lenire, nec alvum aperire potuerunt. Tandem Agrotans in extremis partibus frigidus evasit cum pulsu formicanti, sensimque defecit.

In cadavere observavimus intestinum colon à naturali situ recessisse, diductum scilicet in hypogastrium à mole aucta omenti, quod à ventriculo secesserat, & in scorum prolapsam totam ejus capacitatem implebat illi arctissime adhærendo. Intestina omnia phlogosi affecta conspiciebantur.

In hoc cadavere curiosum quid observavimus, nimirum vesiculam bilis turgidissimam instar intestini: examinamus hepâr, ut illam examinarem, & notavimus ab incluso intrâ vesiculæ tunicas statu vesiculam fuisse tam insigniter expansam: nam leviter perforata exteriori tunica, illicò concidit vesicula, remanente integra interiori tunica. In meatu cystico anulum fibrosam Glissonij manifestum vidimus.

**M**anifestum est quod posito situ memorato intestini coli difficilis esse debet excrementorum motus in colo, & à colo ad rectum: naturalis enim coli positura & conformatio talis est, ut celestem excrementorum in illo motum, & transitum ad rectum impediat, quia modicè flexuosum, est tanquam segmentum magni circuli. Igitur quò magis augetur hæc tortuositas eò difficilior redditur motus excrementorum. In nostro casu datur tortuositas intestini coli naturali major, quæ considerari potest ut triplex, una scilicet versùs ileum, altera versùs rectum, altera in hypogastrio. Quæ in hypogastrio est, minoris momenti per se ipsam est, quia convenit cum naturali tortuositate ejusdem intestini in epigastrio; sed dato descensu coli in hypogastrium, declivior intestini positura occasio est quod portio coli tam versùs ileum, quàm versùs rectum tortuosa & eminens sit & similis naturali machinæ pilori. Quare habita proportione conjecturari potest utriusque tortuositatis resistentia.

Circa phænomenon vesiculæ felleæ observo quòd quemadmodum exterior tunica vesiculæ est continuatio tunicæ hepatis, quæ ab hepate facilè divelli potest; ita pari facilitate exterior vesiculæ tunica ab interna sejungi potest ex iurratione alicujus liquidi, potissimum fetosi, ut aliquoties observasse memini.

## OBSERVATIO XIX.

*Polypus cordis.*

**A** Nno 1680. mense Februario Adolescens laboravit gravi peripneumonia, à qua convenientibus remediis, & speciatim sanguinis missionibus modicè iteratis sanatus est. Supererat feri viscosi in pulmones fluxus, qui per plures menses continuavit, & Adolescens sensim ad cachectiam vergebat. Non diù cachecticus vixit; nam hydropæ universal correptus decem, aut duodecim dierum spatio absque pulsu manifesto cum difficillima respiratione expiravit.

Dissecto cadavere notavimus dextrum cordis ventriculum naturali ampliorem, in quo ingens polypus multis radicibus inter ventriculi sulcos irretitis orificia vasorum corpore suo obstruebat.

**Q**uoniam sanguis, qui à sinistro cordis ventriculo trahitur in arterias, & mittitur per illas in universum corpus, debet superare resistentiam naturalis arteriarum contractionis, gravitatem, compressionem, & tensionem reliquarum partium, necesse est, ut à corde talis impetus recipiatur, qui dictas resistentias superare valeat, sanguis autem qui à dextro cordis ventriculo in pulmones traditur multo minorem superare debet resistentiam, ut manifestum est unde mentem exigit à corde impulsus. Igitur patet ratio differentie ventriculorum, quòd scilicet sinister dextro plurimum crassior sit. seu multo carne roboretur, quæ ad majorem contractionis vim faciendam necessaria est. Quoniam igitur dextri ventriculi vis contractionis minor est vi contractionis sinistri ventriculi, & cum minori impetu sanguis exprimitur à dextro ventriculo, quàm à sinistro, poterit facilis in systole cordis sanguinis portio remanere in dextro, quàm in sinistro ventriculo, ibidemque lenescere, crassescere, &

glutinositatem, seu polypi naturam contrahere. Porro quia majores arteriæ rarissime obstruuntur, & multipliciter habent emissaria, idè etiam si aliquod ex his obstructione afficiatur, nihilominus sanguis sufficiens in reliqua derivatur emissaria; valde majores arteriæ, quæ sanguinem immediate à corde recipiant semper sine dispositæ ad recipiendum sanguinem qualibet systole propulsam; Quamobrem rarissimum est quòd sanguis in systole cordis nequeat à sinistro ventriculo totus expelli. Sed quia sanguis à dextro cordis ventriculo mittitur solum in pulmonem per arteriam pulmonalem tanquam per unicum emissarium; igitur datâ resistentiâ in pulmone, vel in emissario non poterit sanguis in qualibet systole à dextro ventriculo protrusus omninò expelli ob occurrentem resistentiam in emissario, vel receptaculis, & per consequens aliqua ejus portio major vel minor juxta proportionem spatij superfluit in canaliculis, & receptaculis remanebit in dextro ventriculo cordis, & facta in illo



longiori mora concrefcere facilè poterit in polypum. poffe concretiones polypofas potiffimum in dentu  
Quare paret in affectibus pulmonis facilè produci ventriculo.

## OBSERVATIO XX.

*Mefenterium verſus ſpinam reſtractum: ſubſtantia medullaris cerebri & medulla oblongata duriffima &c.*

**I**nſans medioeriter carnoſus capitis parvi primò levibus, mox validis convulſionibus eotripi cœpit. Purgatus fuit, & à purgatione melius ſe habere videbatur; Adhibitis etiam remediis volatilibus ut ſpir. ſal. armon. elixir. vit. tinct. caſtor. &c. adhuc melius ſe habuit. Tertia verò die ſuperveniente inſultu validiſſimo obiit.

Aperto cadavere vidimus inteſtina flatibus diſtenta, & verſus vertebraſ reſtracta à meſenterio convulſivè contracto. Pauca aderat bilis in veſicula, eaque coloris, & conſiſtentiz inſtar liquidæ picis. In cerebro vaſa ſanguine turgida apparuere, excepto plexu choroide prorsus inanito: ſubſtantia medullaris cerebri & medulla oblongata duriffima erat, ac veluti tenſa.

**M**eſenterium in homine ex duplicata pèritonei membrana componitur, cui interjicitur peculiaris, ac fibroſa membrana, quæ notabilis contractio- nis capax eſt. Ex quia copioſi extant in meſenterio nervorum plexus & tanali, idè in affectibus convulſivis facilè meſenterium violentam patitur contractionem.

Frequentiffimè cerebri vaſa ſanguine turgidiſſima obſervavi ſpectatim in affectibus capitis, cum tamen plexus choroïdes eſſet omninò depletus. Hujus ratio

phænomeni hæc eſſe videtur, quod vaſa ſanguine turgida apparentia ſunt potiffimè venoſa, vaſa verò plexum choroïdem conſtituentia ſunt pleraque arterioſa. Notum eſt autem multò majorem ſanguinis copiam in venis ſemper reperiſi, quàm in arteriis, cum quia venarum major eſt numerus, & amplior diametèr, nam quia arteriæ magis, quàm venæ contractiles ſunt, idè quæ in venas facilè diſtractiles omnem ſerè ſanguinem expriment.

## OBSERVATIO XXI.

*Tumor in Hepate.*

**E**xcellentiffimus Dominus ætatis conſiſtentis, corporis carnoſi, vinis meracioribus valdededitus incidit in febrem erraticam, quæ per quatuor continuos meſes perſeveravit. Inſerea conquerebatur de dolore in regione hepatis, & lienis, & circà inferiorem partem ſterni. Ulimis vitæ diebus fluxum alvi importunum habuit, ac tandem reſolutis viribus ſenſim deſieit.

Diſſecto cadavere obſervavimus inſignem extenuationem partium præcipuè carnoſarum, quia in Abdomine membrana adipoſa erat adhuc multo adipe reſerta: omentum valdè erat conſumptum, & totus venter omninò depreſſus. Vidimus hepar mole inſigniter auctum, ejus lobus anterior in ſiniſtrum hypochondrium protendebatur; In parte gibba deprehendimus inſignem tumorem, quo aperto effluxit puris glutinoſi, & ſub crucenti ingens copia, illoque evacuato obſervavimus cysſtim notabilis craſſitiei.

**D**olor in hypochondrio dextro, & verſus ſternum pendebat ex tenſione ligamentorum hepatis; quoniam tumor in parte gibba urgebat molem hepatis verſus partem ſiniſtram; unde necèſſe erat ut ligamenta per vim diſtenderentur; Dolor verò in ſiniſtro

hypochondrio dependebat ex eo, quod lobus hepatis ventriculum & lienem premebat: quapropter ob inſuetum pondus Ager percipiebat dolorificam in illa parte ſenſationem.

## OBSERVATIO XXII.

*Cor maximum plurimis ulcuſculis in ſuperficie alteratum.*

**A**nno 1680. Vir ætatis conſiſtentis ſtrigoſi habitus cœpit conqueri de Palpitatione cordis, quæ per meſem circiter patum remiſſa, iterum recruduit, & cum tanto impetu, & ſtrepitu ſiniſtrum latus arietabat, ut ſonitus ad notabile ſparium audiretur, & vibrationis impetus in Thorace conſpiceretur.

Pulſum ſemper habebat æqualem, aliquando tamen durum, & magnum, aliàs parvum & celerem ſpectatim ulimis vitæ meſibus, ſed nunquam intermittentem: aliquam ſpirandi difficultatē, ſed maximam pectoris anxietatem: Dolorem in ſterno, & cartilagine xiphoidæ continuum; nec poterat ſupra lara, nec ſuprà dorfum decumbere; Denique habebat præſocationes periodicas, quarum quatuor vel quinque graviſſimas intra duos annos paſſus fuerat.

Die septima Aprilis An. 1682. sensim languendo obiit: Ccepit enim frigescere in partibus inferioribus: mox erumpabant sudores frigidi, & pulsus sensim deficiebat, qui ultimis vitæ horis percipi amplius non poterat corde adhuc languidissime palpitante.

Hujus morbi causam curiosè scrutati fuimus in cadavere, & observatis in Abdomine sanis omnibus respectivè visceribus, Thoracem perlustravimus; in quo inspectis primò pulmonibus flaccidis, & semè consumptis, pericardium secimus, quod contiguum cordi absque concreto sero invenimus. Cor autem mole maximum, ac verè monstruosum se se obtulit plurimis exiguis ulceribus in superficie alteratum: Auricula dextra varicosa maximum polypum continebat: dextro ventriculo alter inerat polypus, & alter etiam sinister.

Quoniam cor mole maximum erat, ideo pericardio factum est contiguum; Et quia nullum inpetras in pericardio inane spatium, ob perfectam ejus cum corde contiguitatem; ita nullus in pericardio liquor apparuit. Præterea: cor non solum omne spatium in pericardio occupavit, sed moles ejus enormiter antea violenter dilatavit pericardium, cujus validè distractio in consensum traxit mediastinum, à quo externa ejus membrana propagatur; Et hinc dolor in sterno, & circa cartilagineo xiphoideum sequutus est. Ob eandem cordis thiagositatem notabiliter antea difficilis esse debebat. Egri in utrumque latus, & suprà dorsum decubitus; quoniam ad latera decumbente Egro maximam patiebatur pulmo ab ingenti pondere cordis compressionem: suprà dorsum vero decum-

berite, tota moles ponderosa cordis suprà magnam arteriam, & venam cavam gravitabat; unde sequebatur inquietudo, repognantia; & anxietas. Egri in tali decubitu. Postea rationem molis, maxime cordis magnam Thoracis partem occupantis pulmo dilatari sufficienter non poterat in inspiratione ob deficientiam spatij in cavitate Thoracis; & aliqualem etiam à cordis mole compressionem patiebatur, unde liber fluxus liquidorum in substantia ejus haberi non poterat hinc necesse erat ut pulmo flaccidus, & consumetur sit evidens est. Ulcera in superficie cordis reperta ostendunt veram causam palpitantis; quoniam à molesta irritatione in cordis villis per ulcera facta potest simulabatur ad violentam contractionem.

### OBSERVATIO XXIII.

*Diaphragmatis disruptio, & ventriculi in Thoracem ascensus.*

Anno 1682. mense Novembri Adolescens habitus corporis gracilis vulnus ante annum in Epigastrio passus; à quo identidem doloribus veluti colicis occasione prævæ, & inordinatæ violentiæ rationis obnoxius fuit; ccepit de dolore ventris conqueri, cui maxima vomitus violentia accessit. Medici vehementissimum vomendi impetum mirati opportuniora præscribere remedia, quæ prorsus inutilia fuere Egro sensim deficienter.

Cadaveris dissectioni vocatus intestina phlogosi affecta observavi; & evidens est Adolescentem ex illo periisse, cum ex relatione in ultimis vomitus conatibus quid feculentum vomuerit. Vesicula bilis atra bile turgida inventa est; Quod autem rarissimum visum fuit, diaphragma, ubi œsophago transicum præbet, disruptum, & ventriculum cum portione omenti in cavitate Thoracis invenimus.

Verisimile est quod vulnus inflictum in epigastrio ventriculum penetraverit, & inducta vulneri cicatrice soporavit in ventriculo stimulus, qui datæ levi occasione vomendi necessitatem fecerit. Hic stimulus multiplex esse potest, vel spirituum motus inordinatus, qui multoties recidis partibus nervosis remanet, & longioris tempore perdurat, ut observamus in illis, in quibus tempore brachio, vel cure superest dolotifica passio quæ à morbo recisæ partis producebatur, antequam pars illa rescloderetur; vel acris materia ex vitata cicatrice transudans, & vellicans nervos fibrillas; vel etiam mala cicatricis conformatio, ut si aliquæ nervæ fibrille laxius untantur, aliæ stricte, unde facile sequitur inæqualitas motus illarum quæ molesta esse solet spiritibus animalibus, quorum influxum naturalis majorem promover.

Diaphragma non perforatur ab œsophago in parte nervæ, ut multi Anatomici censent, sed in parte carneæ, quæ ab œsophago vetè non perforatur, sed illi

permittit transitum: componitur enim diaphragma ex duplici musculo anteriori, & posteriori: posterior ex duobus carnosis cruribus constat, quæ œsophagus interjacet; unde sufficit quod hæc duo crura musculosa diducantur, & illorum unio, vel coactio accedat, vel posterior aliquantulum discontinuetur, vel disruptatur, ut ventriculi violenter contracti permittant in Thoracem ascensum: notum est enim quod ventriculus in distensione positus maximam molem habet, & ingens spatium occupat; sed valide contractus minimam habet dimensionem; unde potest in Thoracem convulsus ferri per foramen ampliarum diaphragmatis, ut dictum est. Vidi hominis ventriculum adeo contractum, ut dimidij pugni magnitudinem non excederet. Patet etiam summa discrepantia inter dimensionem partium dum contractæ sunt, vel plurimum distenduntur: potentissimum in utero, vesicæ urinariæ, intestinis &c.

## OBSERVATIO XXIV.

*Strangulatio superioris orificij ventriculi à mole maxima hepatis, & ventriculus in umbilicalem regionem detrusus.*

**R**everendus Pater temperamenti sanguinei, & habitus corporis carnosii laborabat identidem, ut referebat, languore stomachi: sensum extenuabatur, & ex eodem languore deficiebat ob imponentiam sumendi alimenta, quæ probe deglutita ad ventriculum pervenire non posse videbantur. Tandem vehemens corripuit illum vomendi stimulus, & atrii humoris mediocrem copiam evomit; post vomitum invasit febris, unde brevi macilentus, & in marasmo constitutus occubuit.

Dissecto cadavere animadvertimus omentum tenacissime adhærere peritoneo: hepar mole maximum occupabat totum epigastrium: bilis vesicula amplissima erat, & bile repleta: lienis vestigia vix apparebant. Notavimus ab ingente mole, & pondere hepatis depressam fuisse ventriculum, quem in regione umbilicali invenimus, & orificium illius superius à superineumbente hepate valde compressum, ac veluti strangulatum.

Notandum quod liquida difficiliter deglutiebatur, quam solida.

**E**x depressione ventriculi, & strangulatione superioris illius orificij pater necessitas languoris stomachi, & impotentie sumendi alimenta, acuti enim robor stomachi à vigoratione fibrarum ejus, & vegeta contractione dependet, ita ejusdem languor coincidentia, & relaxatione produciatur; œsophagus etiam per vim elongatus evasit angustior, unde alimenta difficilè canalem permeare poterant. Præterea orificium ventriculi firmiter coarctatum cibi ingressum in ventriculi cavitatem prohibebat. Quoniam vero œsophagus

plurimum erat distensus, panctus ejus facti erant contigui, & tenaciter adherentes, unde liquida in potu sumpta vim sufficientem habere non poterant ad distrahenda canalis latera; Verum solida alimenta à pharynge se contrahente compressa facilius poterant adinstat cuneorum disungere contigua œsophagi latera; & per vim contractilem totius canalis naves versus orificium ventriculi, ejusque resistentiam superare.

## OBSERVATIO XXV.

*Maxima limpha copia in ventriculis cerebri: portio cerebri supra nervos opticos corrupta.*

**A**nno 1680. mense Maio Virginem vidi semi delirantem diu, noctuque querulam, & irrequietam fere sine sensu oculis scintillantibus, flammis, & veluti convulsis. Conquerabatur de dolore capitis, & nulla aderat febris. Opportuniora remedia præscripta fuere, & missio sanguinis è venis jugularibus instituta fuit; nihilominus post paucos dies obiit.

In sectione cadaveris viscera omnia tum Thoracis, tum Abdominis sanissima invenimus. In capite vero vidimus maximam in ventriculis cerebri seri copiam: substantiam cerebri fibrosam supra nervos opticos omnino corruptam, alibi vero probe constitutam: vasa supra cerebri corticem turgidissima.

**D**ebilitas sensus dependere quidem potest à compressione cerebri facta à sanguineis vasibus turgidissimis, & à copiâ lymphæ in ventriculis, sed majori jure peti debet à passione cerebri, in quo spirans agitari, & irrequieti detinentur, neque regulariter in sensoria influunt.

Flammæ erant oculi, & veluti convulsi ob altera-

tionem portionis cerebri supra nervos opticos; unde liquor nervus virium contraxerat, speciatim acedinis, quæ spiritibus, nerveisque fibrillis infusissima est. Mirum autem quod nulla febris aderat datâ notabili cerebri læsione, & liquoris nervei vitiosquod non responderet hypothesi I. A. Bozelli circa causas febrium.

## OBSERVATIO XXVI.

*Fungosa cerebri excrescentia.*

**A**dolescens ex casu ab alto contraxit fracturam ossis frontis ad radicem nasi, ubi excavatum est, & præcipue versus superciliam dextrum. Aderat ossis fracti depressio, quod Chirurgus ferro extollere per vim tentavit. Ablata autem squama cerebrum cum membranis ex aperto cranio prominebat ad magnitudinem medietatis exiguæ nucis juglandis, & trium mensium spatio excrevit in fungosam extuberantiam. Chirurgus ænciprem morbi exitum prævidens fungi extirpationem ferro magis periculosam judicans illius lapsum ligatura tentare voluit. Adolescens autem facta ligatura post breves horas incidit in soporem cum pulsu inæquali & formicanti, vomitu &c. febris etiam supervenit

nit, & intra viginti circiter horas obiit.

In cadavere capitis sectionem institimus, & invenimus maximam portionem substantiæ cerebri circa fungum sphæcelaram. Excreſcentia fungoſa cerebri nihil aliud erat, quàm continuatio, & exuberantia ipſius ſubſtantiæ cerebri cum extensione meningum.

Quotiescumque in capite vulneratis cum cranij fracturâ, ablatiſque iſquamis dura marer denudatur, & per aliqualem læſionem in ejus ſuperficie factam vel à ſquamiſ, vel à medicamentis, vel ab humoribus acerbis ſuper illam ſtagnantibus, alteratur congruitas fibrillarum dictam membranam componentium, periculum eſt fungoſæ excreſcentiæ in ipſâ membrana cujus productio ita explicari verifiſimiliter poteſt. Sanguis ad dent, matris nutritionem, aliſque uſitates à minutiffimis arteriolis inſillatur in fibrillarum integritatis, & porofitatibus, cujus modica portio congruens nutriendis porofitatibus retinetur in illis, & ſenſim tranſit in ſubſtantiâ fibroſam membranæ, reliqua portio juxta legem circulationis in extremis radiculis venarum recipitur ac ſi abſorberetur ab oſculis hyrudinum. Supponamus igitur in aliquâ membranæ parte fibrillas vel lætari, vel diſrumpi, fieri non poteſt ob multitudinem minimarum arteriolarum & venularum, quin aliquæ ex his ſimul lætentur, vel diſrumpantur. Quare ex duplici fonte ſcaturiet ſanguis, nimirum à fibris membranæ, & vaſculis ſanguineis. Sanguis tranſudans ab interſitiis, & porofitatibus fibrillarum partim genuinus eſt ſanguis omnino ſimilis illi, qui à vaſculis immediate exſillat, partim verò in nutriendis portis glutinoſam ſam receptiſ modificationem. ſpirituſque evaſit in ſolidam converti ſubſtantiâ. Genuinus itaque ſanguis cum ſanguine modificato tranſudans in ſuperficie mem-

branæ facile tranſit in coagulom, quod ſenſim induciſcit in molem carneam informem ſpongioſam ex impreſſo ſolidæ partis radimento à glicinoſis particulis in ſubſtantiâ membranæ modificatis.

Eodem modo alteratis glandulis corticis cerebri humores nutritij modificati in ipſi cerebri ſubſtantiâ cum reliquis humoribus ſanguineis non modificatis tranſudant, & fungoſam producant excreſcentiam. Maſpighius cenſet exulceratis per vulnera corticibus glandulis ſuccum nerveum per inſertos nervos canaliculos non excreti, ſed extravafari, & excreſcentiam facere.

Difficilius eſt autem explicare modum productionis excreſcentiæ cerebri non vulnerato cerebro, ut contingit in hoc caſu, in quo videtur à ſola dilatatione & laxitate membranarum cerebri fungum dependere. Fieri igitur poteſt, ut ad dilatationem duræ matris ad apertum cranium congrua cerebri portio facile extendatur ob mollem conſiſtentiam, & corticis producta ſubſtantiâ laxior evadat, quæ ideoſcit majorem ſucci nutritij copiam admittere poteſt; unde neceſſariò exuberat corticalis ſubſtantiâ in ſpeciem fungoſæ excreſcentiæ.

Symptomata quæ Agro ſuperveniente facta fungi ligatura dependent à ſpirituum in ſuſu partim impedito, partim inordinato, ut evidens eſt. Subſtantiæ cerebri ligaturæ adjacentis corruptio ab intercepto liquidorum fluxu petenda eſt.

## OBSERVATIO XXVII.

*Pulmonis inflammatio: hepatis & lienis obſtruſtio: Polypus in ventriculis cordis.*

Vix ætatis conſiſtentis corripitur febrî acuta cum dolore peſtoris laterali, ſputo eruento, & reliquis ſymptomatibus indicantibus morbum pulmonis inflammatorium: Accedit pulſus inæqualitas maxima cum intermittentia. Symptomata graviora ſunt, quæ Agrotantem interſimunt.

Aperto cadavere vidimus hepar maximæ magnitudinis, quod totum occupabat epi-gaſtrum; lienem etiam ex obſtruſtione valde tumentem: nihil ſeci in cavitæ Abdominis extravafati occurrir: Pulmonis ſubſtantiâ ex nimia inflammatione corrupta & inſtar conſiſtentis hepatis. In cordis ventriculis aderant polypi columnulis per fila-menta appenſi, tanquam funiculo penduli.

IN Maximis viſcerum obſtruſtionibus facile ſerum ſecede à lenteſcente ſanguine, & per expanſam membranarum ampliores poros tranſiſcat, & in ventris cavitæ congeritur. In hoc caſu datur maxima hepatis & lienis obſtruſtio ſine ulla ſeci extravafatione, cujus phenomenon hæc eſſe videtur ratio, quia diſpoſitio inflammatoria in ſanguine eſt omnino contraria diſpoſitioni ſingulis ad hydropem Obſectio. quæ contra hanc affectionem poſſiſſimam in caſu expoſito, adduci poteſt, reſponſio in promptu eſt.

Exiſtentiam polyporum in ventriculis cordis frequenter indicat pulſus inæqualitas, & inter-

mittentia. Polyphenim vel ſtriſtâ connexionem habent cum parietibus ventriculorum, ut poſſeſp contingit inſanatis præſpiginibus in columularum interſitiis; & in his caſibus diffiſile eſt de polypis ex pulſu judicium: vel polypi ex aliquâ tantum parte adhærent parietibus ventriculorum, & in reliquo liberi ſunt, ac quodammodo in ventriculis fluctuantes; & tunc inæqualitatem, vel intermittentiam pulſus producere ſolent; quia polypi à ſanguine abſrepti, vel à corde impulſi accedunt ad oriſcia vaſorum, quorum aliqualem, vel omnimodam à polypis occluſionem ſequitur pulſus inæqualis, vel intermittens, ut clarè patet.

## OBSERVATIO XXVIII.

*Cordis abſceſſus &c.*

Vix quidam ex caſu ab alto diſrupum fuit vas aliquod pulmonicum, ex quo extra-vaſato ſanguinis in pulmone, pulmonis alteratio, & ſanguinis in cavitæ Thoracis

effusio sequuta est. Vir erat asciticus viscera habens obstructione laborantia: Obijt autem ex affectu pulmonis.

In cadavere præter pulmonem alteratum, sanguinem in Thorace extravasatum, & serum in Abdomine contentum cum obstructione hepatis, & lienis, reperimus eorabscessa jam disrupto alteratum, & puris crassitie adhuc inerustatum. Aqua pericardij limpida erat.

**A** Corrupta pericardij lymphæ cordis superficiem alterari non raro contingit; cujus rei exemplum habemus in Observatione 16., & simile legisse memini in Observatione Olai Borrichii commemorata in Actis Hafniensibus, in qua habet à corrupto pericardij sero cor membranâ spoliatum, & exteriorem cordis substantiam ab eodem humore exesam invenisse cum reliquâ substantiâ flaccida & marescente, ibidemque observari nunquam ægri de dolore in regione cordis conquestum fuisse. In nostro tamen casu morbus est in

ipso corde independenter ab honore pericardij, qui limpidus observatus est; ex quo facile est coniecere memoratum cordis abscessum à longo jam tempore factum fuisse; alioquin aqua pericardij purulenta apparuisset. Præterea cordis alterationem à vicio humoris pericardij productam non fuisse constat, quia non in unica tantum portione, sed in toto cordis ambitu læsio facta esset. Interdum mirum videtur, quod nunquam apparuerint affecti cordis indicia neque alteratio cordis mortis occasio fuerit.

## OBSERVATIO XXIX.

*Hepar semi-scirrhosum, cum duritie lienis, & pancreatis: serum in Thorace extravasatum: Pulmo multiplici materia turgidus: Cor maxima magnitudinis.*

**V** Ir quinquagenarius forti orthopnea à longo jam tempore detinebatur: lenta febris supervenit, & per tussim expuebat serosam, spumofamque materiam sanguineis moleculis permixtam. Tumor aderat in dextro hypochondrio duritie ad scirrhum vergente; aderatque inferiorum partium ingens œdema, & superiorum non parva consumptio; adeo ut diu cunctando fatigatis jam respiraret suspirijs. Quamvis ad utrumque latus pari difficultate se venteret, nulla tamen procurata pectoris commotione murmurabat contenti humoris inundatio. Suppresso denique spūto difficillima in respiratione exspiravit.

Dissecto eadavere observavimus insignem hepatis molem substantiæ semi-scirrhosæ, lienem inimum & durissimum; itemque pancreas: nihil feri Abdomine continebatur in Thoracis verò dextro latere copiosum toram implebat cavitatem. Pulmonis substantia inæqualiter læsa apparuit: erat enim alicubi consistentiæ veluti hepaticæ, densa nimirum & conereta alibi phlogosi affecta, alicubi insolitis maculis variegata, sed magnam partem tumida, densa, & pituitoso farcimine stipata. Dissectis juxta longitudinem bronchiis in principio materia spumosa, & albicans apparebat, in extremitatibus vero illorum quid subcrenti, & putridi, quod immediatè ab ipsa pulmonis substantia emanabat: Cor insolite crassitie, & magnitudinis, in quo valvulæ enormiter dilatatz, valvorumque orificia ut in bovino corde ampliata conspiciebantur: Illius ventriculi grumoso, & atro turgabant sanguine.

**D**ifficultatis spirandi in Asthmaticis ratio multiplex esse potest pro multiplici causa talem morbum producente. In casu exposito dependere videtur à sero in Thorace contento pulmonem opprimente: à materia sanguineo-serosa pulmonum vesiculis, & canaliculis impacta, quæ in crassam, viscidam, & purulentam degeneravit & à mole hepatis aucta diaphragma Thoracem versus premente; Undè multis de causis aëris commercium impeditur.

In laborantibus pectoris morbo cum suspitione feri in cavitare extravasari solent Practici procurare commotionem Pectoris Agri, & advertere, an aliqua subaudiatur liquidum in dextro, ex qua manifestè inferri possit existentia feri in cavitare. Verùm adverte quod fallax perispe est hujusmodi experimentum illis potissimum in casibus, in quibus feri extravasati tanta est copia, ut alteram, vel utramque cavitatis partem ad summum impleat: Tunc enim impossibile est ut liquidum undulatio percipitur, quemadmodum commovendo vas aliquod liquido exactè plenum nulla liquidum contingit in vase undulatio. Et hoc verissimum cuilibet videbitur in ex-

spiratione. Verùm obiciet fortasse aliquis non bene versatus in perustantibus mechanicis Animalium machinis, quod saltem inspirante Agro poterit aliqualis agitatio liquidi in Thorace pericardij, quia elevatis costis, & depresso diaphragmate conciliatur amplior in Thorace cavitatis, quæ si potest aditum præbere aëri in bronchiis, & substantia pulmonis, potest etiam liberius spatium liquido extravasato concedere; sed facilis est ad hanc objectionem responsio. Quandoquidem qualibet vel levissima pectoris elevatio, vel diaphragmatis depressio fieri non potest, quin eodem momento aër ingrediatur canales pneumonicos ad occupandam spatium inane, non ob metum vacui, sed ex necessitate mechanica pressionis aëris; Et quia insufficientis est spatium in pulmone ad recipiendam quantitatem aëris necessariam dara maxima feri copia in cavitare Thoracis; ideo Agrotans summam, quæ haberi possit, elevationem Thoracis, & depressionem diaphragmatis molitur; undè per vim quodammodo insinuatur columnula aëris in fistulis pneumonicis procurantes dilatationem fistularum, & valvularum pulmonis; Quare pater impossibile esse,

esse; ut nullum spatium superfit in cavitate Thoracis, in quo possit liquidum extravasatum undulationem pati.

Hic etiam opportunum videretur advertere, quod in his casibus pulmonis consumptio non raro contingit ex eo, quod non solum comprimentur canales & vesiculæ aëres, sed reliqui etiam diversorum liquorum canales, & tota substantia pulmonis undequaque compingatur, ut patet. Præterea ob immensam respirationem, & aliquando in alterutro pulmonis undequaque ab aquis compressi lobo supprestati dari potest copia humoris in hūilis pnenmonicis, & nulla sequi excreatio, ut pariter manifestum est.

Vesiculæ pulmonis aëreæ serosa, ac pinnitosa materia infarctæ difficilis respirationis causa existit non solum quia aërem excipere; & emitte nequeunt; sed etiam quia eadem dicta materia turbida una cum interstitiis ipsa pariter materia repletis concresecunt in massam densam, & compactam, quæ supra leves fistulas aëreas gravitando interceptum aëris fluxum, atque refluxum. Hæc autem moles pulmonis densioris consistentiæ supra aëreas fistulas suam gravitatem magis exerceat in decubitu. Egrotantis horizontali: quum in perpendiculari ad horizontem ut parer; Hinc facilius respirant Egrotantes erecti, vel sedentes, quam decubentes in lecto. Io exposita Observatione mentio fit de hepate duro, & tumido, quod in situ corporis horizontali diaphragma versus Thoracem urgere potest, quemadmodum erecto corpore diaphragma secum trahendo deprimit in hoc speciatim casu, in quo hepatis moles est naturali ponderosior: naturaliter enim hepar, & pleraque Abdominis viscera in situ corporis horizontali niuntur in diaphragma, illudque versus Pectoris cavitatem trahunt; Gravitatis enim viscerum in corpore erecto ad hypogastrium est, partem solidam, non cadentem, utposse ossicam; quam verò corpus reclinatur directio gravitatis viscerum ad diaphragma tendit, partem mollem carneo-tendinosam, cadentem.

Thomas Willis in Cap. de Asthmate pag. 105.

## OBSERVATIO XXX.

*Hepar albicans: hymenis existentia: dextra cordis auricula varicosa &c.*

**F**ellia semi ictERICA, valetudinaria, & ad cachexiam disposita lenta febre detinebatur: supervenit brachiorum tumor à sero extravasato, quod aliquando refluebat in vas, & tunc evanescerebat tumor; mox à novæ seri affluxu iterum apparebat. Tandem languendo obijt frustra adhibitis opportunis remediis.

In Cadavere vidimus hepar notabilis magnitudinis, coloris albicantis, & reliqua Abdominis viscera sero extravasato immersa, flaccida, & ad corruptionem disposita. Partes vero genitales curiose examinantibus hymen evidentissime se nobis obtulit. In Thorace maxima seri copia reperta est, cui innatantes pulmones lividi occurrebant. Dextra cordis auricula varicosa, sive enormiter dilatata apparuit, in qua ingentes cōtinebantur

**F**requenter in cachecticis, & hydropicis pallidus observatur hepatis color, quia sanguis in illis vividâ rubedine defecit. Aqua in ventre contenta visceribus molliem, & flacciditatem facili conciliat; unde in diuturnis hisce morbis inter legem. Frigida evadunt viscera, & abeunt in putrilaginem.

Auricula dextræ cordis enormiter dilatata simile erat exemplum apud P. Dionis celebrem Anatomicum Parisiensem in appendice ad dissertationem de Generatione hominis, cui appposita est ejusdem auriculæ figura.

Hymenis existentiam Aliqui admittunt Anatomici, plerique negant; & inter illos, qui eam admittunt alii veram membranam esse statuunt genitalia Virginum in externa, & interna distinguendum fere modo, quo tympani membrana exteriam autem ab interna separat. Alii contiguitatem,

circæ difficultatem respirandi Egro in lecto jacentem hæc habet. *Utitur est huic morbo obnoxius sepi lectum ingredi non ausus, tantummodo in Cathedra, aut super cubile vestibus indutus dormire posse. Cujus ratio est, quod corpore singulis cooperit, & concalcato sanguis preindit in motum paulo citiorem concitus, & serventem uberiorem aëris inspirationem requirit, quam per trachea ductus coarctatus suppleri queat: nam quo plus sanguinis quoque systoles & diastoles vice pulmones traiecit, eo præter accensionem, simulque eventilationem ejus aer copiosius, & celerius ingeri, reverterique debet, cui per se (cum propter impedimenta non facile absolvitur) tamen quoquo modo peragendo partim omnium respirationi dicatarum cum magna totius pectoris contentione conatus ultimus exerantur. Patet autem non à stragulis spirandi difficultatem dependere: illis enim remoris eadem remanet difficultas, quæ ab incongruo corporis situ petenda est; quoniam Egro rectâ cervicē insistent, etiam indumentis immensè coopertus facilius respirat, quam in prono decubitu denudatus pectore. Sanguinis verò ab aëre eventilatio à Thomas Willis, aliisque Authoribus indicata prorsus reticienda est. Hæc spectat expulsiō fuliginum, sanguinis refrigeratio nitrosarum particularum insinatio, & istiusmodi commenta ab Authoribus excogitata pro scopo naturæ in respiratione Animalium: Talia enim vel falsa omnino sunt, vel valde dubia, vel si aliqua ex his vera esse constet, sunt tantum effectus respirationis secundarii; nam præcipuus naturæ scopus in respiratione insinuanda in Animalibus longè ab his diversus est. Egregiè quidem de Respiratione scripserunt Præclari Viri L. Svammerdam, R. Boyle, M. Traulton, G. Epius, L. Majovv, J. A. Borellus, & alii; sed multa in illorum Commentariis obcuratissima sunt, quædam valde dubia, nonnulla etiam prorsus falsa: neque verum respirationis usum ostendunt. Ego pollicor verum usum respirationis, sive necessitatem quæ est in Animalibus, & plantis hauriendi liquidum æcū rationibus, & experimentis me aliquando demonstraturum.*

## OBSERVATIO XXXI.

*Cordis polypi: Abscessus in pericardio: illius interna, & cordis externa superficies alterata &c.*

**F**ebbris acuta Virum corripuit, qua brevi extinctus est. Præcipua symptomata fuisse calor intensus, tussis molesta, difficultas spirandi maxima: suprà latera decumbere. Eger non poterat; minori autem incommodo suprà dorsum decumbebat; verùm sedens meliùs se habebat, & faciliùs respirabat: ultimò diarrhæa supervenit.

In dissectione cadaveris vidimus abscessum in pericardio valde dilatato, in quo tum puris, tum feri maxima copia contineretur: superficiem internam pericardij, & cordis externam alteratam, & crusta albicante textam: concrectiones polyposas in cordis ventriculis: hepar inflammatum, & in cava parte corruptum.

**D**E cordis alteratione alibi jam facta est mentio, & jam innuimus causam alterationis substantiæ cordis aliquando excitari in corde ipso, interdum à labe humoris pericardij dependere. Idem in pericardio contingere potest, cujus substantia, vel ex se ipsa, vel ab ejus humore corrupto labefactari potest.

Polyporum existentiam in Animalibus viventibus Multi in dubium revocant, Aliqui absolute negant, inter quos Kerckringius opinatur polypos in cadaveribus produci ex coagulatione sanguinis refrigerati inducta à particulis aculeosis; & conatur suam opinionem, experimento firmare: infundit enim liquorem acidum, ut spir. vitrioli in venam vivi canis, quo deinde post repentinam mortem aperto grumescens, & concretum sanguinem observat. Verum cuilibet occurrere potest quàm longè diversa est polypi substantia, & conformatio à simplici sanguine grumoso, & concreto, ut multis rationibus ostendi potest. Quòd si Kerckringio concedere velim ab interjectione liquoris acidi in venam canis vivi veros polypos excitari, turpiùs illum errare, sibi que contradicere ostendero; quia sanguinis concretio polyposa ab acido liquore producta brevi animal interimens, manifestè demonstrat in vivo animali polypos generari posse, quod est contra illius assertum.

Aliqui contendunt extremis tantùm vitæ diebus ex lentescence sanguine excitari polypum; cujus opinionis falsitas etiam patet ob symptomata, quæ manifestantur in polypo laborantibus; quæ mensæ, & annos aliquando perdurant.

Circa materiam, ex qua polypi efformantur, putat Malpighius hunc esse portionem fibrosam sanguinis; sed Clariss. Boghn negat dari fibras in sanguine, quia quantumvis minimæ essent difficilè permearent capillares vasculorum extremitates, quæ ideo à dictis fibris obstruerentur. Malpighius verò in Opere Posthumo pag. m. 62. confirmat suam suppositionem existentiæ fibrarum in sanguine his verbis. *In sanguine, inquit, Animalium, & præcipue*

*hominis, minimis fistulis excepto præter atomas rubras, ramenta quædam, & minima filamenta cinerea sere innatantia patenter observantur, quæ probabiliter cessante motu locali, & intestino implicatione in solidum corpus compaginantur & concrescunt, sicut accidis salibus, & fissilibus, quorum racemi, ramenta, & partes minime eadem polleant signa, quæ in his solè magnitudine differtunde ipsorum concretio pendet à determinatâ componentium figura. Nec metienda est minimorum vasorum obstructio, cum sere confusa sint fibra, unde motus, & impulsus à corde receptus sufficienter superat resistentiâ unicarum vasorum &, ipsa solè implicatione, vel ferruminatione mediis acidis quiescendo concrescant. Exarata in sero ramenta à Malpighio observata meliùs fibrarum inchoamenta, ut ipse alicubi nominat, quàm verè fibræ dici possunt: simul enim coeuntia fibras efformant. Quòd verò ad excitandum polypum requiratur acidum ferruminaos falsò multi arbitrantur, quia in sanguine educto, & potissimum in aquam effuso, ac postea refrigerato excitatur concretio quædam polypose analoga, quæ tamen producitur sine concursu acidis. Malpighius primò statuit dicta ramenta ferruminari ab acidis, ut clarè habet in præcitati Operis pag. 62. Hunc itaque (intelligit polypum) non rarè in cordis ventriculis, & præcipue in dextro, & appendis vasis excitari debui, in melancholicis, seu veneris affectibus, reliquisque in quibus coagulationi, acidique sales luxuriant. Hæc autem à minimis fibrarum inchoamentis fieri ab acidis, quasi ferruminantibus concludavi, deficientibus insuper volatilibus particulis ab aere communicatis, quibus debita sanguini fluiditas conciliatur, & manentetur. Deinde sequenti pag. 62. loco suprà citato videtur excludere perpetuum acidis concursum, dum ait, quòd si (a fibra solè implicatione, vel ferruminatione mediis acidis quiescendo concrescant, & paulò suprà loquendo etiam de fibris sanguinis, quòd probabiliter cessante motu locali & intestino implicatione in solidum corpus compaginantur & concrescunt.*

F I N I S.



# I N D E X

## LIBRORUM, SECTIONUM, ET RERUM PRÆCIPUARUM

I N

Omnibus OBSERVATIONIBUS, quibus ANATOMIA hæc  
PRACTICA constituitur, contentarum.

### ANATOMIÆ PRACTICÆ LIBER I.

De Affectibus Capitis. Tom. I. pag. I.

SECTIO I.

De Dolorē Capitis. Ibid.

**D**OLOR Capitis in Apoplexiam  
desinens à sanguine vasa duræ  
meningis distendens, & ejus-  
dem meningis crassitie, ac duritie  
insigni. Ibid.

Obs. 2. Cephalalgia à vasis meningum & cerebri  
sanguine turgidis & distentis, abscessu parvo,  
seroso in cerebri parte anteriore. pag. 4.

Obs. 3. Capitis dolor à repletionē vasorum menin-  
gum, & feri copia in ventriculis. p. 5.

Obs. 4. Capitis dolor ob vasa pia duræque meningis  
sanguine turgida; Ulcus oblongum sub medio  
ossis sincipitis dextri, ad os temporis extensū;  
ob copiam feri in ventriculis anterioribus. p. 6.

Obs. 5. Capitis dolor à vasis cerebri sanguine adustō  
repletis, & meningibus velut fideratis. p. 8.

Obs. 6. Capitis dolor à phlegmone meningum, vasis  
& sinibus sanguine repletis; aquā plurimā in  
anfractibus. Ibid.

Obs. 7. Capitis dolor à vasis meningum & cerebri  
sanguine distentis; aquā limpida cerebri plicas  
implente & totam compagem inundante. p. 9.

Obs. 8. Capitis dolor à sanguine nigro venas im-  
plente & quasi varicosas reddente, cum siccia-  
re cerebri ac membranarum ejus: Sero multo  
in ventriculo medio. p. 10.

Obs. 9. Occipitis dolor ab humore acri crassam men-  
ingem erodente; atro sanguine vasa tenuis &  
crassie meningis distendente. p. 11.

Obs. 10. Capitis dolor à dato phlegma in quo cerebri  
venule nigricantes reperiuntur, cum paucā sanio-  
sā materiā in superficie &c. Ibid.

Obs. 11. Capitis dolor ab inflammatoria dispositio-  
ne meningum & partis exterioris cerebri ubi  
nigredo intensa deprehensa. p. 12.

Obs. 12. Capitis dolor à vasis tenuis meningis cruo-  
re oppletis & ampliatis; sinu tertio sanguine  
turgido; sero flavo per cerebrum circa falcem  
diffuso; humore purulento in utroque venri-  
culo &c. Ibid.

Obs. 13. Capitis dolor casum sequutus à sanguine  
circa occiput inter cranium & pericranium ef-  
fuso; feri copia in anteriore capitis parte inter  
membranas & cerebrum contenta. Ibid.

Obs. 14. Capitis dolor gravis à sero in ventriculis  
cerebri, vasis meningum sanguine feculento  
turgidis, & ab ulcerato ventriculi orificio su-  
periori. p. 13.

APPENDIX. De Cephalalgia stomachi vitio adcri-  
benda. p. 14.

Obs. 15. Capitis dolor à turgentibus atro sanguine  
cerebri venis & aquā in ventriculis. Ibid.

Obs. 16. Capitis debilitas à sero copioso inter men-  
ingas diffuso & ventriculos replente. Ibid.

Obs. 17. Cephalalgia à sero inter duram meningem  
& cerebellum larente.

Obs. 18. Hemictania ab ingenti feri copia inter cra-  
nium & duram meningem contenta, tum in  
hujus falce & reduplicationibus. p. 15.

APPENDIX. De Hemictania à sero producta, erchinis  
& vesicatorii curata. p. 16.

APPENDIX. De Cephalæa per aquæ limpide & naribus  
stillantis copiam soluta. Ibid.

Obs. 19. Capitis dolor à sero ventriculos replente,  
& spacia inter meningē &c. Ibid.

Obs. 20. Cephalæa à sero cohibito in cerebri ventri-  
culis & ejus anfractibus alluente. p. 17.

Obs. 21. Capitis dolor à copiosa aqua cerebrum al-  
luente, cum ventriculi vitio. Ibid.

Obs. 22. Capitis dolor ab aqua duræ matri incum-  
bente. Ibid.

Obs. 23. Capitis dolor à sero, supra, intra, & infra  
meninges contento; abscessu grandiore intra  
dextrum ventriculum &c. Ibid.

Obs.



- Obs. 14. Capitis dolor à sero ventriculorum cerebri dextrum implente. Tom. I. pag. 18.
- Obs. 15. Capitis dolor à sero spatium inter utramque meningem implente, cerebri anfractus alluente &c. Ibid.
- Obs. 16. Capitis dolor gravativus à serosorum humorum inter duas meningis collectione ortus. Ibid.
- Obs. 27. Pungitivus capitis dolor ab aque perispiruæ copia in posterioribus cerebri ventriculis contenta. Ibid.
- Obs. 28. Capitis dolor à cerebro nimis humido. p. 19.
- Obs. 29. Cephalalgia ab aque copia in capite, ob evaporationes per aures suscepta. Ibid.
- Obs. 30. Gravis circa frontem dolor à seroso humore in substantia cerebri, & ventriculis. Ibid.
- Obs. 31. Capitis dolor à colluvie serosa in cerebro & corruptione omnium principum viscerum. p. 10.
- Obs. 32. Capitis debilitas à copia seri inter meningis & in ventriculis collecta. p. 11.
- Obs. 33. Capitis dolor à maxima collectione serosi humoris inter duas meningis. Ibid.
- Obs. 34. Cephalæa à sero largius meningibus affuso ac in ventriculis copioso. Ibid.
- Obs. 35. Capitis dolor à cerebro aqueo humore copiose irriguò, & tumore globoso in parte anteriore. p. 11.
- Obs. 36. Capitis dolor ab aqueo & pituitoso sanguine plures cerebri partes occupante. Ibid.
- Obs. 37. Capitis dolor cujus nulla alia in corpore causa deprehensa quàm bilis cystica felleam distendens. Ibid.
- Obs. 38. Capitis dolor à bile meningis suffundente & liquore inter eos contentò. Ibid.
- Obs. 39. Capitis dolor à vaporibus vel flatibus piam matrem distendentibus. Ibid.
- Obs. 40. Capitis dolor à pure inter piam matrem & cerebrum contentò, illicque ab inflammatis pleuræ & pulmonibus delatò. p. 13.
- Obs. 41. Gravedo à pure ad os ethmoides delatò. Ibid.
- Obs. 42. Capitis dolor à pure supra membranas & cerebrum effuso. p. 24.
- Obs. 43. Gravis circa oculum dolor puncturam ossis temporis sequutus, ab ingenti puris copia inter membranas & cerebrum. Ibid.
- Obs. 44. Capitis dolor vulnus sequutus, à putredine inducà dimidiæ cerebri parti; pure & aqua inventriculis. Ibid.
- Obs. 45. Capitis gravitas ab abscessu & pure in anteriore cerebri parte. Ibid.
- Obs. 46. Capitis dolor ab abscessu seroso natus cerebri & infundibulo adhzrente. Ibid.
- Obs. 47. Capitis dolor ab abscessu sanioso circa nervum opticum, cum glutinosi & pellucidi aquæ. p. 15.
- Obs. 48. Capitis dolor à vomica in cerebro, sequuta ossis frontis fracturam. Ibid.
- Obs. 49. Cephalalgia ab abscessibus in processibus mammillaribus; erosione ossis frontis. p. 26.
- Obs. 50. Dolor intolerabilis & fugax ad frontem & tempora ex abscessu in media cerebri parte. Ibid.
- Obs. 51. Dolor circa tempora ab abscessu in cerebri pœntalibus vulnus sequutò. Ibid.
- Obs. 52. Capitis dolor ab abscessu parulento & fetido. Ibid.
- Obs. 53. Capitis dolor à gravi in cerebro abscessu, suppressionem saniei ex auribus manantis sequutò. p. 27.
- Obs. 54. Capitis dolor ab abscessu sub cranio, duræ matris, pie, & subditi cerebri putredine parvo spatio circumscripta. Ibid.
- Obs. 55. Capitis dolor ab abscessu sub cranio laterale. Ibid.
- APPENDIX. De Vomica Hypocranica. p. 29.
- Obs. 56. Cephalæa à substantia quadam callosa in cerebro. p. 30.
- Obs. 57. Capitis dolor ab officulo duram meningem pungente & abscessu parulento in cerebri substantia. Ibid.
- Obs. 58. Capitis gravitas ab abscessu in anteriore cerebri parte. Ibid.
- Obs. 59. Capitis dolor vulnus sequutus à pure supra membranas & cerebrum effuso. p. 31.
- Obs. 60. Capitis dolor à phlegmone ingenti intra calvariam; duræ meningis inflammatione; puris copia. Ibid.
- Obs. 61. Dolor continuus à tumore parva processibus mammillarum. Ibid.
- Obs. 62. Capitis dolor ab hydaridibus obortis circa temporales arterias. Ibid.
- Obs. 63. Capitis dolor à tumore globoso in cerebro; aqua plurima per id diffusa. Ibid.
- Obs. 64. Capitis dolor ob tenuis meningis cum crassa connexionem. Ibid.
- Obs. 65. Hemiplegia diuturna à phlegmone parva locum dolentem. Ibid.
- Obs. 66. Frontis dolor astuosus à cerebri & membranarum dispositione inflammatoria sequuta puncturam eandem partem. Ibid.
- Obs. 67. Cephalalgia à tumore scirrhuso membranis cerebri accreto & aqua liquida anfractus alluente. p. 32.
- Obs. 68. Capitis dolor à Gummatibus duræ meningis excitata ab ossis acuto circa falcem latente. Ibid.
- Obs. 70. Capitis dolor ob tumorem duræ meningis, crassiem tenuis, ac serum copiosum per cerebrum diffusum. p. 33.
- Obs. 71. Capitis dolor à tumore scirrhuso pie matris, ac ichore inter meningis & cerebrum. Ibid.
- Obs. 72. Capitis dolor à coactu meningum sanguinis liberum cursum præpediente. p. 34.
- Obs. 73. Capitis dolor ab inflammatis cerebri membranis; abscessu in parte cerebri sinistra, cum fururum in cranio delatò. Ibid.
- Obs. 74. Capitis dolor à membranarum phlegmone post casum. p. 36.
- Obs. 75. Capitis dolor à sero stygo represso, tunc prius excitante, unde cerebri & membranarum corruptio. Ibid.
- Obs. 76. Meningum laceratio sequuta diuturnos dolores. p. 37.
- Obs. 77. Capitis dolor ad occiput & spinam potentes, ob meningum inflammationem, quam sequuta laceratio. Ibid.
- Obs. 78. Capitis dolor à phlegmone cerebri partem posticam obfidente subsequente sphacello. p. 38.
- Obs. 79. Capitis dolor à totius cerebri phlegmone quem sequuta ejus necrosis. p. 40.
- Obs. 80. Hemiplegia dextri lateris à corruptione cerebri latere sinistro. p. 41.
- APPENDIX. De Hemiplegia per consensum cerebri cum renibus affectis. Ibid.
- Obs. 81. Capitis dolor à viriosa meningum dispositione inducà ab humoribus atabilibus. Ibid.
- Obs. 82. Capitis dolor à pia & dura matre circa os coronale nigricantibus ob perennem tabaci sumum. Ibid.
- Obs. 83. Capitis dolor à membranarum coactis & tumoribus scirrhusis. p. 42.
- APPENDIX. De Cephalgia supra vicennium durate ac probabiliter à tumoribus scirrhusis membranas obfidentibus orta. p. 43.
- Ibid.

Item de Cephalalgia vitio succi nervi imputata.

Tom.I. p.45.

Oss. 84. Capitis dolor pertinax sequitur plurimque membranarum morbos conformationis. Ibid.

Oss. 85. Capitis dolor à putredine dimidiæ cerebri partis pure & aqua in ventriculis. F.46

Oss. 86. Capitis dolor in diuturna luce, ubi cerebrum pene consumptum repperit propter ejusdem dissolutionem. Ibid.

Oss. 87. Hemisrania sinistra lateris ob carotidem dextram intra cranium ossesam redditam. p.47.

Oss. 88. Atrox Capitis dolor ab arterijs carotidibus induratis, aque collectione sub pia matre & arenulis in glandula pineali. p.48.

Oss. 89. In longis occipitis doloribus cerebellum cerebro mollius, quandoque siccius ac friabile repperit. p.49.

Oss. 90. Capitis dolor à nimis arcta suturarum compage. Ibid.

Oss. 91. Capitis dolor à crassitie cranij, suturarum absencia & aqua multa in ventriculis cerebri collecta. p.50.

APPEND. De immunitate à dolore capitis ob cranij tenuitatem & perviam substantiam. Ibid.

Oss. 92. Capitis dolor à suturarum discessione. p.51.

APPEND. Super eodem argumento. p.52.

APPEND. De Capitis dolore continuo in puella cui oss frontis mobile. Ibid.

Oss. 93. De Cranio sine suturis & crassissimo in quodam qui nulla vi externa in capite lædebat, nec unquam à causa externa dolebat. p.53.

Oss. 94. Ingens capitis dolor ab ossis incisuris dextræ carie & lumnis oblitteratis. Ibid.

Oss. 95. Capitis gravedo à carie ossis frontis & lacione superioris orbitæ. Ibid.

Oss. 96. Capitis dolor à carie cranij parte interna juxta cerebellum. Ibid.

Oss. 97. Capitis dolor à carie cranij & adhesionem cum membrana. p.54.

Oss. 98. Capitis dolor ab adhæsu crasse meningis cum crano. Ibid.

Oss. 99. Capitis dolor ab humore maligno cranium, subditas membranas, ipsumque cerebrum corrode. Ibid.

Oss. 100. Capitis dolor à cranio sphacelato; ichore putrido supra meninges corruptas & corrupto cerebro nervisque opticis. p.55.

Oss. 101. Capitis dolor ab interiore cranij tabulâ carie affectâ. p.56.

APPEND. De dolore capitis ab humore acro in capite collecto, potius cranium quàm duram meningem erodente. Ibid.

Oss. 102. Capitis dolor ab humore virulento inter cranij laminas contento. p.57.

Oss. 103. Capitis gravedo à carie ossis frontis illatis meningibus & cerebro. Ibid.

Oss. 104. Capitis dolor ab internæ diploidis particulis meningibus pungentibus. Ibid.

Oss. 105. Dolor circa frontem à laminæ interioris cranij erosione, & purulentia circa partem cerebri. Ibid.

APPEND. De Hemisrania ab introcessione particulæ ossis frontis meningem subditam premente, & liberum per vasa excursum præpediente. p.58.

Oss. 106. Capitis dolor ab ossis spina inter duram & piam matrem, cerebri substantiam ingrediente. Ibid.

Oss. 107. Capitis dolor à styli frustulo in cerebro relicto, ingruente tantum pluvia molestus. p.59.

Oss. 108. Dolor capitis acutissimus ex materia lapidea durè meningi adnata, suis aculeis tenuem perfodiente. Ibid.

Index Anai, Boneti.

Oss. 109. Capitis dolor à lapide membrana inclusa in posteriori capitis parte; aqua in ventriculis. Tom.I. pag.60.

Oss. 110. Capitis dolor gravativus à lapide circa cerebri basim genito. Ibid.

Oss. 111. Capitis dolor à lapide inter duram & piam matrem in posteriore capitis parte. Ibid.

APPENDIX. De Calculo per palatum rejecto. p.61.

APPENDIX. De Calculis per nares rejectis præcedente dolore capitis.

Oss. 112. Cephalalgia à calculo in cerebro nato. p.63.

APPENDIX. De globulo plumbeo mentes sex in cerebro delirificante sine ullo symptomate. Ibid.

Oss. 113. Capitis dolor lethalis ab offsculis circa salicem adnatis. Ibid.

Oss. 114. Capitis gravitas ab hydrargyro post inunctionem in capite relicto. p.64.

Oss. 115. Capitis dolor pruriginosus à pediculorum caterva sub pericranio & intra cranij diploas latitante. Ibid.

Oss. 116. Cephalalgia à verme in anfractibus cerebri latitante. p.66.

Oss. 117. Capitis dolor à vermibus inter meninges, & putredine circa cerebrum ortus. p.67.

Oss. 118. Capitis dolor à verme inter calvariam & piam matrem latente. Ibid.

Oss. 119. Capitis dolor à verme nigratunica involuto, unde cerebelli substantia à dextro latere sejungebatur à reliquo corpore. p.68.

Oss. 120. Capitis dolor à vermiculis circa nates & anum in cerebro latentibus. p.69.

Oss. 121. Capitis dolor à Scorpionibus in cerebro natibus. p.70.

Oss. 122. Capitis dolor à sanguine aortam & cavam replente, ibidemque concrefcente. Ibid.

Oss. 123. Diuturnus capitis dolor cujus nullam deprehensa causa quam ulcus in ventriculo. Ibid.

# ADDITAMENTA ad Sectionem primam.

Oss. 1. Cephalalgia à lapillo inter duram piam, quæ matrem repperit. p.73.

Oss. 2. Cephalalgia à sinubus sanguine distentis; sero per cerebrum effuso &c. Ibid.

Oss. 3. Capitis dolor in qua pulmo ex parte consumptus; pericardium pure & sano sanguine opplerum. p.74.

Oss. 4. Cephalalgia in qua insignis cerebri suppurationes à natibus fluxit. Ibid.

Oss. 5. Cephalalgia à glandulis in cerebro prognatis ac inde orto hydrope capitis. p.75.

Oss. 6. Cephalalgia alteram capitis partem occupans à cerebri gangrenosi. p.76.

Oss. 7. Cephalalgia à cranio crassiori & suturis destituto; vasis meningum sanguine turgidis, & sero multo in ventriculos & cerebri basin effuso lb.

## SECTIO II.

### De Apoplexia.

Oss. 1. Apoplexia ab occlusionem vasorum in concursum omnium cerebri sinuum. Tom.I. p.77.

Oss. 2. Apoplexia in qua sanguis & frigidus & concretus. p.79.

Oss. 3. Apoplexia à grumo sanguinis in carotidibus. p.80.

Oss. 4. Apoplexia in qua sanguis extravasatus, ant abicessum repperit. Ibid.

- Obs. 4. Apoplexia ab arterie magnæ officio summe dilatato & corde sanguine distento. Tom. I. pag. 81.
- Obs. 6. Apoplexia ab immodico sanguinis in cerebrum exitu. p. 81.
- Obs. 7. Apoplexia ictum sequuta ob sanguinem effusum ex disrupto torculari vasisque finimis. Ibid.
- Obs. 8. Apoplexia valvulis sub oculo sinistro sequuta ob lacerum dextrum cerebri ventriculum, & effusum sanguinem ad cerebri basin. p. 83.
- Obs. 9. Apoplexia à sanguine sub duris meningibus postica parte effuso in basin cerebri, & fistulam spinæ dorsæ, cum sero cruento in ventriculis anterioribus. p. 84.
- Obs. 10. Apoplexia à sanguine ventriculos cerebri infarciens. p. 86.
- Obs. 11. Apoplexia à cerebri ventriculis concreto sanguine turgentibus, ex rupto vase plexus choroideidis. p. 87.
- Obs. 12. Apoplexia à sanguine concreto in utroque cerebri ventriculo; plurimo sero cruento in tertium & quartum devoluto; plexus choroideidis rami ruptura, & arterijs duræ meningis sanguine turgidis. Ibid.
- Obs. 13. Apoplexia à sanguine per cerebri gyros diffusio, & diffractis anterioribus vasis caroticis & vertebralibus. p. 88.
- Obs. 14. Apoplexia ab atro sanguine cerebrum occupante. Ibid.
- Obs. 15. Apoplexia à sanguine cerebrum ad basin usque suffundente, & eodem inter piam matrem ac cerebrum collecto, cum feri congestione inter ventriculos. Ibid.
- Obs. 16. Apoplexia à repletis sanguine sinibus. p. 90.
- Obs. 17. Apoplexia à sanguine ventriculum sinistram opplente. p. 91.
- Obs. 18. Apoplexia à parte cerebri sanguine suffusa; grumo magno sanguinis peculiari cavitare concluso; ex rupto insigni ramo arterie carotideidis anterioris. Ibid.
- Obs. 19. Apoplexia à sanguine in cerebri basin effuso ac concreto, arterias retiformes & plexum choroideum comprimente. p. 93.
- Obs. 20. Apoplexia à sanguine inter utramque meningem effuso, ut & circa cerebri basin, ad totam ejus substantiam & ventriculos. p. 94.
- Obs. 21. Apoplexia à sanguine in cerebri ventriculos ilabente ibique concreto; plexu choroideide quasi concluso. p. 98.
- Obs. 22. Apoplexia à sanguine supra & infra cerebri membranas effuso. Ibid.
- Obs. 23. Apoplexia à vasis cerebri sanguine turgidis & aqua limpidâ totam cerebri compagem inundante. p. 99.
- Obs. 24. Apoplexia valvulis sequuta ab humore ventriculos cerebri replente, & sanguine putrido circa os cuneiforme fractum. Ibid.
- Obs. 25. Apoplexia secundæ cranij laminæ fracturam sequuta, integra prima. Ibid.
- Obs. 26. Apoplexia & paralytis post valvulæ capitis, à cruoris copia intra cranium effusa. Ibid.
- Obs. 27. Apoplexia à sanguine seroso intra spatia meningum concluso; Lethum promovente sanguinis in thoracem ingenti effusione. Ibid.
- Obs. 28. Apoplexia à repletis sero ventriculis, & sanguine obstruente processus spinalis medullæ. p. 101.
- Obs. 29. Apoplexia à sanguine circa cerebri basin effusa. p. 102.
- Obs. 30. Apoplexia phlegmonem cerebri sequuta post gravem cephalalgiam. Ibid.
- Obs. 31. Apoplexia à viscido humore cerebrum opplente. p. 101.
- Obs. 32. Apoplexia à pituitosis humoribus spinalis medullæ principium occupantibus. p. 104.
- Obs. 33. Apoplexia à pituita crassa quarti ventriculi foramen obstruente. Ibid.
- Obs. 34. Apoplexia à crasso & viscido humore ad retiformem contextum invento. p. 105.
- Obs. 35. Apoplectici caput, pectoris regio, stomachus materia pituitosa infarcta repleta. p. 108.
- Obs. 36. Apoplexia à cerebro pituita perfuso; ejus venarum ab eodem obstructionem; ventriculos sero repletos, & polypum cordis fibræ adnatum. Ibid.
- Obs. 37. In plurimis Apoplexia extinctis, cerebri arterie vasa, viscidis corporibus, polyis dictis infarcta repleta. p. 110.
- Obs. 38. In Apoplectici sinistro cordis ventriculo pinguedo repleta. p. 111.
- Obs. 39. Apoplexiam ab humore aquoso per cerebri substantiam diffuso, ventriculos replente, cum sanguine atro & crasso in arteriis temporalibus. Ibid.
- Obs. 40. Apoplexia à sero plurimo in ventriculis cerebri, per substantiam diffuso, & in sacra fistula, hydatidibus in plexu choroideide. Ibid.
- Obs. 41. Apoplexia ab aqua plurima anfractus cerebri alluente; cerebri mollitie & flacciditate; mucos in glandula pituitaria &c. p. 113.
- Obs. 42. Apoplexia à seri & pituitæ copia in toto cerebro & ventriculis. p. 115.
- Obs. 43. Apoplexia ab aqua cerebri plicis implente & totam compagem inundante. p. 116.
- Obs. 44. Apoplexia levis à seroso humore in cerebro stagnante. Ibid.
- Obs. 45. Apoplexia à seri ingenti copia inter cranium & duram meningem, item in falce & illius reduplicatione, omnibusque cranij cavitatibus. Ibid.
- Obs. 46. Apoplexia à seroso humore anfractus cerebri alluente & ventriculos replente. p. 117.
- Obs. 47. Apoplexia à sero inter utramque meningem; inter piam ac cerebrum & cerebellum; madore cerebri substantiæ; repletionem ventriculorum, & effluxu ejusdem seri in fistulam sacram. Ibid.
- Obs. 48. Apoplexia à plurima aqua cerebrum diluente. p. 122.
- Obs. 49. Apoplexia ab abscessu seroso in cerebro. Ibid.
- Obs. 50. Apoplexia epilepsiam sequuta, à sero acri in cerebro, inter meningem & in ventriculis. Ibid.
- Obs. 51. Apoplexia à vesicis rotundis aquosis corpori calloso incumbenibus. p. 123.
- Obs. 52. Apoplexia ab abscessu in dura matre disrupto, cum corrosione tenuis & concisæ cerebri à pure inde manante. Ibid.
- Obs. 53. Apoplexia à tumore strumatoso inter cerebrum & cerebellum constituto. Ibid.
- Obs. 54. Apoplexia à cerebri subsidentia, dissolutione & fluiditate, ob pituitam ejus molem intigantem. Ibid.
- Appendix, De Apoplexia à cerebri subsidentia contingente, ob tumorem cranij resectum. p. 125.
- Obs. 55. Apoplexia à sanguine circa basin cerebri effuso, cum cerebelli laceratione. Ibid.
- Obs. 56. Apoplexia ab hydatidibus circa temporales arterias, cum cerebri flacciditate &c. Ibid.
- Obs. 57. Apoplexia citò interitens, cerebro omnino salvo & incolumi, solo vitio in pulmonibus apparente. Ibid.

- Obs. 58. Apoplectici cystis fellea decem calculis præ-  
gnans. Tom. j. p. 126.  
Obs. 59. Apoplexia à fulmine excitata. p. 127.  
Obs. 60. Fulmine tacti ac apoplectici sic mortui alia  
anatomie. Ibid.  
Obs. 61. Apoplexia lychiam sequuta, ob vitium  
renum calculis obfessorum, ac serum non exci-  
pientium. p. 128.

## ADDITAMENTA

## Ad Section. secundam, De Apoplexia.

- Obs. 1. **A** Apoplexia in sanguine in ventriculis cor-  
dis concreto, item in pulmonum va-  
sis sanguineis reperto. Tom. I. p. 128.  
Obs. 2. Apoplexia à sanguine in cerebro extravasa-  
to. p. 130.  
Obs. 3. Apoplexia à sanguine extravasato. Ibid.  
Obs. 4. Apoplexia in qua cerebri vasa insigniter di-  
stenta. p. 132.  
Obs. 5. Apoplexia in qua sanguis concretus & serum  
effusum in cerebro reperta. p. 133.  
Obs. 6. Apoplexia ex icteru, ubi sanguis extravasatus  
item abicessis unde materia multa vitidis in ven-  
triculis. p. 135.  
Obs. 7. Apoplexia in qua cerebrum sero inundatum.  
p. 137.  
Obs. 8. Apoplexia in qua carotis dextra offesa. Ibid.  
Obs. 9. Apoplexia post respirandi difficultatem, in  
qua splen putridus, pulmones purulenti, cordis  
thalamus dexteri excoriatus, &c. Ibid.  
Obs. 10. Apoplexia in qua cerebrum flaccidum;  
meninges humore musculo & tenaci, item ventri-  
culi & sinus eodem oppleti, cum polypo in cor-  
de. p. 138.  
Obs. 11. Apoplexia fortissima ex cerebri hydrope. Ibid.  
Obs. 12. Apoplexia fortissima post quinquennium  
recurrere à sanguine extravasato. p. 139.  
Obs. 13. Apoplexia in qua sanguis niger grumulosus  
ad duas prope libras (forsan melius uncias) in ce-  
rebri ventriculo dextro, serum in sinistro ad se-  
meniam, cum intermixtis arenulis; vasa undi-  
que varicosa; dura mater undique cranio adha-  
rens reperta. p. 141.  
Obs. 14. Apoplexia in qua vasa cerebri varicosa; se-  
rum multum effusum. p. 144.  
Obs. 15. Apoplexia à sanguine in dextrum cerebri  
& ventriculum effuso. p. 148.

## SECTIO III.

De Reliquis Affectibus Soporosis, Lethargo, Coma,  
Cataphora, Comate somnolento &  
vigilii.

- Obs. 1. **L**ethargus à sero cerebri anfractus exte-  
rior alluente. Tom. I. pag. 148.  
Obs. 2. De Somno naturali & præternaturali à latice  
aqualo cerebri meatu occupante in ventriculos  
dextulo. p. 150.  
Obs. 3. Lethargus ab extremis cerebri oris madore  
perfusis. Ibid.  
Obs. 4. Lethargus ab aqua limpida sub meningibus  
cerebri corticem obrepente & madescente. 151.  
APPEND. I. De Lethargo febri malè iudicæ succe-  
dente imperfectè soluto. p. 153.  
APPEND. II. De Lethargo ex usu opiatorum orto.  
Ibid.  
APPEND. III. De Lethargo à feri copia abortu, vesi-  
culæ Anat. Bonci.

- catiorum toti capiti applicatorum ope sanato.  
p. 154.  
Obs. 5. Carus ab aqua cerebri anfractus alluente &  
ventriculos implente. Ibid.  
Obs. 6. Sopor ab aqua duri matris circumfusa. p. 155.  
Obs. 7. Sopor ab aqua cerebrum inundante. p. 156.  
Obs. 8. Sopor ab humiditate copiosa in cerebro. Ibid.  
APPENDIX. De Cataphora à collectione humoris in-  
ter cranium & capitis cutem. Ibid.  
Obs. 9. Coma lethargicum ab aqua copia in ventri-  
culis. Ibid.  
Obs. 10. Lethargus à sero ad libere quantitatem ven-  
triculum cerebri dextrum implente. p. 157.  
Obs. 11. Sopor Lethargicus ab aqua anteriores duos  
ventriculos implente, substantiamque cerebri ita  
premente ut anfractus inconspicui essent. Ibid.  
Obs. 12. Comatosus affectus ab aqua citrina nervo-  
rum origini incumbente. Ibid.  
Obs. 13. Sopor profundus à sero ad caput amandato  
ob vitium tenuum perforatorum. Ibid.  
Obs. 14. Carus à sero in cerebro & ejusdem vasis re-  
dundante. p. 158.  
Obs. 15. Coma à refluxu feri ob calculum renum &  
vesicæ exire prohibiti. p. 159.  
Obs. 16. Lethargus in Apoplexiam deficiens à valis  
piæ meningis & sinu tertio sanguine rurgidis;  
ventriculis lateralibus pure ab ulceribus ibidem  
manantibus, oppletis. Ibid.  
Obs. 17. Sopor sequutus insignem bregmaris sinistri  
contusionem, ubi ossiculum cerebri immersum  
reperitum est. p. 161.  
Obs. 18. Lethargus gravem sinistrotum temporum  
contusionem sequutus, à sanguine coagulato &  
nigro lateralem ossis sphenoidis sinistri cavitatem  
adimplente. Ibid.  
Obs. 19. Coma à venis meningum sanguine melan-  
cholico repletis; aqua in ventriculis. Ibid.  
Obs. 20. Sopor à dura cerebri membrana sanguinem  
& pure suffusa. Ibid.  
Obs. 21. Lethargus à tumore scirrholo membranæ  
cerebri accreto, & aqua limpida cerebrum al-  
luente. Ibid.  
Obs. 22. Sopor à cerebri parte corrupta. Ibid.  
Obs. 23. Sopor à purulento humore circa cerebrum  
consistente; dura meninge sanguine suffusa. p. 163.  
Obs. 24. Carus à cerebri subsidentia, dissolutione, &  
fluiditate ex pituitæ copia. Ibid.  
Obs. 25. Sopor à flacciditate cerebri; lapide in eo  
cum aqua in prioribus ventriculis. Ibid.  
Obs. 26. Sopor à cerebri substantia sphacelata. Ibid.  
Obs. 27. Sopor ab abscessu in peneralibus cerebri.  
Ibid.  
Obs. 28. Cataphora indurata à catie ossis frontis &  
læsione superioris orbitæ. Ibid.  
Obs. 29. Sopor cum stupore à tumore duro in cere-  
bro, & aqua cerebrum irrigante. p. 163.  
Obs. 30. Sopor scorbuticorum & morti proximorum  
à spirituum penuria pender; quandoquidem ce-  
rebrum in illis ab illuvie serosa immune & satis  
exsuccum reperitur. Ibid.  
Obs. 31. Soporiterius capitis dolor ab abscessu sanio-  
so circa nervum opticum, una cum glutinosa &  
pellucida aqua. Ibid.  
Obs. 32. Sopor ab apostemate in cerebro vultus ca-  
pitis secuto. p. 164.  
Obs. 33. Lethargus ab abscessu & pure in anteriore  
cerebri parte. Ibid.  
Obs. 34. Lethargus à cerebri apostemate, cui sphace-  
lismus successit. Ibid.  
Obs. 35. Lethargus non semper sequitur ab apostema-  
te cerebri, nec apostema cerebri semper Lethar-  
gum producit. p. 165.

- Obs. 36. Carus à tumore phlegmonode meningum cerebrique exterioris ambitus. Tom. I. pag. 165.  
 Obs. 37. Carus ab abscessu tunicato post vulnus in capite genito. Ibid.  
 Obs. 38. Lethargus ab abscessu purulento in substantia cerebri, vulnus orbitæ securo, & ossiculo duram membranam pungente. Ibid.  
 Obs. 39. Lethargus symptomaticus à pulmonum vitio inductus. p. 166.  
 Obs. 40. Lethargo afflicti habuit calculos in meatu fellis quæ duodeno inseritur. p. 167.  
 Obs. 41. In quodam ab assumpto pio extincto, id cordi adhaesit deprehensum est. Ibid.  
 Obs. 42. Lethargus à vermibus in intestino tenui conclusis, sano cerebro. Ibid.  
 Obs. 43. Coma vigil à repletionem vasorum meningum & sero flavo in cerebri ventriculis. p. 168.  
 Obs. 44. Coma vigil in abscessu in substantia cerebri, & ossiculo duram meningem pungente. Ibid.  
 Obs. 45. Coma vigil ab aqua pluvialis in toto capite & corpore stagnante. Ibid.  
 Obs. 46. Coma vigil à venis cerebri varicosis; substantia cerebri sicca; sero multo in ventriculo medio. p. 169.  
 Obs. 47. Coma vigil à parvis quibusdam pilis, plexui choroidæo adnatis. Ibid.  
 Obs. 48. Coma vigil à pulmonibus tabidis parte sinistra, dextra vero humiditate multa suffusis. p. 170.  
 Obs. 49. Coma vigil in quo calculi meatum felleum obidentes reperti. Ibid.

## ADDITAMENTA

Ad Lib. I. Section. 3. De Reliquis affectibus  
Soporosis &c.

- Obs. I. Sopor Lethargicus à sero circa basin cerebri, medullam oblongam ac spinalem stagnante. Tom. I. pag. 170.  
 Obs. 2. Carus lethalis à percussio & disrupto osse temporis dextri, & sanguine sub eo extravasato è laceratis ibidem aliquibus duræ matris vasis, sine vulnere externo. p. 171.  
 Obs. 3. In quorundam lethargicorum cerebro, & ejus corruptio, & sanies, ac pus inventa. p. 172.  
 Obs. 4. Lethargus inflammationi pulmonum conjunctus ab insigni abscessu seroso in cerebro. Ibid.  
 Obs. 5. Lethargus ex Cephalalgia in quo tumor scirrhosus membranis accretus. p. 173.  
 Obs. 6. Comato Epilepticus in quo vasa cerebri ejusque membranas turgida, glandula passim illis appensa, ventriculi omnes aqua distenti. Ibid.  
 Obs. 7. Lethargus ab abscessu ossis cribriformis. p. 175.

## SECTIO IV.

## De Catalepsi seu Catacho.

- Obs. 1. Catalepsis à crasso sanguine quedam cerebri vasa replente, & serosa materia pollicem cerebri partem occupante. Tom. I. p. 176.  
 Obs. 2. Catalepsis à sanguine concreto in majori vena quæ medium caput preterit, & sero raso in posteriore cerebro. p. 177.  
 Obs. 3. In Catalepticis sanguis etiamnum concretus. p. 179.  
 Obs. 4. Catalepsis à sanguine nigro, & raso venas capitis varicosas reddente, cum cerebri & membranas ejus siccitate. p. 179.  
 Obs. 5. Catalepsis à cerebri circa superficiem siccitate exorta. Ibid.  
 Obs. 6. Catalepsis à sanguine concreto in vena ob hamum hydragyrum. p. 180.

## SECTIO V.

## De Insomniis &amp; Incubo.

- Obs. 1. Insomniis & Incubo cujusdam veterari, ventriculi cerebri aqua distenti reperti sunt. Tom. I. pag. 180.  
 Obs. 2. In quodam Incubo aliisque Cephalicis affectibus extincto, repertum cerebrum quo ad vena nigricans, cum parca materia saniosa in superficie, at multa & cum mucositate in sinistro ventriculo. p. 181.

## SECTIO VI.

## De Vigilis præter naturam.

- Obs. 1. Vigilia ob cerebri corticem humore destitutum oborta. Tom. I. pag. 183.  
 Obs. 2. Vigilia à meningum phlegmone. p. 185.  
 Obs. 3. Vigilia item à phlegmone cerebri. Ibid.  
 Obs. 4. Vigilia à plenitudine vasorum meningum, ulcere sub medio ossis sincipitis dextri; feri copia in ventriculis &c. Ibid.  
 Obs. 5. Vigilia à crasso sphaclero &c. p. 186.  
 Obs. 6. Vigilia ab abscessu cerebri. Ibid.  
 Obs. 7. Vigilia à vasis membranasum sanguine turgidis; ulcere sub sincipite dextro, & plexu choroidæo aliquatenus eroso. Ibid.  
 Obs. 8. Vigilia à pancreatis abscessu latente. Ibid.

## SECTIO VII.

## De Phrenitide, Paraphrenitide &amp; Delirio.

- Obs. 1. Phrenitidem non gigni à meningum phlegmone, nec paraphrenitidem à sepi inflammatione procedere, ex dissectionibus ostenditur. Tom. I. pag. 187.  
 Obs. 2. Phrenitis à retrocessu humoris biliosi erysipelas in tibia parientis, in pulmonis ac cerebri membranas irruentis, ubi pustulas excitavit. p. 189.  
 Obs. 3. Phrenitis à cerebri ejusque membranas inflammatione. p. 190.  
 Obs. 4. Phrenitis à pice matris inflammatione. Ibid.  
 Obs. 5. Phrenitis à duræ matris exulceratione; vasorum ejus ut & pice plenitudine, cum abscessu in cerebello flaccido. Ibid.  
 Obs. 6. Phrenitis in qua venæ cerebri varicosæ, medulla cerebri ut & membranae siccissimæ. Ibid.  
 Obs. 7. Phrenitis à tumore inflammatorio in cerebri substantia. p. 192.  
 Obs. 8. Phrenitis à vermine utramque meningem perforante. Ibid.  
 Obs. 9. Phrenitis à meningum inflammatione. Ibid.  
 Obs. 10. Phrenitis vulnus sequens, ubi abscessus sub calvaria genitus. p. 193.  
 Obs.

Obs. 11. Paraphrenitis ab inflammata dura meninge ac plexu choroideo; cum ichore inter meninges & cerebrum. Tom. I. pag. 193.

Obs. 12. Phrenitis ab abscessu sub cranio latente; putredine meningum ac particula cerebri substantiæ. Ibid.

Obs. 13. In Phrenitico nullæ phlegmones notæ reperiuntur in cerebro. p. 194.

Obs. 14. Phrenitis ab aqua cærulea cerebri ventriculos replente, unde sinister exesus erat. Ibid.

Obs. 15. Phrenitici cadaver exhibuit diaphragma gravi inflammatione correptum, hepaticque partem inferiorem, cum polypo in longitudinali duræ meningis sinu. p. 195.

Obs. 16. Phrenitis ab aqueo & pituitoso humore, in pluribus partibus cerebri, sine ulla inflammationis nota. Ibid.

Obs. 17. Phrenitis absque febre, cum inflammatione cerebri ac meningum. p. 196.

Obs. 18. Phrenitis ab inflammatione meningum. Ibid.

Obs. 19. Delirium a vasis meningum sanguine turgentibus & cerebri substantia aqua madida. p. 197.

Obs. 20. Paraphrenitis a vasis cerebri sanguine nigro turgentibus &c. p. 198.

Obs. 21. Delirium oculorum ab apostemate cerebri in sphacellum abeunte. Ibid.

Obs. 22. Delirium a tumore phlegmonode meningum. Ibid.

Obs. 23. Delirium a phlegmone intra calvariam, cum duræ meningis inflammatione. Ibid.

Obs. 24. Delirium a sanguine vasa meningum replente; ulcere sub medio fincipitis dextræ; plexu choroideo vitato. Ibid.

Obs. 25. Delirium ab ulceribus in ventriculo cerebri unde pure opplebantur, cum piz meningis vasorum distentione a sanguine. p. 199.

Obs. 26. Delirium vulnus fecutum a duræ meningis & cerebri phlegmone, unde sphacelus. Ibid.

Obs. 27. Delirium a sero tenui cerebrum madefaciente ac ejus ventriculos implente. Ibid.

Obs. 28. Delirium & amentia a sero plurima per cerebri & cerebelli substantiam pererrante. p. 200.

Obs. 29. Delirium a vasis cerebri ac cerebelli sanguine turgentibus. Ibid.

Obs. 30. Delirium a membranarum phlegmone. Ibid.

Obs. 31. Delirium a putredine dimidia cerebri partis; ventriculis aqua citreæ & pure occupatis. Ibid.

Obs. 32. Delirium ab abscessu profundo in cerebro. Ibid.

Obs. 33. Delirium a pure in cerebro cob hico. p. 201.

Obs. 34. Delirium a sanguine inter cranium & duram meningem, cum venis sanguine tumidis. Ibid.

Obs. 35. Delirium ab ingenti phlegmone intra calvariam, cum tumore duræ meningis. Ibid.

Obs. 36. Phrenitis a phlegmone postice cerebri partis. Ibid.

Obs. 37. Delirium ab inflammatione & suppuratone septi transversæ. p. 202.

Obs. 38. Delirium in quo pulmones corrupti & nigricantes. Ibid.

Obs. 39. Delirium a pulmonibus abscessibus tentatis. Ibid.

Obs. 40. Delirium ab inflammato impuro ventriculo ortum. Ibid.

Obs. 41. Delirium a tuberculo in ventriculo disraptum. Ibid.

Obs. 42. Delirium a vitio uretri. p. 203.

Obs. 43. Delirium ab abscessu in hepate. Ibid.

Obs. 44. Paraphrenitis a bile acerrima è cysti sellis

exudante; vasis cerebri & cordis sanguine nigro turgidis. p. 203.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Phrenitide.

Obs. I. Phrenitici Anatome plura in omnibus visceribus ac præcipue cerebro cutiosa exhibet. Tom. I. pag. 203.

SECTIO VIII.

De Mania & Rabie, seu Hydrophobia.

Obs. 1. Mania a siccitate cerebri in superficie, que flavedine tincta visa est. T. I. p. 105.

Obs. 2. Maniacus affectus in puero ab atra bile vasa duræ & piz matris occupante, ac in vasis partium vitalium & naturalium contenta. p. 108.

Obs. 3. In Maniacorum cerebro, aut in meningibus macula nigra deprehensa. p. 209.

Obs. 4. Meningum putredo in maniacis aliquando notata. Ibid.

Obs. 5. Mania a vermibus in cerebro. Ibid.

Obs. 6. Mania a venis cerebri varicosis. Ibid.

Obs. 7. Rabidi pericardium sine humore repletum ac ex parte consumptum; sinus cordis aridi. p. 210.

Obs. 8. In Hydrophobico summa siccitas viscerum reperiuntur. Ibid.

Obs. 9. In Lúporum Rabientium renibus serpentes nascuntur. p. 211.

Obs. 10. In Rabidis nihil anginosum deprehenditur. Ibid.

Obs. 11. In equis, bobus & ovibus rabie affectis, vermes in capite deprehensis. Ibid.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Mania & Rabie.

Obs. 1. In Rabidis œsophagus phlegmate repletur. p. 211.

Obs. 2. Hydrophobici ejusdem viscera variè affecta reperiuntur. p. 212.

Obs. 3. Rabidorum cerebrum vermibus scatere repletum. Ibid.

APPEND. In qua duplici historia præcipua hydrophoborum symptomata dilucide explicantur. p. 213.

Observatio item alia extra ordinem, capite scilicet de Convulsione; quæ in rabidi cadavere, intestina, ac orificium ventriculi utramque, passim maculis inflammatoriis oblecta, pulmones sanguine extravasato turgidi, ac pleuræ adherentes, Diaphragma inflammatum &c. reperiuntur. p. 214.

Item de Mania Observatio alia extra ordinem, scilicet capite de Melancholia; qua in maniacorum cerebrum multo sanguine seroso madidum; vasa plexus choroidei sanguine turgidiora, cum vesiculis lividis seu hydatidibus pluri formibus; septum lucidum punctis sanguineis fedatum &c. reperiuntur. p. 215.

Additamentum aliud ad eandem Sectionem

Quo, de Furorè Vterino.

Obs. 1. Furor uterinus in quo clytoris mire protuberantia; ovaria seu testes maxime amplitudinis. Tom. I. p. 216.

Cec. 3. Obs.

Obs. 2. Furor uterinus à semine in sinistro testiculo concluso, viâque ex eo ad uterum oclusa.  
Tom. I. pag. 220.

## SECTIO IX.

### De Melancholia & Affectione Hypochondriaci.

- Obs. 1. **I**N Melancholico venæ meningium sanguine atro turgidæ, cum aqua in ventriculis.  
Tom. I. pag. 221.
- Obs. 2. Melancholia à sanguine cerebri vasa replente, cum ventriculorum & plexus choroidei superficie mucosa oblita.  
Ibid.
- Obs. 3. Melancholia à sanguine nigro in venis tenuis meningis.  
p. 222.
- APPENDIX. De Melancholia ab affectu cerebri circa torcular.  
Ibid.
- Obs. 4. Melancholia ab humore atro in dextro cordis sinu contento.  
Ibid.
- Obs. 5. Melancholicorum quorundam cor aridum & exsuccum.  
p. 223.
- Obs. 6. Melancholia ab atro sanguine in cordis cavitate & abscessu prope sinistram auriculam.  
Ib.
- Obs. 7. Melancholia ab atro sanguine in corde, mesenterio exsiccatum &c.  
Ibid.
- Obs. 8. Melancholici cor arefactum repertum.  
pag. 224.
- Obs. 9. In melancholici corde vesicula atro sanguine plena reperta.  
p. 226.
- Obs. 10. In Melancholici cordis utroque sinu pituita vitrea reperta.  
Ibid.
- Obs. 11. Melancholia ab atro sanguine in corde.  
Ibidem.
- Obs. 12. Melancholia ab atro humore in corde.  
Ib.
- Obs. 13. In Melancholici cordis sinu sinistro reperta caro nigricans & glandulosa.  
Ibid.
- Obs. 14. Melancholia ab humore fetido in sinistro cordis ventriculo.  
Ibid.
- Obs. 15. In Melancholica pericardium undique cordi adnatum.  
Ibid.
- Obs. 16. Hypochondriaci affectio à ventriculi vitio & epiploæ humore melancholico infarcto.  
Ib.
- Obs. 17. De eodem argumento agit.  
p. 227.
- Obs. 18. Hypochondriaci affectionis sedes in pyloro reperta.  
Ibid.
- Obs. 19. Hypochondriaci affectio à liene male affecto & vasis mesaraicis atro sanguine turgidis.  
Ibid.
- Obs. 20. Hypochondriaci omentum vitiatum.  
Ibid.
- Obs. 21. Hypochondriacorum lien sæpe falso incusatur.  
Ibid.
- Obs. 22. Melancholia à lienis abscentia.  
p. 229.
- Obs. 23. Hypochondriaci lien durus & prægangdis.  
Ibid.
- Obs. 24. Hypochondriaci Melancholia à liene scirrholo.  
Ibid.
- Obs. 26. & 27. Sunt de eodem argumento.  
Ibid.
- Obs. 28. Melancholia à parvitate lienis.  
Ibid.
- Obs. 29. Melancholia à liene corrupto.  
p. 231.
- Obs. 30. Melancholiz sedes in vasis celiacis & mesentericis.  
Ibid.
- Obs. 31. Melancholia essentialis à cerebri venis atro sanguine plenæ, sanie & mucos in ventriculo sinistro, jecore & liene lividis; corde nigro sanguine repleto.  
p. 232.
- Obs. 32. Melancholia à Jecore nigricante, glanduloso, fistulis affecto &c.  
p. 234.
- Obs. 33. Melancholia ab atro humore in ventriculo;

pyloro à scirrholo atro oculo, mesenterio scirrholo & lapidoso.  
Tom. I. p. 234.

- Obs. 34. Affectio hypochondriaci à vicio ventriculi; pancreate & hepate duris.  
p. 236.
- Obs. 35. In melancholici ventriculo qui canam ibi vivam se gestare credebat, repertus tumor scirrholus.  
Ibid.
- Obs. 36. In Melancholico capsula attrahitur minoris & peculiaris figuræ cum parvo liene.  
p. 237.
- Obs. 37. In Hypochondriaci cadavere magna materia purule nata colluvies inter duas mesenterij tunicas reperta.  
Ibid.
- Obs. 38. In Melancholico Hypochondriaci Anteriori sub clavicula dextra repertum.  
p. 238.
- Obs. 39. In Melancholico omentum maximum & scirrholum ob transfusum è liene humorem melancholicum.  
p. 239.
- Obs. 40. In Melancholico Hypochondriaci, glandulæ mesenterij & omenti scirrholæ &c.  
p. 240.
- Obs. 41. Melancholia vicio cordis, pulmonum & jecoris crustorum, cum cerebri ventriculi corruptione.  
p. 241.
- Obs. 42. Melancholiz Hypochondriaci sedes in venis illis quæ alimentum è ventriculo excipiunt, sanguine crasso, ac tortefacto tumefactis, plerumque repertum.  
Ibid.
- Obs. 43. Melancholici vasa mesaraica nigro sanguine distenta sunt reperta.  
Ibid.
- Obs. 44. Melancholiz Hypochondriaci sedes effut plurimum in sinistro hypochondrio multo succo nigro scatente.  
p. 242.
- Obs. 45. In Hypochondriaci vasa mesaraica veluti varicosa & cancerosa evadunt.  
Ibid.
- Obs. 46. In Hypochondriaco mesenterium nigris vasculis oblitum; pancreas oblitum; Hepar parvum, nigrum scirrholum; Lien durus.  
Ibid.
- Obs. 47. In Hypochondriaci, Hemoptoica, ventriculus mareriam viscidam, spadicæ coloris præbuit, cum co pia sanguinis concreti & pyloro confectio.  
p. 243.
- Obs. 48. Puerpera ex merore mortua varia in toto cadavere exhibuit curiosa.  
p. 244.
- Obs. 49. Melancholia à vasis spermaticis femine corrupto relectis.  
p. 245.
- Obs. 50. Canis Melancholicus in cuius hepate vermibus repleto.  
Ibid.

## ADDIDAMENTA

### Ad Sectionem de Melancholia &c.

- Obs. 1. **D**E Mania jam supra allata proprio capite.  
Tom. I. p. 245.
- Obs. 2. Hypochondriaci mors ab inunctione mercuriali cum ejus Anazome, in qua varia reperta.  
p. 247.

## SECTIO X.

### De Imaginatione, Ratiocinatione, & Memoria depravatis & abolitis.

- Obs. 1. **A** Mentia à vitiosa cerebri conformatione, ob aquæ copiam cerebrum inferientem & distendentem.  
Tom. I. p. 251.
- Obs. 2. Oblivio & Desipientia à sinistra parte cerebri laxiore reddita, &c.  
p. 255.
- Obs. 3. Facultas nativa ob parvitatem cerebri & plexus intercostalis exilitatem.  
p. 256.
- Obs. 4. Mentia stupiditas à tumore globoso in cerebro & zanco humore ventriculo distendente.  
Ib.

APPENDIX. De fatuitate à vitiosa cerebri conforma-  
tione, cujus indicium præva futurarum dispositio.

Tom. j. pag. 257.

Obs. 5. Stoliditas à lapide in cerebro reperito, substantia ejus flaccida, & cerebri cum cerebello malè coherentià; Defectu glandulæ pinealis. Ibid.

Obs. 6. Stoliditas & feritas ex ossium capitis crassitie nimia, p. 258.

Obs. 7. Mentis stupor à sero bilioso caput replente. Ibid.

Obs. 8. Fatuitas à superficie cerebri sicca. Ibid.

Obs. 9. Mentis stupor ob cerebrum parvum, cum gyris paucioribus. Ibid.

Obs. 10. Fatuitas nativa ob cerebrum parvum & tenue. Ibid.

Obs. 11. Stupor mentis à dura meningē pustulis ob-  
sita; cerebri spiris nigro sanguine repletis &c. p. 259

Obs. 12. Stoliditas à vesicis corpori calloso incumben-  
tibus. Ibid.

Obs. 13. Mentis stupor à sero caput opplente. Ibid.

Obs. 14. Mentis hebetudo ob ventriculū sero &  
sanguine plenum. Ibid.

Obs. 15. Mentis stupor ab aqua cerebrum inundante. Ibid.

Obs. 16. Mentis ac corporis torpor & hebetudo à  
flacciditate cerebri, piuma perfusi, cum polyo  
cordis. Ibid.

Obs. 17. Fatuitas à superficie cerebri facillima &c. p. 260.

Obs. 18. Stupiditas in qua pars hepatis exterioris ni-  
gra. Ibid.

Obs. 19. Fatuitatis inveteratæ nulla in cerebro cau-  
sa deprehensa. Ibid.

Obs. 20. Oblivio à sero cerebri aofractus alluente. Ib.

APPENDIX. Ex leicis constitutione morum diversitas &c. p. 261.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Imaginatione &c. latis.

Obs. 1. Oves fatue cerebri catere deprehensa. Tom. j. p. 261.

Obs. 2. Fatui cerebri ventriculi humore nigro ple-  
ni. Ibid.

## SECTIO XI.

### De Vertigine.

Obs. 1. Vertigo à sero cerebri anfractus alluente,  
ventriculos item implente, cum arte-  
rijs venisque coalitis & glandulis ipsi aditis. To. j.  
pag. 262.

Obs. 2. Vertigo ob caput sero à suppressa urina re-  
pletum. p. 264.

Obs. 3. Vertigo à ventriculo cerebri altero aqua di-  
stento p. 265.

Obs. 4. Vertigo ab aqua in ventriculis cerebri. Ibid.

Obs. 5. Vertigo à vermibus in cerebro. Ibid.

Obs. 6. Vertigo ab abscessu in cerebro. Ibid.

Obs. 7. Vertigo à sanie & muco in sinistro ventricu-  
lo. Ibid.

Obs. 8. Vertigo ab abscessu aquoso in cerebro. Ibid.

Obs. 9. Vertigo à vesiculis aqueis in cerebri ventri-  
culis. p. 266.

Obs. 10. Vertigo ab abscessu juxta dextrum ventricu-  
lum. Ibid.

Obs. 11. Vertigo à cerebro aqua imbuta. p. 267.

Obs. 12. Vertigo à sero undique per cerebrum diffu-  
sa. p. 268.

Obs. 13. Vertigo à sphacelo cerebri in bove. p. 268.

Obs. 14. Vertigo vitio ventriculi nigro succo infar-  
cti. Ibid.

APPEND. De Vertigine gravissima, cum memoriæ ja-  
ctura, delirio & paralyti, feliciter curata. Ibid.

APPEND. De Vertigine ex aquæ limpide per oares  
distillatione delineata. p. 269.

APPEND. De Vertigine emetico curata. p. 270.

APPEND. De Vertigine astudinici curata. Ibid.

Obs. 15. Vertigo à semine in vasis seminarijs conclu-  
so. Ibid.

Obs. 16. Vertigo à nigro succo in ventriculo. Ibid.

Obs. 17. Vertigo à coarcescente in venis sanguine. Ib.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Vertigine.

Obs. 1. IN Vertiginoso omeotom putridum, jecur  
scirrhosum, ventriculi interior circa py-  
lorum facies quasi coacta, cum sacco nigro con-  
tento, Tom. j. p. 270.

## SECTIO XII.

### De Epilepsia.

Obs. 1. NEque cerebrum, neque meninges, sunt  
Epilepsia subjectum, quandoquidem  
illa non sequuta est ab ipsis pure vellicatis. Tom. j.  
pag. 271.

Obs. 2. Idiopathica Epilepsia ex ventriculorum io-  
sactu non semper suscitatur. p. 272.

Obs. 3. Epilepsia à castæ loterina etanij juxta cerebel-  
lum. Ibid.

Obs. 4. Epilepsia à vitio duræ meningis perforatæ  
& pustulis oblectæ, sanguine nigro per cerebri spi-  
ras sparsa, cum inflammatione atque hinc enata  
ventriculorum compressione. p. 274.

Obs. 5. Epilepsia à sero caput replente. Ibid.

Obs. 6. Epilepticorum cerebrum, ventriculi & sa-  
cra fistula plerumque aqua imbuta & repleta  
sunt. p. 275.

Obs. 7. Epilepsia ab aqua cerebrum alluente & pu-  
stulis, cum ventriculi vitio. p. 276.

Obs. 8. Epilepsia à sero cerebrum & ejus ventriculos  
implente. Ibid.

Obs. 9. Epilepsia à cerebri tribus ventriculis aqua  
turgidis. Ibid.

Obs. 10. Epilepsia à sero cerebri posticam partem  
præcipue opplente. Ibid.

Obs. 11. Epilepsia à sero in cerebro & ventriculis Ib.

Obs. 12. Epilepsia item à sero ibidem & in sacra  
fistula. Ibid.

Obs. 13. Epilepsia à sero acro in cerebro, cum vermi-  
bus in intestinis. Ibid.

Obs. 14. Epilepsia non sit ab obstructis ventriculis  
cerebri. p. 274.

Obs. 15. Epilepsia causa in humore limido, calido  
& acro. Ibid.

Obs. 16. Epilepsia ex oves & capræ ob feridam in ce-  
rebro humiditatem. p. 279.

Obs. 17. Epilepsia ab humore ferido in cerebri sub-  
stantia. Ibid.

Obs. 18. Epilepsia à paucio humore putri inter calva-  
riam & duram meningem. Ibid.

Obs. 19. Epilepsia ab humore in ventriculis cereb. Ib.

Obs. 20. Epilepsia ab apothematē in cerebro. p. 282.

Obs. 21. Epilepsia ab abscessu in cerebro. Ibid.

Obs. 22. Epilepsia à vulnere cum sanguinis effusione  
in cerebro. Ibid.



- Os s. 13. Epilepsia à Sphacelo cerebri post vulnus. Tom. I. p. 283.  
 Os s. 24. Epilepsia in qua polypus duræ meningis sinum occupavit. ibid.  
 Os s. 25. Epilepsia à gladioli frustulo in ipsa cerebri substantia impacto. ibid.  
 Os s. 26. Epilepsia à tuberculo caroso in cerebri ventriculo. ibid.  
 Os s. 27. Epilepsia ab ossis acuto juxta falem latente, cum duræ meningis gangliena. ibid.  
 Os s. 28. In Epileptico angustia nativa ventriculorum cerebri reperta. p. 284.  
 Os s. 29. Epilepsia à compressis cerebri ventriculis & sanguine in substantia ejus concreto. ibid.  
 Os s. 30. Epilepsia à materia adipi simili inter cerebri ventriculos. p. 285.  
 Os s. 31. In Epileptici cerebro nihil præter cereum & exilia quædam corpuscula in ventriculis apparuit. ibid.  
 Os s. 32. Epilepsia ab incurvatione dispois inter. ibid.

APPENDIX De prava futurarum dispositione in tribus epilepticis. ibid.

- Os s. 33. Epilepsia ab apostemate in cerebro. ibid.  
 Os s. 34. Epileptici motus per consensum à pulmone dextro ad dextro, nigerrimo, thoraci adhaerente cerebro & reliquis partibus salvis. p. 286.  
 Os s. 35. In Epileptico sinus cordis humore concreto oppleti. ibid.  
 Os s. 36. Epilepsia, illaso cerebro & ventriculis. p. 287.  
 Os s. 37. Cerebrum sæpe aquis immersum visum, non tamen sic inducta Epilepsia. ibid.  
 Os s. 38. In Epileptica cerebrum ac omnia viscera intacta reperta. ibid.  
 Os s. 39. In Epileptica solum pancreas malè affectum repertum. p. 288.  
 Os s. 40. Epileptico puello visum unice in intestinis repertum. p. 289.  
 Os s. 41. in cane Epileptico intestina vermicibus oblecta reperta. ibid.  
 Os s. 42. In infante Epileptico lien lapidosus quasi repertus. p. 290.  
 Os s. 43. In Epileptico omnia salva præter ventriculorum influxum membranarum tenuissimarum repertum. ibid.  
 Os s. 44. Epilepsia à suppelso semine. ibid.  
 Os s. 45. Epilepsia lethalis à levi palpebre vulnere. p. 291.  
 APPENDIX, De Epilepsia lethali in inguine dextro fomitem habente. ibid.

#### ADDITIONALIA

##### Ad Sectionem de Epilepsia.

- Os s. 1. Epilepsia à sanie putrida glutinosa in cerebro aut circa ejus meninges. Tom. I. p. 292.  
 Os s. 2. Epilepsia ob obstructos ramos vasorum jugularium ab humore concreto. ibid.  
 Os s. 3. Epilepsia Luis Venereæ soboles. ibid.  
 Os s. 4. Epilepsia à conformatione capitis ut plurimum dependet. p. 293.  
 Os s. 5. Epilepsia ab abscessu in cerebro. ibid.  
 Os s. 6. Epilepsia lethalis à plethora. p. 294.  
 Os s. 7. Epilepsia à sero acido. p. 296.  
 Os s. 8. Epilepsia ab humore gelatinoso cerebri sinu ac interstitia inter illud & membranas opplente. ibid.  
 Os s. 9. In Epileptico intestina erosa à gangliosa reperta. p. 297.  
 Os s. 10. Convulsionibus interpolant in infantulo testiculos in scroto delinquo. ibid.  
 Os s. 11. In Epileptici cadavere curiosa varia adnotata. Tom. I. p. 299.  
 Os s. 12. Anatome Piceglandarum Epilepsia enee. ibid.  
 Os s. 13. Anatome fringillæ Epileptica. ibid.  
 Os s. 14. In Epileptico verè singulari plura contra naturam in imo & medio ventris reperta. p. 300.  
 Os s. 15. In Epileptico sanguis extravasatus, ventris turgidus &c. p. 301.  
 Os s. 16. Infantuli Epileptici cadaverculum in omnibus ventribus varia curiosa exhibuit. p. 304.

## SECTIO XIII.

### De Convulsione & motibus Convulsivis.

- Os s. 1. Convulsio à sero cerebrum inundante & spinalem medullam exinde extenuatam. Tom. I. p. 305.  
 Os s. 2. Serum non semper causam convulsionum esse demonstratur ex cerebri eorum qui quantumvis illo oppleantur minime tamen convelluntur. p. 308.  
 Os s. 3. In iis qui à passimis in febribus enecti sunt serum acre in postica medulla oblongata patet, imò pellicula eam obvolvens disrumpitur quandoque reperta. p. 312.  
 Os s. 4. Convulsivus motus à sero intra omnes ventriculos fluctuante. p. 314.  
 APPENDIX, De Affectione Convulsiva in viro propter originem nervosam affectam. p. 315.  
 Os s. 5. Motus convulsivi aliquando in sero cerebrum irrigante, cerebelloque subiectum ventriculorum oppleant; aliquando nullam sensibilem causam habent. p. 319.  
 Os s. 6. Convulsionis febribus ante mortem se adjuvantis causa plerumque serum nervos in exitu afficiens. p. 320.  
 Os s. 7. Convulsivi motus à serosa illuvie cerebri omnes recessus occupante. p. 321.  
 Os s. 8. Convulsio à sero intra cranium, in cerebro ad ejus ventriculo quarto & spinali medulla. p. 322.  
 Os s. 9. Convulsio à sero cerebri ventriculo ac nervorum originem obfidente. p. 324.  
 Os s. 10. Convulsivi motus ab humore inter cranium & capitis cutem collecto. ibid.  
 Os s. 11. Convulsio à sanguine vitioso replente vasa meningum, & exulceratione duræ meningis, cum cerebelli abscessu. ibid.  
 Os s. 12. Convulsivi motus à vasis meningum turgidis cum eandem tumore phlegmonioso, & aqua plurima cerebri anfractus implente. p. 325.  
 Os s. 13. Convulsio ceryicæ & convulsivi motus à sanie & nunc in sinistro cerebri ventriculo. ibid.  
 Os s. 14. Convulsionibus vulnus occipitis sequitur, ob sanguinem in basin cerebri effusum unde cerebelli sideratio. p. 326.  
 Os s. 15. Opisthoronos à materia viscida, lutea ventriculos cerebri replente & initium nervorum prementente. ibid.  
 Os s. 16. Contractio dorû & incurvatio, affectus nervi spinæ ab acrimonia urinx, effusus è vesica l3 cera. p. 327.  
 Os s. 17. Contractio digitorum sinistræ manus succitate & gracilitate originis nervorum. ibid.  
 Os s. 18. Spasmodus dextræ partis corporis rigor, à succitate medullæ cerebri & membranarum, cum sero multo in ventriculo medio. ibid.  
 Os s. 19. Vixit membrorum distensiones à cerebro suppurato orire. p. 328.

- Obs. 20. Capitis involuntarius subitus à phlegmone pollicis partis cerebri. Tom. 1. Ibid.
- Obs. 21. Convulsiones ab abscessibus in cerebro latentibus. Ibid.
- Obs. 22. Spasmi à colluvie serosa cerebri varias partes occupante. Ibid.
- Obs. 23. Exemplum Convulsionum capitis vulnera sequentium, ob sanien, pus, vel abscessus in cerebro genita. p. 39.
- Obs. 24. Convulsivi motus à Diaphragmate ulcerato. p. 390.
- Obs. 25. Convulsivi motus ob ventriculum veneno affectum. p. 390.
- Obs. 26. Convulsiones à vertebis lumborum duabus ad medullam atque spinalem corosis. p. 391.
- Obs. 27. Motus Convulsivi à veripe intestinum duodenum perforante. Ibid.
- Obs. 28. In mulieris cerebro spasmo subito extincto nihil repetum est. Ibid.
- Obs. 29. Manuum & pedum contractio ac convulsio in quodam nullo in viscibus vitio apparente. Ibid.
- Obs. 30. Convulsio terribilis, vi cuius ossa femoris, humeri &c. fracta in corpore reperta sunt. p. 392.
- Obs. 31. Convulsivi motus calculos in uteribus subsistentes sequuti. Ibid.
- Obs. 32. Anatome equi cui os subito obrigit & clausum est, ob constitas maxillas à sero musculos eorum imbuente, & glandulas vicinas beneficiente. p. 393.
- Obs. 33. Capitis in sinistram partem convulsio, & motus convulsivi, à sanie & muco in sinistro cerebri ventriculo. p. 394.
- Obs. 34. Colli rigida durities ob ejus musculos corruptos. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Convulsione.

- Obs. 1. Convulsivi motus à materia pituitosa in cerebri concreta juxta nervos qui convelli visi sunt. Tom. 1. p. 394.
- Obs. 2. Convulsivi motus castrationem sequuti, ob processus petronet reliquias sphacelo affectas. p. 396.
- Obs. 3. In Puella miris convulsionibus cum aliis etiam symptomatibus exagitata, varia in omnibus ventribus repetuntur. p. 398.
- Obs. 4. Convulsiones maxie à tumore scirrhoso & aspero super lumbos petro. p. 399.

## SECTIO XIV.

### De Stupore, torpore, tremore, horrore, rigore, anxietate seu inquietudine.

- Obs. 1. Stupor à cerebelli substantia molliore, sanguine pituitoso diffidente Tom. 1. p. 344.
- Obs. 2. Stupor à sero flavo per anfractus cerebri oberrante & in ventriculis. p. 345.
- Obs. 3. Stupor à sero cerebrum inundante & spinalem medullam Ibid.
- Obs. 4. Stupor digitorum gangrenam precedens, à denegato spirituum influxu ob eos extrematum. p. 46.
- Obs. 5. Stupor in sensu tactus marionis lepta infectus, ob scirrhosum musculorum habitus constitutum. Ibid.
- Obs. 6. Stupor totius corporis viam pedum tremore &

- palpitatione continua. In viro cuius lien quadartus erat cartilaginea substantia incrassatus. Tom. 1. Ibid.
- Obs. 7. Tremor à sero subvirescentis coloris substantiam cerebri alluente, cujus portio in spinalem medullam infiltrat. p. 47.
- Obs. 8. Eadem cum mox precedente, addito scholio. p. 48.
- Obs. 9. Tremor à sanie & muco in sinistro cerebri ventriculo. Ibid.
- Obs. 10. Tremor à veripe in cerebro latente. Ibid.
- Obs. 11. Morbus tremulus equae, à glandulis maxillaribus & totius corporis, humore navefcente & acrimuriis. Ibid.
- Obs. 12. Horror perperuus ab impuro sanguine venarum toroque putulento. p. 49.
- Obs. 13. Horror à diffusionem feciei cerebri in spinalem medullam & partes membranas. Ibid.
- Obs. 14. Horror à colluvie materiei putulente, inter duas mesenterii tunicas latente. Ibid.
- Obs. 15. Rigor citra recalcrescentiam à putredine induta dimidiæ cerebri parti. Ibid.
- Obs. 16. Rigor à sero diffidente à corruptione uteri. p. 50.
- Obs. 17. Rigor pleuritidi suppuratum abeunt superinveniens. Ibid.
- Obs. 18. Rigor vehemens citra febrem, à bile citum jecoris cava coëctita. p. 51.
- Obs. 19. Anxietas à ventriculo per venenum inflammatum. Ibid.
- Obs. 20. Anxietas à pure à pleura in ventriculum illabente. Ibid.
- Obs. 21. Anxietas à lumbrico ovi ventriculi affixo. p. 52.
- Obs. 22. Anxietas à sanguine copiose intra thoracem effuso. Ibid.

APPENDIX De pure intra thoracem conclusa anxietatem faciente; quo evacuato, illa cessat. p. 53.

- Obs. 23. Anxietas à concretiscentie in vasis sanguine. Ibid.
- Obs. 24. Anxietas à pericardii inflammatione. Ibid.
- Obs. 25. Anxietas mediastini inflammatione. Ibid.
- Obs. 26. Anxietas à polyis in cordis sinibus &c. Ibid.

## SECTIO XV.

### De Paralyfi.

- Obs. 1. Paralyfis à dissolutione corporum cerebri strationum. Tom. 1. pag. 34.
- Obs. 2. Paralyfis à sero inter cranium & meninges diffuso, quantum ventriculum replente, & cerebellum ac spinæ indicium irrigante. p. 35.
- Obs. 3. Paralyfis à sero in factam fistulam illapso, ac totum cerebrum & cerebellum occupante. p. 36.
- Obs. 4. Hemiplegia à mollitie & flaviditate cerebelli sero plurimo in sacra fistula aquam medulla non adimplebar. p. 360.
- Obs. 5. Paralyfis ab excremento aqueo in spinam decumbente, unde dorsalis medullæ tumor, non vero nervorum obstructio. p. 363.
- APPENDIX De nervis sero immeris, unde nulla paralyfis, ni illi præterea comprimantur aut erodantur. p. 364.
- Obs. 6. Paralyfis colicos dolores sequuta à sero cerebri & spinalem medullam inundante. p. 365.
- Obs. 7. Paralyfis à sero in ventriculis cerebri & sacra fistula contento. p. 368.
- Obs. 8. Paralyfis à sero totius cerebrum madefaciente. Ibid.
- Obs. 9. Paralyfis ob anteriorem cerebri partem sanguine & sero plenam, corpus usum stratum com.

- compadimentibus Tom. 1. Ibid.
- OBS. 10. Paraplegia in phrenitico, ob fetum multum in ventriculo medio, cum siccitate medullæ cerebri & membranarum. p. 369.
- OBS. 11. Paralysis ab aqua limpida cerebri anfractus allente. Ibid.
- OBS. 12. Paralysis à sero inter utramque membranam, item inter ipsam & cerebrum ac cerebellum concluso cum madore substantiæ cerebri, repletionem ventriculorum, & effluxum humoris in spinam. Ibid.
- OBS. 13. Paralysis spacia à cerebro humidiora, ac sero immerso, nec non spinali medulla, quæ extenuata. p. 370.
- OBS. 14. Paralysis à sero inter cranium, & duram meningem, circa reduplicationem falcis ac in omnibus cranii cavitatibus. Ibid.
- OBS. 15. Paralysis ab aqua ventriculos cerebri omnes replente, & hinc ad corpus unum situm dissente. pag. 70.
- OBS. 16. Paralysis à cerebri ventriculis sanguine concreto repletis ex rupto plexu choroide. Ibid.
- OBS. 17. Paralysis à bile ad spinæ nervos detrusa. Ibid.
- OBS. 18. Paralysis ab apostemate cerebri. p. 371.
- OBS. 19. Paralysis à cerebri suppuratione ex ichu. Ibid.
- OBS. 20. Paralysis à pure inter cranium & duram meningem. Ibid.
- OBS. 21. Paralysis ab abscessu cerebri & aqua in ventriculo ejus sinistro. p. 372.
- OBS. 22. Paralysis à cerebro post vulnus ex parte exhausto. p. 373.
- OBS. 23. Paralysis à laxis cranij suturis. Ibid.
- OBS. 24. Paralysis ex ichore à cranij carie exudante. Ibid.
- OBS. 25. Paralysis à cerebri apostemate. Ibid.
- OBS. 26. Paralysis crurum ab affectu spinali medulla è regione renis sinistri pariter affecti. Ibid.
- OBS. 27. Exempla varia paralyseos cerebri vulnus sequuta, ob variam cerebri læsionem. Ibid.
- OBS. 28. Paralytici lue venerea inquinati membranae cerebri cransio cartilago, tenacissimè adhaerebant. p. 384.
- OBS. 29. Paralysis partium inferiorum ob contusam medullam à globo sel opetato. Ibid.
- OBS. 30. Imbecillitas totius corporis & *diversitas* à liene & hepate semiputridis. p. 385.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Paralyti.

- OBS. 1. **P**aralytici in quo cerebri meninges sibi invicem adnatæ ichor serosus & cruentus circa cerebellum & basin cerebri copiose stagnans &c. Tom. 1. pag. 376.
- OBS. 2. Paralysis à bile degenerare undique aggregata. p. 379.

- OBS. 3. In Hydrocephalo glandule cerebri immiscunt & in conspectum veniunt. Tom. 1. Ibid.
- OBS. 4. Hydrocephalus ab aqua cerebri ventriculis distendente. Ibid.
- OBS. 5. Hydrocephalus ab aqua cerebri spacia occupante; idque ad angustias redigente. p. 381.
- OBS. 6. Hydrocephalus à cerebri ventriculis aqua repletis. Ibid.
- OBS. 7. Hydrocephalus ab humore mediam tunicam cerebri partem occupante. Ibid.
- OBS. 8. Hydrocephalus à sero copioso cranio contento unde fissuræ non parum dehiscunt. p. 384.
- OBS. 9. Hydrocephalicus in quo cerebrum adhaeret. Ibid.
- OBS. 10. Hydrocephalicus cerebrum pilam palmarem non excedens. Ibid.
- OBS. 11. Hydrocephalus ab aqua in duplicata dura meninge contenta, absente cerebro. Ibid.
- OBS. 12. Hydrocephalus ab aqua cerebrum ita comprimente ut deesse videretur. p. 385.
- OBS. 13. In Hydrocephalicis tenuis meninx à cerebro facile avellitur. Ibid.
- OBS. 14. Hydrocephalus ab aqua cerebri ventriculis opplente, cerebrique substantiam adeo comprimente ut anfractus inconspicui redderentur. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Hydrocephalo.

- OBS. 1. **H**ydrocephalus in quo plures aquæ immiscuitur. Tom. 1. p. 387.
- OBS. 2. Hydrocephalus in fætu abortivo in quo matris serum cruentum. Ibid.
- OBS. 3. Hydrocephalus cum vesica carnosa circa tunicam sagittalem. Ibid.
- OBS. 4. Hydrocephalus virio spinæ bifida. p. 389.
- OBS. 5. Hydrocephalus ingens in quo cerebrum non parum diminutum ac ejus radix in fibras quasi dissoluta, cerebello integro. p. 390.
- OBS. 6. Hydrocephalus à cerebro gelatine molis pellucidæ immerso, cum ichore aquoso in ventriculos effuso. p. 391.
- OBS. 7. Hydrocephalicorum plures dissensiones. pag. 391.
- OBS. 8. Hydrocephalus in substantia medullari cerebri. Ibid.
- OBS. 9. Hydrocephalus in quo cerebrum & cerebellum non parum in magnitudine & figura alteratur, ossa bregmatica & occipitis ad posteriora & in vicem reclinata &c. Ibid.
- OBS. 10. Hydrocephalus internus cum violentissimis reatum verius tractatione convulsiva capitis. p. 392.
- OBS. 11. Hydrocephalus unde liber plus quam viginti quatuor ichoris producebant. p. 394.
- OBS. 12. Hydrocephalicorum varis Anatomiz. Ibid.

## SECTIO XVI.

## De Hydrocephalo, seu Hydrope capitis.

- OBS. 1. **H**ydrocephalus ab aqua inter cranium & pericranium collecta productus. Tom. 1. pag. 379.
- OBS. 2. Hydrocephalus ab aqua in anfractibus cerebri. p. 384.
- OBS. 3. Ab Hydrocephalo interno processus mammillares corumpi. Ibid.
- OBS. 4. In Hydrocephalo plexus choroideus collabitur ob laxatam glandulam pinealem. Ibid.

## SECTIO XVII.

## De Catarrho.

- OBS. 1. **V**ias Catarrhorum per ossa ethmoidalia & sphenoides impervias esse ostendit anatome: Aliæque itinera dedit. Tom. 1. p. 400.
- OBS. 2. Catarrhi pericranii obidentes, à cerebro originem non ducentes. p. 403.
- OBS. 3. Sero à cerebro in pulmones delivium patitur ductus, phthisicos causam non esse ex observationibus coustat anatomicis. p. 405.
- OBS. 4. Anatome equi coryza laborantis, ob vitium sanguinis illi cerebro. p. 406.

- Obs. 5. Coryza laborantium capita difsecta, exhibuerunt vasa per membranam oris, pituitariam dictam, disseminata, diffusiota. Tom. 1. Ibid.
- Obs. 6. Muci & spuri carentia, ac urinae paucitas & serum in cerebro suppressum. 408.
- Obs. 7. Colluvies ferola catarrhi materia colligitur in glandulis pleam choroidæ adfisis, unde in ventriculos extillat. p. 409.
- Obs. 8. In Catarrho cerebri plusquam libra tenacioris feri inter duram & tenuem meningem reperiatur. Ibid.
- Obs. 9. A continuo catarrhi influxu, foramine in basi calvarie exesa & ampliata reperi. Ibid.
- Obs. 10. Coryza tumore globosa in cerebro & aqua in ventriculis. p. 410.
- APPENDIX I. De Coryza singulari, seu vesicula sero plena, extra naves quandoque propendente, ac serum stillantem fundente. Ibid.
- APPENDIX II. De Phlegmatonegia. Ibid.
- Obs. 11. Catarrhus suffocativus in molliere, cujus cerebrum itersum fuit, pulmones soli vitati. Ibid.
- Obs. 12. Romani fluxionibus maxime obnoxii, ac in plerisque post obitum pulmonum varia læsio deprehenditur. p. 411.
- Obs. 13. Catarrhus vitio cerebri humidioris generis. Ibid.
- Obs. 14. Catarrhus suffocans à cerebro molliore & fiacido; copia feri inter utramque meningem; anfractuum superficie gelatina quadam obducta &c. p. 412.
- Obs. 15. Catarrhus suffocativus à cerebri laxitate & mollietate. p. 412.
- Obs. 16. In corde, aut in cerebro, aut in utrisque; eorum qui à catarrho suffocativo extincti sunt polypi aut concretiones reperiuntur. Ibid.
- APPENDIX III. De Catarrho externo, extra calviam, à summo capitis vertice in externas & subditas partes delabente, contra Fernelium, p. 414.

# ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Catarrho.

- Obs. 1. Catarrho suffocativo defunctus exhibuit hepatis magnum & lapidem in cysti fellea. Tom. 1. pag. 418.
- Obs. 2. Catarrhus pectioax pithisim accersiens cerebro in substantia fiacido, & in extrema superficie quasi siderato, cum initio corruptionis principii spinalis medulle, ac meningum alteratione. Ibid.

# SECTIO XVIII.

## De Oculorum affectibus.

- Obs. 1. Amaurosis à tumore globoso in cerebro nervos opticos prementente. Tom. 1. p. 419.
- Obs. 2. Amaurosis ob vesicam nervos opticos tunc crucifixam prementem. p. 420.
- APPENDIX I. De Gutta serena illico exorta à sanguinis evena frontis educatione. Ibid.
- Obs. 3. Cæcitas ab extenuatione nervorum opticonum. p. 421.
- Obs. 4. Visus privatus ab abscessu in processibus mammillaribus. Ibid.
- Obs. 5. Amaurosis à subdencia ventriculorum cerebri & marcote nervorum opticonum. Ibid.
- Obs. 6. Cæcitas à putredine humoris vitrei & verme in eo reperi. p. 422.
- Obs. 7. Amaurosis à sero copioso inter utramque me-

- ningem cerebrum deprimente. Tom. 1. Ibid.
- Obs. 8. Amaurosis à contusione nervorum opticonum. Ibid.
- Obs. 9. Amaurosis ab aqua cerebri corticem madefaciens. Ibid.
- Obs. 10. Cæcitas indolis à tumore siccotomario inter cerebrum & cerebellum. Ibid.
- Obs. 11. Visus amissio in uno oculo, ob cavitatem cerebri anteriorem sanguine cum feri copia plenam. Ibid.
- Obs. 12. Cæcitas ab aqua cerebrum inundante. p. 423.
- Obs. 13. Cæcitas ob nervos opticos vi aquæ in hydrocephalo corruptos. Ibid.
- Obs. 14. Visus diminutio in vetula, cui pars cerebri sanguine suffusa & mollior reperi, cum insigni gramo sanguinis, peculiari raritate conclusa. Ibid.
- Obs. 15. Amblyopia ab excedente in cerebri ventriculis anterioribus humiditate. Ibid.
- APPENDIX I. De Gutta serena, visusque abolitione aut diminutione orta quandoque ab obftructione aut condictione filamentorum nerveorum corpora striata adeuntium. Ibid.
- Obs. 16. Catarrhe nigre causam in nervo optico obftructionem non semper consistere ostendit anatome, sed in vitreo humore & crystallini absentia. p. 424.
- Obs. 17. Visus debilitas ab extenuatione nervi visorii. Ibid.
- Obs. 18. Saffusiois causis plerumque in crystallini humoris incassatione. Ibid.
- Obs. 19. Cæcitas causa in brutis multiplex deprehensa. Ibid.
- Obs. 20. Hypochyma non oritur ab humore in oculis influente, sed potius ab humoris aquei crassitie. p. 425.
- Obs. 21. Saffusio aliquando inter corneam & aream tonicam nascitur. Ibid.
- Obs. 22. Saffusio aliquando gignitur à mucositate tenaci citica foramen aures sensum coarctante, illiusque margini interiori adherente. pag. 426.
- Obs. 23. Cæcitas à corruptione nervorum opticonum. p. 427.
- Obs. 24. Cæcitas à nervis optici crassescitis & fragilibus. Ibid.
- Obs. 25. Oculi ob *exanopsia* extirpatio, cujus humores in sebacem erant conversi amateriam. Ibid.
- Obs. 26. Oculum prociens ob tumorem pone eum delitescentem. p. 428.
- Obs. 27. Oculi dextri marcor' ab ætate ineunte ob nervum dextrum tenuiorem sinistro ultra conjunctionem. p. 429.
- Obs. 28. Oculi prociens ob tumorem ciliarium inter & duram materiem delitescentem. Ibid.
- Obs. 29. Strabismus unius oculi & resolutio superioris palpebre ab humore multo cerebrum nervumque oculi motorium alluente. Ibid.
- Obs. 30. Oculi dextri dolor ob abscessum in cerebro natum, ventriculumque sinistram compressum. p. 430.
- Obs. 31. Oculum attolendi impotentia ab ingenti feri copia inter cerebrum & meningas, anteriori parte collecta. Ibid.
- Obs. 32. Lachrymarum proventus ab insigni aque copia in anterioribus cerebri ventriculis, cum cranio membranaceo. Ibid.
- Obs. 33. Lachrymarum ubertas ab aquæ copia sub pia meningē & in ventriculis cerebri. Ibid.
- Obs. 34. Humiditas ab oculis ad naves deferenda interceptio, ob calculum in glandula lacrymali contentum. Ibid.

APPENDIX I. De lacrymarum origine. p. 431.

APPENDIX II. De causis Myopie & Nyctalopie. ab

- ab humoris crystallini situ diverso. Tom. I. p. 431.  
Obs. 34. Oculi dolor à pure inter cerebrum & membranas delitescens. p. 432.  
Obs. 35. Oculi dolor ab abscessu tunicato in cerebro. Ibid.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Oculorum Affectionibus.

- Obs. I. **D**E Lacrymarum ubertate à redundantia cerebri humiditate manantium, Tom. I. pag. 431.  
Obs. 2. Cæcitas à lapide in nervis opticis sito. p. 433.  
Obs. 3. Amaurosin ab obstructione nervorum opticorum fieri posse ostendit anatome. Ibid.  
Obs. 4. Cataractæ sedes est spatium quod inter uveam laxam & anteriorem partem humoris crystallini interjacet. p. 434.  
Obs. 5. In Cataracta colliquescit humor crystallinus, humorisque membrana dissoluta pupillæ adheret. Ibid.

SECTIO XIX.

De Aurium Affectionibus.

- Obs. I. **A**ures purulentæ ab abscessu cerebri T. I. pag. 435.  
Obs. 2. Surditas à tumore stomatamico inter cerebri & cerebellum. Ibid.  
Obs. 3. Surditas cum tinnitu, à redundantia aquei humoris & bdella in cerebro. Ibid.  
Obs. 4. Surditas à nativitate ob defectum ossiculi in-  
cudis dicti. p. 436.  
APPEND. De usu membranz tympani dictæ, quod  
meliori acutiorique auditui tantum conferat. p. 437.  
Obs. 5. Auditus læsio à foridibus aurium lapidescentibus. Ibid.  
Obs. 6. Aurium dolor à cerebro humidior. Ibid.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Aurium Affectionibus.

- Obs. I. **S**urditas à membrana tympani crassiore. Tom. I. p. 438.  
Obs. 2. Surditas à mucositate tympani obidentem. p. 439.  
Obs. 3. Surditas à membrana tympani crassiori. Ibid.  
Obs. 4. Auditus læsio ob excrementa crustulæ in-  
star membranz tympani adhaerentia. p. 440.  
Obs. 5. Auditus læsio ob carnem nativam membrana dictæ obrensam. Ibid.  
Obs. 6. Cur plures sensu auditus à nativitate priventur quam alio quopiam, causa ex nervorum origine detecta. p. 440.  
Obs. 7. Auditus acutior piofecta à tergemino urrinque nervo auditorio. Ibid.

SECTIO XX.

De Narium Affectionibus, Odoratus læsione, Polypo, Excretionibus p. n. Hæmorrhagia, Sternutatione.

- Obs. I. **O**doratus amissio ob abscessus in processibus mammillaribus. Tom. I. pag. 441.

- Obs. 2. Odoratus privatio ob dehegatos nervos nasales narium internæ. p. 442.  
Obs. 3. Odoratus privatio ob defectum papillarum processuum & nervorum partis. Ibid.  
Obs. 4. Odoratus amissio ob lapidem circa cerebri basin inclusum. p. 443.  
Obs. 5. Odoratus amissio ob fedorem illecestem circa olfactus organa cohibitam, unde vermes duo educti. Ibid.  
Obs. 6. Olfactus destructio in fumisigo ob consumptos processus mammillares. Ibid.  
Obs. 7. Odorum post remoram rem odorem pertinax in naribus mora pendet ex eo quod osfrontis supra supercilia insigniori cavitate prædum est. p. 444.  
Obs. 8. Polypus narium odoris pedibus donatus, à concretis pituita ortus. Ibid.  
Obs. 9. Polypus narium ex viscerum imi ventris, ille cerebro ortum ducens. p. 445.  
Obs. 10. Mucus graveolens è naribus prodians à cerebri substantia copioso humori innatante. p. 446.  
Obs. 11. Pus per nares excretum à pulmonibus inflammatione & abscessu affectis. Ibid.  
Obs. 12. Excretio materiæ cruentæ & saniosæ è naribus, ab apostemate cerebri. Ibid.  
Obs. 13. Excretio muci fetidi è naribus, ob copiosum humorem cerebro infarctum. Ibid.  
Obs. 14. Hæmorrhagia ab hepatis & lienis scinbo, cordis vitio &c. Ibid.  
APPEND. I. Qua adfertur exemplum Hæmorrhagiæ ob fibras motrices arteriarum spasmodicè affectas, contingentis. p. 447.  
APPEND. II. De viis per quas sanguis in Hæmorrhagiâ erumpit. p. 448.  
Obs. 15. In iis qui ob narium Hæmorrhagiâ moeni sunt, sinus cerebri & torcular controla reperiuntur. p. 449.  
Obs. 17. Hæmorrhagia ab hepatis vel lienis vino. Ibid.  
Obs. 17. A Sternutatione sæpius concitato mors ob disruptas arterias & meninges cerebrum cingentes. Ibid.  
APPENDIX, Quod Hirudo naribus admodum in cerebrum irrepere non potest. p. 450.

SECTIO XXI.

De Oris affectionibus, Labiorum, Gingivarum, Dentium, Palati, Gule, Lingue, Salivæ defectu.

- Obs. I. **G**ingivarum erosio incurabilis, à vermium abundantia in intestinis. Tom. I. pag. 451.  
Obs. 2. Aphthosum os & Gurgulio à siderato intus thorace. Ibid.  
Obs. 3. Oris ariditas in quodam cujus jecoris summa pars apostemate obfessa erat. Ibid.  
Obs. 4. Oris fetor à Thymo corruptis humoribus infarctis. p. 452.  
Obs. 5. Oris fetor à putredine intestinorum & omnium interiorum viscerum. Ibid.  
Obs. 6. Hæmoptoeus cujus anima admodum excens fuit, citra pulmonum ulcus. Ibid.  
Obs. 7. Hæmoptoeus & fetor oris à lobis pulmonis sinistro, scirrhoso reddito, trajectionem liberam sanguinis impediens. p. 453.  
Obs. 8. Oris fetor ab ulcere ventriculi. p. 453.  
Obs. 9. Oris fetor à pulmonibus. p. 454.  
Obs. 10. Oris fetor à pylori laxitate. Ibid.

OBS. 11. Oris fetor ab Epilpſi putredine &c. Tom. I.

OBS. 12. Oris amaro à poro cholidicho fundo ventriculi infecto. Ibid.

OBS. 13. Oris gangrenæ à mercurio, poſt ſitum in cerebro relicto. Ibid.

OBS. 14. Fauces aphris & mucagine obductæ, à pulmonibus aridis, mucagine illa obductis. p. 455.

OBS. 15. Guſu dolor ab inflammatis ſummis pulmonibus. Ibid.

OBS. 16. Saliva ex ore nertim manans, læſis buccarum glandulis, eorumque ductibus ſalivalibus. p. 456.

OBS. 17. Salivæ defectus ab obſtructione ductuum ſalivarium à glandulis ortorum. Ibid.

OBS. 18. Labiorum intumefcentia à glandularum ſolacate copia. p. 458.

OBS. 19. Lingua in pelliculas craſſas & glutinoſas vi peſtilentis febris reſoluta, ob ſiderationem viſcerum quorundam. Ibid.

OBS. 19. Linguae nigredo à pulmonibus retortidis, cum hydropne thoracis dextra. p. 459.

OBS. 20. Lingua nigra ob corruptam in utero ſecundinam. Ibid.

OBS. 21. Linguae & faucium nigredo, à nigro humore in arteria venaſa & aorta conſoſo. Ibid.

OBS. 22. Linguae ſiccitas & rubor à parte ſiniſtra pulmonum tibiſa; parulenta materia in ſiniſtra thoracis parte. p. 460.

OBS. 23. Linguae ſiccitas in quodam cui pulmones circa doſum corrupti reperti ſunt. Ibid.

OBS. 24. Lingua ſcabra & nigra in quodam cui carbo peſtilens in ventriculo repertus eſt. p. 461.

OBS. 25. Linguae ſcabrities & nigredo in febre inducitur à vitio & intemperie calida ac ſicca ventriculi & jecoris. Ibid.

OBS. 26. Lingua ſordida, aſpera & rubra à pulmonibus inflammatis. p. 462.

OBS. 27. Lingua extra os perpetuo exerta, ob pulmonum incendium, puſtulis per membranam obſtorum. Ibid.

OBS. 28. A Gingivarum craſſitie dentium erupcio impedita, unde mors. Ibid.

OBS. 29. Dentium dolor & caries ab humore è capite per meatum peculiarem in cavitatem maxillæ ſuperiori inſculptam ſtillante. p. 463.

OBS. 30. Dentium dolor à ſero flavo circa corpus ſalciforme contento. Ibid.

OBS. 31. Dentium doloris pulſatorii cauſa pendet ab affluxu humorum per arterias in vaſis obſtructionis pariente, manifeſtis in dente bubulo. p. 464.

OBS. 32. A reſecto dente prominulo convulſiones & mors, ob nervum illi inſertum ſimul abſciſſum, in ſegmine conſpicuum. Ibid.

OBS. 33. Dentium dolor à vermiculis in eorum caver-nulis. p. 465.

OBS. 34. Dentes decidui ab eorum alveolis materia gypſea inſtruſtis. Ibid.

OBS. 35. Guſtus privatio ob vitioſum nervorum ſitum. Ibid.

APPEND. De Guſtus privatione à læſione nervi illi ſenſui deſtinato. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Affectibus Oris.

OBS. 1. Lingua affectus ventriculi, sanguinis & jecoris potius denotat, quam pulmonum. Tom. I. pag. 466.

APPEND. De Generatione tumoris sub lingua qui batrachos, seu ranula dicitur, Ibid.

Index Anat. Veneti.

## SECTIO XXII.

### De Vitiis Vocis & Scrimosis.

OBS. 1. A Phonis & Rancedo ab inflammata aspera arteria. Tom. I. pag. 467.

OBS. 2. Vocis læſio ob rumorem exortui tracheæ innatum. p. 468.

OBS. 3. Vocis amiſſio à lapidibus aſperam arteriam & nervum recurrentem prementibus. Ibid.

OBS. 4. Vox obſcura ob pulmones ſcirrhofos &c. Ibid.

OBS. 5. Vox clauſa ob fragmenta bronchiorum à ſubſtancia pulmonum avulſa. Ibid.

OBS. 6. Vox intercepta ob nummum venarum in gula ſubſiſtentem &c. p. 469.

OBS. 7. Aphonis à ſiccitate cerebri & nervorum origine ſolito graciliori. Ibid.

OBS. 8. Aphonis ab inflammatione meningum &c. Ibid.

OBS. 9. Aphonis ab abſceſſu tunicarum in cerebro poſt vulnos. Ibid.

OBS. 10. Aphonis à dextra cerebri parte parulenta. Ibid.

OBS. 11. Aphonis ab abſceſſu in pericardio. p. 470.

OBS. 12. Aphonis ab humore concreto in cordis ventriculis. Ibid.

OBS. 13. Vox deficiens ob pulmonis vomitum &c. lb.

OBS. 14. Aphonis à vitio pulmonum corruptorum. Ibid.

OBS. 15. Vox rauca ob ſpasmus cerebri vitio ortum. Ibid.

OBS. 16. Rancedo ob thymum corruptis humoribus pleoom. Ibid.

OBS. 17. Vox impedita ob variam pulmonum læſionem. Ibid.

OBS. 18. Rancoris ab abſceſſu in ventriculo. p. 471.

APPEND. I. Quod Aphonis ſit medius inter Apoplexiam & Epilepſiam affectus. Ibid.

APPEND. II. Vocis interceptionis, ut & ſomnolentis iis acciſſentis qui torturæ ſubiſciuntur, ratio ex fundameotis anatomicis deducta. p. 472.

OBS. 19. Loquela vitiat in iis quibus os frontis ſinu non eſt excavatum. Ibid.

OBS. 20. Balbuties vitio lingue jugiter irrigatæ à ſero humore ſtillante è clyſide in cerebro eo tepleta. p. 473.

OBS. 21. Balbuties ſit aliquando à defectu foraminum quarti illis ſuperioris maxillæ. Ibid.

OBS. 22. Loquela impedita ob epiglottidem induratum. Ibid.

OBS. 23. Mutitas ob deficiens os incus dictum. Ibid.

OBS. 24. Loquela impedimento, cerebri malam conformationem, ſero undique ſuſſuſi, ſequuntur. p. 474.

## SECTIO XXIII.

### De Angina.

OBS. 1. Angina latens à pulmonis abſceſſu purulento. Tom. I. p. 476.

OBS. 2. Angina latens ab inflammatione pulmonum in gangrenam deſinente; tumore thymi pblegmonode &c. p. 478.

OBS. 3. Angina peſtilentia in capite ſomitem habet. p. 479.

OBS. 4. Angina à pituita mucoſa citrina inter cutem & mſculos temporarios, cum longo ejuſdem decurſu ad malis uſque &c. p. 482.

D d d Apd.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Angina.

Obs. 1. **A**ngina à jecore corrupto, salvo larynge.  
Tom. I. pag. 482.

**ANATOMIÆ PRACTICÆ**

## LIBER II.

## SECTIO I.

## De Respiratione laesa.

Obs. 1. **D**yspnœa ab infixo aspectu arterie officulo.  
Tom. I. p. 483.

Obs. 2. Dyspnœa à pituita lenta intra tracheam. p. 484.

Obs. 3. Dyspnœa à lapidibus asperam arteriam prementibus.  
P. 485.

APPENDIX. De Spiritu difficili ob petamen nucis avellane circa caput asperæ arterie inherente. Ibid.

Obs. 4. Orthopnœa ab inflammata aspera arteria. Ibid.

Obs. 5. Dyspnœa à tumore adnato lateri asperæ arterie.  
Ibid.

Obs. 6. Dyspnœa à thymo-tumido tracheam premente.  
P. 486.

Obs. 7. Dyspnœa ab aneurismate aortæ, tracheam prementis.  
Ibid.

APPEND. De Dyspnœa convulsiva à tracheæ bronchijs coarctatis & contractis.  
Ibid.

Obs. 8. Dyspnœa & Stertor à cancro-pulmonis partem superiorem obidente, & arteriam asperam premente.  
Ibid.

Obs. 9. Respiratione laesa ob sanguinis transitum per venam pneumonicam prope cordis insertionem lapidescentem, impeditum.  
Ibid.

Obs. 10. Dyspnœa à transitu sanguinis per pulmones impedito.  
P. 489.

Obs. 11. Respiratione laesa ob pulmones rumentes à sanguine intra vasa stagnante bronchia premente.  
Ibid.

Obs. 12. Dyspnœa ob cruorem intra pulmones extravasatum.  
P. 490.

Obs. 13. Orthopnœa ob pulmonem dextrum inflammatum.  
Ibid.

Obs. 14. Dyspnœa à phlegmone pulmonum post venenum.  
Ibid.

Obs. 15. Dyspnœa à pulmonum & œsophagi inflammatione.  
Ibid.

Obs. 16. Dyspnœa à pericardii & pulmonum inflammatione.  
Ibid.

Obs. 17. Constitutio interna & externa senis qui annos centum & quinquaginta duos vixit, atque cum spirandi difficultate mortuus est, ob pulmones sanguine distentos & costis annexos.  
Ibid.

Obs. 18. Orthopnœa ob pulmones inflammatos à casu; dextrum cordis sinum sanguine nigro repletum &c.  
P. 491.

Obs. 19. Dyspnœa à pulmonibus magnis, atro sanguine turgidis, exterius macularis, gangræne notas gerentibus &c.  
P. 492.

Obs. 20. Dyspnœa à vitioso lobo dextro pulmonis.  
P. 494.

Obs. 21. Dyspnœa à pulmone rumente ex humore tenaci, at putulento.  
Ibid.

Obs. 22. Dyspnœa à pulmonibus ichore spumoso repletis.  
Ibid.

Obs. 23. Orthopnœa à pulmonibus semiputridis.  
P. 495.

Obs. 24. Dyspnœa à pulmonibus aqua turgidis &c.  
Ibid.

Obs. 25. Respiratione laesa à gangræna pulmonis, T. I.

Obs. 26. Asthma à pulmonibus viscidis humoribus plenis.  
Ibid.

Obs. 27. Asthma à pulmonibus pituita putrida infectis &c.  
Ibid.

Obs. 28. Orthopnœa à materia crassa in substantia pulmonis.  
P. 497.

Obs. 29. Asthma à materia pituitosa pulmones inficiens.  
Ibid.

Obs. 30. Dyspnœa à materia in propria pulmonum substantia.  
Ibid.

Obs. 31. Spirandi difficultas ab abscessibus in imo pulmone.  
P. 498.

Obs. 32. Dyspnœa à corporibus glandulosis in pulmone.  
Ibid.

Obs. 33. Asthma à vesicis humore flavo plenis in pulmone.  
Ibid.

Obs. 34. Dyspnœa ob pulmones stercoribus obfesos.  
P. 499.

Obs. 35. Asthma à tuberculis in pulmone.  
Ibid.

Obs. 36. Orthopnœa ab hydropothorace &c.  
Ibid.

Obs. 37. Dyspnœa ab empyemate, & pulmonum vomica.  
P. 500.

Obs. 38. Dyspnœa à vomica insigni pulmonis.  
P. 502.

Obs. 39. Dyspnœa à tuberculis pulmonum scieriosis. Ibid.

Obs. 40. Dyspnœa à tuberculis in pulmonibus.  
Ibid.

Obs. 41. Dyspnœa ab hydropothorace & lapide in pulmonibus.  
Ibid.

Obs. 42. Calculosi pulmones illæsa respiratione. Ibid.

Obs. 43. Dyspnœa à calculis circa jugulum.  
P. 503.

Obs. 44. Dyspnœa à metallis in pulmonibus coactis.  
Ibid.

Obs. 45. Dyspnœa ab exciccatis pulmonibus.  
Ibid.

Obs. 46. Difficilis respiratione à calculis & ossibus in pulmonibus.  
Ibid.

Obs. 47. Asthma à massa lapidibus repleta pulmonibus adnata.  
P. 504.

Obs. 48. Dyspnœa à pulmonum lapidea duritie. Ibid.

Obs. 49. Respiratione laesa ob pulmones duros & fragiles.  
P. 505.

Obs. 50. Dyspnœa à pulmonibus induratis.  
Ibid.

Obs. 51. Dyspnœa à pulmone densiori & minus explicabili.  
Ibid.

Obs. 52. Dyspnœa à corrugatione pulmonum.  
Ibid.

Obs. 53. Dyspnœa à pulmonis scieriosis.  
Ibid.

Obs. 54. Suspirium à pulmone siccitate.  
P. 506.

Obs. 55. Orthopnœa à pulmonibus flatu distentis. Ibid.

Obs. 56. Suspirium à pulmonibus inflatis.  
P. 507.

Obs. 57. Dyspnœa à pulmone maximo.  
Ibid.

Obs. 58. Asthma à pulmone cum vomica mole.  
Ibid.

Obs. 59. Asthma à pulmonibus lutulento humore turgidis.  
P. 508.

Obs. 60. Dyspnœa à pulmone partim retracto-partim tuberculis obfuso.  
Ibid.

Obs. 61. Asthma à pericardii hydropothorace &c.  
Ibid.

Obs. 62. Dyspnœa à materia crassa dextro cordis ventriculo impacta.  
Ibid.

Obs. 63. Asthma ob pulmonum meatus pituita infectos, cum vomica parva.  
P. 509.

Obs. 64. Dyspnœa à pulmonum tuberculis &c.  
Ibid.

Obs. 65. Dyspnœa à pulmonum cum thorace coarctis.  
P. 510.

Obs. 66. Asthma ob pulsiones per filamenta nervæ costis accretos.  
P. 511.

Obs. 67. Dyspnœa ob cohesi pulmonis cum pleura. Ibid.

Obs. 68. Dyspnœa à pulmonibus putridis costis adherentibus.  
Ibid.

Obs. 69. Dyspnœa ab insigni pulmonum cum costis cohesionem.  
P. 512.

Obs. 70. Asthmatici pulmones nigri, sanguine nigro turgidi &c.  
Ibid.

- OBS. 70. Dyspnæa à carunculis in pulmonum bronchiis. Tom. I. pag. 144.
- OBS. 71. Dyspnæa à multiplici pulmonum affectu. Ib.
- OBS. 72. Asthma ab insigni feri copia in thorace. p. 514.
- OBS. 73. Dyspnæa ab hydropse thoracis & pulmonu. Ib.
- OBS. 74. Dyspnæa ab hydropse thoracis, & pulmonu vizio. Ibid.
- OBS. 75. Hydrops thoracis sinistri cum pleuræ crassitie. p. 516.
- OBS. 76. Dyspnæa à thorace aqua sanguinolenta pletho. p. 518.
- OBS. 77. Dyspnæa ob hydropem pulmonum & thoracis. p. 519.
- OBS. 78. Dyspnæa à pulmone putri & insigni hydropse thoracis. Ibid.
- APPEND. DE Thoracis hydropse sine dyspnæa. Ibid.
- OBS. 79. Orthopnæa ab hydropse pectoris & pulmonibus purulentis. Ibid.
- OBS. 80. Asthma ab hydropse pectoris. p. 520.
- OBS. 81. Asthma à stupendo pectoris hydropse. p. 521.
- OBS. 82. Orthopnæa ab hydropse purulento thoracis. p. 522.
- OBS. 83. Dyspnæa à sero cruento thoracis replente. Ib.
- OBS. 84. Dyspnæa à sero lixivioso sinistrum thoracem replente. p. 523.
- OBS. 85. Asthma à pure in dextro thorace &c. Ibid.
- OBS. 86. Asthma ab hydropse thoraci, pericardii & abdominis. p. 524.
- OBS. 87. Varie pulmonum lesiones cum hydropse thoracis & empyemate. Ibid.
- OBS. 88. Asthma ab hydropse thoracis dextri &c. p. 525.
- OBS. 89. Dyspnæa à vario partium thoracicarum vizio. Ib.
- OBS. 90. Varie partium thoraciarum lesiones confectio corde. p. 526.
- OBS. 91. Asthma à cordis magnitudine præternaturali. p. 527.
- OBS. 92. Respiratio difficilis ab insignibus cordis polypis. Ibid.
- OBS. 93. In eodem est argumento. p. 528.
- OBS. 94. Respiratio difficilis ob aquæ defectum in pericardio. Ibid.
- OBS. 95. Respiratio sensim deficiens à polypo cordis. Ibid.
- OBS. 96. Dyspnæa à materia pinguedini simile in cordis sinu. Ibid.
- OBS. 97. Dyspnæa ab indurato pericardio & cordis parte. Ibid.
- OBS. 98. Dyspnæa à pulmone sanguine referto & carunculis in cordis sinistro sinu. p. 529.
- OBS. 99. Dyspnæa à pericardio crassiori cordi adnato. Ibid.
- OBS. 100. Respiratio læsa à polypo cordis. Ibid.
- OBS. 101. Dyspnæa à pericardio aqua distento. Ibid.
- OBS. 102. Dyspnæa à pericardii inflammatione. Ibid.
- OBS. 103. Dyspnæa ab adipse cor & pulmones invadente. Ibid.
- OBS. 104. Dyspnæa à pericardii & pulmonum inflammatione. Ibid.
- OBS. 105. Dyspnæa ab ampliori corde &c. p. 530.
- OBS. 106. Dyspnæa à sanguine nigro in corde concreto. Ibid.
- OBS. 108. Asthma ab abscessu in vena arteriosa. Ibid.
- OBS. 109. Asthma à polytis aortæ &c. Ibid.
- OBS. 110. Dyspnæa ob dilatione aortæ descendentis. Ibid.
- APPEND. Respiratio nem diaphragmate peragi experimento probatur. Ibid.
- OBS. 111. Dyspnæa à corpore sub diaphragmate. p. 531.
- OBS. 112. Dyspnæa à sacco purulento supra diaphragma. Ibid.
- OBS. 113. Dyspnæa à materia viscida diaphragmati adhærente. Ibid.
- OBS. 114. Dyspnæa à stercoribus diaphragmatis. Ibid.
- OBS. 115. Dyspnæa ob pus diaphragmati à vulnere incumbens. Ibid.
- OBS. 116. Dyspnæa à cartilaginibus costarum induratis. Ibid.
- OBS. 117. Dyspnæa à sterni rials configuratione & mammis grandioribus. Ibid.
- OBS. 118. Respiratio læsa ab adipse in pleura & mediastino. Ibid.
- OBS. 119. Dyspnæa à pleuritico apostemate &c. p. 534.
- OBS. 120. Dyspnæa à pleura & pulmonibus pustulosis. Ibid.
- OBS. 121. Dyspnæa ab abscessu inter pleurâ & costas. Ib.
- OBS. 122. Dyspnæa à spinæ conrictione & pulmonibus purulentis. p. 535.
- OBS. 123. Asthma à pulmonibus purulentis & mediastino hydropico. Ibid.
- OBS. 124. Dyspnæa à mediastino adipse referto &c. Ib.
- OBS. 125. Orthopnæa à mediastini inflammatione. Ib.
- OBS. 126. Asthma ab empyemate sinistro pulmonem confumente &c. p. 536.
- OBS. 127. Dyspnæa ex hydropse pectoris, cum pericardii abscentia. p. 536.
- OBS. 128. Dyspnæa à pulmonibus purulentis, scirrhis & calculosis. p. 537.
- OBS. 129. Dyspnæa à thoracis cavitare sanguine putrido plena, cum pulmonibus consumptis. Ibid.
- OBS. 130. Dyspnæa à vomica pulmonis, cum hepatis & renis vitiis. Ibid.
- OBS. 131. Dyspnæa ob pulmones tabo sine ulcere refertos; Hepatis & ventriculi molem. p. 538.
- OBS. 132. Dyspnæa ab hydropse thoracis. Ibid.
- OBS. 133. Dyspnæa à pulmonibus stertulentis & abscessu tentatis. Ibid.
- OBS. 134. Dyspnæa à pulmone inflammatione & hepatis grandiori mole. p. 540.
- OBS. 135. Boem strages epidemica à pulmonibus & hepate hydatidibus obsessis, unde respiratio anbelosa ac ruficula. Ibid.
- OBS. 136. Dyspnæa à pulmonibus, omento & mesenterio strumosis. p. 541.
- OBS. 137. Dyspnæa ab hydropse pectoris, cum pulmonum sideratione. Ibid.
- OBS. 138. Dyspnæa ab hydropse thoracis & pulmonibus induratis in glandulosos. p. 542.
- OBS. 139. Dyspnæa à partium spiritalium compressione ab utero elato. Ibid.
- OBS. 140. Dyspnæa à multiplici viscerum vizio. Ibid.
- OBS. 141. Respiratio difficilis in bobus à pila conglobata in ventriculo. p. 544.
- OBS. 142. Dyspnæa à ventriculo tumente ob pus intra membranas conclusum. Ibid.
- OBS. 143. Dyspnæa à ventriculo tumido. Ibid.
- OBS. 144. Dyspnæa ob vitiosum ventriculi & omenti in thorace situm. p. 544.
- OBS. 145. Dyspnæa à ventriculi parte cū duodeno &c. per totam diaphragmatis in thoracem ascend. Ib.
- OBS. 146. Dyspnæa à ventriculo tumido & abdominalis hydropse. Ibid.
- OBS. 147. Asthma à flatu tumidis intestinis & grandi in vesica biliaris lapide. p. 545.
- OBS. 148. Dyspnæa ob tumida flatibus intestina. Ibid.
- OBS. 149. Dyspnæa à fecibus per exulcerata intestina in abdominis cavum effusis, viscera ventus thoracem compellentibus. Ibid.
- OBS. 150. Dyspnæa à visceribus flatu distentis. Ibid.
- OBS. 151. Dyspnæa ab aneurismate arterie calliæ & pituita in ea concreta. Ibid.
- OBS. 152. Asthma ab hepate & pancreate magnis. p. 546.
- OBS. 153. Dyspnæa ab hepate magno & scirrholo. Ib.
- OBS. 154. Asthma ab abscessu juxta lienem. Ibid.
- OBS. 155. Dyspnæa à variis hepatis & lienis vitiis. p. 547.
- OBS. 156. Dyspnæa à mesenterio ob plures vesiculas tumido. Ibid.
- OBS. 51. Dyspnæa à variis mesenterii vitiis. p. 548.



Obs. 158. Dyspnæa à variis omenti affectibus. Tom. I. pag. 148.

Obs. 159. Orthopnæa à rene purulento. p. 549.

Obs. 160. Orthopnæa à contorsione spinæ & renibus calculosis. Ibid.

Obs. 161. Dyspnæa ob renes jecori affixos. p. 550.

Obs. 162. Orthopnæa ab immani renis vnius tumore; lb.

Obs. 163. Dyspnæa à massa carnea crinita & aqua in abdomine. Ibid.

Obs. 164. Asthma convulsivum à colluvie serosa. lb.

Obs. 165. Asthma ab addita causa. p. 552.

Obs. 166. Dyspnæa à pulmonum defectu & humore lacteo in thorace. p. 553.

Obs. 167. Lobus unus pulmonum potest deficere, vita superstitere. Ibid.

APPEND. I. Asthma & Dysuria reciproca, ita ut uno præterente cessaret alteram, &c. p. 554.

APPEND. II. An homo vivere possit sine respiratione; lb.

Obs. 168. Urinatores & animalia amphibia diu sub aquis subsistunt, quia in eis foramen ovale per totam vitam apertum remanet. p. 555.

APPEND. I. De respiratione urinatorum. p. 556.

APPEND. II. Experimento comprobatur mortem præcipue dependere à recentis aeris in pulmonibus inopia. Ibid.

## ADDITIONAMENTA

### Ad Sectionem de Respiratione laesa.

Obs. 1. Asthma diuturnum à pulmone sinistro gypso. Tom. I. pag. 557.

Obs. 2. Asthma ab excresecientia in basi cordis. Ibid.

Obs. 3. Asthma ab hepatis & pulmonum rara constitutione. Ibid.

Obs. 4. Asthma à pulvisculo pulmones inferiente. p. 558.

Obs. 5. Asthma ab exsiccatis & ulcerosis pulmonibus. Ibid.

Obs. 6. Asthma ob hepatis cum pulmonibus conjunctionem. Ibid.

Obs. 7. Asthma à polypis cordis. p. 559.

Obs. 8. Asthma à pulmonibus scirrhotis & purulentis, cum polypo cordis. Ibid.

Obs. 9. Respiratione laesa ob jecur tumidum; pulmones inflammatos. Ibid.

Obs. 10. Respiratione difficilis ob pulmones inflammatos & pituita infarctos. p. 560.

Obs. 11. Dyspnæa à cartilagine mucronata ossæ. Ibid.

Obs. 12. Dyspnæa ob insignem hepatis molem. Ibid.

Obs. 13. Dyspnæa ab enormi cordis magnitudine. Ibid.

Obs. 14. Dyspnæa à vena arteriosa pituita infarcta. p. 561.

Obs. 15. Respiratione laesa ob pulmonum ariditatem. lb.

Obs. 16. Difficilis spiratio ab hydropne thoracis. Ibid.

Obs. 17. Respiratione laesa ab ingentissimo hepate. 562.

Obs. 18. Respiratione laesa à polypo cordis &c. Ibid.

Obs. 19. Difficilis respiratio ob pericardium cordi accretum. lb. d.

Obs. 20. Dyspnæa à polypis cordis & valvulis mitralibus ossis. p. 563.

Obs. 21. Respiratione difficilis in pleuritidis, quare? lb.

Obs. 22. Dyspnæa à vomica pulmonis. Ibid.

Obs. 23. Suffocatio hovis à gramine in asperam arteriam illapso. p. 564.

Obs. 24. Non omnis cohesio pulmonum cum costis sicut respirationem difficilem. p. 565.

Obs. 25. Asthma à vertebra dorsi cariosis. Ibid.

Obs. 26. Respiratione difficilis ab hydropne mediastini & pulmonibus purulentis. p. 566.

Obs. 27. Asthma ab hepate magno glanduloso, topheo. Ibid.

Obs. 28. Dyspnæa à pulmonis substantia coactione. 567.

Obs. 29. Asthma à polypo cordis. Ibid.

Obs. 30. Respiratione difficilis à polypo cordis. p. 568.

Obs. 31. Respiratione difficilis & urinae incontinentia à nimia pinguedine &c. p. 579.

Obs. 32. Respirationis difficilis causæ rara in tuberculo. p. 571.

Obs. 33. Difficillima respiratio à glandulis pulmonis scirrhotis. p. 572.

Obs. 34. Asthma à pericardio mirum in modum dilatato. p. 575.

## SECTIO II

### De Suffocatione.

Obs. 1. Suffocatio anginosa à constrictione jugularium. Tom. I. p. 575.

Obs. 2. Suffocatio à miro palati abscessu. p. 576.

Obs. 3. Suffocatio ab effuso sanguine in tracheam. p. 577.

Obs. 4. Suffocatio à struma interna circa jugulum. Ibid.

Obs. 5. Suffocatio à pituitæ copia ad uvulæ delatâ. 578.

Obs. 6. Suffocatio à frusto carnis inter epiglottidæ & laryngis vincula substantiæ. Ibid.

Obs. 7. Suffocatio ex frusto pulmonis ruptj, in trachea. Ibid.

Obs. 8. Suffocatio ab alimentis cordibus in aspera arteria. p. 579.

Obs. 9. Suffocatio à broncheoelâ tracheam prementente. Ibid.

Obs. 10. Suffocatio à lapidibus tracheam prementibus. Ibid.

Obs. 11. Suffocatio à pure ex vomica pulmonum in trachea illabente. Ibid.

Obs. 12. Suffocatio à sero & cysti in cerebro ad pulmones illabente. p. 580.

Obs. 13. Suffocationis sensus à cysti serosa tentum sinistri thoracis partem occupante. Ibid.

Obs. 14. Suffocatio ab aneurismate arteriæ magnæ. lb.

Obs. 15. Suffocatio ab aquarum copia in thorace. Ibid.

Obs. 16. Suffocatio ab hydropne thoracis & vteri. p. 581.

Obs. 17. Suffocatio à pure bronchia occupante. Ibid.

Obs. 18. Suffocatio à carunculis in bronchijs. Ibid.

Obs. 19. Suffocatio à materia viscida bronchia obturante. Ibid.

Obs. 20. Suffocatio ob pulmones variolis obfesos. lb.

Obs. 21. Suffocatio à sanguine universo ad pulmones conflato. Ibid.

Obs. 22. Suffocatio à turgidis venis internis. Ibid.

Obs. 23. In strangulato pulmonis sanguine spumoso pleni. p. 582.

Obs. 24. In strangulato pulmonum fistula spuma repleta. Ibid.

Obs. 25. Suffocatio à crasso sacco cordis sinus ac pulmones inferiente. Ibid.

Obs. 26. Suffocatio ab introque cordis sinu sanguine distincto. p. 583.

Obs. 27. Suffocatio à pericardio & cordis portione ossis. Ibid.

Obs. 28. Suffocatio ab aorte aneurismate aperto. 584.

Obs. 29. Suffocatio à rupta in pulmone vena. Ibid.

Obs. 30. Suffocatio à pulmone sinistro copiose aqua innatante. Ibid.

Obs. 31. Suffocatio ab icteru, ubi pulmones maculis lividis infecti, reperiuntur. Ibid.

Obs. 32. Suffocatio à sanguine grumoso cor repleto. p. 585.

Obs. 33. Suffocatio à corde & ejus adjacentis sanguine & aqua distensis. Ibid.

Obs. 34. Suffocatio à copiosiore pericardij humore. 586.

- Obs. 35. Suffocatio à materia alba circa cor in sanguine contenta. Tom. I. pag. 86.
- Obs. 36. Suffocatio à nimia in toto pinguedine. p. 87.
- APPEND. Obefitas nimia suffocationem minuitans, curata. Ibid.
- Obs. 37. Suffocationis seofus ab abscessu sub ala sinistra, & suppuratione sepi transverſi. p. 88.
- Obs. 38. Suffocatio ab hydropse & pinguedine thoracis. Ibid.
- Obs. 39. Suffocatio à jecoris præternaturali magnitudine. Ibid.
- Obs. 40. Suffocatio ab abscessibus abdominis diaphragma sursum compellentibus. Ibid.
- Obs. 41. Suffocatio ab intestinis per vulnus diaphragmatis in thoracem intrusis. p. 89.
- Obs. 42. Suffocatio ab utriculo uteri diaphragma comprimentis. Ibid.
- Obs. 43. Suffocationis suspicio in infante ob compressum manibus caput. Ibid.
- Obs. 44. Qui in aquis suffocantur, perent ob defectum aëris. Ibid.
- Obs. 45. Pueri fulmine oculi meninges sulphureis maculis, & fœtibus odorem eminentibus. cin-  
dæ repetitæ. p. 90.

## ADDITAMENTA

### *Ad Sectionem de Suffocatione.*

- Obs. 1. Suffocatio repentina ex inflatione ventriculi. Tom. I. p. 90.
- Obs. 2. Suffocatio à flatibus in viscera diffusis. p. 91.
- Obs. 3. Suffocatio ab aquis in thorace. Ibid.
- Obs. 4. Suffocatio à mole carnea à pleura pendula. Ib.
- Obs. 5. Suffocatio à polypo gelatinoso cordis. Ibid.

## SECTIO III

### *De Tussi.*

- Obs. 1. Tussis à pulmone dextro prope absumpto & hydropse pectoris. Tom. I. pag. 92.
- Obs. 2. Tussis ab hamore luxureto in pulmonibus. p. 93.
- Obs. 3. Tussicula in magno pulmonum affectu, cum hydropse pectoris & empyemate. Ibid.
- Obs. 4. Tussis sicca à pulmonibus statim distensis. Ibid.
- Obs. 5. Tussis ab inflammatis & suppuratis pulmonibus. p. 94.
- Obs. 6. Tussica bonum lues ob vitium pulmonum, vel costis adnatorum, vel tandem absumptorum. p. 95.
- Obs. 7. Tussis à pulmonibus sanguine infarctis. Ibid.
- APPEND. De tussi diurna dilatactionem varicosam vasorum pulmonalium sequuta. Ibid.
- Obs. 8. Tussis à tuberculo pulmonis. p. 96.
- Obs. 9. Tussis iridem à tuberculis. Ibid.
- Obs. 10. Tussis à ventriculis in pulmonibus. Ibid.
- APPEND. De tussi à nucleo in pulmones illapso, per bechias educto. Ibid.
- Obs. 11. Tussis à lapillis in pulmonibus. Ibid.
- APPEND. De tussi sicca à vesiculis ichore sanguineo plenis. p. 97.
- Obs. 12. Tussis sicca ob lapideam duritiem pulmonum. Ibid.
- Obs. 13. Pulmonum calculosorum historia rara. Ibid.
- Obs. 14. Tussis multiplices pulmonum affectus sequuta. p. 98.
- Obs. 15. Tussis sicca ob pulmones induratos. Ibid.
- Obs. 16. Tussicula ab impactu tracheæ ossiculo. Ibid.
- Obs. 17. Tussis varios pulmonum affectus sequuta. Ib.
- Obs. 18. Tussis iridem à variis affectibus &c. p. 99.
- Obs. 19. & 20. In eodem argumento. p. 100.

*Index Anat. Boneti.*

- Obs. 21. Tussis ab incurvatione spinæ & pulmonibus purulentis. p. 100.
- Obs. 22. Tussis ab hydropse thoracis, &c. Ibid.
- Obs. 23. In eodem est argumento. p. 101.
- Obs. 24. Tussis à mediastino inflammato. Ibid.
- Obs. 25. Tussis à pericardio inflammato. Ibid.
- Obs. 26. Tussis à jeculi parte in diaphragmate latentē. Ibid.
- Obs. 27. Tussis à vario partium naturalium vitio. Ibid.
- Obs. 28. Tussis à gravi ventriculi affectu, salvis pulmonibus. p. 102.
- Obs. 29. Tussis à sero hepatis illis pulmonibus. Ibid.
- Obs. 30. Tussicula ob renes jecori affixos. Ibid.
- Obs. 31. Tussis à pulmone vitioso & corde ulceroso. p. 103.
- Obs. 32. Tussis à nervoso genere affectu illis pulmonibus. Ibid.
- Obs. 33. Tussis ab aqua in cerebri ventriculis conclusa. p. 104.
- Obs. 34. Tussis à feri in nervos pneumonicos illapso. p. 105.

## ADDITAMENTA

### *Ad Sectionem de Tussi.*

- Obs. 1. Tussis à duobus clavicularis in pulmones illapſis. Tom. I. p. 106.
- Obs. 2. Tussis sicca à sinistro pulmone gypſoso. p. 107.
- Obs. 3. Tussis suffocativa à grumo piriformi inter secundum & tertium tracheæ anulum impacto. Ibid.

## SECTIO IV.

### *De Pectoris, Latervum & Dorſi dolore.*

- Obs. 1. Pectoris dolor & gravitas ob serum in mediastino & purulentia in pulmonibus. Tom. I. p. 108.
- Obs. 2. Pectoris dolor & ardor à mediastino inflammato. p. 109.
- Obs. 3. Thoracis dextri dolor ab abscessu sub integumentis communibus. p. 110.
- Obs. 4. Pectoris dolor à pericardij & pulmonum phlegmone. p. 111.
- Obs. 5. Pectoris dolor à cysti liquore pleno, parte sinistra, ex humero ad usq; diaphragma pendulo. Ib.
- Obs. 6. Pectoris dolor ab angue in sinistro cordis sinu. p. 112.
- Obs. 7. Pectoris dolor pulsans ab aneurismate arteriæ venosæ. p. 114.
- Obs. 8. Pectoris gravitas ob hydropem pulmonum. Ib.
- Obs. 9. Pectoris dolor à variis pulmonum & thoracis affectibus. Ibid.
- Obs. 10. Dolor circa mammam dextram à jecore lapidoso. p. 115.
- Obs. 11. Pectoris dolor à ventriculo distento. Ibid.
- Obs. 12. Dolor ad Pectus ob renum vitium. Ibid.
- Obs. 13. Pectoris dolor à flammâ viscera extendente. Ib.
- Obs. 14. Pleuritide aliquando non coſſiciuntur pulmones. Ibid.
- Obs. 15. Lateris dolor ab abscessu in pleura & maculis thoracis intertribus. p. 119.
- Obs. 16. Lateris dolor à tumido pulmone & vitiosis muscularis intercostalibus. Ibid.
- Obs. 17. In pleuritico pleura supra modum crassa & pulmo firmiter ei adnatus. Ibid.
- Obs. 18. In pleuritico uterque pulmo costis validè adhaere. Ibid.
- Obs. 19. Sinistri lateris dolor ab abscessu sub ala sinistra, vitio pleurae & diaphragmatis inspiratione. Ib.

- Obs. 20. Pleuritis & Peripneumonia sepiissime complicantur. Tom. I. p. 610.
- Obs. 21. Superueniens Phthisicis lateris dolor, oritur debet pulmonum cum pleura cohesioni. p. 629.
- Obs. 22. Pleuritis lethalis ob plenae sphacelum. Ib.
- Obs. 23. Lateris dolor ex Peripneumonia cum pectoris hydropse. Ibid.
- Obs. 24. In Peripneumonia saepe tantum pars aliqua pulmonis inflammatur. p. 630.
- Obs. 25. Dolor pectoris gravativus in Peripneumonia fit ubi pulmonis viscus inflammatur, lancinans ubi plena. Ibid.
- APPENDIX, Varias lateris doloris ideas & causas continens. Ibid.
- Obs. 26. Lateris dolor ex contusione cujus vestigia intrus appaerere. p. 632.
- Obs. 27. Lateris dolor costarum contractionem sequitur, ubi mediastinum inflammatur. Ibid.
- Obs. 28. Pleuritis à vomica sub mamma humore virescente plena. p. 633.
- Obs. 29. Pleuritis, ubi inflammatum pericardium. Ib.
- Obs. 30. Pleuritis, ubi suppuratum pericardium. p. 634.
- APPENDIX, Puris sputum his advenit pleuriticis quibus pulmones costis cohaerent; Empyema quibus ii supj liberi. Ibid.
- Obs. 31. Pleuriticorum ubi dolor sedatur, quandoque cordis gravamen succedit ob sanguinem in sinibus cordis & vasis concrescentem. Ibid.
- Obs. 32. In Pleuriticis thorace copia puris deprehensa. Ibid.
- Obs. 33. Lateris dolor aliquando excitatur ab hepate per fibras costis adherente. p. 635.
- Obs. 34. Lateris sinistri dolor ob diaphragma licni affixum. Ibid.
- Obs. 35. Lateris dolor à pure ex abscessibus imi ventris effusio. Ibid.
- Obs. 36. Lateris dolor ab Hepatis vomica. p. 636.
- APPENDIX, De lateris dolore uteri inflammati committente. p. 637.
- Obs. 37. Lateris dolor à pustulis in stomacho & jecore ex hac venerea. Ibid.
- Obs. 38. Pleuritis à vermibus in imo ventre. Ibid.
- Obs. 39. Pleuritidi quidam fuit obnoxius quod in venia azygo una esset valvula. p. 638.
- APPENDIX, De Pleuritide ex dorso. p. 639.
- Obs. 40. Dorsi dolor à pulmone corrupto & ventriculo perforato. Ibid.
- Obs. 41. Dorsi dolor à carie vertebrae. p. 640.
- Obs. 42. Dorsi dolor à pulmonibus vicinis dorso annexis. Ibid.
- Obs. 43. Dorsi & gule dolor à pulmonibus in utriusque vicinia inflammatis. Ibid.
- Obs. 44. Dorsi dolor ab aneurismate interno. p. 641.
- Obs. 45. Omoplatatum dolor à patri materia in thorace. Ibid.
- Obs. 46. Dorsi dolor à venae cavae dilatatione. Ibid.
- Obs. 47. Dorsi dolor ex aortae tumore praegrandi. Ib.
- Obs. 48. Dorsi dolor à liene, rene dextro & utero callosis. Ibid.
- Obs. 49. Dorsi dolor à lapidibus in sinistro rene. p. 642.
- Obs. 50. Dorsi dolor à sero pingui musculos humerales inferiente. Ibid.
- Obs. 51. Dorsi dolor à pingui mole mesenterij principio adherente. p. 644.
- Obs. 52. Dorsi dolor à trunco aortae juxta diaphragma osseo. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Dole Pectoris, Laterum, Dorsi, &amp;c.

- Obs. 1. Pectoris dolor circa mammam dextram, ob tumorem oblongum inter ipsos pulmo-

- nes descendente, arterias prementem, Tom. I. pag. 644.
- Obs. 2. Vehemens Pleuritis & Plenae & Pulmones, imo ipsum quandoque pericardium afficit. p. 645.
- Obs. 3. Lateris dolor gravativus à pulmone inflammato. p. 646.
- Obs. 4. Pectoris ardor ab humore acris cordis tunicae ac substantiam afficiente. Ibid.
- Obs. 5. Dolor lateris lethalis ab inflammata pleura & pulmonibus. p. 647.
- Obs. 6. Pulmonis inflammatio dolorem non semper invehit si ea pleuram non attingit. Ibid.
- Obs. 7. In Pleuritide pulmones suppurari. Ibid.
- Obs. 8. Pectoris dolor ob pulmones pleurae connexos. Ibid.
- Obs. 9. Lateris dolor ob pulmonem finistram putrescentem, partibus vicinis undique adherentem. Ib.
- Obs. 10. Pleuropneumonia ab affecta pleura lateris dextri, cum pulmone eidem coherente. p. 648.
- Obs. 11. Pleuritis in qua pulmones livebant & pus fundebant. p. 650.

## SECTIO V.

## De Sputo Sanguinis.

- Obs. 1. Hemoptisis à pulmonibus sanguine nigro, liquido, cum sanie referis. Tom. I. pag. 651.
- Obs. 2. In Hemoptysica pars pulmonum interna puro reperta, mediastinum sero sanguineo plenum, repertum. p. 652.
- Obs. 3. Sanguinis sputum ab aneurismate aortae circa dorsum & rupta cava. Ibid.
- Obs. 4. Hemoptysis ab inflammatione pulmonum. Ibid.
- Obs. 5. Hemoptysis à pulmone scirrhuso liberam sanguinis trajectionem impediens. p. 653.
- Obs. 6. Hemoptysici pulmones multum sanguinis nigri continebant. Ibid.
- Obs. 7. Sanguinis sputum à pulmone sphacelo. p. 654.
- Obs. 8. Hemoptysis ab aneurismate in pectore aperto. p. 655.
- Obs. 9. Hemoptysis à percussione & contusione pectoris interna. p. 656.
- Obs. 10. Hemoptysis à corrosis pulmocubus à materia acris à tuberculo crudo exudante. Ibid.
- Obs. 11. Hemoptysis à pulmone tumido; sanguineque illic subsistente. Ibid.
- Obs. 12. Hemoptysis à fluxione acris pulmones erodente. p. 657.
- Obs. 13. Expunctio cruenta vomica in pulmone distractionem fere praecedat. Ibid.
- Obs. 14. Hemoptysis à bronchijs & pulmonibus laecis. p. 658.
- Obs. 15. Expunctio cruenta ab inflammatione pulmonis. Ibid.
- Obs. 16. Sanguinis & puris sputum sine pulmonum affectione aliquando contingit. Ibid.
- Obs. 17. Hemoptysis ob pulmones putres, ulceratos. Ibid.
- Obs. 18. Hemoptysis à pulmonibus induratis, nigricantibus. Ibid.
- Obs. 19. Hemoptysis ab acris sanguine quo cor infarctum repertum est. p. 659.
- Obs. 20. Sputum sanguinis nigri, à pulmonibus & corde eo referis. Ibid.
- Obs. 21. Hemoptysis à cordis ulcere. Ibid.
- Obs. 22. Hemoptysis ab inflammato pulmone. p. 660.
- Obs. 23. Hemoptysis à sanguine melancholico à liene & vasis mesaraicis transmissio. Ibid.

- Obs. 14. Hæmoptysis à jecore per fibras collis nœcis annexo. Tom.I. pag.66.  
 Obs. 15. Hæmoptysis ob sanguinem à jecore in pulmones transfusum, &c. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Spûto sanguinis.

- Obs. 1. Hæmoptysis à disrupçione vena cava. Tom.I. pag.662.  
 Obs. 2. Hæmoptysis à bronchijs & pulmonibus laceratis. Ibid.  
 Obs. 3. Hæmoptysis à sero acri vasa pulmonum erodente. Ibid.  
 Obs. 4. Hæmoptysis in qua auricula cordis monstruosa, cum arteria pulmonalis aneurismate. Ibid.

## SECTIO VI.

## De Expiratione purulenta, sordida, Empyemate.

- Obs. 1. Expiratio varia à pulmonum abscessibus. Tom.I. p.664.  
 Obs. 2. Expiratio materiz purulente à pulmone fistulosis ulceribus scatente. Ibid.  
 Obs. 3. Expiratio purulenta à pulmonibus pure infarctis. Ibid.  
 Obs. 4. Expiratio purulenta à pulmone sinistro omnino in pus soluto. Ibid.  
 Obs. 5. Expiratio purulenta ab empyemate cum pulmonis suppuratione. Ibid.  
 Obs. 6. Expiratio alba, rotunda à pulmone tamente & viscido, albo humore infecto. Ibid.  
 Obs. 7. Expiratio purulenta manans à bronchijs pure infarctis. Ibid.  
 Obs. 8. Expiratio purulenta à pulmone sinistro purulento. Ibid.  
 Obs. 9. Expiratio purulenta ab apostemate in latere, cum pulmonis inflammatione. Ibid.  
 Obs. 10. Empyema pleuritidi succedens ante diem decimum quartum. Ibid.  
 Obs. 11. Empyema sinistri thoracis nulla sui signa exhibens. Ibid.  
 Obs. 12. Empyema pulmonum exulcerationem frequentius sequitur in phthisicis. Ibid.  
 Obs. 13. Expiratio purulenta à fractura ossis cunei formis, & sanguine circa illud suppurato. Ibid.  
 Obs. 14. Expiratio frustulorum carneorum ab exulceratione cordis. Ibid.  
 Obs. 15. Suppurati pericardium totum ferè corruptum repertum est, & cordis major pars exorta. Ibid.  
 Obs. 16. Empyema lethale pleuritidem sequutum, ob neglectam per paracentesin puris evacuationem. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Expiratione Purulenta, Sordida, Empyemate.

- Obs. 1. Empyematicorum pus anacathari non expellitur, quia ad bronchia non vergit. Tom.I. p.672.  
 Obs. 2. Empyema thoracis caseosum. Ibid.  
 Obs. 3. Empyema ex intermissa paracenthesi lethale. Ibid.  
 Obs. 4. Empyema ex pleuritide paracenthesi curatur, patiensque tandem hydropè moritur. Ibid.

## SECTIO VII.

## De Tabè in genere &amp; Tabè pulmonari in specie.

- Obs. 1. Tabes non ob solum pulmonum vitium excitatur, sed sæpe viscerum aliorum & sanguinis, sequitur. T.I. pag.675.  
 Obs. 2. Phthisis à pluribus pulmonum ulceribus; vomica in eorundem dextra parte &c. Ibid.  
 Obs. 3. Phthisis à pulmonum putredine, collis adherentium cum ulceribus variis. Ibid.  
 Obs. 4. Phthisis à pulmone exsiccato, in quo sanies alba, cruda, aque mixta. Ibid.  
 Obs. 5. Phthisis grande & multiplex pulmonum ulcerum sequuta. Ibid.  
 Obs. 6. Phthisis orta à scabie reperiçulla, ob quam pulmones omnino corrupti magna ex parte in scirrhum indurati sunt. Ibid.  
 Obs. 7. Phthisis à media parte pulmonum consumpta & pure soluta. Ibid.  
 Obs. 8. Phthisis à parenchymate sinistri Pulmonis ferè omnino consumpto. Ibid.  
 Obs. 9. Phthisis à pulmonibus subduris & compactis, suprema parte exulceratis & lateri annexis. Ibid.  
 Obs. 10. Phthisis ab ulceratione parenchymatis pulmonis, ejusque bronchiorum obstructione. Ibid.  
 Obs. 11. Phthisis à tracheæ parte erosa lobopulmonum altero calloso. Ibid.  
 Obs. 12. In Phthisico fragmenta bronchiorum Pulmonum, ab eorum substantia avulsa reperti sunt in dextro latere, cum plurima sanie. Ibid.  
 Obs. 13. Phthisis à pulmonis parte consumpta, vomitibus plurimis in rechina. Ibid.  
 Obs. 14. Phthisis à pulmonibus ulcerosis & scirrhis. Ibid.  
 Obs. 15. Phthisis à pulmone sinistro, intus repleto pere, sanie & scirrhis. Ibid.  
 Obs. 16. Phthisis à pulmonibus sordida, copiosa aqua plenis. Ibid.  
 Obs. 17. Phthisis à crudis Tuberculis totum pulmonem parenchyma obfidentibus. Ibid.  
 Obs. 18. Phthisis à variis abscessibus purulentis in utraque pulmonis parte, ac pituita in iis concretæ lapidescente. Ibid.  
 Obs. 19. Phthisis à corruptis penitus pulmonibus & in pus conversis, vasisque cordis in eos insertis, ablutis. Ibid.  
 Obs. 20. Phthisis à corruptis pulmonibus, pure thoracem & abdomen implente. Ibid.  
 Obs. 21. Phthisis à pulmone corruptiela & in empyema conversione, ob malefluentia lochia genita. Ibid.  
 Obs. 22. Phthisis ab exulceratione Pulmonis producta per piruriam & erosionem vasorum, cum duribus conclusis vomitibus. Ibid.  
 Obs. 23. Pulmones in Phthisico pene consumpti assiduo usu nasturtii aquatici restituti. Ibid.  
 Obs. 24. Phthisis à Pulmonibus lustralento humore scatentibus, unde insignis eorum gravitas. Ibid.  
 Obs. 25. Phthisis à pulmone interius omnino purulento. Ibid.  
 Obs. 26. Anatome Phthisicis infantis, cujus sinister pulmo in pus resolutus est, unde thorax eodem latere pure repletus; Cum insigni abscessu superne illius arterie afflixo. Ibid.  
 Obs. 27. Phthisis ab abscessibus in utroque lobo pulmonis parte superiore genitis, sinus ingentes relinquentibus. Ibid.

- Obs. 28. Phthisis à suppuratione Pulmonis post peripneumoniam Pleuritidem sequentem. Tom. 1. pag. 695.
- Obs. 29. Phthisis à vomica totius Pulmonis. p. 697.
- Obs. 30. Phthisis à Pulmonibus duritie, plurimis parvis stercorosis confici, Tuberculis pure scatenibus, ulcere in sinistro lobo, vomica plurimis &c. Ibid.
- Obs. 31. Phthisis à parte sinistra Pulmonis Tabida; in columa dextra; Puris ingenti copia in thorace pag. 698.
- Obs. 32. Phthisis à Pulmonibus scirrhosis, ulcerosis, &c. p. 702.
- Obs. 33. Phthisis Pulmo intermeratus repertus est, visceribus naturalibus illis. Ibid.
- Obs. 34. Phthisis ab abscessu, scirrhosis duritie & corruptela pulmonum dependens. p. 705.
- Obs. 35. Phthisis à suppuratione omnimoda pulmonum. p. 704.
- Obs. 36. Phthisis à consumptione maxime pulmonum partis, & in pus resolutione. p. 705.
- Obs. 37. Phthisis à mensuris resistentibus & in pulmones resistentibus, unde illorum corruptela, cum multiplici viscerum naturalium vitio. Ibid.
- Obs. 38. Tabes à pulmonis totali fere putredine costis adnatis sinistro latere &c. p. 706.
- Obs. 39. Phthisici pulmones Intus parulenti, externa facie sani apparcbant. p. 706.
- Obs. 40. Phthisis à vomica in sinistro pulmone, Hydrope sinistri thoracis &c. p. 707.
- Obs. 41. Phthisis à pulmonum corruptela cum Thoracis hydrope Ibid.
- Obs. 42. Phthisici pars sinistra pulmonis cava ad instar fistule inventa, substantia autem congesta & arida, cum empyemate thoracis & aliis vitis viscerum naturalium. p. 708.
- Obs. 44. Phthisici pulmones omnino absumpti à puris acrimonia reperti. Ibid.
- Obs. 45. Phthisici pulmones dextro latere omnino absumpti. Ibid.
- Obs. 46. Phthisis à consumpto pulmone parte dextra, vomica & hydrope thoracis eodem latere, vasis omnino parulenti &c. p. 709.
- Obs. 47. Phthisis à Pulmonibus pure & flato, citra ulcus, tumentibus, maculosis, Jecore impeale magno & scirrhoso, liene vitio &c. Ibid.
- Obs. 48. Phthisis à vitio Pulmonum pure in sinistro latere scatenium, sanguine congesto in dextro lobos post suppressionem mensium: Ventriculi glandulis serosis circumscriptis &c. p. 710.
- Obs. 49. Phthisis à corruptione omnimoda pulmonum lateris sinistri, parulenti dextrorum, cum lienis scirrho. p. 710.
- Obs. 50. Anatome Phthisici, cujus pulmones lividi, flaccidi, exsucci: cordis auricula dextra sanguine nigro distenta nec non ventriculi: præter alia vitia Thoracis, Jecoris & Renum. p. 711.
- Obs. 51. Phthisici pulmones spongiosi, & levissimi, cum pure copioso in vasis eorum &c. p. 711.
- Obs. 52. Phthisis à consumptione omnimoda partis sinistre pulmonis, cum cordis vitio p. 712.
- Obs. 55. Phthisis à vitio pulmonum exsanguium, siccorum, constrictorum costis flacciditate & partium naturalium affectibus. Ibid.
- Obs. 54. Phthisicorum quorundam pulmones frustillatim ab humore acri fuerunt. p. 713.
- Obs. 55. Phthisici pulmones non solum suppurantur, sed etiam alteratro latere penitus absumuntur, diu vita supersistere. Ibid.
- Obs. 56. Tabes à putrefactione sinistri lobi Pulmonis dextri vitio, Ventriculi extenuatione & contractione, Epatis scicrare, Grandi calculo in vesica, Rene
- mo corrupto, altero feri copia distento, cordis vitio, &c. Tom. Ibid.
- Obs. 57. Phthisis orta à pulmonibus putridis, materia ichorosa per totum infarctis, Renum vitio &c. p. 714.
- Obs. 58. Phthisis pleuritidem sequuta, à pulmonis dextri parenchymatis consumptione, sinistri peritragine, Pericardio pustulis exasperato, Jecore scirrhoso &c. Ibid.
- Obs. 59. Phthisis à Pulmonum corruptione, Vasonum cordis consumptione, Pericardii & mediastini emulceratione. Ibid.
- Obs. 60. Phthisis à Pulmonum ulcere & eorumdem flacciditate. p. 715.
- Obs. 61. Anatome puellæ cujus Pulmo sinister consumptus, cum insigni Jecoris magnitudine; ventriculum ad infusora deprimere. Ibid.
- Obs. 62. Phthisis à Pulmonum lobo utroque, sinistro præsertim corrupto, præcedente vitio venarum, intestinorum & pancreatis. Ibid.
- Obs. 63. Phthisis à Putredine Pulmonum intra 24 dies interimens, cum intestinorum vitio. p. 716.
- Obs. 64. Phthisis à Pulmonis dextri consumptione, integra sinistri inchoata, Empyemate thoracis &c. p. 717.
- Obs. 65. Phthisici infantis pulmo dexter & hepatis phacelo afficta reperta, ventriculus corruptus, &c. Ibid.
- Obs. 66. Tabes à Pulmone parulento, Pancreate scirrhoso, aliisque partium naturalium vitis. Ibid.
- Obs. 67. Tabes à multiplici vitio partium inter ventris, & thoracicarum. p. 719.
- Obs. 68. Tabes à vitio Pulmonum flaccidum, Hepatis scirrhosi ramidi, Omenti glandulosi ex parte corrupti, Renis dextri putridi, sinistri glandulis obfisi &c. Ibid.
- Obs. 69. Phthisis à Pulmonibus corruptis, ulceratis, Hepate torrefacto, liene pene absumpto &c. p. 720.
- Obs. 70. Phthisis à vitio Pulmonum corruptorum, & in tabem solutorum, Mesenterii glandulis obfisi &c. Ibid.
- Obs. 71. Tabes à Pulmone insigni corruptela, Omenti putredine, Mesenterii & Pancreatis obstructione, Hepate scirrhoso, liene duro, Rene dextro calculoso, insigniter tumido & ad gangrenam vergente &c. Ibid.
- Obs. 72. Phthisis, à Mesenterio scirrhosis tumoris obfisso, abscessu in Pulmone dextro, cum scirrhosis & stercorosis per totam eorum substantiam. pag. 721.
- Obs. 75. Phthisis à Pulmonis grandi vomica in latere dextro, pure viscido totum Parenchyma obidente, Vomica plurimis in sinistro, & Pericardii aqua distento, cordis, Hepatis vitio &c. Ibid.
- Obs. 74. Phthisis ab apostemate in infimo sinistro Pulmonis lobo consistente. pag. 722.
- Obs. 75. Phthisis à Pulmone dextro corrupto, flaccido, cum puris acris albi collectione in thorace eodem latere. Ibid.
- Obs. 76. Phthisici ob ariditatem Pulmonum indurati à fistula thoracis. Ibid.
- Obs. 77. Plurimorum parulenti expuentium Pulmones aridi reperti. Ibid.
- Obs. 78. Tabes à Pulmonum squalore, costis, & diaphragmati adnatorum, canicula in cordis sinu sinistro &c. Ibid.
- Obs. 79. Tabes Rachitidis comes, à Pulmonibus quasi tumor gypseo referens excitata, lividis exsiccis &c. pag. 723.
- Obs. 80. Anatome Phthisici, in quo Pulmonum vesicæ maxima crassities reperta est, hepatis, lienis, diaphrag-

- ma, intestina invicem cohescentia, Tom. I. Ibid.
- Obs. 8. Phthisis à Pulmone innumeris pustulis fœtente mediastino putrefacto, & vitis varis viscerum naturalium. Ibid.
- Obs. 9. Phthisis, à sperto sanguinis, Pulmones dextra vel sinistra parte tumore, cum viscido humore in vesiculis eorum contento &c. pag. 714.
- Obs. 84. Phthisis utraque Pulmonum pars livens maculis variegata & plena sanæ inventa est, cum hydropo dextri thoracis, ossis in corde, aliisque vitis viscerum naturalium. Ibid.
- Obs. 84. Anatomie Phthisis cujus Pulmo & Jecur pustulis obfusa erant. Ibid. pag. 714.
- Obs. 89. Tabes à Pulmonibus lividis & pinatolis humoribus imbutis, post hydatyrosin. Ibid.
- Obs. 86. Phthisicorum quorundam Pulmones lapides & calculos continentes. Ibid. pag. 716.
- Obs. 87. Tabes à corporibus albis, pinatosis sibiis, in vena cava repositis, vesica calculo & Renum supuratione. Ibid.
- Obs. 88. Phthisis non ulceratis Pulmonibus, citra sanguinis aut puris spurum, cum vitio cerebri, parietis &c. Ibid. pag. 717.
- Obs. 89. Phthisis Pulmones aridi scirrhosis pleni, citra puris aut sanguinis spurum sunt repositi. Ibid. pag. 718.
- Obs. 90. Phthisis ab ulcere Pulmonum citra sanguinis spurum. Ibid.
- Obs. 91. Phthisis à syderatis Pulmonibus citra sanguinis aut puris spurum. Ibid. pag. 719.
- Obs. 92. Tabes inducta à Tumore duris Diaphragmatis radici infixi. Ibid. pag. 730.
- Obs. 93. S. 1. Tabes à pure supra Diaphragma congesto. Ibid. pag. 730.
- Obs. 94. E Phthisicis si sane restituti, quibus vel callus in Pulmonibus contractus, vel agglutinatus est cum pleura pars exulcerata. Ibid.
- Obs. 95. Phthisis cito succumbunt, si Pulmones pleura adnascuntur. Ibid. pag. 731.
- Obs. 96. Puris spurum Phthisicis pathognomonum non semper est signum nec ulcus pulmonum semper sequitur. Ibid.
- Obs. 97. Insigne Pulmonis ulcus citra dolorem & tussim. Ibid.
- Obs. 98. Pulmones citra insignem doloris sensum dimidia parte sepe consumpti. Ibid. pag. 732.
- Obs. 99. Tabes à complicatis Pulmonum & fini ventris affectibus. Ibid.
- Obs. 100. Anatomie puri marasmo extincti, cui Hepar justo majus, abcessu prope venam cavam, Pulmones nulli. Ibid.
- Obs. 101. Tabes à cordis vitio, quod exsiccum, Pulmonum multiplici lisione, Hepatis duritie, Pancreatis scirrho, mesenterii glandulis tumidis &c. Ibid. pag. 733.
- Obs. 102. In Phthisicis quibusdam ex sanguinis spuro, Pulmones post inflammationem scirrhosam duritiem contrahunt. Ibid. pag. 734.
- Obs. 103. Phthisis universalis, à putulentibus omnibus visceribus naturalibus & vitalibus, salvis solum renibus, liene & ventriculo. Ibid.
- Obs. 104. Phthisis ventriculorum cordis ossa à carnea consenscentia penè obturata fuerit reposita. Ibid. pag. 734.
- Obs. 105. S. 1. Tabes ab ulcere Pulmonis non semper inducitur. Ibid. pag. 736.
- Obs. 106. In Phthisicis cerebro, clavis aethoris credito, nihil vitii deprehensum est. Ibid. pag. 738.
- Obs. 107. Tabes ab obstructione venæ cavæ prope eor. Ibid. pag. 739.
- Obs. 108. S. 1. Tabes à cordis exsiccatione & defectu humoris in Pericardio. Ibid.
- Obs. 109. Tabes ab ulceribus cordis excisata. Ibid.
- Obs. 110. Tabes à Pericardii affectu. Ibid. Tom. I. pag. 740.
- Obs. 111. Anatomie Phthisis in utroque cordis fine canaliculis habentis. Ibid.
- Obs. 112. Atrophia in Boxe, ab abcessu in corde & Tuberculis in parenchymate Hepatis. Ibid. pag. 740.
- Obs. 113. Tabes ab obfuso in mediastino cordis. Ibid.
- Obs. 114. Tabes à tumoribus scirrhosis in pericardio, finibus & Galli, Qui affectus analogice ad homines referri potest. Ibid. pag. 741.
- Obs. 115. Atrophia ab infarctu auriæ & ventriculi dextri cordis. Ibid.
- Obs. 116. Tabes à scirrho Hepatis abcessibus plurimis repleti, lienis & Pulmonum vitio. Ibid.
- Obs. 117. Tabes sequens Hepatis inflammationem, abcessum ac gangrenam. Ibid.
- Obs. 118. Tabes à purulenta Jecoris indurata. Ibid. pag. 741.
- Obs. 119. Tabes à vitio Hepatis scirrhosi &c. Ibid.
- Obs. 120. Phthisis Jecur profunde caudicans repleta. Ibid.
- Obs. 121. Tabes Pectoris Rachitis Angliis dicta à Jecore supra modum infuso, ottum ducit. Ibid.
- Obs. 122. Tabes ab Hepate vitiatâ, non sanguificante, in thoracis cavitatem compulsa. Ibid.
- Obs. 123. Tabes à vitio Hepatis venæ obfusi, mesenterii & intestinum cum vermibus copiosis. Ibid.
- Obs. 124. Tabes à pure sub vulnerata Jecoris fibra collecta. Ibid. pag. 741.
- Obs. 125. Tabes à Jecoris substantia exesa, plurimisque lapillis in cuni felles. Ibid.
- Obs. 126. Tabes ob Reues Jecoris affixos. Ibid.
- Obs. 127. Tabes ab infusis lapillis in fellis vesica contentis & Jecoris substantia exesa. Ibid. pag. 744.
- Obs. 128. Tabes à defectu omnimodo Bilis in basi cula fellis. Ibid.
- Obs. 129. Tabes à Glandulis mesenterii & colli scirrhosis. Ibid. pag. 745.
- Obs. 130. Tabes cum anorexia, vomitu & diarrhæa, à scirrho pancreaticis & glandularum mesenterii. Ibid. pag. 746.
- Obs. 131. Tabes à lapillis minutis venas mesentericas obstruentibus. Ibid.
- Obs. 132. Tabes à mesenterio tumore affecto circa exortum, Tuberculo in corde &c. Ibid. pag. 747.
- Obs. 133. Tabes à mesenterii & mesocoli abcessu. Ibid. pag. 748.
- Obs. 134. Tabes à mesenterii abcessibus ejusque consumptione. Ibid. pag. 749.
- Obs. 135. Tabes à mesenterio scirrhoso, compressione venarum portæ & cavæ aliisque vitis partium naturalium & vitalium. Ibid.
- Obs. 136. Tabes à glandulis mesenterii tumidis orta. Ibid. pag. 750.
- Obs. 137. Phthisicorum Pulmones sepe integre reperi, male vero affectum orificium ventriculi. Ibid.
- Obs. 138. Tabes à Glandula pyloræ aduata. Ibid. pag. 751.
- Obs. 139. Tabes ab ventriculo corrosum ab usu magisteriorum corallorum & perlarum. Ibid.
- Obs. 140. Tabes ventriculi syderationi succedens. Ibid.
- Obs. 141. Anatomie Tabidi post pœstum exhibitum, in cujus ventriculo massa dura reposita est. Ibid.
- Obs. 142. Tabes nata à Tumore scirrhoso ventriculi pylori proxime adherente. Ibid. pag. 752.
- Obs. 143. Tabes à corruptione omnium viscerum, solo corde salvo. Ibid.
- Obs. 144. Tabes à depravata constringione viscerum omnium naturalium. Ibid.
- Obs. 145. Tabes à Glandularum lactearum lumbarium vitio. Ibid. pag. 753.

- Obs. 145. In quibusdam morbo consumptis. Pancreas  
est tunica à parenchymate abscississe visa est.  
Tom. 1. Ibid.
- Obs. 146. Atrophia in puero à Pancreate scirrhoso.  
Ibid.
- Obs. 147. S. L. Macies à Inimicis longitumis in Rene  
reperitis. Ibid.
- Obs. 150. Atrophia à verme in altero Renum, & cal-  
culo in lumbis. p. 754.
- Obs. 151. Anatomie Canis Atrophia confecti, cujus re-  
nis finitri parenchyma vermis depascebat. Ibid.
- Obs. 152. Tabes à cortosis duabus vertebrais lumbari-  
bus. Ibid.
- Obs. 153. Tabes à tumore muscularis lumbisibus lateris  
dextri adnato, cum annexis stentomatis, atheroma-  
tis melicisibus. pag. 755.
- Obs. 154. Atrophia ab inflammata altera glandularum  
lumbiarum, cum Pulmonum vitio. Ibid.
- Obs. 154. S. L. Anatomie Canis, Tabidi à rupta ductu  
Thoracis, chylium in venas subclavas yebente  
p. 746.
- Obs. 154. Tabes ab ulceratione musculi mastoidei in  
ducta casus pus per venam jugularem ad dextrum  
cordis ventriculum penetraverat: A liene indurato  
& magno, Hepar consumptio biliofaque materia  
referto Pancreate magno & scirrhoso &c. p. 757.
- Obs. 156. Atrophia partium inferiorum, ob defectum  
succo nervi nutritii. p. 761.
- Obs. 156. Atrophia partium inferiorum ob defectum  
succo nervi nutritii. pag. 761.
- APPENDIX, De Atrophia à lymphæ inopia. p. 62.
- Obs. 157. Tabes dorsalis à pituita lactam histium fu-  
bennate & medullam opprimente. Ibid.
- Obs. 158. Tabes à glandulis scirrhosis per totum cor-  
pus sparsis. p. 763.
- Obs. 159. Mulieris tabidæ abdomen pinguedine in-  
farctum repertum. Ibid.
- Obs. 160. Tabes ab osium apostemate. Ibid.
- Obs. 161. Tabes à causa abdita. p. 764.
- Obs. 162. In Tabido arteria cutialis sanguine destitu-  
ta reperta. Ibid.
- Obs. 163. Tabes à lumbicis in trunco venæ portæ.  
Ibid.
- Obs. 164. In Phthisico bronchij particula ossæ reper-  
ta. Ibid.
- Obs. 165. In Phthisico minimum cerebri aderat. Ibid.
- Obs. 166. Tabes in Phthisicis ossa etiam attingit.  
Ibid.
- Obs. 167. Tabes varios & multiplices imi ventris af-  
fectus sequuta. Ibid.
- Obs. 168. Phthisis ab excisa epiglottide &c. p. 766.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Phthisi.

- Obs. 1. **M** Arasmus à pancreatis extescentia mitta  
& mesenterio glanduloso. Tom. 1.  
pag. 766.
- Obs. 2. Phthisicos non interire à puris copia suffoca-  
tos &c. probatur. p. 767.
- Obs. 3. Phthisis à viscerum omnium labe &c. p. 768.
- Obs. 4. Phthisis ab abscessibus in pulmone; Lienis du-  
plicif. Ibid.
- Obs. 5. Tabes à rene dextro calculoso & purulento,  
cum pulmonum gangrenosi. p. 769.
- Obs. 6. Phthisis ab ulcere, vomica & purulenta pul-  
monis cum bile per abdomen diffusa. Ibid.
- Obs. 7. Phthisis ab ulcere pulmonis præcedente men-  
sum suppressione & hæmoptysi. Ibid.
- Obs. 8. Tabes à denegata chyli percolatione per inte-  
stinorum carneam crustam. Ibid.
- Obs. 9. Tabes ob vitium & multiplex cordis vi-  
tium. Tom. 1. Ibid.
- Obs. 10. Ulcera pulmonum dolorem non parum un-  
de hoc vitium sensu destituti evincitur. p. 770.
- Obs. 11. Phthisis ab ulcere, induratione & purulenta  
pulmonum. &c. Ibid.
- Obs. 12. Phthisis ab insigni pulmonum ulcere. p. 771.
- Obs. 13. Tabes ab aquis in thoracis cavo. Ibid.
- Obs. 14. Phthisis inducitur à pituita pulmones exceden-  
te, eosque ita exterius investiente ut toti aggluti-  
nentur pectori. Ibid.
- Obs. 15. Phthisis vulnus sequuta ab pulmone: violente  
p. 772.
- Obs. 16. Tabes aliquando fit ab arteria venosa piti-  
ta infecta. Ibid.
- APPENDIX, De Apostematum & Tuberculorum  
in pulmonibus generatione & curatione, per eia-  
triculos ab obitu manifestas. p. 773.
- Obs. 17. Hædico-Phthisica febris; ubi ulcera in pul-  
monibus reperta &c. Consultationes, & visio cada-  
veris. p. 774.
- Obs. 18. Phthisica affectio ab insigni tuberculo semi-  
scirrhoso, abscessu & aliis tuberculis granulosis per  
pulmonem substantiam reperiis. p. 781.
- Obs. 19. Phthisis scrophulosa in qua pulmones calculosi  
inventi; lien duplex &c. p. 783.
- Obs. 20. Phthisis à pulmonibus putridis, scirrhosis;  
epiplois scirrho. p. 784.
- Obs. 21. Phthisis ex pulmonum & pancreatis scirrho-  
sitate. p. 785.
- Obs. 22. Tabes in qua pulmonum ac reliquorum vi-  
scerum varia adnotata sunt vitia. p. 787.
- Obs. 23. Phthisica pulmonem flaccidum, decolorem,  
majusculo abscessu affectum habuit. p. 788.
- Obs. 24. Phthisis à vomice purulenta hinc inde refer-  
tis, cum pericardij hydropse. p. 789.
- Obs. 25. Phthisis in qua pulmo finitri consumptus;  
pericardij hydropis. &c. Ibid.
- Obs. 26. In Phthisico pulmones tenacissime costis ad-  
nati fuere & maculis pluribus variegati. p. 792.
- Obs. 27. Phthisis à pulmonibus exulceratis. p. 792.
- Obs. 28. Phthisis à pulmonibus pustulis repletis, me-  
diastino putrefacto. p. 793.
- Obs. 28. Phthisis à pure feridissimo pulmones opplen-  
te. Ibid.
- Obs. 30. Phthisis à pulmoulbus emicis. Ibid.
- Obs. 31. Phthisis in pulmonum vasa purulenta infecta  
&c. Ibid.
- Obs. 32. Phthisis in qua pulmo interius scirrhosus.  
p. 794.
- Obs. 33. Phthisis in qua multiplex ac varium viscerum  
omnium vitium repertum est. Ibid.
- Obs. 34. Tabes à Dysenteria. p. 797.
- Obs. 35. Tabes cum hydropse post peripneumoniam.  
Ibid.
- Obs. 36. Phthisis scrophulosa. p. 796.
- Obs. 37. Phthisis ab hæmoptoia. Ibid.
- Obs. 38. Phthisis in qua pulmones & hepar variè affecti.  
p. 797.
- Obs. 39. Phthisis à tribus clavicalis in pulmones illa-  
psis. p. 798.
- Obs. 40. Phthisis ab hepate; hepatica proprietate dicta.  
Ibid.
- Obs. 41. Phthisis à calculis in vesica felica. p. 802.
- Obs. 42. Phthisis ab ovario altero ulceratione contum-  
to, cum aqua multa in ipsius membrana. p. 802.
- Obs. 43. Phthisis in qua abdominis pinguedo multa  
ren calculis repleta, vesica felica calculis onusta &c.  
p. 803.
- Obs. 44. Phthisis in qua pulmones non parum con-  
sumti & nigri. p. 804.

- Obs. 45. In Phthisici corde ingens polypus reperitur. Tom. 1. p. 837.  
 Obs. 46. In Phthisica pulmonum corruptio multa, cum adhaesione partibus vicinis, & cordis polyppis. Ibid.  
 Obs. 47. In Tæpido mesenterium scirrhosum, & vicinæ prope abdominis omnine ac pulmo corporculis grandiosis repleta. p. 836.  
 Obs. 48. Phthisis in qua grandines pulmonum aliarumque partium. p. 838.  
 Obs. 49. In Phthisico hepar ac fini ventris viscera male affecta; pulmones scirrhis repleti; pericardium humore multo glutinoso distentum. p. 815.

- Obs. 27. Palpitatio cordis succedanea vel comes variationum affectionum vasorum illi adfuerunt. p. 834.  
 Obs. 28. Palpitationi cordis æta obnoxius cavitatem pectoris aquæo humore repleam exhibuit. p. 837.  
 Obs. 29. Palpitatio ab aqua in thorace & pericardio. p. 836.  
 Obs. 30. Palpitatio ob corpus membranaceum, cordis superpositum, aliud cor referens. Ibid.  
 Obs. 31. Palpitatio ab aneurismate lienis. Ibid.  
 Obs. 32. Palpitatio à corruptione omnium viscerum, & corde livido in quo cruor niger. Ibid.  
 Obs. 33. Palpitatio à vicio testiculi fræmenci. p. 837.  
 Obs. 34. Cordis dolor à tumore scirrhoso, humore putrido repleto, parieti ventriculi dextri affixo, cum defectu humoris in pericardio. Ibid.  
 Obs. 35. Cordis dolor à calculo in ejus sinu dextro. Ibid.  
 Obs. 36. Cordis dolor à frustulo carnis nigre in cordis sinistro sinu. p. 838.  
 Obs. 37. Cordis dolor ab ulcere in eo. Ibid.  
 Obs. 38. Cordis dolor compressivus ob pericardium porre scaten. Ibid.  
 Obs. 39. Cordis ardor perpetuus in quodam cui cor pilosum, & truncus aortæ descendens circa diaphragma offensus. Ibid.  
 Obs. 40. Cordis tremor ab ossæo corpore in eo contentum. Ibid.  
 Obs. 41. Cordis tremor à pericardij inflammatione. p. 840.  
 Obs. 42. Cordis tremor à feri à capite illapso innervum cordis. Ibid.  
 Obs. 43. Cor in dextro latere pulsans, eò depulsum ab abscessu in sinistro thorace contento. Ibid.

## SECTIO VIII.

### De Palpitatione, Tremore, Dolore Cordis.

- Obs. 1. Palpitationis cordis variz causæ ex Anatomie. Tom. 1. p. 816.  
 Obs. 2. Cordis Palpitatio ab ejus inflammatione. Ibid.  
 Obs. 3. Palpitatio cordis à sanguine concreto in dextro ejus sinu ac auricula summè angta &c. Ibid.  
 Obs. 4. Palpitatio cordis ab aorta, in suo è corde egressu, ossæa. p. 817.  
 Obs. 5. Cordis palpitatio à bile terrorida in arteriis effusa. p. 819.  
 Obs. 6. Palpitatio cordis ab hydatidibus in ejus membrana. Ibid.  
 Obs. 7. Cordis palpitatio à corpore membranaceo carnosio ejus auriculis annexo. p. 820.  
 Obs. 8. Cordis palpitatio ab ulcere & abscessibus in ejus substantia. Ibid.  
 Obs. 9. Cordis palpitatio à lapidibus in eo contentis. Ibid.  
 Obs. 10. Cordis palpitatio à polypo auriculæ dextræ & aortæ. p. 821.  
 Obs. 11. Palpitatio ab irruente affatim in cor sanguine unde disruptum septum. Ibid.  
 Obs. 12. Palpitatio cordis ob substantiam carneam in ejus sinistro sinu contentam. p. 822.  
 Obs. 13. Palpitatio cordis enormiter magni ob polypum in arteria magna, & valvulæ ex parte consumptionem. Ibid.  
 Obs. 14. Cordis palpitatio ob corpora extranea sinus ejus occupantia &c. Ibid.  
 Obs. 15. Cordis enormiter magni palpitatio à calculis in ejus sepro conclusis. p. 825.  
 Obs. 16. Palpitatio cordis ab hydropse lutulento pericardij & calculis duobus in corde. p. 826.  
 Obs. 17. Palpitatio ob cor cruore infarctum & intumefactum. p. 826.  
 Obs. 18. Palpitatio à flacibus pericardium distendentibus. p. 827.  
 Obs. 19. Palpitatio à vermibus pericardio conclusis. p. 828.  
 Obs. 20. Palpitatio ob adhesionem pericardij cum corde. Ibid.  
 Obs. 21. Palpitatio à varijs pericardij affectionibus. Ibid.  
 Obs. 22. Nisi alia scedat causa, palpitatio non excitatur à nimia copia humoris in pericardio. p. 831.  
 Obs. 23. Palpitatio à corporibus extraneis in aorta, absque vasis cordi annexis. Ibid.  
 Obs. 24. Palpitatio à carne mole cordi à dinata duplex quasi cor faciente. p. 832.  
 Obs. 25. Palpitatio cordis & saltus circa ventriculi regionem, ob sinum illos mutatum. Ibid.  
 Obs. 26. Cordis palpitatio & tremor ob vermem illi affixum. p. 833.  
 Obs. 27. In palpitatione cordis obnoxius arteriæ magnæ tantæ à modum distantur. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Palpitatione, Tremore, Dolore Cordis.

- Obs. 1. Palpitatio cordis in scorbuticis pendet à polyppis cordis. Tom. 1. p. 841.  
 Obs. 2. Palpitatio Cordis ab Abscessu in pulmonibus & feri copia in pericardio. Ibid.  
 Obs. 3. Cordis palpitatio à corpore cartilagineo vel nam pulmonalem propè occultente, &c. Ibid.

## SECTIO IX.

### De Pulsibus præternaturalibus.

- Obs. 1. Pulsus exilis, Asphyxia à callo in magna arteria oborto. Tom. 1. p. 49.  
 Obs. 2. Pulsus inæqualites ob Cordis finitum ventriculæ subnigricante carne in factum. p. 845.  
 Obs. 3. Pulsus inæqualitas à pituitosa concretionem in Corde. p. 46.  
 Obs. 4. Asphyxia ab utroque cordis ventriculo corporibus adiposis obstructo. Ibid.  
 Obs. 5. Pulsus inæqualis & similis palpitanti, à sanguine in Corde & toto reorrido. Ibid.  
 Obs. 6. Pulsus inæqualitas excitata ab abscessu in vena arteriosa. p. 47.  
 Obs. 7. Asphyxia quadrimestris à grumis sanguinis in Aorta prope cor. Ibid.  
 Obs. 8. Pulsus inæqualis & parvitas ob hydropem thoracis, dextram pulmonis partem læscidam, finitum in sanem resolutam, &c. p. 848.  
 Obs. 9. Arteriarum omnium insignis Pulsio, cum



- actu totius corporis ab aëritate arteriarum venosarum. Tom. I. Ibid.
- Obs. 10. Pulsus interceptio à duobus Polypis in corde. p. 849.
- Obs. 11. Pulsus inæqualis & intermittens ob cordis ventriculum dextrum ulceratum, auriculam dextram majorem. Ibid.
- Obs. 12. Pulsus inæqualis, intermittens ob corpora foliata in sinibus cordis contenta. Ibid.
- Obs. 13. Pulsus intermittens, à calculo in cordis cavitate dextra contento, cum humore purulento in capulis. Ibid.
- Obs. 14. Pulsus intermittens, à calculo in aortæ ramo infuso. p. 850.
- Obs. 15. Pulsus parvus & intermittens ob Pericardium cordis undique adnatum. Ibid.
- Obs. 16. Pulsus formicans ob Pericardium aqua repletum. Ibid.
- Obs. 17. Pulsus Durus & inæqualis ob Pericardium inflammatum. p. 851.
- Obs. 18. Pulsus Durities & parvitas ob tumorem Pericardii innatum. Ibid.
- Obs. 19. Pulsus languidus & rarior ab insigni aqua turbida in Pericardio. Ibid.
- Obs. 20. Pulsus inordinatus, intermittens à Pulmonibus cuore suscitatus &c. Ibid.
- Obs. 21. Pulsus formicans ob vasa Pulmonis dextri plane purulenta, & Pericardium aqua plenum. Ibid.
- Obs. 22. Pulsus inæqualis à Pulmonibus sanguine nigerrimo, liquido, multaque sine obfessis. p. 852.
- Obs. 23. Pulsus crebrior ab humore acro Pericardio infuso, à quo cum cordis membrana fuit erosum. p. 853.
- Obs. 24. Pulsus molles, languidi, inæquales ab augmento Pulmonum partis alterius &c. Ibid.
- Obs. 25. Pulsus durissimus, vermiculans, celerrimus, à supputatione Pulmonum, Vomitis, aquosa substantia in pericardio, corde flaccido &c. p. 854.
- Obs. 26. Pulsus interceptus ob Pulmonem sinistram inflammatam, fere putrem. Ibid.
- Obs. 27. Pulsus inæqualis à vario Pulmonum vitio, & cordis insigni magnitudine. Ibid.
- Obs. 28. Pulsus interceptus ob partem sinistram Pulmonum materia fistida tamida. p. 855.
- Obs. 29. Pulsus interceptus ob partem sinistram Pulmonum materia fistida tamida. p. 855.
- Obs. 30. Pulsus magni, molles, quinta palliatione intercurrentes, à Pulmonum tumore &c vitio. Ibid.
- Obs. 31. Pulsus in dextera manu fere abortivus, in sinistra magnitudine & parvitate dispar, à dissimili inflammationis statu in dextro & sinistro pulmone, hydropne thoracis. Ibid.
- Obs. 32. Pulsus inordinatus, intermittens, urgentibus paroxysmis convulsivis, cum inflammatione pulmonum. Ibid.
- Obs. 33. Pulsus interceptus, intermittens ob Hydropem pericardij & thoracis. p. 856.
- Obs. 34. Pulsus inæqualitas ob Hydropem pectoris & Pulmonum. Ibid.
- Obs. 35. Pulsus debilis ob bilem minus acrem in vesica fellea contentam. Ibid.
- Obs. 36. Pulsus deficiens à corruptione omnium viscerum. p. 857.
- Obs. 37. Pulsus inordinatus, intermittens, urgentibus paroxysmis convulsivis, capillaribus, in arteriis deficiens, ob partes vitales in angustum coactas ab hepatis mole Pulmonum vitio &c. Ibid.
- Obs. 38. Pulsus vibrans ab Hæmatis incendio, sinistro pulmone purulento &c. Ibid.
- Obs. 39. Pulsus inæqualis, deficiens, ob cordis ventriculos & Pulmones sanguine repletos, cum carunculis in sinistro cordis sinu. p. 858.
- Obs. 40. Pulsus interceptus, tandem asphyxia, ob calculum in sinu dextro cordis inclisum, &c. Ibid.
- Obs. 41. Pulsus per triduum deficiens ab exhaustis sanguine cordis ventriculis. Tom. I. Ibid.
- Obs. 42. Pulsus inæqualis ob contenta extranea in sinibus cordis, succedente Asphyxia. p. 859.
- Obs. 43. Pulsus intermittens à corde exulcerato, &c. p. 861.
- Obs. 44. Pulsus inæqualis, inordinatus, intermittens, ob obstructionem utriusque sinus cordis à substantiis quidam ossium in edulle simili. p. 862.
- Obs. 45. Pulsus intermittens à calculo obfidente aortam, aortam juxta venas. Ibid.
- Obs. 46. Asphyxia à cordis vasis majoribus sanguine concreto repletis. Ibid.

## SECTION X.

## De Leptothymia, Syncope.

- Obs. 1. Syncope à corde sanie obfuso. Tom. I. p. 863.
- Obs. 2. Syncope ab ulceribus sinistram cordis auriculam exedentibus. Ibid.
- Obs. 3. Syncope à nigro concretoque sanguine in dextro cordis ventriculo, ejusque auricula; à nigro crassoque in sinistro. p. 864.
- Obs. 4. Animi deliquium à fetido humore in sinistro ventriculo cordis concluso. Ibid.
- Obs. 5. Leptothymia à tumore carnis nigrosæ in sinistro cordis sinu. p. 865.
- Obs. 6. Syncope Cardiacæ à Venæ in sinu cordis dextro abortiva. Ibid.
- Obs. 7. Leptothymia exulcerationem cordis sequens. p. 866.
- Obs. 8. Syncope ob defectum pericardij. Ibid.
- Obs. 9. Animi deliquium à corde extendito, cum variis partium vitalium & naturalium vitijs. Ibid.
- Obs. 10. Anatomie juvenis crebris Leptothymijs tentata, cujus cor magnitudinis insignis deprehensum est. Ibid.
- Obs. 11. Animi creberrima defectio ob putrem & fistidum humorem intra pericardium contentum. p. 867.
- Obs. 12. Syncope pericardij inflammationem sequens. Ibid.
- Obs. 13. Syncope Cardiacæ à concreto in venis sanguine. Ibid.
- Obs. 14. Syncope à carne excrecentia, inter magnæ arteriæ ramum & venæ arterialis radium suborta. p. 869.
- Obs. 15. Syncope à corpore fibroso in aorta contento. p. 870.
- Obs. 16. Syncope ab abscessu in diaphragmatis parte carnosa. Ibid.
- Obs. 17. Syncope Mediastini inflammationem, Pulmonum & Pericardij sequens. Ibid.
- Obs. 18. Leptothymia à Pancreatis abscessu orta. Ibid.
- Obs. 19. Syncope ab Iliacorum venarum concursu & dilatatione, in umbilico definentium & Jecur afficientium. p. 871.
- Obs. 20. Syncope à Lumbrico excitata, officio ventriculi affixo. Ibid.
- Obs. 21. Syncope à Tuberculo ventriculo innato & rupto. p. 872.
- Obs. 22. Leptothymia à corruptione Hepatis & Pulmonum. Ibid.
- Obs. 23. Syncope ab effuso, ob vas ruptum, sanguine in Abdomen &c. p. 873.
- Obs. 24. Animi deliquium ab abscessu in ventre dissimulato. Ibid.
- Obs. 25. Leptothymia, Syncope, à varijs tui ventris partium affectibus oborta, ventriculi, Hepatis, Lienis Renum, Pancreatis, uteri. Ibid.
- Obs. 26. Syncope, sanguinis nimiam effusionem per venæ sectionem sequens. p. 874.
- Obs. 27. Leptothymia crebre ob cor pericardio distentum, cum hydropne pectoris. Ibid.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Leipothymia, & Syncope.

- Obs. 1. Syncope lethalis effusum visum sequuta, ob sanguinem nigrum & concretum venam cavam supra cor obcurrentem. Tom. I. p. 877.  
Obs. 2. Animi frequens defectio ab ulcere cordis. p. 878.  
Obs. 3. Syncope frequens, cum respiratione intercepta à Polypo insigni in vena cava. Ibid.  
Obs. 4. Animi deliquij per consensum à ventriculo abortu rario ex Anatome petita. Ibid.  
Obs. 5. De syncope ab inflammatione Cordis. p. 879.  
Obs. 6. Syncope à Pericardio cordi undique adnato. p. 880.

SECTIO XI.

De Morte Repentina.

- Obs. 1. 5. 1. Mors subita ob effusum sanguinem in dextrum cordis sinum & pericardium, à rupta vena cava. Tom. I. pag. 881.  
Obs. 2. Anatome Virginis annoſæ subito mortuæ: cujus vasa circa cor sanguine exhausta repleta sunt, cum Pulmonibus viriatis. p. 883.  
Obs. 3. Mors subita à vermibus cordis aut pericardij incolis. p. 884.  
Obs. 4. Mors subita ab atro sanguine in cordis cavitare, serpo in pericardio & abscessu prope sinistram auriculam. Ibid.  
Obs. 5. Mors repentina à corporibus extraneis in sinibus cordis contentis. Ibid.  
Obs. 6. Mors subita ob Polypos in sinibus cordis, Pulmones sanguine infarctos &c. p. 885.  
Obs. 7. Mors subita ob sinistram cordis auriculam materia crassa repletam. Ibid.  
Obs. 8. Mors repentina ob sanguinem intra cor & pericardium effusum, & abscessus in aorta. Ibid.  
Obs. 9. Mors repentina à sanguine cor suffocante. Ibid.  
Obs. 10. Mors repentina à disrumpa vena in ventriculo cordis, cum Pulmonum vitijs. p. 886.  
Obs. 11. Mors repentina à sanguinis copia suffocante & obstruente sinistram cordis ventriculum. Ibid.  
Obs. 12. Mors subitanea à retrocessione sanguinis ex arteria & vena axillari ad cor, ob corpus carneum cavitatem arteriæ obturans. Ibid.  
Obs. 13. Mors repentina à sanguine circa cor &c. con crescente. p. 887.  
Obs. 14. In subita morte extincto, repetitum Pericardium aqua & sanguine concreto repletum. Ibid.  
Obs. 15. Mors subita ab aqueo humore in pericardio redundante. Ibid.  
Obs. 16. Mors subita ab adipis copia pericardium investiente. p. 888.  
Obs. 17. Mors subita à nimia pinguedine. Ibid.  
Obs. 18. Mors subita ab irridente afflatu in Pulmones sanguine, ibique concrecente. Ibid.  
Obs. 19. Mors subita à putredine querti Pulmonum lobi. p. 889.  
Obs. 20. Morte subita abrepta mulieris anatome cujus mediastinum plenum erat sero sanguineo, Pulmonis substantia pure repleta, Testiculos sinistres viriatis &c. p. 889.  
Obs. 21. Anatome viri morte repentina subitæ, in ejus thorace repleta massa, siccum referens, in medio pendens sanguine nigricante plena. Ibid.

Index Anat. Boneri.

- Obs. 22. Mors subita ab hydropæ Thoracis, Pulmonum motum impediente. Tom. I. pag. 889.  
Obs. 23. Mors subita à Tabe & consumptione Pulmonum. p. 890.  
Obs. 24. Mors subita ob Pulmones sicciore & vitium cordis auricularum, unde impedita sanguinis circulatio. Ibid.  
Obs. 25. Mors repentina à retortida bile in arteriis effusa. Ibid.  
Obs. 26. Anatome hominis subito extincti, cujus valvule femilanares, ad aortæ ostium fixæ, offere repertæ sunt. Ibid.  
Obs. 27. Mors subita ob corruptionem omnium viscerum vitalium & naturalium. Ibid.  
Obs. 28. Mors repentina à Corde flaccido, suppurato &c. vitio omenti, pulmonum, jecoris &c. Ibid.  
Obs. 29. Mors ex improvise adveniens, à rupta pulmonis vomica & pure ad Cor penetrante. Ibid.  
Obs. 30. Mors repentina ab hydropæ Thoracis & Pericardij, ac vitio cordis nigro sanguine distenti. p. 892.  
Obs. 31. Mors subita ab appenso amulero ex Arsenico, à quo cor siccum, nigricans & ulceratum fuit. Ibid.  
Obs. 32. Mors subita à Cordis corruptione & pericardij consumptione. p. 893.  
Obs. 33. Mors subita ab alterato ventriculi fundo. Ibid.  
Obs. 34. Mors subita à subito bilis in ventriculum confluxu. Ibid.  
Obs. 35. Mors subita in quodam cui ventriculus vinculo quasi strictus videbatur. Ibid.  
Obs. 36. Mors repentina à bilis in ventriculum effusione. Ibid.  
Obs. 37. Mors subitanea à pure ex abscessu rupto, & pure in intestina consuente. p. 894.  
Obs. 38. Mors repentina à vermibus ventriculum perforantibus. Ibid.  
Obs. 39. Mors subita ob fungorum esum, à quibus redditum Hepar rurgidum & albidum. Ibid.  
Obs. 40. Anatome cujusdam subito extincti, cui gibba Jecoris pars ulcere affecta erat. Ibid.  
Obs. 41. Anatome mulieris repentina morte subitæ, In cujus hepate lapis repperus. Ibid.  
Obs. 42. Mors subita à ruptura vesicæ felleæ. Ibid.  
Obs. 43. Mors subita à sanguine à Liene putri effuso. p. 895.  
Obs. 44. Mors subita sequuta Vasotum rupturam & sanguinis intra corpus effusionem. Ibid.  
Obs. 45. Mors subita ab Abscessu Hepatis, sanguine circa id extravasato, & sero in utero mortuo. Ibid.  
Obs. 46. Mors repentina à Pancreate sphacelato, Pinguedinis copia in partibus internis &c. p. 896.  
Obs. 47. Mulieris mors repentina, cui Testiculus dexter mirum in modum intumuerat. Ibid.  
Obs. 48. Mors subita ab uteri gangrena & corruptione. p. 897.  
Obs. 49. Anatome mulieris subito mortuæ, in qua nihil repperit præter Testiculorum alterum corruptum. Ibid.  
Obs. 50. In cadavere mulieris subito mortuæ & perperuo cum magnis ejulatibus querula, uterus convolutus inventus cum binis embryonibus, & lapide in cystis felleæ. Ibid.  
Obs. 51. Mors subita ob vomitum in cerebro excitatum. Ibid.  
Obs. 52. Mors subita ob influxum feri in quartum cerebri ventriculum, Nobilem dictum. Ibid.  
Obs. 53. Mors subita à fracto osse temporali sub ipso musculo. p. 898.

Ecc

Obs.

Obs. 54. Mors repentina à sanguine in ventriculos cerebri illapso, ibique concreto, Plexu choroide quasi confuso, Pulmonibus laceribus annexis. T.I. pag. 898.

Obs. 55. Mors subita, cujus nulla causa intus in corpore reperta, à venenata aura cor subito opprimente nata. Ibid.

Obs. 56. Mors subita ab impedito sanguinis ingressu in cordis sinistrum ventriculum. Ibid.

APPEND. Mors subita interdum contingit ob Renes pinguedine obtusos. p. 899.

### ADDITAMENTA

#### Ad Sectionem de Morte Repentina.

- Obs. 1. **M**ors subita ob vitium Pulmonum & cordis sanguine turgentium &c. To. I. pag. 899.
- Obs. 2. Mors subita à cruoris copia cor obruente progressus illius palpirationibus crebris. Ibid.
- Obs. 3. Mors repentina Canis, ob Polypos omnes rotas corporis venas & arterias occupantes. Ibid.
- Obs. 4. Mors repentina à sanguine in Pulmones effuso, & renis vitio. p. 900.
- Obs. 5. Mors repentina mulieris, quasi suffocata, cujus ventriculus flatu distensus repertus cum amara nigra; & abrasione mucis; intestina tenuia inflammata, cum aliquot vitijs Pulmonum. p. 901.

### SECTIO XII.

#### De Gibbositate.

- Obs. 1. **G**ibbositas ob sinistrum Pulmonem & Pericardium firma cicatrice costis adnata. Tom. I. pag. 902.
- Obs. 2. Gibbositatis causa in capite reperta, ob vitiosam ossis Ethmoidis conformationem. p. 904.
- Obs. 3. Gibbositas ob spinæ dorsii irrigationem à cerebro humido. p. 906.
- Obs. 4. Gibbositas Pectoris & Dorsii à magnitudine Hepatis extraneuaria, Rachitis Anglis dicta, Tabes Pectoris. Ibid.
- Obs. 5. Gibbositas ob vertebrae dorsii in cavo inflexas. p. 910.
- Obs. 6. Gibbositas à vertebrae intus vel extra, aut ad latera inclinantibus ortum ducit. p. 911.
- Obs. 7. Anatome Gibbosi, cujus Pulmo integer repertus est; unde constat ejus affectus dyspnoeam non semper esse comitem. Ibid.
- APPEND. I. Gibbositas insignis, musculorum thoracorum vitio excitata, feliciter topici curata. p. 912.
- APPEND. II. Spinæ incurvatio & tortuositas febrem sequuta, resolventibus & roborantibus curata. Ibid.

### ADDITAMENTA

#### Ad Sectionem de Gibbositate, ubi de Rachitide.

- Obs. 1. **R**achitidis & respirandi difficultate laborantis, anatomica inspectio. Tom. I. p. 912.
- Obs. 2. Rachitidem consequens dolor Colicus lethalis, in quo Intestina, ac præcipue crassa, rubore inflammatorio hinc inde perflua; Cecum tumidum ac sphaelo tactum; Bilis ad instar picis paulò diluoris nigra &c. p. 913.
- APPEND. De causis incurvationis ossium & Gibbositatis in Rachitide. p. 914.

## TOMUS SECUNDUS LIBER. TERTIVS

### De Affectibus imi Ventris.

#### SECTIO I.

#### De Inappetentia.

- Obs. 1. **A**norexia inducitur ab orificio ventriculi superiore ulcerato, humoribus corruptis in cavitate ejusdem. Tom. II. pag. 7.
- Obs. 2. Apopsia ob ventriculum humore viridi plenum colloque intestino ubi ventriculo annexum est valde laxo &c. p. 4.
- Obs. 3. Inappetentia à vitio fibrarum ventriculi & parvitate nimia lienis. Ibid.
- Obs. 4. Inappetentia à ventriculi depressione per magnum hepatis. Ibid.
- Obs. 5. Inappetentia à corrugatione ulcere fistuloso aliisque vitijs ventriculi cum omento putrido vesicæque felleæ rupture. Ibid.
- Obs. 6. Inappetentia à viscerum omnium corruptione. Ibid.
- Obs. 7. Inappetentia diuturna ab adipi copioso circa fundum internæ superficiei ventriculi. p. 5.
- Obs. 8. Apopsia ob ventriculum laxiorem in quo globuli deprehensi, lienem scirrhosum. p. 6.
- Obs. 9. Inappetentia producta à varijs ventriculi affectibus ejus scilicet putredine, laceratione, substantia tenui aliisque causis. Ibid.
- Obs. 10. Inappetentia inducitur à diversis hepatis aut lienis affectibus puta hepate solito majore, duro, ejus vomica, abscessibus &c. p. 7.
- Obs. 11. Inappetentia ab intestinis sphaelatis circa quæ varia curiosa. Ibid.
- Obs. 12. Apopsia orta à vitio coli intestini fecibus aut viscosis humoribus repleti. Ibid.
- Obs. 13. Apopsia, oris amoror à bile in ductibus choledochis redundante, vesicula eâ turgente, hepate male constituto. p. 8.
- Obs. 14. Anorexia à vitio hepatis subputridi lienis, cum ventriculi interiore tunica corrosa. Ibid.
- Obs. 15. Inappetentia, Bradypepsia aliisque affectus pancreatis vitio adscripti ab hepate affecto oriundi. Ibid.
- APPENDIX. De nro Pancreatis ejusque succi, atque ostenditur pluribus quidem morbis dare originem perperam tamen multos ipsi adscribi à vitijs aliarum partium deducendos. Ibid.
- Obs. 16. Apopsia à scirrho pancreatis & glandularum mesenterij orta. p. 10.
- Obs. 17. Apopsia exorta à varijs vitijs & complicatis partium naturalium puta pancreatis, renis, omenti, hepatis &c. Ibid.

### ADDITAMENTA

#### Ad Sectionem de Inappetentia.

- Obs. 1. **A**norexia à ventriculi fibris prorsus laxis. p. 12.

## SECTIO II.

*De Fame præternaturali.*

Obs. 1. **A**ppetitus inextinguibilis in quodam canis ventriculus ingentis magnitudinis cruore ad medium repletus. Tom. II. pag. 11.

APPEND. De Canina Fame ex lumbriis alimentum assumptum depascentibus. p. 13.

Obs. 11. Fames extraordinaria insigni hepatis molis adscripta. p. 14.

Obs. 3. Fames intensa à stomachi & intestinorum vitiosa figura, anfractibus carentium, pylori carentia. Ibid.

Obs. 4. Fames & edacitas summa à putri Lienis. pag. 15.

Obs. 5. Anatomie Viri voracis in cuius ventriculo aquæ nigra copia inventa est. Ibid.

Obs. 6. Hominis voracis anatomie in cuius ventriculo bilis deserebatur. Ibid.

Obs. 7. Anatomie puellæ famelicæ in qua splenica vena insigni magnitudine prædita reperta est. Ibid.

APPEND. De Lienis Usa. Lienis ad excitandum appetitum nihil conferte exemplo canis ostenditur qui eo per Sectionem privatus ut ante famelicus fuit. p. 16.

Obs. 8. Fames extraordinaria imputata magnitudini ventriculi & lienis ac trium intestinorum absentione. p. 17.

Obs. 9. Fames insatiabilis à pediculorum caterva in ventriculo alimentum absumentium. Ibid.

Obs. 10. Voraces & bibones non semper amplo ventriculo præditi sunt. p. 18.

Obs. 11. Cuiusdam summe famelici œsophagus in thorace insigniter dilatatus repertus est. Ibid.

Obs. 12. Boulimia & fames canina infarctum mesenterij ejusque abcessus sequuta. Ibid.

Obs. 13. Ductus pancreaticus duplex in viro famelico ventris intumescens atque cruciatus missè vexato repertus. p. 19.

Obs. 14. Fames Canina à Colo intestino valde distento & vitrea viscida piruita referto. Ibid.

Obs. 15. Pica in muliere crudorum piscium comestione placanda, cui colon crassis flatibus distentum repertum est. Ibid.

Obs. 16. Pica à ventriculo exortu cum liene circa regionem vesicæ latente. Ibid.

## SECTIO III.

*De Siti Morbosa.*

Obs. 1. **S**itis diversos ventriculi affectus (scilicet ejus ardorem cum humoris viridis copia aliasque varias sitis causas sequuta. Tom. II.

Obs. 2. Sitis immensa ab inflammatione fundi ventriculi in gangrenam desinente &c. p. 23.

Obs. 3. Sitis à pulmonibus nigris tumidis, hepate nigro sanguine consperso, cysti felle destituta. p. 24.

Obs. 4. Sitis ab Erysipellate pulmonum & hepatis incendio. Ibid.

Obs. 5. Sitis p. n. excitata à diversis vitijis partium vitalium & naturalium puta pulmonibus puta-

lentis, aridis exstis ventriculo pure referto &c. pag. 25.

Obs. 6. Sitis excitata à varijs aut complicatis affectibus partium naturalium; scilicet ventriculi interiore tunica corosa, hepatis & lenis substantia corrupta &c. Ibid.

Obs. 7. Sins molesta ob varios partium vitalium affectus puta cordis v. tres p. tanta plenitudo cum pericardio adhesionem, per cardij membranas, que interseptientium inflammatione pulmonis tabidi &c. p. 16.

Obs. 8. Sitis ab incendio viscerum vitalium quæ marcida reperta absumpto humore pericardij. p. 17.

Obs. 9. Sitis absentia in iis quorum ossa solida medulla carent. Ibid.

## ADDITAMENTA

*Ad Sectionem de Siti morbosa.*

Obs. 1. **S**itis immensa ab Erysipellate pleuræ & pulmonum latere sinistro ventriculi fundo flavidine infecto à contactu vesicæ fellicæ. pag. 17.

Obs. 2. Sitis intensa in se ab inflammatione uteri. Ibid.

Obs. 3. Mulieris sibilundæ cor maximum deprehensum est. p. 18.

Obs. 4. Sitis ob pericardium aqua destitutum, cordi omnino adcretum. Ibid.

## SECTIO IV.

*De Deglutitione laesa.*

Obs. 1. **D**eglutitio laesa ob convulsionem Oesophagi pendentem à materia viscida initio nervorum incumbendo. Tom. II. p. 18.

Obs. 2. Deglutitio laesa à tuberculo fauces occupante. p. 19.

Obs. 3. Deglutitio laesa ob molem carneam circa exortum asperæ arteriæ innatam & œsophagum. Ibid.

Obs. 4. Deglutitio laesa ab adipis copia gulæ & tracheæ adnata. Ibid.

APPEND. Deglutitio laesa ob pruni ossiculum in tonsillis subsistens. Ibid.

Obs. 5. Deglutitio laesa ob Columellæ & Tonsillarum absentionem. p. 31.

Obs. 6. Deglutitio laesa ob Epiglottidem induratum. Ibid.

Obs. 7. Deglutitio laesa ob œsophagum callosum & compressum à materia crassa ambiente. Ibid.

Obs. 8. Deglutitio laesa ob Oesophagum cartilagineum redditum & dorsi spinæ accretum. p. 32.

Obs. 9. Deglutitio laesa ob obduratum Oesophagum à cartilagine ab ipso enata. p. 33.

Obs. 10. Deglutitio laesa ob Thymum glandulam corruptis humoribus infarctam. Ibid.

Obs. 11. Deglutitio laesa ob strumas officium stomachi obidentes. Ibid.

Obs. 12. Deglutitio difficilis ob carunculam gulæ innatam. Ibid.

Obs. 13. Deglutitio difficilis ob œsophagum divinum. Ibid.

Obs. 14. Deglutitio abolita ob summam œsophagi angustiam. Ibid.

- Obs. 15. Deglutitio abolita ab oesophagi inflammatione post devoratum officulum, Tom. II. pag. 33.
- Obs. 16. Deglutitio impedita ob tumorem lateralis arteriae adnatam, oesophagum per filamenta intus enata obstructum & Glandulas ejus exteriores tumidas. p. 34.
- Obs. 17. Deglutitio laesa ob adipem Gulae & Tracheae adnatum. p. 35.
- Obs. 18. Deglutitio laesa ob vitium chylem in stomacho contentum, & pituitam asperam arteriam implentem Oesophagum comprimentem. Ibid.
- Obs. 19. Deglutitio laesa in Puella ob vitium ventriculi & pulmonum. Ibid.
- Obs. 20. Deglutitio laesa à cartilaginea duritie sphincteris gulae totiusque oesophagi, Glandularum laryngi adnarum miro incremento. Ibid.

- APPEND. I. Deglutitio laesa & depravata ab atrociata larynge & musculis vicinis exsiccatis. Ibid.
- APPEND. II. Deglutitio potus laesa ob arteriae asperae siccitatem & ligulae constrictionem. p. 36.
- Obs. 21. Deglutitio laesa à tuberculo ori ventriculi interno. Ibid.
- Obs. 22. Deglutitio laesa à scirrho ventriculi orificium obfidente. Ibid.
- Obs. 23. Depravata deglutitio potus qui velut in cavum descendere videbatur ob pulmones costis annexos ex parte purulentos. p. 37.
- Obs. 24. Deglutitio potus laesa ob callum in arteria aorta obortum. Ibid.
- Obs. 25. Deglutitio laesa ob humorem foetidum in ventriculo contentum cum stribus Pylorum exulceratum &c. connexum in ibi cum hepate. Ibid.
- Obs. 26. Deglutitio laesa ob Gulam ab intestinis compressam. 1. Hepatis partis cum ventriculo connexionem. 2. Ventriculi syderationem cum pulmonum inflammatione ab assumpto veneno. 3. p. 38.

ADDITIONALIA

Ad Sectionem de Deglutitione laesa.

- Obs. 1. Deglutitio laesa ac Fames ob ulcus insignem totam gulam quae arteriae adiacet occupante. Tom. II. p. 38.
- Obs. 2. Deglutitio laesa ob tuberculum cancerosum in Oesophago. Ibid.

SECTIO V.

De Singultu & Rummatione.

- Obs. 1. Singultus ab hepate, splene & intestinis vitiat. Tom. II. p. 39.
- Obs. 2. Singultus à fecore inflammato ventriculum comprimentem. p. 40.
- APPENDIX. De singultu ab inflammatione hepatis, & quomodo juvet sterntorio. p. 41.
- Obs. 3. Singultus à bile adulta ventriculi fundo contenta inflammatione viscerum Reni sinistro corrupto vicinorum, &c. Ibid.
- Obs. 4. Singultus ab attrabili humore in ventriculo contento. Ibid.
- APPEND. I. Singultus à lactis acrimonia orificium ventriculi infantis vellicante. Ibid.

- APPEND. II. Singultus periodicus soli sanguinis missioni è brachio cedens. p. 42.
- Obs. 5. Singultus ab omento ventriculum deorsum trahente ortus. Ibid.
- Obs. 6. Singultus inflammationem, hinc syderationem pulmonum & intestinorum sequens. Ibid.
- Obs. 7. Singultus excitatus à variis ventriculi, intestinorum aliarumve partium naturalium affectionibus. p. 43.
- Obs. 8. Singultus excitatus ab inflammatione vesicae urinae, Renis dextri & appendi mictetia. Ibid.
- APPENDIX. Singultus à prolapsu cartilaginis macronatae excitatus. p. 44.
- Obs. 9. Anatome Viri ruminantis cujus Oesophagus undique carnosus repertus est. Ibid.
- Obs. 10. Anatome alterius ruminantis cui ventriculus erat ingens & membrana interior admodum aspera. Ibid.

SECTIO VI.

De Concoctione laesa.

- Obs. 1. Concoctio laesa à nimia attenuatione & relaxatione tunicarum ventriculi. T. II. p. 45.
- Obs. 2. Concoctio laesa ob crustam densiorem tunicae ventriculi tunicae adnatam. p. 55.
- Obs. 3. Anatome puellae ventriculum imbecilem habentis qui stribus distensus repertus est. p. 56.
- Obs. 4. Concoctio laesa ob Omentum putrefactum. Ibid.
- Obs. 5. Concoctio laesa ob amplitudinem ventriculi nimiam & affectionem hypochondriacam. p. 57.
- Obs. 6. Ventriculi concoctio laesa & crebri Ructus ob ulceratum stomachum, hepatis & lienis vitia. p. 59.
- Obs. 7. Ructus frequentes ab atro humore in cavitatem attenuati ventriculi conclusi Pylozo scirrho. Ibid.
- Obs. 8. Ventriculi concoctio laesa ob delentia ejus rugas. p. 60.
- Obs. 9. Concoctio laesa & Ructus frequentes ab inflammatione ventriculi & intestinorum nigro humore oblitum. Ibid.
- Obs. 10. Ructus à ventriculo putri hepatis annexo emissi. Ibid.
- Obs. 11. Ructus frequentes à vitio ventriculi Epiplois obstructi &c. p. 61.
- Obs. 12. Concoctio laesa à ventriculi siti mutato. Ibid.
- Obs. 13. Concoctio laesa ab inflammatione ventriculi in quo nigricans materia reperta. Ibid.

ADDITIONALIA

Ad Sectionem de Concoctione laesa.

- Obs. 1. Concoctio laesa ob tunicarum ventriculi inflammationem. Tom. II. p. 61.
- Obs. 2. Concoctio ventriculi licet toto suo corpore duro &c scirrhoso facto bene se habens. Ibid.

## SECTIO VII

## De Ventriculi dolore.

- Obs. 1.** **D**E Dolore ventriculi ab ejusdem erosione à bile à cysti confluyente liqore seroso acri è mesenterio prodeunte cum varijs cun- riosis. Tom. II. pag. 61.
- Obs. 2.** Ventriculi dolor subito exortus à veneno illius substantia excoriantè, & corrodeute. p. 62.
- Obs. 3.** Ventriculi ingens dolor ob ejus erosionem à veneno factam. p. 63.
- Obs. 4.** Ventriculi dolor ab eo circa pylorum ab aqua sublimati cum jecore corrosivo. p. 64.
- Obs. 5.** Stomachi dolor ab excoriatione Oesophagi prope ventriculi orificium à vermibus induc- tæ aquæ chrysolæ potui imputatæ. Ibid.
- Obs. 6.** Ventriculi dolor ab ulcere circa ejus superius orificium &c. p. 65.
- Obs. 7.** Dolor ventriculi parte externa ulcerari. p. 66.
- Obs. 8.** Ventriculi dolor ab humore acri cum ero- dente. Ibid.
- Obs. 9.** Ventriculi tunicæ corrosæ repertæ sunt ab abusu Magisterij perlarum. p. 67.
- Obs. 10.** Ventriculi dolor ab erosâ inferiore ventri- culi tunica ex usu spiritus virtioli. Ibid.
- Obs. 11.** Ventriculi dolor ab ejus Erysipelate. Ibid.
- Obs. 12.** Ventriculi dolor ab Apostemate in inferio- re ejus ore & duodeno cum sanguinis copia in capacitate. Ibid.
- Obs. 13.** Dolor circa scrobiculum cordis à ventricu- li fundo inflammato, Omento gangrenoso &c. Ibid.
- Obs. 14.** Ventriculi dolor à scirrho existente inter binas ejus tunicas. p. 68.
- APPEND.** Ventriculi dolor à mole carnes in eo con- tenta. Ibid.
- Obs. 15.** Cardialgia à Vermibus orificium ventriculi mordentibus. p. 69.
- Obs. 16.** Ventriculi dolor à sanguine in eum abusu ob venæ Portæ rupturam, & cavæ partis hepatis continui solutionem. Ibid.
- Obs. 17.** Ventriculi ardor à bile in ejus substantiam effusa macula lutea se prodente. p. 70.
- Obs. 18.** Dolor ventriculi à veneno assumpto cum perforante. Ibid.
- Obs. 19.** Ventriculi dolor ab adhæsu hepatis partidi cum diaphragmate. p. 71.
- Obs. 20.** Ventriculi dolor à compressione ejus ob cartilaginem Xiphoidem induratum & corrupto hepate. Ibid.
- Obs. 21.** Ventriculi dolor à scirrho totum Pancreas, Mesenterij partem, Pylorum & jejuni partem oc- cupante. Ibid.
- Obs. 22.** Ventriculi dolor ab intestino porci cholô- dochii in ejus fundum. p. 72.
- Obs. 23.** Ventriculi dolor à bile atra ex liene in ven- triculum transfusa. Ibid.
- Obs. 24.** Ventriculi dolor ab atro fœco in ejus fun- do qui velut confusus repertus est. p. 73.
- Obs. 25.** Ventriculi ardor ob humorem viridem in eo inclusum & in fellis vesicula. p. 74.
- Obs. 26.** Ardore circa os stomachi laborantis ven- triculus maculis rubris conspersus repertus est. Ibid.

- Obs. 27.** Ventriculi dolor inductus à vitiosis hurro- ribus ejus cavitatem occupantibus. Tom. II. pag. 74.
- Obs. 28.** Ventriculi dolor à varijs ventriculi affecti- bus productus. Ibid.
- Obs. 29.** Ventriculi dolor à materia nigra, locumta inclusa. p. 75.
- Obs. 30.** Ventriculi dolor à lapidibus in ejus cavi- tate contentis. Ibid.
- Obs. 31.** Ventriculi dolor à siccitate aut eumore ejus membranarum. p. 76.
- Obs. 32.** Ventriculi dolor à materia cruda inclusa cum lapide accreto, hepatis duritie. Ibid.
- Obs. 33.** Dolor circa capsulaginem Xiphoidem à cal- culis in ventriculo & vesica fellæ. Ibid.
- Obs. 34.** Ventriculi & hypochondrij dextri torsio à calculis in vesica fellæ contentis. p. 77.
- Obs. 35.** Ventriculi dolor ob hepar illi adnatum & materiam nigram in illo contentam. Ibid.
- Obs. 36.** Stomachi dolor ob massam pilularum in ventriculo relictam. Ibid.
- Obs. 37.** Ventriculi dolor à lacertis & serpentibus inibi hospitantibus. Ibid.
- Obs. 38.** Ventriculi dolor à Zinziberis libra una in ventriculo relictæ. p. 78.
- Obs. 39.** Ventriculis dolor à vesiculis pediculis ple- nis illi affixis. Ibid.
- Obs. 40.** Ventriculi dolor & pondus à lapide in je- juno intestino contento. Ibid.
- Obs. 41.** Circa ventriculi regionem dolor perti- nax à ferreis instrumentis in eo contentis. p. 79.
- Obs. 42.** Ventriculi æstus & dolor à nimio usu spiri- tus vini vel calidioris Theriacis aquæ post obitû flammæ specie erumpenti. Ibid.
- Obs. 43.** Ventriculi dolor à pure ex apostemate Pleu- ræ in eum illabente ejusque tunicas & intestino- rum corrumpente. Ibid.
- Obs. 44.** Cardialgia à bile à cysti &c. transmissa 1. 2. & ventriculi substantia exosa. 3. Ulcere in orificio ventriculi. 4. Vomica in hepate. 5. Ibid.
- Obs. 45.** Pulsatio circa ventriculum ab aneurismate celiacæ arteriæ. p. 80.
- Obs. 46.** Cardialgia ob acumen cordis maximi à ci- bo sumpto os ventriculi comprimentis. Ibid.
- Obs. 47.** Stomachi oppressio producta ab hydropo pectoris. Ibid.
- Obs. 48.** Epigastrij dolor; Rugitus ob Intestini duo- deni laxitatem & amplitudinem præternatura- lem. Ibid.
- Obs. 49.** Ventriculi dolor ab humoribus acris & statulentis in eo contentis pro verme habitis, Py- lora exulcerato, connexionione cum hepate &c. Ibid.
- Obs. 50.** Ventriculi dolentis anatome qui perforatus repertus est. p. 81.
- Obs. 51.** Ventriculi dolor compressi à Pancreate scir- rho cum Renis sinistri omnimoda purulentia. p. 82.
- Obs. 52.** Ventriculi dolor ab ejus connexionione, an- terius cum epigastrio, posterius cum pancrea- re, Repleto eodem materia nigra intestinorum à flatibus distensione & inflammatione, &c. p. 83.
- Obs. 53.** Ventriculi dolor genitus à varijs Hepa- tis, cystis fellæ, Pancreatis, &c. affectibus. p. 84.

## ADDITIONAMENTA

## Ad Sectionem de Ventriculi dolore.

- Obs. 1. Stomachi dolor ob orificium utrumque quasi corrosum & sideratam, virium hepatis, Pancreatis, vesiculam felleam lapillis plenam &c. Tom. I. p. 84.
- Obs. 2. Ventriculi dolor intolerabilis à scirrho Pancreatis, Mesenterij & Intestini jejuni portiones. p. 87.
- Obs. 3. Post dolores ventriculi lethales pars illa perforata reperta &c. Ibid.
- Obs. 4. Dolor à tumore scirrhus ventriculi fundo adherente lethalis. p. 86.
- Obs. 5. Verruæ ventriculi lethalis. p. 87.
- Obs. 6. Glandulæ ventriculi scirrhus cum Pylori & Pancreatis scirrhus insigni post dolores & vomitus lethales in cadavere reperta. Ibid.

## SECTIO VIII.

## De Vomitu &amp; Nausea.

- Obs. 1. Vomitus & Nausea frequens excitatur cum serosis humor aut abscessus aut bilis constans suffusio Tunicam ventriculi externam lacerat. Tom. I. pag. 83.
- Obs. 2. Vomitus ab ulcerato superiore ore ventriculi. p. 89.
- Obs. 3. Vomitus tenuis & crassi humoris diuturnus à fistula stomachi excitatur. Ibid.
- Obs. 4. Vomitus ob interiorem ventriculi tunicam erofam. p. 90.
- Obs. 5. Vomitus ob erosionem ventriculi fundi ab assumpto arsenico parietibus ejus affixo. Ibid.
- Obs. 6. Anatome fœminæ ex esu elæbori albi cum enormi vomitu mortuæ cujus ventriculus aqua turgens repletus intus corrosum & maculosus, intestina flaccida distenta. p. 91.
- Obs. 7. Puellæ anatome ob vomitum enormem extinctæ à propinato veneno ventriculo signata incurrente & bilem ad duodenum alliciente. p. 92.
- Obs. 8. Vomitus lethalis succedens Gallæ assumptioni à qua perforatus ventriculus. Ibid.
- Obs. 9. Vomitus lethalis post sumptam purgans nullo nocte vestigio in corpore deprehensio. p. 93.
- Obs. 10. Vomitus, Nausea ab assumpto veneno inflammationem in ventriculo & duodeno; hinc syderationem excitante &c. Ibid.
- Obs. 11. Vomitus ob ventriculi gangrenam & syderationem. p. 94.
- Obs. 12. Vomitus ab angustia & contractione ventriculi cum hepatis duritie, superfite assumpto croce metallorum. p. 95.
- Obs. 13. A frequentia vomitus & purgantibus crebro exhibitis ventriculi inflatio reperta est. Ibid.
- Obs. 14. Vomitus à ventriculo perforato. p. 96.
- Obs. 15. Vomitus ab abscessu circa fundum ventriculi. Ibid.
- Obs. 16. Vomitus à gemino ventriculi steatomate. Ibid.
- Obs. 17. Vomitus ob Pylorum occalescentem cartilagineum redditum. Ibid.
- Obs. 18. Vomitus à Pylori scirrhus. p. 97.
- Obs. 19. Vomitus excitatus ob Pylorum materia steatomatica oppletum. Ibid.
- Obs. 20. Vomitus continuus ob Pylorum tuberculis scirrhosis obfessum. Ibid.
- Obs. 21. Vomitus ab occiso per nummum argentum deglutitum Pyloro. p. 99.
- Obs. 22. Vomitus Pancreorum à nimia lactis copia, Pylori angustiam nativam non perscrutantem. Tom. I. p. 100.
- Obs. 23. Vomitus nigricantium humorum ob Pylorum exacte clausum. Ibid.
- Obs. 24. Vomitus bilis coercitus Tertianam febrem, hinc paralyfin, post mortem invexit ob illius in cavo jecoris retentionem. Ibid.
- Obs. 25. Vomitus vitio anadotoles inducus in affectione hypochondriaca laborantibus ob Pylori angustiam. p. 101.
- Obs. 26. Vomitus creber in quodam qui ventriculum duplicem habebat. Ibid.
- Obs. 27. Vomitus ob ventriculum in cavitatem thoracis depulsum. Ibid.
- Obs. 28. Vomitus ob farsam compulsum ventriculum ac immani sinistri Renis tumore. p. 102.
- Obs. 29. Vomitus ob compressum ventriculum ab intestini flaccibus & fœcibus distensis. Ibid.
- Obs. 30. Vomitus ab ileo incistino juxta Cæcum contracto. Ibid.
- Obs. 31. Vomitus materie chylosæ à coactione reduplicati intestini Ilei bubonocelen sequente. Ibid.
- Obs. 32. Vomitus à relaxata valvula Ilei intestini extremo inserta. p. 106.
- Obs. 33. Vomitus excitatus à vitiosa conformatione Pori cholidochi; ventriculo ab Epiplocon coopto. Ibid.
- Obs. 34. Vomitus excitatus à vitiosa Pori cholidochi infertione. Ibid.
- Obs. 35. Vomitus bilis à ruptione vetricæ felleæ. p. 107.
- Obs. 36. Vomitus ciborum à calculis in vesicæ felleæ & meatu cholidochi. Ibid.
- Obs. 37. Vomitus ob Hepatis partem concavam abscessu tentatam, Putredine in convexa. Ibid.
- Obs. 38. Vomitus ab adhæsa Jecoris puridi cum diaphragmate. Ibid.
- Obs. 39. Vomitus lactis in infante ab Hepatis necere excitatus. p. 108.
- Obs. 40. Vomitus puris ab Hepatis abscessu manentis. Ibid.
- Obs. 41. Vomitus ab extraordinaria hepatis & ventriculi mole. Ibid.
- Obs. 42. Vomitus ob Hepatis gangrenam. Ibid.
- Obs. 43. Vomitus varias Hepatis lésiones sequens cum aliis aliarum partium affectibus. p. 109.
- Obs. 44. Vomitus ob Hepar ventriculo adnatum & materiam nigram in hoc contentam. Ibid.
- Obs. 45. Vomitus ob ventriculum parte superiori scirrhosum, lividum in fundo, Epiplocon scirrhosum, crassum, rubrum &c. p. 110.
- Obs. 46. Vomitus à flacciditate & extenuatione orificij ventriculi cum Lienis scirrhus, Hepate vitiato &c. Ibid.
- Obs. 47. Vomitus pituitæ, bilis & melancholicæ à tenuitate membranarum ventriculi, pori cholidochi, vas brevis obstructione, & Hepatis Pancreatis decritæ &c. cholidochi porum ventriculi infertione. p. 111.
- Obs. 48. Vomitus excitatus ob vas breve singularis conformationis. p. 112.
- Obs. 49. Vomitus à bile atra à cysti venis melanaricis & liene ad ventriculum missa. Ibid.
- Obs. 50. Nausea vomitus à bile sincera circa Jecoris cavam latente. Ibid.
- Obs. 51. Vomitus cum assidua nausea à colluvie materie purulente inter mesenterij tunicas. p. 113.
- Obs. 52. Vomitus ob tumorem circa radicem Mesenterij extortum. Ibid.
- Obs. 53. §. 1. Vomitus ob Pancreas scirrhosum. Ibid.

- Obs. 54. Vomitus à corruptione & sphacelo Pancreatis. Tom. 2. Ibid.
- Obs. 55. Vomitus à Pancreate cancro affecto excitatus. Renes contrahente. p. 124.
- Obs. 56. Vomitus à varijs ventriculi affectibus productus. Ibid.
- Obs. 57. Vomitus à complicatis ventriculi & parium vicinorum affectibus excitatus. p. 115.
- Obs. 58. Vomitus variatum & plurius partium affectus sequens. Ibid.
- Obs. 59. Vomitus sequutus varios Infectionum affectus. p. 126.
- Obs. 60. Vomitus causam habens in Renibus calculo, arenolis &c. obsessis. Ibid.
- Obs. 61. Vomitus per consensum à cerebro madido, excitatus. p. 117.
- Obs. 62. Vomitus vido cerebri excitatus in quo abscessus lesus. Ibid.
- Obs. 63. Anatome viri fumo Tabaci abutentis indeque vomitu continuo fatigati cuius caput & ventriculus sine labe invenire sunt. Ibid.
- Obs. 64. Vomitus à pulmonis sinistri corruptione concitatus, & œsophago in vicinia perforato. p. 118.
- Obs. 65. Vomitus ortus ob ingentem vomitum in pulmone. Ibid.
- Obs. 66. Vomitus ab Erysipellate pulmonum & hepatis excitatus. Ibid.
- Obs. 67. Vomitus puris & pleuritæ à viscerum omnium corruptione. Ibid.
- Obs. 68. In canis nausea & mictione cruenta laborantis, vesicæ orificio & inferiore cavitate glandulæ reperiuntur, in liene tubercula & Renibus pustulæ. Ibid.

APPENDIX De calculis vomitu reiectis & materia arenosa. p. 118.

- Obs. 69. Nausea à femine corrupto in cavitate vasii in penem id deferentis coactio. p. 119.
- Obs. 70. Vomitus sanguinis ob Hepar scitibus ex parte obsessum cydum tellectam bile turgidam hinc vasa majora sanguine exhausta. Ibid.
- Obs. 71. Vomitus sanguinis à liene corrupto in ventriculum ferulcentias extrudente excitatus. p. 120.
- Obs. 72. Vomitus sanguinis à putri liene manantis sanguini concreto simili. p. 121.
- Obs. 73. Vomitus sanguinis à vase brevi eximie amplitudinis in ventriculum hiantem. Ibid.
- Obs. 74. Sanguinis & puris vomitus ex pancreate ut plurius procedit. p. 123.
- APPENDIX Vomitus aqueus ex arteriarum capillamentis in cavum ventriculi hiantibus & serum infundentibus procedit. Ibid.
- Obs. 75. Vomitus singularis à pulmonibus. p. 122.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Vomitu & Nausea.

- Obs. 1. Vomitus omnium Ingestorum peritaxitopylosum gypsa materia intus & extra obductum. Tom. 2. p. 124.
- Obs. 2. Nausea frequens ob abscessum cordi & ventriculi orificio proximam. Ibid.
- Obs. 3. Vomitus cibi continuus ob membranarum ventriculi inflammationem. p. 125.
- Obs. 4. Vomitus continuus ab abscessu ulcerato in pyloro. Ibid.
- Obs. 5. Anatome curiosa Ancillæ Altemburgentis que Insones vomuerat. Ibid.
- Obs. 6. In Anatome femine crebro Vomitu obnoxia ventriculus à corpore ipsi incumbente excavatus &c. chæ quæ varia curiosa. p. 129.
- Obs. 7. Vomitus sanguinis à vasculis interioris ventri-

- culi tunics hiantibus. Tom. 2. Ibid.
- Obs. 8. Vomitus funealis à pylori scythomatæ. p. 130.
- Obs. 9. Vomitus sanguinis à causa extraordinaria in cadavere reperiæ cum varijs curiosis. Ibid.
- Obs. 10. Vomitus sanguineo-carnosus rarissimus lethalis. p. 131.
- Obs. 11. Vomitus ementæ lethalis. p. 132.
- Obs. 12. Vomitus quadraginta librarum muci compati acipici liquidæ similis lethalis, aliæque rarissima in dissecto corpore observata. p. 134.
- Obs. 13. Vomitus sanguinis. p. 136.
- Obs. 14. Quidam diu vomuit apertæ cadavere cochleæ, putamen in re inventum est. p. 137.

## SECTIO IX.

### De Cholera Morbo.

- Obs. 1. Anatome puellæ à cholera morbo extinctæ in qua vitiosus ventriculi sinus omentum non cooperit cum vitiosa coli conformatione & pori bilarii nec non lienis. Tom. 2. p. 138.
- Obs. 2. In cholera extinctis Jecur aridum inventum turgens vesicula, polus bilarius dilatat. &c. p. 139.
- Obs. 3. Copiosa bilis in folliculo reperitur eorum quos cholera interficit, pauca vel nulla in ventriculo. pag. 140.
- Obs. 4. Excretio susque deque commota à sumpto atfenico. p. 141.
- Obs. 5. Cholera subito funesta ob infectionem pori choledochi proxime pylorum. Ibid.

## SECTIO X.

### De Alvi profluvio incrementis.

- Obs. 1. Lienteria boulimia comes ob mesenterij vitium. Tom. 2. Ibid.
- Obs. 2. Post Dysenterias graves cicatrix sæpe in intestinis relinquatur chyli distributionem impediens unde Lienteria vel Diarrhea chylosa. Tom. 2. p. 142.
- APPENDIX A dysenteria gravi Diarrhea supetilis ob erosos villos quibus retentrix fulciunt. p. 143.
- Obs. 3. Lienteria sæpe sequitur ingentem abdominis abcessum aut pulmonis vomitum aut pectoris remumque supurationem. Ibid.
- Obs. 4. Fluxus Coliacus excitatus à pancreatis & lienis vitio, glandulis mesenterij tumidis durisculis & alijs ejusdem vitij. p. 144.
- Obs. 5. Diarrhea chylosa cum atrophia ob lactearum mesentericarum obstructionem, hepatis & lienis scitum &c. p. 147.
- Obs. 6. Diarrhea, Lienteria, Hepatis fluxus cum febre vehementi ab omnimoda conversione illej intestini gangrena cum alijs infecti, pancreatis duritie, splenis & hepatis vitio. 48.
- Obs. 7. Fluxus ventris sanguinosus à vitio hepatis & lienis constitutione &c. p. 151.
- Obs. 8. Diarrhea à vitio ventriculi, hepatis, cyllis felles &c. p. 154.
- Obs. 9. Alvi fluxus sanguinosus à bile simili in cydii tellecta contenta. Ibid.
- Obs. 10. Diarrhea aquo-billoformis humorum à vitio jecoris externæ flaccidi intus duri & retrocidi. pag. 155.
- Obs. 11. Diarrhea ab hepate vomitibus oblecto & mesenterio syderato ex parte. p. 156.
- Obs. 12. Diarrhea ab Atheromate in parte gibba hepatis. Ibid.



- Obs. 13. Anatomico infans diarrhoea extincti cujus cystis felles humorum continetur: Igro viridem huiusmodi fuit, albicans &c. Tom. 2. Ibid.
- Obs. 14. Diarrhoea peritum a Jecore tuberculis obfeso aliisque ejusdem vitij. p. 157.
- Anatomico post Diarrhoeam mortui in quo reperiatur tumor insignis mufculus lumbarebus annexus. Ibid.
- Obs. 15. Tabidorum quorundam a diuturno alvi profluvio. Jecur integrum reperiunt. Ibid.
- Obs. 16. Lues ovis & juvenis infesta a vermibus hepate Diarrhoeam comitem aliquando habens. pag. 158.
- Obs. 17. Diarrhoea ab hepatis incendio inducitur quod frabile invenitur est. p. 159.
- Obs. 18. Diarrhoea ab ulcerato ventriculi fundo. Ibid.
- Obs. 19. Diarrhoea a callo inter venas mesaraicas nato. Ibid.
- Obs. 20. Diarrhoea ob mesenterij glandulas tumidas hepate tabidum. &c. Ibid.
- Obs. 21. Diarrhoea a pancreate scirrhoso, mesenterij vitio. p. 160.
- Obs. 22. In viâ Diarrhoea fluxu sanguineo &c. affectu ductu pancreatico calculi reperi. Ibid.
- Obs. 23. Diarrhoea abscessum in ventre sequuta p. 161.
- Obs. 24. In quodam post Diarrhoeam extincto obstruâ a calculis cystis felles inventa. Ibid.
- Obs. 25. In Diarrhoea biliosa pancreaticus ductus bile plenus inventus. Ibid.
- Obs. 26. Post Diarrhoeam malignam ventriculi fundus maculis obfusus reperiatur, & hinc tres in intestino recto. Ibid.
- Obs. 27. A Diarrhoea mortui anatomico cujus ventriculi fundus fideratus reperiatur, colon varie affectum &c. p. 162.
- Obs. 28. Diarrhoea ob corruptionem coli & Tenuium intestinorum inflammationem sequentem eadem omnes non cooperata, Tumorem huic adnatum &c. Ibid.

APPENDIX, De Diarrhoea causis & de Diarrhoea cerebrali aut cathartica an detur. p. 164.

Obs. 29. Pedilus frequens a laxata coli valvula. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Alvi profluvio incrementis.

- Obs. 1. Diarrhoea lethalis ob bilem in vesiculis fellis in lapideum naturam convertitâ T. 6. p. 169.
- Obs. 2. Diarrhoea extinctionum intestina phlegmone obfesa & fortissimè inflata reperiuntur. p. 166.
- Obs. 3. Diarrhoea lethalis ab inflammatione ventriculi intestinorum & mesenterij Ibid.

## SECTIO XI

### De Dysenteria.

- Obs. 1. Dysenteria a bile vitij & cysti manante unde cæci & coli corruptio. Tom. 2. p. 167.
- Obs. 2. Anatomico Dysenterici cujus intestina ab initio coli ad finem recti ulceribus & apostematibus obfesa erant. p. 168.
- Obs. 3. Dysenterici intestina sphacelata, erosa & perforata reperiunt. Ibid.
- Obs. 4. Anatomico Dysenterici cujus intestina purulentis tuberculis sciantia deprehensa sunt. p. 169.
- Obs. 5. Dysenterici corpus intestinorum vitium re-

periturum est.

Obs. 6. Dysenterici intestina inflata cum interioribus tumore abrasione reperiuntur sunt. &c. Ibid.

Obs. 7. Pus in involutis intestinorum Dysenterici coactum reperiuntur est. Ibid.

Obs. 8. Dysenterici pueri intestina crassa tumida inflata animadversa sunt. Ibid.

Obs. 9. Dysenterici intestina gangrena affecta fuerunt. Ibid.

Obs. 10. Intestina ulcerata latere in dysenterico coacta. Ibid.

Obs. 11. Dysenteria & variolis affecti intestina purulenta erant. Ibid.

Obs. 12. Scrobiculi & cavitates in intestino recto vestigia dysenteriae & reliquiae. Ibid.

Obs. 13. Dysentericorum non intestina solum sed alia partes quandoque exulcerantur. Ibid.

Obs. 14. Dysenteria ab intestinis apostematibus obfesa ut & mesenterio. Ibid.

Obs. 15. Dysentericorum quorundam intestina tantum crassa sanguinem continere observata sunt. p. 173.

Obs. 16. Gravem Dysenteriam absterila crassa intestinum carnea sequitur cicatrix chyli distributionem impediens. Ibid.

Obs. 17. Dysentericus ulceratum habuit ventriculum. Ibid.

Obs. 18. In Dysenterico hepar sphacelatum inventum & epiploon, pylorus & tenuia intestina inflammata. p. 174.

Obs. 19. In Dysenterico Hepar siccum pallidum fuit cum abscessu prope cystis fellis, alio in mesenterio. Ibid.

Obs. 20. A longis Dysenterijs Diarrhoeaeque observata intestina ad summam tenuitatem redacta & coacta. Ibid.

Obs. 21. Dysenteria a vermibus excitata. Ibid.

Obs. 22. Dysentericorum ulcers ab aliis opiorum magis putrida & foetidiora evadunt. Ibid.

Obs. 23. Dysenteria a vomica in Hepate prodita. Ibid.

Obs. 24. Dysenteria vitio lienis duci infandi &c. vitio excitata. Ibid.

Obs. 25. Vitij a Dysenteria in decem diebus extincti pericardium aequè ex peris reperiunt. Ibid.

Obs. 26. Anatomico fluxu hepatico laborantis in quo hepatis apostema ejusque dissolutio reperiuntur est. Ibid.

Obs. 27. Sanguinis dejectio ob cavam glabramque hepatis partes cum ventriculo juxta pylorum gladio transmissas. p. 177.

Obs. 28. Hepaticus fluxus a vitio Jecoris, Pancreatis, cordis &c. p. 178.

Obs. 29. Tenebrimus ultra vitium recti intestini aut utriusque ostium a vitio tenuium intestinorum. Ibid.

Obs. 30. Perpetuus dejectio canalis ab affectibus vicinarum intestinorum, recto patrum. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Dysenteria.

- Obs. 1. In Dysenterica cystide felles reperiuntur lapides. Tom. 2. p. 179.
- Obs. 2. Dysenterici intestina sphacelata vasculis sanguine vacua reperiuntur sunt &c. Ibid.
- Obs. 3. Dysenterici intestinum ileon ulcusculis innumeris repletum cum coli foetore & purulentia & loco vesicae felles vitio bile suffusa reperiuntur sunt &c. p. 180.
- Obs. 4. In Dysenterico extra omaso excepto fiderata reperiuntur. Item de fluxu Gallico quedam. p. 181.

Obs. 5. Dysenterici intestina corrupta ac glandulis  
respersa. Tom. 1. p. 181.  
Obs. 6. De cruento & purulento alvi fluxu diuturno  
lethali ex intestini coli erosione & sphacelatione  
Ibid.

## SECTIO XII.

De Excrementis alvi præter naturam & eorum  
per aliena loca & involuntario exitu.

- Obs. 1. **V**arietatum excrementorum dejectio ut  
plurimum visceris alicujus vitium sequi-  
tur. Tom. 1. p. 182.  
Obs. 2. Dejectio variegata à corruptione omnium  
viscerum. p. 184.  
Obs. 3. Dejectiones biliosæ liquidæ ab inflammatio-  
ne Jecoris in gangranam desinente. p. 85.  
Obs. 4. Dejectiones cineritiæ fœtidæ à mesenterio om-  
nino scitihoso ortæ. p. 186.  
Obs. 5. Chilosa dejectio à mesenterio scitihosis tumori-  
bus referto &c. Ibid.  
Obs. 6. Fluxus varius Mesenterij abscessum sequutus.  
Ibid.  
Obs. 7. Alvi profluvium albicans à vitio jecoris exci-  
tatum. p. 187.  
Obs. 8. Tenujum & aquosorum dejectio ob infarctum  
coli intestini. Ibid.  
Obs. 9. Dejectio purulenta à pulmonibus & mesenterio.  
Ibid.  
Obs. 10. Dejectio purulenta à mesenterij abscessibus.  
Ibid.  
Obs. 11. Dejectiones purulente à putri mælatæ ma-  
nantes. p. 188.  
Obs. 12. Purulenta dejectio ab abscessu Pleuræ. Ibid.  
Obs. 13. Puris dejectio à Vomica in Hepate. Ibid.  
Obs. 14. Puris per anum & vulvam excretio ob fistulam  
in collo uteri ad anum pervenientem. Ibid.  
Obs. 15. Nigrosum dejectio à quodam facta cui pan-  
creas scitihosum repletum est. Ibid.  
Obs. 16. Nigrosum vel sanguinis dejectio ab hepate vel  
liæoe transmissum &c. p. 189.  
Obs. 17. Nigrosum dejectio à venæ Portæ disrup-  
tione in cavo Jecoris. Ibid.  
Obs. 18. Sanguinis dejectio à corde & superioris parti-  
bus ad intestina transfusi. p. 190.  
Obs. 19. Excretio stercoris ex abdomine per fistulam  
vulnus sequutam. p. 190.  
Obs. 20. Fæcum involontarius exitus & ani prola-  
psus à nimio cerebri & spinæ dorsalis madore.  
Ibid.  
Obs. 21. Fæces per vulvam excretæ. Ibid.  
Obs. 22. Tumor circa umbilicum disrupsus à quo ster-  
cora purulenta exierunt ob vitium intestinum re-  
nium corrosorum. Ibid.  
Obs. 23. Alvi excrementa cum otina reddita ob lace-  
ratam vesicam à carnositate putri in recto intestino  
à regione vesicæ. Ibid.  
Obs. 24. Alvi fæces cum urica cunctis ob rectum in-  
testinum vesicæ implantatum. p. 191.  
Obs. 25. Fæcum per umbilicum exitus post ruptam  
Tumorem miculorum abdominis ab ulcere coli  
intestini. Ibid.  
Obs. 26. Fæces per umbilicum excretæ ab intestinalis  
diversis locis perforatis. Ibid.

## SECTIO XIII.

De Adstrictione Alvi.

- Obs. 1. **A**lvus adstricta ob multiplex intestinum  
vitium 1. Eorum atoniam & con-  
dentiam 2. Calculos in ijs oclusos. 3. Carneas ex-  
cretescencias in crassis. 4. Sphacelum cum infarctione  
Excreticem eorum abolitam. 6. & 7. Constrictio-  
nem à callo 8. Spasmodicum eorum affectum. 9.  
Tom. 2. p. 191.  
Obs. 2. Alvus cohibita ob siccitatem viscerum & in-  
testinorum à quibus Duodenum Stercore infarctum  
erat. p. 193.  
Obs. 3. Alvus immotæ ob vitium ventriculi & in-  
testinorum infarctionem, nigricantium 1. ob Sycotoma  
io fundo ventriculi. 2. Abscessum circa hujus fun-  
dum. 3. situm ejus & coli p. nat. 4. Ibid.  
Obs. 4. Alvi adstrictio ob pylorum cartilaginolum red-  
ditum. Ibid.  
Obs. 5. Alvus adstricta ab angustia Ilei intestini carti-  
lagine. p. 194.  
Obs. 6. Alvus difficilis ob nodos in intestino Ileo 1. Ejus  
prolapsum. 2. Partem ejus gangrenæ affectam. 3.  
Ejus distensionem à stercore. 4. Apoplema tenuium  
intestinorum. Ibid.  
Obs. 7. Alvus adstricta ob cæcum intestinum cydoniato  
obturatum 1. Colon fœcibus obstructum. 2. p. 195.  
Obs. 8. Alvus obstructa ob colico pituita infarctum.  
Ibid.  
Obs. 9. Alvus adstricta ob crassi intestini partem an-  
tulo constrictam 1. coli putredinem. 2. Gangranam  
Calculum adhaerentem. 4. Sphacelatum & disruptum  
5. Seinhum. Dilatationem 6. & 7. Malam confor-  
mationem. Putrefactionem. 9. & 10. Contortionem  
& Dilatationem 11. scitihum. 12. p. 197.  
Obs. 10. Alvus adstricta ob Omenti extremi crassi-  
tatem intestina conglutinantem. p. 198.  
Obs. 11. Alvi adstrictio ob coarctum laterum intestino-  
rum 1. intestini Recti 2. 4. 5. Ilei 3. Antioclusionem  
per membranam. 5. 14. Infertionem recti intestini  
in vesicam 6. 12. Anum imperforatum 7. 10. 1. 13.  
Rectum intestinum implicatum cum vesica & ejus  
collo 8. ob coarctum recti intestini supra anum  
apertum 15. 16. ob defectum recti intestini & podi-  
cis 17. ob ulcus recti intestini. 18. ob idem con-  
strictum à membranæ vinculo ac reduplicatum. 19.  
Ibid.  
Obs. 12. Alvi adstrictio ob Jecur durum & cystis fel-  
leæ vitium 1. ob bilis defectum & lapidem in cysti  
2. 7. 8. ob plures calculos in cysti. 3. 9. ob glandu-  
las mecum cysticum prementes. 4. ob vesicam ob-  
turatam. 5. ob mecum bilatum obstructum. 6. 10.  
ob viscosam poti bilarij infertionem 10. ob exhan-  
stam bile cystis 11. p. 202.  
Obs. 13. Alvi adstrictio ob glandulas mesenterij & imi  
ventris induratas 1. Ob Jecur scitihosum vasorum  
mæstacorum obstructionem 2. Ob mesenterium  
scitihosum intestina prementis 3. Ob glandulosas  
mesenterij memores. 4. p. 203.  
Obs. 14. Alvi adstrictio ob insignem Uteri tumorem  
1. Ob atrium materia extranea infarctum 2. Ob  
Tumorem inter alvum ac vulvam latentem 3. Ob  
lapidem inter intestinum & collum vesicæ jacentem.  
4. Ob duos calculos in vesica urinaria Ex filimenta  
membranosa recti intestini cavitatem interfecitioria  
5. Ob vesicam magnæ molis musculis adnatam. 6.  
Ob eandem lotio distentam 7. p. 204.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Adstrictione Alvi.

- Obs. 1. **A**lvi adstrictio à coarctatu intestini recti. Tom. 2. p. 209.  
 Obs. 2. Alvus suppressa in infantulo recens nato colo occlusa. p. 206.  
 Obs. 3. Alvus suppressa sine ullo causæ suæ iudicio. Ibid.

## SECTIO XIV.

## De Ventris Dolore Colico, Ilico &amp;c.

- Obs. 1. **C**olicus dolor à flatibus intestina omnia distendentibus cum humore pituitoso & bilioso ijs adherente. 1. A flatibus cum involucrio & subingressu intestinum 2. A flatibus retentis 3. A flatibus in colo, fecibus in reliquis intestinis 4. A flatibus cum pyloso viz pervio. Duodeno & Recto quibusdam locis annexis 5. A flatibus colon ampliatum 6. 7. 11. 12. Etiam vi intestina disrupta 13, 14, 15. A flatibus ventriculorum una distendentibus 16. A flatibus cum intestinorum corruptione 17. A flatibus & fecibus in colo 18. Tom. 2. p. 206.  
 Obs. 2. Colicus dolor à flatibus intestina omnia repleantibus 1, 2, 3. A colo fecibus infarctis & glauculis mesenterij indutis 4. p. 209.  
 Obs. 3. Ventris dolor à pituita visca externa intestinum tunica affixa. p. 210.  
 Obs. 4. Colicus dolor à pituita totum coli ductum obducite. Ibid.  
 Obs. 5. Colicus dolor à bile intra membranas ilei conclusa 1, 2. A bile circa colon effusa cum abscessu mesenterij 3. A bile cum lapide in cysti fellea lacera 4. A bile in ileo & colo 5. A bile ab hepate manente. Ibid.  
 Obs. 6. Ventris dolor colicus corruptioneum viscerum prope omniom naturalium sequens à bile ortus. p. 213.  
 Obs. 7. Colicus dolor à coli inflammatione cum flatuum multitudine 1, 2, 3, 4. Ab inflammatione intestinis ventriculo mesenterio sensim conjunctim. Ab inflammatione tenuium intestinum ventriculi ilei parte corrupta 6. A viscerum & intestinum inflammatione & putredine 7. Ab inflammatione intestinis, ventriculo, mesenterio omento, liene &c. 8. A peritonæj, & intestinum phlegmone 9. Ab inflammatione coli & mesenterij in abscessum desinente 10. p. 214.  
 Obs. 8. Colicus dolor à coli putredine 1, 2. A scirrho in colo ejusque dilatatione 3. Ob colon post vulnus in thoracem compulsum 4, 8. Ob vulnus coli 5. Ob colon in scrotum devolutum 6. Ob colon cancro affectum 7. Ob colon à rene lapide pregnantem compressum 9. Ob colon post vulnus disparagmati annexum 10. Ob globulos plurimos colo affixos. p. 216.  
 Obs. 9. Ventris dolor à callo in intestinis oborto pag. 218.  
 Obs. 10. Ventris dolor ab ilej & coli intestinum coarctatione & ventriculi erosione ac inflammatione levi. Ibid.  
 Obs. 11. Ventris dolor circa umbilicum succedente tumore & olcere ab apostemate tenuium intestinum p. 219.  
 Obs. 12. Ventris dolor à vermibus in intestinis. Ibid.  
 Obs. 13. Ventris dolor circa umbilicalia à coli inte-

- stini Tumore vario. Tom. 2. p. 219.  
 Obs. 14. Colicus dolor à calculis in intestinis Ibid.  
 Obs. 15. Ventris dolori ebriorij intestina loco movetur, nec omentum omnia tegit. p. 222.  
 Obs. 16. Colicus dolor ob angustiam intestinum ex nimia pinguedine 1. A coarctatione tenuium intestinum 2. Ob intestina lovicem congesta urinaria 3, 4. A coarctatione colo adhesionem 5. A tumore fungoso coarctatione 6. Ibid.  
 Obs. 17. Ventris dolor cum murtore & intestinum agitationibus à cæcatorum & prononiamocleisin intestino colo retentis. p. 222.  
 Obs. 18. Ventris dolor à deglutitis ferrameis &c. intra intestina subsistentibus. Ibid.  
 Obs. 19. Ileus inflammationem intestinum ut plurimum sequitur 1, 9. Inflammatio circa colinum præsertim contingit 2, 5. Inflammationem intestini ejus fissura sequuta 4. Ab inflammatione cum ulceribus intestinum 5. Ad eam sequuntur splicæ intestinum & omenti 6, 7, 8. p. 224.  
 Obs. 20. Ileus à murto intestinum subingressu seu intussusceptione. p. 226.  
 Obs. 21. Ileus ab amplexibus involutis intestinis & convulsis instat suis 1, 2. Ab ileo contractu plicato 3. Ab ileo tribus complicatombus complicato 4. Ab ileo diversis in locis convolto. Ab ileo tribus modis contracto 7. Ab ejusdem contractione 8. p. 229.  
 Obs. 22. Ileus à compressione Jejunii intestini in hypochondrio dextro 10. p. 232.  
 Obs. 23. Ileus à Cæco intestino obstructo & coarctato à devorato cydoniato. Ibid.  
 Obs. 24. Ileus à coarctis & gangrena ilej, A fistula in eo cohibito, hinc fistula 2. A gangrena in vicinia cæci ob ligaturam in herniotomia 3. A materia lapidea obstruente intestina juxta cæcum 4. A colo cancro affecto 5. A colo prope rectum splicato & disrupto 6. A colo exulcerato cum stercore retento 7. A tumore vesicali Recto intestino annexo 8. A Recto intestino contracto & replicato 9. Ab abscessu in intestinis 10. p. 232.  
 Obs. 25. Ileus à colo pituita infarcto. p. 234.  
 Obs. 26. Ileus à prolapsu intestinum in scrotum. p. 236.  
 Obs. 27. Ilica passio à prolapsu intestino in inguine cum imi ventris quasi syderatione. p. 236.  
 Obs. 28. Ileus à mesenterij scirrho genitus. Ibid.  
 Obs. 29. Ventris dolor ab apostemate in ore ventriculi inferiore & duodeno 1. A materia putrida in fundo ventri dilata 2. A phlegmone ejus & corruptione 3, 4. A syderatione fundi 5. Ab ejus corruptione & materia putrida in peritonæo 6. p. 237.  
 Obs. 30. Colicus dolor ob intestina ad latus dextrum devoluta à tumore vertebrae lumborum affixa. p. 238.  
 Obs. 31. Ventris dolor ab acri ichore per membranas imi ventris spatio 1. A vesiculis inter eam & peritonæum circa umbilicum erodente 3. p. 239.  
 Obs. 32. Ventris dolor ab ichore bilioso peritonæum & mesenterium rodente. A mesenterio hydatidibus repleto 2, 3. A mesenterio tumore afflicto intestina premere 4. Ab eodem computrescente 7, 8. Ab ejus glandulis humidis 9. Ab eo pure scateo 10, 11, 15. A glandulosa tumoribus 11. A Tumoribus ulceratis 12, 13. Post diuturnos dolores glandularum arescere 16. Ab insigoi mesenterij incrementis 17. p. 241.  
 Obs. 33. Colici dolores habituales sedem habent in plexibus mesenterij nervis & spasmoclicis sunt ob murtum morificam à cerebro in illos plexus transmissam. p. 243.  
 Obs. 34. Obs.

Obs. 24. Ventris dolor in pariete definitus silvis intestinalibus ab acri soro è cerebro manante, ea in spasmus eiente. Tom. 1. p. 245.

Obs. 35. Ventris dolor & ardor à causa in thorace latente. p. 249.

Obs. 36. Ventris dolor à vizio in peritonæo, omento, mesenterio, intestinis, cysti fellæ &c. t. A scyrtho in pancreas, & anematis in mesenterio 2. Ab omento semi corrupto, intestinum distensione 3. A hæmorrhæmatis venis pancreaticis & mesenterij adnatis 4. A pancreate duto & scirrhoso. Ibid.

Obs. 37. Ventris dolor à jecore indurato Pancreate maxime scirrhoso glanduloso 1. Ab hepatis cum intestinum inflammatione 3. A Stomatite hepatis innato bilis effluxum impediende 4. Ab hepatis posteriori officio ventriculi affixo diaphragmatis & partibus circumscitis pancreaticis induratione, mesenterij, pylori, glandularum mesenterij 5. Arque inflammatione, hinc abscessu cavæ partis Jecoris 6. Ab hepate magno premente subdita partes 7. p. 257.

Obs. 38. Ventris dolor à pororum choledochorum siccitate 1. A meatus cystici coalitu ac bilis in cysti cohibitione 2. Ob cysti in lapillis repletam & hepatis viciu 3. Ob calculum cysti impactum in femina quæ serpentem in ventre gestare credebatur. 4. p. 257.

Obs. 39. Anatome virginis diuturno ventris dolore verax casus intestina & mesenterium corrupta repleta sunt, Lien ad imam usque hypogastrium devolutus. p. 254.

Obs. 40. Ventris dolor vizio hepatis & cystis fellæ excitatus cum abscessu mesenterij 1. Ob jecur inflammatum, Bilem in intestinis, Attram in ventriculo & liene, Pancreas viciu 2. A liene mixte formæ & molli in quo aræ bilis, lapidibus in pancreati canali, vizio mesenterij, cystis fellæ, hepatis 3. A liene intestina premente 4. ob tenes per peritonæum utero connexos 5. p. 255.

Obs. 41. Ventris & lumborum dolor ob coalitum officij cervicis uteri sanguinis mensural effluxum cohibentem. Ibid.

Obs. 42. Ventris dolor ab Apostemate pancreas occupante. p. 256.

Obs. 43. Ventris dolor à pancreate male affecto & exulcerato. Ibid.

Obs. 44. Ventris dolor productus ab humore ex ulcere Renis succenturiati manante à quo coli tunica quasi sphacelata evasit. p. 257.

Obs. 45. Ventris dolor & lumborum à mortifera uteri magnitudine. p. 258.

Obs. 46. Ventris dolor diuturnus à Fœtu in tuba uteri concepto. Ibid.

Obs. 47. Ventris dolor à sanguinis effusione in peritonæi spatio 1. Ab effuso sanguine in abdomine post glacie elam 2. Post vulnus hypochondrij dextri 3. A musculis abdominis sanguine suffusis 4. A pure totum abdomen implente 5. Ab effusione 9. Ibid.

Obs. 48. Ventris dolor ab urina per abdomen effusa ob ruptam à calculis vesicam. p. 259.

Obs. 49. Ventris dolor post vehementem abdominis internam allisionem unde sequuta Ilej & colicæ foratio & Mesenterij fissura. p. 260.

Obs. 50. Ventris rugitus & murmur ab humoribus & flatibus in duplicatura omenti vagantibus. p. 261.

Obs. 51. Ventris dolor pulsativus, ob Arteriz magnæ extraordinariam dilationem, ventriculum & intestina flava turgida. Ibid.

Obs. 52. Ventris saltus & palpitationes à vermibus

excitate,

Tom. 2. p. 262.

Obs. 53. Ventris pulsatio circa umbilicum à compressa arteria magna. Ibid.

Obs. 54. Arteriz magnæ pulsatio manibus in ab domine deprehensa & venterum ipsarum corpus ob retracta versus hypochondria intestina. p. 263.

Obs. 55. Ventris pulsatio ab aneurismate in abdomine. Ibid.

Obs. 56. Ventris dolor inaccessibilis, nullis in internis labis relictis argumentis à Cinnabari incaute per os ingressa. Ibid.

APPENDIX, De ventris doloribus febribus eorumque causa quæ partim est liquor nervosus, partim Sanguineæ mælis secretamenta. p. 264.

# ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Ventris Doloře &c.

Obs. 1. Contractio intestinum insignis observata in defunctis à colica Tom. 2. pag. 267.

Obs. 2. Colicus dolor aliquando pender ab intestinum constrictione convulsiva. p. 266.

Obs. 3. In Colico dolore à valida intestinum constrictione hæc interdum disrupta fuisse. Ibid.

Obs. 4. Ventris dolor ab omenti parte circa ventris medium conglobata. Ibid.

Obs. 5. Ventris dolor ab hepate abscessibus repleto infarcto, Pancreate magno, Rene luxato. Ibid.

Obs. 6. Ileus ab Introsusceptione. Ibid.

Obs. 7. Dolor ventris Iliacus à disrupto peritonæo in sanguine per cujus biam intestini Ilej portio in se recipit. p. 267.

Obs. 8. Ventris tormina à flatibus, capacitate abdominis inclusis, omenti putredine & cum vicinis partibus cohesione, Intestinis involutis & sibi invicem adnatis, Eorundem gangrena, Hepate apostematato, Pure intra membranas omenti concusso, Pancreate scirrhoso. Ibid.

Obs. 9. Anatome Fœminæ Passione Iliacæ defunctæ pag. 268.

Obs. 10. Ileus lethalis à vermibus. Ibid.

Obs. 11. Ileus perniciosis à calculo, vermibus, flatibus. Ibid.

Obs. 12. Ileus ex profundo intestini recti coalitu. p. 269.

Obs. 13. De Puella recens nata passione Iliacæ à constrictione intestinis crassis laborante. Ibid.

Obs. 14. Virginis cuiusdam ileo laborantis & busones vomentis dissectio. p. 270.

Obs. 15. Post dolorem dextrum in sinistro hypochondrio & passionem Iliacam cadaveris inspectio ubi cecum in ileon infusum &c. p. 271.

Obs. 16. Ilej affectus ventris causæ per varia exempla anatomica demonstrant. Ibid.

Obs. 17. Ex Enterocæle & gladij ictu ileos funestus pag. 272.

Obs. 18. In Ileo intestini Ilej & glandularum ejus gangrenosis cum abscessibus varijs in imo ventre latentibus &c. p. 273.

Obs. 19. In alio Ileo intestini Ilej gangrenosis &c. perforato &c. cum polytis in corde valisque huic appendicis maximis. p. 274.

Obs. 20. De Ileo sponte sphacelato & Miliæne mef lethifico. p. 275.

Obs. 21. Ileus idem semivivens. Ibid.

Obs. 22. Colica à materijs viscidis coagulatis. Ibid.

Obs. 23. Colica à bile non uno modo digeræa coagulata nempe vitellina, pomacea, atque &c. Ibid.

Obs. 24. Colica convulsiva in pregnante lethalis  
Tom. 1. p. 276.

## SECTIO XV.

### De Hemorrhoidibus.

- Obs. 1. **H**emorrhoidum sinistri obnoxius ramum  
Postae sub recto intestino decurrentem  
pollicis crassitiem superantem habuit Tom. 1. p. 277.  
Obs. 2. Hemorrhoidum inflammatio ob mearum  
gangrenam vicinam. p. 278.  
Obs. 3. Hemorrhoidalis fluxus innoxius & copiosus ab  
hemorrhoidali ramo à medio Lienis procedente,  
pag. 279.

## SECTIO XVI.

### De Hypochondriorum Tumore.

- Obs. 1. **H**ypochondrij dextri Tumor à jecore ma-  
gnitudine præternaturali Tom. 1. p. 279.  
Obs. 2. Hypochondrij dextri tumor à parte gibba he-  
patis p. n. conformatà. Ibid.  
Obs. 3. Hypochondrij dextri tumor cum dolore ob he-  
pat in insignem molem adactum ab occulto ulcere  
ex axilla dextra excisato, Et massam carneam me-  
senterium occupantem. p. 280.  
Obs. 4. Hypochondrij utriusque præsertim dextri tu-  
mor ab hepate tumido induratoque. p. 281.  
Obs. 5. Tumor & durities hypochondrij dextri ab inso-  
lita hepatis magnitudine, calculis involutis cysti te-  
stis &c. Ibid.  
Obs. 6. Jecoris extimas partes tumor aliquando ob-  
sidet nullam ejus figuram servans aut circumscri-  
ptionem. Ibid.  
Obs. 7. Hypochondrij dextri tumor ob hepar vesicis  
purulentis oblitum. p. 282.  
Obs. 8. Hypochondrij dextri tumor & dolor ab hepa-  
tis inflammatione in abscessum desinente 1. Ab apo-  
stematè hepatis. 2. Ibid.  
Obs. 9. Hypochondrij utriusque tumor ob lienem in-  
signis magnitudinis hepar ad angustias redigentem.  
Ibid.  
Obs. 10. Hypochondrij utriusque tumor à Jecoris &  
Lienis magnitudine extra ordinaria. p. 283.  
Obs. 11. Hypochondrij sinistri tumor ob lienem exi-  
mitè magnitudinis, & Renem sinistram maximum.  
Ibid.  
Obs. 12. Hypochondrij sinistri Tumor à Lienis intra sa-  
nitatis limitè magno. p. 285.  
Obs. 13. Hypochondrij sinistri Tumor à lienis impen-  
se magno. Ibid.  
Obs. 14. Hypochondrij sinistri tumor à lienis indurato,  
pag. 287.  
Obs. 15. Hypochondrij sinistri tumor à lienis indurato  
male formato & Reni sinistro annato. Ibid.  
Obs. 16. Hypochondrij sinistri tumor à lienis insignis  
magnitudinis. Ibid.  
Obs. 17. Hypochondrij sinistri tumor ob lienem durum,  
magnum interius puridum & materia feci vini si-  
mili replemum. Ibid.  
Obs. 18. Hypochondrij sinistri tumor ob subditum lie-  
nem magnum sanguine seroso desitumum p. 283.  
Obs. 19. Hypochondrij sinistri tumor à lienis magni-  
tudine & duritie. p. 290.  
Obs. 20. Hypochondrij sinistri tensio ob lienem scir-  
rhosum sede emortum. Ibid.  
Obs. 21. Lien scirrhosus evadit ut plurimum quoad  
tunicam abdominis musculos spectantem potius

quam intra parenchyma.

Obs. 22. Hypochondrij sinistri Tumor ob Renem fe-  
ri copia replemum 1. ob renem insignis molis 2. ob  
fictas ossa in uretro licentia 3. ob molem ossis ilij  
superiori extremitati connatam 4. ob abscessum  
Sciatomaticum sinistree abdominis regionis. 5.  
Ibid.

APPENDIX, De Tumore hypochondrij sinistri,  
lienì adscripto, à pènitè viscida intestino colo  
conclusa orto. p. 292.

Obs. 23. Hypochondrij dextri durities à scirrho in  
fundo ventriculi & colo intestino. Ibid.

Obs. 24. Hypochondrij dextri tumor ab utero eo de-  
lato cum dolore. Ibid.

Obs. 25. Hypochondrij sinistri tumor & tumor ab  
humoribus & flatibus in ea omentis cavitate conclu-  
sus que intus sita est. p. 293.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Hypochondrij Tumore.

- Obs. 1. **H**ypochondrij sinistri tensio insignis ob lie-  
nè tunica cartilaginea donatà Tom. 1. p. 294.  
Obs. 2. Hypochondrij dextri tumor ab Epiplois illic  
devoluto. p. 294.

## SECTIO XVII.

### De Hypochondriorum Dolorè.

- Obs. 1. **H**ypochondrij dextri dolor ab hepatis phle-  
gmone in Peripneumoniam desinente  
Tom. 1. pag. 294.  
Obs. 2. Hypochondrij dextri dolor ab abscessu in  
jecore, vomitis, suppuratione. p. 295.  
Obs. 3. Hypochondrij dextri dolor ulcere in gibba ejus  
parte excisato. p. 298.  
Obs. 4. Hypochondrij dextri dolor ab hepate oblitum,  
duro, tuberoso &c. p. 299.  
Obs. 5. Ab hepatis marasmo & cancrula affectione.  
Ibid.  
Obs. 6. Hypochondrij dextri dolor, durities & pondus  
ab hepate justo majori, scirrhoso, maculato &c.  
Ibid.  
Obs. 7. Hypochondrij dextri dolor à fissuris Jecori  
accidentibus ob causas internas vel externas.  
pag. 300.  
Obs. 8. Hypochondrij dextri pondus cum dolore ob  
massam carneam vices hepatis suppletem. p. 300.  
Obs. 9. Hypochondrij dextri dolor ob hepar diaphra-  
gmatis adnatum &c. Ibid.  
Obs. 10. Hypochondrij dextri dolor ab hepatis duritie  
& vesicæ felleæ rupturâ. Ibid.  
Obs. 11. Hypochondrij dextri dolor ab hepatis du-  
ritie, siccitate productus 1. magnitudine insigni, 2.  
scirrhoso cum magnitudine cystis felleæ 3. A tubero-  
so, duro 4. Nigricante circa lobos externos 5.  
Insigni magnitudine ventriculum infra deprimente,  
Cava parte ventriculo annexo 7. ob pus in hepate  
& thorace defluxum 8. A vitio Jecoris & subditæ vesicæ  
&c. 9. p. 302.  
Obs. 12. Hypochondrij dextri dolor cum duritie ab  
hepatis purulentiæ vulnus capitis sequentem.  
Ibid.  
Obs. 13. Hypochondrij dextri dolor à lapillis & lapi-  
dibus in hepate congestis. p. 303.  
Obs. 14. Hypochondrij dextri dolor à calculis in ve-  
sica fellea contentis. p. 304.  
Obs. 5

SECTIO XVIII

De Ictero.

- Obs. 15. Hypochondrij finistri dolor ab inflammatione Lienis purulenti facti. 1. Tensio ab illius & hepatis inflammatione. Tom. II. p. 309.
- Obs. 16. Hypochondrij finistri pulsatio à Liene densa crassa & cartilaginea incrassata. Ibid.
- Obs. 17. Hypochondrij finistri dolor & tumor ab insolenti Lienis magnitudine. p. 307.
- Obs. 18. Hypochondrij finistri dolor à Liene in cava parte sitto ob ictum infistum. Ibid.
- Obs. 19. Hypochondrij finistri dolor à Liene semiputrido & hepate ventriculo annexis. p. 308.
- Obs. 20. Hypochondrij finistri dolor à lapide in Liene incluso. Ibid.
- Obs. 21. Hypochondrij finistri dolor à Liene intus putrido, exterius integro & inculpato. p. 309.
- Obs. 22. Hypochondrij finistri dolor à Liene putri. 1. Magno, nigra saburra distento. 2. Putrido. 3. Ibid.
- Obs. 23. Intestini tenuis dolores falso Lienis adscribi ostendit Anatome. Ibid.
- Obs. 24. Hypochondrij utriusque dolor maxime finistri à putri Liene & putri sanguine in sinistro hypochondrio. p. 310.
- Obs. 25. Hypochondriorum dolor ab inflammatione ventriculi & suppurationem deducta. Ibid.
- Obs. 26. Hypochondrij dolor à ferramentis in ventriculo contentis &c. Ibid.
- Obs. 27. Ilij finistri dolor gravativus à Colo dantis fecibus obstructo, 1. A Coli inflammatione, 2. A Colo putrescente. 3. p. 311.
- Obs. 28. Hypochondrij dextri dolor à contusione & inflammatione intestinorum omenti mesenterij circa originem musculorum psoadum &c. Ibid.
- Obs. 29. Hypochondrij dextri dolor ab abscessu intra musculos abdominis & peritonæum contento. Ibid.
- Obs. 30. Hypochondrij dextri dolor ab enormi renum magnitudine, hepatis & lienis. 1. Ab hepate inflammato pancreate obstructo. 2. Ab hepate infarcto, pancreate magno. 3. Ab hepate ventriculo affixo, pancreate, mesenterio induratis. 4. A mesenterij abscessibus. 5. Præcordiorum ætus à tumore phlegmonoso circa umbilicum. 6. Præcordiorum collahentium sensus ob renes jecori affixos. 7. Præcordiorum dolor à renum vitijs. 8. Sinistri dolor ob renem in semedem lienis depulsum. 9. Dextri dolor à peritonæo & musculis vicinis à feri acrimonia commotus. 10. A pericardij & cordis sinistra regione ossis redditus. 11. Dextri dolor à pure intra thoracis cavitatem concluso. 12. p. 312.
- Obs. 31. Ilij dextri dolor ab osse femoris eroso & carioso. p. 313.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Hypochondriorum dolore.

- Obs. I. Hypochondrij dextri dolor ab ure maximo inibi juxta ventriculum sitto. p. 314.
- APPEND. De hypochondriorum quantitate aut tensione affectionis hypochondriacæ perpetuis comitibus. Ibid.
- Obs. 2. Hypochondriacæ mulieris Lien ea parte qua arteria ingreditur crassa cartilaginea inventus. Ibid.
- APPEND. Lapides in vesica fellea sæpe innoxie & sine dolore in hypochondrijs gestari ostendit Anatome. p. 315.

- Obs. 1. Icteri causa consistit plerumque citra vesicam felleam aut circa ipsam versus hepar. Tom. II. pag. 315.
- Obs. 2. In Ictericis non semper observatur ductus aut intestinalis aut cysticus, In iisdem solito acidiore evadit sanguis. p. 316.
- Obs. 3. Ictericis sectio à Clar. Sylvio anno 1664. administrata in quo folliculus fellis solito major ac bile margins deprehensas, hepar coloris ex flavo obscure virescentis &c. p. 318.
- Obs. 4. Icterus à jecore indurato lapillis repleto. p. 321.
- Obs. 5. Icterus ab hepate vitiatò & subviridi. Ibid.
- Obs. 6. Icterus ab hepatis vitio quod vitiosum erat. Ibid.
- Obs. 7. Ictericis intestina tumefacta apparuerunt & coloris citrini: Pericardium humore destitutum, sanguis in cordis ventriculis concretus & ipsius cordis substantia pravi coloris &c. p. 322.
- Obs. 8. Icterus à lapidibus in vesica fellea & calculis in pluribus ortus. p. 323.
- Obs. 9. Constitutio cystis felleæ in iis qui calculos in ea congerunt. p. 326.
- Obs. 10. Ictericis bilis cysti conclusa serosa & vix flavida reperta est. Ibid.
- Obs. 11. Icterus ob occlusionem meatus fellei ad intestina tendentis à glandulis circumscitis eum promentibus. Ibid.
- Obs. 12. Icterus ortus ob obstructum meatum vesicæ à carne excrefcentia. p. 327.
- Obs. 13. Icterus à Pori choledochi vitiosa figura. Ibid.
- Obs. 14. Icterus ab obstructione hiliis meatuum per hepatis substantiam spatiorum. Ibid.
- Obs. 15. Icterus ab ossa configuratione vesicæ felleæ ejusque meatus cum parte mesenterij. Ibid.
- Obs. 16. Icterus à pororum choledochorum succitate. Ibid.
- Obs. 17. Icterus exortus ob vesicam copia bilis turgentem. p. 328.
- Obs. 18. Icterus à cava hepatis parte scirrhusa & inflammata, pancreate putrescente &c. Ibid.
- Obs. 19. Icterus à jecore magno, duro, viridi, Et molli ingentique Liene. p. 329.
- Obs. 20. Icterus niger non semper fit à lienis obstructione quod in his affectibus Lien sæpe sanissimus reperitur. Ibid.
- Obs. 21. Ictericis à vitio hepatis subalbidi abscessu tentati, Lienis maximi lapidibus repleti. Ibid.
- Obs. 22. Icterus ab abscessu Jecoris, Liene lapidibus pleno. p. 330.
- Obs. 23. Ictericis Anatome in quo Jecur scirrhusum &c. Cystis sine felle, Lien & Pancreas scirrhusa &c. Ibid.
- Obs. 24. Icterus ab hepatis inflammatione quam sequuta gangrena. 1. Ab ipsius suppuratione. 2. Ab ulcere in gibba parte. 3. A calculo in vesica fellea. 4. A calculis in cysti, hepate grandi, duro, flavo, calculoso. 5. A vitio pancreatis, hepatis, vasis choledochi &c. 6. A calculis in cysti & meatu choledochi. 7. A cysti obstructa. 8. Ab hepate scirrhuso, arenoso. 9. Ibid.
- Obs. 25. Anatome Ictericis in quo Mesenterij venæ cruore flavo ac stercoreo scatentes repertæ sunt. 331.
- Obs. 36. Icterus à vitio Lienis & vasorum ad eum tendentium angustia. Ibid.

- Obs. 17. Icterus niger sequens Jecoris insignem duritiem. Tom. II. pag. 331.  
 Obs. 18. Icterus niger ab hepate scirrholo, vesicula fellis vacua, Omento putrido. Ibid.  
 Obs. 19. Icterus niger à Lienis absentia prognatus. Ibid.  
 Obs. 20. Icterus à parvitate Lienis, grandiore vesica fellea & obstructa. Ibid.  
 Obs. 21. Discoloratio à vermium copia in intestinis. pag. 333.  
 Obs. 22. Ictericus anatomè cujus interiora omnia membrata in primis hepar & intestina bile suffusa deprehensa sunt. Ibid.  
 Obs. 23. Mater Ictero laborans puellum enititur eodem infectum cujus sanguis totus erat flavus. Ib.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Ictero.

- Obs. 1. Icterus citra febrem vitio Jecoris generis cujus pars convexa omnino viridis. Conca-va pure referta, vesicæ felleæ crassiori bile turgens, Pulmonis sanie obijt & purulenti. To. II. p. 334.  
 Obs. 2. Icterus à lapide pellucido in cystide fellea. Ibid.  
 Obs. 3. Ictero nigro laborantis Lien male constitutus deprehensus. Ibid.  
 Obs. 4. Icterus non fit nisi ductus communis obstruat-ur. Ibid.  
 Obs. 5. Icterus à bile omnia viscera suffundente. Ibid.  
 Obs. 6. Icterus in Ascitem deficiens ab hepate scirrholo & lapillis cum bile crassa in vesicula fellis. 335.

## SECTIO XIX.

## De Scorbuto.

- Obs. 1. Scorbutus non semper vitio Lienis oritur ut varijs paret exemplis. Tom. II. p. 337.  
 Obs. 2. Scorbutici Jecur scirrholum deprehensum & rubrosum, Lien maximus, vasa mesenterica obliterata. p. 340.  
 Obs. 3. In scorbuticorum & hypochondriorum peditibus Lienis meatibus & lateribus arteriæ splenicæ & coeliacæ materia multa tartarea & sabulosa adhaerescens reperitur. p. 342.  
 Obs. 4. Scorbuticus hepar vitiatum habuit. p. 343.  
 Obs. 5. In scorbutico deprehensum omentum putridum, Mesenterium nigris varicibus oblitum, pancreas iudicatis glandulis repletum, hepar nigrum, scirrholum, lien longus, durior solito &c. Ibid.  
 Obs. 6. Scorbuticorum Omentum saepe vitium contrahit ut & Mesenterium. Ibid.  
 Obs. 7. Scorbuticorum urinas rubras fundentium hepar aut cystis fellea variè in vitio fuisse. p. 344.  
 Obs. 8. Scorbutici laqueo suffocati constitutio corporis interna & externa. p. 345.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Scorbuto.

- Obs. 1. Scorbuticorum & hypochondriacorum Lien saepe exterius ineniparus est qui intus vitij notas exhibet sua mollitie & flacciditate. p. 345.  
 Obs. 2. Scorbutum non semper oriri à lymphæ glandulas lacteas obstruente, ostendunt cadavera eorum in quibus mesenterij glandulae illas depre-

headuntur.

- Obs. 3. In scorbuto Lien male sepius culpatur ubi de varijs scorbuto speciebus. Ibid. p. 346.

## SECTIO XX.

## De Cachexia, Anasarca, Leucophlegmatia.

- Obs. 1. Cachexia genita ob Jecoris vasa à sanguine retrorrido obstructa. 1. Ob ejus vasa arterialia infarcta. 2. Ob ejus vitium hydratidibus se prodens. 3. Ab ejus duritie, ruberitate &c. 4. Tom. II. p. 349.  
 Obs. 2. Cachexia virio hepatitis quasi excocti inducitur, cum sin. stri pulmonis inflammatione & semiputredine. 1. Ab hepate magno ex parte corrupto cum pulmonum omnimoda putredine. 2. A virio hepatitis, pulmonum, cystis meatu obstructo. 3. A multiplici virio partium vitalium, & naturalium. 4. 5. 6. 7. 8. Ab hepate & liene scirrholis cum calculo in dextro cordis ventriculo. 9. A mala constitutione jecoris cystis felleæ cum Omenti extraordinaria crassitie. 10. Ab hepate fere putrido, Renum vitio. p. 350.  
 Obs. 3. Cachexia à parvitate & duritie Lienis inducitur. p. 351.  
 Obs. 4. Cachexia à renum calculosorum vitio producta. Ibid.  
 Obs. 5. Cachexia ab hydropo pulmonum inducitur. Ibid.  
 Obs. 6. Cachecticorum mesenterium vitiatum ut plurimum deprehenditur. 1. Materia purulenta inter duas ejus tunicas collecta reperta. p. 355.  
 Obs. 7. In cachectico vitium pancreatis deprehensum, hepatitis, lienis, vasorum mesentericorum obstructio, pericardij, pulmonum læsio. Ibid.  
 Obs. 8. Cachectici cadaver exhibuit lienem male constitutum & glandulis magnas comprimentes venam Portæ ejusque ramos cum pulmonum læsione. Ibid.  
 Obs. 9. Cachexia à tumore scirrholo, suppurato, orto ab inferiore parte pancreatis, hepate, liene, pulmonibus, renibus &c. viciatis. p. 356.  
 Obs. 10. Cachexia à sero per totum diffusio ob glandulas pancreatis & mesenterij induratas, Jecur pallidius & corporibus pituitosis in cordis ventriculis &c. Ibid.  
 Obs. 11. In Cachecticæ mulieris vesicula fellea aquosus humor sero lacti persimilis copiosus reperitur. p. 357.  
 Obs. 12. Cachexia laborantis thorax aqua plenus repertus. Ibid.  
 Obs. 13. Anatome cachectici pituitosi in cujus pericardio tumor turbulentus ad libras duas repertus. p. 358.  
 Obs. 14. Varia in Anasarca & Cachexia affectionum corporibus reperta, Abcessus in corde 1. Coepota fibrosa in majoribus vasis. 2. Abcessus febrile-tomatici. 3. Vasa emulgentia mucro obiecta. 4. p. 358.  
 Obs. 15. Anasarca ab abcessu Jecoris genita & Lienem maximo lapidibus repleto. p. 359.  
 Obs. 16. Leucophlegmatia producta ab exiguis liene Jecore utrunque morbo, vasorum quæ ad portam feruntur parvitate calculis in vesicula fellis, Renibus male constitutis &c. Pulmonibus pleuritæ adnatis. Hamore viscido in corde. Aqua in thorace. Ibid.  
 Obs. 17. Anasarca defuncti soli pulmones in vitio fuere. p. 361.  
 Obs.

- Obs. 18. Leucophlegmatia ab hydrope pectoris cum pulmonum vicio orta. Tom. II. pag. 361.  
 Obs. 19. Leucophlegmatia plerumque sequitur excedentem jecoris humiditatem. 1. Genita à Jecoris tumore satis magno. 2. p. 364.  
 Obs. 20. Anasarca defuncti cerebrum aquatiorè haurire erat imbutum. Ibid.  
 Obs. 21. Anasarca asciti juncta ab hepate scrofulis obstituta & peritonæo omento & intestinis cum inflammatione. Ibid.

ADDITAMENTA

Ad Sectionem de Cachexia, Anasarca &c.

- Obs. 1. Cachexia & hydrops in puero cujus viscera pleraque transposita reposita sunt cum plurimis vitij viscerum naturalium & vitilium. Tom. II. p. 364.  
 Obs. 2. Vitio pulmonum producta leucophlegmatia. p. 365.  
 Obs. 3. In muliere quæ ex Anasarca obierat abcessus pus fetidissimum fundeus in proprio lienis situ repositus. Ibid.  
 Obs. 4. In Anasarca succus biliosus quasi lacteus inventus est. Ibid.

SECTIO XXI.

De Ventris Tumore, Hydrope.

- Obs. 1. Hydrops ascitis causa sæpe aliunde quam ab affectu Jecoris aut Lienis pendet quæ sæpe in cadaveribus illæta deprehenduntur. Tom. II. pag. 366.  
 Obs. 2. Hydrops ascites à seroso humore subflavo citra vitium hepatis & lienis cum peritonæi & intestinorum inflammatione. p. 368.  
 Obs. 3. Ascites cordis vitio genitus polypis duobus obfessus. 1. 2. 3. 4. Existi cum distensione & magnitudine pericardij. 3. 4. Externuati. 5. Extraordinariè magni cum sanguine concreto in ventriculis præternatural. constitutis. 6. A calculo in corde cum hepatis & lienis scirrhus. 7. 9. A vitio cordis in quo substantia picuosa cum jecoris, lienis & renum vitio. 8. 11. Ob vitium cordis pericardio destituti cum alijs lesionibus & hepatis corruptione. 10. Vitio lienis cordis, hepatis, pancreatis, vasorum mesaraicorum obstructione. 12. Vitio cordis & pulmonum. 14. Cordis, hepatis, lienis, renum. 15. 16. A polypis in corde, hepate scirrhus. 17. A folliculo in corde pinguedine in dextro ventriculo. 18. A substantia pituitosa in dextro ventriculo. 19. Ab excrescentia carnosa in utroque ventriculo. 10. A corporibus fibrosis in sinistro ventriculo & aorta summè dilatatis. 21. A calculo venæ arterialis principio adhærente. 22. Ascites & pectoris hydrops à polypis in corde. 23. p. 369.  
 Obs. 4. Hydrops ascitis vitio Jecoris aridi exortus. 1. 6. Obftrus & nigricantis. 2. Maximi & duri. 3. Indurati, callosi, tuberculis obfati. 4. Indurati & lapillis repleti. 5. Scirrhus bile infecti. 7. Scirrhus lapillis repleti, Glandularum mesenterij induratarum &c. 8. Enormis in magnitudine, scirrhus cui duo saxi tumores appendi cum lapide in utero. 9. Exsterni, retortendi, faculenta amurca pleni. 19. Picuosa obftrus cum hydatidibus in substantia. 11. Pallidi, undique abdomini annexi. 12. Scirrhus magni, pallidi. 13. Flavescens cum insolita meatum felleorum constitutione. 4. Tuberosi, scirrhus cum peritonæi & omentij putredine & hydrope pectoris. 15. Cancrosi & tumore affecti. 16. Abcessu affecti. 17. Ab insigni ejus tumore cum abcessu in musculari abdominis. 18. Vitio jecoris exsterni cum anasarca. 19. Exsterni scirrhus. 20. Duri subpallidi, intus granulosi. 21. Magni ex parte corrupti. 22. Scirrhus, rubrosi. 23. Lapidebus obftrus. 24. 25. Corrupti, arenosi cum intestinorum dilatatione. 26. Flaccidi. 27. Scirrhus. 28. Arenis repleti. 29. Vermis in hepate & in poro choledochæ, bilis aqua in cysti. 30. Indurati & vitati cum Rene unico. 31. Corrupti cum adnata utero verruca. 32. Ingentis ponderis post suppressionem mensium. p. 380.  
 Obs. 5. Hydrotici cystis fellea exhausta lapillis repleta, Intestina nigra quasi torrefacta. 1. Cystis muco & capillis repleta. 2. Lapilli nigri in cysti. 3. 4. 5. p. 397.  
 Obs. 6. Ventris tumor Asciticus vitio Jecoris duri, pustulis ubique repleti. Lienis crassi, conglobati. 1. Jecoris & Lienis tumores scirrhus affectorum, Glandularum mesenterij tumidarum in Leena, Hepatis & Lienis durorum siccorum. Hepatis fungum adnatum habentis, Lienis intus vitati. 4. Hepatis & Lienis pituita alba obductorum. 5. Ob scirrham in vicinis utriusque. 6. Vitio Lienis monstruose conformati. Hepatis vitati. 7. Hepatis duri, tumidi, Lienis pallidi mollioris. 8. Hepatis & Lienis corruptorum. 9. Hydrops sæpe consequitur corruptionem & putredinem utriusque. 10. Asciticus & Tympaniticus tumor ob utriusque visceris scirrhum. 11. Ascites cum gravitate à jecore scirrhus. Liene quasi lapidato. 12. Ibid.  
 Obs. 7. Hydrops sine vitio hepatis à Liene putri. 1. Albido & effluo. 2. 3. Tumido & indurato. 4. Monstrosæ magnitudinis & formæ intus putri. 5. Ascites lienis tumorem vel vitium plerumque consequitur. 6. A flaccido Liene concreto sanguini simile quid continente. 7. Scirrhus obfeso. 8. Apostemate infecto. 9. p. 396.  
 Obs. 8. Ascites vitio Renum flaccidorum & exilium procreatus. 1. Ulceratorum & perforatorum. 2. 3. Sinistri corrupti. 4. 5. Renis dextri obftrus à calculis sinistri parentis. 6. Utriusque muco obftrus. 7. Sabulo. 8. Sinistri valde consumpti, Dextri veteris obstructione. 9. Hydrotici renes nullo adipe obfati, Lien parvus. 10. à Renibus flaccidioribus cum vitio hepatis & lapide insigni in cysti. 11. p. 403.  
 Obs. 10. In hydroticorum renibus cavitates non naturales aqua lymphida repleta sæpe comperiuntur. p. 406.  
 Obs. 10. Ventris tumor Asciticus cum tuberibus & glandulis mesenterij induratis. 1. In hydroticis prope omnibus induraverunt. 2. Ob vasa serosa abdominis à tumore duro compressa. 4. A magnitudine mesenterij abcessibus obfati. 4. Ab eodem plurimis hydatidibus obfati. 5. Ab eisdem steatomate. 7. A pluribus vesiculis in tumore insigni adnato cum aquarum copia. 8. Ab eodem prodigioso surgente, scirrhus cum pluribus abcessibus & Jecore abcessibus repleto. 9. Ab exuberantij. steatomate illius glandularum cum pustulosis vâscis ac fætu in utero. 10. Ab eodem scrofulis repleto. 11. Ab infectis ejus glandulis. 12. A squamis id & totum ventrem inferiorem occupantibus. 13. Hydroticorum mesenterij ut plurimum



- corruptum invenitur. 14. A glandulis omnibus tam mesenterij quam externis abdominis induratis. 15. A mesenterij ulcere. 16. Tom. II. pag. 470.
- Obs. 11. Anasome ascitici corpus viscera omnia naturalia affecta. 1. Asciticus à virio glandularum mesenterij, hepatis abscessibus tenaci, Renis duri, Renum putridorum. 2. A virio hepatis indurati, Lienis parvi albi cantis, Renum male constitutorum. 3. Ab hepate fuso vesiculis obfuso, Renibus pertusis. 4. A Jecoris ventriculi, Pancreatis scirrhosi virio, mesenterij glandulis tumidis. 5. A Jecore pituita refferto, Pancreate duro, Rene dextro calculoso. 6. A mesenterio flatuomatibus refferto, Pancreatis scirrho, Hepatis duritie, Pulmonibus scirrhosis. 7. Ab hepatis abscessibus, Renis finitimi & uteri. 8. Ab hepatis duritie viritis renum mesenterij. 9. Ob Lienem calculosum, Renem dextrum lapide occupatum, uterum cartilagineum. 10. Ventris tumor hydropicus à copia ichorosa & purulentæ materiæ ob viscerum omnium corruptionem. 11. A virio Jecoris, Renum cystis felleis Pulmonum. 12. Ab abscessibus juxta hepate. Liene apostemate infecto. 13. A scirrho Jecoris. 14. Lienis, Renum virio, Pancreatis &c. p. 453.
- Obs. 12. Ventris tumor hydropicus ab æque ingenti copia extra peritonæum subsistente, salvo Jecore & liene. 1. 8. A sero Orientali caritate concluso & ejus glandulis tumidis, iisdem visceribus salvis. 2. Ab aqua in peritonæo collecta. 3. per tubas uteri delata. 4. A lentento humore inter musculos abdominis & peritonæum contentis. 5. 6. A sero quincuo cum parvo liene. 7. A sero inter duas peritonæi tunicas. 8. p. 456.
- Obs. 13. Ventris tumor hydropicus ab aqua in vena umbilicali retenta, Ech hunc in abdomen extillans. p. 450.
- Obs. 14. Hydropici (cujus aquæ per umbilicem evacuatæ) inventa vena umbilicalis externis dilata. p. 451.
- Obs. 15. Hydropicus infusus in utero à collectis tum in abdomine tum pectore aquis. Ibid.
- Obs. 16. Embrio hydropicus cui meatus amplius à vesicæ fundo in ventem cavam producebatur. p. 452.
- Obs. 17. Ascites circa viscerum lationem à sola viscerum lympharum disruptione ortus. 1. 2. Ventris tumor ab aquis pellucidis illius replentibus. 3. A lymphæ variæ consistentiæ. 4. 5. Ibid.
- APPENDIX. Hydrops Ascitis & Anasarca generatio ostensa per experimentum in cane factum venam cavam illius sectione in thorace fistula stringendo filo nuda mox intumescit abdomen vel habitus corporis à sero ex ea effudante. p. 453.
- Obs. 18. Hydrops quamquam à lymphaticis visis aliquando oritur, iisdem tamen integris obortum fuisse experientia constat. p. 454.
- OBSERV. 19. Hydrops Ascites non contingit absque aliqua interiorum partium abdominalium solutione continui unde Vesicarum & Hydatidum origo. Ibid.
- Obs. 20. Ventris tumor ob magnam aquarum congregationem & tumorem insignem in eo inclusum. 1. A feci copia cum crasso muco hypocondria lococapitis replente, 2. Ascites à muliere grävda ex superfecundatione judicata. 3. Ab aqua eructa in abdomine. Et massa carnea in ventriculo alitque partibus annexa. 4. Ab aqua nigra in abdomine materia nigra in ventriculo. 5. A pure aquoso abdomen implente. 6. A pure sacculo incluso ex propenduntia diaphragmatis efformato. 7. Ab urina effusa à disruptione vesicæ. 8. Ab aqua cruenta cum corruptione intestinorum. 9. A fecibus exulceratis intestinis in abdomen effusis. 10. A pure ad replente. 11. 12. A pure ex thorace in abdomen effuso. 13. 17. A sanguine in id effuso. 14. Ab aquæ copia; muco inter intestina & mesenterium ac glandulosos corporibus inter intestina & mesenterium. 16. p. 455.
- Obs. 21. Hydrops à vesiculis membranæ adiposæ adnatis, lumborum à regioni adnatis circa Jecoris viam. 1. Ab aquis vesiculis multis conclusis intra omenti substantiam. 2. A binis vesiculis inter peritonæum & intestina latentibus. 3. A pluribus vesiculis inter peritonæum & intestina. 4. A vesicæ variæ magnitudinis circa mesenterium. 5. A vesicis visceris omnia inter ventris obfidentibus. 6. A multis vesiculis propria tunica conclusis. 7. A vesicis mesenterio, peritonæo intestinali, omnibusque visceribus adnatis. 17. 18. A vesicis variis abdominalis locis dispersis. 9. 10. A virio Jecoris vesicula obfusi. 11. 12. 13. A lymphæ vesicis conclusa. 14. A crebris vesicis invicem coherescentibus inter peritonæum & cutem abdominis. 15. A vesiculis inter abdomen & peritonæum aggregatis. p. 455.
- Obs. 22. Tympanitidis causa obscura. p. 456.
- Obs. 23. Ventris tumor Tympaniticus à flatibus intestinis distendentibus. p. 458.
- Obs. 24. Tympanites à flatibus intra cavitatem abdominis. p. 459.
- Obs. 25. Hydropicorum abdomen non aquis solum sed à flatibus distendentibus turgens. Ibid.
- Obs. 26. Ventris tumor flatulentus & aquosus à ventriculo post inflammationem perforato. p. 460.
- Obs. 27. Ventris Tumor Tympaniticus ob venenum inductus à quo viriatum hepar. Ibid.
- Obs. 28. Ventris tumor Tympaniticus à Liene maximo, pluribus membranæ (inter quas aqua continetur) involuto &c. Ibid.
- Obs. 29. Ventris Tumor Tympaniticus à ventis mesenterij arefactis. Ibid.
- Obs. 30. Ventris Tumor Asciticus & Tympaniticus à Jecore retorrido, indurato Liene, Rene putrido, intestinalis syderatis. p. 461.
- Obs. 31. Tumor ventris Asciticus & Tympaniticus salvo Jecore genitus & aliis visceribus. Ibid.
- Obs. 32. Tumor ventris Tympaniticus & asciticus cum epigene in paralyti. p. 462.
- Obs. 33. Ventris tumor Tympaniticus ob ventriculum & intestina flatibus tumida ab hepatis, mesenterij, pancreatis virio & languore calidi innata. Ibid.
- OBSERV. 34. Ventris tumor Asciten mentis à monstroso Omenti tumore. 1. Ab Omento totam epigastrij regionem occupante. 2. Ob omentum ubique sanie reffertum. 3. Ob ejus glandulas magnitudinis insignis. 4. Ob illius insolentiam crassitiam. 5. A tribus glandulis omenti maximis, scirrhosis. 6. p. 463.
- Obs. 35. Ventris tumor pro hydropice habitus à splene immensum insignitudinis & Jecore magno. 1. A Lienetorum abdomen occupante. 2. 3. Ob Lienem molis extraordinariæ ligamentis splutur. 4. 5. Ob Lienem monstrosum alieno loco hærentem. 6. Ob hepatis insignem magnitudinem. 7. p. 465.

- Obs. 36. Ventris tumor à corpore extraneo, crassitie pedis unius & semis sub musculus abdominis : Alio virilem mentulam referente inter uterum & vesicam urinariam sito. p. 446.
- Obs. 37. Ventris tumor pro hydropico habitus ab ingenti massa pinguedinem referente, totum fere mesenterij spatium occupante. 1. A steatomate ingenti Pancreati Asellij innato. 2. p. 448.
- Obs. 38. Ventris tumor à portentosa Abscessuum magnitudine repetitorum in mesenterio. p. 450.
- Obs. 39. Ventris tumor à Mesenterio prodigiose turgente scirrhoso cum infinis abscessibus & scirrhoso jecore abscessibus referto. Ibid.
- Obs. 40. Ventris tumor ab insigni viscerum magnitudine naturali copioso adipe obditorum Alcines creditus. p. 451.
- Obs. 41. Ventris tumor & durities ob hepar cartilaginea tunica constans, Peritonæum durissimum vesicam & uterum substantiæ lapideæ. p. 452.
- Obs. 42. Ventris tumor gravidationis specie impo- nens à Copia sanguinis in abdomine, hepatis magnitudine insigni, intestinorum tenuiam protuberantia. p. 452.
- Obs. 43. Tumor ventris suspicionem ingereus gravi- ditas ab insigni ventriculi tumore & Liene inter illum & hepar sito. p. 453.
- Obs. 44. Ventris tumor à sanguinis nigerrimi copia inter musculos abdominis & peritonæum con- tenta. Aqua multa inter peritonæum & intesti- na. Tuba dextra uteri tumida &c. Ibid.
- Obs. 45. Abdominis Tumor immensus à Massa cri- nta & aquæ ingenti copia intra peritonæum conclusa à vitio Jecoris genita. p. 454.
- Obs. 46. Ventris tumor ob massam propterea mem- brana involutam nigricante & foetidissima aqua plenam. p. 455.
- Obs. 47. Ventris Tumor ab infinito numero abces- suum steatomatorum. Ibid.
- Obs. 48. Ventris Tumor à tumore duro & dolorifico musculorum abdominis cum multiplici interio- rum viscerum vitio. Ibid.
- Obs. 49. Ventris tumor ab hydropo ventriculi pro- ductus. p. 456.
- Obs. 50. Ventris tumor à ventriculo & intestinis flaribus distentis. 1. Ab intestinis omnibus flaribus tumidis. 2. Ob eadem inflammata & fla- ribus repleta. 3. Ob Colon fecibus & puvira infarctum. 4. Ob ejus abscessum. 5. Ob idem puvira infarctum. 6. Ob illius contorsionem & insignem dilatationem. 7. Ob excrementum meconium dictum, cohibitum in infante. 8. p. 457.
- Obs. 51. Hydropici Pulmones pene consumpti. 1. 2. Purulenti sine vitio viscerum naturalium. 3. Ibid.
- Obs. 52. Ventris tumor hydropicus illeto Jecore & Liene ab abscessu, omento & Peritonæo. Ibid.
- Obs. 53. Ventris tumor hydropicus ob abscessum juxta Lienem genitum. p. 458.
- Obs. 54. Ventris tumor & durities ab ejus exterioribus cartilagineis & cancriosis. Ibid.
- Obs. 55. Fungi in hydropici abdomine reperti. Ibid.
- Obs. 56. Ventris tumor ab utriculo uteri supe- riori parti adnato, aquam copiosam continente. 1. A monstrosa uteri magnitudine & aqua co- pia in abdomine. 2. Ab utero dupli- cum gemino foru, Effusaque in abdominis cavitatem sanguine. 3. Ab utero materia adiposa infarcto

insigni ponderis. 4. A varijs & monstrosis in uteri substantia contentis. 5. Ab uteri substantia in scirrhum indurata. 6. Ab utero & abdomine scirrhosis. 7. Ab uteri enormi extensione cum aquarum congestione. 8. A varijs uteri vitijs & insigni ejus hydropo. 9. Ab uteri insigni hy- dropo, Et dextris testis glandulis admodum tu- midis. 10. Ab uteri insigni amplitudine, alijs- que virijs cum massa carnea in ejus cavo. 11. Ab hydropo in cornubus uteri innumeras vesti- cas continentibus. 12. Ab hydropo Testiculo- rum muliebrium cum aquæ copia in abdomine. 13. Ab hydropo uterino. 14. Ab enormi uteri incremento. 15. Ab hydropo Testicali feminini. 16. Ab insigni uteri magnitudine, Et humoris putridi in abdomine copia. 17. A cathea molè ex uteri superficie externa, exorta hydropem ascitem mentiente. 18. Ab hydropo uteri & ve- siculis purulenta materia refertis cum aqua co- piofa in abdomine. 16. Ab utero aqua pleno. 20. Ab hydatide testiculis finistri muliebris vi- cem occupante. 21. Ab uteri putrefactione cum hepatis vitio. 22. Ab utero & vesica urinaria exulceratis. 23. A ligamento uteri sinistro a- qua pleno abdomen distendens. 24. Tom. II.

- APPEND. De simili Tumore ex cute Pudendi innato feliciter per sectionem extirpato. p. 464.
- Obs. 57. Tumor ventris hydropicus vitio Testium muliebrium salvo hepate excitatus. p. 466.
- Obs. 58. Ventris tumor ob molam pluribus annis gestatam. 1. 2. Ob forum & molam. 3. Ob mo- lam ingentem ex plurimis vesicis aqua repleta constans. 4. Ibid.
- Obs. 59. Ventris tumor graviditatis suspicionem ex- hibens à feri copia abdomen replentis, utero valde magno, pleno humore crasso &c. p. 467.
- Obs. 60. Ventris tumor & durities scirrhum mentita ob forum utero conceptum. p. 469.
- Obs. 61. Ventris Tumor Asciticus cum testiculis dex- tri (in muliere) pilis infarcti miro incremento. Ibid.
- Obs. 62. Ventris Tumor à ligamento uteri superiori tumido fero. p. 470.
- Obs. 63. Ventris tumor à molè insigni omento ad- nata & vasis spermaticæ ac uteri tuba dextra ex multifariis partibus contenta. Ibid.
- Obs. 64. Hydrops à defectu caloris navi inductus. p. 471.
- Obs. 65. Hydropicus ventris Tumor à nimio potu inductus. Ibid.
- Obs. 66. Peritonæi tunice in hydropicis mire ali- quando crassescunt & indurantur. Ibid.
- Obs. 67. Hydropici ventriculus admodum angus- tus quia jamdiu non comederat. Ibid.
- Obs. 68. In hydropicis quibusdam pericardium cor- di adherens inventum. Ibid.
- Obs. 69. Anatome hydropicæ mulieris in qua prin- cipium venæ cavæ descendens arcu coaluerat. p. 472.
- Obs. 70. Hydropici cadaver sine hepate & Liene in- ventum. Ibid.
- Obs. 71. Anatome hydropicæ sine Jecore, Liene, Renibus inventæ cum mola insigni in utero. Ibid.
- Obs. 72. Hydropici Jecur totum consumptum, Lien, Renes &c. Ibid.
- Obs. 73. Ventris tumor ab aquæ ingenti copia visce- ra adeo compellente ut nec cordis nec pulmonum appareret vestigium. Ibid.

- Obs. 74. Anarome canis toto corpore tumida possensulum in venas oleo Tartari in cujus venis languis folto fluidior repertus est. Tom. II. p. 473.
- Obs. 75. Borborygma & coarctantium ranarum species ob impedito libero flatuum per intestina excursu. Et ventris Tumor à mirabili ejus pinguedine. Ibid.
- Obs. 76. Ren unicus observatus in his quibus venter promissus & viriatu costarum ductus. Ibid.
- Obs. 77. Ventris inferioris gracilitas cum intumescencia superioris ob delatam post vulnus ventriculi partem & intestinorum in thoracem. p. 474.

## ADDITAMENTA

*Ad Sectionem de Ventris Tumore, Hydropis, &c.*

- Obs. 1. **A**bdominis Tumor ab immani uteri expansione cum infarctu & corruptione illius. Tom. II. pag. 474.
- Obs. 2. Ventris tumor à parte in eo parte sinistra congesto praesertim circa Lienem cui immerfus omni vicinis partibus latebat. Ibid.
- Obs. 3. Hydrops Ascites vitio hepatis insignis magnitudinis geniti, duri, varijs in locis putridi. p. 475.
- Obs. 4. Hydrops Ascites à scirthis Jecur, mesenterium, pancreas, aliasque, partes instantibus. Ibid.
- Obs. 5. Hydropici cadaver exhibuit Renem dextrum materia calei simili infarctum. Sinistram vas distentum exterius cum hydatide &c. Ibid.
- Obs. 6. Hydrops à Liene, Abscessu seroso & purulento obfesso qui ante obitum materiam ad latus dextrum eructabat. Ibid.
- Obs. 7. Ventris Tumor ab aqua in peritonæi duplicatura peculiari coherente saccum efformans extra quem viscera constituta. p. 476.
- Obs. 8. Ascites à duro hepate & Liene. p. 477.
- Obs. 9. Polypi liberi in cordis ventriculis duarum mulierum una hydropis, altera cachexia extincta. Ibid.
- Obs. 10. Ventris tumor ob Renis tunicam externam admodum expansam, Renis substantia consumpta. Ibid.
- Obs. 11. Hydrops Ascites à Jecoris & Lienis scirrho. Ibid.
- Obs. 12. Hydropici pancreas semiputris observatum. p. 478.
- Obs. 13. Hydrops à Jecore retortido, pituita refocto. Ibid.
- Obs. 14. Hydrops scorbuticus. Ibid.
- Obs. 15. Ascites cum hydropis thoracis vitio hepatis in quo fissura deprehensa genitus cum calculis in vesica fellea. p. 479.
- Obs. 16. Hydrops Ascites lethalis casum sequens in Puella cujus viscera nobilia consumpta reperta fuere & Lien marcidus. p. 480.
- Obs. 17. Ventris tumor à glandulis panniculo carnosio substratis tumore insigni sub peritonæo humore feci vini rubri simili repleto, Molis plurimis utero adnatis &c. Ibid.
- Obs. 18. In hydropica muliere glandulae circa mesenterium admodum tumidae repertae sunt, Lien tumidus, humoris serosi copia &c. p. 481.
- Obs. 19. Hydrops Ascites à vitio Jecoris intrinsece corrupti, carnem non solidam sed cretorem nigerrimum condensatum referentis. Ibid.
- Obs. 20. Ascitici hepar album repertum est, distensum, mestibus albo crassoque sacco infarctis folliculis tellis jiss. vix continens fetidissimam, cum

- ulcere mesenterij. Tom. II. p. 482.
- Obs. 21. Hydropice cor maximum repertum, pericardio connatum undique. In sinistro illius ventriculo sanguis purulentus. p. 483.
- Obs. 22. Imi ventris tumor ab utero scirrho induratus cum vomica in mesenterio. Ibid.
- Obs. 23. Ventris tumor graviditatem mentiens à Vesicæ abscessu. p. 484.
- Obs. 24. Tympaniticorum & Asciticorum Jecur solidiorem densioremque substantiam natum est, Leucophlegmaticorum laxiorem. Ibid.
- Obs. 25. Ventris tumor à serosi humoris copia insigni inter peritonæi tunicam duplicatam occulsa. Ibid.
- Obs. 26. Hydrops Tympanites à flatibus abdomine inclusis. p. 485.
- Obs. 27. Ventris Tumor insignis ob renem postero-lateri magnitudinis. Ibid.
- APPEND. Ventris Tumor ab Omenti incrassatione ex conjectura ortum ducens. p. 486.
- Obs. 28. Uteri Tumor à sacco membranaceo, innodis omnibus visceribus incumbente abdomenque multum extollente, tantaque capacitatis ut 40. circiter mensuras tenuerit &c. circa quæ aliquot curiosæ. p. 487.
- Obs. 29. In hydropica aquæ 90. librarum repertæ, ventriculus ultra modum longus &c. p. 488.
- Obs. 30. Ventriculi hydrops. Ibid.
- Obs. 31. Uteri hydrops. Ibid.
- Obs. 32. Tumor ventris in quo mesenterium ac pancreas immenso molis &c. Ibid.
- Obs. 33. Hydrops in quo tumor pilosus in omento repertus est. p. 489.
- Obs. 34. Hydrops in quo hepatis glandulae admodum tumefactæ. Ibid.
- Obs. 35. Hydrops Ascites ex hydatidibus. p. 490.
- Obs. 36. Partium quarundam induratio in hydropica. Ibid.
- Obs. 37. In hydropici cadavere hepar male & quomodo affectum. Ibid.
- Obs. 38. In simili alio hepar iridem male affectum una cum calculo in ductu cystico. Ibid.
- Obs. 39. Hydrops Tubæ uterinae monstruosus. p. 491.
- Obs. 40. Hydrops cum scirrho Ovarij sinistri tuberoso. Ibid.
- Obs. 41. Hydrops ingens in duplicato peritonæo. p. 492.
- Obs. 42. Hydrops à scirrho partium glandulosarum. Ibid.
- Obs. 43. Hydrops ex Rene dextro, materia calculosa oppleto &c. p. 496.
- Obs. 44. Ex peripneumonia, phthisis & hydropis. p. 498.
- Obs. 45. Anatomie adolescentis hydropici *μεγαλὴν* cum varijs curiosis. p. 499.
- Obs. 46. Hydropis rari historia. p. 500.
- Obs. 47. Hydrops Ovarij mulieris &c. p. 501.
- Obs. 48. Historia hydropis memorabilis. p. 504.
- Obs. 49. Hydrops in quo hepar toxum glandulosum &c. repertum. p. 505.
- APPENDIX, Lumbricus Hydropicus sive Tentamen quo probabile redditur hydatides sæpius in morbidis corporibus animalium obvias esse speciem vermium seu animalium imperfectiorum. p. 506.
- Obs. 50. Anatomie herniosæ & ascitice curiosæ. p. 508.
- Obs. 51. Anatomie Ascitice. p. 510.
- Obs. 52. Anatomie Anasaræ encæti. p. 511.
- Obs. 53. Anatomie hydropis uteri extrinsecæ. p. 512.
- Obs. 54. Anatomie hydropis & mola uteri efflicte. p. 514.
- Obs. 55. Anatomie Ascitici. p. 517.

- Obs. 56. Anatome Ascitici & Herniosi. Tom. 2. p. 518.  
 Obs. 57. De omento mirabili hydropici p. 520.  
 Obs. 58. De intestino colicatum in modum à flatibus distenso hydropem ascitem mentiente dequellente sphacelo & corrupto. Ibid.  
 Obs. 59. Anatome hydropicorum. p. 521.  
 Obs. 60. Hydropes pectoris cum abscessibus hepatis & calculo ingenti folliculis fectis. p. 522.  
 Obs. 61. Mammarum osses in virgine cum pectoris hydropice. Ibid.  
 Obs. 62. Vivum cadaver sen hydrops Ascites in quo partes superiores corporis omnino tabefactæ p. 523.  
 Obs. 63. Hydrops abdominis sacculus cum vesicæ ac nteri defectu &c. Ibid.  
 Obs. 64. Hydropice post paracente sinistatome. p. 525.  
 Obs. 65. In hydropica paracentesis frustra pene tentata. p. 526.  
 Obs. 66. De abdominis tumore stomatico in puctulo nondum trienni rato & admittendo Ibid.  
 Obs. 67. Hydrops Ascites siccatas sive abdominis intumescencia suspende magnitudinis cum interveniente parva felici. Ibid.  
 Obs. 68. Cadaverum sectio veritatis refectione sive Hydrops Ascites falso pro monstro habitus. p. 528.  
 Obs. 69. Hydrops sacculus. p. 529.  
 Obs. 70. De Ovario hydropice monstroso. p. 531.  
 Obs. 71. Hydrops ovarii mulieris suspendas in exentatione mulieris cuiusdam repertas. Ibid.  
 Obs. 72. Hydrops ovarii mulieris. p. 532.  
 Obs. 73. Tumor ventris quasi gravidæ ab omento glanduloso. p. 533.  
 Obs. 74. De sacco abdominis hydropem mentiente. Ibid.  
 Obs. 75. Inflatione intestinum hydropem mentiente citica que de flatuum causa, materia &c. queritur. pag. 537.  
 Obs. 76. De Hydropes pectoris lethali: hic extra proprium locum, siquidem pertinet ad morbos. p. 540.  
 Obs. 77. Hydropice anatome ubi testiculus dexter ad magnitudinem capitis infansilis auctus repertas &c. Ibid.  
 Obs. 78. De anatome viri hydropice & fluxu hepatico defuncti. Ibid.  
 Obs. 79. Hydrops pectoris, hic extra proprium locum, in quo Polypus cordis portentosus repertas. p. 541.  
 Obs. 80. De pinguedine in abdomine tumorem Tympanitico similem efficiente. p. 542.  
 Obs. 81. De hydropes quem sacculum vocare solent singulari. Ibid.  
 Obs. 82. De Hydropes vesicario. p. 546.  
 Obs. 83. De anatome canis hydropici. Ibid.  
 Obs. 84. Hydrops in quo lien præcipue affectum repperitum est. p. 547.  
 Obs. 85. Hydrops Ascites in quo tumores omni generis innumerati abdomini occupabant. p. 548.  
 Obs. 86. Hydrops Ascites in quo tumor grandis in pancreate aliisque minores per totum mesenterium ac intestinum longitudinem disseminati &c. p. 549.  
 Obs. 87. Hydrops Ascites in quo omentum variis tuberculis confectum, hepatisque suppuratum repertas est. Ibid.  
 Obs. 88. Hydrops purulentus seu abscessus mesenterici hydropem ascitem mentiens. p. 551.  
 Obs. 89. Pseudo hydrops à pinguedine anomala imi ventris exterioris ac interioris copiosius occupante. pag. 552.

SECTIO XXII.

De Lumborum dolore Nephritide & Calculi Renum.

- Obs. 1. Renum dolor calculis obfessorum ureterum capitis subventibus. Tom. 2. p. 553.  
 Obs. 2. Lumborum dolor à Calculis Renum insistentis figure & molis: Calculi Spertingiani. pag. 554.  
 Obs. 3. Lumborum dolor à calculis renum substantiam absorbentibus comite inflammatione p. 556.  
 Obs. 4. Renum dolor à calculo immenso in rene dextro, sinistro penitus consumpto &c. Ibid.  
 Obs. 5. Post nephriticos dolores à lapide Renum substantia consumpta est, sola supetite membranæ. p. 557.  
 Obs. 6. A Nephriticis doloribus extinctæ mulieris Reni dexter plane putridus inventus, sinister flaccidus, tumidus, pure & calculis repletus &c. p. 558.  
 Obs. 7. Ob nephriticos dolores extinctæ Reni sinister maximus inventus est lapidem continens exiguum; dexter minimus. p. 559.  
 Obs. 8. Nephriticus dolor à calculo cui gallinacei magnitudine sub membrana renis sinistri delitescere & pluribus in utroque Ibid.  
 Obs. 9. Cuiusdam Nephritico doloti obnoxii Renes lapidez durities reperi sunt. p. 560.  
 Obs. 10. Mulieris post Nephriticos dolores mortuus Renes absorpti & vesica corrupta reperiuntur. Ibid.  
 Obs. 11. Nephriticus dolor & imi ventris à Rene suppurato & Calculo vesicæ huiusque exicitatione. Ibid.  
 Obs. 12. Nephriticus dolor à Calculo perforato urinæ transitum concedente. p. 561.  
 Obs. 13. Nephriticus dolor à calculo ureterem obtutante. Ibid.  
 APPENDIX, Renum substantia varie pro nan ta affectuum varietat. p. 562.  
 Obs. 14. Lumborum dolor à Calculo oblongo & obliquo renem dextrum occupante eumque tandem consumpente. Ibid.  
 Obs. 15. Renis & præsertim dexteri dolor à calculo in hoc totum: Alio bilido in sinistro cum corruptione. Ibid.  
 Obs. 16. Lumborum dolor à rene putri ob calculos & materiam viscidam tumido, altero immixto. p. 563.  
 Obs. 17. Lumborum & nephriticus dolor à calculo grandiori pelvis renis dextri implente cum alio minore &c. Ibid.  
 Obs. 18. Nephriticus dolor à calculis uteribus vel pelvi impactis. p. 564.  
 Obs. 19. Nephriticus dolor à Calculis in renem substantia & ipso infundibulo &c. Ibid.  
 Obs. 20. Nephriticus dolor à calculo cruciformi per universum renem se dispergente. Ibid.  
 Obs. 21. Nephriticus dolor à varis formæ & coloris calculis. p. 566.  
 Obs. 22. Renum dolorum utrumque Renem calculo obfessorum. 1. Ob calculum per omnes Renis sinus dispersum. 2. Ob renem à calculo continente, ab his summe ampliam. 3. Ob calculum in Rene dextro & arteria magnæ distensionem. 4. Ob renis tumorem & pelvis calculi repertas. 5. p. 566.  
 Obs. 23. Lumborum dolor ob renem purulentum insignis magnitudinis. 1. Ob renem semipurulentum, purulentum. 2. Ob Renis dextri apostema. 3. Ob

renem finistram maximum dextro absente. 4. Ob vermes in renibus. 5. Ob renum inflammationem hinc sequutam gangrenam. 6. Ob abscessum in sinistri renis carne externa. 7. Ob renis dextri putredinem. 8. Viceratos erosos. 9. finistri duritiem substantiam putrefactam. 10. Renum magnitudinem duritiem, concretis puris substantiam referentem. 11. Sinistram pure ac theatomate infectam. 12. Sinistram colliquam. 13. utrumque mole insignem citra vitium. 14. Tom. 2. p. 567.

Obs. 24. Calculus uariarum trium & semis in rene dextro repertus; Centum lapilli in sinistro citra dolores nephriticos urinas sabulosas aut difficulter fluentes. 1. Calculi citra signa gestati. 2. 3. 4. 5. 6. p. 569.

APPENDIX, De quodam Nephritide laborante cui citra dysuriam disit dolor. Ibid.

Obs. 25. Lumborum dolor & dorsii ab insigni pancreatis abscessu. p. 570.

Obs. 26. Calculosi Renes flaccidi reperti cum ureterum amplificatione. 1. Cavitates majores sunt ab appulsu novae materiae. 2. In calculosis ureterum dilatatio reperta. 3. 4. 5. In emolgentibus calculi geniti. 6. 7. Cicatrix renibus indurata post diuturnos dolores nephriticos. 8. Ibid.

Obs. 27. Nephriticus dolor à Calculis & arenulis cum tenua substantiae ulcere, suppuratione, corruptione &c. p. 571.

Obs. 28. Pueros Nephritidi & lumborum doloribus obnoxios esse ostendit anarome. Ibid.

Obs. 29. Multos lumbis dolere citra calculi in renibus praesentiam ex solo catharro anarome ostendit. Ibid.

Obs. 30. Lumborum dolor ob lienis è loco proprio discessionem. p. 572.

Obs. 31. Lumborum dolor à lapidibus in arterijs lumbacibus absconditis. Ibid.

Obs. 32. Lumborum dolor ob scirrhum in ileo intestino supra renis regionem consistentem. Ibid.

Obs. 33. Lumborum dolor à sero in fistula dorsii stagnante. Ibid.

Obs. 34. Lumborum dolor ab abscessu illic oborto. p. 573.

Obs. 35. Lumborum dolor à corrosis duabus lumborum vertebrae, succedente hinc venae cavae & arteriae aortae ruptura. p. 573.

Obs. 36. Renum dolor à pure è corde calculis & abscessibus oborto manente. 1. Ab hydropneumonia, calculo in corde. 2. p. 574.

Obs. 37. Lumborum dolor ab acri sanie è pulmonibus aut venis in renes conflante aut sero vasa distendente. Ibid.

Obs. 38. Lumborum & dorsii dolor ob vasa ab hepate ad Renes euncia Tartaro obliterata. Ibid.

Obs. 39. Lumborum dolor à pancreate & mesenterio induratis. &c. p. 576.

Obs. 40. Lumborum ossis sacri ad coxendicem & Iliolum dolores à Pancreate Asellij enati & Mesenterio homotibus tragentibus. Ibid.

Obs. 41. Lumborum & dorsii dolor à cancroso pancreatis ulcere, spina dorsii erosa & putrida. Ibid.

Obs. 42. Lumborum dolor à varijs partium infimi ventris affectibus. A mesenterij vitis varijs. 1. 9. 10. 11. A tumore vertebrae lumbacibus affixo. 2. A pancreate suppurato vasa majora premente. 3. 8. Ob uterum sanguine repleto. 4. Ob Pancreas putrefactum, mesenterium ad originem scirrho induratum. 6. A pancreate tumido & vitato. 7. p. 577.

Obs. 43. Illi finistri dolor excitans à Rene putrefacto. p. 578.

Obs. 44. Dolor circa regionem ossis sacri ob abscessum insignem juxta venae caevae bifurcationem. Ibid.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Lumborum Dolori &c.

Obs. 1. Lumbi dextri totiusque cruris dolor ab ingentibus calculis in mesenterio & hepate inclusis. Tom. 2. p. 578.

Obs. 2. Lumborum dolor à vermibus in renibus genitis. p. 579.

Obs. 3. Nephriticus dolor cum phthisi à Renibus & calculis obsessis. Ibid.

## SECTIO XXIII.

### De Hypogastrii dolore.

Obs. 1. Hypogastrii dolor à calculo vesicae 32. unciam ponderis. 1. A calculo 34. unciam. 2. A lapide unciam duarum & dragmatis unius. 3. A lapide uncias civilis ponderis decem pendente. 4. A lapide ovi asinarii magnitudinem aequante. 5. 7. Octo unciarum. 6. A Calculo oblongo. 8. A grandi diti occulto. 9. A grandi lapide catus portio per lithotomiameducta. 10. A calculo aculeato formae mirandae. 11. Tom. 2. p. 579.

Obs. 2. Hypogastrii dolor à tribus calculis vesicae conclusis uno magno, reliquis minoribus. 1. A novem lapidibus avellanae magnitudine, aequalibus. 2. A duodecim lapidibus ovi columbini magnitudine. 3. A decem magnitudinis ejusdem. 4. A tribus magnitudinis nucis integre, levibus. 5. A quinquaginta calculis avellanae magnitudine. 6. A tribus lapidibus medio locis magnitudinis. 7. A multitudine calculorum prope collum vesicae ejus membranae impleto. 8. A grandi lapide, alio collo adhaerente, Maxime in media vesica. 8. p. 581.

Obs. 3. Hypogastrii dolor ob Calculos è renibus in vesicam deciduos. p. 582.

Obs. 4. Hypogastrii dolor à calculis vesicae inclusis in duos loculos discretis. 1. A calculis membranaceis inclusis. 2. 3. A lapide humore multo, crasso investito. 4. A calculo vesicae adnato. 5. A Calculo in vesica contracta & complicata. 6. A lapide cervici vesicae affixo. 7. A calculo cum ipsa vesica in serosum illapso. 8. A calculo in vesica exulcerato. 9. A grandi calculo in vesica filicis duritiei. 10. Ab ulcere gangrenoso vesicae indurto à calculo aspero. 11. 12. lapis per lithotomiam feliciter ex ulcerata vesicae colloeductus. 13. A Calculo maximo glandem plumbeam inclusam habente. 14. 15. Ab apostemate in fine intestini concitato ob haerentem inibi calculum. 16. p. 584.

Obs. 5. Hypogastrii dolor ob vesicam Calculum continentem cum uteri insigni obstructione. p. 585.

Obs. 6. Hypogastrii dolor ob vesicam calculum cum exulceratione vesicae & sine uteri motu. 1. A Calculo grandi cum vesicae laceratione. 2. A vesicae inflammatione & gangrena. 3. A pure inclusio inter uterumque tunicam vesicae interius foraminibus perforata. 4. A scirrho totam vesicam implente. v. Ibid.

Obs. 7. Hypogastrii dolor à calculis latentibus in vesicae sinibus & cuniculis. 1. 4. A calculo levi magno obducto catheteris attritum elidente. 2. 3. Calculus vesicae magnus nullis signis se prodens. 5. 6. 7. p. 587.

Obs. 8. Calculos in vesica citra arenarum motum contineri autopsia comprobatur. p. 592.

APPENDIX, Glutinosum aliquid ad Calculi generationem requirit ostenditur phaenomeno. p. 593.

Obs. 9. Arenosas urinas Calculi in vesica signum proprium.

primum non esse comprobatur anæsthesia lithiæ laborantium.

Tom. 1. Ibid.

**Oss. 10.** Hypogastrii dolor à variis affectibus partium ipsius ventris funditus. A sacco vesicæ urinariæ adnato 1. A calculo in vesicâ solidis & plandis sub membrana fœoris coactis 2. Ab intestini Coli ulcere & vermibus inclinis 3. Ab intestinis crassis stercore duro repletis 4. 6. Ob colon in ea regione parte fixatum 5. A parte intestini caeco propinqua contracta 7. Ab Epiloi ad venicam devoluti apothemate A liene illuc devoluti 9. 10.

p. 5. 4.

**Oss. 11.** Hypogastrii dolor ab ulcere cancroso colli matricis 1. A collectione matricis humoralis & carner intra membranas uteri 2. A complicatione uteri 3. Ab uteri gangrena 4. Ab uteri incremento cum gangrena v. Ab oide in utero tumore 6. A lapidibus utero inclinis 7. 8. 9. 10. 11. 12. A quatuor tuberculis circa os uteri 13. Ab hydropis uterino 14. Ab utero sanguine repleto 15. Ab ejus constipatione 16. Ob cancerum 17. Ob metum à mola putrefactum 8. Ob molem lapideam membrana inclinatam 19. Ob uterum ulceratum 19. Ob vomitum in testibus mulieribus 20. Ob vasa spermatica & testes tumidam muliere 21. Ob disruptionem testiculî femineî dextrî, vasorum ejaculatorum & dextrî uteri cortin à fœtu ibi genito 22. A fœtu extra uterum in abdomine repleto 23. Ob fœtum in utero corruptum 24. Ob uterum ulceratum scirrhosum Ejus vaginam à diuturno fluore muliebri erofam 25.

p. 595.

**APPENDIX.** Hypogastrii dolor Partium sequens varias agnoscit causas.

p. 600.

**Oss. 12.** Inguinum tumor & dolor ab utero cum fœtu eo devoluti 1. Ab ulcerato utero 2. A calculo in renibus 3. 4. In ureteribus 5. A Testiculis ibi reconditis 6.

p. 605.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Hypogastrii dolore.

**Oss. 1.** Hypogastrii dolor & gravitas cum tumore ab immenso uteri infarcti tumore.

Tom. 1. p. 604.

**Oss. 2.** Circa umbilicum dolor & hypogastrum vermibus adscriptis ab humoris biliosi ventriculo atque intestino incumbens copia horumque inflammatione. Et datus cholagogi Intusceptione.

Ibid.

**Oss. 3.** Lapidis vesicæ extractio folio per apertionem ad latus vesicæ in mortuis primum ostensa.

p. 603.

## SECTIO XXIV.

### De Urinæ Suppressione.

**Oss. 1.** Ichuria à copia sabuli in emulgentibus in ipso Renum corpore & in capite ureterum 1. A plurimis Calculis renis & ureteris admodum distendentibus 2. Ab uretere sinistro obstructo à Calculo impado deficiente rene dextro 3. Ob ureterum infra calculis occlusa 4. 5. 6. 7. Ichuria quæ dysuria à calculo duplici in uno uretere 8. Ab obstructo utroque uretere à calculo. Rene sinistro inflammatione 9. Ob utrumque renem à calculo in ureteris ostiolum illapso obstructum Renem oppositum putrefactum 11. Ab obstructis ureteribus à viscidis humoribus 12. Ob obstructum ureterem dextrum à tumore sanguinis 14. Ob ureterem unum ressectum alterum calculo obstructum 15. Ob ureteres obstructos à gypse materia 16. Ob Emulgentes &

ureteres crassa pituita obstructos 17. A calculis renis & ureteris initium occupantibus 18. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. A materia calculeosa in renibus calculo sinistro reali inserto 20. A Rene dextro calculoso, ureteribus, arena repletis 31. Ob ureterem dextrum calculo obstructum cum duobus intestinis in evertitate Renis sinistri.

Tom. 2. p. 605.

**Oss. 2.** Ichuria ob effluxum Urinæ à Renibus à calculo perforatis 1. Ob calculum ureteris sinistri initio impadum 2. Ob Renem dextrum atrophis contractum sinistram calculo obstructum in pelvi cum arenulis & duobus calculis in sinibus 3. A calculo circa pelvim Renis sinistri cum aliis minoribus & lapillis in vesica 4. A calculi substantiam & cavitatem Renem occupantibus 5. 6. A vicio Renum tabidarum tuberculosorum calculis obstructorum 7. A Rene utroque sabulo repleto 8. A calculo Renum pelvis impadum cum arenulis 9. A Rene sinistro calculis in cavitate & mestibus obstructo Dextro corrupto 10. Ab uno sabulo oppleto ureteris initio à calculo obstructo Rene altero consumpto 11. Ob arennas in Renibus cum magnis lapidibus in cystis felleis 12. Ob utrumque renem calculo obstructum.

p. 613.

**Oss. 3.** De rata urina suppressione ob Renem sinistram sero & arenulis distentum, dextro Rene incolunt.

p. 617.

**Oss. 4.** Ichuria ob Renem inflammationem hinc gangrenam 1. 2. 3. Ob molem nimiam 4. Ob Renem macilentum, corpus durum inter alterum & ureterem interjectum 5. Ob serosum in iis abscessum 6. Ob eodem mucro oppletos 7. Ob Renem semiputridum 8. Ob Sinistram consumptam, dextram obstructam 9. Ob Renes induratos viscidâ materia repletos post hydratyrosin 10.

p. 619.

**Oss. 5.** Ichuria ab emulgentium venarum Renumque actione attractrice abolita.

p. 621.

**Oss. 6.** Ichuria ob renem sinistram maximam parte resectum, ureterem ejusdem pituita & arenulis infarctum, Renem dextrum cum uretere, lapillis obstructum, vesicâ succientem 2. Ob Renem dextrum circa pelvim incrustatum gypse materia. Emulgentem venam compressâ, ureterem sinistram obstructâ 3. Ob Renes obstructos sabulosos, vesicâ substantiâ densitate, gangrene initis affectæ cum pure crassa inclusis 3. Ob Renis sinistri pelvim dilatantem cum calculis duobus in vesica 4. Ob Renum calculum insignem cum vesicæ urinariæ absentia 5. Ob ureteres & vesicam excrementis repleta 6. Ob angustiam ureterum circa insertionem in vesicam eorumque obstructionem à mæco 7. Ob locum in ureteribus subsistens quâ vesicâ calculis repleta 8. Ob lapidem Renis impadum post vesicæ lithotomiam 9.

p. 622.

**APPENDIX.** 1. Ichuria ab erosionem vasorum urinariam post unum acidularum curam.

p. 625.

**APPENDIX.** 2. Ichuria venæ sectione sanata ab obstructione vasorum Emulgentium sanguine distentorum.

p. 626.

**Oss. 8.** Ichuria à Calculis in vesicâ proprium seculum sibi efformantibus ejus cervicæ obiectum.

Ibid.

**Oss. 9.** Calculus vesicæ in medio pervius circa signa & symptomata gestans.

p. 627.

**Oss. 10.** Ichuria ob compressum & callosum collum vesicæ, hujusque cum strictissimâ involutionem 1. Ob inflammationem & necros collî vesicæ 2. Ob compressum collum vesicæ ob hernia singulari 3. Ob Tumorum ostio vesicæ obiectum 4. Ob scirrhum collum vesicæ occupantem cum sequuta inflammatione 5. Ob carnem ex fundo vesicæ enatam u. e. rham subeuntem 6. Ob inflammationem urinariæ meatus 7. Ob scirrhum ostio vesicæ obiectum 8.

Ibid.

Oss.

Obs. 11. Iſchuria ob plures Calculos in veſica ſitantes, Ex tres ejus tunice affixos 1. A lapide in veſica unciarum 18. 2. ob lapidem 32. unciarum 3. A grandi lapide veſicę offio obſecto 4. 5. ob lapidem ſilicis duritię, ponderis unciarum ſex & diſſidat 6. A lapide mediocri collum veſicę obturante 7.

Tom. 2. p. 519.

Obs. 12. Iſchuria à topico in fiſtula urinaria p. 630.

Obs. 13. Iſchuria caſum ſequuta hinc vulnus inſigne veſicę 1. ob carunculas in veſica ſubſiſtentes in quas reſoluta Renis ſubſtantia 2. A calloſa appendicula veſicę offio adnata 3. ob veſicę nimiam diſtentionem ab urina copia 4. A nimis dilatata veſica & inſtumentata 5. 6. A debilitate ſubſtantie ejusdem 7. Ab ejus abſceſſu & gangrena 9. Ab ejus partiæ antice ſummo madore cum multo phlegmate in fundo & caruncula in ſphinctere meatum obturante 10.

p. 631.

Obs. 14. Iſchuria à caribus ſpongiſis juxta veſicę oriſciū internum adnatis. p. 634.

APPENDIX, Obſervatio vulgatis quę conſtat non modo ſtabiliante calculo, ſed etiam in urina ſuppreſſione aut diſſcultate graviore: ſuperatis leviſſimis auxiliis ſecaſi tuto veſicam. Ibid.

Obs. 15. Iſchuria ob lapidem urethre impactum p. 636.

Obs. 16. Iſchuria à pauputio foraminis glandis ſanato. Ibid.

Obs. 17. Iſchuria, Dyſuria, ſtranguria veſiculis à corpore veſicę in ſubſtantiam calloſam converſo cum duobus corporibus inglandis magnitudine ille adnatis. Ibid.

Obs. 18. Iſchuria ob tuberculum ciſtihoſum inter collum veſicę & inteſtinum rectum 1. In puero ob penem abdomini connatum & pituitę copiam in veſica 2. ob mucum in veſica & ureteribus 3. ob compreſſum veſicę oriſcium à calculo 4. in corpore glanduloſo genitum 4. ob corpus glanduloſum tumidum 5. ob Proſtatas pure tumentes & ulceratas 6. ob ſtenoma prope veſicam 7.

p. 637.

Obs. 19. Iſchuria ob callum collo veſicę ſubſiſtens Meatus urinarios ſtatibus diſtensos 1. ob abſceſſum inter Renes & veſicam 2. ob colon ſiniſtro tenſi obligatum. Inteſtini recti plenitudinem 3. ob rectum inteſtinum ſtatibus & fecibus turgidum 4. ob coli inſignem plenitudinem & inteſtinorum phlegmonem 5. urinae paucitas ob tumorem circa meſenterii exortum 6. Iſchuria ob ptolaſium meſenterii & inteſtinorum in ſeroriam 7. ob tumorem inter alium & vulvam 8. ob inflammationem gibe partiſ hepatis 9. ob lapidem in uteri cavitate veſicam prementem 10. ob corpus calloſum ureti vices ſupplens 11. ob ventriculum perſortatum.

pag. 638.

Obs. 20. Iſchuria à cauſa abdita circa quam quædam curioſa & neceſſaria. p. 639.

APPENDIX, Iſchuria à ſcybalis duris inteſtinum rectum implentibus & collum veſicę premenſibus. p. 640.

APPENDIX, Iſchuria ab uretro cum aliſ ſuis melancholico ſanguine ingente excitata. Ibid.

APPENDIX, Iſchuria diſſicilem parium aliquando ſequitur. p. 641.

Obs. 21. Urinae paucitas ſero cimento thoracem replente. Ibid.

## SECTION XXV.

*De Frina difficultate, ardore &c.*

Obs. 1. **M**ictio diſſicilis ob ulcus in collo veſicę 1. ob carnem ad collum veſicę concretam 2. ob abſceſſum in collo veſicę 3. ob carunculas meatum urinarium occupantes 4. Stranguria ab uſure veſicę inducitur 5. A proſtatis pure tumentibus ulceratis 6. Ibid.

APPENDIX, Stranguria ab ulcere veſicę inducitur. pag. 642.

Obs. 2. Micturio frequens ob natiyam veſicę anguſtiam 1. Mictio tota vita diſſicilis ob veſicam urinariam deficientem 2. ob ſcirthum corpori veſicę adheſcentem 3. ob veſicę diſſolutionem 4. Stranguria ob calloſam veſicam puſtulis purulentis obſitam. Dyſuria ob carnem molem in veſica. Tumorem juxta ejus collum, calloſitatem veſicę 6.

p. 643.

Obs. 3. Mictio diſſicilis ob adnatam urethę hyperarchoſin, Proſtatarum tumorem à veſicę corpus contrahum & varie leſum, ejus cavitatem ſordibus plenam, Renem dextrum purulentum &c. Hiſtoria veſicę monſtroſe Magni Caſanboni deſcriptę ab Excell. Th. de Mayenne Brotaio aſſcriptę.

p. 644.

Obs. 4. Mictio doſorifica à calculo grandi ſubinde in cervicem veſicę proſubente. p. 647.

Obs. 5. Mictio dolorifica putris pituitę à calculo ſcirtham veſicam opplente, & appendice curvę ejus cervicem obſtante. p. 648.

Obs. 6. Stranguria, Dyſuria alięque acciſſentia à veſicę calculo oculo. Ibid.

Obs. 7. Mictio dolorifica ob Calculum oculum. p. 649.

Obs. 8. Mictio frequens ob calculos veſicę membranis incluſos 1. Diſſicilis ob lapides quatuor in veſica 2. Stranguria ob calculum 3. xv. in veſica 3. ob tres calculos incluſos cum oſſis pubis fragmento 4. ob calculi totam veſicam adimplentem 5. ob calculos ſeptem 6. ob calculum magnum in cavitate minore in ipſius veſicę ſubſtantia 7. ob duos Calculos mucro & puri inſeratos cum ipſius veſicę conſumptione 8. ob calculos veſicę adnatos cum viceribus & cellis 9. ob lapidem ſolidiſſimum ponderis ſeptem unciarum 10. ob 12. calculos in veſica & Renem ſiniſtrum purulentum 11. ob calculum coriſtorem veſicę affixum unciarum quinque & ſemis 12. ob calculum in veſica latentem pſimile involutum & propria quaſi veſicę obſtaculum 13. ob calculos peculiari ſacculo incluſos 14. ob calculos veſicę arcte circumdatos 15. ob quinque calculos 16. ob lapidem ſeptem unciarum à renibus in veſicam devolutum 18. ob quatuor lapides in veſica cum abſceſſu juxta os ſacrum 19. ob leſas veſicę tunicas à calculo 20. A duobus lapidibus aculeatis cum veſicę offentione 21. p. 650.

Obs. 9. Mictio diſſicilis ob calculos renem & veſicę 1. ob renes ulceratos calculoſos, veſicam putridam 2. ob renes exiles, veſicam patram 3. ob Renem pſimilem & lapidem in veſica 4. ob plures lapillos in renibus, Grandem pſimile obſitum in veſica 5. ob abſceſſum in rene dextro, vitium ſiniſtri, veſicam mucro repleta 6. ob ſenis dextri apoſtema, veſicę inflammationem 7. ob calculos renes & uretes obſtinentes, phlegma & calculos in veſica 8. p. 66.

Obs.

- Obs. 9. 10. Mictio dolo rifica & intercepta à Renē uno calculis obfesso lapide membrana involuta ureteris ostio affixo, Renē altero incolumi. Tom. 2. p. 657.
- Obs. 11. Mictio difficilis ob adtes humores vitio hepatis genitus 1. ob aneurisma arterie vasis nigralis subiacentis 2. ob mēfenterii fistigie incrementum 3. ob scirrhum in lēo intestino 4. ob ulcus intestini ceterad collum usque vesicæ extensum 3. p. 659.
- Obs. 12. Urinæ ardor & micturitiō frequens ob humorem visulentum in vthacæ & corlis sinu fixato inclusum 1. ob coarctationem p. n. pericardii cum diaphragmate 2. Ibid.
- Obs. 13. Stranguria ob duos calculos in emulgentibus prope Rēnes flaccidos 1. Dysuria ob calculum vesicæ & ureterum 2. ob calculum ureteris infixo obiectum 3. ob calculos in ureteribus & Renibus 4. ob Renum & ureterū corruptionem 5. ob Renum materiam purulentam continentem 6. Calculos in utroque Renē 7. ob vitium Rēnum nigralantium 8. ob Rēnes parulētos, carciinoma vesicæ 9. p. 660.
- Obs. 14. Urinæ difficultas sequuta Thoracis hydropem & concretum in corde lapidem. Ibid.

- Obs. 19. Vesicæ tunicarum crassities nimia non semper obest urine excretioni. Ibid.
- Obs. 20. Dysuria lethalis ob vesicæ ulcus. Ibid.
- Obs. 21. Stranguria, Dysuria à Renē sinistro parulenti, 10. vesicæ calculo & stentomate illius collo exteriori adnato. p. 672.
- Obs. 22. Stranguria, Dysuria ob venas cervicis vesicæ sanguine distentas. vscicolasque ideo redditas. pag. 673.
- Obs. 23. Mictionis difficultas ob calculum membranæ involutum in Renē sinistro ureteris ostium præcludente & materia tartarea ductus renales infarciēte. pag. 674.

## SECTIO XXVI.

### De Diabete seu urina Profluvia.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Urina difficultate, ardo- re &c.

- Obs. 1. Ichuria cum nephriticis doloribus à calculo immenso & occulto vesicæ. Tom. 1. p. 661.
- Obs. 2. Ichuria ob obstructio uno uretere in sui principio à lapillis phlegmate infiscaris, altero à calculo prope insertionem in vesicam. Ibid.
- Obs. 3. Ichuria ob membranas vesicæ crasso humore unctique rugidas, sinistram tamen inflammatam &c. pag. 662.
- Obs. 4. Ichuria vera à supore vesicæ, phlegmone, distheli & Parastatarum magnitudine extraordinaria. pag. 664.
- Obs. 5. Ichuria vera ab affectu intestini recti. pag. 665.
- Obs. 6. Ichuria à quatuor calculis in vesicâ renaria uno in renē dextro. p. 665.
- Obs. 7. Ichuria ob vesicam nimis tumidam lotio exteriori parte fere gangrenosam. Ibid.
- Obs. 8. Ichuria triadanam sequuta vesicæ urinariæ disrupcio. p. 666.
- Obs. 9. Ichuria ob ostium Renis sinistri glandulis obstru doris &c. Absentia Renis dextri & partium famelantium. Ibid.
- Obs. 10. Ichuria 33. dierum ob calculum ureterem Renis dextri obturantem cum hydropē, urina paulo ante obitatu viam sibi faciente. p. 667.
- Obs. 11. Ichuria in Bove ob vesicam urinariam disrupcionem. p. 668.
- Obs. 12. Ichuria lethalis ob Renem dextrum præternaturalem formam adeptum, corruptum, scirrhotico inieptum, sinistram tumidam cum vitio vasorum emulgentium & ureterum. Ibid.
- Obs. 13. Ichuria nullo vitio neque in Renibus neque in vesicâ exillente oborta. p. 669.
- Obs. 14. Ichuria 10. die lethalis ob lapillum tæneum ureteri dilacerato impactum. Ibid.
- Obs. 15. Ichuria à calculo ureterem dextrum occupante. p. 670.
- Obs. 16. Ichuria à scirrho vesicæ. Ibid.
- Obs. 17. Ichuria icidē aliā à Prostatarum scirrhotitate. Ibid.
- Obs. 18. Dysuria in qua vesicâ sphincter callosus. p. 671.

- Obs. 1. Diabete extincti Rēnes flaccidi & decolorati inventi. Tom. 2. p. 675.
- Obs. 2. Diabete à vitio Renis sinistri magnæ molis, lapide obfessi exigui, dextri minimi & fere consumpti. p. 676.
- Obs. 3. Diabete à calculis occultis in Renibus & Palmonum Erysipellate. p. 677.
- Obs. 4. Diabete vitio vesicæ tumore & parastatis affectu excitatus. Ibid.
- Obs. 5. Diabete à Renē uno lapide obfesso & in ureteris initium implantato altero minore reddito & collapsio. Ibid.
- APPENDIX, De viis per quas Potus nequaquam immutatus in Diabete legitimo excernitur. pag. 678.

## SECTIO XXVII.

### De Urina Incontinentia & per locum indecentem Excretionē.

- Obs. 1. Urinæ per anum effluxus ob vesicæ carcinoma rectum intestinum penetrans 1. ob sphincterem vesicæ callo occultum 2. ob ulcus vesicæ ad rectum intestinum pertingens 3. Exitus per fissuram (perie deficiente & veli 2) in quam ureteres inferebantur 4. Per anum ob obstructos renes à calculis & uras in mēfenterium transitum 5. Tom. 2. p. 678.
- Obs. 2. Mictio involuntaria ob spinalem medullam leuotectam 1. ob relaxationem nervorum ossis sacri 2. ob Renem sinistram calculo exiguo obfessum, Dextrum in magnitudine excedentem 3. ob Renem sinistram calculis obfessum cum parvo in vesicâ 4. ob vesicæ inflammationem, colli ejusdem dilatationem & muscutorum resolutionem 5. ob vesicæ duriciem, sphincteris extenuationem, Parastatarum vitium 6. ob ampliationem unius ureterum, vitiosam alterius in vesicam scirrhoticam &c. insertionem &c. 7. ob sphincterem vesicæ relaxatum, madorem spinalem medullæ 8. ob corporis vesicæ vitium livore se prædus 9. ob pus in collo vesicæ delitescens 10. ob lapillos in vesicâ 11. ob grandem lapidem collum vesicæ opplenentem, uretri insignem obstructionem 12. p. 679.



## ADDITAMENTA

*Ad Sectionem de Urina incontinentia & ejus Alienis viis.*

- Obs. I. **V**rina per scroti fistulam emissâ ob obturatum meum urinatum Tom. 2. pag. 687.

## SECTIO XXVIII.

*De Urinis non naturalibus.*

- Obs. I. **V**rinæ decolores tenues ob ventriculi vitium, Hepatis &c. 1. ob calculum insignem in vesica 2. Urina tenuissima aliquando cruenta ob vitium Renum 3. ob carunculam juxta sphincterem vesicæ 4. Tom. 2. p. 681.
- Obs. 2. Urina rubra & ignea ab inflammatione Jecoris in sphacelum abeunte 1. Ab inflammatione cum ulcere 2. 3. p. 682.
- Obs. 3. Urina rubra & fetens reddita ab hydropse pectoris in sinistro latere, sinistri scro referti. p. 683.
- Obs. 4. Urine rubicundæ scorbutorum pendente à secretionibus bilis impedita ob vitium jecoris vel cystis fellæ. p. 684.
- Obs. 5. Urina rubicunda ab hepate ad sphacelum vergente. p. 685.
- Obs. 6. Urina viridis reddita ob viscera atrophica bile infecta cum abscessu in Jecoris cavo. p. 686.
- Obs. 7. Urina aramenti testæ nigra & crassa, salutariter sepe excreta à liene ea via ab humore melancholesco exonerante. Ibid.
- Obs. 8. In cadavere virili dissecto urinas turbidas rubras fundente ideoque calculoso judicato ventriculi, Epatis, lienis, vesiculæ fellis, cordis &c. vitium repertum salvis renibus. p. 687.
- Obs. 9. Urina cruenta à Rene arenulis referro 1. A Renibus ulceratis per asperos lapides 2. A ruptis Renum vasibus 3. A maximis in Renibus calculis 4. p. 688.
- Obs. 10. Urinarum lactearum mictus ob Renum ulcus à Calculo inducitur. p. 689.
- Obs. 11. Cruentorum urinarum, Puris, Arenarum crassiorum mictio citra vitium Renum à collo vesicæ leviter affecto. p. 690.
- Obs. 12. Puris & sanguinis mictio à corde abscessibus & calculis oborto 1. Ab ulcusculo in Rene cum calculo 2. A Rene abscessu affecto hinc consumpto 3. Cicatrix Rene indurata post ejusmodi mictionem 4. Membranæ cum pure & sanguine emittæ à Rene sinistro 5. Puris & sanguinis à Rene altero consumpto 6. Ibid.
- Obs. 13. Urina purulenta remixto aliquando sanguine, à corde duobus calculis obfesso cum multis parvis abscessibus prodians. p. 691.
- Obs. 14. Urina turbida cum hypostasi lactea ab abscessu renis sinistri &c. p. 692.
- Obs. 15. Urina viscida & crassa materia referta ob ulcus & inflammationem colli vesicæ. Ibid.
- Obs. 16. Urina crassa & viscida à renibus lapideis 1. Turbata à corruptione gangrenosa renis 2. Hypostasis alba à Renis abscessu 3. Mucus tenax à singulari vesicæ vitio 4. Mictio puris pituitæ à vesicæ Calculo affecta 5. Turbida cum crassa hypostasi ab abscessu in apice gibbæ hepatis parvis 7. p. 693.
- Obs. 18. Subfidentia matris crassæ, viscidæ & rariscentis à vesicæ calculo occulto & alio in Rene dex-

- tro. Tom. 2. p. 694.
- Obs. 18. Mucosa substantia cum urina diu excreta. Ibid.
- APPENDIX, Materia mucosa, renascissima diu à Sene incolanti excreta citra calculi præfidentia. p. 695.

- Obs. 19. Mucosa pituita urinae permixta, diu reddita ab illis qui calculo vesicæ laborant, excrementum est illius male affectæ alimentum proprium vite non conficiens. Ibid.
- Obs. 20. Urina alba purulenta ob 12. in vesicæ calculos 1. ob vesicæ ulcus, 2. ob ulcus colli vesicæ 3. ob calculos vesicæ ulceratæ, callosæ adnatas 4. A Rene sinistro parte referto 5. ob lapidem in ore vasorum utinastorum 6. Ab abscessu mesenterii 7. A Calculis renes atrentibus 8. A vesicæ & renibus ulceratis 9. A Renibus suppuratis 10. Ibid.
- Obs. 21. Urinæ mucosæ & purulentæ à lapide in vesicæ & renibus purulentis 1. Mucosæ à rene iocis consumpto, calculo in vesicæ, 2. p. 697.
- Obs. 22. Mucosum urinae excrementum citra Renum aut vesicæ ulcus. Ibid.
- Obs. 23. Urina purulenta, passæ, cum sedimento crassiore nigro, in muliere cui Glandula Renalis arenosa reperta est. p. 698.
- Obs. 24. Urina purulenta Empyemati thoracis succedanea. Ibid.
- Obs. 25. Foliaceæ sedimenta à vesicæ ulcere deducta. pag. 699.
- Obs. 26. Corpora cruenta lata, per urinam excreta, à Renis dexteri interiori substantia densa. Ibid.
- Obs. 27. Mictio arenularum rubrarum prodeuntem à vasibus quæ ab hepate ad renes tendunt. p. 700.
- Obs. 28. Arenularum mictio à renibus excretarum in pelvi & prope carunculas juxta lapidem concretarum 1. A renibus calculosis 2. p. 701.
- Obs. 29. Urinæ varix à vitio vesicæ urinariæ Calculis in rene dextro. Ibid.
- Obs. 30. Membrana crassa & lata cum lotio à muliere excreta, pars tunice interioris. Ibid.
- Obs. 31. Cibos assumptos per urinam reddens quidam cui exulcerata vesica. Ibid.
- Obs. 32. Caruncularum & sanguinis cum urina excretio, à fungo in suppuratum abeunte vesicæ nascato 1. A renis substantia in eas resoluta 2. p. 704.

## ADDITAMENTA

*Ad Sectionem de Urinis non naturalibus.*

- Obs. 1. **A** Renulæ robore in utris occurrunt ducunt à vitio Glandularum conglobatarum. Tom. 2. Ibid.
- Obs. 2. Arenularum, pituitæ, purulentæque materie diuturna excretio à Rene sinistro eo deturbata in vesicam quæ dura, callosa crassaque reperta est, calculos duos renales continens cum absentia naturali Renis dextri. Ibid.
- Obs. 3. Cruenta & purulenta mictio ob arenulas per renichyma Renis dextri abradentes, vesicam ex gangrena perforatam &c. p. 705.
- Obs. 4. Purulenta mictio à reneum suppuratione excitata. Ibid.
- Obs. 5. Calculorum plurimorum emissio è sacculo membranaceo illis repleto in vesicam transcurrentem per singularem canalum. pag. 704.

**TOMUS TERTIUS**  
**ANATOMIÆ PRACTICÆ**

**LIBER III.**  
**SECTIO XXIX.**

*De Herniis.*

- Oss. 1.** **H**ernie rupturam Peritonæi raro sequuntur, frequentissime expansionem. T. III. pag. 3.
- Oss. 2.** Vera hernia non fit sine peritonæi rupturâ, Imperfecta per solam relaxationem fieri potest. 4.
- Oss. 3.** Hernia à rupturâ Peritonæi. Ibid.
- Oss. 4.** Enterocèle à dilatazione sola processus peritonæi citra rupturam dependens. p. 5.
- Oss. 5.** Vasa feminalia Peritonæo obvolvi ex sectione anatomica Hernioformis patet. Ibid.
- Oss. 6.** Mulieres herniis esse obnoxias ostendit diffectio virginis c. n. à relaxato Peritonæo Inguinalis accidit. Ibid.
- Oss. 7.** Herniæ opè subligaculi solius curantur, natura huius materia adiposa offuscante. p. 6.
- Oss. 8.** Extraordinariæ herniarum species per Anatomem deprehensæ. Ibid.
- Oss. 9.** Bubonocèle à descensu Coli in inguen. 1. A descensu Ceci cum utriusque testiculæ hydrocèle. 3. Ab intestinis inter cutem & musculos cohibitis. 4. Ab omentis & intestini prolapsu insequuta inflammatione & gangrena. 5. p. 7.
- Oss. 10.** Obberniam castrari plerique inireunt, vi illius peritonæi processui, nervo sexti paris & vasis spermaticis. p. 8.
- Oss. 11.** Enteropiplocele ob sequentem gangrenam. 1. Ob Ileii & Epiploii cum aqua & flaribus. 2. Ob Epiploon maximam partem devolutum. 3. Ob inflammationem Epiploii & intestinorum. Ibid.
- Oss. 12.** Hernia à prolapsu partis mesarii & intestinorum in scrotum cum putredine. 1. 2. p. 10.
- Oss. 13.** Hernia vicennalis solo pondere molesta, ex decubitu Ileii & Epiploii in scrotum. Ibid.
- Oss. 14.** Enterocèle nativa. 1. Incurabilis ob substratum seroso adipem & ileum vaginali tunica affixum. 2. Ob prolapsum Ileii interi cum dilatazione externæ tunicæ vaginæ, internæ superiore. 3. 4. 5. Ibid.
- Oss. 15.** Epiplocele lethalis ob corruptionem omenti, Testis & vicinarum partium. 1. A maxima Omenti parte in seroto. 2. Epiplocele ab omenti in Testis feminaliumque vasorum tunicarum descensu. 3. p. 12.
- Oss. 16.** Hernia triplex lethalis ob putrefactionem intestinorum in seroto incipientem. p. 13.
- Oss. 17.** Hernia ex Aquosa, Varicosa & Carnea constata. Ibid.
- Oss. 18.** Herniosi calculosa vesica unam scroti partem implebat, Intestina tennia alteram. Ibid.
- Oss. 19.** Hernia à descensu Ileii in serotum subsequente illico affectu, irreversibilis ob excrescentiam circa mentum enatam. Ibid.
- Oss. 20.** Hernia à vasa deferente in serotum delapsa. p. 15.
- Oss. 21.** Hydrocèle ab aquæ copia inter Testem & tunicam Elitroidem. 1. Ab aqua Testiculam replente. 2. Ab aqua inter Elitroidem & Nervæam tunicam. 3. Scroti apertio in hydrocèle inutilis ob corruptum testiculum è directo. 4. Ibid.

*Index Anat. Boner.*

- Oss. 22.** Sarcocèle fit sæpius à Tumore innato quam adnato. 1. Vesiculæ intra membranam testiculi. 2. Falx à particula stenomatice tumoris ex abdomine in scrotum delapsa. 3. Curatio sarcocèles Chirurgica. 4. Tom. III. p. 16.
- Oss. 23.** Epiploon aliquando in scrotum procumbit. Aliquando in umbilicum procidit unde Emphalocèle. 7. p. 17.
- Oss. 24.** Tumor seu Hernia Umbilicalis lethalis ob Jecoris lobum alterum extra Peritonæum prolapsum eidem adnatum. Ibid.
- Oss. 25.** Omphalocèle ab ortu contracta. Ibid.

**ADDITAMENTA**

*Ad Sectionem de Herniis.*

- Oss. 1.** **B**ubonocèle lethalis ob Ileii intestini Peritonæi processui adhaesum abscessum in inguine sinistro genicum &c. p. 18.
- Oss. 2.** Ab omento in scrotum proci duo Enterocelen induci posse ostendit Anatomia. Ibid.
- Oss. 3.** Abscessus in inguine ab hernia suppurata cum erosione intestini purisque ac excrementorum foetidissimorum rejectione. Ibid.
- Oss. 4.** Hernia in qua intestini Ileii portio ad inguina delabens intus & extris glandulosis excrescentiis referta reperiata est; hepatis purulentum &c. p. 19.

**SECTIO XXX.**

*De Testiculorum Dole.*

- Oss. 1.** **D**olor Testiculi sinistri à latente hydrocèle ortus, & vitio Renis sinistri. T. III. pag. 19.
- Oss. 2.** Testis dolor cum Tumore ab Ulcere in peritonæo hinc puris in illum derivatione. p. 20.
- Oss. 3.** Testis dolor ob compressionem factam ab infimis masculis abdominalis ad quos compulsi. 21.
- Oss. 4.** Testis dolor à copia seminis contenti. Ibid.
- Oss. 5.** Testis dolor ob vesiculas sanguine plenas intra membranam illius contentas. Ibid.

**SECTIO XXXI.**

*De Gonorrhæa.*

- Oss. 1.** **G**onorrhæa diuturna laborantis glandosum corpus semine repletum inventum est cum Testibus eodem refertis. Tom. III. p. 23.
- Oss. 2.** Gonorrhæa affectu cadaver vasa semen deferentia in penem maxime dilata exhibuit. p. 24.
- Oss. 3.** Gonorrhæa excitata ab Ulceribus orificii vesicæ vicinarumque partium. Ibid.
- APPEND. I.** Seminis emissio citior ob ulcus Recti interstiti. Ibid.
- APPEND. II.** Seminis emissio ab injectis calidioribus Clysteribus. p. 25.
- APPEND. III.** Gonorrhæa ab abscessu frigido Renum producta. Ibid.
- Oss. 4.** Gonorrhæa diutius durans à vasis spermaticis ad testes usque vitium transfundit, vesicam & ureteres. p. 26.
- Oss. 5.** Glandulosum corpus (Prostata) Gonorrhææ virulente sedes est, ut variis exemplis hæc allatis patet. Ibid.

G g g

Oss

- OBS. 6. Gonorrhœa mulieris Glanduloso corpore affecto excitatur. Tom. III. pag. 28.  
 OBS. 7. Gonorrhœa muliebris à Vomica in uno Teste genita. Ibid.  
 APPEND. De Gonorrhœa & Bubonum venereorum ortu. Et de usu ligamenti uteri vermiformi dicto. Ibid.  
 APPEND. altera. De Gonorrhœa causis & differentiis. p. 29.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Gonorrhœa.

- OBS. 1. **D**E Gonorrhœa pertinaci in qua observatio unica de corruptione omnium interiorum viscerum cum veneni exhiberi suspicione adparuit. p. 29.

## SECTIO XXXII.

## De Uteri Procidencia, Descensu &amp;c.

- OBS. 1. **U**teri Procidenciam possibilem esse ostendat dissectio cadaveris muliebris in cuius uteri prolapsu vagina cereus glodulus deprehensus est. Tom. III. p. 30.  
 OBS. 2. Uteri procidencia vera in cadaveris apertione deprehensa. Ibid.  
 OBS. 3. Uteri Procidencia imperfecta. p. 31.  
 OBS. 4. Uteri Procidencia mola credita, lethalis. Ibid.  
 OBS. 5. Uteri Procidencia & ectomia, cui deficienti callosum corpus substituit natura. p. 32.  
 OBS. 6. Uteri procidencis effectio lethalis ob simul sectam Coli intestini partem in illum delapsam. Ibid.  
 OBS. 7. Excresecencia fungosa uterum prolapsum mentiens. p. 33.  
 OBS. 8. Sarcoma totam uteri vaginam occupans forasque propendens uteri procidenciam falso exhibens. p. 35.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Uteri Procidencia &amp;c.

- OBS. 1. **H**istocia uteri procidencis ex virgine resecti. p. 35.  
 OBS. 2. De Excresecencia Uteri nleerosa cum sphacelo lethalis. p. 36.  
 OBS. 3. Excresecencia carnea uterina. Ibid.  
 OBS. 4. Corpus mylloides post partum masculinum ex utero propendens cum subitaneo puerperæ interitu. Aperturæ cadaverum nitilias. p. 37.  
 OBS. 5. Uteri & Vesicæ urinarie Procidencia. p. 39.  
 APPEND. Mulieres hydropicæ uteri procidencie læpe obnoxie. p. 40.  
 OBS. 6. De Procidencia uteri falsa circa quæ varia curiosa. Ibid.  
 OBS. 7. De Vera totius uteri procidencia. p. 45.  
 OBS. 8. Uteri Procidencia falsa. Ibid.  
 APPEND. De Utero morbo consumpto. p. 46.

## SECTIO XXXIII.

## De Hystericiis affectibus, Suffocatione &amp;c.

- OBS. 1. **U**teri ascensum qui suffocationem Hystericam dictam pariat impossibilem esse Anatome ostendit. p. 47.  
 OBS. 2. Hysterici affectus convulsivi in muliere cui

menstrua suppressa.

Tom. III. p. 48.

- OBS. 3. In muliere à suffocatione metina extinctus repertus sanguis cordis ventriculis coagulatus. Ibid.

- OBS. 4. Hysterici affectus immanes à semine retento. 1. Ob Testes & vasa spermatica semine, per moram glyptam duritiem adepto, resecto. 2. Ob Testes atheromate & steatomate distentos. 3. Ob humorem æruginosum, croceni in Testibus cum alterutris incremento. 4. Ob Testiculum dextrum parè, pilis &c. resectum cum tumore magno. 5. Ob croceum & scitidum hamorem in Testiculis inclusum. 6. Ob Testiculum sinistrum tumidum, nigricantem, gangrenæ proximum. 7. Ob vesiculas atro humore plenas juxta Testes. 8. Ob Testes seroso humore turgentibus & Tubam Uteri dilatantem. 9. Ob semen in Tubis uteri corruptum. 10. A semine corrupto in Testibus utero & vasibus spermaticis. 11. Ibid.

- OBS. 5. Affectus hysterici credidi, utero in fonte orti à Mesenterij membranis ab invicem divisiss. p. 51.

- OBS. 6. Affectus hysterici judicati orti à sero acri nervorum initis in occipite afficiente, utero incolumi. p. 55.

- OBS. 7. Passio hysterica credita, orta à Pancreatis vitio. Ibid.

- OBS. 8. Suffocationis Uterinæ causa in Pancreatē non semper querenda. Ibid.

- OBS. 9. Affectus hysterici admitandi à causis occultis excitari quod nihil virij in utero sit deprehensum circa quæ varia scitu necessaria. Ibid.

## SECTIO XXXIV.

## De Salacitate, Venere Languida, Impedita, Facunditate, Sterilitate in utroque sexu.

- OBS. 1. **S**alacitas & *Onchomania* in viro à peculiaribus vasorum seminalium conformatione. 1. Salacitas cuiusdam Testiculis destituta. 2. Salacissimus in utroque rene binos ureteres habuit in dextro tres emulgentes, Ambas spermaticas ab emulgentibus productas. 3. Seni salaci & fecundo unica arteria spermatica, vesicæ spermaticæ bifidæ ad initium. 4. Salacitas ab insigni renum magnitudine in viro. 5. In muliere. 6. Mulier salax arteriam spermaticam dextram bifidam habuit. 7. Vir salacissimus tribus venis seminalibus dextris donatus fuit, unica arteria. 8. Alius duplici arteria spermatica dextra. Tom. III. pag. 61.  
 OBS. 2. Venus extincta in viro cui Rencæ admodum parvi & flaccidi. 1. Ob vasorum semen generantium vel deferentium defectum suumve præpositum. 2. A venere abstinentis tota vita Testes & vasa spermatica contraxerunt. 3. p. 64.  
 OBS. 3. Examina fertilis cui arterie spermaticæ deerant. p. 65.  
 OBS. 4. Sterilitas muliebris ob multiplex uteri vitium. 1. Ob Uterum immenso tumorem & scirrhosum. 2. Ob ejus parvitatem & duritiem cartilagineam. 3. Ob uterum compressum à duricie insigni Omentis. 4. Ob carnositatem exiguum intra caulem vix cervicis. 5. Ob uteri defectum, vasorum spermaticorum & Testium. 6. Ob obstructum uteri collum à carnea excresecencia. 7. Ob obstructions tumores &c. Tubarum uteri. 8. Ob callum in utero enarum. 9. Ob carneum tuberculum in collo interiore. 10. Ob uterum spongiosum & mollem ejus cervicem oscam. 11. Ob scirrhum circa osificum fundi uteri. 12. 13. Ob steatomâ uteri fundo partu externa adnatum. Et cavitatem pinguedine densa

denſa obſtita. 14. Ob tumorem uteri materiam ſebo ſimilem continentem. 15. Ob concretionem carnoſam in fundo. 16. Ob uterum exiguum utriculū illi adnatum. 17. Tom. III. p. 64.

Obs. 5. Sterilitas in Juvene ob malam conformationem vaſorum ſpermaticorum & teſticulorum retractionem. 1. In viro ob deficientes arterias ſpermaticas. 2. Ob vaſa ſpermatica utrinque ex emulgentibus oriunda. 3. Ob lapidem mearum qui à proſtatis in urethram tendit, occudentem. 4. In viro cui hepar ſedem Lienis & viciniſſim obnoſcat citra vitium partium generationis. 5. pag. 67.

Obs. 6. Excretio ſeminis læſa in viro ob lapidem glandoſo corpori innatum. 1. Concupitus impeditus ob coalitum cervicis uteri. 2. Ob magnum lapidem in collo veſicæ; Uteri vaginum concreto humore reſertam. 3. Ob duas fiſtulas in collo matricis. 4. Ob Narram ab uteri libio pendulam feliciter ſectam. 5. In ſermina ob nimium coitum mortua ligamenta uteri reſectia ſemine repleta obſervata. 6. p. 68.

### ADDITAMENTA

#### Ad Sectionem de Salacitate &c.

Obs. 1. **C**onceptio impedita ob internum uteri collum humore craſſo obſtructum. p. 69.

Obs. 2. Sterilitas ob uterum contractum & parvum. Ibid.

Obs. 3. Seminis ejaculatio impedita ab incurveſactione glandularum. Ibid.

### SECTIO XXXV.

#### De Menſtruo Fluxu, Suppreſſo, Imminuto, Inordinato.

Obs. 1. **M**enſtra per collum potius quam per corpus uteri ferri oſtendit Anatome Tom. III. p. 70.

Obs. 2. Anatome virginis nunquam menſtrualis cuius uteris natura clauſus repertus, ſanguis in vaſis omnino puris. p. 71.

Obs. 3. Menſtruum fluxum non à ſola ſanguinis in utero congeſtione ſed à toto pendere oſtendit Anatome. p. 72.

Obs. 4. Menſium ſuppreſſio ob Hymenem & uteri occudentem. 1. Ob coalitū cervicis Uteri. 2. p. 77.

APPEND. De Menſtruum ſuppreſſionis cauſa. Ibid.

Obs. 5. In Juvenca ex ſuppreſſione primorum menſtruum mortua vena ab Utero ad mammas tendens & venæ ad uterum tendentes ſanguine diſtenta & nigre repertæ uterique quali gangreñoſus &c. cum ejus collo diſtorto. p. 78.

Obs. 6. Menſes ſuppreſſi aut diminuti ob Polypos uteri aut cordis vaſa opplentes. p. 79.

Obs. 7. Menſium ſuppreſſio ob vitium hepatis, meſenterij, uteri multi plex. 1. Ob uterum mola carnea repletum. 2. Ob inſignem lapidem in utero. 3. Ob vitium Uteri, Meſenterij. 4. Ob ventriculū aqua plenum ſuperiori uteri parti adnatum. 5. Ob vaſa ſpermatica denſa, obſtructa. 6. Ob Teſtes tumidos, viriatis. 7. Ob hydropem cornuum Uteri. 8. Ob vitium ſiniſtri ligamenti uteri. 9. Ob Uterum exulceratum. 10. Ibid.

Obs. 8. Menſtruum ſuppreſſio ob meſenterium ſteatomatis reſertum &c. p. 80.

Obs. 9. Menſtra inordinata ob Tumorem vulvæ tunicis adnatum. 1. Ob vitium hepatis, Uteri ſcirrhoſi, venæ umbilicalis plenitudinem. 2. Ibid.

Index Anat. Boneti.

### SECTIO XXXVI.

#### De Fluore Muliebri & Excretis p. m. ab Fiero, Mola.

Obs. 1. **F**luor uterinus ob uterum exulceratum, Glandulas lumbares & Utero vicinas humore purulento plenas, Teſticulos viciatos. 1. Ob glandulas totius induratas, flavum humorem craſſum continentes, Hydatides in Tubarum extremitate. 2. Ab utero purulento. 3. Ab utero ulcerato cum inſigni veſicæ dilatatione. 4. In utero fluori obnoxiarum humor limpidiſſimus repertus. 5. Fluor diutius perſeſſerans gangrænam tandem aut uteri corruptionem inducit. 6. 7. 8. To. III. pag. 87.

Obs. 2. Carunculae ab Utero excretæ ob illius cancroſum ulcus. 1. Partes ſætes molliores excretæ pro ſanie uteri habitæ. 2. Globuli lymphæ gelatiſſima ab utero iis reſerto ejeſti. 3. Effluxus ſaniei ob membranas uteri putreſcitas. 4. Fœtus involuta cum utero putreſcitas excreta. 5. p. 88.

Obs. 3. Mola ex membrana grumum ſanguinis continente conſiſtens ab utero ejeſta. 1. Mola tota ſoliſa. 2. Mola parenchyma Lienis interius reſerens. Ibid.

### SECTIO XXXVII.

#### De Graviditate falſa, Conceptione Tubaria, Gemellorum origine, Hermaphroditis, Virginitatis notis.

Obs. 1. **M**ola ingeſſis graviditatem mentiens. 1. Uterus ulceratus carnem ſpongioſam & putridam continens. 2. Mola duæ extra matricem. 3. Membrana ſubſtancia roſcunda, bullis reſerta, utero incluſa. 4. Mola pulmentaria. 5. Mola duæ in utero conceptæ. 6. Tom. III. p. 89.

Obs. 2. Graviditatis opinio ob Uterum magnum humore repletum cum ſero multo in abdomine. 1. Ob hydropem uterinum. 2. Ob plures calculos in utero. 4. Ob diſtentum, durum, maſſam carneam continentem. 5. Ob uterum extenſum. 6. Ob excreſcentiam in Uteri fundo. 6. Ob ſteatoma illi innatum. 8. Ob inſignem molem unius teſticuli. 9. p. 92.

Obs. 3. Graviditatem ementita ſteatomata meſenterio innata. 1. Ejus inſignis tumor. 2. Veſiculæ crebrae peritonæo incumbentes. 3. Mater a viſcoſa in abdomine. 4. Aqua purulenta. 5. Ingens copia ſeroſi ſanguinis. 6. Ren maximus nictus. 7. Hepat ingentiſſis molis. 8. Magnitudo inſignis Jecoris & Lienis. 9. Inſignis ventriculi tumor. 10. Ejus hydrops. 11. Veſiculæ inſignitæ viſcera imi ventris obſidentia. 12. Hepatis Empyema abdominis tumorem efficiens cum Lienis inſeſtiorumque ſtarulento tumore motum fixus exprimente. 13. Vide plura tit. de Ventris Tumore, Sectione XXI. p. 93.

Obs. 4. In Mulieris quæ Gemellos pepererat teſticulis & extra eos ova reperta ſunt. p. 95.

APPEND. I. De Hominis Conceptione ex Ovario, & Gemellorum generatione. Ibid.

APPEND. II. Superſtationis extraordinariæ hiſtoria, fœtus in utero corrupto & clam lateat ſuperveniens. p. 99.

Obs. 5. Hermaphroditorum aliquot anatome. p. 101.

- Obs. 6. Pudendi orificij angustia pro virginittis nota haberi non debet. p.199.  
 Obs. 7. Hymen virginittis non membrana in aliquibus reperta in alijs non. p.102.

## SECTIO XXXVIII.

## De Abortu, Partu impedito, Fetu mortuo, Puerperia.

- Obs. 1. **A** Bortus frequens excitatus ob calculum in Rene dextro. 1. Ob vaginam uterim monstruosam conformationis. 2. Abortus gemellorum ob vitiosum alterius fetus conformationem & matris. 3. Quinto mense factus ob foetum suffocatum a tumore asperæ illius arteriæ inhaerente. 4. Ob exiguitatem & tenuitatem vasorum umbilicalium. 5. 6. Ob eorundem brevitatem. 7. 8. Ob eorum excedentem longitudinem fetum strangulantes. 9. Ob eadem disrupsa. 10. Ob foetum ægrum Tumorem in jecore &c. 11. Ob Placentam in utero relictam. 12. Ob spasmodicos affectus a sero acqi à medulla spinali effluentem excitatos utero partibusque vicinis & annexis plane insensibile. 13. Ob foetum injuriæ matri illaræ notis gerentem. 14. Tom. III. pag. 102.
- Obs. 2. Partus difficilis ob corpus uteri, scirrhum concretum & vitiosum fetus situm. 1. Ob scirrhum & perforationem uteri. 2. Ob abscessum. 3. Ob Tumorem durum cum ulcere & uteri disrupsione. 4. Ob orificium arcte clausum, compressum à recto intestino fecibus oppleto. 5. Ob uteri crassitiem extraordinariam. 6. Ob omenti crassitiem. 7. p. 103.
- Obs. 3. Partus impeditus ob ossis Pectinis malam conformationem quam uteri disrupsio sequuta. 1. In Partus difficultate uterus lacrarus impediens scirrho uteri fetus exclusionem. 2. 10. Fetus extra uterum disrupsam repertus. 3. 4. Impeditus ob adharum uteri orificio sarcoma. 5. Ob uteri orificium caput fetus constringens, hydropem abdominis in matre. 6. Ob apophysis non naturalem in materna ossium pubis facie aut Iliis. 7. 8. Uterus disrupsus prope cervicem in cuius foramen fetus brachium intruserat. 9. Partus impeditus ob angustiam oris matricis huiusque lacerationem. 11. Ob vitiosam coecygis & pelvis conformationem. 12. p. 107.
- Obs. 4. Partus impeditus ob foetum mortuum putrefactum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ob foetum extra uterum conceptum. 8. p. 110.
- Obs. 5. In mulieris decima à partu hora mortuae cadavere uterus Hepar & Pulmones in vitiis deprehensa. p. 114.
- Obs. 6. Partus ad 16. mensem prorogatus ob vitiosam capitis fetus conformationem & illi accretum tumorem. Ibid.
- Obs. 7. Partus impeditus ob foetum in utero incurvatum. 1. Ob foetum transversum situm. 2. Ob vitiosum situm, uteri disrupsionem, vasorum umbilicalium convolutionem. 3. Ob foetum magnitudinem situmque transversum. 4. Ibid.
- Obs. 8. Ossa pubis & coxendicis in partu distrahuntur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ibid.
- Obs. 9. Os uteri in graviditate arctissimè clausum repertum. 1. 2. Uteri status à Partu secundo die. 2. 3. 6. De crassitie uteri in Graviditate. 4. Uteri status sexta post partum hebdomada. 5. Uteri constitutio in Graviditate à Partu. 7. Uterus hypogastrio adstrictus post matris partum. 8. p. 119.

- Obs. 10. Secundinarum retentio ob arctam cum utero adhesionem. 1. 2. 3. Ob eandem cohesionem carne cum utero adnatam. 4. Tom. III. p. 121.
- Obs. 11. Lochiorum retentio ob rupta uteri ligamenta. p. 122.
- Obs. 12. In muliere à nimio fluxu extincta uterus valde contractus vaginaque valde ampla reperitur. Ab uteri ruptura nimis fluxor. Ibid.
- Obs. 13. Tortura partum sequuta ob uterum grumis plenum, flatus in ventre inferiore cum Jecoris & Renis dextri vitia. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Abortu partu impedito &amp;c.

- Obs. 1. **P** artus difficilis lethalis ob vasa umbilicalia foetum constringentia & in utero cohibentia. Tom. III. p. 122.
- Obs. 2. Partus impeditus ob insignem fetus magnitudinem, uteri expansionem extraordinariam ob peritonæi divulsionem Hemiae uterinae anam præbentem. 123.
- Obs. 3. Abortus excitatus à renibus calculosis & purulentis. p. 124.
- Obs. 4. Partus impeditus ob uterum in latum hypogastri devolutum patulaginosum redditum ab inflatione intestinorum. Ibid.
- Obs. 5. Partus impeditus ob putrefactum uterum, foetu in abdomine sito. p. 125.
- Obs. 6. Partus difficultas ob fetus gemellos in utero mortuos. Ibid.
- Obs. 7. Partus impeditus ob solutionem conceptus in uteri parte exteriori & inferiore. Ibid.
- Obs. 8. Partus impeditus ob scirrhum in regione umbilicali entum. p. 126.
- Obs. 9. Partus impeditus propter caput infans in inter ossa pubis & ipsum uteri orificium profundius impactum. Ibid.

ANATOMIÆ PRACTICÆ

## ANATOMIÆ PRACTICÆ

## LIBER IV. &amp; ULTIMUS.

## De Febris, Affectibus, Externis, Artuum &amp;c.

## SECTIO I.

## De Febris.

- Obs. 1. **F** ebris excitata à sanguine vasa meningum replente & distendente cum earum tumore phlegmonode. 1. A tenui meninge leviter inflammata, sinu tertio sanguine repleto, superficie ventriculorum cerebri exulcerata. 2. A venis cerebri sanguine distensis. 3. Ab inflammatione meningum post vulnus capitis sero & pure inter utramque concluso. 4. A phlegmone intra calvariam excitata. 6. Ab abscessu sub calvaria. 7. Ob cerebrum Cancro affectum. 8. Ob pars supra membranas. 9. Ob duræ meningis phlegmonem. 10. Ob ulcus in cerebro. 11. Ob abscessum in cerebro. 12. Tom. III. pag. 127.
- Obs. 2. Febris ab abscessu in corde desinente in ulcus. 1. A concretionem purulenta in ventriculo. 2. A polyis in sinibus cordis &c. 3. Mucosa purulenta in corde &c. 4. p. 130.

- Obs. 3.** Feb<sup>r</sup>s pulmonum inflammationis comes, 1. A pulmone dextro inflammato & tabescente, 2. Scirrhosus ab inflammatione, 3. Pulmonibus rectoridis & parulis cum hydropneumothorace dextri, 4. Ab Empyemate universalis pulmonum, 5. A Pulmonum parte fere tabida, pure in thorace, 6. Ob lapides plurimos lateribus asperis arteriarum incumbentes, 7. Ob Pulmonis substantiam pure refertam & ferum Mediastinum replens, 8. Ob Pulmones purulentos, corruptos, Intestinatorum phlegmonem & aliarum partium vitium, 9. Ab apostemate & hydropneumothorace, 10. Ab omnibus pulmonum vasibus sanguine plenis, 11. A pulmonis dextri purulencia, 12. Tom. III. pag. 131.
- Obs. 4.** Feb<sup>r</sup>s ob affectum Oesophagi ad os ventriculi ulque, 1. Ob apostema in ventriculo, 2. Ob ventricularem inflammationem hinc perforatam, 3. Ob Ileum intestini inflammationem, 4. Ob abscessum Mesenterij, 5. p. 133.
- Obs. 5.** Feb<sup>r</sup>s ab hepatis inflammatione, 1. Ab ejus vomica, 2. Ab ejus tuberculis & abscissibus, 3. A lapidibus in vesica fellea, 4. 5. A bile multa in cysti, 6. A jecoris incendio, 7. p. 134.
- Obs. 6.** Feb<sup>r</sup>s ob Renes lapidibus obfessos, 1. 2. 3. Ob eorum inflammationem, hinc consumptionem, 4. Ob inflammationem eorum figuram depravantem, 5. Ob scirrhosum corruptelam cum scirrho pancreatis, 6. Ob eorum corruptionem cum lapide in cysti, 7. Ob vesicæ urinariæ inflammationem, 8. Ob inflammationem ejus colli, 9. Ibid.
- Obs. 7.** Feb<sup>r</sup>s a collo Martiis cancroso & ulcerato, 1. A secundinarum putredine, 2. A corruptione uteri, fortis, secundina, 3. p. 134.
- Obs. 8.** Feb<sup>r</sup>s ab abscessu intra musculos abdominis & peritonæum post conquassatum corpus, 1. pertransiente rhoda, 2. p. 135.
- Obs. 9.** Feb<sup>r</sup>s ictum lateri inflicto sequuta, 1. A corruptione facta in subditiis partibus, 2. Ibid.
- Obs. 10.** In mulieris apoplectica cum febre morientis cadavere vix uncie quatuor sanguinis residui reperta sunt, 1. Ibid.
- APPEND.** Feb<sup>r</sup>s brachij dextri particularis Quotidiana, 1. Ibid.
- Obs. 11.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica Phlegmonarum Internarum fere comes est, 1. p. 136.
- Obs. 12.** Hæctica marasmodi affecti cor ex toto exsiccum, 1. Materia crassa sinistro ventriculo impacta reperta, 2. Cor flaccidum aqua pericardij multa, pulmones vitati, cordi accreti, 3. Auricula sinistra ulcerata, 4. Tumor duriculus in pericardio, 5. Cor durum, minus Pericardium laxè ambiens, vasa cordis ampla, Pulmonum vitium, 6. In hæcticorum pericardio & ventriculis cerebri ut plurimum aqua exasperat, 7. p. 136.
- Obs. 13.** Feb<sup>r</sup>s lenta a pulmonibus aridis cretacea materia ubique obfusa, 1. A pulmone sinistro & thorace plane purulenti, 2. Ab humore lutulento intra pulmones coeluso, 3. A pulmonibus intrinsecus & extra purulentis, corruptis, 4. Ab hisdem putredine fere absumptis vasibus cordi adfisis, 5. A pulmone vesicis semipleno aquam flavam continens, 6. A pulmonibus putridis ulceratis costis adherentibus, 7. A Pulmonibus lateribus per piruitum viscidum annexis, 8. Hæctica a pulmone plane putrefacto, 9. a pulmone dextro admodum tumido cum materia purulenta in bronchijs, 10. A pulmone in unicum vomitum converso, 11. Ab alia superiore & inferiori dextri Empyemate infecta, vomica in superiore &c. 12. Ob pulmones superna parte ad-
- herentes semiputridos &c. 13. Ab ingenti scirrho in dextro lobo, 14. A thoracis capacitate sanguine putrido plena, pure in pericardio, cordis superficie erosa, 15. A vitio pulmonum, Ex defluxione acris a capite, 16. Tom. III. pag. 138.
- Obs. 14.** Feb<sup>r</sup>s Tabifica a vomitis in mediastino, sterno, pure in abdomine, 1. A puris copia intra thoracem post abscessum lateris, 2. Ab aqua cruenta thoracem replente, 3. Ab hydropneumothorace, 4. a pure ex pleuræ abscessu in diaphragma decubente, 5. a vomica purulenta in sinistro pulmone & sinistra pleura &c. 6. p. 140.
- Obs. 15.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica vitio pulmonum induta, diaphragmatis & plerarumque partium naturalium, 1. A vario pulmonum vitio mesenterico scirrhoso, Compressione aortæ & cavæ, 2. A Pulmone & Jecoris vitio, 4. A Pulmone sinistro, purulento, Glandulis mesenterij & adfisis portæ truncis tumidis feto in utroque ventre, 5. A Pulmonum inflammatione, mesenterico scirrhoso, ventriculi corrosione, 6. Ab abscessu in pulmonibus & juxta hepate, 7. A Pulmone vitio & partibus spirabilibus in angustiam coactis ab hepatis & ventriculi mole, 8. A Pulmone vitio, Lienis, Vesicæ & Intestinatorum inflammatione, 9. Ab abscessu putrido in pulmone cum scirrhosis, mesenterij tumoribus scirrhosis &c. 10. A Pulmone dextro inflammato, Gangræna in fundo ventriculi, colo, 11. A Pulmone toto parti, Liene, thorace fere pleno, 12. A multiplici partium thoracicarum vitio, 13. p. 142.
- Obs. 16.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica a glandulis pylori accumulatis tumidis cumque prementibus, 1. A Glandulis lymphaticis magnis, mesenterij vitio &c. 2. A vitio ventriculi materia vitiosa referti, 3. A corruptione crassorum intestinatorum &c. 4. A distentione & corruptela ventriculi, 5. p. 144.
- Obs. 17.** Feb<sup>r</sup>s Lenta extincta Omentum corruptum repertum est, Ren dexter gangræna affectus, Hepar grande & durum ac tuberculosum, Intestina & Mesenterium male affecta &c. Ibid.
- Obs. 18.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica putridæ junctæ cujus focus in venis mesentericis atro sanguine tumens, Lienis putrido, sanguine nigro oblito, vesicula fellea atra b le referta &c. p. 145.
- Obs. 19.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica ab insigni mesenterij abscessu genita, 1. A Mesenterio nigri varicibus obfuso, Pancreate obstruito, 2. Ab inflammatione Epiplois mesenterio communicata, 3. A mesenterio steatomatis referto, 5. A mesenterio calculoso, 6. A callo inter venas mesentericas, 7. A sanguine concreto in vasis mesentericis tumidis, 8. A mesenterij glandulis materia argillacea infarctis, 9. A vitio Pancreatis tumidi, Jecori annexi, 10. p. 146.
- Obs. 20.** Feb<sup>r</sup>s Hæctica Lenta a corruptione hepatis, 1. Ab ejus putrilagine, 2. Ab ejus ingenti abscessu, 3. Ab ejus parenchymate in pus converso, 4. a graveolente pure sub ejus lobo minimo, 5. Ab ejus duritie & vitio cystis fellea, 6. Ab eo putri & renum vitio, 7. A Liene post casum indurato, 8. p. 149.
- Obs. 21.** Feb<sup>r</sup>s lenta symptomatica a Renis dextri putredine, 1. A Rene dextro purulento, 2. Ab utroque in pus converso, 3. a sinistro toto absumpto cum vomitis, 4. Ab utroque purulento cum carcinomate juxta vesicam, 5. a veribus in utroque, 6. Ab ureteribus a calculo obstructis, 7. A Rene putrilaginem continente, 8. p. 150.

- Obs. 12.** Lenti febricula ab ulceribus vesicæ inducitur. 1. Aggulo in vesica citra signa. 2. Tom. III. pag. 151.
- Obs. 13.** Febris Hæctica ab uteri corruptione: 1. Ab ejus affectu in gangrænam desinente. 2. 152.
- Obs. 14.** Febricula alidua in quodam cui corfole dux lumborum vertebæ repetitur sunt. 1. A glandulis in toto corpore dispersis. Ibid.
- Obs. 15.** Intermittentium febrium causa deducta ab obstructione partiali ductum pancreatis laterali. Ibid.
- Obs. 16.** Febris Tertiaria in senile lethalia ob vitium pituitosum, mesenterij & pancreatis. p. 156.
- Obs. 17.** Febris Tertiaria vitio Jecoris tumidi, retortendi nec non Lienis inducitur. 1. Ab hepatis immangi tumore. 2. Ab eodem scirrhoso & glandulis mesenterij tumidis. 3. A bile æruginosa citra ejus cava collecta. 4. A bile sincera intra ejus membranas collecta. 5. A Jecore duro; exangui, ventriculi tunica exterior erosa. 6. Ab obstructa cyliti & meatibus per Jecoris substantiam decurrentibus. p. 158.
- Obs. 18.** Febris Tertiaria naturam referentes à serositate biliosa in carnibus putrescente orta. p. 160.
- Obs. 19.** Eorum quæ in paroxysmi Febris Tertiariae initio extinctæ fuerunt, cor & pulmones sanguine aggravata reperta sunt. p. 161.
- Appendix.** Febris duplex Tertiaria Epileptica dicta à symptomate Epileptico in singulis paroxysmis periodice recurrente. Ibid.
- Obs. 20.** Febris Quartana focum ut plurimum habet in Lienis atro sanguine turgente & adusto cujus parenchyma in substantiam pisci similem sæpe resolvitur. 1. A Lienis majori, putri & corrupto. 2. A Lienis non naturalis constitutione ac Portæ hujusque ramorum à glandulis vicinis tumidis compressione. 3. Quartana; cadaver exhibuit in corde & vasis frusta magna pituitosa. 4. Quartana affectus neglecto remedium usui lethalem musculorum abdominis abscessum incurrit. 5. Quartana à Jecore inflammato cum vitio Lienis Pancreatis, ventriculi, intestinorum. 6. Quartana ab hepate scirrhoso cui successit hydrops &c. 7. Inducta à vitio Jecoris & cylitis scilicet. 8. 162.
- Obs. 21.** Febris semitertiana ortum habet plerumque ab inflammatione mesenterij, omnes, intestinorum vicinarumque partium. 1. 2. 3. 4. Pestilens ab hepatis, pulmonum, imo cordis inflammatione, hinc sideratione. 5. Extinctæ mulieris hepatis effusum repetitur cum lapillis in cysti, Pulmone suppurato. 6. p. 166.
- Obs. 22.** Febris Erratica à Jecore orta in cuius sima vomica. 1. Vitio Lienis inducitur. 2. Vitio mesenterij glandulosi. 3. A mesenterio, glanduloso Pancreate scirrhoso, Pulmonum labe. 4. Ab obstructionibus vasorum. 8. 5. p. 169.
- Obs. 23.** Febris acuta ab intestinorum inflammatione, subsequente vicinarum partium putredine &c. 1. 2. p. 170.
- Obs. 24.** Febris Ardens ab inflammatione Meningum quam sequitur syderatio cerebri. 1. Ardens ab abscessu sub cranio; putredine meningum & particulæ cerebri. 2. Ardens ab abscessu in cerebri substantia, inflammatione meningum. 3. A sanguine pituitoso & seroso in vasis cerebri. 4. 5. p. 171.
- Obs. 25.** Febris Acuta à pericardij inflammatione. 1. Ardens à pericardij & pulmonum phlegmone suppurata. 2. Acuta ob feculentum humorem sinistram cordis sinum replentem & totum fere thoracem. 3. Acuta à mediastini tumore inflama-
- torio.** 4. Pericardium eorum quos Causis extrinsecis exanthum repertum, Cor marcidum. 5. 6. 7. Juvénis ab Ardente extincti cordis ventriculi sanguine flavescere illis affixo pleni reperti. 8. A cordis phlogosi & vasorum ejus tumore. 9. T. III. pag. 173.
- Obs. 26.** Febris Ardens à pulmonibus inflammationis qui nigri & corrupti reperti. 1. A pulmonum Erysipelate. 2. Acuta à pulmonum inflammatione in Sphacelum desinente. 3. Acuta Epidemica à suppurato sinistram pulmonem lobo, Et puris collectione infra diaphragma. 4. Acuta ab inflammato pulmonem lobo sinistram & hunc sinistram vicino. 5. A puris copia in thorace. 6. p. 174.
- Obs. 27.** Febris Ardens à Jecore retortido, in quo sanguis ater & corruptus. 1. A Jecore extremis partibus inflammato. 2. A Jecore maximo inflammato. 3. Febre acuta extincti jecur disruptum inventum est & combustum. 4. Ardens vulnus hepatis sequitur. 5. Ab hepate bile indigne suffuso flavissima &c. 6. A portione hepatis inflammata. 7. Ab immangi ejus tumore incus duri, retortido. 8. A bile acerrima è cysti emanante, adusto sanguine in corde &c. 9. A dextri Hepatis lobi & splenis inflammatione. 10. A Lienis phlogosi laborante. p. 177.
- Obs. 28.** Febris Ardens cum lumborum dolore ab inflammatione Renis sinistri in corruptionem abeantis. 1. 2. p. 178.
- Obs. 29.** Febris Ardens vitio pulmonum & renis dextri. 1. A pulmone vesicis oblitro, Hepatis tumore inflammatorio &c. 2. A Jecoris vesicæ Inflammatione, inflammatione Erysipelatoide. 3. A viscerum omnium putredine &c. 4. p. 180.
- Obs. 30.** In Vesica fellea eorum quas febris ardens aut diuturna rapuit sæpe lapides deprehensi. p. 180.
- Obs. 31.** Febris acuta ab inflammatione juxta musculos lumbares internos in abscessum desinente. p. 181.
- Obs. 32.** Grævida acutè febris infantem emittit cuius ossa vi æstus febrilis friabilia reddita sunt. Ibid.
- Obs. 33.** Febris Ardens à sanguine juxta vasa æstuantia citra labem interiorum viscerum. Ibid.
- Obs. 34.** Febris Continua, Tertiana à seroso humore in vasis cerebri accenso & totius. 1. à pure intra cranium & membranam subsistente. 2. à plenitudine vasorum tenuis meningis cum apostemate in proxima cerebri parte. 3. Ob partem cerebri cum membranis putrefactam. Ibid.
- Obs. 35.** Febris Continua focum in pulmonibus inflammationis habens. 1. Ab inflammatione pulmonum in abscessum desinente. 2. 8. Ab Erysipelate pulmonis. 3. 4. Ab inflammatione partis sinistram pulmonis postice in corruptionem desinente. 5. A pulmonibus timentibus ex parte doris, aqua fetida plenis. 6. Ab eorum inflammatione citra partes extremas, sanguine crassiori in eorum substantiam effuso. 7. à dextre partis cum pleura corruptione. 9. à tumentibus pulmonibus & abscessu tentatis. 10. Peripneumoniarum quorundam pulmones sanguine putrido turgidi, indurati. 11. Pulmones cum corde sanguine turgidi. 12. A pulmonibus syderatis, Aqua virosa in thorace. 13. Continua à pulmone & pleura uno latere corruptis. 14. Ab inflammatione pulmonibus & Jecore. 15. A sinistra parte inflammata. 16. Ab humore in eos influxu unde tumentes reperti. 17. Ob fluxionem è cerebro in pulmones unde peripneumonia mendosa. p. 183.
- Obs. 36.** Febris Lethargica à Pulmonibus putredine affectis. p. 194.

Obs. 47. Febbris affidua à pulmonibus putrescentia, datur cum vitio cordis, pericardij. 1. Ab aneurismate cæliacæ arteriæ obturata à putrida concretæ. 2. A massa pingui libera, in sinistro cordis sinu cum vomitibus pulmonis. In mulieris peripneumonice vena cava reperta substantia carnea è corde exorta. 4. Febbris affidua ab abscessu sub alâ sinistra & suppurazione septi transversî. 5. Tom. III. p. 196.

Obs. 48. Febbris continua à jecore inflammato & corde hinc marelido. 1. Ab abscessu in concava jecoris parte. Spigelii obitus. 2. Ab inflammatione extremi lobi jecoris dextri cum mesenterij parte colo diligata. 3. Ab insigni jecoris tumore. 4. A vitio in jecore cum lapillis in cysti. 5. Ab hepatis tumore cancroso. 6. Ab inflammatione lienis & hepatis communicata. 7. A liene inflammato, Fernelij obitus. 8. A phlegmone hepatis partim suppurato partim in scirrhum desinente. 9. A Tuberculis & furunculis id obsidentibus. 10. p. 198.

Obs. 49. Febbris Continua à corruptione gangrenosa in parte renis interna. 1. Ob Apostema in fine ureteris. 2. Ab abscessu in sinistro renis parte exteriori. 3. Ab inflammatione Testiculorum & meatu uriparii. 4. p. 104.

Obs. 50. In quodam Febre duplici Tertiana continua extinctio vermium in ventriculo & intestinis quantitas ingens deprehensa. p. 102.

Obs. 51. Febbris Continua à Mesenterio pure refferto. 1. Ab ejusdem abscessu. 2. Ab ejus tumore & abscessibus. 3. Ab ejus & coli inflammatione in abscessum desinente. 4. Ibid.

Obs. 52. Febbris Continua à pulmonum putredine, Renis dextri, Duodeni, omenti, Colli vesicæ &c. Obitus Francisci primi Galliarum Regis. 1. A vitio hepatis putrescenti, coli nigrescenti, Epiploj putris. 2. Hepatis sphacelati, Pylori, Epiploj inflammatione & tenuum intestinorum. 3. A lobo hepatis inflammato, Pyloro, Pancreate, Mesenterio induratis, Pulmonibus putrescentis. 4. Ab humore putrido in capsula cordis, calculo citra valvulas dextri ventriculi cum vitij pulmonum hepatis, lienis. 5. A corruptione inducta Jecori, Lieni, Intestinis, venenò adscripta. 6. p. 103.

Obs. 53. Febres Continuae lethales exustis visceribus ob deuterarum potum. p. 105.

Obs. 54. Febre Continua extincti vasa omnia sanguine depleta reperta sunt. p. 106.

Obs. 55. Febbris Continua à nimia obestitate inducta. Ibid.

Obs. 56. Febbris Leipyria à pulmonum inflammatione, exsiccatione & tæbe se prodente. 1. Ab Erysipelate eorum. 2. Ab eorum inflammatione maculas relinquentem. 3. Typhodes ab inflammatione pulmonum in suppuratum abeunte. 4. Leipyria ab Erysipelate ventriculi. 5. Ab hepatis inflammatione in abscessum, ulcus & gangrenam desinente. 6. Ab inflammatione extremorum hepatis lorum nigredine se prodente Lieni, communicata cum insigni cystis fellæ magnitudine & repletionem. 7. Febbris Leipyria tertianaria ab uteri inflammatione corruptionem invehente cum pulmonis partis & Jecoris vitio. 7. Ibid.

Obs. 57. Pueri Febre Maligna affecti viscera vitalia & naturalia variè affecta fuere. 1. Mulieris ab eadem extinctæ pulmones putridi, hepar inflammatum à ventriculi tunica exteriori. 2. Leon intestinum ex parte gangrenosum. 1. Febreis malignæ ut plurimum ab inflammatione ventriculi & viscerum pender. 3. Maligna putrida & hæctica juncta à pulmonum vitio, jecoris, lienis. 4. In Puella à febre maligna mortua ventriculi

viscerum notatum, hepatis, cystis fellæ, intestini recti. 5. Febreis maligna in thorace sedem habens cujus cavitas aqua putrida, subnigra, plena, Pulmones unius lateris & plena corrupta. 6. Febreis maligna à multiplici viscerum naturalium & vitalium vitio. 7. Ab inflammatione, hinc necrosi eorundem omnium viscerum. 8. A veneno exhibitò viscerum prope omnium naturalium corruptionem inducente. 9. Febreis maligna ab inflammatione Renis sinistri, nigredine se prodente spinali medulla communicata. 10. In pluribus partibus quorundam à febre maligna extinctorum vermes deprehensi. 11. A febre maligna mortuus habuit omnia viscera nigricantia, sphacelata, ventriculorum putridum. 12. Alius ventriculorum plurimis pustulis confectum. 13. Alius in cysti fellæ calculos. 14. Febreis maligna ab inflammatione plerorumque viscerum. 15. A vitio ventriculi & jecoris post venenum assumptum. 16. Ab ardore febtili in malignis aliquando sanguis concrevit in venis. 17. 18. Aliquando fluidus permanet. 19. 20. Calculi in vesica fellis febre maligna laborante. 21. Ob ventriculorum dextrum extraneo corpore repletum, sinistrum ex parte. 22. A pulmonis & lienis Sphacelo quorum sola tunica superstes: Ubi industrij Picitoris industria cerebrum conformatio describitur. 23. Malignus morbus pustulis malignis infra mammillam sinistram se prodens ob labem jecoris maculis luteis confectis. Tom. III. pag. 112.

Obs. 58. Febreis Epidemica nervosa generi & thoracis partibus infesta. 1. Febreis Epidemica ab inflammatione pulmonum. 2. 3. Epidemica vermiculosa. 4. 5. 6. p. 124.

Obs. 59. Exanthematum pestilentium origo in partibus internis, imo quandoque in pericardio sedem habere ostendit Anatome. p. 118.

APPEND. De Exanthematum pestilentium, Bubonum & Carbunculorum generatione ex eodem. Ibid.

Obs. 60. Variolæ lethales ob adjunctam pulmonis inflammationem. 1. Variolæ & Morbilli eorum partibus internis bellum indixere. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. In hepate pueri à Morbillis extincti vermes reperti. 11. Morbillis retrocedentibus uteri sphacelus lethalis cito succedit. 12. Ossa quorundam à variolis extinctorum erosa fuere. 13. Hepatis gangrena successit. 13. p. 230.

Obs. 61. Variolarum nova species Rossalia dicta lethalis duobus infantibus ob supervenientem pulmonum inflammationem & abscessum. p. 237.

APPEND. De Variolarum malignitate.

Obs. 62. Plerumque à Febre pestilenti extinctorum interiora viscera à phlegmone syderata reperta sunt. 1. Pestis & febris pestilens ventriculorum præsertim adortur. 2. 3. 4. 5. Carbunculus pestilens in ventriculo. 6. 7. In quadam Pestilentia serpentes, lacertæ. 8. 9. In alia vermes in corde reperti. 11. Pestis bobus infesta quorum cystis fellis lapidea facta. 12. Bubones pestiferi vermibus scatentes. 13. Caro substrata in lethiferis ustulata. p. 239.

## ADDITAMENTA

### Ad Sessionem de Febribus.

Obs. I. Hædici Anatome cujus cor flaccidum exsiccum, pericardium aqua destitu-



- Obs. 2.** Quartanarij defuncti cor pallidum, flaccidum, sanguine destitutum repperit. Tom. III. pag. 241.
- Obs. 3.** Quartana febris lethalis à bile atra in cavitare ventriculi & ejus vetis occurrente. p. 241.
- Obs. 4.** Febris Hemorrhagica à scirrbo hepatis & exulceratis pulmonibus oritur. p. 243.
- Obs. 5.** A sanguinis missione febris extinctio non semper expectanda. Ibid.
- Obs. 6.** Tertiana febre decumbenti à crebriori venæ sectione vasa omnino exhausta fuere. Ibid.
- Obs. 7.** Diaria febre extincti cadaver exhibuit lienem maximum, totum epigastrij spacium occupantem. Ibid.
- Obs. 8.** Febres acutæ rarò sola putredinis ratione sunt lethales, sed ob adjunctum tumorem aut grave vitium internum. Ibid.
- Obs. 9.** Febris continua ab inflammatione sinistri pulmonis in putredinem abeunt & abscessu jecoris. p. 244.
- Obs. 10.** Febris Leipyria citra viscerum inflammationem à sola humorum malignitate ob Variolas suppressas. Ibid.
- Obs. 11.** In cadaveribus eorum qui febribus malignis extincti sunt coagulatio sanguinis non semper reperitur, sed inflammatio viscerum. p. 245.
- Obs. 12.** Febris maligna petechialis ob vitium Jecoris, vesicæ felleæ lapillis obstructæ, ventriculi materiam vitiosam in cavitare & venis continetis; Pulmonum sanguine melancholico, refertorum, Cordis flaccidi, livescens &c. Ibid.
- Obs. 13.** Febris Maligna ob vitium pulmonum inflammationem; Cordis pinguedine obruti. p. 247.
- Obs. 14.** Febris maligna in corde focus habens. p. 248.
- Obs. 15.** In Peste carbunculi extra emergentes, alios intra latentes supponunt, Exanthemata male affectos pulmones. p. 249.
- Obs. 16.** Malignæ febres ut plurimum à putredine fiunt. Ibid.
- Obs. 17.** Lues pestifera in Ovis & Juvenis ob vermes hepar depauperantes. Ibid.
- Obs. 18.** Apertio aliquot cadaverum febris malignæ Pisis anno 1661 grassante jugulatorum ex descriptione Clariss. Joh. Alph. Borelli ad Clariss. Matcellum Malpighium transmissa. p. 250.

## SECTIO II.

### De Tumoribus præter naturam.

- Obs. I.** **T**umor in capite propriam cerebri substantiam continens ab erosa utraque cranij tabula. 1. Tumor prope musculum temporalem à materia à cerebro per foramen in cranio ejecta. 2. Natus in principio vas sanguiferum ex cranio accipiens. 3. Natus varia materia. 4. Tumores capitis lympham variè consistentiæ continens. 6. Tom. III. pag. 256.
- Obs. 2.** Tumor seu sarcomati Oculo dextro subnato, resecto, aliud sub oculo sinistro successit, Ex fungosa & pituitosa substantia constans utrumque, atque à dura meningē ortum ducens. p. 259.
- Obs. 3.** Monstrosus Mentis tumor steatomatous cui ulcus cavum & profundum adjunctum. p. 261.
- Obs. 4.** Tumor Collo adnatus cum brachij intumescencia à copiosa pinguedine & sero inter musculos. 1. Tumor affixus asperæ arteriæ per totum collum radicibus diffusus. 2. Tumor circa laryngem in ductu salivali devio; 3. Infra meatum

- durus ab obitu evanescens. 4. Tom. III. p. 262.
- Obs. 5.** Brouchocele variæ materiæ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ibid.
- Obs. 6.** Strumæ suffocationem afferentes ad stomachum, pulmones, mesenterium diffuse. 1. 2. Strumarum insignium callum oblidendum Anatome. 3. Strumarum pertinacia à seminario sub axilla sinistra ortæ ab internis, Pancreatis &c. 5. Struma ingens, sub inferiore maxilla à Jecore infecto pendens. 6. Strumarum Anatome. 7. A faucibus ad os usque pubis exportectæ. 8. Strumæ per totum diffuse. 9. p. 263.
- Obs. 7.** Mammæ sinistræ Tumor in ulcere desinens lethalis ob insignem interiorum viscerum lesionem. 1. Mammæ Tumor scirrhus radicem habens scirrhus in costis venam ugricantem. 2. Mammæ Tumor cum exulceratione cujus glandulæ exulceratæ putrescentes cum vitio uteris; Mammæ Apostema ex lacte coagulato congestu habens pus inter glandulas & musculum pedoralem. 4. Mamma strumosa ob strumas in pancreate, mesenterio, jecore & testibus. 5. Mammæ Tumor pro cancro habitus substantiam habens durissimam, coagulata. 6. Mammæ Cancer excitatus à vitio viscerum tuberculis obstrictum. 7. p. 263.
- Obs. 8.** Tumor infra cartilaginem Ensisformem ab abscessibus juxta hepar. 1. Tumor juxta stomachum. Ob lobum hepatis illuc productum. 2. Ob lobum lienis. 3. Infra lienis regionem ob illum flexibus distentum. 4. Ob partem Ilei conglobatam. 5. In latere sinistro ob incrementum mesenterij. 6. Circa mactonatum cartilaginem ob excrecentiam in gibbo hepatis. 7. p. 270.
- Obs. 9.** Tumor & elevatio costarum ob tumorem intra pectoris cavitatem. 1. Bubo sub axilla sinistra à Jecoris abscessu ortus. 2. Tumor totius in pectus à causa abditi. 3. p. 272.
- Obs. 10.** Tumor in abdomine à duobus tumoribus cancris in hepate. 1. Plures tumores à tumoribus in mesenterio. 2. Tumor in fœtu ab intestinis extra situm. 4. Ad umbilicum à rupto peritonæo. 4. A scirrbo fundo uteri adnato. 5. Ab Omento conglobato. 6. A pure inter musculos transversos concluso. 7. Ab hepatis abscessu. 8. A parte lienis indurata. 9. A rene excrecente prope umbilicum se effertente. 10. Tumor circumscriptus circa umbilicum à prolapsu illuc hepate. 11. p. 272.
- Obs. 11.** Tumores in Hypogastrio vel interfemine à Renibus suppuratis interdum excitantur. 1. Tumor supra inguen à fœtu ibi concluso. 2. In sanguine à copia puris ibi collecti. 3. Hypogastrij à scirrbo in vesica. 4. A steatomate prope vesicam. 5. Inguinis apostema verminibus scatens. 6. Infra inguen ob putrem pulmonem à regione mali. 7. Circa pubem incipiens ad umbilicum extensus à materia purulenta inter duas tunicas mesenterij collecta. 8. p. 275.
- Obs. 12.** Tumor in dorso ad suppurationem deductus, pus ad thoracis cavitatem effudit in quo Empyema inducit. 1. Spine dorso tumor fluctuans salvis visceribus. 2. p. 276.
- Obs. 13.** Tumor in Lumbis à medulla spinali natus abortus. 1. Ab abscessu in rene vicino. 2. Tumor in lumbis varias propagines habens nervorum. 3. 4. Tumor à regione Ossis Sacri per ductum hepatis inferius. 5. Ibid.
- Obs. 14.** Mentulæ & Scroti monstrosus Tumor à materia subcandida, crassi glutinosa, uberi vaccino simili &c. generis. p. 278.

**Obs. 15.** Tumor Glandulosus sub Scapula sinistra à glandula non morboſa ſub cute concluſa 1. Struma 2. Humore ſuſſo ad peſtus & dorſum diſfuſa coſtis adherens 3. Tumor Humore innans ob ſubjectam oſſis cariem 4. Tumor in ſcapula ſiniſtra lapidem continens 5. Tuberculum circa Forculam à pulmonibus ortum ducens 6. Tom. 3. p. 179.

**APPENDIX, De Glandulis ſanis varias corporis partes occupantibus in Milite.** p. 280.

**Obs. 16.** Brachii totius tumor pellucidus à lymphæ concuſa 1. Manus tumens ob oſſiculum pollicis carioſum 2. Tumores Oedematofi circa articulos manuum ob corrupta oſſa 3. Paronychia male tractata digiti corruptionem & oſſis cariem inſtulit 4. Clavorum in pedibus pertinacia inde eſt quod in perloſio radicem habeant 5. Tumores circa articulos digitorum ob viſcerum corruptelam 6. p. 282.

**Obs. 17.** Femoris ſteatoma gypſea pila & calculis reſectum 1. Crurum Tumor à tumef. ſtis eorum glandulis 2. Femoris tumor ob carnem mucilaginofam lardo ſimilem 3. Crur Oedematofum ob Emulgentem venam femorali inſertam 4. Ibid.

**Obs. 18.** Tumor in Genu excitatus à ſteatomate 16. libratum ponderis innato. Cartilagineus cavitates habens ſero repletus 2. p. 284.

**Obs. 19.** Femur & Tibiarum tumor ob vitium hepatis, pulmonum, genitalium 1. Tibiarum tumor ob vitium renum, hepatis, pulmonum 2. Manus ſiniſtræ pedisque tumor ob hepatis vitium 3. Tibiarum & Pedum ob pulmonis vitium, uteri 4. Crurum Pedumque inſtatio ob lienis & Jecoris vitium 5. Pedum & Surarum tumor ob ſuppuratum pulmonem ſiniſtrum 6. Pedes Oedematofi ob hydropem thoracis & lienis vitium 7. Pedum tumor ob jecoris, lienis, meſenterii vitium 8. Pedum oedema ob thoracis hydropem, hepatis læſionem 9. Ob pulmonum, cordis, jecoris, renum vitia 10. Ob vitium jecoris, pulmonum 11. Ob vitium hepatis 12. Pedum tumor ob glandulas ſubcutaneas tumidas 13. Pedes veſicæ obſidi ob bi. em in cyſti cohibitam &c. 14. Pedum tumor oedematofus ob pus ex hepatis abſceſſu, in meſenterium & omentum illapſum 15. p. 285.

**Obs. 20.** Tumor Oedematofus manus ſiniſtræ cum ulcere in vola ab oſſibus metacarpi corruptis & demortuis integro periſtio Pædathroace ſeverini ſpina ventroſa, ventus Spineus p. 287.

**Obs. 21.** Tumor in capite pulſatorius. aneurifma in meningibus ſequitur 1. In ſummo pectore à dilatatione inſigni Aortæ 2. Aneurifma quantum thoracis partem interius occupans 3. Sub ſiniſtra homoplata ob ſanguinem ex magna ad caput aſcendente aortæ in muſculorum ſpacia effuſo 4. Aneurifma aortæ arteriæ 5. Tumor colli pulſatorius ab Aneurifmate arteriæ carotidis 6. In Dorſo tumor pulſatorius ob Aneurifma Aortæ à directo 7. Brachii tumor pulſatorius inſelicem venæ ſectiōnem ſequitur 8. Sub clavicula dextra ob aneurifma arteriæ magnæ 9. Cruris ob dilatationem ejusdem arteriæ 10. Cruris ob ruptam arteriam cruralem 11. Aneurifma ſit arteriæ tunica interna corroſa aut rupta, Externa dilatata 12. p. 288.

**APPENDIX, De inſelici Aneurifmatis ſpæctione.** p. 291.

**Obs. 22.** Varices imi ventris ab iliicis venis ortum ducentes. p. 293.

**Obs. 23.** Eryſipelas cutem tantum afficiens illic ſubjecta carne. Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Tumoribus.

**Obs. 1.** In ſcapuloſi meſenterio plures glandulæ reperte &c. Tom. 3. p. 294.

**Obs. 2.** Scrophuloſi in pede tumores pus fundentes in poella cui pulmo ſiniſter abſumptus in cujus loco aderat materia gypſea. Ibid.

**Obs. 3.** Colli Tumor Strumuloſus carcinodes, lethaliſſimus pag. 295.

**Obs. 4.** Scrophuloſi meſenterium innumeris glandulis obſitum. pag. 296.

**Obs. 5.** Tumor ſinem dorſi ſpinæ occupans ortum ducens à foramine natio in medio ſpinæ dorſi inter vertebraſ. Ibid.

**Obs. 6.** Abſceſſus ſupra Maſtoiden apophyſin lethaliſſum ortum ducens à pulmonibus necrotis cerebro pure ſcatente. p. 297.

**Obs. 7.** Abſceſſus Tibiæ amputatione curandus ob ſubjectum oſſis vitium. p. 298.

**Obs. 8.** Tumor frontis ſubjectum os corroſum habens ex humore viſcido lento. Ibid.

**Obs. 9.** Fungoſi excreſcentia capiti poſſico adnata ab obitu reſecta & anatomico cultro examinata exhibuit aquæ pellucidæ è cerebro derivatæ copiam. p. 299.

**Obs. 10.** In ſpina ventroſa oſſa ſemper erofa &c. p. 300.

**Obs. 11.** Tumor femoris lethaliſſus ab vitium pulmonis, lobi è directo purulenti & ſplenis corrupti. p. 302.

**Obs. 12.** Tumor in regione lumbæ ſubſtantiam poly-poſam continens ob vicinum renem affectum. Ibid.

**APPENDIX, Tumor à partu ſuperſtes circa regionem umbilicalem excitatus à copia ſanguinis concreti in Tuba dextra retenti & manibus educi.** Ibid.

**Obs. 13.** Carnea excreſcentia à mulieris inguine pendens ponderis 25. libratum à viſcerum namralium vitio orta. p. 303.

**Obs. 14.** Genu tumor ſerum continens & duo corpora carnoſa. Ibid.

**Obs. 15.** Aneurifma aortæ diſruptum Ibid.

**APPENDIX, De Aneurifmatis natura, cauſis, &c.** pag. 304.

## SECTION III

## De Vulneribus, Plagis, &amp;c.

**Obs. 1.** Vicia accidentia à ſenſei Deſcenſu per poros cranii ſupra panniculos &c. Tom. 3. p. 307.

**Obs. 2.** Percuſſio ſiniſtræ partis capitis lethaliſſis à viſcerum meningis phlegmonem, cranii Fiſuram 1. Caſus lethaliſſus ob rimam calvarie & ſanguinis effuſionem

2. Ob longiſſimam Frontis Rimam ad ſellam equalem productam &c. 3. Vulnus duplex lethale ob Fiſuram incompſam & venarum ruptionem 4. Ob rimam patentem & cerebri cum depreſſione læſione cerebri & meningum 5. Ob Fiſuram in diſtecto ponum lætentem 6. Ob Fiſuram Bregmaticam ad dextrum temporum os productam & læſionem venarum jugularium 7. Fiſura oſſis petroſi cute integra unde dura mater ſanguine & pure ſuffuſa 8. p. 309.

**Obs. 3.** Vulnus capitis lethale ob læſionem cranii & duræ meningis unde collectio ſeri in dextro ventriculo.

pud in sinistro 1. Ob lesionem substantie cerebri ejus portiones ante obitum exstante ablate sunt. 2. Ob peritum tertium cerebri ventriculum 3. Ob utramque meningem & ventriculos lesos 4. Punctura ossis frontis leth. ob meninges lesas salvo cerebro 5. Temporis ob compressum cerebrum ab olse depresso 6. Temporis dextri ob lesionem dote maris male curat 7. Bregmatis sinistri ob sanem inter cranium & duram matrem effusam 8. Venicis & musculi masseteris ob lesam cerebrum cranium & meningem 9. Frontis juxta supercilium ob membrarum phlegmonem & sanguinis per cerebri anfractus diffusionem 10. Temporis dextri a faucibus vasis intra cranium 11. Temporis dextri ob sanguinem circa musculum effusum, os subditum perforatum, confectionem sanguinis inter cranium & meningem inter utramque & in ipsa cerebri substantia cujus duo fragmenta educta 12. Frontis infra orbitam oculi ob lesionem ossis cribrosi, dextri cerebri ventriculi & sanguinis ad basin usque ac cerebellum effusionem 13. Tom. 3. p. 311.

Obs. 4. Contusio capitis lethalis post trimestris ob copiam portis supra meninges & cerebrum effusi 1. Ob cranii fracturam & depreffionem 2. Sinipitis ob sequentum seriosum abscessum tertium ventriculum prementem 3. Temporis sinistri ob sanguinem effusum in cavitatem ossis sphenoidis 4. Ob genitum in cerebri substantia abscessum 5. 6. ob sequentum abscessum in opposito latere 7. Ob copiam portis inter utramque meningem collecti 8. Ob inductam substantie cerebri parti putredinem salvo crano 9. Ob sequentum cerebri substantie necrosin 10. p. 318.

Obs. 5. Fractura ossis frontis lethalis ob sequentum cerebri suppuracionem 1. Vulnus Temporis ob apostema in cerebro sequentum 2. In palpebra superiori ob excitatum in cerebro apostema 3. Frontis ob fracturam cranii fissuram dote maris & Jecotis sequentum abscessum 4. Frontis & bregmatis ob ossis fracturam & vomitum in contiguis cerebri parte 5. Vulnus lethale ob fracturam cranii & sequentum cerebri phlegmonem 6. Ob fracta ossa bregmatis cum introfusione & contusione musculi temporalis 7. Ob Cranii fracturam hinc cerebri ad corpus usque callosam consumptionem 8. Ob cranii fracturam & fragmenta cerebro impacta cum sanguinis diffusionem 9. Ob striatum corporum lesionem 10. p. 321.

APPENDIX. Qua via in vulneribus capitis sanguis in auditorium meatum feratur & per aures erumpat. p. 322.

Obs. 6. Vulnus exiguum frontis lethale ob simulam in olse & sequentum cerebri phlegmonem 1. Ob pus inter cranium & duram meningem & os corruptum 2. Leve jam trimetris consolidatum lethale ob pus supra membranis & cerebrum effusum 3. Frontis exiguum leth. ob pupillam utriusque meningis & cerebri sequentum abscessum 4. Ob vitium in meningibus & cerebro communium nigredine se prodens 5. Ob sequentum abscessum infra substantiam cerebri & sinistri bregmatis ob pus intra etrogium & membranas subsistens ac cerebri ea parte consumptionem 7. Neglectum lethale ob sequentum meningum phlegmonem illato crano 8. p. 323.

Obs. 7. Capitis vulnus lethale ob cranii particulas in ambas meninges defixas, hinc subotum apostema 1. Bregmatis sinistri cum confusione dextre partis cranii cujus fragmentum membranas penetrabat. p. 327.

Obs. 8. Capitis vulnera sequentia Cerebri substantie & ventriculorum putredo 1. Temporis dextri lethale ob fractum abscessum in cerebri penteralibus 2. Occipitis ob fissuram in interna ossis parte & sequentum Ab-

cessum 3. Casus lethalis ob sequentum cerebri suppuracionem & ulcus 4. Vulnus rotundum & angustum juxta suturam sagittalem lethale ob sequentum putredinem dimidie partis cerebri &c. 5. Cicerice jam obductum lethale ob cerebri partem putrefactam 6. Lethale ob ingens in cerebro apostema speciem curatum 7. Faciei a sclopeto inflictum leth. ob lesionem meningum & sinistri cerebelli principii necrosi affectu 8. Occipitis & verticis latus lethales ob Abscessus in cerebri substantia genitos 9. Occipitis a sclopeto ob sanguinem circa basin cerebri effusum ac cerebelli syderationem 20. Tom. 3. p. 328.

Obs. 9. Vulnus capitis cum Dedolatione lethale ob pus inter utramque meningem collectum 1. Ob fracturam cum Dedolatione sequentumque apostema cerebri 2. p. 332.

Obs. latus capitis lethalis ob fractam laminam secundam prima illata 1. 2. 3. 4. 6. 7. &c. p. 334.

Obs. 11. Idus supra dextrum supercilium lethalis ob sanguinem in occipito effusum inter utramque meningem collectum node sequenti vicini cerebri corruptio obitus Henrici II. Galliarum Regis 1. Vulnus frontis lethale ob contrassuram in occipitis olse & effusionem, sanguinis ac senie in subdura meningem 2. Percussio in una capitis parte lethalis ob commotionem cerebri & sanie collectionem in parte opposita 3. 4. 6. Ossis frontis vulnus lethale ob abscessum circa occiput excitatum 5. Vulnus in altera temporum lethale ob fissuram in opposito latere 7. Contrassura duplex a casu in musculum temporalem 8. Casus in occiput lethalis ob sequentum fissuram ossis frontis 9. p. 336.

Obs. 12. Vulnus Frontis lethale ob hiantem suturam lambdoideam & sanem supra meningem duram effusam. p. 339.

Obs. 13. Vulnus sinipitis lethale ob actum dote meningis cum crasso adhesionem cujus ratione pus extri non potuit. Ibid.

Obs. 14. Capitis ictum & ventris levem punctum mors sequitur neutri imputata. p. 340.

Obs. 15. Vulnus capitis lethale ob agri debilem constitutionem & alium morbum accedentem. Ibid.

APPENDIX. De difficultate curationis vulnerum capitis apud Florentinos &c. p. 341.

Obs. Hepatis abscessus in capite vulneris non raro repertus. Ibid.

Obs. 17. Oculi dextri vulnus lethale ob lesam cerebri quod dextra parte pauculentum sinistra plenius serosa plenum 1. Ob cerebellum simul lesam 2. Externi oculi ob lesionem cerebri 3. Palpebre inferioris lethale citra ullam aliam noxam 4. Orbitæ superioris ob sequentum meningis & cerebri corruptionem. p. 344.

Obs. 18. Vulnus Nasi & Genæ inflictum lethale ob relictum ferum vulneris causam. p. 345.

Obs. 19. Vulnus Brachii lethale ob sequentum gangrenam & subsistentem globulorum plumbentem intra os humeri 1. Ob viciosa viscerum constitutionem 2. Punctum Brachii lethalis ob lesam cum vena betrum 3. Carpi vulnus lethale ob arteriam substantiam per longitudinem divisam 4. vulnus interni brachii lethale ob profusam hæmorrhagiam, ubi de vitibus aque styptice 5. p. 346.

Obs. 20. Juguli vulnus interuenientia totius corporis sequenda. Ibid.

Obs. 21. Thoracis vulnus lethale ob copiam sanguinis in cavinarem illapsi illatis pulmonibus 1. 2. Ob Diaphragma per scitum per cuius histum intestina ibotacem subjerant 3. 4. Ob peritum Diaphragma & Pulmones 5. Lateris dextri ob

lesum Diaphragma & Hepar 6. Ob Diaphragma perforatum per quod ventriculus in thoracem viliam fecit 7. Ob partem diaphragmatis carneam perforatus huiusmodi pars interit 8. Ob perforatum diaphragma per quod ventriculi & coli pars thoracem ingreditur 9. Ob perforatum diaphragma hepar & ventriculum iuxta pylorum 10. Paracentesis thoracis mors sequens ob lesam pericardium 11. Vultus lethale ob leviter lesam diaphragma parte carnosa 12.

Tom. 3. p. 348.

Obs. 21. Vultus duo pectoris mors levissima sequitur 1. Pulmonis cui pericardium lobos cum parte thoracis proxima coalescentia 2. Vultus thoracis sequens abscissus hepatis 3.

p. 353.

Obs. 23. Pectoris vultus lethale ob cordis simul & aortae lesionem 1. Ob finitum cordis ventriculorum lesam 2. Ob disscissam arteriam venosam paulo supra auriculam cordis finitram Obitus Henrici Magistri 4. Galliarum Regis 5. Ob transsolos pulmones & vasa cordis in basi lesa 4. Ob cordis disscissum 5. Ob cordis ventriculi dextri lesionem illius pulmonibus 6. Ob cor trajectum quatuor die lethale 7. Ob cor ad dextrum usque sinum lesam 15. denum die lethale 8. Biduo post lethale ob cor lesam ad ventriculorum usque dextrum & aliud vultus diaphragma, ventriculorum & hepar penetrans 9. Ob basin cordis ejusque conum globulis duobus transverberatum & branchii vultus 10. Ob lesam pericardium ad cordis usque substantiam & pulmonem lobum 11. Ob vulneratum cor & pus in pericardio die contentum 12. Vulneri thoracis fistula succedit & qua pus egreditur pericardium & ipsum cor corripit 13. Nono denum die vultus lethale quod ad cordis cavitatem penetrat 14. Vultus cordis quatuor die lethale 15. Ob utrumque cordis ventriculorum perforatum 16. Ob cordis substantiam lesam 17. Ob lesam finitum ventriculorum 18. Ob vultus dextrum ventriculorum attingens 19. A thoracis vulnere pulmo ad denudationem usque cordis consumptus 20. 21.

p. 354.

Obs. 24. Vultus Thoracis lethale ob arteriam venosam disscissam 1. Ob laceratos ramos vasorum subclavium 2. Ob Pulmonem dextrum vulneratum effusumque sanguinem 3. Ob Pulmonis parenchyma perforatum 4. Ob conceptam in pulmonibus putredinem & Ductus chyli lesionem 5. Ob lesionem pulmonum & oesophagi 6. Ob praesentia cavitatem thoracis substituens 7.

p. 359.

Obs. 25. Vultus Pectoris & Hypochondrii dextri lethalis ob vulnera pericardii Hepatis & Medullae spinalis lesionem 1. Pectoris & abdominis ob lesam alterum pulmonem lobum, diaphragma, ventriculorum, lienem 2. Hypochondrii dextri ob vulneratum infirmum jecoris fibratam 3. Ob Ventriculi fundum lesam 4. Ob substantiae Hepatis lesionem & truncum vena cae 5. Ob Colon per transversum percutum disscissum 6. 15. Ob vultus hepatis 7. Portionem hepatis abscissa regenerata 8. Vultus abdominis lethale ob perforatum ileon intestinum copiam sanguinis in abdomen effusi Mesenterium perforatum. Mors Henrici tertii Galliarum Regis & Poloniae 9. Ob disscissum ileon intestinum 10. Ob lesionem interiorum viscerum, intestinum corruptionem & abscissum perulenterium 11. Ob intestina crassa & tenuia confecta 12. Ob Colon transversum sectum 13. Ob ileon intestinum duobus in locis lesam 14. Ob ileum transversum, vulneratas venas & arterias mesentericas 15. Ob umbilicalem venam abscissam 16. Vultus intestini coli summa cicatrice coaluisse deprehensum 1. Vultus abdominis lethale ob venam cavam disscissam 18. 19.

p. 361.

Obs. 26. Dorsi & laterum vulnera lethalia ob pericardium in thoracem effusum 1. Lumborum ob lesam spinalem medullam 2. Natis ob lesam spinalem medullam ad os sacrum 3. Natis ob incongruum vultus rationem lethale 4. Femoris circa ramos iliacos ob horum disscissionem 5. Cruri ad dorsi regionem ob lesam intestinum sectum, mesenterium & dextrum ventriculi latus 6. Natis ob insignem virium viscerum naturalium 7. Cruris ob arteriae lesionem 8. Digitorum ob nervos ad ossa disscissos sequentesque convulsiones 9.

Tom. 3. p. 366.

Obs. 27. Epigastri vultus lethale ob fundum stomachi perforatum 1. 2.

p. 370.

Obs. 28. Casus in Dorsum lethalis ob quinque ventres vitiatos 1. In laevis ob lesam lienem 2. Ob lesam hepar & ruptam vesicam fellis 3. In Pectus ob contusionem anticalem cordis & inflammationem lobii pulmonis 4. Ex casu Colon peritonaeo adunum 5. Lethalis ob rupturam vena cae 6. Verbera mors sequitur ob sanguinem per habitum corporis & viscera effusum, luter cranium & durum materem 7. Concussio corporis a rheda lethalis ob vim pericardio illatam & pulmonibus 8. Ob abscissum genitum inter musculos abdominis & peritonaeum 9. Ictus lateri sinistro lethalis ob contusum diaphragma venasque vicinas disruptas 10.

p. 371.

Obs. 29. Alapam mors subita sequitur nullo lesionis in cerebro apparente signo 1. Ictus ad nucham lethalis ob effusum sub cranio cruorem & meningis phlegmonem 2. Ictus p. Aetoris lethalis ob pericardium allisum & extremam costam fractam 3. Lateris vestis dorsum percussio lethalis ob excitatam in mediastini interpedine vomitum 4. Pectoris ob contusionem sinus excitatam 5. Lethalis percussio pectoris ob viciosam viscerum constitutionem 6. Casus in dorsum lethalis exinde latio hepatis ob fissuram in liene excitatam 8. Hypochondrii dextri ob lesionem intestinum, diaphragmatis, vasorum mesenterii 9. Hypogastri ob pericardium in inguen devolutum 10. Hypochondrii sinistri ob faniatum lienem 11.

p. 372.

## ADDITAMENTA

### Ad Sectionem de Vulneribus.

Obs. 1. Vultus pectoris lethale ob cordis lacerationem illam pericardio Tom. 3 p. 372.

Obs. 2. Fibrae leve vultus lethale ob sequentem haemorrhagiam nullis medicamentis cohibitam hinc cordis consumptionem. Ibid.

Obs. 3. Vultus pericardii cum alio cordis vulnere unico lectu infatum, quatuor solum die lethalis. p. 376.

Obs. 4. Vultus a globulo ex bombardis emisso infatum lethale ob subsistentem circa Medullae spinalis exteriora &c. Ibid.

Obs. 5. Vultus lethale ob cordis substantiam lesam & sanguinis in diaphragma effusionem p. 378.

Obs. 6. Vultus pectoris lethale ob vasorum pulmonum & cordis lesionem. p. 379.

Obs. 7. Vultus pectoris lethale etsi cavitatem non attingeret. Ibid.

Obs. 8. Vultus lethale ob cerebri substantiam lesam globulo ad occiput usque propulso, cerebrum autem ad minimam molem sedatum. Ibid.

Obs. 9. Vultus oculi repente lethale ob prociuum falcisiformem lesam & ventriculorum tertium.

pag. 380.

Obs.

- Obs. 10. Vulnus frontis lethale ob utrumque diploen effusam. Tom. 3. Ibid.
- Obs. 11. Culter in latus immisso inter secundam & tertiam costam diaphragma illud permansit, unde colligitur Empyematicos sibi secandos aut utendos esse. Tom. 3. Ibid.
- Obs. 12. Vulnus thoracis lethale ob costarum lesionem, tabern & Empyema accensentem. p. 381.
- Obs. 13. Vulnus Epigastrii lethale ob filicem parvum & sclopeto emissam vesicam subeuntem abque ulla vulnerationis inditiis. p. 382.
- Obs. 14. Casus ab alto lethalis ob sanguinem in mesenterium effusum 1. In abdominis cavitatem 12. Ibid.
- Obs. 15. Vulnus scinipitis & frontis lethale ob fracturam laminae internae, hinc perforatam duram matrem. p. 383.
- Obs. 16. Epigastrii vulnus lethale ob lacerum ventriculorum. Ibid.
- Obs. 17. Vulnus occipitis lethale ob varios errores ab agro commissos. p. 384.
- Obs. 18. Vulnus pectoris lethale ob utrumque cordis ventriculum pertusum. Ibid.
- Obs. 19. Capitis vulnus leve, lethale tamen in quo cerebrum sphacellatum & alia reperta. Ibid.
- Obs. 20. Arteria citrali lacerata mors ad 14. dies dilata. pag. 385.
- Obs. 21. Aperitio vulnerati. Ibid.
- Obs. 22. Culter costarum medium transfolgens vulnere lethali. p. 385.
- Obs. 23. Vulnus capitis cum fractura cranii & fungo cum totius morbi exacta descriptione. p. 386.
- Obs. 24. Capitis vulnus cum fractura & fissura lethale. p. 390.
- Obs. Intestinalis jejuni laceratio, integro abdomine lethali. p. 391.
- Obs. 26. Intestinalis Ilei ruptura integro abdomine cum variis curiosis. p. 392.
- Obs. 27. Intestinalis laceratio sine abdominis vulnere. pag. 403.
- Obs. 28. Abdominis vulnus penetrans sine lesione ventriculi & intestinorum. p. 404.
- Obs. 29. De gravissimo capitis vulnere per cranium & meninges ad ipsum usque cerebrum penetrante. pag. 405.
- Obs. 30. De liene. p. 406.
- Obs. 31. De inaudita mortis causa scilicet a disruptione vasorum quorundam praecipuorum ex baculi ictu. Ibid.
- Obs. 32. Capitis vulnus ingens, subiungitur historia de Masculorum dorsum ex globulo sclopeti ictu lethali. p. 407.
- Obs. 33. Ex ictu, casu, capitis confusio, cerebri abcessus, apoplexia &c. p. 408.
- Obs. 34. Ex casu ab alto cerebrum vulneratum putrescit sine paralyti, convulsione &c. p. 410.
- Obs. 35. Grande vulnus ense lato insitum duas costas spualis viciniores excindens, pericardium, diaphragma aliisque viscera transiciens. p. 411.
- Obs. 36. Pulmonis vulnus lethale a sclopeto solo pulvere pyro instructo insitum. Ibid.
- Obs. 1. Ulcus in pectore tumorem canthico apertum sequentem, sanguinem fundens originem dicens a vomica in pulmonibus ad cor usque pertingente. Tom. 3. p. 413.
- Obs. 3. Ulcus in ano lethale ob intestini recti excoriationem in gangrenam delincentem. pag. 414.
- Obs. 4. In puero tuberculis & ulceribus cum ossium carie per triennium scitente & sine ad lumbum sinistram deprehensum est Jecur magnam costis agglutinatum. Abcessus juxta vertebrae dorsales superiores circa lumen veneream. p. 414.
- Obs. 5. Ulcus tibie sinuosum ob subditiorem ossium vicium spina Ventosa 1. 2. 3. Ulcera tibiarum & femorum a Jecoris & lienis vitio pendente. pag. 415.
- Obs. 6. Ulcus fonsidum Genae a ligamentis, cartilaginibus ipsisque ossibus purulagine infectis. pag. 416.
- Obs. 7. Fungosa caro ex ulcere tibie pullulans ob foramen 1. ossis ad medullam usque penetrans. pag. 417.
- Obs. 8. In his quos Carcinoma ulceratum sustulit, sanguis adustus intra vasa repositus cum labe Jecoris lixato liene. Ibid.
- Obs. 9. Fistularum pertinacia & curationis difficultas inde est quod eorum principium aliter excutitur & fundamentum in ossibus habeant 1. 2. Fistula in inguine sanum imi ventris cructans 3. In femore otra a lumbis 4. Ibid.
- Obs. 10. Sphacelus totius corporis sequens coedis ejusque vasorum intumescationem 1. Uniusque Tibie ob tumorem scirrhosum vicinum cave descendenti 2. ob obstructam venam cavam 3. Pedis dextri ob viscerum omnium corruptionem 4. Cruris ob vitiatam arteriam quae fibulam petit 5. Crurum & Tibiarum ob vicium Jecoris & Pancreatis 6. Cruris ob sinistram cordis ventriculum carne glandulosa infatam & impeditum arteriae motum 7. Crurum & Tibiarum ob vicium Jecoris, P. necatis & lienis 8. Digitorum pedis ob vicium pulmonum, cordis 9. Humeri dextri ob consumptionem lobis dextri pulmonis, cordis vicium 10. Manus ob sanguinem cor exhaustum & pulmones 11. Scroli & vicinarum partium ob vicium mesenterii, intestini recti 12. Digitorum pedis ob pulmones Languine turgentes cor exangue, sanguinem putridum in intestinis, p. 418.
- Obs. 11. Brachii gangrena ob filium epiphyse ubi cubitus ipsi jungitur contusione superthoracis affectam. pag. 419.

## SECTION V.

## De Fracturis.

- Obs. 1. Fracturam ossis humeri sequens tumor cum ossis carie 1. Brachii non coalescens ob cariem subditam 2. Fracturam ulnae & Radii sphacelus lethalis sequitur 3. Ossis femoris lethalis ob frangementa ossium relicta 4. Femoris sine magnitudine lethalis 5. Occulta ossis femoris fractura cui successit ejusdem ossis ad ischiam luxatio 6. Fractura spontanea ossis femoris 7. Fracturam ossis femoris sequens insignis tumor ob calium exuberantem nec coherentem 8. Tibia fracta non coalescens ob ossiculū ab osse tibie separatū & sphaceli initium in inferiore ejus parte 9. Humeri dextri & femoris fractura spontanea. 10. Tom. 3. p. 422.

## SECTION IV.

## De Ulcibus, Sphacelo.

- Obs. 1. Ulcera capitis manantia in infante lethalia ob serum sub cranio suppreffum 1. In morte cerebri partem exinde putrescentem 2. Ulcus occipitis nativum in infante Obstetricis erroris adscriptum 3. p. 422.

SECTIO VI.

*De Luxationibus & ambulatione laesa, aut Motu impedito ob osium vitia.*

- Obs. 1. **L**uxatio vertebræ secundæ cervicis non semper illico lethalis. Manuum & Pedum luxationes ob ligamentorum putredinem. Tom. 3. pag. 427.
- Obs. 2. Claudicatio pendens à cervicis femoris fracta circa luxationem. Ibid.
- Obs. 3. Cervicis immobilitas ob vertebrarum ligamenta indurata & tophos innatos. 1. Torus ob osium omnia unionem. 2. Brachium inflexile ob osium in cubito agglutinationem. 3. Inflexio lumborum impedita ob symphyseos nativam vertebrarum lumborum. 4. Inflexio in anteriora impedita ob appendicem acutam in osse illeo. p. 429.
- Obs. 5. Statura recta impedita ob magnæ arteriæ duriciem infra & supra renes ac omentum ventris adnatum. p. 430.

SECTIO VII.

*De Decubitu supino aut in latera impedito.*

- Obs. 1. **S**upinus decubitus impeditus ob ventriculos cerebri aqua distentos unde infomniorum, tremoris cordis &c. origo. ob Seri descensum in quantum ventriculum. Tom. 3. p. 430.
- Obs. 2. Decubitus in sinistram latera molestitus ob tumorem inflammatoriu in parte sinistra pulmonis. 1. ob tumorem in parte dextra pulmonis. 2. ob pulmonem sinistro latere consumptum. 4. Decubitus supinus & ad latera impeditus ob arctam pulmonem cum thoracis costis omnibus anterioribus cohesionem. 5. In sinistram impeditus ob dextrum pulmonem costis affixum & omnino impeditus ob pulmonem coherentiam cum costis, vertebis & diaphragmate. 7. In laevum latera impeditus ob pulmonem utrinque costis & diaphragmati adnatum. 8. ob pulmonem costis & diaphragmati adnatum cum cordis erosionem. p. 432.
- Obs. 3. Decubitus impeditus ob cavitatem thoracis sero repletam. Decubitus in dextrum latera impeditus ob puris copiam in sinistro latere abscessum in eodem. 2. In sinistram ob cavitatem dextram ibidem consumptam. 5. ob aquæ libras 6. in cavitare dextra. 4. Supinus & in latera ob aquam totam replentem. 5. 7. Supinus impeditus ob mediastini inflammationem. 6. Decubitus dexter impeditus ob copiam puris inter costas & pulmones. 8. In latera impeditus ob aquam in cavitare dextra, pulmonem cum pleura ibi corrupta, ventriculum humidum. 9. Sinister ob cylindri humore plenam in sinistro pectoris latere. 10. Dexter ob prependicularitatem facciorem in diaphragmate. 11. p. 433.
- Obs. 4. Decubitus in latera impeditus ob mesenterii lactementum. 1. ob Jecur tumidum, hydropem pectoris. 2. ob Vemicam hepatis. 3. ob Abscessum regionis hepatis adnatum. 4. ob adhaerentem hepatis cum diaphragmate. 5. Decubitus omnis impeditus ob hepatis infarctum, pancreas maximum. 6. ob Vitiū pancreatis. 7. In latera dextram ob lienem julo majorem. 8. In latera ob Lienis magnitudinem, pulmonis sinistri adhaerentem. 9. In dextrum latera impeditus ob grandem calculum in rene dextro. 10. 11. p. 434.

- Obs. 5. Supinus decubitus impeditus & status cessus molestus ob jecur induratum, pancreas maximum. Tom. 3. p. 435.
- Obs. 6. Decubitus in latera & supinus impeditus ob calculum in vesica. 1. Supinus impeditus ob molem uteri. 2. 4. ob Constitutionem varicosam Iliacorum venarum. 3. ob uteri molem immensam, aquam in abdomine. p. 436.

SECTIO VIII.

*De Arthritis, Podagra, Ischiadico dolore.*

- Obs. 1. **A**rthritis diu afflictorum membra afflicta exesa & reperta sunt. Tom. 3. p. 435.
- Obs. 2. Humor Arthritidis patens intra articularum cavitates non concluditur, cum ingeniosa & nova de loco affectu in Arthritide ejusque causa, dissertatione &c. p. 439.
- Obs. 3. Calculus articularis erui. p. 442.
- Obs. 4. In quodam Arthritico summa tenum flacciditas & exilitas reperta. Ibid.
- Obs. 5. Contractura digitorum &c. in Arthriticis causa est calx spatia omnia occupans & officula fecerit cogens. p. 443.
- Obs. 6. In quodam Podagra diu vexato lien exsucus & omni pulpa catens inventus. Ibid.
- Obs. 7. Ischiadicum & Podagricum dolorem patientes humores circa finem medullæ spinalis congeriuntur. Ibid.
- Obs. 8. Anatomie Ischiadico laborantis dolore in cuius coxa invente sunt glandulae induratae pus concretum continentes. p. 444.
- Obs. 9. Ischiadicus dolor ab abscessu ingenti ad rotatorem musculum femoris dextri exortus & atheromate sub musculo Psoas sinistro. p. 445.
- Obs. 10. Ingens coxarum dolor ob os coxæ indicis coruptionem passum & erosionem. Ibid.
- Obs. 11. Humores Ischiadici committentes aliquando in eo spatio quod faciunt musculi continentur. p. 446.
- Obs. 12. Ischiadicus dolor sequutus tumorem circa mesenterii exortum genitum. Ibid.
- Obs. 13. Coxæ dolor ab utero gangrena affecto. Ibid.
- Obs. 14. Gonagra laborantis Genua dissectum exhibuit sanguinem crassum, adustum. p. 447.

ADDITAMENTA

*Ad Sectionem de Arthritide &c.*

- Obs. 1. **I**schialem committentis humoris sedes sepe in musculorum interapedinibus reperitur. Ibid.

SECTIO IX.

*De Luc Venerea & Plica Polonica.*

- Obs. 1. **P**urum Luc Venerea laborantium vena infarctæ nec non musculose quæ doloribus afficiuntur. 1. Inferiori Luc partes internæ ulceribus quandoque & abscessibus sciant. 2. 3. 4. 5. vitiosus humor in cerebro repertus. 6. sepe reperitur in cranio eorum qui graviter laborant dura & concreta crusta illi adhaerens. 7. Cerebri crani reperta. 8. 12. Gumma dura mari innata. 9. Exostosis cranii ab humore inter diploas contenta. 10. 11. Ossa ex

- crebro usum medicamentorum mercurialium tribu-  
lia reddita 13. Dnorum spondylorum caries 14. Os-  
sium pectoris caries cum abscessibus in vicinia 15.  
Tom. 3. pag. 448.
- Obs. 2. Jecur ratione morbi venerej ulceratum 1. 2.  
3. 4. 5. p. 452.
- Obs. 3. In cadaveribus quorundam qui hydrargyrosu  
passi mercurius reperiens. Ibid.
- Obs. 4. In cadavere cusuissam Lue infecti cuncta vis-  
cera nunci. (ana reperiuntur. p. 453.
- Obs. 5. De Tricis ven Plica Polonica. In eorum san-  
guine qui Plica correpti inestiere Pili reperiuntur.  
Ibid.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Lue Venereo &amp;c.

- Obs. 1. **I**N vitro lue inquinato cum dolore capi-  
tis, Epilepsia Melancholia Cachexia,  
Ophthalmia unius oculi &c. Sinus cerebri sinister  
aqua plenus repletus cum parte cerebri corrupta &  
gummati in ea. Tom. 3. p. 454.

## SECTIO X.

De Morbis Occultis Chronicis à Veneno  
inductis.

- Obs. 1. **M**orbus occultus & diuturnus ob ulcus  
induratum in cordis auricula sinistra 2. Polypi  
reperi in vena Cava diu ob morbum decubuum 3.  
In utroque ventriculo lento morbo extincti 4. san-  
guis costalisformis in venis lenta morte extincti re-  
peritur 5. Languor diuturnus à lapidibus pluribus  
in pulmonibus congestis 6. Diuturno morbo con-  
fecti cordis substantia absumpta solo superstitie invo-  
lucto 7. Morbus incognitus à lapillo in substantia  
cordis contento 8. Diu valerudinarius ob multipli-  
cem vicerum omnium lesionem 9. Morbus à ver-  
mibus in cerebro 10. Tom. 3. p. 46.
- Obs. 2. Ignoto morbo extincti cadaver exhibuit cystin  
felleam blè vacuam 1. Pancreatis apostema multos  
occulte perimit 2. Lenta mors à panietate scitro-  
so excitata 3. Valerudinarij pars jecoris concava fe-  
re absumpta reperiata est 4. Morbus incognitus à pul-  
monibus & hepate veticulis obstitis 5. A vesica fellea  
pluribus calculis obstita. A pulmonum & hepatis put-  
redine 6. A rene uno, vesica & cysti fellea, sabulo &  
calculis obstitis 7. Valerudinarius diu pona glacie  
refrigerato usus hepar babuit prorsus ambustum 9.  
Morbus incognitus à jecore lapide juxta vesicam  
obfesso 10. A jecore omnino putrefacto 11. A me-  
lenterij glandulis duabus. uni dis 12. A vasorum me-  
saraicorum obstructione, pulmonum circa dorsum  
inflammatione abscessu in rene 13. Ab altero ulcerato.  
carne spongiosa in ejus cavo 14. Materia serota per  
umbilicam stillans ab hepate scitroso & ulcerato  
15. p. 457.
- Obs. 3. Morbus ignotus ab insigni vermium copia in-  
tra hepatis substantiam 1. A vermibus juxta osti-  
um superius ventriculi & intestinis ab his perfora-  
tis 2. In canalicula à vermibus cucurbitinis in in-  
testinis 3. p. 459.
- Obs. 4. Veneno interempte mulieris cor triplo ma-  
jus naturali inventum est 1. Ab hydrargyri haustu ex-  
tincti sanguis coagulatus fuit 2. Ab inundatione mer-

- curiali pulmones lividi redditi sunt mucro obficti cor  
flaccidum evadit 3. A veneno exhibitio ventriculi  
pars ima excoriata. Jecoris superficies nigrescens  
4. In iis qui assumpti Arsenici vim evasere ventri-  
culus à morte exhibuit latus & profundas erosiones  
5. Venenum corrosivum ventriculum quasi canalicu-  
lavit Jecur albicans reperiens, intestina flaccida  
turgida, ventriculi os superiorem erofum 7. Oris  
ejusdem substantia interna erofa 8. Pueri veneno ex-  
tincti Jecur pallidum evasit, vesicula fellea aqua  
limpida plena repleta 9. veneni exhibitio falsa suspi-  
cio in quodam qui ob retrocedentes morbos opti-  
nio ab uteri strangulatu peremptus. 11. Tom. 3. p. 461.
- Obs. 5. Mors Fungorum etiam consequens à veneno il-  
lis commixto. p. 463.
- Obs. 6. Canum & aliorum animalium à vipere mor-  
su excoriorum anatome. p. 464.
- APPENDIX, Seu historia viri à vipera commossi  
medicamentorum efficacia liberati. p. 465.

## ADDITAMENTA

## Ad Sectionem de Venenis &amp;c.

- Obs. 1. **M**orbus vipere ex quo sanguis coagula-  
tus &c. Tom. 3. p. 469.
- Obs. 2. De viperarum morsu. Ad illustrem Franci-  
scum Redi Nobilem Arcinum. p. 470.
- Obs. 3. Historie varic circa Cicuræ tum aquariorum  
terrestis exhibitionem ejusque noxas. p. 474.
- Obs. 4. De Noxis Cicuræ terrestis ex epistola ad vi-  
rum Celeberrimum Joh. Jac. Weplerum Archi-  
atrum Scafulanum. p. 488.
- Obs. 5. De Napello. p. 493.
- Obs. 6. De Cocculis. p. 495.
- Obs. 7. De Nucæ vomica. p. 497.
- Obs. 8. De Helleboro Albo. p. 502.
- Obs. 9. De Gialappa. p. 503.
- Obs. 10. De Corona Imperiali. p. 504.
- Obs. 11. De Amygdalis amaris. Ibid.
- Obs. 12. De Antimonio. p. 508.
- Obs. 13. De Arsenico & Auripigmento. p. 510.
- Obs. 14. De Mercurio. p. 516.
- Obs. 15. Inundatione Mercuriali usus scabiosus, cor  
exhibuit coagulato cruore turgidum. p. 518.
- Obs. 16. De Oleo Peti veneno funestissimo quodam è  
clarissimi viri Dom. Francisci Redi Experimen-  
tis naturalibus exscripta quæ hic appendicis loco  
pro natura ac historia venenorum illustranda quam-  
vis nihil anatomici complectantur. p. 519.
- Obs. 17. Radicis lupatæ & olei Nicotianæ effectus  
in Ciconia majore. p. 520.
- Obs. 18. Olej ejusdem effectus in Ciconia femella ju-  
vencula. p. 521.
- Obs. 19. Olei effectus in Ranis. p. 522.
- Obs. 20. Olei Nicotianæ effectus in serpentibus. p. 524.
- Obs. 21. Olei Nicotianæ effectus in lacertis & lima-  
cibus. p. 525.
- Obs. 22. Olej Nicotianæ effectus varij in cane Molos-  
so. Ibid.
- Obs. 23. A veneno exhibitio ventriculus lividus reddi-  
tus, lien gangrenosis affectus in hepate & corde san-  
guis grumulosus repletus &c. p. 526.
- Obs. 24. Morbus ignotus ob Tenziam seu vermem la-  
tum intestina omnia opplentem. p. 527.

## SECTIO XI.

*De Cutaneis Infectionibus, Doloribus Externis  
tum partium.*

- Obs. 1.** Leprosæ Matronæ cadaver exhibuit viscera tum vitalia tum paravalia marcore confecta. Tom 3. p. 527.
- Obs. 2.** Pfora laborans in cyti felica lapidem habuit pag 330.
- Obs. 3.** Pedes leprosi vesicis obfisi ab corruptionem omulium viscerum solo salvo corde. p. 331.
- Obs. 4.** Pruritus vagus in muliere cui Tumor conerofus in vulva natus, p. 333.
- Obs. 5.** Penis perpetuus pruritus à carcinomate in vesica. Ibid.
- Obs. 6.** Pallor vultus à mollitie Pulmonum 1. Pustule rubræ per totum, præsertim circa hepatis regionem ab hujus duritie & subsidentia cytis felicæ 2. Tubercula per totum à vitio hepatis & lapidibus in cytis 3. Pallor vultus & lapillos in cyti, vitium hepatis hydropem pectoris 4. Macule purpureæ circa regionem ventriculi in umbilico, inguinibus à vitio pancreatis, hepatis, lienis 5. Affectus faciem, manus & pedes invadens ex intervalis ob vomitum in sima hepatis parte 6. Rubor genarum & vultus ob vasa meningum quasi vasculosa atto sanguine plena 7. Macula rubra in nasi extremitate à visceribus sphaçelo tactis 8. Rubor genarum à pulmone tabido exsiccato &c. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 19. Facies albida cum genarum rubore fugaci à pulmone sinistro vitioso 19. Facies pallor à pulmone vitio staccidum, lividum 20. A viscerum omnium corruptione 21. Ab hydropse thoracis pulmonum syderatione 22. Facies turgida, pallida à vitio pulmonis sinistri 23. Pallor vultus à vitio hepatis 24. Chlorosis in virgine cui testis sinister fetore subfavo repletus &c. 25. Color vultus plumbeus ob vitium lienis scirrhosi 26. A visceribus omnibus simili colore infectis 27. Livor tergonis in cadavere ab assumpto arsenico 28.
- Obs. 7.** Dolor summæ scapulæ & humeri ab abscessu in corde in ulcus desinente pulmonibus accretis 1. Brachii & clavi ulatum à fetore corrupto circa perostium in sphaçelum desinens 2. Sux dolor intolerebilis à vomiceoso hepate 34. Circa coccygem dolor ob Empyemate ossis sacri 6. 7. Humeri dexteri dolor ob hepatis tumore cæcrotro affectum 8. Dolor circa pubem ab incremento & relaxatione Testiculi femine 9. Dolor in infima regione hypochondrii dextri ob vitium mesenterii vicini & Psoadiv Musculorum 10. Circa regionem ossis sacri ob quatuor lapides in vesica 11.

p. 5, 6.

## SECTIO XII.

*Miscellanea Continent.*

- Obs. 1.** Tabaci fumi abusu lingua, trachæa arteria atque fuligine tinctæ reperiuntur, pulmones atridi, hepar inflammatum 1. Pulmones flaccidi, rotundis costis annexi 2. Cerebri substantia exsiccata ad parvam molem redacta 4. Tabaccifugo papillares processus cum nervorum odoratoziorum extremitate defuerunt 5. Cerebrum nigrum & fuligine tinctum observatum 6. Crassa fuligine & spissa obdudum cranium repletum 7. Cerebri nigredo obser-

vata in quodam Tabaci pulverem per nases crebro artachiente 8. Spina triplex lapidea reperiuntur inter utramque meningem Tabacifugi 9. Stomachus flavescens tinctus à fuliginibus Tabaci 10. Vestigia fumi in visceribus notata 11. Insignis Tabacifugi cerebrum nitidum repletum 12. 13. 14. 15. Tom. 3. p. 338.

- Obs. 2.** In Calvaria cuiusdam qui quovis tempore & loco horas potuit determinare, Pulli gallinacei figura reperiuntur expressa. p. 343.
- Obs. 3.** Cranium Rustici qui laqueo fauces sibi perclusit insolite conformationis repletum. Ibid.
- Obs. 4.** Dissecti cordis fragrantia ex diuturno cardioacromi usum 1. Curis dorsi aliarumque partium mobilitas ob membranam carnosam fibris carnis donatam 2. Frons depressa in quibusdam ad nasi radicem ob deficientem cavetum ossis frontis 3. 1. sinus 16. mensium jecur habuit in sinistro hypochondrio, lienem in dextro cor ad dextrum propendens 4. In vena cava mulieris à frigore externo enectæ Polypus carnis inventus 5. A frequentiori Enematum usu intestina stercore vacua 6. In canis inter eundem ad latus sinistram inclinantis Renis sinistri substantia duo vermes reperi 7. Quod quidam sint Scævolæ aut ambidextri causa in ossibus brachiorum sita 9.
- Obs. 5.** Quidam in summis torturis frontem nunquam contigavit 1. Præ torturæ violentia hominæque disrupit 2. Quidam frontem elevans nasum simul attollebat ob peculiarem musculum illi concessum 3. Latrones ut plurimum carent musculo interiore manus primo. p. 346.
- Obs. 6.** Robustissimorum quorundam cranium summis desinunt repletum 1. Vir summe robustus os unum indifferenter habuit à jugulo ad illa costarum vicem supplens 2. singulare robor capitis ob crassitatem cranii eximiam & totius corporis ossa crassissima nunctuoso humore cephalo delibuta 3. Quidam admodum agilis singulares obtinuit musculos 4. In Audacissimis quibusdam cor hirsutum repletum 5. 6. 7. 8. Audacissimus cor habuit hirsutum & partem trunci Aortæ ossam 9.
- Obs. 7.** Hominis ferocissimi cor pusillum ac durissimum 1. Mulieris ob flagitia decollata cor inversum inventum 2. Latronis ferocissimi cadaver viscerum imi & mediis ventris à dextris ad sinistra transpositione exhibuit 3. In viri ferocis & nequam cordis valium orificium caruncule reperiunt 4. Latro cor bæsium habuit 5. In juvenis dissolutissimorum morum cadavere duo lienis inventi 6.
- Obs. 8.** Frons pusillanimitis cor ulceribus exesum deprehensum 1. Fur sine cerebro 2. In Fure insignis vas breve bissectum inventum abscessus in sinistro cordis ventriculo paucissimum cerebrum in occipite 3.
- Obs. 9.** Senex ad iram proclivis post obitum sine felle & cyti inventus est 1. Iracundum pericardium exulcorum & squalidum habuit 2. In valde iracundi cyti felica reperiuntur lapis eam adimplens 3. In muliere ira & more confecta carne cordis substantia plane consumpta fuit 4.
- Obs. 10.** Obesitas totius insignis ob viscera insolite magnitudinis. p. 352.
- Obs. 11.** Suffocatio suspensi impedita ob trachæam ossifram. p. 353.

Ibid.

## ADDITAMENTA

*Ad Sessionem de Miscellaneis.*

- Obs. 1.** Dorsus vehemens dolor & duritudo ob Tumorem in illius regione obortum, spi-



ne tandem ruptam invehentem & sanguinis in  
imam ventrem effusionem. Tom. 3. p. 53.

Obs. 2. Hydrops thoracis dissectione post mortem  
cognitus. pag. 554.

Obs. 3. In Calvis meninges à cranio semper dilatare de-  
prehenduntur. Ibid.

Obs. 4. Similitudo causa ex anatome deprehensa. Ibid.

Obs. 5. Senes incurvi sunt & repandi minusque dor-  
sum movent ob vertebrae coarctum &c. p. 555.

Obs. 6. Tinea subjectum principale non cutis sed pin-  
guedo illi subiecta. Ibid.

Obs. 7. Flatuum cohibitionem sequuta insignis intesti-  
ni Coli distensio. p. 556.

Obs. 8. Acidulis vitriolicis diutius quidam usus cor &  
ventriculum corrota & exsiccata exhibuit. Ibid.

## OBSERVATIONES

*Anatomica Medica Iohannis Fantoni.*

Obs. 1. **A**neurisma arteriae magnae paulo supra  
iliacis & polypti infra locum aneuris-  
matis reperti sanguinis intra tunicas mesenterij &  
circa renes extravasatio. Ibid.

Obs. 2. Tumor sarcomatosus intra tunicas coli. p. 557.

Obs. 3. Cerebrum febricitantis flavo humore rinctum,  
vasorum cerebri exsiccatio: Aquej oculorum hu-  
moris consumptio &c. Ibid.

Obs. 4. Inflammatio hepatis, pulmonis & intestino-  
rum: Aqua pericardij purulenta & superficies cor-  
dis alterata. p. 558.

Obs. 5. Moles hepatis maxima venticulus in regione  
umbilicali, cor insolite magnitudinis &c. Ibid.

Obs. 6. Cranium crassissimum cum suturis vix appa-  
rentibus, medulla oblongata biloso sero tincta &c. p. 559.

Obs. 7. Pulmo inflammatus, cor magnum, variega-  
tum & durissimum. p. 560.

Obs. 8. Pancreas durum cum liquore lymphatico  
in canali vistrungiano, capsulae atrabilarie maxime  
& alterata, cor magnum & planum &c. p. 561.

Obs. 9. Inflammatio meningum & cerebelli corruptio.  
Ibid.

Obs. 10. Tumor fibrosus intra tunicas cerei & coli &c.  
Tom. 3. pag. 561.

Obs. 11. Hepatis & diaphragmatis inflammatio, ca-  
tis, cerebrum & intestina bile ducta sicut monitiones  
cerebri frigiditas. Ibid.

Obs. 12. Hydatides in superficie cordis, vesiculae ma-  
ximae magnitudinis & meatus cystici obstructio &c.  
p. 562.

Obs. 13. Hepar steatomatosum & musculorum abdo-  
minis supra corpus hepatis externum. p. 563.

Obs. 14. Tumor cartilagineus in pyloro & superiore  
parte duodeni. Ibid.

Obs. 15. Pulmo carnosus &c. p. 564.

Obs. 16. Pulmonis abscessus, Pus in pericardio & cor  
externum corruptum. Ibid.

Obs. 17. Cor in basi vulneratum &c. Ibid.

Obs. 18. Colon in hypogastrium diductum. p. 565.

Obs. 19. Polypus cordis. Ibid.

Obs. 20. Mesenterium versus spinam tractum sub-  
stantia medullaris cerebri & medulla oblongata du-  
rissima &c. p. 566.

Obs. 21. Tumor in hepate. Ibid.

Obs. 22. Cor maximum plurimis ulcusculis in superfi-  
cie alteratum. Ibid.

Obs. 23. Diaphragmatis disruptio & ventriculi in tho-  
racem ascensus. p. 567.

Obs. 24. Strangulatio superioris orificij ventriculi à  
mole maxima hepatis & ventriculus in umbilicalem  
regionem detrusus. p. 568.

Obs. 25. Maxima lymphae copia in venticulis cerebri  
portio cerebri supra nervos opticos corrupta. Ibid.

Obs. 26. Fungosa cerebri excrecentia. Ibid.

Obs. 27. Pulmonis inflammatio, hepatis & lienis ob-  
structio, polypti in venticulis cordis. p. 569.

Obs. 28. Cordis abscessus &c. Ibid.

Obs. 29. Hepar sclerosum cum duritie lienis & pan-  
creatis, serum in th. trace extravasatum: Pulmo mul-  
tiplici materia turgidus, cor maxime magnitudinis.  
p. 570.

Obs. 30. Hepar albicans, hymenis existentia, dextra cor-  
dis auricula varicosa &c. p. 571.

Obs. 31. Cordis polypti, Abscessus in pericardio, illius  
interna & cordis externa superficies alterata &c.  
p. 572.

FINIS.